

Vol 1

N^o 3

256

Macao

Psitacus macrourus ruber.

remigibus supra caeruleis, subtus ruffis
genis nudis rugosis. *Lin. Syst. Nat. p. 96*

The Red Macaw

Vol 1

N 3

Ararauna

258

2 *Pittacus macrourus Supra caruleus,*

Genis natis; lineis plumosis. Lin. Syst. Nat. p. 96

The Blue Macaw

No. 201. N. 2.
Macao Viridis Cristatus

259

Pittacus macrourus, cauda cunei
formi rostro nigro genis coccineis nudis.

Tridibus albidis pedibus nigris, fronte rubro

Capite crista Dorsio et alis viridibus

Uropigio caeruleo. Splendentē Cauda

caerulea media rubra.

The Green Macaw

Vol. 11. N. 54.
260.
Macao Minor

Ps. Macrourus minor. magnitudine

Columbi. rostrum superiore parte

albicat subtus nigrescat. genus albis

nudis corpore et cauda coccineis remigibus

caeruleis rectricibus flavis. abdomine

caeruleo. pedibus griseis.

Habitat in India Orientali

The Small Macaw

Vol. 1 N. 6
261

Psitticus Macrourus
Viridis

Ps. Macrourus rotio palpebris et
pedibus albidis irridibus ferruginis
toto Corpore Viride. magnitudine
Columbæ

The great Green Parroquet

Vol. 1

No. 7 1367

Torquatus

Ps. Macrourus rostri maxilla superior
rubro inferiore nigro. Iribus flavis
circulis coccineis cinctis. capite et
pectore e viride purpureascentibus
abdomine viride flavescente collo
anulo coccineo cincto. Dorsis alis et
cauda viridibus remigibus tamen
et rectricibus longissimis caeruleis
pedibus griseis purpureascentibus.
Magnitudine precedenti aequalis

King Parroquet

Parlon #7

Vol 1 No 3 N. 8
Bengalensis major

P. Macrourus viridis rostro rubro. capite
collo et pectore et ventre palide virescente
Dorso et alis viridibus. nucha et humeris
Maculis Coccineis notatis. lineis
Circularis nigris ab inferiore parte
Rostris ad nucha ²²tractis. ~~in~~
Cauda longa Caerulea rectricibus
inferioribus flavis

The Great Benghall
Parroquet

Vol 1

284

N 9

Benghalensis major

Femina

*In Femina hujus Species Lineae
Circularæ nigrae desunt*

The Hen of the Great

Benghall Parroquet

Rufirostris.

Pittacus^{Macr.} *viridis rostro rubro cera alba*
iridibus flavis palpebris albis. rectricibus
longioribus caeruleis. pedibus
griseis. magnitudine precedenti paulo
minore.

The Green Parroquet.
with a red Beak.

Cuculatus

P. macrorus rostro flavo cerea e maxilla inferiore
nigrescente pupillis Nigris circulis albis conetis.

Fronte et genis coccineis occipite cuculato Cæruleo
gula nigra pectore abdomine et femoribus luteis
collo parte inferiore flavo superiore viride
cærulescente et splendente dorso viride
flavescente alis partibus superioribus
glaucis macculo coccineo notatis remigibus
et tectricibus viridibus. uropigio glauco splendente
sicut etiam rectricibus inferioribus tamen
apicibus luteis rectricibus albis. pedibus albis
magnitudine præcedenti æqualis.

Habitat In Insulla Boylonica

The Bloom Bird

Vol 1

267

N 12

Canicularis

P. macrourus viridis, fronte rubra,

occipite remigibusque extremis

cæruleis.

L. S. N. p. 60

Habitat in America.

The red and Blue headed

Parraket

*Psittacus Macrourus viridis, extremitibus
plurimum fuscis, rostro luteo, cera alba,
pedibus albicantibus, tectricibus flavis.
Magnitudinis Turdi. Cauda corpore
longiore.*

Benghalensis.

*P. Macrourus. Protri mandibula superiore
Coccinea inferiore nigra Capite purpureo fronte
et gula nigris Cotto viride Pallescente Dorso
uro^o pugi abdomine et Cauda viridibus. Pectore
Poenicio. Alis viridibus Maculis flavis remigibus
quatuor primariis ac etiam Pectricibus duabus
Longissimis Caeruleis.
Habitat in Bengall magnitudine Merula
The Bengall Paroquet.*

271
10
Aurantiacus -

*Submacrourus flavus virescens rostro et pedibus
nigrescentibus capite et pectore Aurantiis.
Tectricibus viridibus sed in extremitatibus
luteis. Remigibus et Pectricibus superiore
partibus caeruleis subtus flavis
virescentibus. dorso abdomine et
partibus superioribus alarum flavis
virescentibus.*

*Magnitudo Turdi Cauda curvei formis.
sed non Clongata.*

Vol 1 272 N 17
Borneus.

*P. macrourus ruber, remigibus rectoribus,
que apice viridibus, alis macula caerulea*

Habitat in India: Borneo. L.S.N. p. 97

The Parrot of Borneo

P.
Psittacus.

*Rostrum aduncum: mandibula
superiore mobila cera instructa.*

Lingua carnosae, obtusa, integra.

Pedum digiti antici 2. posticique 2.

The Parrot.

minio-rostris.

P. submacrourus viridis, rostro ^{miniato} sanguineo,
vertice caeruleo, alis luteo caeruleoque
variegatis.

Magnitudo *P. Erithaci*. Rostrum ~~viride~~
^{Cera albida.} sanguineo-miniatum. Totum Corpus
viride, Collum saturatius. Vertex cyaneo-
caeruleum. Ala virides: Tectrices —
humerum caeruleo-nigra; media luteo
marginata; inferiores quo longiores mar-
gine flavicantes: Remiges intus —
nigricantes, extus ~~glauca~~ viridi-glauca
Cauda corpore paulo brevior, cuneiformis,
viridis. Pedes albescentes. Oculorum
circulus cinerascens. Iris Pupilla nigra,
Iride fusca annulo albido-crystallino cincta.
Habitat in India orientali.

*Cristatus.**P. brachyurus albus, crista dependente**flava.**L. S. N. p. 99**Habitat in China.**The Cockatoo.*

Vol 1

278

W. 23

Cristatus

*P. Brachyurus albus, crista
dependente flava.*

Habitat in China. L. S. N. 99

The Cockatoo the female

Vol 1

279

N 24

Niger

17 *P. brachyurus niger.*

L. J. N. p. 99

Habitat in Madagascar

The Black Parrot.

Niger Cauda Rubro

*P. Brachyurus Niger. rostro et toto
Corpore et pedibus Nigris. Cauda
rubra Temporibus canis. L. S. N. p. 117*

Habitat in America Septentrionali

*The American Black
Parrot*

*Erithacus**P. Br. canus; temporibus, cauda**coccinea.**L. L. N. p 99**Habitat in Guinea**The Grey Parrot*

Vol

284

N 20

18

Sordidus.

18 *P. brachyurus subfuscus. gula*

caerulea, alis caudaque viribus,

rostris anoque rubris. L. S. N. p. 99

Habitat in Mexico.

Vol 7

285

N 29

Leuco-cephalus.

26 *P. Brachyurus Viridis, remigibus
caeruleis, fronte alba, cauda rubra.*

habitat in America L. S. N. p 101

*The White Headed
Parrot.*

Astivus.

27 Ps. Brachyurus Viridis. fronte Cærulea

humeris sanguineis. magnitudine

columbae. L. S. N. p 101

Habitat in America.

The Summer Parrot

287
Vol. 1
31
Brasiliensis

30 *P. Brachyurus Viridis fronte rubra*
Temporibus Caeruleis. Occipite flavo
Habitat in Brasilia. L. S. N. p. 102.

The Brazilian Parrot

290
1736
Autumnalis

31 P. Brachyurus Viridis, fronte
remigumq₃ macula coccinea. Vertice
Remigibusq₃ primoribus Cæruleis. L.S.N. p. 102.

Habitat in America.

The Autumnal Parrot

Vol 1 291 N 33
*Psittacus ab. Insula
S^t Thomæ.*

*P. Br. Viridis fronte et rostro albido cervice
et genis humeris q^{ue} flavis. Dorsio viride pennis
margine nigris remigibus lateribus exteris
parte superiore coccineo cæteris cæruleis pectore
et Abdomine viride cærulescente rectricibus
duodecimis quorum medius duobus viridibus
apicibus flavescens. Quatuor in parte
superiore viridibus inferiore flavis: sex
alteris in parte superiore coccineis
inferiore flavis sed in duobus in extremis
margine exteriori Cæruleo.*

The Parrot of the Island of S^t Thomas

Vol 1 292 N 36

Chryseo Cephalus

P. Brachyurus maximus capite et collo
flava rostro et circa oculos circulis
albis. Iridibus flavis anulis rubris
cinctis. humeris coccineis. remigibus
et rectricibus extremis superiore
parte coccineo. apicibus remigium
caeruleis pedibus albis

The Great yellow headed Parrot

293

N 37

Pittacus Pectore fusco

*P. Br. viridis rostro albido fronte et genis et
humeris flavis vertice Dorso parte superiora
alarum et medio cauda viridibus collo et
pectore fusco remigibus caeruleis maculo
coccineo in mediis posito rectricibus
externis flavis femoribus abdomine
viridibus.*

The Brown Breasted
Parrot.

Vol 1 Phoebus ²⁹⁴

N 30

*Psitticus fronte
Coccineo*

*Ps. Br. rostro albo. fronte coccineo capite flavo
circulis albis oculos
circumferentibus Dorso et alis viridibus
tectricibus dilute flavescens Remigibus
et Cauda caeruleis pedibus albis. pectore
coccineo et flavo variegato.*

*The Yellow headed Parrot with
A Red forehead*

Vol 1

295

Or 39

Accipitrinus.

32 P. Brachyurus Viridis Capite
fusco Collo pectoreq. subviolaceo vario,
remigibus Pectricibusq. apice caeruleis.

Habitat in India. L. S. N. p. 102.

The Hawk Headed
Parrot

*Pitticus. Brachyurus. Viridis. rostro
et pedibus griseis. Troidibus rubris
cerculis Albidis circumferentibus
Temporibus flavis vertice gula et
Collo viridibus. pectore et Abdomine
luteis. dorso et alis viridis tamen
maculo luteo infra humeros. remigibus
caeruleis tectricibus coccineis cauda
Viride subtus in medio Coccinea.*