

從卷九 痘門

瘡根

哮喘

喘

恶心

口吐

欬

翻胃

嘈雜

閑格

癰氣

八

季卷十 瘰熱門

一 瘡


一 痛

顛狂

驚悸怔忡

京都產院文庫藏書

Dr. Saiki's Library.	
函之	或番
冊	號
備考	4437



丹溪心法附錄九卷一

痰門

痰

二十七

附錄熱

丹溪心法

○脉浮當吐 爾得脈濇卒難開也 必費調理 大凡治痰用利藥過多致脾氣虛則痰易生而多 湿痰用蒼朮白朮 熱痰用青黛黃連芩 食積痰用神曲麥芽山楂 風痰用南星老痰用海石半夏瓜蒌香附五倍子作丸服 痰在膈上必用吐法漏亦不能去 風痰多見奇証 溫痰多見倦怠軟弱氣實痰熱結在上者吐難得出痰清者屬寒二陳湯之類膠固稠濁者必用吐 熱痰挾風外証為多熱者清之 食積者必



用攻之兼氣虛者用補氣藥送。痰因火盛遂上者以治火為先。白朮、黃芩、軟石膏之類。內傷挾痰必用參芪。白朮之屬多用姜汁傳送或加半夏。虛甚加竹瀝。中氣不足加參朮。痰之為物隨氣升降無處不到。脾虛者宜清中氣以運痰降下。二陳湯加白朮之類兼用升麻提起。中焦有痰則食積。胃氣亦賴所養。卒不便虛若攻之盡則虛矣。痰成塊或吐咯不出兼氣鬱者難治。氣實痰熱者難治。痰在腸胃腑者可下而愈。在經絡中非吐不可。吐法中就有發散之義焉。假如癇病因驚而得驚則神出舍。空則痰生也。血氣入在舍而拒其神不能歸焉。血傷必用姜汁傳送。黃芩治熱痰假其下火也。竹瀉滑痰非姜汁不能行經絡。五倍子能治老痰佐他藥大治。

頑痰 二陳湯一身之痰俱治管如要下行加引下藥在上加引上藥 凡用吐藥宜升提其氣便吐也如防風山梔川芎桔梗芽茶生姜薑汁之類或用瓜蒂散 凡風痰病必用風痰藥如白附子夫麻雄黃牛黃片芩姜桑猪牙皂之類

諸吐法另具于後

○凡人身上下有塊者多是痰問其平日好食何物吐下後方用藥 許學士用蒼朮治痰成窠囊邊行極妙痰挾瘀血遂成窠囊 眇運嘈雜乃火動其痰用二陳湯加山梔子黃連黃芩之類 憶氣吞酸此食鬱有熱火氣上動黃芩為君南星半夏為臣橘紅為使熱多加青黛 痰在腸下非白芥子不能達痰在皮裏膜外抹姜汁竹瀝不能濕達痰在四肢抹竹瀝不開

痰結核在咽喉中燥不能出入用化痰藥加鹹藥軟堅之味
瓜蒌仁杏仁海石桔梗連翹少佐朴硝以姜汁蜜和丸噙服之
海粉即海石熱痰能降溫痰能燥結痰能軟頑痰能消可入
丸子末子不可入煎藥 枳實鴉痰能衝牆壁 小胃丹治膈
上痰熱風痰濕痰肩膊諸痛能損胃氣食積痰實者用之不宜多
○喉中有物咯不出嚥不下此是老痰重者吐之輕者用瓜蒌
葦氣實必用荆瀝 天花粉大能降膈上熱痰 痰在膈間使
人顛狂或健忘或風痰皆用竹瀝亦能養血與荆瀝同功治稍
重能食者用此二味効速穩當二瀝治痰結在皮裏膜外及經絡
中痰必作以姜汁一匙汁治血滯不行中焦有飲自然汁冷喫
兩三銀盞父胸中煩燥不寧而後煎 參萸丸能消痰見吞酸頭

入方

青礞石丸

解食積去濕痰重在風化硝

南星

二兩切去片用白礬末五錢水浸一二口晒乾

又云一兩

半夏

一兩泡切作片以大皂角水浸一日晒乾

片黃芩

姜汁炒一兩

茯苓

枳實

炒各一兩

法製硝

用蘿蔔水煮化去蘿蔔濾令細入臘月牛胆內風化硝秤五錢或只風化亦可又云一兩

礞石

二兩擂碎焰硝二兩同入小砂罐內瓦片蓋之鐵線縛定鹽泥固濟晒乾火煅紅候冷取出

右爲末神麃糊丸梧子大每服三五十丸白湯下

一方加蒼术半兩滑石一兩看病冷熱虛實作湯使

一本礞石南星各一兩無枳實

又方

半夏二兩

白术一兩

茯苓七錢半

黃芩

礞石一兩

風化硝二錢

右爲末同前

潤下丸 降痰甚妙

南星

一兩

半夏二兩各依橘紅製

黃芩

黃連

各一兩

橘紅半斤以水化鹽五錢拌令得所煮乾焙

甘草

炙一兩

右爲末蒸餅丸如菉豆大每服五七十丸白湯下

一方單用陳皮半斤鹽半兩水拌煮陳皮候乾焙燥爲末入甘草末一兩炒斛同上凡亦好去脣膈有痰兼嗽上熱加青金石濕加蒼莎或加參萸看虛實作湯使

又方 治濕痰喘急止心痛

半夏

一味不拘多少香油炒

右爲末粥丸梧子大每服三五十丸姜湯下

又方

薰苓

香附

半夏

姜制

貝母

已上治濕痰加瓜簍仁青黛作丸子治熱痰

又方 燥濕痰亦治白濁因痰者

南星

半夏

各一兩

蛤粉

二兩

右爲末神麃糊丸如梧子大青黛爲衣每服五十丸姜湯下
濕痰加蒼术 食積痰加神麃麥芽山楂 热痰加青黛
中和丸 治濕痰氣熱

蒼术

黃芩

半夏

香附

等分

右爲末粥丸如梧子大每服五七十丸姜湯下
又方 治痰嗽

黃芩

酒洗一兩半

貝母

南星

各一兩

滑石

白芥子

各半兩

風化硝

二錢半取其輕浮速降

右爲末湯泡蒸餅丸服

瀉痰湯

南星

炮一兩

橘紅

去白一兩

赤茯苓

去皮一兩

一

二

三

枳殼去穰炒一兩

甘草炙半兩入云一兩

半夏四兩又云四錢

水煎生姜五片食前服

手縉湯 治喘

半夏七個泡制每個作四片

皂角去皮炙一寸

甘草炙一寸

右咀作一服生姜如指大煎

小菖丹

芫花好醋浸過一宿庵砪住手撓令黑不要焦

甘遂濕麵裹泥水浸半日再水洗晒乾又云水浸冬七日

秋五日或水煮亦可

大戟長流水煮一時再水洗晒乾各半兩

火黃濕紙裹煨勿焦切焙乾再酒潤炒熟焙乾一兩半
橫柏三兩焙炒

右爲末粥丸麻子大每服二三十丸臨卧津液吞下或白湯

一口送下取其鬲上之濕痰熱積以意消息之欲利則空心
服 又方甘遂大戟咸三分之一硃砂爲衣名辰砂化痰丸

一方加木香枳榔各半兩蒸餅丸每服七八丸至十丸至

治酒痰

青黛
瓜蒌

右爲末姜密丸噙化救肺

治鬱痰

白殼龜

杏仁

爪裏仁

詞子

貝母

五倍子

右爲末糊丸梧子大每服五十丸白湯下

導痰丸

吳茱萸

錢制

茯苓一兩

黃連半兩

滑石七錢半

蒼术

泔浸一兩

右爲末糊丸梧子大每服八十九丸姜湯下

茯苓丸出千金方百一選方同

半夏四兩

茯苓二兩

枳殼一兩

風化硝半兩

右爲末蒸餅或神麃姜汁糊丸梧子大每服三十丸姜湯下

此方治中脘停痰臂痛難舉手足不得轉有效

又方 治食積痰火并濕胃火

軟石膏不拘多少研細

右用醋糊丸如菉豆大每服二十丸白湯下

又方 治陰虛內多食積痰

川芎七錢

黃連

瓜蒌仁

白朮

神麴

麥芽各一兩青黛半兩

人中白三錢

右爲末姜汁蒸餅丸服

久吐痰喘

杏仁去皮尖生用

來復丹炒

右等分爲末粥丸麻子大每服十五丸白湯下

黃連化痰丸

即黃連清化丸

半夏一兩半黃連一兩

吳茱萸湯洗一錢半

杏仁二十四箇研一兩

陳皮一兩半

右爲末麴糊丸菉豆大每服一百丸姜湯送下

白玉丸

巴豆三十箇去油

南星半夏

滑石輕粉各三錢

右爲末皂角仁浸濃汁丸梧子大每服五七丸姜湯下

黃瓜萎丸治食積痰壅滯喘急

瓜萎仁

半夏

山楂

神麴炒各等分

右爲末瓜萎水丸姜湯竹瀝送下二三十丸

又方

瓜萎仁

半夏一兩 蒼朮二兩

香附二兩半

黃芩

黃連半兩

又方

瓜萎仁

黃連半兩 半夏一兩

右爲末糊丸梧子大每服五十丸

抑痰丸

瓜萎仁一兩

半夏二錢

貝母二錢

右爲末蒸餅丸如麻子大每服一百丸姜湯下

清膈化痰丸

黃連

黃芩一兩

黃柏

山梔半兩

香附一兩半 蒼朮半兩

昇涼人法附錄

卷之二

右爲末蒸餅丸白湯下

風化痰丸

人参 槐角子 燭蚕

白礬

陳皮去白 天麻

荆芥各一兩半夏四兩姜汁炒

辰砂半兩另研

右爲末姜汁浸蒸餅爲丸辰砂爲衣服四十丸姜湯下
墜痰丸 治痰飲

黑丑頭末二兩枳實炒一兩半白礬三錢枯一半

朴硝二錢風化枳殼一兩半炒猪牙阜角一錢酒浸

右爲末用蘿蔔汁丸每服五十丸鷄鳴時服初則有糞次則

有痰

知潔心法附錄
卷之三
治濕痰

蒼朮三錢

白朮六錢

香附一錢半

白芍酒浸炒二錢半

右爲末蒸餅丸服

治肥人濕痰

苦參

半夏各一兩半

白朮三錢

陳皮乙錢

右咀作一服姜三片竹瀝半盞水煎食遠吞三補丸十五丸

祛風痰行濁氣

明礬

一兩

防風二兩

川芎

猪牙皂角

鬱金各一兩

蜈蚣一條

用赤脚黃腳各一條

右爲末蒸餅丸梧桐子大每三十丸食前茶湯下春以芭蕉

湯搜吐

工焦風痰

瓜萎

黃連

半夏

牙皂

姜汁浸炊餅丸

寒氣方

片芩炒

半夏半兩

白朮

白芍一兩

茯苓

陳皮三錢

右為末姜汁泡蒸餅丸服

利膈化痰丸

南星

蛤粉研細一兩半夏

瓜萎仁

貝母去心治

胸膈痰氣妙香附半兩酒浸

右為末用猪牙皂角十四挺敲碎水一碗半煎杏仁去皮尖

一兩黃芩將乾去皂角搗杏仁如泥入前藥搜和再入姜汁
泡蒸餅丸如棗大青金爲衣每服五十丸姜湯下

清膈丸

黃芩半斤酒浸炒黃

南星四兩生用半夏湯泡七次

右爲末姜汁打糊丸

清痰丸 專清中脘熱痰積

烏梅

枯礬

黃芩

蒼朮

陳皮

滑石

青皮

枳實各半兩

南星

半夏

神麴

山楂

乾生姜

香附各一兩

右爲末湯浸蒸餅丸服

充接府溪治病以瘀為重諸病多因瘀而生故前諸方間有別出者亦其平日常用故不另開於附方觀者詳焉

附諸賢論

劉宗厚曰瘀之為病仲景論四飲六証無擇叙內外三因俱為切當蓋四飲則叙因瘀而顯諸證者三因則論其因有所傷而生瘀者也唯王隱君論人之諸疾悉出於瘀此承前人所未論可謂深識瘀之情狀而得其奧者矣製漆瘀丸一方總治斯疾固為簡便較之仲景三因有表裏內外而分汗下溫利之法則疎闊矣况又有虛實寒熱之不同者哉夫瘀病之原有因熱而生瘀者亦有因瘀而生熱者有因風寒暑濕而得者有因驚而得者有因氣而得者有因酒飲而得者有因

食積而得者有脾虛不能運化而生者有腎虛不能降火而生者若熱瘀則多煩熱風瘀多成癱瘓奇証冷瘀多成骨痺濕瘀多倦怠軟弱驚瘀多成心痛懶疾飲瘀多成脇痛臂痛食積瘀多成癰塊瘀滿其為病狀種七難名王隱君論中頗為詳盡學者但察其病形脉證則知所挾之邪隨其表裏上下虛實以治也若夫子和謂飲無補法必當去水故用吐汗下之三法治人常愈又論熱瘀治瘀之誤固為詳切亦有挾寒挾虛之証不可不論夫久瘀凝結膠固不通狀若寒凝不用溫藥引導必有拒格之患寧有風寒外束瘀氣內鬱者不用溫散亦何以開鬱行滯又有血氣虧乏之人瘀客中焦閉塞清道以致四肢百骸發為諸病理宜導去瘀滯必當補接

兼行又難拘於子和之三法也夫久病久淹延卒不便死者
多因食積痰飲所致何以然者蓋胃氣亦賴痰積所養飲食
雖少胃氣卒不便虛故也亦有治痰用峻利過多則脾氣愈
虛津液不運痰反生而愈盛法當補脾胃清中氣則痰自然
運下此乃治本之法也謂腎中之王道者正此類也

附脉理

脉訣舉要曰偏弦為飲或沉弦滑或結或伏痰飲中節
脉理提綱曰痰脉弦滑

附諸方

金沸草散和濟方治外感風寒痰氣內鬱咳嗽稠粘
參蘇飲和劑方亦治外感風寒痰氣停積胸膈咳嗽氣促言語

不能相續者並見傷風類

小青龍湯和剝方治外感風寒內溢飲支欬倚息喘滿不得安卧者見咳嗽類

法製半夏御藥院方消飲化痰健膈順氣

右用大半夏以湯泡洗一遍去眩再泡洗如此七遍焙乾用濃米泔浸一日夜取出控乾每半夏一兩用白礬一两半研細溫水化浸半夏止留不兩指許頭放浸冬月於暖處頓放浸五日夜取出焙乾用鉛白霜一錢溫水化又浸一日夜通前七日尽取出再用鹽水放慢火內煮勿令滾候鹽水極熱取出焙乾於銀石器或磁器內收貯每服一二粒食後細嚼生姜湯下又一法依前製成半夏每一兩用龍腦半錢

研極細同飛過硃砂於半夏上再為末却鋪上燈草約厚一
指單排半夏於上再用燈草蓋約厚一指以炒豆焙之候乾
取出於器內收貯每服一二粒細嚼食後溫水下或冷茶送下
橘皮半夏湯宣明方痰嗽久不已者

橘皮去白半兩半夏二錢半湯七次

右為末分作二服每服水一盞半入生姜十片同煎六分溫服

茯苓半夏湯治停痰留飲胸膈溼悶嘔逆惡心吐痰水

茯苓去皮三兩半夏湯炮七次五兩

右㕮咀每服四錢水一盞姜七片煎六分空心服

大半夏湯御藥院方治痰飲及脾胃不和

半夏

陳皮

茯苓各二錢半

右㕮咀水二盞生姜二錢半煎一王八分去滓食後溫服
二陳湯和劑方治痰飲為患或嘔吐惡心或頭眩心悸或因食
生冷飲酒過度脾胃不和並宜服之

半夏

湯洗七次去滑衣

橘紅

陳皮去白者是各五兩

白茯苓

去皮三兩

甘草

早炙一兩半

右㕮咀每服四錢水一盞生姜七片烏梅一箇同煎至六分
熱服

○廣按此方半夏豁痰燥濕橘紅消痰利氣茯苓降氣滲湿
甘草補脾和中蓋補脾則不生濕燥濕滲濕則不生痰利
氣降氣則痰消解可謂休思兼該標本兩盡之藥也今人
但見半夏性燥便以他藥去之殊失立方之旨若果血虛

燥症用姜汁製角何妨抑嘗論之二陳湯治痰之主藥也
如寒痰加附子姜桂濕痰加蒼白一本食積痰加麵蘖山
楂熟痰加芩連梔子風痰加南星皂角燥痰加瓜慈青黛
欒痰枳壳燒香附老痰加海石朴硝乃合其宜

丁香半夏丸和剤方治脾胃宿冷胸膈停痰嘔吐惡心吞酸噫
氣心腹痞滿不思飲食

肉豆蔻

木香

丁香

人參

陳皮

去白各二錢半

藿香葉

半兩

半夏

湯泡七次姜製三兩

右為末以生姜汁煮麵糊丸如小豆大每服二三十丸姜湯下

○已上數方治寒痰之劑

平胃散

治有濕痰倦怠軟弱嗜卧沉困無力

方見中溫

五苓散

治腑下有停飲癲眩吐涎沫

方見濕熱

化痰丸

本草方治停痰宿食

半夏

湯泡

人參

去芦

桔梗

細切姜片剝

白朮

枳實

香附子

白茯苓

各一兩

前胡

去芦

甘草

各半兩

右為末用半夏姜汁煮糊丸如梧桐子大每服四五十丸姜

湯下

檳榔散

濟生方治胸膈停滯痰飲腹中虛鳴食不消化時或

杏仁

去皮炒

旋覆花

去枝梗半夏

湯洗七次

換榔

各一兩

甘草

五錢

桔梗

去芦炒

白朮

各一兩

人參

五錢

乾姜

炮

橘紅各一兩

右㕮咀每眼四錢水一盞半姜五片煎至八分溫服

半夏湯

瑞竹堂方
姜製一兩

順陰陽消痞滿消酒化痰

半夏

姜製一兩

橘紅

去白一兩
桔梗

去芦一兩

枳實

去穰炒半兩

右㕮咀每服四錢水一盞半生姜五片煎至七分半饑半飽

熱服

海藏五飲湯

拔粹方
一留飲心下二癖飲腸下三痰飲胃中四

溢飲膈上五流飲膀胱間凡此五飲酒後傷寒飲冷過多故有

此疾

旋覆花

人參

陳皮

枳殼

白朮

茯苓

厚朴

半夏

澤鴻

猪苓

前胡

桂心

芍藥

甘草

各等分

右剉每兩分四服水二盞生姜十片同煎至六分取清溫服
不拘時候忌食肉生冷滋味等物因酒多飲加葛根葛花砂仁
蠲飲枳實丸拔萃方逐飲消痰導滯清膈

枳實

去穰炒

半夏

湯泡七次

陳皮

去白各二兩

黑牽牛

半斤取頭末三兩

右為末水煮麵糊為丸如梧桐子大每服五十九生姜湯下
食後

葛花解醒湯

拔粹方

治酒飲太過嘔吐痰逆心神煩亂胸膈痞

塞手足戰搖飲食減少小便不利

見傷食類

一方 治痰飲流注疼痛

用大半夏二兩湯浸為末風化朴硝二兩生姜自然汁糊丸
如梧桐子大每服五丸姜湯下痛在上臨卧服痛在空心服
○已上數方治濕痰食積痰之劑

清氣化痰丸古庵方清頭目涼膈化痰利氣

半夏湯洗七次二兩

陳皮去白

茯苓去皮各一兩半

薄荷葉

荆芥穗各五錢

黃芩酒浸炒連翹

梔子仁炒

桔梗去梗

甘草炙各一刀

右為末姜汁煎水打糊為丸如梧桐子大每服五十九食後臨
卧各一服如腸胃燥實加酒炒大黃芒硝各一兩

○廣按此方即二陳湯與涼膈散相合是也蓋痰因火動

升涼丸治附錄
平和自效創九
十五
故作育膈痞滿頭目昏眩今因二陳以豁痰利氣涼膈以降火散風熱何病之不瘳哉

條痰丸御藥院方治三焦氣滯痰築利胸膈痞滿咳唾稠粘面目熱赤肢体倦怠不思飲食常服升降滯氣清膈化痰

木香

枳榔

青皮去白

陳皮去白

京三稜煨

枳殼去穰麵炒

半夏洗七次各一刃

大黃

一刃煨黑牽牛微炒二刃

右為末水糊丸梧桐子大每服四五十丸姜湯食後下利膈丸拔粹方治風勝痰實喘滿咳嗽風氣上攻

黑牽牛

炒四刃半夏洗

皂角

去皮弦酥炙各二兩

青皮去白

梔角子炒

木香

各一刃

枳榔

大黃各半兩

右為末生姜糊丸如梧子大每服七十丸生姜湯下食後

開結枳實丸御藥院方宣導滯氣消化痰飲升降陰陽通行三

焦蕩滌脾胃流暢大小腸導膀胱專主胃中痞逆惡心嘔噦
飲酒不消宿食停積兩脇脹悶咽嗌不利上氣喘嗽黃疸肺

枳實炒

白术

半夏製

南星炮

白礬枯

苦草莖炒

大黃

青皮去白各五錢

木香三錢

黑牽牛頭末二錢

大皂角酥炙去皮弦

旋覆花各一錢

右為末生姜汁糊為丸梧子大每服五十丸姜湯下無時婦
人乾血氣膈實腫滿或大便不通小便不利生姜葱白湯下

王隱君滾痰丸

括曰旣裏翻身甲掛金于今頭戴草堂深相逢二八求斤正
硝煅青礞倍若沉十七两中零半两水丸桐子意常斟千般
恆証如神効水濁双身却不任

大黄 酒蒸 黄芩 杏酒洗淨各八分 沉香半两

礞石 一两搗碎焰硝一两用入小砂罐內蓋之鐵縛練定
鹽泥固濟晒乾火煅紅候冷取出

一方加硃砂二两研為細末為衣

右為細末水丸梧子大每服四五十丸量虛實加減服茶清
溫水任下臨卧食後服

按此以大黃黃芩為君大濁陽明濕熱之藥礞石以降痰沉

香則引諸氣上而至天下而至泉爲使也

大利膈痰粹方主胸中不利痰嗽喘促脾胃壅滯

木香七錢 檀榔七錢半厚朴一兩姜制人參去芦

藿香葉

當歸

甘草炙

枳實炒

大黃酒浸焙一兩

右爲末水浸蒸餅丸如梧子大每服五十丸溫水下食後或臨卧服

○已上數方治熱痰之劑

辰砂化痰丸和劑方治風化痰安神定志利咽膈清頭目

白礬枯過別研

辰砂飛研各半兩

南星

二兩炮半夏洗七次姜汁搗作麯三兩

右以白礬半夏麵天南星爲末和匀生姜汁煮麵糊丸如梧

桐子別用辰砂爲衣每服二十丸食後姜湯下

半夏利膈丸御藥院方治風痰壅盛頭疼目眩咽膈不利涕唾稠粘并治過酒停呴逆惡心胸脇引痛腹內有聲

半夏湯洗三兩

白茯苓去皮

白礬

生

人參去芦

滑石

貝母各一兩

白附子生用

二兩

天南星

生用兩半

白朮

一兩

右爲末麵糊丸如梧桐子大每服三十丸食後姜湯下

葉氏分涎方簡易方治風痰留滯膈間喘滿惡心涎唾不利

陳皮去白

棟參

枳實

苦梗

半夏洗七次令軟每個切四片姜湯浸一夕

天南星

去另皮蒸餅包灰火煨香熟取出各等分

右咬咀每服二錢水一盞姜十片同煎食後服

靈砂白丸子

治元氣虛弱痰氣上攻風痰壅塞嘔吐已

靈砂

青州白丸子水各一兩各研

右爲末和勻以生姜自然汁打黍米糊丸如梧桐子大每服三十九空心人參湯或枣湯下

大人參半夏丸

宣明方化痰墜涎止嗽定喘治諸痰不可盡述

茯苓

去皮人參去蘆

天南星

薄荷葉各半兩

蛤粉

一兩

藿香葉

二兩半

乾生姜

半夏

白礬生

寒水石

右爲麵糊丸

如小豆大生姜湯下二三十丸食後溫水亦得

一方加雷連半兩黃蘖一兩水丸取效愈速治酒病調和臟腑尤宜服之

治風痰不下

聖惠方

荆芥四兩 白礪生一兩槐角生二兩陳皮

半夏各二兩半

右爲末水糊爲丸如梧桐子大每服四十丸生姜湯下

辰砂祛痰丸聖惠方治酒食過多酸鹹作成痰飲聚於胸中凝則嘔逆惡心流則脅痛頭目昏眩腰腳疼痛深則左癱右瘓淺則蹶然倒地此藥神效

硃砂一兩水飛一半入藥一半爲衣 半夏四兩

槐角炒

白礪生

陳皮

荆芥各一兩

生姜

四兩半夏製作餅陰乾

右為末姜汁打糊丸如梧桐子大每服五十九生姜湯皂角子湯任下忌動風動氣物食後溫服

化痰丸

瑞竹堂方

快脾順氣化痰消食

半夏淨洗

皂角切碎

天南星去皮膜生薑

白藥

右件各四兩用砂鍋同水煮天南星無白點為度揀去皂角不須將半夏天南星生姜切細晒乾如無日色慢火焙乾加後水

青皮

三樣

陳皮

乾葛

紫蘇子

神曲

六樣

麥芽炒

山楂

蘿蔔子炒別研

香附子去皮尖炒另研

一方加枳實枝令

右十味各一兩合前藥碾末姜汁蜜餅打糊丸如梧桐子大
每服五七十丸食後服臥茶酒下

利潤化

白朮四兩 皂角去皮殼子三兩

生平真

生白齋

右將皂角擣水半碗浸半夏白朮各五
夏三秋七冬十日不
用皂角晒乾為末姜汁糊為丸加梧桐子大每服三十丸姜

陽下

已上數方治風眩之劑

七湯和濟方治七情氣鬱結聚痰涎狀如破絮或如梅核在咽喉之間咯不出嚥不下并治中脘痞滿痰涎壅盛上氣喘急

半夏

五兩

茯苓

四兩

紫蘇

三兩

厚朴

三兩

右㕮咀每服四錢水一盞半生姜七片東子一枚煎至六分熱服婦人有孕惡阻亦宜服之但半夏用姜汁製過男子因氣而小便白濁用此湯下青州白丸子有效

三仙丸

百一選方

治中脘氣滯胸膈煩滿痰涎不利頭目不清

南星

生去皮半夏

湯洗七次二味各五兩為末用生姜自

然十和下可太軟但手捏得聚為度搘在篩中用揩禁蓋之令發黃色晒乾收之須是五六月內做曲如

醫方 卷之二十一

八

醬黃法

香附子

畧炒於磚石上磨去毛五兩

右為末麵糊丸如梧桐子大每服四十丸食後姜湯下機要
去香附加橘紅名玉粉丸治氣痰

沉香和中丸

秘方治証同前

陳皮

去白

青皮

枳殼

梅榔

木香

黃芩

青礞石

烟硝煅各半兩

大黃

一兩一分

沈香

二錢

滑石

二兩

黑牽牛

頭末二兩二錢

右為末滴水為丸如梧子大每服五十丸茶清下臨卧服

節齊化痰丸

論曰痰者病名也人之一身氣血清順則津液流通何痰之有惟夫氣血濁逆則津液不清薰蒸成聚而變為痰焉痰之本水也原於胃痰之動濕也主於脾古人用二陳湯為治痰通用者所以實脾燥濕治其標也然以之而治濕痰寒痰痰飲痰涎則固是矣也夫痰因火上肺氣不清咳嗽時作及老痰鬱痰結成粘塊痰滯喉間吐咯難出此等之痰皆因火邪炎上薰於上焦肺氣被鬱故其津液之隨氣而升者為火薰蒸凝濁鬱結而成歲月積久根迷蒂固故名老名鬱而其源則火邪也病在上焦心肺之分因候之間非中焦脾胃濕痰以痰飲痰涎之比也故涉藥雜治亦非半夏茯苓蒼朮枳殼南星等藥所能治也惟在開其鬱降其火清潤肺金而消

化凝結之痰緩以治之庶可取力今製一方于后

天門冬去心一两

黃芩酒炒一两海粉另研一两

瓜蒌仁另研一两

橘紅二两去白桔梗去芦五钱

杏附子搗碎淡鹽水浸炒五钱

連翹五钱

青黛另研三钱

芒硝三钱另研

右為極細末煉蜜入生姜汁少許和藥末杵極勻丸如小龍
眼大噙化一丸或嚼
外清湯細嚥之或丸為細丸如黍米大
淡姜湯送下五六十九

此等老痰大率飲酒之人多有之酒氣上升為火肺與胃
脘皆受火和故欬滯而盛功用天門冬黃芩泄肺火也海
粉芒硝鹹以軟堅也芩仁潤肺降痰香附米開欬降氣

連翹開結降火青黛散
醫火故皆不用辛燥之藥

○已上數方治鬱肺老痰之劑

蘇子降氣湯和劑方治虛陽上攻氣不升降上盛下虛痰涎壅

川當歸云芦甘草炙

前胡去芦

肉桂去皮

厚朴去皮姜制各二兩

半夏麴

紫蘇子各五兩

陳皮去白三兩半

右㕮咀每服五錢水一盞姜三片枣一枚煎服不拘時

俞山人降氣湯和劑方治上盛下虛痰氣壅盛或喘或滿咽乾

不利并治脚氣上攻煩渴云火吹

前胡去芦

五加皮姜制蜜炙

肉桂

當歸去芦

半夏麴

紫蘇子

陳皮去白

厚朴

去皮姜制

兩枚各一兩

桔梗

羌活

去芦各五錢

甘草一兩

乾姜炮

附子

炮去皮人參去芦各五錢

附子

炮去皮半

沉香

右咬咀每服五錢水一盞半紫蘇三葉姜三片枣一枚煎服

黑錫丹和剝方治寒氣壅塞上盛下虛心火炎熾腎水枯竭及婦人血海久冷無子或赤白帶下並皆服之

肉桂

去皮半兩

沉香

附子

炮去皮

附子

<

黑色爲度酒糊爲丸如梧桐子大陰乾入布袋內擦令光
瑩每服四十粒空心鹽姜湯下女人艾東湯下

靈砂丹和劑方治上盛下虛痰涎壅塞此藥最能鎮降升降陰
陽安和五臟扶助元氣

水銀一兩硫黃四兩

右用新鐵錠炒成砂有烟卽以醋洒候研細入水火丹醋調
赤石脂封口鐵線扎縛晒乾塗泥固濟用炭二十斤煅如鼎
裂筆蘸赤石脂頻抹火盡爲度經宿取出研爲末糯米糊爲
丸如麻子大每服二十粒空心東湯米飲人參任下

○廣按已下四方竝係類聚溫熱之藥而出証皆云治上盛
下虛氣不升降蓋謂盛者卽心火之炎虛者卽腎水之弱

火炎水弱則有升無降故津液湧而爲痰稠粘膠固凝滯於胸膈之間非金石丹藥溫熱香燥之劑而能流通開散之乎書云重可以去怯正所謂刲劑也用此刲劑之後又當用兼補兼消之藥繼之如六味地黃丸之類是也

金匱腎氣丸即六味地黃丸治腎氣有飲故用此藥補腎逐水見補損

○廣按腎水虛弱則心火上炎以致津液敗濁而爲痰涎用此劑補腎逐水乃根本之藥也前黑錫丹等劑溫脾刲痰之治標之藥也

六君子湯 治脾虛不進飲食嘔吐痰水 方見調補脾胃
中下二經方 治胃中虛損及痰吐者

半夏麴一兩白术一錢 桂榔一錢半木香

甘草炙各二錢

茯苓二錢

右爲末每服二錢生姜湯調下食前服

八味丸

治脾腎兩虛嗽唾而不咳者方見補損

○已上數方治虛痰之劑

○廣按痰本津液因熱而成熱則津液薰蒸而稠濁故名爲痰也痰之爲物隨氣升降無處不到或在臟腑或在經絡所以爲病之多也若夫寒痰濕痰熱痰則易治至於風痰燥痰老痰則難治也分而治焉寒則溫之濕則燥之熱則清之風則散之燥則潤之老則軟之總而治之用人參甘草以補脾半夏白术以燥濕陳皮青皮以利氣茯苓澤泻

以滲水是舉其縑也如寒痰加以附子乾桂濕痰加以蒼
朮厚朴食積痰加以麵蘖山楂熱痰加以岑連梔子風痰
加以南星皂角燥痰加以瓜萎杏仁鬱痰加以枳殼香附
老痰加以海石芒硝是張其目也雖然痰證又有挾虛者
不可不加補藥焉如挾氣虛加以四君血虛加以四物脾
虛治以六君腎虛治以六味分其表裏上下審寒熱虛實
而施治之未有不中其情者

痰飲治例

出明医確暑

王節齋曰痰屬濕乃津液所化因風寒濕熱之感或七情飲
食所傷以致氣逆液濁變爲痰飲或吐咯上出或凝滯胸膈
或留聚腸胃或流注經絡四肢隨氣升降遍身上下無處不

到其為病也為喘為欬為惡心嘔吐為痞隔壅塞閑格異病
為泄為眩暈為慟雜怔忡驚悸為癲狂為寒熱為痛腫或胸
間轆轤有聲或背心一點常如冰冷或四肢麻痺不仁皆痰
所致百病中多有兼痰者世所不知也痰有新久輕重之殊
新而輕者形色清白稀薄氣味亦淡久而重者黃濁稠粘凝
結欬之難出漸成惡味酸辣腥臊鹹苦甚至帶血而出治法
痰生於脾胃實脾燥濕又隨氣而升宜順氣爲先分導次之
又氣升屬火順氣在於降火熱痰則清之濕痰則燥之風痰
則散之鬱痰則開之頑痰則軟之食積痰則消之在上者吐
之在中者下之又中氣虛者宜固中氣以運痰若攻之太重
則胃氣虛而痰愈盛矣

主方二陳湯

橘紅

半夏

湯泡

白茯苓

甘草

生姜

右方據治一身之痰如要下行加引下藥上行加引上藥
濕痰多軟如身軀倦怠之類加蒼朮白朮

寒痰痞塞胸中倍加半夏甚者加麻黃細辛烏頭之類痰厥
頭痛亦加半夏

風痰加南星枳殼白附子天麻姜桑猪牙皂角之類氣虛者
更加竹瀝氣實加荆瀝俱用姜汁

熱痰加黃芩黃連痰因火盛遂上降火為先加白朮黃芩軟
石膏黃連之類眩暉嘈雜者火動其痰也亦加山梔黃連

黃芩

血虛有痰者加天門冬知母瓜萎仁香附米竹瀝姜汁
血者更加黃芩曰芍藥桑白皮 血滯不中行佳有飲者
取竹瀝加生姜薤菜自然汁吃三五銀盞必胸中燥煩不
寧後愈

氣虛有痰者加人參白朮 脾虛者宜補中虛以運痰降下
加白朮白芍藥補梨麥芽蕡用升麻提起內傷挾痰加人
參黃耆白朮之類姜汁傳送或加竹瀝尤妙

食積痰加神麵麥芽山楂炒黃連枳實以消之甚者必用攻
之宜丸藥兼血虛者用補血藥送下中焦有痰者食積也
胃氣亦賴所養故不便虛若攻之盡則虛矣

老痰用海石半夏瓜萎仁香附米連翹之類五倍子佐他藥
大治頑痰宜丸藥 喉中有物咯不出嚥不下此痰結也
用藥化之加鹹藥軟堅之類宜瓜萎仁杏仁海石桔梗連
翹香附少佐朴硝姜汁煉蜜和丸噙服之脉脉濇者卒難
開必費調理氣實痰熱結者吐難得出或成塊吐咯不出
氣滯者難治

痰在膈上必用吐法瀉之不吐膠固稠濁者必用吐脈浮者
宜吐痰在經絡間非吐不可吐中就有發散之義凡用吐
藥宜升提其氣便吐如防風川芎桔梗 条生姜薑薤汁之
類或瓜蒂散凡吐用布緊勒肚於不通風處行走
痰在腸胃間可下而愈枳實甘遂巴豆大黃芒硝之類凡痰

用荆瀝過多脾氣易虛則癰易生而多

癰在脇下非白芥子不能辯

癰在皮裏膜外非姜汁竹瀝不可及在四肢非竹瀝
經絡中亦用竹瀝必佐以生姜韭汁膈間有癰或嘔
健忘或風癰俱用竹瀝與荆瀝同功氣虛少食用竹瀝氣
實能食用荆瀝

凡人身中下有塊是癰也問其平日好食何物吐下後方

用桑

凡人頭面頸頰身中有結核不痛不紅不作膿者皆癰注也
宜隨處用藥消之

滾痰丸攻瀉腸胃癰積及小兒食積癰急驚風癰盛者最為

要藥常宜合備但湏量人虛實而用之

○痰熱新增

附諸賢論

劉宗厚曰夫痰熱之原有因熱而生痰者有因痰而生熱者廣按因熱而生痰者熱則董蒸津液而成痰因痰而生熱者痰則阻礙氣道而生熱夫熱生痰而痰生熱始終新久之謂也

附諸方

四神丸經驗良方治痰涎壅盛頭目昏眩肩背拘急手足禎麻
天麻大者 南星各湯洗防風去芦各一兩

薄荷葉半兩

右為末酒糊為丸如棗豆大每服二十丸荆芥生姜湯下食後

龍星丹 治諸風熱壅痰盛

鮮毒椎黃丸 治上膈壅熱痰涎不利

並見中風

鵬砂散 和剤方治大人小兒風痰熱毒喉閉生瘡鼻衄出血

山藥六斤生腦子七兩另研牙硝十四兩甘草二十兩

射香 四兩研鵬砂二十兩生另研

右為末每服服半錢好茶點服

上清丸 治膈間痰熱口舌生瘡咽喉腫痛咳嗽喘滿煩燥不

寧兒風熱

哮喘 二十八

丁集

丹溪心法

○哮喘必用薄滋味專主於痰宜大吐藥中多用醋不用涼藥
須常帶表散此寒包熱也亦有虛而不可吐者一法用二陳湯
加蒼朮黃芩作湯下小胃丹看症實用

入方一治寒包熱而喘

半夏

枳殼

桔梗

片芩炒

紫蘇

麻黃

杏仁

甘草

右水煎服

天寒加桂枝

治哮治積方

用鷄子一箇

敲殼損膜不損浸屎缸內三四日夜取出煮

熟與之効蓋雞子能去風痰

紫金丹 治哮湏三年後可用

用精猪肉二十兩一作三十兩切作骰子塊用信一兩明者研極細末拌在肉上令勻分作六分用紙筋黃泥包之用火烘令泥乾却用白炭火於無人處煅青烟出盡爲度取放地上一宿出火毒研細以湯浸蒸餅丸如菉豆大食前恭湯下大人二十九丸小兒七八丸量大小虛寢與之

喘

二十九

舟溪心法

○喘病 氣虛 陰虛 有痰 凡久痰之証未發宜扶正氣爲主已發用攻邪爲主 氣虛短氣而喘甚不可用苦寒之藥火氣盛故也宜導痰湯加千緝湯有痰亦短氣而喘 陰虛自小腹下火起衝於上喘者宜降心火補陰 有火炎者宜降心

火清肺金。有痰者用降痰下氣爲主。上氣喘而躁者爲肺
脹欲作風水証宜發汗則愈。有喘惡風痰上逆者大全方千緒
湯。佳或導痰湯加千緒湯。有陰虛挾痰喘者四物湯加枳殼
半夏祐陰降火。諸喘不止者用刦藥一二服則止。刦之後因
痰治痰。因火治火。刦藥以椒目研極細末一二錢生姜湯調下。
止之氣虛不用。又法蘿蔔子蒸熟爲君。皂角燒灰等分爲末。
生姜汁煉蜜丸如小豆大服。且七十丸噙化止之。氣虛者用
人參蜜炙黃柏麥門冬地骨皮之類。氣寔人因服則氏過多
而喘者用三卯湯以瀉氣。若喘者須用阿膠。若久病氣虛而
發喘宜阿膠人參五味子以補之。若新病氣寔而發喘者宜桑
白皮苦歷瀉之。

戴云有痰喘有氣急喘有胃虛喘有火炎上喘痰喘者凡喘
便有痰聲氣急喘者呼吸急促而無痰聲有胃氣虛喘者擗
眉顴項喘而不休火炎上喘者乍進乍退得食則減食已則
喘大槩胃中有寔火膈上有稠痰得食入咽墜下稠痰喘卽
止稍久食已入胃反助其火痰再升上喘及大作俗不知此
作胃虛治以燥熱之藥者以火濟火也業都督患此諸醫作
胃虛治之不愈後以導水丸利五大丈而安

入方

痰喘方

- 南星 半夏 杏仁 瓜蔞仁
香附 陳皮去白 皂角炭 蘿蔔子

右爲末神麃糊丸每服六七十丸姜湯

又方

羅蔔子蒸半兩皂角半兩海粉一兩南星一兩

白礬一錢半姜汁浸

右用瓜萎仁姜蜜丸噙化

却喘藥

好銅青研細 號丹少 炒赤色

右爲末每服半錢醋調空心服

附諸賢論

王節齋曰喘與脹二証相因必皆小便不利喘則心生脹脹則必自臨但要識得亦本先後先喘而後脹者生於肺先脹而

標

後喘者主於脾何則肺金司降外主皮毛經曰肺朝百脉通
調水道下輸膀胱又曰膀胱者州都之官津液藏焉氣化則
能出矣是小便之行由於肺氣之降下而輸化也若肺受邪
而上喘則失降下之令故小便漸短以致水溢皮膚而生腫
滿焉此則喘為本而腫為標治當清金降氣為主而行水次
之脾土惡溫外主肌肉土能制水若脾土受傷不能制水則
水溫妄行浸漬肌肉水既上溢則邪反浸肺氣不得降而生
喘矣此則腫為本而喘為標治當實脾行水為主而清金次
之苟肺症而用燥脾之藥則金得燥而喘愈加脾病而用清
金之藥則脾得寒而脹愈甚矣近世治喘脹者但知實脾行
水而不知分別肺脾二症予故為發明之

附脉理

袖珍方論曰允此証脉滑而手足溫者生脉濁而四肢寒者死
附諸方

三拗湯和剤方治感冒風寒鼻塞聲重語音不出咳嗽喘急

生甘草

麻黃

不去節

杏仁

不去皮尖各等分

右㕮咀每服五錢水一盞姜五片煎服以得汗為度

華蓋散和剤方治風寒冷溫之氣傷於肺經上氣喘促不得睡

卧或聲音不出者

小青龍湯和剤方治感寒咳嗽喘急不得睡卧

蘇沉九寶湯簡易方治老人小兒素有喘急遇寒暄不常發則

連綿不已咳嗽吼哮夜不得睡

並見咳嗽

分氣紫蘇散和劑方治脾胃不和氣逆喘促

五味子去梗桑白皮

茯苓去皮

甘草炙

草菓仁

大腹皮

陳皮去白

桔梗各二兩

右㕮咀秤二兩入淨紫蘇一兩五錢搗碎同一處拌勻每服四錢水一盞姜三片入鹽少許同煎空心服

紫蘇子湯

濟生方

治因憂思過度邪傷肺脾心腹脹及喘促

煩悶腸鳴氣走濂濂有聲大小便不利脉虛數而濇見氣滯

杏仁半夏湯

宣明方

治肺氣不足喘咳嗽不已并傷寒從來寒熱

杏仁去皮

桔梗

陳皮去白

茯苓去皮

漢防已

桑白皮

白礬各二錢

猪牙皂角

薄荷葉各一錢

甘草二十

右為末作二服水一盞生姜三片煎至六分食後溫服
參產散劑生方 治過食煎燭或飲酒過度致肺壅喘不得安卧

及肺癰咽燥不渴濁唾腥臭

甜葶苈

炒桔梗去芦

瓜蒌仁

川升麻

薏苡仁

桑白皮

葛根各一兩甘草炙五錢

右㕮咀每服四錢水一盞半生姜五片煎至八分去滓食後

溫服

定肺湯直指方治上氣喘嗽

紫菀

五味子

橘皮去白

甘草炙

紫蘇子炒

杏仁去皮尖炒桑白皮

炒

半夏製

枳殼麴炒等分

右㕮咀每服一两生姜五片紫蘇五葉水二盞煎至一盞食後溫服

○已上數方攻邪之劑

人參潤肺湯宣明方治肺氣不足喘急咳嗽不已往來寒熱自

汗

見咳嗽

蘇子降氣湯和剂方治虛陽上攻喘促咳嗽

見痰類

杏蘇飲直指方治上氣喘嗽浮腫

紫蘇葉二兩

五味子

大腹皮

烏梅去核

杏仁

去皮炒各一半兩

陳皮

去白

桔梗

麻黃

去節

桑白皮

炒

阿膠

炒各七分半

紫苑

甘草

各一分

右㕮咀每服五錢水一盞半生姜五片煎至八分去滓食後溫服

玉華散

直指方

治咳嗽上喘調順肺金清利咽膈安和神氣

甜葶藶

焙

桑白皮

炒

天門冬

去心

馬兜鈴

半夏

剉

紫菀

杏仁

去皮尖

貝母

炮

百合

人參

各五錢

百部

甘草

炙各二錢半

右㕮咀每服一兩水二盞生姜四片棗子三枚煎至一盞去滓食後溫服一方無生姜煎

杏參散

秘方

治胸膈脹滿上氣喘急咳嗽倚息睡卧不得

見咳嗽

○已上數方半攻半補之劑

神秘湯

二因方

治上氣喘急不得卧者

橘皮

去白

桔梗

紫蘇

五味子

人參

各等分

右㕮咀每服四錢水一盞煎至六分食後服

知母款芩湯

宣明方

治肺痿喘嗽不已往來寒熱自汗

見肺痿類

五味子湯

活人方

治喘促脉伏而數者

五味子

半兩

人參

麥門冬

去心

杏仁

去皮尖

生姜

陳皮

各一錢半

棗子

二枚

右㕮咀作二服每服水二盞煎至一盞食後服

寧肺湯

楊氏家藏方

治榮衛俱虛發熱自汗肺氣喘急咳嗽痰

唾稠黏

見咳嗽

人參保肺湯 治五勞七傷喘氣不接

見發熱

○已上數方補虛之劑

人參理肺散

板卒方

治喘不止

麻黃

去節炒黃色

木香各一兩

榧栗殼

三兩炒

人參

二兩

當歸

一兩

杏仁

三兩炒

右㕮咀每服八錢水一盞半煎至八分去渣食後溫服

紫參散

拔粹方

治形寒飲冷傷肺喘促痰涎不得安卧

麻黃

桔梗

五味子

甘草

紫蘇

各一兩

瞿粟殼

二兩

蜜炒黃色

右㕮咀每服一兩水一盞半煎至八分溫服食後

○已上二方止瀉之劑

惡心

三十

丹溪心法

○惡心有痰 有熱 有虛 皆用生姜隨證佐藥

戴云惡心者無聲無物心中欲吐不吐欲嘔不嘔雖曰惡心
實非心經之病皆在胃口上宜用生姜蓋能開胃豁痰也

附諸方

大半夏湯

半夏

陳皮

茯苓

各二錢半

右㕮咀水二盞生姜二錢半煎八分食後服

小半夏茯苓湯

半夏

五两

茯苓

三两

右咬咀每服八錢用水一盞半煎至一盞入生姜自然汁投藥中更煎一二沸熟服無時或用生姜半兩同煎

加味二陳湯

半夏

橘紅

茯苓

甘草

黃連

姜汁炒

黃芩

姜汁炒各一錢半

右作一服水二盞姜五片煎八分溫服

加味生姜理中湯

人參

白朮

生姜

甘草

半夏

陳皮

各等分

右水煎服

嘔吐 三十一

丹溪心法

凡有聲有物謂之嘔吐有聲無物謂之噦胃中有熱膈上有痰者二陳湯加炒山梔黃連生姜 有久病嘔者胃虛不納穀也用人參生姜黃芪白朮香附之類 嘔吐朱奉議以半夏橘皮生姜為主劉河間謂嘔者火氣炎上此特一端耳 有痰膈中焦食不得下者 有氣逆者有寒氣鬱於胃口者 有食滯心肺之分而新食不得下而反出者 有胃中有火與痰而嘔者嘔吐藥忌瓜蔓杏仁桃仁蘿蔔子山梔皆要吐丸藥帶香藥行散不妨注 船大吐渴飲水者即死童便飲之最妙

附脉理

脉訣舉要曰滑數為嘔代者霍亂微滑者生濇數凶斷

附諸方

香薷飲

和劑方

治伏暑而嘔

一見中暑

四君子湯

拔萃方

治久病胃虛而嘔

茯苓

白朮

人參

黃芪各一兩

右㕮咀每服一兩水二盞姜五片煎一盞去滓溫服

錢氏白朮散

治症同前

見痢類

加味理中湯

和劑方

治胃感寒嘔吐不止

人參

白朮

乾姜炮

甘草炙各一錢

丁香

十粒

右㕮咀生姜十斤水煎服

大藿香散消生方 治七情傷感氣鬱于中變成嘔吐或作寒熱
眩暉痞滿不進飲食

藿香葉

洗去土半夏

白朮

人参去芦

木香

不見火各一兩

茯苓

去灰

桔梗

去芦剉細

桃杞葉

製去毛

橘皮

甘草

炙各半兩

右為末每服五錢水一盞姜五片煎六分溫服束一枚

養胃湯徐氏方 治脾胃虛冷不思飲食嘔吐翻胃

白豆蔻仁

人參

丁香

宿砂仁

肉豆蔻

附子

炮

沉香

橘紅

麥芽

神曲

各二錢半

右為細末每服二錢姜鹽湯下

旋覆花湯 濟生方 治中脘伏痰吐逆眩暉

旋覆花

去梗半夏 湯炮七次

橘紅

乾姜

炮各一兩

枳榔

人參

去芦

甘草

炙

白朮

各半兩

右㕮咀每服四錢水一盞姜七片煎服不拘時
八味二陳湯 治停痰結氣而嘔

半夏

橘紅

各五錢

白茯苓

三兩

甘草

炙一兩半

砂仁

一兩

丁香

五錢

生姜

二兩

右水煎服

藿香養胃湯

御藥院方

治嘔吐不已

藿香葉

一兩

半夏

二兩

湯洗焙

陳皮

一兩去白

甘草

二兩

厚朴

二兩

姜制

蒼朮

三兩米泔浸

右為粗末每服五錢水一盞半生姜五片棗一枚同煎去滓溫服

生姜橘皮湯 治人方活人治乾嘔噦或致手足厥冷

橘皮

四兩

生姜

半斤

右㕮咀水七盞煮至三盞去渣逐旋溫服

濟生竹茹湯 治熱嘔或因飲酒過度而嘔者

葛根

半夏

湯炮七次二兩

甘草

炙一兩

右㕮咀每四錢水一盞入竹茹一小塊姜五片煎服

小柴胡加竹茹湯 治發熱而嘔

柴胡

二錢

半夏

湯洗一錢

黃芩

人參

甘草

炙各七分半

竹茹

一塊

橘皮

一錢

右㕮咀水一盞生姜七片煎六分溫服

三一承氣湯

宣明方

治嘔吐水漿不入食即吐大便秘或利而不

不鬆快時覺腹痛滿者或下利赤白而嘔吐食不下者或大小腸膀胱結而不通上為嘔吐膈食煎熟入硝細啜服

○廣按三因方言嘔吐証忌用利藥此言其常然大小腸膀胱熱結而不通上作嘔吐隔食若不用利藥開通發泄則嘔吐何由而止或只嘔吐而大小便不秘澁者此利藥又

當所忌也

三承氣湯見溫熱類

吐亟而嘔方

黑鉛炒成灰槟榔末等分米飲調下

欬逆

三十二

丁集

丹溪心法

○欬逆有痰 氣虛 陰火

視其有餘不足治之其詳在格

致餘論不足者人參白朮湯下大補丸有餘并有痰者吐

之人參蘆之類痰碍氣而吃逆者用蜜水吐此乃燥痰不出

痰者陳皮半夏

氣虛人參白朮

陰火黃連黃柏滑石

欬逆自利者滑石甘草炒黃柏白芍人參白朮陳皮加枳瀝服

○戴云咳逆者因痰與熱胃火者極多

附諸方

半夏生姜湯 治咳逆欲死

半夏

壹兩二錢五分

生姜一兩

右以水二盞煎八分去滓分作二服

柿蒂湯 濟生方 治胃膈痞滿咳逆不止

柿蒂

丁香 各一兩

右數回每服三錢水一盞姜五片煎服

差活附子散 濟生方 治吐利後胃寒咳逆

差活

附子

炮去皮茴香炒各五錢乾姜炮

木香

各一兩

棗少許

右咬咀每服一錢水一盞鹽少許煎至半盞溫服不拘時一

方去木香用丁香三因方二香竝用

橘皮湯 治吐利後胃虛膈熱而咳逆者

橘皮

人參

甘草

右咬咀每服四錢水一盞竹茹一小塊生姜五片棗一枚煎

右㕮咀每服四錢水一盞竹茹一小撮生姜五片煎一椀

七分溫服不拘時

○廣按欬逆之症乃胃火蒸薰津液成痰凝滯於脣膈之間
阻碍氣道所以咳嗽也已上二方治吐利後胃寒胃熱咳嗽
然吐利後胃熱咳嗽者多而胃寒咳嗽者千百中而一二
也

人參白朮湯

人參

黃芩

柴胡

乾姜

梔子仁

甘草

白朮

防風

半夏

炮七次

五味子

右㕮咀每服四錢姜三片煎

桂苓白朮散

宣明方

消痰止咳逆散痞塞開堅結痛悶進飲食

調和臟腑

揀桂

乾生姜

各二錢半

茯苓

去皮

半夏

各一兩

白朮

陳皮

夫白

澤瀉

各半兩

右爲末麩糊丸如小豆生姜湯下一二三十丸日三服病在上
食後病在下食前在中不拘時一方加黃連半兩黃柏二兩
水丸取效愈妙

灸法

見濕熱

大補丸

見補損

翻胃

三十三

丹溪心法

○翻胃大約有四血虛氣虛有熱有痰兼病必用

童便蘿蔔汁竹瀝牛羊乳生姜汁氣虛入四君子湯右手脉無力血虛入四物湯加童便左手脉無力切不可用香燥之藥若服之必死宜薄滋味治反胃用黃連三錢生姜汁浸炒山楂肉二錢保和丸二錢同為末糊丸如麻子大胭脂為衣用入參湯入竹瀝丹煎一沸下六十九有殃二陳湯為主寸開脉沉或伏而大有氣結宜開滯導氣之藥寸關脉沉而濡有內虛陰火上炎而反胃者作陰火治之年少者四物湯清胃脘血燥不潤便故瀦格致餘論甚詳年老雖不治亦用參木閔防氣虛胃虛氣虛者四君子湯加蘆根童便或參苓白朮散或薤汁牛羊乳或入駭駘屎又有積血停於內而致當消息逐之大便澁者難治常令食兔肉則便利翻胃即膈噎膈

噎乃翻胃之漸 發揮備言 年高者不治 飢如羊屎者斷不可治大腸無血故也

戴云翻胃血虛者脉必數而無力氣虛者脉必緩而無力氣血俱虛者則口中多出沫但見沫大出者必死有熱者脉數而有力有痰者脉滑數二者可治血虛者四物為主氣虛者四君子為主熱以鮮姜母為主痰以二陳為主

入方

用馬刺兒燒灰存性一錢好棗肉平胃散二錢
右和勻溫酒調服食即可下然後隨病源調理

又方

茱萸

黃連

貝母

瓜蒌

牛轉草

治翻胃

薤菜汁二兩牛乳一盞

右用生姜汁半兩和勺溫服效

治翻胃積飲通用

益元散生姜自然汁澄白脚丸小丸子時時服

溫清丸 治翻胃伐肝丸

乾姜一兩 滑石

甘草各二兩

右為末丸服

附諸方

撞氣阿魏丸和剤方治五種噎疾九般心痛痃癖氣塊腹痛腸

鳴嘔吐酸水丈夫一、腸氣婦人血氣並治之

見諸氣

木香通氣飲子

御藥

加九方

治一切氣噎塞痰飲不下

青皮去穰

木香口

蓬莪木

枳榔

陳皮去白

蘿蔔子炒各五錢

藿香葉一兩

甘草炙

人參去芦

枳殼各五錢
香白芷一錢半

右為末每服五錢水二盞煎八分溫服

瓜萎實丸

濟生方治胸膈痛徹背脇喘急妨悶膈噎翻胃

方見痞類

人參利肺丸

接粹方

治胸中不利痰咳喘滿和脾胃壅滯推陳

致新治膈氣聖藥

木香

枳榔

七錢半人參

當歸

藿薯

甘草

枳實各一兩

黃酒浸

厚朴姜製一兩

右為末滴水為丸梧桐子大每服五十丸溫水送下

桑肉平胃散 開胃進食

厚朴姜製

陳皮去白各三斤二兩

甘草炙

紅棗

生姜各二斤

蒼朮泔浸一宿炒五斤

一方加茯苓人參

右剉拌勻以水浸過面上半寸許者乾焙燥為末每服二錢
鹽湯空心點服

保和丸消食開胃

見積聚

寬中進食丸

滋形氣喜飲食

田家心法附錄 卷之三 目錄
道益純陽丹 治寒涎聚於中脘不能傳導

並見調補脾胃

○已上數方消導之劑

白术和胃丸 治脾胃虛弱不能運化

和中散 同前

八珍湯 同前

參苓白术散 同前 俱見調補脾胃

○已上數方補虛之劑

燒針丸 此藥清鎮專主吐逆

黃丹 不以火多

右研細用去皮小棗肉丸如鷄頭子大每用一丸針簽松燈

止燒灰為末乳汁下

利奪命丹

專治噎食

烏梅

十三箇水浸去核

硇砂二錢

雄黃二錢

乳香一錢

百草霜五錢

荳豆

各四十九粒

黑豆各四十九粒

右將烏梅杵爛煎藥并豆為末入梅再搗和勻丸如彈子大
以乳香少加味硃砂為衣陰乾每服一丸空心噙化待藥盡
烙熟餅一箇擘碎入熱茶泡食之無碍為驗過三五日依法
再服一丸即愈極有神效

治膈氣經驗方

用大鯽魚自死者活者不效剖去腸留鱗用大蒜去皮薄切
片填之魚腹內仍合魚用濕紙包定吹用麻縛之又用熟黃
泥厚塗固日微乾炭火慢慢煨熟取出去鱗刺骨用平胃散

杵丸如梧桐子大日晒乾瓶收勿令泄氣每服空心米飲下

三十九

槿花散 治翻胃

以千葉白槿花陰乾為末陳米湯調下一二五口不轉再服

一方 治轉食

用翻翅鷄一隻煮熟去骨入人參當歸各五錢為細末再
煮取與食之勿令人共食

一方 治翻胃不問新久冷熱二症

用虎脂半斤切如豆大用清油一斤瓦瓶浸虎脂一月厚綿
紙封口勿令氣泄每用清油一兩入無灰好酒一大鍾調勻
不拘時溫服服盡病減其虎脂再添油再浸再可活二人若

時無虎脂只用珠子研黃細研半兩水銀二錢半入硫黃
末研至無水銀星再研如墨煤色每服三丸生姜四兩取自
然汁入好濃酒一鍾盪熱調空心服厚衾蓋覆當自足趾間
汗出遍身皆汗透止當立止不止再服此藥輕浮難調須先
滴酒少許以指緩緩研之旋添酒調

一方 治噎食

用碓嘴上細糠蜜丸如豌子大每服一丸噙化津液燕下

一方

用白麵二斤半蒸作大饅頭一箇項上開口取空將皂礬裝
滿用新瓦四圍避護饅頭塗泥封固却窯土窯安放以文武
火燒一晝夜候紅色取出研為細末東肉丸如梧桐子大每

卷之三

服二十九空心酒湯任下忌酒色

○已上數方專治之劑

四君子湯

四物湯
俱見補損

二陳湯
見痰類

○廣按膈噎翻胃之証因火而成其來有漸病源不一有因思慮过度而動脾火者有因忿怒过度而動肝火者有因久食煎炒而生胃火者有因淫慾忘反而起腎火者蓋火氣炎上薰蒸津液成痰初則痰火未結咽膈乾燥飲食不得流利為膈為噎久則痰火已結胃之上脘不開飲食雖進停滯膈間須臾便出謂之嘔吐至於胃之下脘不開飲

食雖進而在滯胃中良久方出謂之翻胃丹溪云年高者不治
蓋少年血氣未虛用藥劫去痰火病不復生老年氣血已虛
用藥劫去痰火雖得暫愈其病復作所以然者氣虛則不能
運化而生痰血虛則不能滋潤而生火故也丹溪又云此証
切切不可用香燥之藥若服之必死宜薄滋味其局方尤用
香燥之藥豈合宜乎夫証屬熱燥固不宜用香燥之藥又香
散氣燥耗血而滋味助火而生痰也予嘗用霞天膏加於補
虛藥中以治此証者一人則吐瀉以去積血一人則吐瀉以
去積痰俱獲病安思食而彼二人俱不能節戒隨啖肥甘終
不能免殊不知此証挾虛雖云病去而脾胃尚弱肥甘難化
故病復也噫嘻得此証者不可知所謹哉知所懼哉若用霞

天膏吐瀉後宜用人參煉膏補之

霞天膏

見倒倉法

人參膏

見駁顏

丹溪心法

嘈雜

三十四

○曹雜是痰因火動治痰為先姜炒黃連入藥用炒山梔子
黃芩為君南星半夏陳皮為佐熱多加青黛 嘴雜此乃食鬱
有熱炒梔子姜炒黃連不可無 肥人嘈雜二陳湯少加撫芎
蒼朮白朮炒山梔子 嘴雜若濕痰氣鬱不喜食三補丸加蒼
朮倍香附子 醫按將氏子條云心嘈索食白朮黃連陳皮作
丸白湯下七八十九數服而止 又云眩暈嘈雜是火動其痰
二陳湯加梔子芩連之類

二陳湯加施子苓連之類

戴云此句俗謂之心嘈也

二補丸

見補損

二陳湯

見痰類

關格

三十五

丁集

丹溪心法

○關格必用吐提其氣之橫格不必在出痰也 有痰宜吐者
二陳湯吐之吐中便有降 有中氣虛不運者補氣藥中升降
寒在上熱在下脉两手寸俱盛四陪以上

○戴云關格者謂膈中覺有所得欲升不升欲降不降欲食不
食此為氣之橫格也

癰氣

三十六

丹溪心法

○癰氣先湏斷厚味

入方

海藻一兩

黃連二兩

一云黃柏又云黃蘖

右為末以少許置掌中時時舐之津嚥下如消三分之二止

後服

附諸方

海帶丸 治癰氣久不消者

海帶

目母

青皮

陳皮

右各等分為末煉蜜丸如彈子大每服一丸食後噙化

一方

海藻

青鹽各半兩

海帶

昆布各一兩

廣茂

右為末煉蜜丸如彈子大每服一丸食後噙化

破結散

濟生方

治石癰氣燄筋癰血癰肉癰等証

海藻

洗

龍貼草

海蛤

通草

昆布

洗

礬石

松蘿

各七錢

麥麯

一兩

半夏

湯洗七吹

貝母

去心各三錢

舟溪心法

右為末每服二錢酒服忌甘草鯽魚鷄肉五辛生菓等物

○結核或在項在脰在臂在身如腫毒者多是濕痰流注作核
不散

入方 治耳後項各一塊

姜蚕

炒

酒大黃

青黛

牛膽南星

右為末蜜丸噙化

又方 治項頸下生痰核

二陳湯 大黃

連翹

桔梗

柴胡

右以水煎食後服

又方 治臂核作痛

二陳湯加連翹

防風

川芎

皂角刺

蒼朮

酒黃芩

右以水煎服

升溪心法九卷終

丹溪心法附餘十卷

戊集

瘧熱門

三十七

丹溪心法

○瘧切不可作風治。兼用風藥。大率與癆病相似。比癆為甚。為虛宜帶補。多是氣虛有火。兼痰。宜用人參竹瀝之類。

附論

○廣按瘧症發作則通身而戰。掉皆因氣虛挾痰火所致。正猶火炎而旋轉也。火能燥物而使氣液之不足。世人不諳誤認為風。而用風藥。風能勝溫。是不足之中而又見損也。王匱金鑰曰：休治風。休治燥。治子火時。風燥了未火為風。

燥之本能治其火則是驚而潤燥何風燥之有哉此症所以宜補氣液而兼散痰火也

癇

丹溪心法

○驚與痰宜吐 大率行痰為主用黃連南星瓜萎半夏尋
尋痰分多分少治之無不愈者 分痰與熱 有熱者以涼藥
清其心 有痰者必用吐藥吐後用東垣安神丸 大法宜吐
吐後用平肝之劑青黛柴胡川芎之類龍虎丸正宜服之 且
如癇因驚而得驚則神不守舍空而痰聚也

戴云癇者俗曰猪癲風者是也

附脉理

戴云癇者俗曰猪癲風者是也

麻訣要曰顛癇之脉浮洪大長滑大堅疾癰蓄心狂附諸方

通泄散 治風涎暴作氣塞倒仆

苦丁香為末三錢

右加輕粉一字水半合調勻灌之良久涎自出如未出令砂糖一塊下咽涎出

降痰丸 治風癇

天南星九蒸九晒

右為末姜汁糊為丸如梧桐子大每服二十丸人參湯葛蒲麥門冬湯任下

一方 治遠年近日風癇心恚風狂中風涎潮牙閔不開破傷

風搐者角不動者一斤去皮弦切碎以酸漿水一碗
浸春秋三四日夏二日冬七日擗去滓將汁入銀器或砂
鍋慢火熬以槐柳枝搥成膏取出攤厚紙上陰乾收頓用時
取手掌大一片以溫藥水化在盞內用竹筒灌入病人鼻孔
內良久涎出為驗欲涎止服溫鹽湯一二口便止忌雉魚生
硬溫麵等物

五癩外楊氏方治癩癩發作不間新久並宜服之

全蝎去毒炒二錢

皂角四邊搗碎水半升將汁與

白礬同熬乾半夏湯泡七次二兩

南星炮一兩

烏蛇一兩酒浸一夕去骨焙乾

白附子炮半兩

桂黃一錢半另研

白礬一兩

朱砂二錢半另研

蜈蚣半條去頭足用

麝香三錢另研

白姜蚕一兩半炒去糸

右為末姜汁煮麵糊丸如梧子大每三十丸姜湯下

控涎丹

治生方治諸癰久不愈者頑涎結聚變生諸症並宜之

全蝎

二錢去毒鐵粉二錢

甘遂二錢半

半夏

姜蚕

三味不妙剗碎生姜汁浸一夕各半兩

生川烏

去皮

右為末姜汁打糊丸如豆大硃砂為衣每服十五丸食後

姜湯下忌甘草

逐心丹 治風疾癲癇婦人心風血和

甘遂

一錢堅實不蛀者

右為末用猪心取管而三條和甘遂末將心批作兩邊甘遂
末入在內令線縛定外用皮紙裹慢火煨熟不可焦取末細
研入辰砂末一錢和勻分作四丸每服一丸將煨猪心煎湯
化下大便下惡物為效

欝金丹 治癥疾

川芎二兩

防風

欝金

猪牙皂角

明礬各一兩
蜈蚣黃脚赤脚各一條

右為細末蒸餅丸如梧桐子大空心茶清下十五丸

追風丹 治風癇及破傷風暗風

川芎二兩

細辛六錢

半夏

湯炮七次桔梗

附子炮去皮脐薄荷葉

川烏

白附子各二兩

魚鱠

人參去芦

硃砂另研各六錢

白花蛇

酒浸去皮骨取淨肉焙乾

射香爭四錢另研

南星三錢

蜈蚣四條金頭赤足酒炙黃色

大蝎尾去鈎二錢生用

右為末生姜汁和劑為錠每服一錠溫酒化下以汗出為度

引神歸舍丹百一

每方治心氣不足并治心風

附子一箇重七錢以上者炮去皮臍

朱砂一兩水刑

大天南星厚去皮取二兩生用

右為末用猪心血并麪糊為丸如梧桐子大煎菖草根湯下
子午之交各一服止五十丸

驚氣丸

和剝方治心受風邪

涎潮昏塞牙關緊閉醒則精神若

瘡及驚憂積氣並皆治之

紫蘇子

二兩附子去皮研半兩

天麻

去苗半兩

橘紅

二兩

白姜茶

炮半兩

麻黃

去根節半兩

南不香

一兩宋砂研

一千半為末

白花蛇

酒浸炙熟去皮骨半兩

乾蝎去足尾毒微炒

一升

右為末入腦射少許同研極勻煉蜜杵丸如龍眼大每服一丸用金錢薄荷湯化下或溫酒化下亦可

○廣接瘡症病本痰熱宜用辛寒之劑治之已上三方皆用附子何也蓋瘡瘍在心腎之間每遇火動則發非附子

熱性走而不守而能流通結滯開散頑痰可乎此從治之
法乃劫劑也不得已而用之亦猶中風之証本風火陽邪
而用烏附類也冊注前條云癇症尋火尋痰分多分少則
此三方只宜施之於肥白多痰之人用諸藥而不効者若
夫黑瘦多火之人不宜用也

追風祛瘀丸 治諸風癇暗風

防風

天麻

僵蚕去系嘴白附子煨各一兩

全蝎去毒炒

朱脊各半兩

硃砂另為衣七錢半

猪牙皂角

一兩

白礬研半兩

半夏湯泡七次研為末秤六兩分作二分一分用生姜汁

作麵一分用皂角洗漿作麵

南星三兩剉一半化白礬水浸一半皂角漿浸各宿

右為細末姜糊為丸如梧桐子大每服七八十九食遠臨卧用淡姜湯或薄荷湯下

○廣按此方用藥之當製藥之精無過不及用之豈有不効者

○已上數方溫脾化痰之劑

鎮心丹 治諸癇

好辰砂不拘多少

右為細末猪心血和勻以蒸餅裹剉蒸熟取出丸如梧桐子大每服一丸食後臨卧人參湯下

參砂丸 治風癇

人參

蛤粉

硃砂各等分

右三味為細末猪心血為丸如梧子大每服三十九食遠金
錢蓮荷湯下

歸神丹 治顛癇諸疾驚悸神不守舍

顆塊硃砂二兩豬心內酒蒸

金箔二十片

白茯苓 酸棗仁

羅參

當歸各二兩

銀箔

二十片
琥珀

遠志姜製

龍齒各一兩

右為細末酒煮糊為丸如梧桐子大每服二三十九麥門冬
湯下炒酸棗仁湯亦可

寧神丹 清熱養氣血不時潮作者可服

天麻

人參

陳皮

白朮

歸身

茯神

荆芥

殼蚕炒

獨活

遠志去心
犀角

麥門冬去心

酸棗仁炒

辰砂各五錢另研

半夏

南星

石膏各一兩甘草炙

白附子

川芎

麝金

牛黃各三錢珍珠三錢

生半

黃連各五錢金箔三十片

右為末酒糊丸每服五十丸白湯下

牛黃清心丸和劑方治心氣不足神志不定驚恐悸怖虛煩少

睡常發狂癲言語錯亂

見中同

六珍丹三因方治風癇卒然暈倒或作牛吼馬嘶雞鳴羊呌猪

呼大吠腑臟相引氣爭掣継吐沫涎涎久而方醒

通明雄黃

華子雄黃

未錯真珠各一兩

通明惟黃

無子惟黃

未錄其珠

丹砂半兩

水銀一兩半錢

燒成膏

右為末研令極細蜜和杵二三萬如梧桐子大每服五丸

姜棗湯下

龍腦安神丸按粹方治男子婦人五種癲癇無間遠年近日發作無時

茯苓三兩

人參

地骨皮

甘草各四兩

麥門冬去心二兩

龍腦

另研

射香各五錢

牛黃五錢

硃砂

牙硝

另研

桑白皮

明犀末一兩

金箔十五片

右十三味為末煉蜜為丸如彈子大小夏月涼水又治虛勞發熱咳嗽無涎舌強日進三服

戊集

頭狂

三十九

丹溪心決

○癲屬陰狂屬陽癲多喜而狂多怒昧。虛者可治實則死大率多因痰結於心腎間治當鎮心神開寐結亦有中邪而成此疾者則以治邪法治之原病尤所論尤精。蓋為世所謂重陰者癲重陽者狂是也大槩是熱癲者神不守舍狂言如有所見經年不愈心經有損是為真病如心經重當清心除熱如痰迷心竅當下痰志若癲哭呻吟為邪所狂非狂也燒桑紙酒水下方寸匕卒狂言鬼語針大拇指申下即止風癲引臍痛發則耳鳴用天門冬去心日乾作末酒服五七癲疾春治之。

夏自安宜助心氣之藥一陽虛陰實則癲陰虛陽實則狂病
宜大吐下則除之

入方 治癲風

麻仁四升

右以水六升猛火煮人牙生去滓煎取七合日空心服或然
或不發或多言語勿恆之但人摩手足湏定凡進三劑愈
又方 治狂邪發無時披頭大叫欲殺人不避水火

苦參不以多少

右為末蜜丸如梧桐子大每服十五丸煎薄荷湯下

附脉理

脉訣舉要曰癲癇之脉浮洪大長滑大堅疾瘡畜心狂又曰乍

朱砂安神丸 按粹方治心煩懊惱心

怔忡胸中氣亂心下痞

悶食入反吐出

朱砂四錢研黃連五錢

生甘草十二錢半

右為末蒸餅丸如黃米大每服十丸噙津送下

虎精丸 楊氏藏方 治癇疾發作涎沫

擗精神恍惚時作譫語

犀角屑一兩虎睛對微城大黃

一兩 桔子仁半兩

遠志去心一兩

右為末煉蜜丸如黍豆大每服二丸酒溫食後送下

滾痰丸 治膈熱太甚作痛

見痰火

龍虎丸 治肝火太甚作痛

見熱火

已上數方清心降火之

附

古方三癇丸 治人少日二十種癇癪

荆芥穗三兩 白礬一兩半 生半

右為末麵糊為丸黍米大硃砂為衣姜湯下二十丸如慢驚
用蜜復丹急驚三癇丸食癇醒脾丸可也

本事人參散 治人兒慢脾風神昏於盛

人參半兩 貝白大南星一兩

勿片以生姜汁并漿水各

半陰蒲黃帶性肺

右為末每服一錢水一盞姜三片令瓜仁搗細少許同煎取
半盞作两三次灌下

來復丹 見中暑

醒脾丸 見

大乍小乍長乍短此皆邪脉神志昏亂

附諸方

控涎丹 治痰迷心竅時作顛狂狂言如有所見

甘遂去心 紫大戟去皮白芥子真者各等分

右為末煮麵糊丸如梧桐子大晒乾臨卧淡姜湯或熟水下三十丸以下利去痰飲為愈

追風祛瘀丸 治痰迷心竅頭痛妄語 見癆類

葉氏清心丸簡易方治心受邪熱並精神恍惚往言呼呼睡卧不寧

人參 鍼梢 酒金 生地黃

天麻

天南星為末入黃牛胆內令止酒掛當風處吹乾曬月造要

用旋取各等分

右為末湯浸蒸餅為丸如梧桐子大每服二十九人參湯下

龍星丹

治腎膈停痰蓄熱顛狂嘯叫

方見痰類

滾痰丸

治痰熱攻竅狂嘯

方見痰類

已上數子痰寧志之劑

牛黃清心丸

治心氣不足神志不定驚恐慄怖虛煩少睡常

發狂癲言語錯亂

見中風

牛黃瀉心湯

治心經邪熱狂語精神不爽

腦子研

牛黃研

硃砂

研各一錢

大黃生一兩

右研為末每服三錢涼生姜蜜水調下

葉氏雄朱丸

簡易方治丈夫婦人因驚憂失心或思慮過多氣

結不散積成痰涎留在心包穰塞心竅狂言妄語叫呼奔走

顆塊硃砂

一錢半

白附子一錢

雄黃明淨者一錢半

右為細末和匀以猪心血和丸如梧桐子大別用硃砂為衣
每服三粒用人參菖蒲煎湯下常服一粒能安寢定魄補心
益氣

硃砂安神丸 治症同前

龍腦安神丸

治症同前

並見癇類

牛黃膏聖惠方治婦人熟入血室發狂不認人者

牛黃二錢半硃砂

麝金各三錢腦子

甘草各一錢半丹皮三錢

右為細末煉蜜為丸如皇子大每服一丸新水化下

寧志膏大金良方治婦人因去血過多心神不安言語不常不得睡時

辰砂研

酸棗仁炒

人參

白茯苓去木

琥珀各七錢半

滴乳香一錢研

右為末和勻每服一錢濃煎灯心棗子湯空心調下

一方無茯神琥珀蜜丸如彈子太薄荷湯化下一丸

茯神散大全良方治婦人心虛與鬼交通妄有所見聞言語雜亂

茯神一兩半

茯苓

人參

石菖蒲各二兩

赤小豆半兩

右㕮咀每服八錢水一盞半煎至分通口食前服

○已上數方清心除熱之劑

驚悸怔忡

四十

戊集

丹溪心法

○驚悸者血虛驚悸

時以硃砂安神丸

痰迷心膈者礞石

皆可定志丸加琥珀鬱金

怔忡者血虛怔忡無時血少者多

有思慮便動屬虛

時作時止者痰因火動

瘦人多是血少

肥人屬痰尋常者多是痰

真覓心跳者是血少四物朱

砂安神之類

假如病因驚而得驚則神出舍舍空則痰生也

戴云怔忡者心中不安惕惕然如人將捕者是也

附諸賢論

心法附錄曰人之所主者心心之所養者心血一虛神氣不
守此驚悸怔忡之所肇端也曰驚悸曰怔忡豈可無辨乎心
虛而鬱痰則耳聞大聲目擊異物過險臨危觸事喪志心為
之忤使人有惕惕之狀是則為驚悸心虛而停水則胷中滲

灑，聚氣流動水既上乘心火惡之，心不自安使人有快快之
狀是則為怔忡治之之法驚悸者與之豁痰定驚之劑怔忡
者與之逐水消飲之劑所謂扶正不過調養心血和平心氣
而已

附脉理

脉訣舉要曰心中驚悸脉必代結飲食之悸沉伏動滑

附諸方

茯苓飲子濟生方治痰飲蓄于心胷怔忡不已

赤茯苓去皮半夏湯洗七安茯神去木

麥門冬去心

橘皮去白各一兩

沉香不見火

甘草

枳榔各五錢

右咬咀每服八錢生姜五片煎至八分食後溫服

加味四七湯 治心氣鬱滯痰散驚

半夏

三兩半

白茯苓

厚朴

各一兩半

茯神

紫蘇

各一兩

遠志

甘草

炙半兩

右每服四錢生姜五片石菖蒲一寸枣一箇水煎服

葉氏育神散簡易方理心氣不寧怔忡健忘夜夢驚懼小便自濁

赤石脂別研細臨時入

白茯苓

甘草

遠志去心

乾姜

炮

當歸

酒洗

龍骨

另研如粉臨時入

紫苑

桂心

去皮

白茯神去木

防風

人參去芦

赤芍藥

白术

各一兩

石為木每服二錢水一盞姜三片東一枚煎七分食後溫服
湯闇易方理心下怔忡常懷憂慮神思多驚如墮險地小便或赤或濁

官桂

一兩半

半夏

三兩湯泡入參去芦

白茯苓去皮

枳殼

去穰麩炒

甘草炙

當歸

龍齒

研

桔梗

遠志

去心各一兩半

茯神去水

黃芪

蜜炙各一兩

右為末每服二錢水一鍾姜三片東一枚梗米百粒煎六分溫服

養心湯

治憂愁思慮傷心驚悸不寧

黃芪

蜜炙

白茯苓

茯神

半夏

炮炙

當歸

川芎各半兩

甘草炙四錢遠志去心姜汁炒

辣桂

柏子仁

五味子

酸棗仁

人參各二錢半

右每服三錢水煎姜三片束一箇食前服治停水怔忡加換
榔赤茯苓

加味定志丸 治痰迷心膈散憊怔忡

遠志

二兩

人參一兩

菖蒲二兩

白茯苓三兩

琥珀

麝金

右為末煉蜜為丸如梧子大朱砂為衣每服三十九米湯下

○已上諸方消痰利氣之劑

四物湯

見補損

朱砂安神丸 治血虛心煩懊惱驚悸怔忡胸中氣亂

朱砂五錢水飛過另研

黃連酒洗六錢

甘草炙二錢半

生地黃一錢半當歸二錢半

右四味為細末蒸餅丸如黍米大朱砂為衣服三五十丸津下牛黃清心丸 治心氣不足神志不定驚恐悸怖靈煩少睡夢寐紛紜

歸神丹 治驚悸怔忡神不守舍 並見癲類

真珠丹 治肝經因虛內發翳障則魂散不守時或驚悸怔忡

柏子仁 入參

酸棗仁略一熟地黃

當歸身一兩犀角

茯神

沉香

龍齒各半兩真珠母三錢研

右為末煉蜜丸如梧子大辰砂為衣每服四五十丸金錢薄
荷湯下

益榮湯 齊生方治思慮過度耗傷心血天君不寧怔忡恍惚夜
多夢寐小便赤白濁

當歸 去芦酒浸 黃連 去芦 小草

酸棗仁 去殼炒

柏子仁 炒 麥門冬 去心 桂枝 去木

白芍藥

紫石英各一兩研

木香不見火人參

甘草炙各半兩

右㕮咀每服四錢水一鍾姜五斤東一枚煎七分服

○已上數方補血安神之劑

丹溪心法

○健忘精神短少者多亦有痰者

戴云健忘者為事有始無終言談不知首尾此以為病之名
非此生成之愚頑不知人事者

附諸方

寧志膏和劑方治神恍惚一時健忘 見補損

定志丸 治心氣不定恍惚多忘

遠志

菖蒲各二兩 人參一兩 白茯苓三兩

右為末煉蜜丸如梧子大朱砂為衣服二十九丸米湯下
壽星丸和剝方治心膽被驚神不守舍或痰迷心竅恍惚健忘
妄言如有所見

天南星

一斤先用炭火三十斤燒地坑通紅去炭以酒五升傾坑內候滲酒盡下南星在坑內以盆覆坑周

回用灰排定勿令走氣次日取出為末

朱砂另研為末

琥珀另研一兩

右用生姜汁麪糊為丸如梧桐子大每服三十丸加至五十丸煎石膏蒲人參湯下

歸脾湯濟生方治思慮過制勞傷心脾健忘怔忡

白术

茯神去木

苗耆去芦

龍眼肉

酸棗仁

去殼

人參各一兩

木香半兩

甘草炙二錢半

右㕮咀每服四錢水一鍾姜五片東一枚煎七分溫服

本雀丸百一選方治心神不定事多健忘

茯神

云皮一

沉香半两

右為細末煉蜜丸如小豆大每服三十九人參湯下食後
二丹丸 治健忘養神定志和血內以安神外華膝理

方見中風

人參遠志丸

聖惠方治氣不足驚悸健忘神思不寧

天門冬

去心

白茯苓

葛蒲各半

七錢

人參

遠志

去心

酸棗仁

黃芪各半

兩

桔梗

丹砂

官桂去皮各二錢半

右為末蜜丸如豆大每服二十丸至三十丸米湯下

繆猴風喉痺

四十二

附咽痛咽瘡

丹溪心法

○喉痺大槩多是痰熱 重者用桐油探吐 一方射干逆流
水吐之 又方李實根皮一片噙口內更用李實根研水敷項
上一週遭用新菜園中者 纏喉風屬痰熱戴云謂其咽喉裏
外皆腫者是也用桐油以鵝翎探吐 又法用燈油脚探吐
又用遠志去心為末水調傅項上一遭立効亦可吐 咽喉生
瘡痛是虛熱血虛多屬虛火游行無制客於咽喉也用人參荆
芥蜜炙黃柏 虛火用人參竹瀝 血虛四物加竹瀝 實熱
者黃連荆芥薄荷硝蜜姜汁調噙化 治喉痛用倒商刺根淨
洗入此少好酒同研滴入喉中痛立止 喉痺風熱痰先以千
緡湯後以四加黃柏知母養陰則火降 又方猪牙皂角為末
和霜梅噙 又方木鱉子用鹽苦水浸久噙一丸 又方茜草

一兩作一服降血中之火

又方硝石半錢枯礬半錢硝砂一

錢為末杜牛膝搗汁調

喉閉或有垂一絲結成小血珠垂在

咽喉中用杜牛膝根即破

鵝掌草直而獨條者搗碎用好米醋些

小和研取汁三五滴入鼻中即破

喉痛必用荆芥陰虛火

炎上必用玄參

又喉痺陳年白梅入蚯蚓令化爲梅於口中

入方

雄黃解毒丸

治猩猴急喉風及鵝腫痛湯藥不下

雄黃二兩

巴豆去油十四個

麝金一錢

右為末醋糊丸如豆大熱茶清下七丸吐出頑涎即甦大
効如口噤以物幹開灌之下咽無有不活者

潤喉散 治氣鬱夜熱咽乾硬塞

桔梗二錢半 粉草一錢 紫河車四錢 香附三錢

百藥煎一錢半

右為末傳口內

又方 喉痛

鵬砂

膽礬

白僵蚕

陳霜梅

右為末和噙

附諸方

奪命散秘方治急喉風

白礬

桔

姜絲直者取斷系

鵬砂

皂角末

右等分為末少許吹入喉中喉出聲

如聖散 三因方治風痰壅盛咽喉腫痛水穀不下牙關緊急不
省人事或時氣經喉風並用

雄黃細研 白礬祐

粹方言生用猪牙皂角去皮炙黃芽分

右為末用一字搐入鼻內吐痰為愈

治咽喉牙關緊閉經驗方

右用巴豆去殼以紙包巴豆肉用竹管壓出巴豆油在紙上
却以此紙作個擦子點燈吹滅以煙薰入鼻中一霎時口鼻
涎流牙關開矣

治走馬咽喉張子和方

右用巴豆去皮以綿子微裹隨左右塞於鼻中立透如左右

懸癰

俱有者用二枚塞左右鼻中

○愚按已上二方皆用巴豆蓋巴豆乃斬閔奪門之將熱則
流通之理雖是以熱攻熱不妨碍也

喉散

治咽喉腫痛急慢喉閉懸癰乳鴉嚙物不下

訶子

一斗醋浸一宿去核晒乾

黃芩酒浸一宿晒乾

膽礬

一錢明礬一錢半牛蒡子

甘草生

薄荷各五錢

一方有百草煎

右為末先用好生姜擦舌上每用藥一錢芦管吹入喉中吐
出涎痰便用熱茶喫下再次第二次便用熱粥三次再吹用
熟茶或熱粥乘熱食之加朴硝末少許如口舌生瘡用藥吹

之口中立去痰涎為妙

奪命丹私方治咽喉一切腫毒木舌變乳鵝喉癰等証

紫荷車

蜜陀僧各半

砂仁

管竹

姜蚕直者

烏魚骨

茯苓各一升

射香少許

右為細末麪糊為丸如彈子大陰乾用一丸無根水浸一時
頰食一丸作二服神効

奪命筋頭散聖惠方治急喉痺咽喉腫痛堵塞氣不得通欲死

之狀

膽礬四錢

草烏四錢

碌礬六錢

雄黃一錢

右為末用一筋頭點上咽喉內急吐涎沫立應次以大黃甘
草等分俱為粗末每當取三錢水一鍾半煎至一鍾去滓化乳

香一粒溫服滌去熱毒恐為再發一方加白礬二錢

治咽喉腫痛秘方

山豆根 射干桔根

右同陰乾為末吹入喉中如神

治喉痺秘方

喉痺為急病

涼更命不通

急研新艾水

入口便和同

臘內無新艾

蛇床瓶內燒

其煙纔入口

此病一時消

一方 治喉痺

青黛五分

猪

皂角去皮破五錢

膽礬熟者一錢半

右為細末醋薄糊

翠丸如櫻桃大每用一片以熟絹裹

以熟絹裹吞之

頭上用好醋潤透
藥點在口內喉嚨上咬着餅甘延第
即解後服防風通血散

七宝散

僵蚕白直者十箇

猪牙皂角一根去皮弦

全蝎十箇頭角全

石去毒研

明礬冬一錢膽礬

雄黃

石為細末每用一字入喉中即愈

碧雪散

治咽喉閉塞

時不能言語痰涎壅盛

燈心灰二錢硼砂一

分

右研為細末用鵝翎管吹入喉中立効

鴻化三黃丸秘方治咽喉痛大効

山豆根

一兩
硼砂

一錢
龍腦

火許
射香少許

右為末用青魚膽為丸如黍豆大每服三五丸噙化津燕下
碧玉丸 御藥院方 治心肺積熱上攻咽喉腫痛水漿不下
或生瘡癩重舌木舌並宜服之

青黛

益硝

瀉黃

甘草末各一兩

右同研勻用沙糖為丸每兩作五十九每服一丸噙化或用
乾薑末糁咽喉內亦好

龍腦散御藥院方治咽喉腫痛者因風熱在於脾肺利毒蘊滯
胸膈不利故發疼痛急喉痺閉塞腫痛粥飲難嚥

鵬砂

腦子

朱砂各一分滑石細末三錢

石膏水飛二兩

每服五錢取末炒小半錢重一字

右為細末每服半錢用新汲水調服或乾參嚥津亦得

龍腦破毒散

御藥院方治不測急慢喉痺咽喉腫塞不通

益硝

研細四錢

白礬

蒸微炒去嘴為末八錢

甘草生末八錢

青黛八錢

馬勃末三錢

蒲黃半兩

腦子一錢

射香一錢

右同研令勻細用薑荳子收如有病証每服用藥一錢用新汲水小半鍾調勻細細呷嚥如是喉痺即破血便愈如不是喉痺自然消散也若是諸般舌脹用藥半錢以指蘸藥擦在舌上下嚥津如是小兒一錢作四五服亦如前法用並不計時候

甘桔湯活人方治少陰咽喉痛

桔梗

甘草各等分

右㕮咀每服五錢水一盞半煎至八分通口服

桔梗湯御藥院方治咽喉疼痛如有物妨悶

桔梗炒五錢半夏湯浸七遍切焙乾二錢半

人參去芦頭甘草炙各一錢半

右㕮咀每服一兩水一鍾煎七分去滓溫服食後

利膈湯本事方治脾肺有熱虛煩上壅咽喉生瘡

鷄蘇葉 荆芥穗 防風 桔梗

人參 牛蒡子紙甘草各一兩

右為末每服一錢水湯點服如咽喉口瘡甚者加姜茶一兩

通氣湯應驗方治喉嚨疼痛閉塞不通氣水漿不下痰涎壅盛

牽牛

頭末一
兩半生半熟

米泔水二錢

防風一錢

九分半

枳殼一錢二分半炒

甘草一錢

二分半生用

右為細末每服三錢

沸湯點服

甘露內消丸應驗方治咽喉腫痛不利咽乾痛上焦壅滯口舌

生瘡

薄荷葉一兩

川芎二錢桔梗去芦頭三錢

甘草一錢

人參

柯子各半錢

右為細末煉蜜為丸如皂角子大朱砂為衣每服一丸噙化
下無時

上清連翹散精義治諸瘡腫毒咽喉疼痛煩渴大便自利虛熱
不寐

連喬

山梔子

甘草

防風各一錢

右用水二錢煎至八分去滓溫服食後

玉鑰匙

大成治風熱喉閉及繩喉風

煙硝一錢半

鵬砂半錢

腦子少許

白礪石一厘半

右研勻以竹管吹半錢許入喉中立愈

鵬砂散

端効方治咽喉瘡腫閉塞不通

鵬砂

白礪石

白礪石

山豆根

盆硝

薄荷

白礪石

各半兩

青黛

鐵川苦三錢

右為細末大人寧嗽

一錢小兒一字次摻咽中或水調服

黃丸

大成治喉瘡人三焦積熱咽喉腫悶心膈燥煩小便

赤瀝大便秘結並宜服之

見火類

加味三黃丸

松方

大黃

黃芩

黃連

各二兩
砂二兩半

黃藥子

白藥子

各一兩半

山豆根

黃硝

苦參

各一兩
京墨三錢

射香少許

片腦

一錢半

冬加知母

右為末猪膽調搘瓶內蒸二次後入片射硝為丸豆大噙化

荆黃湯

大成治

臟腑實熱咽喉腫痛大便祕結咽喉之證多是

風熱上壅然後成之非實熱不可服

見風熱

佛手散

應驗治喉咽腫痛生瘡風熱喉痺腫塞

薄荷

二錢

益硝

一分

甘草

七分

桔梗

五分

蒲黃五錢 青黛三錢

右為細末每用少許乾掺又用竹管吹因喉內噙化下時時用之

錚雪散大成治咽喉腫痛噙物悶及口舌生瘡

龍腦

半錢

鵬砂

一錢

朱砂

三錢

馬牙硝半錢

寒水石

煅熟二錢

右研勻每用一字捲於舌上津噙之

人參清肺散衙院方治肺脾不利風熱攻衝咽喉腫痛噙物

妨悶宜服此藥

連翹

三錢

黃芩

川大黃

薄荷各一錢半

入參

甘草

槐子

益硝各一錢

白附子

七分半錢

黃連半錢

右用水一鍾半煎至一鍾去滓溫服食後

牛蒡子湯大成治風熱上壅咽喉腫痛或生癰瘡有如肉腐

牛蒡子二錢玄參

升麻

桔梗夫苦

犀角

黃芩

木通去皮

甘草各一錢

右用水二鍾生姜三片煎至一鍾去滓溫服食後

涼膈散大成

治大人小兒臟腑積熱口舌生瘡痰實不利咽喉

一煩燥多渴腸胃秘滯小便不利一切風熱並皆治之方見溫熱

大青湯端效治咽喉腫口舌糜爛疳瘻口瘡

大青葉

升麻

大黃各二錢

生地黃切焙三錢

右用水二鍾煎至一鍒去滓溫服食後微利止

救口地黃散銅葉治脾肺風熱上攻咽喉腫痛生瘡閉塞不通或生舌脹

黃芩

四錢

甘草

二分半

荆芥穗

一錢

薄荷葉

半錢

右㕮咀用水一鍾半煎至一鍾去滓熱嗽冷吐不拘時

一方 治喉痺

用射干即扁竹根也旋取新者不拘多少搗爛取汁吞下或動火膳解或用醋同研取汁噙引出涎更妙又名野萱花

灸累年喉痺舉發

秘方

男左女右以手大指甲第一節灸二三小壯

針喉閉

針少商出血立愈其穴在兩手大指內側去爪甲角蓮葉

三棱針針之 鈎合谷二穴在虎口針五分

針尺澤二穴在臂中橫紋出血妙

四物湯

見補損

十繙湯

見痰類

○廣按繩喉風喉痺之証其人素有疾延或因飲酒過度或因忿怒失常或因房室不節而發作也何則飲酒過度是胃火動也忿怒失常是肝火動也房室不節是腎火動也火動痰上而為喉熱燔灼壅塞於咽喉之間所以內外腫痛而水漿不入也其症可謂危且急矣治療之法急則治標緩則治本治標用丸散以止咳散熱治本用湯藥

以降火補虛已上方剗其於治標已詳悉矣其於治本尤
缺畧也諸方出証但云治風熱而未云治痰熱但云治脾
肺火而未云降肝腎火予雖不敏贅以管見如挾痰加以
氏萎半夏或千繙湯之類如挾肝火加以柴胡黃連或小
柴胡湯左金丸之類如挾腎火加以生地黃柏或四物
湯加知母黃柏之類未知賢哲以為何如又常論之胃肝
腎三經之火各有所因而生富貴之家醇酒厚味多生胃
火婦人陰憂不發多生肝火男子房勞致虛多生腎火人
之五臟六腑皆有火不如此三經之火常變見而為病之
多也