

v. 35 - v. 36

刊
4

增廣本草綱目

本草綱目木部目錄第三十五卷

木之二

喬木類五十二種

櫟木

本經
即黃葉

檼桓拾遺

小櫟

唐本

黃櫞

嘉祐

厚朴

本經浮胡
爛羅勒附

杜仲

本經

椿櫟

唐本

漆

本經

梓

本經

楸拾遺

桐

本經

梧桐

綱目

孽桐

拾遺
郢桐附

海桐

開寶
雞桐附

棟

本經

槐

本經

檀拾遺

莢

唐本

秦皮

本經

合歡

本經

阜莢

本經
鬼阜莢附

肥阜莢

綱目
革莢

婆羅得

開寶

欒華

本經

舞食子

唐本
即沒食子

訶黎勒

唐本

無患子

開寶

樛

別錄

柳

本經

檉柳

開寶

水楊

唐本

白楊

唐本

扶移

拾遺

松楊

拾遺

榆

本經

榔榆

拾遺

蕪荑

本經

蘇方木

唐本

烏木

綱目

樺木

開寶

綴木

拾遺

櫟樹

拾遺

櫻櫛

嘉祐

櫛木

拾遺

柯樹

拾遺

烏柏木

唐本

巴豆

本經

大風子

補遺

海紅豆

海藥

柏學

綱目

豬腰子

綱目

辰辰

綱目

右附方舊一百三十五新三百三十二

本草綱目木部第三十五卷上

木之二

喬木類五十一種

櫟木

本經釋名黃櫟錄根名檀桓時珍曰集木名義未詳本經言櫟木及根不言櫟皮

錄別錄曰櫟木生漢中山谷及永昌景曰今

漫其根於道家入木芝品今人不知取服又有一種小樹狀如石榴其皮黃而苦俗呼為子櫟亦主口瘡

又一種小樹多刺皮亦黃色亦

主口瘡

參曰子櫟亦名山石榴子似女貞皮白不黃亦名小櫟所在有之今云皮黃謬矣

按今俗用子櫟皆多刺小樹名刺櫟非小櫟也

禹錫曰按蜀本圖經云黃櫟樹高數丈葉似吳茱萸亦如紫椿經冬不凋皮外白裏深黃色其根結塊如松下侯令今所在有之出房商

合等州山谷中皮繁厚二三分鮮黃者上二月五月采皮日乾機曰房商者治裏治下用之邵陵者治表治上用之各適其宜蘭頌曰處

處有之以蜀中出修治數曰凡使櫟皮削去粗皮用生蜜水浸半日漉出曬乾用蜜塗文武火炙令蜜盡為度每五兩用蜜三兩元素曰

者肉厚色深為佳修治二制治上焦單制治中焦不制治下焦也時珍曰黃櫟性寒而沈生用則降實火熱用則不傷胃酒制則治上鹽

制則治中

氣味苦寒無毒

元素曰性寒味苦氣味俱厚沈而降陰也又云苦厚微辛陰中之陽入足少陰經為足太陽引經藥好古曰

黃芩梔子入肺黃連入心黃櫟入腎燥溼所歸各從其類也故活人書四味解毒湯乃上下內外通治之藥

○之才曰惡王治五臟腸胃中結熱黃疸腸痔止洩痢女子漏下亦曰陰陽蝕瘍經療鴻氣在皮間肌膚熱亦起曰熱赤痛口瘡久服通

乾漆伏硫黃

王治五臟腸胃中結熱黃疸腸痔止洩痢女子漏下亦曰陰陽蝕瘍經療鴻氣在皮間肌膚熱亦起曰熱赤痛口瘡久服通

神別熱瘡砲起蟲瘡血痢止消渴殺蛀蟲

藏器曰男子陰瘻及傳革瘡治下血如鷄鴨肝片

軟安心得勞治骨蒸洗肝明目多淚口乾心熱

殺疳蟲治死心痛鼻衄腸風下血後急熱腫痛

大瀉膀胱相火補腎水不足堅腎壯骨髓療下焦虛諸痿癱瘓利下竅除熱素瀉伏火救

腎水治衝脈氣逆不渴而小便不通諸瘡痛不可忍

李得知母滋陰降火得蒼朮除溼清熱為治瘻要藥得細辛瀉膀胱火治口舌生瘡

震傷小兒頭瘡

時珍曰黃櫟之用有六瀉膀胱心火一也利小便結二也除下焦溼腫三也痢疾先見血四也臍中痛五也補腎

亨傳小兒頭瘡

不足壯骨體六也凡腎水膀胱不足諸痿厥腰無力於黃芩湯中加用使兩足膝中氣力涌出痿軟即便去也乃

癰瘍必用之藥蜜炒研末治口瘡如神故雷公炮炙論云口瘡舌折立愈黃藥謂以酥炙根黃含之也東垣曰黃藥倉水乃治瘻要藥凡去下焦溼熱作腫及痛并膀胱有火邪并小便不利及黃澀者並用酒洗黃藥知母為君茯苓澤瀉為佐凡小便不通而口渴者朴熱在氣分肺中伏熱不能生水是絕小便之源也法當用氣味俱薄淡之藥諸苓澤瀉之類瀉肺火而清肺金滋水之化源若邪熱在下焦血分不渴而小便不通者乃素問所謂無陰則陽無以生無陽則陰無以化膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣法當用氣味俱厚陰中之陰藥治之黃藥知母是也長安王善夫病小便不通漸成中滿腹堅如石脚脛裂破出水雙睛凸出飲食不下痛苦不可名狀治滿利小便瀉火之藥服遍矣予診之曰此乃奉養太過膏粱積熱損傷腎水致膀胱久而乾涸小便不化火又逆上而為嘔噦難經所謂闢則不得小便格則吐逆者潔古老人言熱在下焦但治下焦其病必愈遂處以北方寒水所化大苦寒之藥黃藥知母各一兩酒洗焙碾入桂一錢為引熟丸九如芡子大每服二百丸沸湯下少時如刀刺前陰火燒之狀溺如瀑布出林下成流顧盼之間腫脹消散內經云熱者寒之醫惡燥急食辛以潤之以黃藥之苦寒瀉熱補水潤燥為君知母之苦寒瀉腎火為佐肉桂辛熱為使寒因熱引也震亨曰黃藥走至陰有瀉火補陰之功非陰中之火不可用也火有二君火者人火也心火也可以溼伏可以水滅可以直折黃連之屬可以制之相火者天火也龍雷之火也陰火也不可以水溼折之當從其性而伏之惟黃藥可以降之時珍曰古書言知母佐黃藥滋陰降火有金水相生之義黃藥無知母猶水母之無蝦也蓋黃藥能制膀胱命門陰中之火知母能清肺金滋腎水之化源故潔古東垣丹溪皆以為滋陰降火要藥上古所未言也蓋氣為陽血為陰邪火煎熬則陰血漸涸故陰虛火動之病須之然必少壯氣盛能食者用之相宜若中氣不足而邪火熾盛者久服則有寒中之變近時虛損及縱欲求嗣之人用補陰藥往往以此二味為君日日服餌降令太過脾胃受傷真陽暗損精氣不暖致生他病蓋不知此物苦寒而滑滲且苦味久服有及舊十二新附方 治陰火大補丸 用黃藥去皮鹽酒炒褐色為末水丸梧子大血虛四物湯從火化之害故葉氏醫學統首有四物加知母黃藥久服傷胃不能生陰之戒

下氣虛四君子男女諸虛孫氏集效方 次離丸治男子婦人諸虛百損小便淋漓遺精白濁等證黃藥去皮切二斤熟糯水火湯下丹溪方 男女諸虛一升童子小便浸之九浸九曬蒸過曬研為末酒煮麪糊丸梧子大每服一百丸溫酒送下 上盛下虛偏盛方百補丸專治諸虛赤白濁用川芎皮刮淨一斤分作四分用醃酒蜜湯鹽水童尿浸洗曬炒為末以水消中等證黃藥一斤分作四分用醃酒蜜湯鹽水童尿各浸二日焙研一分下血數升黃藥一兩去皮雞子白塗末為末水丸綠豆 蒼朮下水火知母一斤去毛切搗鬆膏和九梧子大每服七十九白湯下 活人心統四治次離丸治水火

下氣虛四君子男女諸虛孫氏集效方 次離丸治男子婦人諸虛百損小便淋漓遺精白濁等證黃藥去皮切二斤熟糯水火湯下丹溪方 男女諸虛一升童子小便浸之九浸九曬蒸過曬研為末酒煮麺糊丸梧子大每服一百丸溫酒送下 上盛下虛偏盛方百補丸專治諸虛赤白濁用川芎皮刮淨一斤分作四分用酒蜜人乳糯米泔各浸透炙乾切研庫米飯丸如上法服 又陸一峯集皮丸黃藥一斤分作四分三分用醃酒蜜湯童尿各浸二日焙研一分下血數升黃藥一兩去皮雞子白塗末為末水丸綠豆 蒼朮下水火知母一斤去毛切搗鬆膏和九梧子大每服七丸溫水下名金虎丸 普濟方 小兒下水火

或血病黃藥半兩赤芍藥四錢為末飯丸麻子大妊娠下痢丸梧子大每空心米飲下三十九日三服神妙不可述婦人良方小兒

熱渴黃藥削皮焙為末用米湯和丸粟米大半服一二十丸米湯下千金博效方赤白渴症及夢洩精滑真珠粉丸黃藥炒真蛤粉各一斤為末每服一百丸空心溫酒下黃

梧子大每服八十丸積熱夢遺心忪恍惚膈中煩熱宜清心丸王之黃藥末一兩片腦一錢炒蜜丸梧子大每服十五丸麥門冬湯下此大智禪師方也許學士本事方

飲數日即止嘔血熱極黃藥蜜丸為末麥門冬時行亦曰黃藥去粗皮為末塗紙包裹黃泥固煨每用一彈子大紗帕包之浸水

韋苗獨行方湯調服二錢立瘥經驗方時行亦曰一盞飯上蒸熟東煎洗極效此方有金木水火土故名五互湯一丸可

用三二次嬰兒亦曰在脊內者人乳浸黃龍不論嬰兒亦曰藥汁點之小品同眼目唇暗每旦含黃藥一片吐津洗之終身行之水無目疾普濟方

食飲不通苦酒和黃藥末點之千金方外臺用黃藥合之良○深師用蜜漬取汁含之吐涎○寇氏衍義治心脾

傳之冷即易肘后方小兒重舌點之有熱舌頭生瘡蜜漬黃藥青黛各一分為末入生龍腦一字摻之吐涎○

赴廷散用黃藥細半等分為末口瘡臭爛綠雲散用黃藥五錢銅線一錢敷二沸恣飲便愈肘后方咽喉卒腫

捲或用黃藥乾薑等分亦良口瘡濕為末擦之漱去涎三因方鼻堵有蟲黃藥二兩冷水浸一夜

唇瘡痄黃藥末以薺根汁搣毛毒瘡生頭中初生如蒲桃痛甚黃藥一兩乳香二錢冰片水調作餅貼於瘡口普濟方

腫痛欲斷黃藥五斤水癰疽乳發初起者黃藥末和雞子白搣成乳發塗之乾即易梅師方癰疽肿毒黃藥皮炒川烏頭炮等分為末唾調塗塗之

三升煮漬之時后方小兒脣瘡生下即腫者黃藥末水調塗足心普濟方傷寒責毒手

熱瘡黃藥末一兩輕粉三錢豬膽汁火毒生瘡凡人冬月向火火氣入內兩股生瘡其汗淋漓用黃藥末塗調塗之或只用蜜炙黃藥一味火毒生瘡摻之立愈一婦病此人無識者有用此而愈張果醫說凍瘡裂痛之儒門事親

死肉毒自死六畜有毒以黃藥末水服方寸匕肘后方飲瘡生肌黃藥末麵糊調塗宣明方

檀桓

拾集草藏器曰檀桓乃百歲藥之根如天門冬長三四尺別在一旁以小根綴之一名檀桓芝出靈

寶方時珍曰本經但言黃藥根名檀桓陳氏所說乃藥旁所生檀桓芝也與陶弘景所說同

氣味苦寒無毒主治心腹百病

安魂魄不饑渴久服輕身延年通神

本經

長生神仙去萬病為散飲服方寸匕盡一枚有驗

藏器

小檗

唐本草釋名

檗山石榴

時珍曰此與金櫻子杜鵑

弘景曰子檗樹小狀如石榴其皮黃而苦又一種多刺皮亦黃並生口瘡

葉與石榴無別但花異子細黑圓如牛李子及女貞子爾其樹皮白陶云皮黃恐誤矣今太常所貯乃小樹多刺而葉細者名刺檗非小

檗也藏器曰凡是檗木皆皮黃今既不黃非檗也小檗如石榴皮黃子赤如枸杞子兩頭尖人剗枝以染黃若云子黑而圓恐是別物非

小檗也時珍曰小檗山間時有之小樹

也其皮外白裏黃狀如檗皮而薄小

氣味苦大寒無毒主治口瘡瘍蠶殺諸蟲去心腹中熱氣

唐治血崩時珍○婦人良方治血崩阿始陀丸方中用之

沈存中

藏器曰黃櫨生商洛山谷四川

黃櫨

宋嘉祐

集解

藏器

曰黃櫨生商洛山谷四川

界甚有之葉圓木黃可染黃色

木

氣味苦寒無毒主治煩熱解酒疸目黃水煮服之

藏器洗赤眼及湯火漆瘡

時珍曰新

器洗赤眼及湯火漆瘡

弘景曰黃櫨木五兩剉用新汲水一斗浸

一二斗九蒸九暴天麻二兩丁香乳香一兩為末以赤黍米一升淘淨用浸黃櫨

水煮米粥搗和丸梧子大每服二三十丸食後漿水下日二夜一服聖濟總錄

厚朴

本經

校正

併入有名墨

別錄

日

赤朴別錄

厚皮

廣樹石櫟別錄

子名逐折

別錄曰時珍曰其木質朴而皮厚味辛而色紫赤

故有厚朴烈赤諸名頌曰夷雅謂之重皮方書或作

厚皮家不須也頌曰今洛陽陝西江淮湖南蜀川山谷中往往有之而以梓州龍州者為上木高三丈四丈徑一二尺春生葉如槲葉

四季不凋紅花而青實皮極鱗皺而厚紫色多潤者佳薄而白者不堪宗興曰今伊陽縣及商州亦有但薄而色淡不如梓

州者厚而紫色有油時珍曰朴樹膚白肉紫葉如槲葉五六月開細花細實如冬青子生青熟赤有核七八月采之味甘美

皮

修治

數曰凡使要紫色辛者為好去粗皮入丸散每一斤用酥四兩炙熟用若入湯飲用自然薑汁

溫吳普曰

氣味苦寒無毒別錄曰大

水炙盡為度大明曰凡入藥去粗皮用薑汁或浸炒用宗興曰味苦不以薑制則棘人喉舌

溫吳普曰

神農岐伯雷公苦無毒半當之小溫羅曰苦辛大熱元氣曰氣溫味苦辛氣味俱厚體重濁而微降陰中陽也果可升可降之才曰乾善為之使惡澤瀉消石寒水石忌豆食之動氣

主治中風傷寒頭痛寒熱驚悸氣血痺死肌

去三蟲本溫中益氣消痰下氣療霍亂及腹痛脹滿冒中冷逆胸中嘔不止濕痢淋露除築去留熱心煩滿厚腸胃別健脾治反胃霍亂

轉筋冷熱氣瀉膀胱及五臟一切氣婦人產前產後腹臟不安殺腸中蟲明耳曰調關節大治積年冷氣腹內雷鳴虛吼宿食不消去結

水破宿血化水殺止吐酸水大溫胃氣治冷痛主病人虛羸白

類主肺氣脹滿膨而喘歎好發明宗誠曰厚朴平胃散中用最調中至今

此藥盛行既能溫脾胃又能走冷氣為

世所須也元素曰厚朴之用有三平胃一也去腹脹二也孕婦忌之三也雖除腹脹若虛弱人宜斟酌用之誤服狀人元氣惟寒脹大熱

藥中兼用乃結者散之之神藥也震亨曰厚朴屬土有火其氣溫能瀉胃中之溼平胃土之

太過以致於中和而已非謂溫補脾胃也習以成俗皆謂之補良哉其治腹脹者因其味辛以提其滯氣滯行則宜去之若氣實人誤

服參芪藥多補氣脹悶或作喘宜此瀉之好古曰本草言厚朴治中風傷寒頭痛溫中益氣消痰下氣厚腸胃去腹滿果泄氣乎果益

氣半益與枳實大黃同用則能泄實滿所謂消痰下氣是也若與橘皮蒼朮同用則能除溼滿所謂溫中益氣是也與解利藥同用則治

傷寒頭痛與瀉利藥同用則厚腸胃大抵其性味苦溫用苦則泄用溫則補也故成無己云厚朴之苦以泄腹滿果曰苦能下氣故泄

溼溫能益氣舊七厚朴煎孫兆甫云補腎不如補脾胃氣壯則能飲食既進則益營衛養精血滋骨髓是以素問云精不

故散溼滿附方新七厚朴煎足者補之以味形不足者補之以氣此藥大補脾胃虛損溫中降氣化痰進食去附飲嘔吐泄瀉等證

用厚朴去皮剉丸用生薑二斤連皮切片以水五升同煮乾去薑焙朴以乾薑四兩甘草二兩生薑五兩去草培薑朴為末用棗肉生薑同煮熟去薑搗棗和丸梧子大每服五十九米飲下一方加熟附子王環一百一選方痰壅嘔逆心胸

不下飲食厚朴一兩薑汁炙黃為末

腹長尺數厚朴三物湯用厚朴半斤枳實五枚以水一斗二升煎取五升入大黃

非時米飲調下二錢七

聖惠方

腹脹脹數四兩再煎三升溫服一升轉動再服不動勿服

張仲景金匱要略

腹痛脹滿物湯用

厚朴半斤制甘草大黃各三兩薑十枚大枳實五枚桂二兩生薑五兩

以水一斗煎取四升溫服八合日三服

金匱要略

男女氣脹黑為末以陳米飲調服二錢七日三服

斗門方

反

胃止瀉方同

中滿洞瀉厚朴乾薑等分為末蜜丸梧子大

小兒吐瀉胃虛及有痰驚悸朴散用梓州厚朴一兩半夏湯泡七次薑汁浸半

以水一斗煎取四升溫服八合日三服

鮑氏方

日曬乾一錢以米泔三升同浸一百刻水盡為度如未盡少加火熬

乾去厚朴只研半夏每服半錢或一錢亂腹痛厚朴湯用厚朴炙四兩桂心二兩枳實五枚生薑二兩水六升煎取二升分三服此陶隱居方也唐石泉公王方慶廣南方云此方不惟治亂凡諸病皆治○聖惠方用厚朴薑汁炙研末新汲下痢水穀久不進者厚朴三兩黃連三兩水大腸乾急厚朴生研豬臘煮搗和丸梧子大水服二錢如神下痢水穀三升煎一升空心細服梅師方大腸乾急每薑水下三十九十便良方尿渾白濁用厚朴薑汁一兩白茯苓一錢水酒各一椀煎一椀溫服經驗良方月水不通不過三四劑神驗一加桃仁紅花煎一椀溫服

經驗良方月水不通厚朴三兩炙切水三升煎一升分二服空心飲

梅師方

逐折氣味甘溫無毒主治風寒目益氣

別錄正誤

實黑如大豆弘景曰杜仲子亦名逐折○別錄厚朴條下已言子名逐折而有名未用中復出逐折主治相同惟風瘧殺鼠字誤未知孰是爾所云厚實

乃厚朴實也故皮謂之厚皮陶氏不知援引杜仲為註皆誤矣今正之

附錄厚羅勒主一切風氣開胃補心除冷癖調臟腑

杜仲

本經

名思仲別思仙

本經木綿吳綿時珍曰昔有杜仲服此得道因以名之思仲思仙皆由此義

集解別錄曰杜仲生上虞山谷及

上品采桑其皮中有銀絲如綿故曰木綿其子名逐折與厚朴子同名

角上黨漢中二月五月六月九月采皮弘景曰上虞在豫州虞號之虞非會稽上虞縣也今用出建平宜都者狀如厚朴折之多白絲者為佳保昇曰生深山大谷所在

有之樹高數丈葉似辛夷頌曰今出商州成州峽州近處大山中葉亦類柘其皮折之白絲相連江南謂之綿初生嫩葉可食謂之綿芽花實苦澀亦堪入藥

藥木可作履益脚

皮修治

敷回月使削去粗皮每一斤用酥一兩蜜三兩和塗火炙以盡為度細剉用

氣味辛平無毒

別錄曰甘溫確曰苦燥元素曰性溫味辛甘氣味俱薄沈而降陰也

李杲潤肝燥補肝經風虛

好古發明時珍曰杜仲古方只知滋腎惟王好古言是肝經氣分藥潤肝燥補肝虛發皆人所未發也蓋肝主筋腎主骨腎充則骨強肝充則筋健屈伸利用皆屬於筋杜仲色紫而潤味甘微辛其氣溫平甘溫能補微辛能潤故能入肝而補腎子能令母實也樸龜元英談數一少年新室後得脚軟病且疼甚醫作腳氣治不效路鈴孫琳診之用杜仲一味寸斷片折每以一兩用半

虛而身強直風也腰不利加而用之

數粒能使筋骨相着李杲潤肝燥補肝經風虛

好古發明時珍曰杜仲古方只知滋腎惟王好古言是肝經氣分藥潤肝燥補肝虛發皆人所未發也蓋肝主筋腎主骨腎充則骨強肝充則筋健屈伸利用皆屬於筋杜仲色紫而潤味甘微辛其氣溫平甘溫能補微辛能潤故能入肝而補腎子能令母實也樸龜元英談數一少年新室後得脚軟病且疼甚醫作腳氣治不效路鈴孫琳診之用杜仲一味寸斷片折每以一兩用半

酒半水一大盞煎服三日能行又三日全愈麻曰此乃醫虛非脚氣也杜仲能治腰膝痛以酒行之則為效容易矣附方舊三新青娥丸方見補腎腰痛崔元亮海上集驗方用杜仲去皮炙黃一浸至五更煎三分減一取汁以羊腎三四枚切下再煮三五沸如作羹法和以椒鹽空腹頓服○聖惠方入薤白七莖○箇中方加五味子半斤二病後虛汗及日中流汗杜仲牡蠣等分為末卧時水服五七不止更服肘后方頓服宣台或三四月即隨着於兩月前以杜仲八兩糯米煎湯浸透炒去絲續斷二兩錢糯米飲下楊起簡便方和丸彈子大每服一丸糯米飲下日二服勝金方

榔芽氣味缺王治作蔬去風毒脚氣久積風冷腸痔下血亦可煎湯蘇頌

椿樗草

唐本校正

併入嘉釋名香者名椿

集韻作櫟夏書祐椿火

臭者名樗

音丑居切

山樗名櫟

音虎目樹考

拾遺

大眼桐

時珍曰椿

樗易長而多毒考

故有椿櫟之稱

莊子言大椿

以八千歲為春秋是矣

椿香而樗臭故椿字又作櫟其氣熏也

椿字從厚其氣臭人呵噏之也

樗亦椿音之轉爾

藏器

椿二

恭曰椿

椿樹形相似但

樗木疏椿木實為別也

頌曰

二木南北皆有之

形幹大抵相類但椿木實而葉香可噏樗木疎而氣臭勝之亦能散去氣並采無時樗木最為無用莊子所謂吾有大木人謂之樗其木擁腫不中繩墨小枝曲拳不中規矩者爾雅云櫟山樗郭璞註云椿似樗色小白生山中因名亦類漆樹俗語云櫟樗俗名相似如一陸璣詩疏云山樗與田樗無異葉差狹爾吳人以葉為茗宗興曰椿樗皆臭椿一種有花結子一種無花不實世以無花而本身大其幹端直者為椿椿木用葉具有花莢而木身小幹多迂矮者為樗樗用根及莢葉又蟲部有椿雖不言椿難以顯有難者為椿古人命名其義甚明禹錫曰椿之有花者無莢有莢者無花其莢夏月常生臭椿上未見椿上有莢者然世俗不辨椿樗之異故呼椿莢為椿莢爾時珍曰椿椿乃一木三種也椿木皮細肌實而赤嫩葉香甘可茹椿木皮粗肌虛而白其葉臭惡敝年人或采食椿木即樗之生山中者木亦虛大梓人亦或用之然爪之如腐朽古人以為不材之木不似椿木堅實可入棟梁也

葉氣味苦溫有小毒

說曰椿芽多食動風寒十二經脉五臟六腑令人神昏血氣微若和豬肉熟麪煩食則中滿蓋壅經絡也時珍曰椿葉無毒椿葉有小毒

王治煮水洗瘡疥風疽樗木根葉尤良

唐白

秀不生髮取椿桃樹葉心搗汁頻塗之時嫩芽滿食消風祛毒生

白皮及根皮脩治

〔嚴〕曰凡使椿根不近西頭者為上米出拌生葱蒸

半日剉細以袋盛樹屋南畔陰乾用時珍曰椿椿

木皮根皮並刮去粗皮氣味苦溫無毒

〔崔〕曰微熱震亨曰涼而燥藏器曰椿根

主治痘瘡根石黃金王治痘瘡根尤良

〔唐〕本去口鼻宿蟲殺蛇蟲亦蠭鬼疰傳

尸蟲毒下爰赤白久痢

〔藏〕得地榆止痛痢

〔蕭〕燒研止女子血崩產後血不止赤帶腸風漏血不住腸滑瀉縮小便竅火用

〔明〕利潤澀數雷治赤

白瀉赤白帶溼氣下痢精滑夢遺燥下溼去肺胃陳積痰

〔震〕〔嚴〕曰女子血崩及產後血不止月信來多并亦帶下宜取東引細椿根

皮一握粳米五十粒葱白一握炙甘草三寸豉兩合水一升煮半升以意服之枝葉功用皆同震亨曰椿根白皮性涼而能澀血凡溼熱

為病瀉痢濁帶精滑夢遺諸證無不用之有燥下溼及去肺胃陳積痰之功治泄瀉有除溼實腸之力但痢疾帶氣未盡者不可通用宜入

丸散亦可煎服不見有害子母用炒研糊丸看病作湯便名固腸丸也

〔時珍〕曰椿皮色赤而香椿皮色白而臭多服微利人益椿皮入血

分而性滻椿皮入氣分而性利不可不辨其主治之功雖同而滲利之效則異正如洪子芻藥赤白頗殊也凡血分受病不足者宜用椿

皮氣分受病有鬱者宜用椿皮此心得之微也乾坤生意治瘡腫下藥用椿皮以無根水研汁服二三椀取利數行是其驗矣故陳藏器

言椿皮有小毒蓋有所試也示與曰洛陽一女人年四十六七耽飲無度多食魚蟹蓄毒在臟日夜二三十瀉大便與膿血雜下大腸與

肛門痛不堪任醫以止血利藥不效又以腸風藥則益甚蓋腸風則有血無膿如此半年餘氣血漸弱食減肌瘦服熱藥則腹愈痛血愈

下服冷藥即注泄食減服溫平藥則病不如如此期年垂命待盡或人教服人參散一服知二服減三服膿血皆定遂常服之而愈其方

治大腸風虛飲酒過度挾熱下痢腹血痛甚多日不瘥用椿根白皮一兩人參一兩為

〔舊六〕方新十升政一合浸一宿絞汁煎一沸

三五日一度服之小兒疳疾椿白皮日乾二兩為末以粟米淘淨研濃汁和丸梧子大十歲三四丸小兒疳利因重者用椿白皮搗粉以

陳藏器本草小兒疳疾末飲下量大加減仍以一丸納竹筒中吹入鼻內三度良

〔子母秘錄〕

升政一合浸一宿絞汁煎一沸

少時又搗如此三遍以水煮熟空肚吞七枚重者不過七服忌油膩熱麪毒物○又方用

椿根濃汁一鯢殼和粟米泔等分灌下部再度即瘥其驗如神大人亦宜

外臺祕要休息痢疾

坦脾胃論用椿根白皮訶黎勒各半

兩母丁香三十箇為末醋和丸梧子大每服五十丸米飲下○唐瑤經驗方用椿根白皮東南行者

水穀下痢及母至立秋前後即患痢

長流水內漂三日去黃皮焙為末每一兩加木香二錢粳米飯為丸每服一錢二分空腹米飲下

水穀下痢兼腹痛取椿根一大兩搗

篩以好麪捻作餅乾如阜子大水煮熟每日空心服一枚並無禁忌神良

劉禹錫傳信方
下利清血 腹中刺痛椿根白皮洗刮研醋和丸梧子大每空心米飲下三四十丸一加芩朮枳殼減半

經驗方 月毒下痢 洗刮取皮日

乾為末飲下一錢 腸毒下血 溫白丸用椿根白皮去粗皮焙乾研末和丸梧子大每淡酒服五十九或酒糊丸亦可

儒門事親加人參等分即虎眼樹仁存方

血痢下血 腸月日未出時取背陰地北引椿根皮東流水洗淨掛風處陰乾為末每二兩炒各一兩為末醋糊丸如梧子大每服五十九米飲下日三服

本事方 廣雅月脫五莖漢椒一撮同煎至三升去滓傾盆內乘熱敷

炒各一兩為末醋糊丸如梧子大每空腹白湯下一百丸又洗冷則再熱一服可作五次用洗後睡少時忌鹽酸醬

發風毒物及用心勞力等事年深者亦治之婦人良方 女人白帶椿根白皮滑石等分為末梧子大半煎炒黑白丹炒黑黃藥炒黑各一錢為末

如上法丸服 男子白濁方同

丹溪方

上

英

稱名鳳眼草

身治大便下血

祐附方

新腸風下血

椿莢半生半燒為末每服二錢半飲下

普濟方

誤吞魚刺

生生編用椿樹子燒研酒服二錢保毒

上品

漆本經釋名

漆聚曰許慎說文云漆本作漆水

漆生漢中山谷夏至後采乾之

弘景曰今梁州漆最甚益州亦有廣州

漆性急易燥其諸處漆桶中自然乾者狀如蜂房孔孔隔者為佳保昇曰漆樹高

二丈餘皮白葉似椿花似槐其子似牛李子心黃六月七月割取液汁金州者最善漆性並急凡取時須待油解破故渴者難得可

重壘別制拭之上等清漆色黑如墨若鐵石者好黃蠟若蜂窠者不佳頃曰今蜀漢金嶺襄陽州皆有之以竹筒釘入木中取汁崔豹古

今注云以剛斧斫其皮開以竹管承之滴汁則成漆也崇興曰漆漆藥中未見用者皆乾漆爾且漆者在燥熱及未冷時則難乾得陰溼

雖寒月亦易乾亦物之性也若漆漬人以油治之凡驗漆惟柿者以物蘸起細而不斷斷而急收更有塗於乾竹上陰之速乾者並佳時

易簡方

之術生

珍曰漆樹人多種之春分前移栽易成有利其身如柿其葉如橘以金州者為佳故世稱金漆人多以物亂之試訣有云微明光如鏡懸絲急似鉤撻成琥珀色打着有浮漚今廣浙中出一種漆樹似小楓而大六月取汁漆物黃澤如金即唐書所謂黃漆者也入藥仍當用黑漆廣南漆作餌

糖氣沾沾無力

乾漆修治

大明日乾漆入藥須搗碎炒熟不爾損人腸胃若是溼漆煎乾更好亦有燒存性者

氣味辛溫無毒

權曰辛鹹宗興曰苦元素曰辛平有毒降也陽中陰也○之才

服之去蟲猶自留腸胃也畏漆人乃至死者外氣亦能使身肉瘡腫自有療法大明日毒發飲鐵莢并黃芩汁甘豆湯喫蠍並可制之時珍曰今人貨漆多雜桐油故多毒淮南子云蟹見漆而不乾相感志云漆得蠍而成水益物性相制也凡人畏漆者嚼蜀椒塗口鼻則可免生漆瘡者杉木湯紫蘇湯

主治絕傷補中續筋骨填髓安五臟五緩六急風寒癆瘍生漆去長蟲久服輕身耐老本經乾漆療欬消

瘀血痞結腰痛

辛疝瘕利小腸去蛇蟲錄別殺三蟲主女人經脈不通

頭疽治傳戶勞除風明削年深堅結之積滯破日久凝結之瘀血

素權治傳戶勞除風明削年深堅結之積滯破日久凝結之瘀血

發明弘景曰仙方用蠍消漆為水鍊服長生抱朴子云漆不粘者服之通神長生或以大蟹投其中或以雲母水或以玉水合之服九

蟲悉下患血從鼻出服至一年六甲行厨至也震亨曰漆屬金有水與火性急而飛補用為去積滯之藥中歸則積滯去後補性內行人不知也時珍曰漆性毒而殺蟲降而附方舊四

行血所主諸證雖繁其功只在二者而已

新七小兒蟲病

胃寒危證與癰相似者乾漆搗燒烟盡白無

行血所主諸證雖繁其功只在二者而已

美等分為末米飲服一字至一錢杜仁方

九種心痛及腹脹積聚滯

氣筒內乾漆一

兩搗炒烟盡研末醋煮麪糊丸梧子大

女人血氣婦人不曾生長血氣疼痛不可忍及治丈夫疝氣小腸氣機痛者並宜服二聖丸

漆一元溫酒下

簡要濟衆每服五丸至九丸熱酒下一兩熬一食頃入乾漆末一兩和丸梧子大每服三四丸溫酒下怕漆人不可服

經驗女人經閉兩以生地黃汁一升入銀石器中慢熬候可丸如梧子大每服一丸加至三五丸酒飲任下以近為度○產寶方治女人

月經不利血氣上攻欲嘔不得睡用當歸四錢乾漆三錢炒烟盡為末練蜜丸梧子大每服十五丸空心溫酒下○千金治女人月水不通

臍下堅如盤時發熱往來下痢腹痛此為血瘕若生肉癥不可治也乾漆一斤燒研生地黃二十斤取汁和煎至可丸九梧子大每服

三丸空心酒下產後奇腫疼痛及血氣水疾乾漆大麥芽等分為末新瓦罐相間鋪滿鹽泥固濟散放冷研散每服一二錢熱酒下但是產後諸病皆可服

婦人經驗方五勞七傷補益方用乾漆柏子仁山茱萸酸

心酒下

服二七丸溫酒下不可針藥者乾漆燒烟解中蠱毒

平冒散木以生漆和丸梧子大每空心溫酒下七十丸至百丸直指方

生漆塗之良肘后方

日二服千金方喉痺欲絕以筒吸之

靈濟總錄角中蠱毒

公頌曰華佗傳載彭城樊阿少師事佗授以漆葉青黏散方

云服之去三蠱利五臟輕身益氣使人頭不白阿從其言年

五百餘歲漆葉所在有之青黏生豐沛彭城及朝歌一名地節一名黃芝主理五臟益精氣本出於迷人入山見仙人服之以告佗佗以為佳語阿阿秘之近者人見阿之壽而氣力強盛問之因醉誤說人服多驗後無復人識青黏或云即黃精之正葉者也時珍曰按葛洪抱朴子云漆葉青黏凡數之草也樊阿服之得壽二百歲而耳目聰明猶能持鍼治病此近代之實事良史所記注者也洪說猶近於理前言可年五百歲者誤也或云青黏即蕨菜

漆葉氣味缺

王治舌勞疾殺蟲暴乾研末日用酒服一錢

時珍曰

公頌曰華佗傳載彭城樊阿少師事佗授以漆葉青黏散方

云服之去三蠱利五臟輕身益氣使人頭不白阿從其言年

心溫酒下七十丸至百丸直指方

漆子

王治下血時珍

漆花

王治小兒解癰腹脹交脛不行方中用之時珍

梓

本經墨

名木王

時珍曰梓或作梓其義未詳按陸佃埤雅云梓為百木長故曰梓為木王蓋木莫良於梓故書以梓

下品采

材名篇禮以梓人名匠朝廷以梓宮名棺也羅願云室有此木則餘材皆不震其為木王可知

景曰此即梓樹之皮梓有三種當用朴素不喬者頌曰今近道皆有之宮寺人家園亭亦多植之木似桐而葉小花紫爾雅云椅梓郭璞

注云即楸也詩鄭風云椅桐梓漆爰伐琴瑟陸璣注云楸之疏理白色而生子者為梓梓實桐皮為椅大同而小異也入藥當用有子者

集解別錄曰梓白皮生河內山谷弘

又一種鼠梓一名櫟亦楸屬也枝葉木理皆如楸今人謂之苦櫟江東人謂之虎梓詩小雅云北山有櫟是也鼠李一名鼠梓或云即此然花實都不相類恐別一物而名同爾藏器曰櫟生山谷間與梓樹本同末異或以為一物者誤矣大明曰梓有數般惟櫟梓皮入藥佳餘皆不堪櫟曰櫟爾雅翼云說又言椅梓也梓櫟也櫟亦櫟也然則椅梓櫟櫟一物四名而陸璣詩疏以櫟之白理生子者為梓梓實桐皮者為椅實思體齊民要術又以白色有角者為梓即角櫟也又名子櫟黃子為椅櫟又名荆黃櫟但以子之有無為別其角細長如箸具長近尺冬後葉落而角猶在樹其實亦名豫章時珍曰梓木處處有之有三種木理白者為梓亦者為櫟

梓之美文者為椅櫟之小者為櫟諸家疏注殊欠分明櫟亦名椅與此不同此椅即戶子所謂荆有長松文椅者也

梓白皮

氣味苦寒無毒主治熱毒去三蟲本經療目中疾主吐逆胃反小兒熱瘡身頭熱煩疎瘡煎湯浴之并搗傅別

錄煎湯洗小兒

壯熱一切瘡疥皮膚瘡癩

大明治溫病復感寒邪變為胃噦煮汁飲之

時珍曰

桐葉梓葉肥豬之法未見應在商丘子養豬經中

茶曰

二樹花

附方新風

一時氣溫病

頭痛壯熱初得一日用生梓木削去黑皮取裡

珍附方

新時氣溫病

白者切一升水二升五合煎汁每服八合取瘥

后方 肘

瘡疥瘻

大治

揭傳豬瘡

飼豬肥大三倍

別錄

療手腳火爛瘡

弘景曰

桐葉梓葉肥豬之法未見應在商丘子養豬經中

茶曰

二樹花

附方新風

一時氣溫病

頭痛壯熱初得一日用生梓木削去黑皮取裡

珍附方

新時氣溫病

白者切一升水二升五合煎汁每服八合取瘥

瘡疥瘻

梓葉木綿子羯羊屎鼠屎等分入瓶中

癬瘡瘻

合定燒取其汁塗之

試效錄驗方

楸

拾遺采名

櫟葉婦女兒童剪花戴之取秋意也

爾雅云葉小而皺

櫟葉大而皺

音鵠皮粗也

集角刺

櫟葉高大皮色蒼白上有黃白

斑點枝梗間多大刺似櫟而薄味甘嫩時燒熟水淘過拌食時

珍曰

櫟有行列莖幹直聳

可愛至

上垂條如線謂之櫟線其木溼時脆燥則堅故謂之良材宜作棊枰即枰之亦者也

木白皮

氣味苦小寒無毒

珣曰

王治吐逆殺三蟲及皮膚蟲煎膏粘傳惡瘡疽瘻瘍腫瘍除膿血生肌膚長筋骨

藏器曰

消食澀腸

下氣治上氣欬嗽亦入面藥

李珣口吻生瘡貼之頻易取效

時珍附方

新一瘻瘍

取效

肘后方

白癥風瘡

煎如稠膏日三摩之

周憲王曰

櫟有二種一種

葛常之韻語

陽秋云有人患發背潰壞膿留竈竈百方不瘥一醫用立秋日太陽未升時采櫟樹葉熬之為膏傳其外

舊一

一九服盡四兩不累日而愈也東晉范汪名醫也亦稱櫟葉治瘡腫之功則櫟有拔毒排膿之力可知

附方新七

上氣欬

要藥而近人少知

范汪方

時珍曰

櫟乃外科

舊一

上氣欬

要藥而近人少知

范汪方

要藥而近人少知

要藥而近人少知

葉氣味

同皮

主治擣傳瘡腫煮湯洗膿血冬取乾葉用之諸瘡腫及內有刺不出者取葉十重貼之

藏器曰

出日時珍曰

藏器

時珍曰

櫟乃外科

舊一

一九服盡四兩不累日而愈也東晉范汪名醫也亦稱櫟葉治瘡腫之功則櫟有拔毒排膿之力可知

附方新七

上氣欬

要藥而近人少知

范汪方

要藥而近人少知

效止痛消腫食膿血勝

于東藥

范汪東陽方

瘰疬瘡瘻

櫟煎取七八升又換鍋煎取二升乃納不津器中用時先取麻油半合蠟一分酥一栗子許同消化又取

杏仁七粒生薑少許同研米粉二錢同入膏中攪勻先塗瘡上經二日來乃拭却即以篦子勻塗樹煎滿瘡上仍以軟帛裹之且日一拭更上新藥不過五六上已破者即使生肌未破者即內消瘡後須將慎半年采藥及煎時并禁孝子婦人僧道雞犬見之。墮中方瘡不癢痒痛不癢樹葉頭及根頭瘡生瘡樹葉搗汁頻皮為末傳之。聖惠方頭瘡生瘡塗樹葉搗汁頻中心搗汁少許絞汁銅器慢熬如稀鴨糞合收之每旦

點之

普濟方小兒水瘡樹葉搗汁塗

聖惠方

桐

本經釋名白桐弘景黃桐圖經泡桐綱目椅桐景榮桐時珍曰本經桐葉即白桐也桐華成筒故謂之桐其材輕虛色白而有綺文故俗謂之白

以椅為梧桐郭璞集解別錄曰桐葉生桐柏山谷弘景曰桐樹有四種青桐葉皮似梧而無子梧桐皮白葉似青桐而有子子肥可食

以榮為梧桐並誤

白桐一名椅桐人家多植之與蘭桐無異但有花子二月開花黃紫色禮云三月桐始華者也堪作琴瑟蘭桐無

子是作琴瑟者本草用桐華應是白桐頌曰桐處處有之陸璣草木疏言白桐宜為琴瑟雲南牂牁人取花中白蕊淹漬以為布似毛

服謂之華布椅即梧桐也今江南人作油者即蘭桐也有子大于梧子江南有賴桐秋開紅花無實有紫桐花如百合實堪燒煮以散

南有刺桐花色深紅宋輿曰本經桐葉不指定是何桐致難執用但四種各有治療白桐葉三歧開白花不結子無花者為蘭桐不中作

琴體重荏桐子可作桐油梧桐結子可食時珍曰陶注桐有四種以無子者為青桐蘭桐有子者為梧桐白桐寇注言白桐蘭桐皆無子

蘇注以蘭桐為油桐而賈思勰齊民要術言實而皮薄者為梧桐華而不實者為白桐白桐冬結似子者乃是明年之華房非子也岡桐

即油桐也子大有油其說與陶氏相反以今咨訪互有是否蓋白桐即泡桐也葉大徑尺最易生長皮色粗白其子輕虛不生蟲蛀作器

物屋柱甚良二月開花如牽牛花而白色結實大如巨棗長寸餘殼內有子片輕虛如榆莢葵實之狀老則殼裂隨風飄揚其花紫色者

名岡桐莊桐即油桐也青桐即梧桐之無實者按陳翥桐譜分別白桐岡桐甚明云白花桐文理粗而體性慢喜生朝陽之地因子而出

者一年可起三四尺由根而出者可五七尺其葉圓大而長有角光滑而毳先花後葉花白色花心微紅其實大二三寸內為兩房房

內有肉肉上有薄片即其子也紫花桐文理細而體性堅不生朝陽之地不如白桐易長長葉三角而圓大如白桐色青多毛而不光且

硬微赤亦先花後葉花色紫其實亦同白桐而微尖狀如刺子而粘房中

肉黃色二桐皮色皆一但花葉小異體性堅慢不同爾亦有冬月復花者

桐葉

氣味苦寒惡食瘡瘍本經消腫毒生髮時附方新手足腫浮桐葉煮汁潰之并飲少許雖疽發背大如盤吳醫不可

珍附方四手足腫浮或加小豆丸妙聖惠方癰疽發背近桐葉醋蒸貼上

退熱止痛漸生肉收
極驗秘方也

醫林正宗髮落不生

桐葉一把麻子仁三升米泔煮五六沸去滓日日洗之則長

肘后方

髮白染

經霜桐葉及子多收搗碎以瓶

之并飲少許

傷寒發狂

六七日熱極狂言見鬼欲走取桐皮削去黑壁斷四寸一束以酒五

肘后方

傷寒發狂

合水一升煮半升去滓頓服當吐下青黃汁數升即瘥

肘后方

跌撲損傷

水桐樹皮去青留白

木皮主治五痔殺三蟲

本經療奔豚氣病別

五淋木髮去頭風生髮滋潤

欬治惡瘡小兒丹毒煎汁塗之

時附方

新腫從脚起

削桐木

煮汁清

花王治傳猪瘻飼豬肥大三倍

本經附方

新眼見諸物禽蟲飛走乃肝膽之疾青桐子花酸棗仁玄明粉羌

活各一兩為末每服二錢水煎滓日三服

經驗方

梧桐

綱目釋名

桐

時珍曰梧桐名義未詳爾雅謂之櫟因其可為棺

集解

李時珍曰梧桐皮白葉似青桐而子肥可食頌曰陶氏謂白桐一名

左傳所謂桐棺三寸是矣舊附桐下今出別條

集解

李時珍曰梧桐皮為椅即今梧桐是二種俱有椅名也遁甲書云梧桐可知日月正閏生十二葉一邊有六葉從下數二葉為一月至上十二月有閏十三月小餘者視之則知閏何月也故曰梧桐不生則九州異宗與曰梧桐四月開嫩黃小花一如來花枝頭出絲墮地成油沾漬衣履五六月結子人收炒食味如菱芡此是月令清明桐始華者時珍曰梧桐處處有之樹似桐而皮青不散其木無節直生理細而性繁葉似桐而稍小光滑有火其花細盛墜下如鍛其莢長三寸許五片合成老則裂開如真謂之橐橐其子綴於橐鄂上多者五六少或二三子大如胡椒其皮皺羅願爾雅翼云梧桐多陰青皮白骨似青桐而多子其木易生鳥卵子墮斬生但晚春生葉早秋即凋古稱鳳皇非梧桐不

棲豈亦食其實平詩云梧桐生矣子彼朝陽齊民要術云梧桐生山石間者為樂器更鳴響也

葉生涼發背炙焦研末蜜調傅乾即易

時

木白皮氣味

主治燒研和乳汁塗癩髮變黃赤

時治腸痔

蘇頌曰刪繁方治病

珍

葉生涼發背炙焦研末蜜調傅乾即易

時

子氣味甘平無毒主治擣汁塗拔去白髮根下必生黑者又治小兒口瘡和雞子燒存性研

珍

嬰子桐

拾遺

虎子桐

拾遺

桐

時珍曰嬰子因實狀似嬰也虎子

集解

桐生山中樹似梧桐頌曰南人作油者乃

遺種桐義油桐以其毒也往者言其油似桂油也

桐也有子大于梧子宗興曰荳桐早春先開淡紅花

子

桐

拾遺

虎子桐

拾遺

桐

時珍曰嬰子因實狀似嬰也虎子

集解

桐生山中樹似梧桐頌曰南人作油者乃

遺種桐義油桐以其毒也往者言其油似桂油也

桐也有子大于梧子宗興曰荳桐早春先開淡紅花

狀如故子花成筒子可作桐油時珍曰國桐即白桐之紫花者油桐枝幹花葉並類國桐而小樹長亦遲花亦微紅但其實大而圓每實中有二子或四子大如大風子其內白色味甘而吐人亦或謂之紫花桐人多種時收子貨之為油入漆家及船家用為時所須人多偽之惟以箋圖識

起如故面者為真

桐子油

氣味甘微辛寒有大毒

大明曰冷微毒時珍曰桐油吐人得酒即解

主治摩疥癬瘡毒腫毒氣至死

藏傳

惡瘡及宣水腫塗鼠咬處能辟鼠

大盪脣瘡火傷瘡吐風痰喉痺及一切諸疾以水和油掃入喉中探吐或以子研末吹入喉中取吐又點燈燒銅箸頭烙風熱爛眼亦

明時珍方新七瘡初起桐油點燈入竹筒內薰之得

血風瘰瘡胡粉煅過研桐油調作糊紙膏貼之○又方用船上陳桐油石灰煅過又

妙珍附方七瘡初起桐油點燈入竹筒內薰之得

血風瘰瘡胡粉煅過研桐油調作糊紙膏貼之○又方用船上陳桐油石灰煅過又

妙珍附方七瘡初起桐油點燈入竹筒內薰之得

血風瘰瘡胡粉煅過研桐油調作糊紙膏貼之○又方用船上陳桐油石灰煅過又

便脚肚風瘡如癩桐油人乳等分掃酒煎赤鼻桐油入黃丹雄黃黃丹雄黃
便脚肚風瘡如癩桐油人乳等分掃酒煎赤鼻桐油入黃丹雄黃黃丹雄黃桐油一盞髮一握熬化妝收每以罕硝石毒吐即毒解

桐油二升灌之涼瘡破裂桐油一盞髮一握熬化妝收每以罕硝石毒吐即毒解華

方刺方酒煎赤鼻桐油一盞髮一握熬化妝收每以罕硝石毒吐即毒解華

桐油一盞髮一握熬化妝收每以罕硝石毒吐即毒解華

佗危附錄桐音而郢切減器曰生山谷間狀似青桐葉有極人取皮以溫麻木皮味甘溫無毒治蠶咬

病方桐毒氣入腹末服之雞犬食蠶欲死者煎汁灌之絲繩即愈葉主蚊蟲蜘蛛咬毒搗爛封之

海桐

宋開寶海桐生南海山谷中樹似桐葉生海桐生海南及雷州近海州郡亦有之葉大如手作三花尖皮若梓白皮而

生側數如掌形若金鳳枝幹有刺花色深紅江南有頹桐紅花無實時珍曰海桐皮有巨刺如龜甲之刺或云即刺桐皮也按嵇含南方草木狀云九真有刺桐布葉繁密三月開花赤色照映三五房凋則三五復發陳翥桐譜云刺桐生山谷中文理細緊而性喜折裂體有

巨刺如櫟樹其實如楓頹桐身青葉圓大而長高三四尺便有花成朵而繁紅色如火為夏秋榮觀

木皮氣味單無毒

大明

王治霍亂中惡赤白久痢除疳牙齒蟲痛並煮服及含之水浸洗目除膚赤

開寶

主腰脚不遂血服

頑癆眼膝疼痛亦白瀉痢半時珍曰古方多用浸酒治風濕南唐筠州刺史王紹顏撰續傳信方云項年予

頑癆眼膝疼痛亦白瀉痢半時珍曰古方多用浸酒治風濕南唐筠州刺史王紹顏撰續傳信方云項年予

方倍有此驗。保一劑便減五分。其方用海桐皮二兩。牛膝一兩。甘草半錢。薏苡仁二兩。生地黃十兩。並浮沈焙乾剉以線包裹入無灰酒二斗浸之。冬二七夏一七空心飲一盞。每日早晚各三次。長令醺醺。此方不得添減。禁毒食。時珍曰。海桐皮能行筋絡。達病所。又入血分。及去風殺蟲。附方。新風癬有蟲。海桐皮、蛇牀子等分。為末。以臘油點。海桐皮煎水漱。

刺桐花主治止金瘧血珠效。附金雞同時。時珍曰。生嶺南山間。其葉如桐。頃用葉者湯洗。漂足膝風溼瘡氣。

集解引錄曰。棟實生荆山山谷。弘景曰。處處有之。俗人五

棟

本經

下品釋名

棟圓

實名

金鈴子

時珍曰。按羅願爾雅翼云。棟葉可以練物。故謂

之

棟子

經云。雲

雲葉

可以練物。故謂

之

金鈴子

之

棟子如小鈴熟則黃色

名金鈴象形也

者無子根赤有毒

服之使人吐不能止

時有至死者

雌者有子根白微毒

入藥當用雌者

頃曰。棟實以蜀川者為佳。木高丈餘葉密如槐

而長三四月開花紅紫色分芳滿庭實如彈丸生青熟黃十二月采之根果無時

時珍曰。棟長甚速。三年五年即可作棟。其子正如圓葷以

川中者為良。王穎農書言鵝鴨食其實應助風俗。通言擇易食其

葉宗憲歲時記言。蛟龍畏棟故端午以葉包棟投江中祭屈原。

實圓核。數曰。凡米得熱乾酒令透蒸。待皮軟剗去皮取肉去核。用凡使肉不侵核。使核不侵肉。如使氣味。當裏有小毒。元素曰。酸苦平陰中之陽。

時珍曰。得酒煮乃寒因

熱用也。尚香為之使

主治溫疫傷寒大熱煩狂殺三蟲疥瘍利小便水道

本王中大熱狂失心躁悶作湯浴不入湯使

權入心及小腸

止上下部腹痛

李瀉膀胱好治諸疝痔瘻

時珍曰。元素曰。熱厥暴痛。非此不能除。時珍曰。棟實導小腸膀胱之熱。因引心包相火下行。故

方治病有四治。五治七治

舊三熱厥心痛或發或止。身熱足寒人不愈者。先灸大溪。崑崙。引熱下行。內服金鈴散。

諸法蓋亦配合之巧耳。

附方。新八熱厥心痛。用金鈴子。玄胡索各一兩。為末。每服三錢。溫酒調下。

潔古活法機要。小兒冷症氣痛。膏腫浮腫。

金鈴子去核五錢。吳茱萸二錢半。為末。酒糊

丸。每服大蜜鹽湯下二三十丸。

全幼心鑑。丈夫疝氣。以麵二升。同於銅鑄內炒至金鈴子亦為度。放冷取出去核。為末。巴豆不用。每服

三錢。熱酒或醋湯調服。一方。癰疽腫痛。潰客方。棟實丸。治鈎腎偏墜痛。不可思用。川棟子肉五兩。分作五分。一兩用破故紙二錢。炒黃一

入鹽炒。尚香半兩。

經驗方。癰疽腫痛。兩用小茴香三錢。食鹽半錢同炒一兩。用牽牛子三錢同炒一兩。用斑

發七枚去頭足同炒棟去食鹽菜菔牽牛班蝥只留故紙茴香同研為末以酒打麪糊九倍子大每空心酒下五十九○得效方棟實九治一切疝氣腫痛大有神效用川棟子酒潤取肉一斤分作四分四兩用小麥一合班蝥四十九箇同炒熟去蝥四兩用小麥一合巴豆四十九粒同炒熟去豆四兩用小麥一合巴戟肉一兩同炒熟去戟四兩用小茴香一合食鹽一兩同炒熟去鹽加破故紙酒炒一兩廣木杳不見火一兩為末酒煮麪糊丸梧子大每服五十九鹽湯空心下日三服○直指方棟實丸治外腎脹大麻木痛破及奔豚疝氣用川棟子四十九箇分七處切取肉七箇用小茴香五錢同炒七箇用破故紙二錢半同炒七箇用黑牽牛二錢半同炒七箇用蘿蔔子巴豆罐炒三味不用入青木同炒七箇用蘿蔔子二錢半同炒七箇用班蝥十四箇去頭足同炒棟去蘿蔔子巴豆罐炒三味不用入青木外臺耳卒熱腫棟實五合搗爛綿裹消膏林病在下焦苦棟子茴香等分炒外臺耳卒熱腫
祕要耳卒熱腫
塞之頻換
聖惠方醫消膏淋為末每溫酒服一錢
聖惠方
小兒五疳
豬膽汁丸米飲下
摘玄方

根及木皮氣味苦微寒微毒

大明曰雄者根亦有毒吐渴殺人不可誤服雌者入服食每一兩可入

臟毒下血

飲每卷十九至二十丸

經驗方腹中長蟲

入穀道中三寸許日二易之

川棟子肉川芎等分為末

川棟子肉川芎等分為末

川棟子肉川芎等分為末

川棟子肉川芎等分為末

川棟子肉川芎等分為末

和瘡癬甚

引治遊風熱毒風癰惡瘡疥癩

小兒壯熱並煎湯浸洗

大明附方

二消渴有蟲

苦棟根白皮一握切焙入麝香少許水二

盞煎至一盞空心飲之雖困頓不妨下蟲

如蛇而紅色其渴自止消渴有

小兒肚蟲卵煮熟空心食之次日蟲下

○經驗方抵聖散用苦棟皮二兩白薑半兩為末每以一二錢

水煎服之○簡便方用棟根白皮去粗二斤切水一斗煮

取汁三升沙鍋成膏五更初溫酒服一匙以蟲下為度

小兒諸瘡惡瘡癰瘍浸淫瘡並宜棟樹皮

吐去勿喫

蠅蝶傷棟樹枝葉汁塗之

附后方蠅蝶傷

楊起簡便方

瘡瘍風蟲根皮皂角去皮子等分

附后方蠅蝶傷

良楊起簡便方

瘡瘍風蟲根皮皂角去皮子等分

花王治瘡瘍培木參之鋪席下殺蟲虱

時珍

葉主瘡瘍入瘡瘍發時煎酒飲

時珍

槐

本經校正
上品
槐花 槐膠果

音懷時珍曰按周禮外朝之法面三槐三公位馬溢注云槐之言懷也懷來人於此也王安石集華別錄

實生河南平澤可作神燭頌曰今處處有其木有極高大者按爾雅槐有數種葉大而黑者名槐槐晝合夜閉者名守宮槐葉細而青綠者但謂之槐其功用不言有別四月五月開黃花六月七月結實七月七日采嫩實搗汁作煎十月采老實入藥皮根米無時醫家用之最多時珍曰槐之生也季春五日而毫目十日而風耳更節而始規二旬而葉成初生嫩芽可煉熱水淘過食亦可作飲代茶或采槐子種畦中未苗食之亦良其木材堅重有青黃白黑色其花未開時狀如米粒炒過煎水染黃甚鮮其實作莢連珠中有黑子以子連多者為好周禮秋取槐禮之火淮南子老槐生火天玄主物薄云老槐生丹槐之神異如此藏器曰子上房七月收之堪染阜

槐實

修治

本草采得去萼子并五子者只取兩子三味

氣味苦寒無毒列缺曰酸鹹之才
因景天為之使

主治內邪氣熱止涎唾補絕傷火瘡婦

人乳癰子膿急癰

本草
經久服

日目篤頭不白延年治五痔瘻瘻

以七月七日取之搗汁銅器盛之日煎令可丸如鼠屎納竅中日三易乃

愈

又墮胎

引別名
引

以殺蟲去風合房陰乾煮飲明日除熱

頭腦心胸間熱風煩悶風眩欲倒心頭吐涎如醉灌漬如虹車上者

藏治

丈夫女人陰瘻溼痒惟生春

七粒明疎導風熱

宋真言
與治口齒風涼大腸潤肝燥

李盈月

好古曰

槐實純陰肝經氣分藥也

治證與桃仁

盛合泥百日皮爛為水核如大豆服之令腦滿髮不白而長生

頌曰折嫩房角作湯代若主頭風明日補腦水吞黑子以變白髮偏鵠明

日使髮不落法十月上己日取槐子去皮納新被中封口二七日初服一枚再服二枚日加一枚至十日又從一枚起終而復始令人可

夜讀書延年益氣力大良時珍曰按太清草木方云槐者虛星之精十月上己日采子服之去百病長生通神藥畫度肩吾常服槐實

年七十餘髮鬢皆黑目看細字此其驗也古方以子入冬月牛膽中漬之陰乾百日每食後一枚云久服明日通神白髮還黑有時及

下血者尤

附方

舊一
新

四槐角丸

有孔名蠻瘞

瘞瘞內有蟲名蟲瘞

並皆治之槐角去梗炒一兩地榆當歸酒焙防風黃芩枳殼炒各半兩為末

酒糊九倍子大每服五十

丸米飲下

和劑局方

大腸脫工

槐角槐花各等分炒為末用羊血蘸藥炙熟食之

許仁則方用槐角子一斗搗汁酒稠取

丸米飲下

和劑局方

內痔外痔

地膽為末同煎九倍子大每飲服十九

兼作梃子納下部或以苦參末代地膽亦可
外臺祕要 目熱昏暗槐子黃連二兩為末蜜丸梧子大每
漿水下二十九日二服 聖濟總錄 大熱心悶 槐子燒末酒服方

根花修治

宗興曰未聞時采收陳久者良入藥炒用染安以水煮一沸出之其稠澤為餅染色更鮮也

氣味苦無毒元素回味氣薄純陰也

王治五痔心痛眼赤殺腹臍蟲及皮膚風熱

槐子燒末酒服方寸七 千金方

腸風漏血赤白痢並炒研服大涼大月素炒香頻噙治失音及喉癰又療吐血衄崩中漏下

時發時止時珍曰槐花味苦色黃涼陽明厥陰血分藥也故所主之病多屬二經

附方二十 新劙血不止 槐花烏賊魚骨等分半生半炒為末吹之

普濟方 吐劙不止

槐花末傳之即槐花燒存性入麝香少許研匀糯米飲下三錢 普濟方 呥血唾血 槐花炒研

糯米飲下仰臥一小便尿血 槐花炒鬱金煨各一兩為末每服二錢淡豉湯下立效

篋中祕密方

朱氏集驗吐血不止 大腸下血 經驗方用槐花荊芥穗等分為末酒服一錢七〇集簡方用柏葉三錢槐花六錢煎湯日服〇袖珍用槐花枳殼等分炒

存性為末新汲水服二錢 檔九殼子大日乾每服一丸空心當歸煎酒化下

朱氏方

大腸下血 經驗方用槐花荊芥穗等分為末酒服一錢七〇集簡方用柏葉三錢槐花六錢煎湯日服〇袖珍用槐花枳殼等分炒

生豬臍一條洗淨控乾以炒槐花末填滿扎定米醋沙鍋內煮爛

錢淡豉湯下立效

篋中祕密方

汲水服二錢 檢九殼子大日乾每服一丸空心當歸煎酒化下

朱氏方

大腸下血 經驗方用槐花荊芥穗等分為末酒服一錢七〇集簡方用柏葉三錢槐花六錢煎湯日服〇袖珍用槐花枳殼等分炒

生豬臍一條洗淨控乾以炒槐花末填滿扎定米醋沙鍋內煮爛

錢淡豉湯下立效

篋中祕密方

槐花炒研酒服三錢日三服

朱氏方

大腸下血 經驗方用槐花荊芥穗等分為末酒服一錢七〇集簡方用柏葉三錢槐花六錢煎湯日服〇袖珍用槐花枳殼等分炒

七百目槐枝桑葉各一錢炙甘草易風寒疾用槐葉一斤熬熟曬乾研末前三分水煎服之聖惠方月風寒疾飲代茶久服明日食醫心鏡鼻氣塞瘻以水五升煮槐葉取三升下

枝氣味

同

王治洗瘡及陰囊下溼瘻八月斷大枝候生嫩葉煮汁釀酒療大風瘻瘻甚效別

炮熱熨蠍毒青枝燒濕塗瘻瘻揩

恭

千金方

蟲煎湯

洗痔核燒灰沐頭長髮藏治赤目崩漏時令

頌曰劉禹錫傳信方著破州王及郎中槐湯灸瘻

瘻使以艾灸其上七壯以知為度王及素有痔疾先

驛入駱谷其痔大作狀如胡瓜熱氣如火至驛僵仆郵吏用此法灸至三五壯忽覺

方舊五

流便以父灸其上七壯以知為度王及素有痔疾先

驛入駱谷其痔大作狀如胡瓜熱氣如火至驛僵仆郵吏用此法灸至三五壯忽覺

新一

風熱牙痛之聖惠方胎赤風眼槐木枝

如馬鍾

大長二尺作二段齊頭麻油一匙置銅鉢中晨便重子

一人以其木研之至腹乃止令仰臥以塗日三度塗

水三大升煎取一升頓服千金鉢中赤不問遠近取槐枝燒灰

服深胎動欲產日月末足者取槐樹東引枝今孕婦手把之即易生

子母祕錄

陰瘻溼瘻槐樹北面不見日枝煎水洗三

五遍令再煖之孟說必效方

木皮根白皮

氣味草無毒主治爛瘻喉瘡寒熱引

錢煮汁淋陰囊陰腫氣痛有癰水漱口齒風疳蟲血

頭治中風瘻瘍

人

煮汁服治下血

附方蘇四

中風直

不得

屈申

不得

屈申

浴男子陰疝卵腫浸洗五痔一切惡瘻婦人產門痒痛及湯火瘻膏止痛長肉消癰腫

腫人煮汁服治下血

附方蘇四

中風直

不得

屈申

不得

屈申

不得

屈申

不得

屈申

反復者取槐皮黃白者切之以酒或水六升煮取二升稍稍服之

時后方破傷中風

壯不痛者灸至不痛用火摩之普濟風

蟲牙痛槐樹白皮一握切以酪一升煮去滓少許含嗽

濟方陰下溼瘻槐白皮炒煎水

痔有蟲作痒或下腹血多取槐白皮濃煮汁先熏後洗良久欲大便當雙瘻槐白皮醋浸半日洗

日洗生生方痔瘻有蟲出不過三度即愈仍以皮為末綿裏納下部中

梅師方蠅蠻瘻槐白皮醋浸半日洗

之孫真人千金方

槐膠氣味

苦寒無毒主治一切風化涎肝臟風筋脉抽掣及急風口噤或四肢不收頑瘻或毒風周身如蟲行或破傷風口眼偏斜

腰背強硬任作湯散丸煎服亦可水煮和藥為丸

高熗熱綿裏塞耳治風熱聾閉時

槐耳

見菜部
木耳

檀

拾翠時珍曰朱子云檀善木也。草藏器曰按蘇恭言檀似秦皮其葉堪為飲樹體細堪作斧柯至夏有不生者忽然葉滿當有大水道采之其字從壘以此壘者善也。集角農人候之以占水旱號為水檀又有一種葉如檀高五六尺生高原四月開花正紫亦名檀樹其

根如葛頌曰江淮河朔山中皆有之亦檀香類但不香爾時珍曰檀有黃白二種葉皆如槐皮青而澤肌細而膩體重而堅狀與梓榆莢遂相似故俚語云研檀不歸得莢遂莢遂尚可得駿馬駿馬梓榆也又名六駿皮色青白多癬駿也檀木宜杵搗鍊器之用

皮及根皮氣味辛平有小毒治皮和榆皮為粉食可斷穀救荒根皮塗瘡疥殺蟲器

莢遂

唐本草釋名謂莢遂詩疏先同集韻茶曰莢遂葉似木槿及榆作小樹其子如疏漫兩兩相對而色亦味甘陸上集韻詩疏云檀榆之類也所在山谷有之藏器曰生北上山林中皮堪為索

枝葉氣味甘苦平無毒至治三蟲下氣消穀煮汁和米作粥飼小兒甚美唐本作粥漢六畜瘡中生蛆立出器

本草綱目木部第三十五卷上終

本草綱目木部第三十五卷下

木之二 奇木類

秦皮

本經校正

併入拾遺

名松皮

音尋木

石膏

引述觀弘

蘇蠻

時珍曰秦皮本作檉皮其木小而岑高故因以為名人

遺檉木釋名

尋木

尋木

石斛

引述觀弘

蘇蠻

時珍曰秦皮本作檉皮其木小而岑高故因以為名人

中品

遺檉木釋名

尋木

高誘注淮南子云檉苦櫟木也

恭曰樹集解

別錄曰秦皮生廬江川谷及冤句水邊二月八月采皮陰乾弘景曰俗云是樊楨皮而水漬

葉似檀故名石檀俗因味苦呼為苦樹

集解

別錄曰此樹似檀葉細皮有白點而不粗錯取皮潰水便碧色書紙看

之皆青色者是真項曰今陝西川郡及河陽亦有之其木大都似檀枝幹

皆青綠色葉如匙頭虛大而不光並無花實根似槐根俗呼為白檉木

寒權曰平惡苦瓠防葵少才曰惡吳茱萸大戟為之使

主治風寒濕痺洗洗寒氣除熱目中青腫翳久眼頭

不輕身

本經

療男子少精婦人帶下小兒癩身熱可作洗目湯火服皮膚光澤肥大有子

別錄曰明目去目中久熱兩目赤腫瘡風濕不祚

湯治小兒身熱煎水澄清洗赤白頭

湯洽小兒身熱煎水澄清洗赤白頭

寒權曰同葉煮湯洗蛇咬并研末傅之

好古同葉煮湯洗蛇咬并研末傅之

寒權曰同葉煮湯洗蛇咬并研末傅之

八合食後溫服此乃謝

赤眼睛瘡

秦皮一兩清水一升白盃中浸春夏一食頃以上看碧色出即以筋頭纏綿仰卧

道人方也

外臺秘要赤眼睛瘡

點令滿眼微痛勿畏良久瀝取熱汁日點十度以上不過兩日瘥也

外臺秘要眼弦挑金熱剉秦皮

夾沙糖水煎調大黃末一錢微利佳。仁齋直指方所濡乃成此疾。以秦皮煎汁一斗飲之即瘥。

寇宗奭本草

合歡

本經

中品

釋名

合晉

唐

日

青裳

圖

鵝

綱

鳥賴樹

頃曰崔豹古今注云欲蠲人之忿則贈以青裳青裳合歡也植之庭除使人不忿

按王璆百一選方云夜合俗名萌葛越人集生本經曰合歡生豫州山谷樹如狗骨樹別錄曰生益州山谷弘景曰俗間少識當以其非謂之烏賴樹又金光明經謂之戶利灑樹本草圖說病之功也然曰此樹葉似皂莢及槐極細五月花發紅白色上有綠茸秋實作莢子極薄細所在山谷有之今東西京第宅山池間亦有種者名曰合昏頃曰今汴洛間皆有之人家多植於庭除間木似梧桐枝甚柔弱葉似皂角細而繁密互相交結每風來輒自相解了不相牽綴米皮反葉用不拘時月宗奭曰合歡花其色如今之燕暉綠上半白下半肉紅散垂如絲為花之異其緣葉至夜則合也嫩時燒熱水淘亦可食

木皮

去粗皮

炒用

氣味

甘平無毒

安五臟和心志令人歡樂無憂衣服輕身明目得所欲

本經

書

治癰

瘡

重膿力

大殺蟲

瘍木和端

下墨油

調盜

蜘蛛咬瘻

用葉洗

水垢

減

折傷

疼痛

研末酒服一錢

七

宗

和血消腫止痛

時

發明

震亨曰

合歡屬土

補陰之功甚

提長肌

神效而外

科家

新方

三月

蠟燭

煮取

半分

二服

章甫獨行方

撲蠅

膏

夜合

樹皮

即合歡皮去粗皮炒黑色四兩

芥菜子炒

妙王璆

合歡木灰

二合

榆木五合

鉛精一合

水淬末二升

熬

水

煎末

二升

搗

口

夜合花

枝濃黃汁拭口

中風

掌百

合枝酒

夜合枝

柘枝

各五兩

並

生糉糯米五升黑豆五升羌活二兩防風五錢細麪七斤半先以水五斗煎五枝取二斗五升浸米豆蒸熟入麪與防風羌活如常釀酒法封三七日壓汁每飲五合勿過醉致吐常令有酒氣也奇效良方

皂莢

本經

釋名

荳蕷

綱

雞子

綱

懸

天

蛇

毒

瘡

似癩非癩天蛇乃早間花

蜘蛛也人被其螫為露水

曾氏方謂之烏犀外丹本草謂之懸刀

集解

別錄曰

皂莢生雍州山谷及

魯鄆縣如猪

牙者良九月十月采莢陰乾弘景曰處處

有之長尺二者良俗人見其有蟲孔而未嘗有蟲形皆言不可近令人惡病殊不爾也其蟲狀如草葉上青蟲微黑便出所以難見恭曰此物有三種猪牙皂莢最下其形曲戾薄惡全無滋潤洗垢不去其尺二者粗大長虛而無潤若長六七寸圓厚節促直者皮薄多肉味濃大好須曰所在有之以懷孟者為勝木極有高大者本經用如猪牙者陶用尺二者蘇用六寸圓厚者今醫家作疏風氣丸煎多用長皂莢治齒及取積藥多用牙皂莢所用雖殊性味不甚相遠其初生嫩芽以為疏如更益人時珍曰皂樹高大葉如槐葉瘦長而尖枝間多刺夏開細黃花結實有三種一種小如猪牙一種長而肥厚多脂而粘一種長而瘦薄枯燥不粘以多脂者為佳其樹多刺難上米時以剪植其樹一夜自落亦一具也有不結實者樹鑿一孔人生鐵三五斤泥封之即結莢人以鐵砧槌皂莢即自損鐵砸之久則成孔鐵鍋燙之多爆片落宣皂

英與鐵有感召之情耶

皂莢

修治數日使要赤肥并不蛀者以新汲水浸一宿用銅刀削去粗皮以酥反復炙透

氣味鹹溫有小毒好古曰入厥陰經氣分時珍曰

入手太陰陽明經氣分之才曰柏實為之使惡參門
久畏空青人參苦參機曰伏丹砂粉霜硫黃硇砂

主治風寒死肌邪氣頭淚出利九竅精物本療眼膜滿溢穀除欬嗽囊結婦人

胞不滿益精可為沐浴湯

錄通關節頭項消痰殺蟲治膏肓胃中風口噤

大破堅癥腹中痛能墮胎又將浸酒中取盡其精煎

成膏金黃貼一切腫瘍

驅寒暑易雨時合裏燒烟辟瘟疫邪濕氣宗堯煙熏因寒又利脫肛機搜肝風瀉肝氣

好通肺及大腸氣治咽喉

塞瘻瘍瘍風癩疥癬

時發月好古曰皂莢厥陰之藥活人書治陰毒正氣散內用皂莢引入厥陰也時珍曰皂莢屬金入手太陰陽明珍

經金勝木燥勝風故兼入足厥陰治風木之病其味辛而性燥氣浮而散吹之導之則通上下諸竅服

之則治風濕瘻瘍溼滿殺虫塗之則散腫消毒搜風治瘻按龐安時傷寒總病論云元祐五年自春至秋斬黃二郡人患恙噦痒十死八九死者半日一日而死黃州推官潘昌言得黑龍膏方救活數十人也其方治九種喉痺急喉痺緩喉瘻喉瘻蟲蝶重舌木舌飛絲入口用大皂莢四十挺切水三斗浸一夜煎至一斗半入人參末半兩甘草末一兩煎至五升去滓入無灰酒一升金燄一七煎如鶴入瓶封埋地中一夜每溫酒化下一匙或掃入喉內取惡涎盡為度後含甘草片又孫用和家傳秘寶方云凡人卒中風瘻亦如醉形體不收或倒或不倒或口角流涎出斯須不治便成大病此證風涎潮于上胸瘻氣不通宜用急救稀涎散吐之用大皂莢肥實不蛀者四挺去黑皮白簪光明者一兩為末每用半錢重者三字溫水調灌不大嘔吐只是微微稀冷涎或出一升二升當待惺惺乃用藥調治

不可使大吐之恐過剝傷人累效不能盡述宗與曰此法用皂莢末一兩

生熟末半兩膩粉半兩水調一二錢過咽即吐延用礬者分脇下涎也

附方

舊二十新

中風口噤

不開延潮壅上皂角一挺去皮猪脂塗炙黃色為末每服一錢溫酒調下

氣壯者二錢以吐出風延為度 脾要濟衆方中風口喝 皂角五兩去皮為末三年大醋和之左喝

主吹之能起死

白蘿蔔死中

外一方水溺矣

宿者尚可活紙裏皂莢末納下 遊巡不救皂莢生研末每以少許點患處

人子金方

白蘿蔔

將死中

外一方水溺矣

部須臾出水即活 外一祕要

中暑不省

皂莢一兩燒存性甘草一兩微炒

鬼覺不睡

皂莢一兩燒存性甘草一兩微炒

或接水灌之亦良○直指方用皂角肉因喉腫痛牙皂一挺去皮米醋浸炙七次勿令大焦為

半截水醋半盞煎七分破出膿血即愈○喉腫痛末每次少許入咽吐涎即止

聖濟總錄

風癘諸癰

角牛斤去皮子以蜜四兩戴上

慢火炙透搗碎以熱水浸一時接取汁慢火熬成膏入麝香少許攤在灰綿紙上晒乾剪作紙花每用三四

片入淡漿水一小盞中洗淋下以筒吹汁入鼻內待痰涎流盡吃脂麻餅一箇涎盡即愈效

普濟方

風邪癰瘍

皂莢燒存性研末炒等分蜜汁入煉蜜丸杏仁十粒用蜜汁制杏仁麻油制巴

九乘湯下日二服稍退口服二十九名抵住丸 永類方

一切癰瘍

皂莢燒存性四兩

四兩蜜陀僧一兩為末成丸梧子大疎砂為衣每服三四十九乘湯下

水五升漫一夜接取汁慢熬至可丸丸如梧子大每食後鹽漿水下十九○又釣瘧膏

用半夏醋煮過以皂角膏和匀入明礬少許以柿餅搗膏丸如彈子噙之

聖惠方

欬逆上氣

研末密丸梧子大每服一丸蜜膏湯下

日三夜不服一服痰嗽長皂莢三條去皮子一莢入巴豆十粒一莢入杏仁十粒用蜜汁制杏仁麻油制巴

張仲景方 痰嗽 呕吐制半夏一處火多黃色為末每用一字安手心臨卧以蜜汁調之噙下神效

余居士選奇方

卒寒嗽

以蜜燒研豉湯服

皂莢燒研豉湯 噴布水雞鳴用肥皂莢兩挺酥失去肉為末密丸豆大膩滿復脹急皂莢去皮子炙黃為末酒一斗

二錢 千金方

每服一丸取微利為度不利更服一日一服

必奇方

月經不通宣明方鐵脚丸用皂莢去皮子為末酒一斗

墨和丸麻子大每服三丸食後陳橘皮湯下胸腹脹滿欲令瘦者猪牙皂角相續量長一尺微火煨去皮子擣篩塞大如梧子服時先

日三服隔一日增一丸以愈為度 經驗方胸腹脹滿喫羊肉兩瓣汁三兩口後以肉汁香藥丸以快利為度覺得力更服以利清水

即止藥瘥後一月不得食肉及

諸油膩

崔元亮海上集驗方 身面腫滿用皂莢去皮炙黃剉三升酒一斗清

時後方

卒熱勞疾 皂莢搗篩密丸梧子大每服一升一日三服

時後方

即止藥瘥後一月不得食肉及

諸油膩

崔元亮海上集驗方 身面腫滿用皂莢去皮炙黃剉三升酒一斗清

時後方

五丸漸增至二十九重者不急勞煩熱體瘦三重丸用皂莢皂莖皮皂莢刺各一斤同燒灰以水三斗淋汁再淋如此三五度煎遇兩劑愈崔元亮海上方急勞煩熱之候少凝入麝香末一分以童子小便浸蒸餅丸小豆大每空心溫水下七丸聖東方脚氣

腫痛皂角亦小豆為末酒醋調貼腫處水類方

傷寒初得

不問陰陽以皂角一挺肥者燒赤為末以水五合和頓服之陰病極效千金方時氣頭痛煩熱用皂角燒研新汲水一中盞姜汁蜜各

汗即愈卒病頭痛嚏皂角末吹鼻取嚏宣不上不姓皂角去皮子密火搗碎入水按取濃汁熬成膏繼鼻通皂角末吹之

聖惠平病頭痛嚏斗門方風寒不上嘴鼻口內咬定良久涎出為度張子和儒門事親鼻通皂角末吹之

濟方霍亂轉筋取嚏即安深師方月經下血用長尺皂角五挺入鼻孔吹之十挺以姜汁地黃汁

去子入鹽滿殼仍加白礬少許黃泥固濟煅研每日擦之甚効相誠經驗方風蟲牙痛十全方用猪牙皂角食鹽等分為末日指之揩牙烏鬚蘸火十遍為末日用揩牙甚妙

濟方霍亂轉筋取嚏即安深師方月經下血兩細切搗爛和丸倍大每溫水下二十九聖惠大腸脫肛不駐皂角五挺搗碎水投

後以湯溫其腰肚上下令皂角氣行則不再作仍以皂角炒焦水角去皮酥炙為末棗肉和丸米飲下三十九聖惠方下部瘡瘍導之時后方外腎偏瘡傳之良梅師方

末以熱醋調攤貼患處頻以水潤之即效又方用猪牙皂角便毒癰疽皂角一條醋熬膏傅婦人吹牙為末水服五錢袖珍方

七片煨黃去皮弦出火毒為末空心溫酒服五錢袖珍方便毒癰疽皂角去皮酥炙為末入麝香少許人

吹奶法如何皂角燒灰研粉和熟丁腫惡瘡黃少許和塗五日後根出普濟方小兒頭瘡粘肥及白秃用皂角燒黑為末去痂傅之

酒一盃調八字管教時刻笑呵呵丁腫惡瘡黃少許和塗五日後根出鄧肇峰衛生雜典

後咽喉骨哽縫滿線縛頂中立消簡便方魚骨哽咽喉聖惠方積年疥瘡猪肚內放皂角煮熟去

油搗爛塗之潘氏方疥瘡皂角食之袖珍方射工水毒生瘡皂角長尺二者苦酒一升煎汁熒如飴金之時

濟急仙方大風頭瘡入雪糕九棓子大每酒下五十丸直指方

子修治穀曰揀取圓滿堅硬不蛀者以瓶煮熟剝去硬皮一重氣味至溫無毒主治春寐皮以水浸軟煮熟清食之疏導五臟

方喉嚨骨哽長皂角二十條炙去皮子以酒煎稠濾過候冷

濟急仙方大風頭瘡入雪糕九棓子大每酒下五十丸直指方

風熱壅宗核中白肉入治肺藥核中黃心嚼食治膈痰吞酸

頌

仁和血潤腸

果治風熱大腸虛秘癰腫毒瘡

燒

珍發

時機曰

是角核燒

存性治大便燥

結其性得濕則滑滑則燥結自通也時珍曰皂莢味辛屬金能通大腸陽明燥金乃辛以潤之之義非得濕則滑也

附方

舊三新腰脚風

痛不能履地皂角子一千二百箇洗淨以少酥熬香為末

利水

風入虛人腳氣入大腸或

或下痢不止

諸藥不效服此三服宿垢去盡即變黃色屢驗皂角子丸

焙陽

利方

每服四五十丸陳茶下

醫方摘要

月風下血

槐實一

兩用皂角子米糠炒過枳殼炒等分為末

不駐皂角子米糠炒過枳殼炒等分為末

飯丸梧子大每米飲下三十丸

普濟方

小兒流涎

七次一錢二分為末姜汁九麻子大每

溫水下五丸

惡水入口及皂莢水入口

熱不止以皂莢子燒存

婦人難產

皂角子二枚吞

聖濟總錄

性一分沙糖半兩和膏含之

博濟方

婦人難產

之十全方

風蟲牙痛

熱更互煩之日三五度

聖惠方

粉滓面黑

皂角子杏仁等分研匀夜

以津和塗之

聖惠方

預免瘡癩

凡小兒每年六月六日照年歲吞皂莢子可免瘡癩之患大人

亦可吞七枚或二十一枚林靜齋所傳方也

吳昊扶壽方

便瘤初起

皂角子七箇研末水服效一方

照年歲吞之

儒門事親方

一切下脰

皂角子仁作末傅之

五年不癰

阮氏經驗方用不蛀皂角子一百粒米醋一升硇砂二錢同煮乾炒令酥看歷

千金方

年久癰

加子多少如一箇服一粒十箇服十粒細嚼水湯下酒浸食亦可服

○聖濟總錄

刺

一名氣味苦溫無毒至渠

酸敷擦刺作煎善瘡癩有奇效

蘇頌治癰腫瘻乳風癩瘻脂衣不下殺蟲

時發

楊士瀛曰皂莢刺能

焦病囊亨曰能引至癰疽潰瘍試驗時珍曰皂莢刺治風殺蟲功與茱萸同但其銳利直達病所為異耳神仙傳云左親騎軍崔吉一日得

大風惡疾雙目昏盲眉髮自落鼻孔崩潰勢不可救遇異人傳方用皂角刺三斤燒灰蒸一時久日乾為末食後濃煎大黃湯調一匕飲

之一旬眉髮再生肌潤目明後入山修道不知所終又劉守真保命集云瘧風乃營氣熱風寒客于脉而不去宜先用樟皮散服五七日

後灸承漿穴七壯三爻後每旦早服樟皮散午以升麻葛根湯下錢氏漏青丸晚服一聖散用大黃末半兩煎湯調皂角刺灰三錢乃緩

疎泄血中之風熱也仍戒房至三年樟皮散見樟皮下又追風再造散即一聖附方

新

十

小兒瘞

皂角刺灰入朴硝或腦子少許漱

口摻入舌下涎出自消

聖惠方小

散云服之便出瘞變為驗數日再服直候虫盡為絕根也新豐首亦老蟲暗黑附方二

小兒瘞

皂角刺灰入朴硝或腦子少許漱

口摻入舌下涎出自消

聖惠方小

便淋門 皂角刺燒存性破故紙等分易

便

前近腎肝便後心肺皂角刺灰二兩胡桃仁破故

傷風久不已而下痢濃

血

日數十度用皂角刺

枳實麸炒槐花生用各半兩為末蜜丸梧桐

子大每服三十九米湯下日二服

袖珍方

胎衣不下

皇角刺燒為末每服一錢

帶

一兩蛤粉一錢和

乳

汁結毒

紙炒槐花炒各一兩為末每服一錢米飲下

普濟方

傷風下痢

日數十度用皂角刺

枳實麸炒槐花生用各半兩為末蜜丸梧桐

子大每服三十九米湯下日二服

袖珍方

胎衣不下

皇角刺燒為末每服一錢

帶

一兩蛤粉一錢和

乳

汁結毒

紙炒槐花炒各一兩為末每服一錢米飲下

普濟方

傷風下痢

日數十度用皂角刺

產後乳汁不泄結毒者皂角刺蔓荆子各燒

存性等分為末每溫酒服一錢

袖珍方

胎衣不下

皇角刺燒為末每服一錢

帶

一兩蛤粉一錢和

乳

汁結毒

紙炒槐花炒各一兩為末每服一錢米飲下

普濟方

傷風下痢

日數十度用皂角刺

木皮根皮氣味辛溫無毒主治風熱痰氣

錢普燒灰酒服三錢嚼麥子三五粒

濟方

瘡瘍惡瘡

皇角刺燒存性研白及少

大風癘瘍

選奇方用黃芩末皂角刺灰各三錢研勻空心酒服取

其處如針刺為効

儒門事親

瘡瘍惡瘡

許為末傅之直指方

大風癘瘍

效散如血肢腫用針刺出水再服忌一切魚肉發風之物取

下蟲大小長短其色不一約一二升其病乃愈也

仁存方

瘡瘍

以水煎湯乘熱以物圍定生薑洗之燒乾使喫補氣丸藥

一服仰睡

婦人良方

葉

時附金黃葉

藏器曰生江南驛畔狀如皂莢高一二尺

錢珍

新肺風惡瘡

瘡瘍

黃芪炒黃氏人參枳殼炒甘草炙等分為末沸湯每服一

葉

時附金黃葉

湯浴去風瘡疥癬擇葉去衣垢沐髮令長

肥皂莢

綱目集

肥皂莢生高山中其樹高大葉如檣及皂莢葉五六月開白花結莢長三四寸狀如雲實之莢而肥厚多

和白麪及諸香作丸濕身面去垢而膚潤勝於皂莢也相感

志言肥皂莢水死金魚辟馬蠅變見之則不就亦物性然耳

莢氣味辛溫微毒

莢治瘧下痢便血瘡癩腫毒

時附方新腸風下血獨子肥皂莢燒存性一片為末

糊九成米飲下

普濟方

下痢禁口肥皂莢一枚以鹽

其內燒存性為末以

少許入白米粥內食

老人腎虛或因涼藥擦牙致痛用獨子肥皂莢以青鹽實之

頭耳諸瘡

眉癬

熱瘡並用肥皂莢燒存性一錢

即效乾坤生意

風瘡腫

燒存性研末掺之或入生樟腦十五文

衛生家寶方

頭耳諸瘡枯萎一分研勻香油調塗之摘去

小兒頭瘡因傷湯水成膿出水不止用肥皂燒存性入臘粉麻油調搽海上方

臘頭瘡不拘大人小兒用獨核肥皂去核填入沙糖入巴豆一枚扎定鹽泥包煨存性入檳榔輕粉五七分研勻香油調搽先以灰汁洗過溫水再洗拭乾乃搽一宿見效不須再

見效

川槿皮煎湯用肥皂去核及內

膜洗湯時時搽之

肥皂搗爛傅之

膜清湯時時搽之

楊起簡便方便毒初起甚效

簡便方

五葉頭瘡肥皂一箇燒存性香油

調搽即愈

攝生方

核氣味甘腥溫無毒主治除風氣時

珍

無患子

朱開澤

名桓拾本草

目

遺本草

目

脂珠

綱目

脂珠

綱目

鬼見愁

藏器曰

藏器回福惠字訛也崔豹古今注云昔有神巫曰瑤

取此木為器用以厭鬼魅故號曰無患人又訛為木患也時珍曰俗名為鬼見愁道家禳解方中用之緣此義也釋家

取為數珠故謂之菩提子與意以同名纂文言其木名盧鬼木山人呼為肥珠子油珠子因其質如肥油而子圓如珠也

集解

藏器曰無

患子高山

大樹也子黑如漆珠博物志云桓葉似櫟柳葉核堅正黑如鑿可作香纓及浣垢宗奭曰今釋子取為念珠以紫紅色小者佳入藥亦少

西洛亦有之時珍曰生高山中樹甚高大枝葉皆如椿特其葉對生五六月間白花結實大如彈丸狀如銀杏及苦棟子生青熟黃老則

文皺黃時肥如油蠟之形味平氣膾且硬其蒂下有二小子相粘承之實中一核堅黑似肥皂莢之核而正圓如珠殼中有仁如榛子仁

亦辛腫可炒食十月米實煮熟去核搗和麥麯或豆麯作濕藥去垢同於肥皂用洗真珠甚妙山海經云扶桑之山其木多桓郭璞注云

葉似柳皮黃不鑽子似棟着酒中飲之辟惡氣流之去垢核堅正黑即此也今武當山中所出

鬼見愁亦是樹莢之子其形正如刀豆子而色褐彼人亦以穿數珠別又是一物非無患也

鬼見愁

藏器曰

藏器曰

藏器曰

子皮即核外氣味微草有小臺主治燒去面黑喉瘻研納喉中立開又毒蟲戶

藏器附方

新牙齒腫痛肥珠子一兩大黃各一兩青鹽

附方半兩泥固燬研日用擦牙

普濟方

明目用橘子皮皂角胡蘿

葛蒲同槌碎漿水調作彈

頭良

子大母用泡湯洗

洗面去黑及黑良

日用洗面去垢及黑良

集簡方

子中仁氣寒平無毒主治燒之辟惡氣藏器燒食辟惡去口臭時附方

新牙齒腫痛肥珠子一兩大黃各一兩青鹽

附方半兩泥固燬研日用擦牙

普濟方

明目用橘子皮皂角胡蘿

葛蒲同槌碎漿水調作彈

頭良

子大母用泡湯洗

洗面去垢及黑良

日用洗面去垢及黑良

集簡方

樂華

本經下品

集解

別錄曰樂花生漢中川谷五月采恭曰此樹葉似木槿而薄細花黃似槐而稍長大子殼似酸漿其中有實如熟豌豆圓

黑堅硬堪為數珠者是也五月六月花可收南人以染黃甚鮮明又以療目亦爛頌曰今南方及汴中園圃間或有之

宗

興曰長安山中亦有之其子謂
樂子携至京都為數珠未見入藥

華氣味苦寒無毒之才曰決明為之便主曾漏出傷消目腫本經

無食子

唐本草

釋名亨開

炮灰

麻茶澤

珣曰波斯人每食以代果故番胡呼為沒石子梵書無與沒同音今人呼為靈石沒石轉傳訛矣

集解

恭曰無食子生西戎沙磧間樹似檉禹錫曰波段成式西

陽雜俎云無食子生波斯國呼為摩澤樹高六七丈圍八九尺葉似桃而長三月開花白色心微紅子圓如彈丸初青熟乃黃白蟲蝕成孔者入藥用其核一年生無食子一年生拔莖子大如指長三寸上有殷中仁如粟黃可取時珍曰按方輿志云大食國有樹一年生如栗子而長名曰蒲盧子可食次年則生麻茶澤即沒石子也間歲互生一根真產如此一統志云沒石子出大食諸番樹如樟實如中國茅栗

子修治

敷曰凡使勿犯銅鐵井被火驚用顆小無於米者妙

氣味苦溫無毒主涼白痢腸滑生肌肉

唐本草虛冷痢益血生精和營

神烏鬚髮治陰毒瘻燒灰用

李淳淨治陰瘻小兒瘻瘍滑不禁

馬發明

宋襄曰沒石子合他藥染製造墨家亦用之珣曰張仲景用治陰汗燒灰先以湯浴了布裹灰撲之甚良

附方

舊三血痢不止

新五

食石子一兩葛米飯及小豆大母

小兒久痢沒石子二箇研黃研末

食前米飲下五十九普濟方

作餽飮食之

宮氣方

瘻瘍下痢

熱即用飲下日一子母秋錄牙齒痛

綿裏無食子末一錢咬之

鼻面瘻

南方沒石子有孔者水磨成膏

涎出吐去

聖濟總錄

夜夜塗之甚妙危氏得效方

口鼻急瘻

沒石子末吹下部

即瘻十全方

大小口瘻

沒石子泡三分甘草一分研末捲之月內小兒生者少許

置乳上吹之入口即帶

聖惠方

足趾肉刺

無食子二枚肥皂莢一挺燒存性

不過三次

聖惠方

制法和傅之立效竒效方

訶黎勒

唐本草

釋名亨

時珍曰訶黎勒生交州愛州頃曰今嶺南皆有而廣州最盛樹似木棗花白子形似梔子

言天土持來也

集解

恭曰訶黎勒生交州愛州頃曰今嶺南皆有而廣州最盛樹似木棗皮肉相着七月八月實熟時采六路者佳嶺南異物志云廣川法性寺有

四五十株子極小而味不濃皆是六路每歲州貢只以此寺者寺有古井木根蘸水水味不鹹母子熟時有佳客至則院僧煎湯以延之

其法用新摘訶子五枚甘草一寸破之汲井水同煎色若新茶今其寺謂之乾明古寺尚在舊不猶有六七株南海風俗尚貴此湯然煎

之不必盡如昔時之法也。訶子未熟時，風飄墮者謂之隨風子，暴乾收之益小者佳，彼人尤珍貴之。薦炳曰：波斯舶上來者六路黑色肉厚者良，八路即六棱也。穀曰：凡使勿用。訶黎勒个个蛇頭也。若訶黎勒文口有六路或多或少，並是雜路勒皆圓而露文，或八路至十三路號曰柳精。

修治數曰：凡用訶黎勒酒蒸後浸一伏時，無毒。勒瀆不堪用。治方削去皮取肉剉焙用，核則去肉剉焙用。曰：苦酸平甘炳曰：苦酸。珣曰：酸澀溫好古。

曰：苦酸平苦重酸，輕味厚陰也。降也。

王安氣心腹脹滿下食

唐本石破膈結氣通利濃液止水道黑囊變軟下宿物止腸澼又洩赤白痢

蕭炳消痰下氣化食胃除煩治水調中止嘔吐霍亂腹瀆

痛瘡腎氣肺氣喘急五臟氣陽風濁虛崩中帶下懷孕濕胎胎動欲生腹悶氣喘甚，惡病入肛門，急瘡產婦陰痛和蠟燭烟熏

之及煎湯熏洗大治瘴嗽咽喉不利含三數枚殊勝

魚肚實大腸欬肺降火

寒發明

宗奭曰：訶黎勒氣虛人亦宜緩緩煨熟少服。此物雖溫陽而又泄氣，其味苦澀故爾。果曰：肺苦氣上逆，急食苦以泄之，以酸補之。訶子苦重澀氣酸輕不能補肺，故嗽藥中不用。震亨曰：訶子下氣以其殊苦而性急，肺苦急急食苦以澀之謂降而下走也。氣實者宜之，若氣虛者似難輕服。又治肺氣因火傷極，遂一遇脹滿，其味酸苦有收斂降火之功也。時珍曰：訶子同烏梅五倍子用，則收斂同橘皮厚朴用，則下氣同人參用，則能補肺治咳嗽東垣云：嗽藥不用者非矣，但嗽未久者不可驟用。兩粒含草木狀言作飲久服，令髮白者變黑亦可取其澀也。珣曰：訶黎皮主嗽內主眼澀痛，波斯人將訶黎勒大腹等在船上用，防不虞或遇大魚放涎滑水中，數里船不能通，乃煮此洗其涎滑尋化為水，則其治氣消痰功力可知矣。○慎微曰：金光明經言流水長者除病品云：熱病下藥服訶黎勒又廣異記云：高仙芝在大食國得訶黎勒長三寸置抹肚下，便覺腹中痛因大病十餘行，疑訶黎勒為祟，後問火食長老云：此物人帶一切病，消利者乃出惡物爾。仙芝寶之後被誅失所在。頌曰：訶黎主痢。唐本草不載。張仲景治氣痢有方。唐劉禹錫傳信方，亨曾苦亦白下，諸藥服遍久不瘥，轉為白膿，令狐將軍傳此方用訶黎勒三枚，兩泡一生並取皮末之以沸漿水一合服之。若水痢加一錢，七甘草末，若微有膿血，加三七血多亦加三七。

附方新六卒氣消食

訶黎一枚為末，瓦器中水一大升煎三兩，沸下藥

更煎三五沸，如題麪色入少鹽飲之。食醫心鏡

之至明嚼嚥。又方訶黎三枚，濕紙包煨熟，取核細嚼以牛乳下。

千金方氣嗽身

湯一盃服立便有味。此知連州成密方也。經驗方

口喫不食

湯服二十九日二服。廣濟方

風痰霍亂

食不消大便滯訶黎三枚取皮為末，和酒頓服三五次妙。

外臺秘要

小兒霍亂

訶黎一枚為末，沸湯服一錢，半未再服。子母秋錄

小兒風痰

壅閉語言不出，氣促喘悶手足搐動。訶子半生半炮去核，大腹皮等分水煎服，名二

聖散全風熱衝冒熱訶藜二枚為末芒消一錢同入氣痢水鴻訶藜勒十枚麪裹燒火煨熟去核研末粥飲頓服亦可飯丸服一加
幼心鑑

風熱衝冒

醋中搗令消磨至熟處

外臺秘要

氣痢水鴻

訶藜勒十枚麪裹燒火煨熟去核研末粥飲頓服亦可飯丸服一加

幼心鑑

風熱衝冒

醋中搗令消磨至熟處

外臺秘要

氣痢水鴻

訶藜勒十枚麪裹燒火煨熟去核研末粥飲頓服亦可飯丸服一加

幼心鑑

風熱衝冒

子每服一
三十九白湯

水瀉下痢

訶藜勒炮一分肉豆蔻一分為

末米飲每服二錢

聖黃方

下痢轉白

訶藜十二箇二炮

一生為末沸湯調

水瀉加甘草末一錢

普濟方

赤白痢

生六煨去核焙

大訶藜燒灰入麝香少許先以米泔水洗後搽之或以荆芥黃檗甘草馬鞭草葱

湯下不過再服

趙原陽濟急方

為末赤痢生甘草湯下白痢炙甘草

湯下不遇再服

趙原陽濟急方

焰精下疳

大訶藜燒灰入麝香少許先以米泔水洗後搽之或以荆芥黃檗甘草馬鞭草葱

白煎湯洗亦可昔方士周守真醫廣清爛至一二寸用此取效也

洪邁夷堅志

核王治磨皂角

注皂角氣赤痛

神良

蘇止效及痢

時珍

上效及痢

時珍

葉毒草下氣消痰止渴及痘癰

煎飲服功同訶藜

時珍

李吏部惠訶藜勒葉詩

宋開釋名婆羅得

宋開釋名婆羅得

生西法波斯國樹似中華柳樹子如華麻子方家多用之時珍

婆羅得

宋開釋名婆羅得

時珍曰婆羅得生西法波斯國樹似中華柳樹子如華麻子但以指甲爪之即有汁出即此物也

楚言重生果也

集解曰按王禹外臺秋要婆羅得似華麻子但以指甲爪之即有汁出即此物也

新

婆羅勒十顆去皮取汁熊脂二兩白馬鬃膏

器附方

一

一

一

一

一

一

子氣味辛溫無毒主治冷氣塊

溫中補腰腎破痃癖

奇染髮

黑

藏器附方

新

婆羅勒十顆去皮取汁熊脂二兩白馬鬃膏

器附方

一

一

一

一

一

一

煎母拔白點之指令人肉即生黑者

此嚴中丞所用方也

孟說近效方

櫟

別錄卷之

櫟柳衍

時珍曰其樹高舉其木如柳故名山人訛為鬼

下品

櫟柳

郭璞註爾雅作拒柳云似柳皮可煮食也

集解

弘景曰櫟樹山中處處有之皮似檀槐葉如櫟樹人多識之

義

郭璞註爾雅作拒柳云似柳皮可煮食也

新

櫟樹山中處處有之皮似檀槐葉如櫟樹人多識之

別

高數仞皮極粗厚殊不似檀

宗興曰櫟木今人呼為櫟柳其葉謂柳非柳謂槐非槐最高者木高五六丈合二三人抱湖南北甚多然亦

不材也不堪為器嫩皮取以繩栲栳及其晉時珍曰

櫟材紅紫作相葉之類甚佳鄭樵通志云櫟乃榆須而枝烈其實亦如榆錢之狀鄉

人采其葉

人采其葉

木皮修治

數日凡使勿用三四年者無力用二十年以來者心空其樹口有

半邊向西生者良剗下去粗皮細剗蒸之從已至未出培乾用

氣味苦寒無毒主治時行頭痛熱結在腸胃

利

木部

煎飲去熱

弘景俗用煮汁服療水氣斷病根能止妊娠腹痛山櫻皮性平治熱毒風燭腫毒

蘇子根五寸水一升煮一升頓服當下盡出

梁州櫻皮二十分失犀角十二分水三升

升新四通身腫

櫻樹皮煮汁日

舊方

聖惠方

聖濟總錄

新方

聖惠方

古今錄驗方

攻腹

手足腫痛櫻樹皮和槲皮煮汁煎如蠶毒下血

欒皮一尺蘆根五寸水一升煮

千金方

小兒痢疾

梁州櫻皮二十分失犀角十二分水三升

飛胬赤眼

欒皮去粗皮切二兩古錢七丈水一升半煎七合去滓洗日二次

聖濟總錄

葉氣味苦冷無毒主治

按貼火爛瘡有效蘇子治腫爛惡瘡並搗敷之

大明

柳

本經

葉名小楊

說弘景曰柳即今水楊柳也

木本

柳以柳為水楊

非藏器曰江東人通名楊柳

北人不言楊楊

樹枝葉

短柳

葉長時珍曰

楊枝硬而楊

起故謂

之楊柳枝弱而垂流故謂之柳

蓋一類二種也

蘇恭所說

是按說文

云楊浦柳也

從木易聲柳

小楊也

從木弌聲易音陽

音西又爾

雅云楊浦柳也

旅澤柳也

櫟河柳也

觀此則楊可稱柳柳亦可稱楊楊可稱柳余宗本種樹書言順掉為柳倒掉為楊其說

韋強且夫楊起之意宗興曰

張昇別錄曰柳華生琅邪川澤頃曰

今處處有之俗所謂楊柳者也

其類非一浦柳即水楊也

枝勁韌可為

釋家謂柳為尼俱律陀木

箭等多生河北杞柳生水旁葉粗而白木理微亦可為車轂

令人收其細條火逼令柔屈作箱匣孟子

所謂杞柳為枯棬者魯地及河朔尤多櫻柳見本條時珍曰楊柳縱橫倒順揀之皆生春初生柔荑即開黃蕊花至春晚葉長成後花中

結細黑子落而葉出如白絨因風而飛子着衣物能生蟲入池沼即化為浮萍古者春取榆柳之火陶朱公言種柳千樹可足柴炭其

嫩芽可

作飲湯

柳華

釋名柳絮

本經正誤

見氣味苦寒無毒主治風水黃疸面赤黑

經研末

惡瘡瘍瘍實主清癰逐膿孚汗療渴

別名華

治濕瘍肢痙急腰痛

穎發明

弘景曰柳華熟時隨風狀如飛雪常用其末舒時著子亦隨花飛止應水漬汁爾藏器曰本經以柳絮

小兒卧尤佳宗興曰柳花黃蕊乾時絮方出收之貼灸瘡良藥之下連小兒子因風而起得水濕便生如苦買地丁之花落結子成絮古

人以絮為花謂花如雪者皆誤矣藏器之說為是又有實及子汁之文諸家不解今人亦不見用時珍曰本經主治風水黃疸者柳花也

別錄主治瘡金瘻潰瘍逐臘血藥性論止血療瘡者柳絮及實也花乃嫩蕊可搗汁服子與絮連難以分別惟可貼瘡止血方
竇瘞之用所謂子汁療渴者則連絮浸清研汁服之爾又崔寔四民月令二月三日及上除日采絮愈疾則入藥多用絮也附方六

無器血

柳絮焙研米飲服一錢 經驗方

金瘻丹

柳絮封之即止外臺秘要 盒調塗普濟方

走馬丹

楊花燒存性入麝香油調塗少許搽保幼大全大風瘻瘍楊花四兩搗成餅貼

壁上待乾取下水浸一時取起瓦焙研末二兩白花蛇烏蛇各一條去頭尾酒浸取肉全蠍蟻蛇酥雄黃各五錢苦參天麻各一兩為末水煎麻黃取汁熬膏和丸梧子大珠砂為衣每服五十丸溫酒下一日三服以愈為度

孫氏集效良方 腳多汗濕楊花着鞋及襪

內穿之 摘玄

葉紫味

同王治瘡瘍瘻瘍馬前煮洗之立愈又療心腹內血止痛別煎水洗漆瘡引行熱病傳尸骨蒸勞下水氣煎膏續

景頤曰柳葉煎湯代茶

筋骨蟲止痛

王治瘡瘍金石入發大熱悶渴火瘡毒入腹熱悶及丁瘡日療白濁解丹毒時舊一小便白濁

清明柳葉煎湯代茶

丹頃

柳葉一斤水一斗煮取汁三升搗洗亦處日七八度子母秋錄

時新五小便白濁

珍附方

以愈為度

集簡方

方

小兒

不可名識者柳葉或皮水煮

時後方

聖惠方

卒得惡瘡

汁入少鹽頻洗之

附方

面上惡瘡

同

痘癰生蛆

嫩柳葉鋪席上卧之蛆盡出而愈也 李樓奇方

枝及根白皮

王治瘡瘍熱溼可為浴湯洗風腫瘡痒煮酒漱齒同恭小兒一日五日寒熱煎枝冷之器煎服治瘡

蘇頌曰柳枝皮及根亦入藥葛洪肘後方治癰疽腫毒奶奶乳等多用之韋苗獨行方主丁瘡

疽癰

時發明頌曰柳枝皮及根亦入藥葛洪肘後方治癰疽腫毒奶奶乳等多用之韋苗獨行方主丁瘡

及反花瘡並煎柳枝葉作膏塗之令人作浴湯膏藥牙齒藥亦用其枝為最要之藥時珍

柳枝去風消腫止痛

其妙附方舊十黃疸初起柳枝煮濃汁半升煎服

不思飲食食下不化病似翻胃嘔膈清明日取柳枝一大把

嫩枝割

為牙杖擦齒甚妙附方新八黃疸初起頓服

柳枝煮濃汁半升煎服

外臺秘要脾胃虛弱

敷湯煮小米作飯酒麯滾成珠子晒乾密懸風處每用燒滾

水隨意下米米沉住火少時米浮取看無硬心則熟可

頓食之久則鬆散不粘矣名曰絡索米

楊起簡便方走注氣痛

氣痛之病勿有一處如打撲之狀不可忍走注不定靜時其處冷如霜

水隨意下米米沉住火少時米浮取看無硬心則熟可

頓食之久則鬆散不粘矣名曰絡索米

楊起簡便方走注氣痛

氣痛之病勿有一處如打撲之狀不可忍走注不定靜時其處冷如霜

凡諸卒腫急痛熨之皆即止
姚增坦集驗方
飲 范 酒
酒月橘 椴枝桑枝煎水熬膏入薑汁細辛芍藥末用擦牙
汪方 炒豆 煎器皿之清酒三升漬三日
日頻含漱涎三日愈 古今錄驗
揭火溫帛裹之冷更易一宿消
時後方 反花 民瘡
升煎汁二升熱如鵝日三盞之

燥即易之 斗門方 滾瘡腫痛
初起堅紫眾療 楊柳白皮卷如指大含咀以汁漬齒根數
揭火溫帛裹之冷更易一宿消
時後方 反花 民瘡
升煎汁二升熱如鵝日三盞之

易一宿消
時後方 痘瘡
方公之覺熱氣入腸大下血穢至痛一頓遂消馳馬而去

本事方

柳膠

時

柳寄生

木類

柳耳

見菜部

柳蠹

見蟲部

檉柳

音債

釋名 檉日赤楊 古今注 河柳爾雨師詩垂絲柳目人柳

綱

目

三眼柳

衍

觀柳

時珍曰

按羅願爾雅翼云天之將雨

乃木之聖者也故字從聖又名雨師或曰得雨則垂垂如絲當作雨絲又三輔故事云漢武帝苑中有柳狀如人號曰人柳一日三起三眠則檉柳之聖又不獨知雨負雪而已今俗稱長壽仙人柳亦曰觀音柳謂觀音用此洒水也崇禿曰令人謂之三春柳以其一年三秀

名 改草角志言赤楊木生河西沙地皮赤色葉萬錫曰爾雅檉柳也郭璞注云今河旁赤草小楊也陸機詩疏云生水旁度赤如絳枝葉如松時珍曰檉柳小幹弱枝挿之易生赤皮細葉如絲婀娜可愛一年三次作花花穗長三四寸水紅色如蓼花色南齊時益

州獻蜀柳條長狀若絲縷者即此柳也段成式酉陽雜俎言涼州有赤白禮大者為炭其灰汁可以煮銅故沈炯賦云
禮似柏而赤王禎農書云山柳赤而脆河柳白而明則稊又有白色者也宗奭曰汴京甚多河西或人取滑枝為鞭

木氣昏鹹溫無毒治驢馬蛇肉毒聚片火燭之并煮汁浸之實枝葉酒燭解酒毒利小便時

附新舊方開新舊方觀音柳

一夜五更空心飲數次
店自消衛生易簡方一
切諸風不問近遠稊葉半斤切枝亦可荆芥半斤水五升煮一升澄清入白蜜五合竹

酒致病長壽仙人柳
晒乾為末母

服一錢溫酒調下
衛生易簡方
一錢溫酒調下

稊乳

即脂

主治合質汗藥治金瘡

開

水楊

唐本草
釋名楊綱
目蒲柳爾雅
音蒲楊古今
注蒲移柳注
移柳

古今韻音
音蒲
古今韻音
音蒲

音九

蒲時珍曰楊枝硬而楊起故謂之楊多

集解

然只水楊葉圓

闊而尖枝條短

硬與柳全別

柳葉狹長枝條長

軟頌曰爾雅
楊柳也其枝勁韌可為箭詩左傳所謂董澤之蒲又謂之蘆苻今河北沙地多生之楊柳

之類亦多崔豹古今注云白楊葉圓青楊葉長柳葉長而細移楊葉圓而弱水楊即蒲柳亦曰蒲楊葉似青楊葉可作夭亦楊宿降則葉
亦材理亦赤然令人鮮能分別機曰蘇軾說水楊葉圓潤崔豹說蒲楊似青楊青楊葉長似不相

類時珍曰按陸機詩疏云蒲柳有二種一種皮正青一種皮正白可為夭北土尤多花與柳同

枝葉氣味

草無毒主癰腫刺赤

搗汁一升服曰二天效

唐本草

主癰腫

痘毒

時珍曰

水楊根治癰腫故

近人用枝葉治痘

或風寒所阻者宜用水楊枝葉無葉用枝五斤流水一大盆煎湯溫浴之如冷添湯良久照月疊起有疊絲者煑行也如不滿再浴之力
弱者只洗頭面手足如屢浴不起者臥血敗矣不可再浴始出及痒瘡者皆不可浴痕不行藥不行漿乃氣溢血滯腠理固密或風寒外阻而然
浴令暖氣透達和暢散蒸氣血通徹每隨暖氣而發行漿貫滿功非淺也若內服助氣血藥藉此生之其效更速風寒亦不得而阻之矣
直見一嫗在村中用此有驗叩得其方行之百發百中慎勿易之誠有療理之妙也蓋黃鐘一動而蟄蟲啟戶東風一吹而堅冰解腹同
一春也羣書皆無

此法故詳著之

木白皮及根

氣味同主治金瘡癰乳癰諸腫痘瘡

時發明時珍白按仲南永類鈴方云有人治乳癰持藥一根生搗貼

治乳癰用柳根則楊與

新方楊木白皮熬燥研末水服方寸

柳性氣不遠可通用也附方一金瘡瘍仍傳之日二次千金方

白楊

唐本草釋名獨搖

宗夷曰本身似楊微白故曰白楊非如粉之白也時珍曰鄭樵通志言白楊一

集解本草曰白楊取葉圓大蒂小無酸冷風自動者械器曰白楊北土

極多人種墟墓間樹大皮白其無風自動者乃楊非白楊也頌曰今處處有之北土尤多株甚高大葉圓如梨葉皮白色木似楊米無時崔豹古今注云白楊葉圓青楊葉長是也宗夷曰陝西甚多承耀間居人修蓋多此木也其根不時碎札入土即生根故易繁植土地所宜爾風縋至葉如大雨聲謂無風自動則無此事但風微時其葉孤絕處則往往獨搖以其葉長葉重大勢便然也時珍曰白楊木高大葉圓似梨而肥大有尖齒青而光背甚白色有鋸齒木肌細白性堅直用為梁拱終不撓曲與楊柳乃一類二種也治病之功大抵彷彿嫩葉亦可救荒

老葉可作酒麯料

木皮

修治戰凡使銅刀刮去粗皮蒸之從已

氣味苦寒無毒大明日

主治風脚氣腫四肢緩弱不隨毒蟲游易在皮膚中癩癬

至未以布袋盛掛屋東角待乾用

酸冷

等酒漬服之

唐本草氣血折傷癰癧在膏肉間痛不可忍及皮膚風瘡腫癰惡為湯浸搗處

器治搗搗瘀血並酒服煎膏可續筋

骨大明剪湯日飲李烈醋含漱止牙痛敷水入鹽噙漱治口瘡煎水煎酒消癰氣

時珍曰舊方新一方妊娠下痢白楊皮一斤水一斗煮取

項下癰氣林米三斗次熱取圓葉白楊皮十兩勿令見風切水五升煮取二升清翅末五兩如常釀酒母旦一盞日再服崔氏方

枝主治腹痛治瘡時珍二口吻爛瘡白楊嫩枝鐵上燒灰和腹滿癰堅

如石積年不損者必效方用白楊木東枝去粗皮研風細剉五升熬黃以酒五升淋訖用絹袋盛滓還納

酒中密封再宿每服一外臺秘要方寸七日三服五十日面及手足皆白

聖濟總錄

葉主治鷦鷯箭水含漱之治骨疽發腫從中出頻搗傅之珍時

時

扶移

音夫移釋名移易古今唐宋兩雅高飛崔豹曰移楊江東呼烏夫移圓葉
○拾遺釋名移木注唐棟雅獨搖猶弱弱微風則大搖故名高飛又曰獨搖機以唐棟為郁李者誤矣郁李乃常棣非唐

樹集解楊與白楊是同類一種今南人通呼為白楊故俚人有白楊葉有風掣無風掣之語其入藥之功大抵相近也

木皮氣味草有小毒主治去風血脚氣痘瘡損瘍血癥不忍取白皮火炙酒浸服之和五木皮煮湯搗腳氣痘瘡燒

作灰置酒中味正經時不敗器發明

時珍曰白楊移楊皮並入五木皮煮湯浸搗損瘍附方諸痛腫所謂五木者桑槐桃楮柳也並去風和血附方

新婦人白崩

扶楊皮半斤牡丹皮四兩升麻桂枝各一兩每用一兩

酒二鍾煎二鍾食

前服集簡方

松楊

拾遺注

併入唐本釋名松木音涼時珍曰其材如松其身如楊故名松楊爾雅云棕即來也其

集解

藏器曰松楊生江南檣落間

草棕色木釋名松木陰可蔭涼故曰棕木藏器曰江西人呼為涼木松楊縣以此得名

集解

大樹葉如梨志曰棕子木葉

木氣味草無毒主治折傷破惡並養好血安胎止痛毒

唐本

木皮氣味草無毒主治采痢不問冷熱濃煎令熏服一升器

藏器

榆

俞由二音釋名榆木本經

榆木

今之榆樹取皮刮去上赤皮亦可臨時用之性至滑利初生莢仁以作療羹令人多睡極康所謂榆令人瞑也恭曰榆三月實熟尋即落矣今云八月采實恐誤也藏器曰江東無大榆有刺榆秋實故經云八月采者誤也刺榆皮不滑利頌曰榆處處有之三月生莢古人采

仁以糜羹今無復食者惟用陳老實作醬耳按爾雅疏云榆類有數十種葉皆相似但皮及木理有異耳刺榆有鍼刺如柘其葉如榆
為蔬羹滑於白榆即爾雅所謂樞葦詩經所謂山有樞是也白榆先生葉却有英皮白色二月剥皮刮去粗韻中極滑白即爾雅所謂榆
白粉是也元成農人取皮為粉食之當根不損人四月采實宗廟曰榆皮初春先生英者是也嫩時收貯為羹如嘉祐中豐沛人缺食多
用之時珍曰邢昺爾雅疏云榆有數十種令人不能盡別惟知莢榆白榆刺榆棚榆數者而已莢榆白榆皆大榆也有赤白二種白者名
榆其木甚高大未生葉時枝條間先生榆莢形狀似錢而小色白成串俗呼榆錢後方生葉似山茱萸葉而長尖縮潤澤嫩葉燒浸淘過
可食故內則云莢榆白榆莢榆嫩葉燒浸淘過晒乾可為醬即榆仁醬也崔實月令謂之蕎榆
音半榆者是也山榆之莢名蕎蕎與此相近但味稍苦耳諸榆性皆扇地故其下五穀不植古人春取榆火今人米
其白皮為榆髓水調和香劇粘滑勝於膠漆承曰榆皮濕搗如糊用粘瓦石極有力汁洛人以石為碓啗用此膠之

白皮氣香平滑利無毒主矣小便不通利水道除邪疫眼斷穀輕身不饑其實食

本經

瘡腸胃邪熱消渴小兒頭瘡

瘡死錄通經脉搗涎傳癰瘡明滑胎利五淋治齁喘療失眠

甄皮搗和三年醋淬封暴患赤腫女茹乳腫旦夕七易效

孟利竊漏

熱行津液消癰瘡時發明

詒

曰高昌人多擣白皮為末和茱萸食甚美令人能食仙家長服服丹石人亦服之取利關節故也時珍曰

榆皮榆葉性皆滑利下降手足太陽手陽明經是也故人小便不通五淋脾滿喘嗽不眠經肺胎產諸證宜

之本草十劑云滑可去著久勞子榆白皮之虛益亦取其利致滑濕熱消留者有形之物爾氣感而壅者宜之

附方新九陰散不食榆皮

若胃寒而虛者久服滑利恐洩真氣本經所謂久服輕身不饑蘇頌所謂榆粉多食不損人者恐非確論也

許明則有效方用厚榆皮削如指大長尺餘

榆皮

為末日服數合鈞喘不止榆白皮陰乾焙為末每旦夜用水五合不二錢煎加膠服食療本草

五合水一錢煎加膠服

普濟方

小便氣淋榆枝石燕子煎水

五合水煎加膠日二服

普濟方

五淋澀痛

榆白皮陰乾焙研每以一錢水煎服

古今錄驗

虛勞

榆白皮陰乾焙研每以一錢水煎服

普濟方

小便氣淋

榆白皮末同米作粥食

之甚效

外臺秘要

榆皮搗末同米作粥食

之小便良

備急方

臨臍易產

榆皮搗為末臨月日三服方寸土

令產極易

陳本本草別說

墮胎下血

不

止榆白皮當歸各半兩

水煎服之

普濟方

胎死腹中

榆白皮嚼水灌入

或母病欲下胎稱白皮煮汁服二升

子母秘錄

身首瘡

榆白皮末油和蜜之

蟲當出

子母秘錄

千金體

榆白皮嚼水灌入

小兒瘡

榆皮末和豬脂塗面覆之蟲出立瘥

十全方

產乳方

榆白皮切清水洗搗爛和香油傅之留頭出氣燥則以苦茶煩潤不

移更換新者將愈以桑葉嘴嚼隨大小貼之口合乃止神效 救急方

小兒瘻瘍 榆白皮生搗如泥封之頓

榆白皮生搗

易必小兒瘻瘍 醋和榆白皮末涂之

葉

味同主

嫩葉作羹及燒食消水腫利小便下石淋屬

石

藏器時珍曰暴乾為末淡鹽水拌或

天或晒乾拌菜食之亦辛滑下水氣

煎汁洗酒皁鼻酸癢等

疾

藏器時珍曰暴乾為末淡鹽水拌或

天或晒乾拌菜食之亦辛滑下水氣

煎汁洗酒皀鼻酸癢等

疾

藏器時珍曰暴乾為末淡鹽水拌或

天或晒乾拌菜食之亦辛滑下水氣

分蜜丸服治膽熱虛勞眼

時

分蜜丸

時珍曰服治膽熱虛勞眼時

花

治小兒癩小便不利傷熱

別錄

英仁

氣味微辛無毒主治

壅食令多睡

弘景主婦人帶下和牛肉作羹食之

藏器子醬似無美能助肺殺諸蟲下寒人能

食消腹間惡氣卒心痛盜瘧癱以陳耆良

孟試

榆耳

見木

棚榆

拾集解

藏器曰棚榆生山中狀如榆其皮有滑汁秋生莢如

大榆時珍曰大榆二月生莢棚榆八月生莢可分別

皮

氣味甘寒無毒主涼熱

利水道令人睡

藏器治小兒解癩

時珍

蕪荑

別錄解名是荑爾

味甘無毒主涼熱

音庚唐本草音庚

木名梗又云蕪荑

殺蟲此物乃蓬樹之荑故名也恭曰蓬虆乃蓬虆二字之誤

集解

別錄曰蕪荑主

山川谷三月采實陰乾

弘景曰今惟出高麗狀如榆莢氣臭如豕被人皆以作薺食之性殺蟲置物中亦辟蛀但

集解患其臭甚今延州同州甚好之曰河東河西處處有之頃曰近道亦有之以太原者良大抵榆類而差小其實亦早成此榆乃

大氣臭氣璞爾雅注云無姑榆也生山中葉圓而厚剥取皮合滑之其味辛香所謂無美也米實陰乾用今人又多取作屑以芼五味惟陳者良人收藏之多以鹽漬則失氣味但宜食品不堪入藥司曰按廣州記云生大秦國是波斯無美也械器曰無美氣瘤者良乃山榆仁也時珍曰蕪荑有大小兩種小者即榆莢也採取仁醞為醬味尤辛人多以外物相和不可不擇去之入藥皆用大蕪荑別有種尤辛人多以外物相和不可不擇去之入藥皆用大蕪荑別有種尤辛人多以外物相和不可不擇去之入藥皆用大蕪荑別有種尤辛人多以外物相和不可不擇去之入藥皆用大蕪荑別有種

王治內邪氣散瘡骨節中溼溫行毒去蟲化食

本經逐子白散腸中溫喝喘息別名積慈腹癰痛除肌膚節中風溼淫如蟲行

蜀五月度膚肢節和蕪荑食治五痔殺中惡蟲毒諸病不生孟詵治腸風痔瘻瘧瘻疥癬大殺蟲止痛治婦子宮風虛逐子母瀉冷

痢得訶子最良李珣和豬脂擦熱瘻和蜜治濕癬和沙牛酪或馬酪治一切瘻

張仲景三新七脾胃有蟲食即作痛面黃無色以石州蕪荑仁二兩和麴炒黃色為

末非時米飲服二升殺諸蟲生蕪荑生橘柳各四兩為末蒸餅丸梧

錢七千金方制殺諸蟲子大每服二十丸白湯下本事方宿熱有蟲

加入盃內飯上蒸之一日蒸一次凡蒸乃入麝香半錢湯

浸蒸餅和凡綠豆大每服五七丸至一二十九丸米飲下錢氏小兒直訣

小兒蟲癩存性等分為末米飲調服一字至一錢杜士方結墮血

未以雄豬膽汁丸梧子大母

服九丸甘草湯下日五服三日斷根普濟方脾胃氣泄久患不止蕪荑五兩搗末飯丸梧子大每日空心午飯前陳米飲下二十

勞脫急宜下氣用蕪荑搗燒去油丸入服去三戠益神駐顏此方得之章錄曾用得力王紹顏續傳信方月脫氣急和食鹽末等分以

綿裹如棗大納下部或下惡汁並下氣佳外臺秘要

嬰孩驚瘲膽汁打糊丸泰米大每服十九丸通湯下黃連能去心竅惡血全幼心鑑蟲弄作痛安蛇孔中

及縫中甚效危氏得效方腹中鼈瘻蟲之行上侵人咽下蝕人肝或附腸背或隱胸腹大則如鼈小或如錢治法惟用蕪荑煎服之兼用賈胃益

血理中之類乃可殺之若徒事虛火

錫灰之類無益也

仁齋直指方

蘇方木

唐不羣

蘇木時珍曰海島有蘇方國其地產木

集解

茶曰蘇方木自南海島來而交州愛州亦有之樹似荅羅葉若楠葉而

此木故名今人省呼為蘇木時珍曰蘇方木前人謂其花黑子如紫石英色曰蘇木而其花黃子青黑具木人用染絳色司曰按徐表南州記

云生海畔葉似絳木若女貞時珍曰按松含南方草木狀云蘇方樹類槐黃花黑子出九真煎汁忌鐵器則色黯其木蠹之實名曰紫納亦可用暹羅國人賤用如新拌細梅樹枝蒸之氣味甘鹹平無毒某曰甘鹹涼可升可降陽中陰也

從已至申陰乾用

好古曰味甘而微酸平其性平

主治破癰瘍脹悶

脹悶欲死者煮至五兩取濃汁服

本婦人血氣心

修治戰曰凡使去上粗皮并節若得中心文橫加緊

腹痛月候不調及暴勞掛腰止痛消癰腫撲損瘀血失音嘔血白刺井後分急痛

大虛勞血癆乘虛瀉產後惡露不安心腹攢痛

及經絡不通男女中風口噤不語暨細研乳頭杏仁七枚酒煎蘇方木調服立吐惡物瘥

海

霍亂嘔逆及人嘔吐用水煎服

月經

破瘡湯死血產後敗血

李

發明元素曰蘇木性涼味微辛發散表裏風氣且與防風同用又能破死血產後血腫

果

是發明脈滿欲死者宜之時珍曰蘇方木乃三陰經血分藥少用則和血多用則破血

附方

新五產後血腫方

木三兩水五升產後喘面黑欲死乃血入肺也用蘇木二兩水二碗煮一椀煎取二升分服

產後氣喘

入人參末一兩服隨時加減神效不可言

胡氏方

破傷風病

故名獨聖散

普濟方

脚氣腫滿

蘇方木爲散三錢酒服

立

細剉入定粉少許水二斗煎一偏墜腫滿蘇方木二兩好酒一壺煮

外

斗五升先煎後洗普劑方偏墜腫滿熟煩飲之好

集簡方

金瘡接指凡指斷及刀斧傷用真蘇木末敷之外

烏木

綱目稱烏櫟木漫

烏文木

時珍曰木名文木南

人呼文如橘故也

集解

時珍曰烏木出海南雲南南喬葉似櫟樹其木黑漆體重堅緻可為筋及器

八尺其色正黑如水牛角作馬鞭日南有之古今注云烏文本

集解者嫩木也南人多以繫木染色偽之南方草木狀云文木樹高七

八尺其色正黑如水牛角作馬鞭日南有之古今注云烏文本

氣味甘鹹平無毒

主治解毒主霍亂吐利脣研末溫酒服

時珍曰

梓木

宋開寶

釋名

櫟木

畫工

以皮燒烟熏紙作古畫字故名櫟俗省作梓字也

其木色黃有小斑點紅色能收肥膩其皮厚而輕虛軟柔皮匠家用

觀鞋裏及為刀鞘之類謂之暖皮胡人尤重之以及春蠶可作燭照

木皮氣味苦無毒主治諸黃痘濃毒飲之良

開寶

煮汁冷飲主傷寒時行熱毒瘡特良即或豆瘡也

藏燒灰龕藥治肺瘡

宗治乳癰時甚一乳癰發腫痛結硬欲破一服即瘥以北來真樟皮燒存性研無火燒灰酒溫服方寸匕即卧覺即瘥也沈存中靈苑方
遍身瘡疥如癩及癰瘍癰痒面上風刺婦粉刺並用樟皮散主之樟皮燒灰四兩松梗去穰燒四兩荆芥穗二兩炙甘草半兩各為末杏仁水煮過去皮尖二兩研泥爛研分母服一錢食後溫酒調下瘡疥甚者日三服和劑方小便熱短飲集蘭方

染鬚髮樟皮一片包側柏一枝燒烟熏香油盃內成烟以手抹在鬚髮上即黑也多能驗事

脂膏燒之辟鬼邪器

藏

絀木

拾釋名鯉魚藏器曰生林澤山谷水甘溫無毒治風濕瘦補腰脚益陽道宣酒飲器

櫟木

拾集解藏器曰出安南及南海用作床几似紫檀而已亦性堅好時珍曰木性堅紫紅色亦有紋者謂之花櫟木可作器皿扇骨諸物俗作花梨誤矣

扁豆並剉煎服李時珍曰破血塊冷嗽汁熱服為枕令人頭痛性熱故也器

藏

櫟櫧

宋嘉祥釋名櫟櫧時珍曰皮中毛經如馬之驥釐故名櫟俗作棕櫚音閻欝也并集解曰櫟櫧出嶺南西川今江南亦有之木高一二丈無枝條葉大而圓有祐

復生上六七月生黃白花八九月結實作房如魚子黑色九月十月采其皮用山海經云石翠之山其木多櫟是也

藏器曰其皮作繩千

歲入水不爛昔有人開塚得一索已生根蘗南有桄榔檳榔子冬葉虎散多羅等木葉皆與栟櫚相類時珍曰櫟櫧川廣甚多今江南亦種之最難長初生葉如白及葉高三三尺則木端數葉大如扇上聳四散岐裂其莖三棱四時不凋其幹直無枝近葉有皮裏之母

長一層即為一節幹身赤黑皆筋絡宜為鐘杆亦可旋為器物其皮有絲毛錯縱如織刹取縷解可織衣帽櫛櫛之屬大為時利每歲必

兩三割之否則樹死或不長也三月於木端莖中出數黃苞苞中有細子成列乃花之孕也狀如魚腹孕子謂之櫟魚亦曰櫟尹漸長出

苞則成花穗黃白色結實纍累大如豆生黃黑熟甚堅實或云南方此木有兩種一種有皮絲可作繩一種小而無絲惟葉可作帚櫛樵

通志以為王草者非也王草乃落葉之名即地膚子別有蒲葵

葉與此相似而赤薄可為扇笠許慎說文以為櫟櫧亦誤矣

筍及子花

氣味苦澀平無毒藏器曰有小毒戰人候未可輕服時珍曰梭魚皆言有毒不可食而廣醫人密煮醋浸以供佛寄遠蘇東坡亦有食梭筍詩乃制去其毒爾

王治湯腸瀉

痢腸風坐帶及養血

藏器方

新大腸下血 櫻荀者熟切片晒乾為末密湯或酒服一二錢 集簡方

皮氣味辛王治鼻衄吐血破癰治腸風坐帶燒存性用

大王金瘡膏

解肌止血

李發明

宋夷曰櫻皮燒黑治婦人血

露及婦人吐血須佐以他藥

時珍曰櫻灰性澀若失血去多滯已盡者用之切當所謂溫可去脫也與亂髮同用更良年久敗櫻入藥尤妙

附方六

新

櫻樹灰隨左右石次

黎居士方

血崩不止

櫻樹皮燒研水服

三錢一方加煅白礬等分

婦人

人良血淋不止櫻樹皮半燒半炒為末每服二錢甚效

衛生家寶方

下血不止

櫻樹皮半斤枯櫻一箇燒灰每服二錢米飲調下

百一選方

水穀痢下

櫻樹皮燒研水服

方寸丸近效方

小便不通存性以水

酒服二錢即通利累

試甚驗

攝生方

檵木

檵良及切葉名櫻木

音櫻木

藏器曰櫻木生江南深山大樹樹有數種取葉厚大白花者入藥白蘇灰入

○拾遺采櫻木

○宋家用時珍曰此木最硬梓人謂之檵筋不是也木入染絳用葉亦可釀酒

木灰氣昏溫小毒至涼心腹癥瘕堅滿痃癖淋汁八升釀米一斗待酒熟每溫飲半合漸增至一二盞即愈

時後

柯樹

拾遺集解木奴

波斯家用木為船舫者也

白皮氣味辛平有小毒主治太腹水病米皮煮汁去滓煎之可丸如梧子太平疎心飲下三丸須臾又一丸氣水並從小便出也

器藏

烏臼木

唐本草

宋本草

時珍曰烏臼喜食其子因以名之陸龜蒙詩云行歌每依鷗白影桃頻時見鼠姑言是矣

其本老則根下黑爛成臼故得此名鄭樵通志言烏臼即桓柳者非也

仍葉似梨杏五月開細花黃色子黑藏器曰葉可染皂子可壓油然燈極明宗頤曰葉如小杏葉但微薄而綠色差淡

子八九月熟初青後黑分為三瓣時珍曰南方平澤甚多今江西人種植采子蒸煮取脂澆燭貨之子上皮脂勝於仁也

集解

宋本草

時珍曰生山南

根白皮氣味苦微溫有毒

大明曰性涼慢火炙乾黃乃用

王治暴瘻結積聚

唐

頭風通大小便明解蛇毒震

時珍曰烏白根性沉

而降陰中之陰利水

通腸功勝大戟一野人病腫滿氣壯令搗此根搗水煎服一盃連行數行而

附方新九一小便不通

烏白根皮煎湯飲之

時後方

大便不通方長一寸

烏白木根

劈碎水煎半盞服之立通不用多

一便通格

二三日則殺人

烏白東南根

白皮乾為末熟水服

喫其功神聖兼能取水

羊門方一便通格一錢先以芒硝二兩煎湯服吐甚效

肘後方

小便澀痛

心腹痛刺沈默錯亂用烏白根皮煎濃汁一合

調硃砂末一錢服之時後方無硃砂

水氣虛腫小便澀烏白皮檳榔不通一兩

烏白根皮煎湯飲之

時珍曰烏白根皮煎湯

水氣虛腫小便澀

烏白根皮煎湯

脚氣壅瘡

極痒有蟲鳥曰根為末傅之少時有涎出良

摘玄方

戶注中惡

心腹痛刺沈默錯亂用烏白根皮煎濃汁一合

調硃砂末一錢服之時後方無硃砂

水氣虛腫小便澀烏白皮檳榔不通一兩

烏白根皮煎湯飲之

時珍曰烏白根皮煎湯

水氣虛腫小便澀

烏白根皮煎湯

杏仁浸油搗薦患處

聖濟總錄嬰兒胎瘡

滿頭用水邊烏桕樹根晒研入雄

鼠糞丸毒

烏白根半兩擂水

鹽勑瘡嘴和飛麪作餅烙熱

烏白根半兩擂水

鹽勑瘡嘴和飛麪作餅烙熱

烏白根半兩擂水

鹽勑瘡嘴和飛麪作餅烙熱

烏白根半兩擂水

乃佳如不行熱茶催之

摘玄方

葉氣味苦辛治食馬齒莧生疔腫發者搗自然汁一二盞頓服得大利毒即愈未利再服冬用根時

珍

根主食馬齒莧生疔腫發者搗自然汁一二盞頓服得大利毒即愈未利再服冬用根時

珍

根主食馬齒莧生疔腫發者搗自然汁一二盞頓服得大利毒即愈未利再服冬用根時

珍

根主食馬齒莧生疔腫發者搗自然汁一二盞頓服得大利毒即愈未利再服冬用根時

珍

根主食馬齒莧生疔腫發者搗自然汁一二盞頓服得大利毒即愈未利再服冬用根時

珍

根主食馬齒莧生疔腫發者搗自然汁一二盞頓服得大利毒即愈未利再服冬用根時

珍

柏油氣味甘涼無毒主治瘡頭變白為黑服一勺令人下利去陰下水氣炒子作湯亦可

藏器

一切腫毒瘡疥

時珍曰

柏油二兩水銀一錢樟腦五錢同研煩入唾津不見

星乃止以溫湯洗淨瘡以藥填入

唐瑤經驗方

小兒蟲瘡

用舊絹作衣化柏油塗之與兒穿著次日蟲皆出油上取下燼

瀕湖集簡方

新

臘泡疥瘡

巴豆氣味苦寒主治瘡頭變白為黑服一勺令人下利去陰下水氣炒子作湯亦可

藏器

一切腫毒瘡疥

時珍曰

巴豆二兩水銀一錢樟腦五錢同研煩入唾津不見

星乃止以溫湯洗淨瘡以藥填入

唐瑤經驗方

小兒蟲瘡

用舊絹作衣化柏油塗之與兒穿著次日蟲皆出油上取下燼

瀕湖集簡方

新

臘泡疥瘡

巴豆氣味苦寒主治瘡頭變白為黑服一勺令人下利去陰下水氣炒子作湯亦可

藏器

一切腫毒瘡疥

時珍曰

巴豆二兩水銀一錢樟腦五錢同研煩入唾津不見

星乃止以溫湯洗淨瘡以藥填入

唐瑤經驗方

小兒蟲瘡

用舊絹作衣化柏油塗之與兒穿著次日蟲皆出油上取下燼

瀕湖集簡方

新

臘泡疥瘡

巴豆氣味苦寒主治瘡頭變白為黑服一勺令人下利去陰下水氣炒子作湯亦可

藏器

一切腫毒瘡疥

時珍曰

巴豆二兩水銀一錢樟腦五錢同研煩入唾津不見

星乃止以溫湯洗淨瘡以藥填入

唐瑤經驗方

小兒蟲瘡

用舊絹作衣化柏油塗之與兒穿著次日蟲皆出油上取下燼

瀕湖集簡方

新

臘泡疥瘡

巴豆氣味苦寒主治瘡頭變白為黑服一勺令人下利去陰下水氣炒子作湯亦可

藏器

一切腫毒瘡疥

時珍曰

巴豆二兩水銀一錢樟腦五錢同研煩入唾津不見

星乃止以溫湯洗淨瘡以藥填入

唐瑤經驗方

小兒蟲瘡

用舊絹作衣化柏油塗之與兒穿著次日蟲皆出油上取下燼

瀕湖集簡方

新

臘泡疥瘡

金線巴豆最為上等他處亦稀有時珍曰巴豆房似大風子殼而脆薄子及仁皆似海松子所云似白豆蔻者殊不類

修治

弘景曰巴豆最能濁人新者佳用之去皮心熬令黃黑擣如膏乃和凡散敷曰凡用巴豆與豆敲碎以麻油并酒等煮乾研膏用每一兩用油酒

各七合大明曰凡入丸散炒用不如去心膜後水煎五度每一沸也時珍曰巴豆有用仁者

氣味辛溫有毒別錄生溫熟寒有大毒普曰神農岐伯桐君辛有毒黃帝

用殼者用油者有生用者麸炒者酸煮者燒存性者有研爛以紙包壓去油者謂之巴豆霜

甘有毒李當之熱元素曰性熱味苦氣薄味厚體重而沉降陰也果白性熱味辛有大毒淨也陽中陽也時珍曰巴豆氣熱味辛生猛烈

緩能吐能下能止能行是可升可降藥也別錄言其熱則性寒張氏言其降李氏言其淨皆泥於一偏矣蓋此物不去膜則傷胃不去心

則作嘔以況香水浸則能升能降與大黃同用渾人反緩為其性相畏也王充論衡云萬物合太陽火氣而生者皆有毒故巴豆辛熱有

毒才曰芫花為之使畏大黃連芦薈蕷蓄蒼耳敗棘冷水得火良惡襄草與牽牛相反中其毒者用冷水黃連汁大豆汁解之效

主治傷寒濕瘧寒熱破癰瘍結聚積留飲痰癖大腹湯綫五臟二腑開通閼利水穀道去惡肉除鬼毒蟲瘡牙物殺蟲魚經本療女

子月閉爛胎止瘻膿血不利丈夫殺斑蝥虺虺毒可練餌之益血脉令人色好變化與鬼神通別錄治一種水腫痞塊落胎藥通宣一切病

泄壅滿除風補勞健脾開胃消癥破瘀消腫毒殺膿蟲治瘞肉及癰癩瘍瘻瘧小兒瘞痘婦人產後利小便通利關竅時珍曰巴豆乃斬關奪門之將不可輕用震亨曰巴豆去胃中寒積無

滲漏利糞痛腹痛氣喘耳聾瘻瘍牙痛通利關竅時珍曰巴豆乃斬關奪門之將不可輕用震亨曰巴豆去胃中寒積無元素曰巴豆乃斬關奪門之將不可輕用震亨曰巴豆去胃中寒積無

其性熱而劇小耳豈知以蠟瘻之猶能下後使人津液枯竭胸熱口燥耗却天真留毒不去他病轉生故下藥寫以為禁藏器曰巴豆主

癰瘻瘍氣虛滿積聚冷氣血塊宿食不消發飲吐水取青黑大者每日空腹服一枚去殼勿令白膜破乃作兩片并四邊不得有損缺吞嚥之以飲塞令下少頃腹內熱如火利出惡物雖利而不虛若久服亦不利人白膜破者不用好古右急治為水穀道路之剝去皮心膜油

生用若緩治為消堅磨積之剝炒去烟令紫黑用可以通腸可以止瀉世所不知也張仲景治百病客忤備急丸用之時珍曰巴豆峻用則有戰慄劫病之功微用亦有撫緩調中之妙醫言之蕭曹絲灌乃勇猛武夫而用之為相亦能輔治太平王海藏言其可以通腸可以止瀉此發千古之秘也一老婦年六十飲病溏泄已五年肉食油物生冷犯之即作腹脹調脾升提止瀉諸藥入腹則泄反甚延余診之脉沉而滑此乃脾胃久傷冷積凝滯所致王太僕所謂大寒凝內入利溏泄愈而復發綿歷年歲者法當以熱下之則寒去利止遂用蠟瘻巴豆丸

藥五十丸與服二日大便不通不利其泄遂愈自是每用治泄痢積滯諸病竟不瀉而病愈者近百人妙在配合得宜樂病相對耳苟用所不當用則犯輕用損陰之戒矣

上誤弘景曰道家亦有練餌法服之云可神仙人乃有相耐如此時珍曰漢時方士言巴豆練餌令人色好神仙名醫別錄米入本草張華博物志巴豆十三新言臘食巴豆重三十斤一謬一誕陶氏信為實語誤矣又言人吞一枚即死亦近過情今並正之附方二十六

一切積滯粉一兩黃藥

三兩為末水丸綠豆大母

水下五丸醫學切問寒澼宿食不消大便閉塞巴豆仁一升清酒五升煮二日三夜研熟合酒微

水下五丸

火煎令可丸如豌豆大每服一丸水下欲吐者二丸十金方

水蠱大腹動搖水聲皮膚色黑巴豆九十枚去心皮熬黃杏仁六十枚去皮尖熬黃擣丸如梧桐子大水下飛尸鬼擊中惡心痛腹股大便不通走馬湯用巴豆二枚去皮心熬黃杏仁一枚

杏仁六十枚去皮尖熬黃擣丸如梧桐子大水下

飛尸鬼擊以綿包椎碎熱湯一合搗取白汁服之當下而愈量毫小用之

外臺食療方

巴豆皮心去淨二錢皇夷去皮子六錢擣研

巴豆皮心去淨二錢皇夷去皮子六錢擣研

積滯泄痢腹痛裏急杏仁去皮尖巴豆去皮心各四十九箇同燒存性研泥浴臘和丸綠豆

九如綠豆大一服一丸冷湯下

時後方

劉守真宣明方

氣痢亦白巴豆一兩去皮心熬研以熟豬肝丸綠豆大空心米飲

氣痢亦白巴豆一箇去皮以雞子開一孔納入紙封煨熟去

豆食之其病即止虛人分作二服決效

普濟方小兒下痢

赤白用巴豆煨熟去油一錢百草霜一錢研末飛鴟麪煮糊丸泰米

大量人用之亦用甘草湯白用米湯赤白用薑湯下全幼心鑑

夏月水瀉不止巴豆一粒針頭燒存性化蠟和

小兒肚瀉巴豆一箇

燒過黃蠟一豆大燈上燒滴入水中同杵丸

傷冷吐利煩濕水浸丹用巴豆二十五箇去皮心及油黃丹炒研一兩一錢半浴

泰米大每用五七丸連子燈心湯下同上

伏暑霍亂化黃蠟和丸綠豆大每服五七丸水浸少頃別以新汲水吞下效

和劑應驗方

乾霍亂病心腹脹痛不吐不利欲先巴豆一枚

去皮熟水研服得吐利即定也

二便不通巴豆連油連黃各半兩擣作餅子先滴葱薑汁在

濟內安餅子上炙二七壯取利為度

楊氏家藏

李翰林用此治莫秀才剄口便止神方也張果醫說風濕痰癥

新巴豆四十九粒研如泥紙壓去油分作三餅如病在左令病人將右手

仰置掌上安藥于掌心以盜安藥上傾熱水入盜內水涼即換良久汗

出立見神效病在右安左掌心一云隨左石安之保壽堂經驗方

陰毒傷寒

心結按之極痛大小便閉但出氣稍暖者急取巴豆十

粒研入麪一錢搗作餅安臍內以小火炷炙五壯氣達

即通此太師陳北山解中藥毒

巴豆去皮不去油牙硝等分安

方也

仁齋直指方解中藥毒

巴豆去皮不去油牙硝等分安

廣利方叫瘧癆

巴豆兩粒紙卷作角

內入喉中牽出即點

千金經略瘧癆切斷兩頭以針穿孔

內入喉中氣透傷寒毒

巴豆一粒去油取霜以紙燃卷

如著孔巴豆一枚亂髮雞

即通勝金方

傷寒毒

出

內入鼻中舌即收上

普濟方

舌上出血

子大燒研酒服

聖惠

中風口喎

巴豆七枚去皮研左喎塗石子

心右喎塗左手心仍以暖水

一

盞安藥上須臾即

正洗法

聖惠方

小兒口瘡

不能食乳剛子一枚連油研入黃丹少許剝去頭上髮貼之四邊起

豆在內盞定綿裹隨左右塞耳中

經驗方用巴豆一粒研綿

風蟲牙痛

蒜一瓣切一頭剝去中心入

裏咬之又方針刺巴豆燈上燒令烟出熏病處三五次神效

天絲入咽

瘡急以白礬巴豆燒灰吹入即愈

瑣碎錄

耳聾聾閉

巴豆一粒煨黃去殼

紙裏針刺孔通氣

風瘡瘻

心下迷悶巴豆五十粒去皮水七升煮

塞之取效

經驗

風瘡瘻

心下迷悶巴豆五十粒去皮水七升煮

塞之取效

經驗方

小兒瘡

喘呻吟不休

巴豆一粒研生麻油三兩

水

千金方

荷錢瘡

巴豆仁三箇連油杵泥以生絹包擦

日

一切惡瘡

巴豆二十粒麻油煎黑去豆以油

新巴豆仁炒焦研膏點痛處則解毒塗於肉上則自化加乳香少

許亦可若毒深不能收斂者宜作擦純之不致成痛

外科精義

瘡瘻

巴豆一錢石灰炒過人言一錢

蠅同研全之斯須痛定微痒忍之待極痒不可思便撼拔動之取出速以生肌膏傅之而痊亦治瘡腫

夏侯鄧在潤州得此方後至洪州旅舍主人妻背瘡呻吟不已鄧用此方試之即痛止也

經驗方

小兒瘡

巴豆一粒杵爛綿裹塞

鼻男左女石瘡即自下

醫鑑

牛疫動頭

巴豆二粒研生麻油三兩

水

半升和灌之

賈相公牛經

油

王治風痰癰氣厥中惡瘡

一切急病咽喉不通牙關緊閉以研爛巴豆綿紙包壓取滓

燃點燈吹滅熏鼻中或用熱烟刺入

嘴即時出涎或惡血便甦又舌上無故出血以薑舌之上

自止

珍時

新一切癰

脉浮洪者多日難已脉微小者服之立止名勝金膏

巴豆皮楮葉

研末甘草湯下五丸

劉河間宣明方

瘡頭脫肛

巴豆殼燒灰

芭蕉自然汁煮入朴硝少許洗軟用真麻油點火滴子上以

礬龍骨少許爲末移肛頭上以芭蕉葉托入

危氏得效方

樹根

主治癰疽發背腦疽瘡疽大患掘取洗擣敷患處留頭妙不可言收根陰乾臨時水搗亦可

時珍出楊誠經驗方

大風子

補遺

時珍曰能治

集解

時珍曰大風子今海南諸番國皆有之按周達觀真臘記云大風乃大樹之子狀

如椰子而圓其中有核數十枚大如雷丸子中有仁白色入則黃而油不堪入藥

仁修治

時珍曰

取大風子油法用子三斤去殼及黃油者研極爛瓷器盛之封口

入滾湯中蓋鍋密封勿令透氣文武火煎至黑色如膏名大風油可以和藥

氣味辛熱有毒

主治風癬疥癩楊梅諸瘡攻毒殺

蟲時發明

震亨曰粗工治大風病以大風油殊不知此物性热有燥痰之功而傷血至有病將而愈

先失明者時珍曰大風油治瘡有殺蟲刦毒之功蓋不可多服用之外塗其功不可沒也

附方

新

大風諸癩

大風子油一兩

少酒糊丸梧子大母服五十九空心

溫酒下仍以苦參湯洗之

普濟方

大風瘡裂

大風子燒存性和麻油輕粉研塗

大風子仁不籠子仁輕粉

仍以殺蟲湯洗之

嶺南衛生方

楊梅惡瘡

方同

風刺亦鼻

大風子仁不籠子仁輕粉

疏黃為末夜唾調塗之

手背皴裂

大風子搗泥

塗之

壽域

海紅豆

海雲名

藥名

集解

珣曰按徐表南州記云生南海人家園圃中大樹而生葉圓有莢近時蜀中種之亦成

時珍曰樹高二三丈葉似

梨葉而圓

按宋祁益部方物圖云紅豆葉如冬青而圓澤春開花白色結莢核間其子累累而綴珠若大紅豆而

扁皮紅肉白以似得

相思子

綱目釋名

蘇子

時珍曰按古今詩話云相思子圓而紅故老言昔有人沒於邊其妻因之哭於樹下而卒

集解

時珍曰相思子生

目以名之此與韓憑嫁上相思樹不同彼乃連理梓木也或云即海紅豆之類未審的否

嶺南樹高大餘白

色其葉似槐其花似皂莢其莢似扁豆其子大如小豆半截紅色半截黑色

被人以嵌首節段公路北戶錄言有蔓生用子收龍腦香相宜令香不耗也

氣味辛有小毒

吐人主治通九竅去

腹知氣散悶頭

痛風癰瘡瘍

殺膿及皮膚內

一切蟲癰毒

取二七枚研服即當吐出

時珍附方

新

瘴瘡寒熱

相思子十四枚水研

研服取吐立瘥

千金

貓鬼野道鬼及耳

有所聞用相思子蓖麻子巴豆各一枚硃砂末蠟各四錢合搗凡如麻子大服之即以灰年中蠱毒

必效方用木鑽相思子十四枚杵碎
為末溫水半盞和服欲吐抑之勿吐

圍患人面前看一斗灰火味藥入火中沸即畫十字于火上其貓鬼者死也 千金方

角

少頃當大吐非常輕者但

服七枚神效

外臺秘要

豬腰子

網目

時珍曰豬腰子生柳州蔓生結莢內子大若豬之內腎狀氣味甘微辛無毒治一切瘡毒箭傷研細酒服二錢

并塗之

時珍

時

石瓜

網目

集解時珍曰石瓜出四川峨眉中及芒部地方其樹修幹樹端葉肥滑如冬青狀似桑其花淺黃色結實如綴長而不圓壳裂則子見其形似瓜其堅如石煮熟黃色

氣味甘無毒治心痛煎汁洗風癩

時珍

本草綱目

卷三十五

十五

本草綱目木部第三十五卷終

本草綱目木部目錄第三十六卷

木之三 灌木類五十種

桑

本經

柘

嘉祐

奴柘

拾遺

楮

別錄

枳

本經即枳

枸橘

綱目

梔子

本經木戟附

酸棗

本經

棘

本經

蕤核

本經

山茱萸

本經即茱萸

胡蘿子

拾遺即盧都子

蘡薁

蜀本

郁李

本經

鼠李

本經即牛李子

女貞

本經

冬青

開寶綱目

楨

綱目

欒

本經

山礬

綱目

南燭

開寶

五加

本經

枸杞

本經

澀疏

本經

楊櫨

唐本

石楠

本經

牡荆

別錄

紫荆

開寶

荆

別錄

藥荆

唐本

石荊

拾遺

木芙蓉

綱目

茶

綱目

茶

綱目

扶桑

綱目

木芙蓉

綱目

岱

綱目

岱花

開寶

密蒙花

開寶

木棉

綱目

柞木

嘉祐

黃楊木

細

不凋木

拾遺

賣子木

唐本

木天蓼

唐本

放杖木

拾遺

接骨木

唐本

靈壽木

拾遺

槐木

拾遺

木麻

拾遺

大空

唐本

右附方舊八十七新二百零七

本草綱目木部第三十六卷

木之三

灌木類五十種

桑

本經中品采桑名椹時珍曰徐鍇說文字解云桑音若東方自然神木之名其字象形桑集解曰方書稱桑之功最神在人資用尤多爾

桑郭璞云辨半也甚與椹同一半有椹一半無椹名杞俗間呼桑之小而條長者皆為女桑其山桑似桑材中弓弩屢桑繫中琴瑟皆材之美者也他木鮮及之時珍曰桑有數種有白桑葉大如掌而厚難桑葉化而薄子桑先椹而後葉山桑葉大而長以子種者不若葉條而分者桑生黃衣謂之金桑其木必特槁安種樹書

云桑以構接則桑大桑根下埋龜甲則茂盛不蛀

桑根白皮

脩治

別錄曰采無時出土上者殺人弘景曰東行桑根乃易得而江邊多出土不可輕信時珍曰古本草言桑根見

地上者名馬頸有毒殺人旁行出土者名伏蛇亦有毒而治心痛故吳淑事類賦云伏蛇痛馬頸殺人殺曰凡使采十年以上向東畔嫩根銅刀刮去青苔剗皮一重取裏白皮切焙乾用其皮中

權曰平大明曰溫元素曰苦酸果曰甘辛寒可升可降陽中陰也好古曰甘厚

涎勿去之藥力俱在其上也忌鐵及鉛或云木之白皮亦可用煮汁染褐色不染

氣味甘寒無毒

經曰平寒可升可降陽中陰也好古曰甘厚

而辛薄入手太陰經之才

續斷桂心麻子為之使

主瘍中五勞極羸瘦弱絕脉補虛氣本

經去肺中水氣壅血熱渴水腫脹滿腹脹

利水道去寸白可以

絳金瘡

治肺氣喘滿虛勞客熱頭痛內補不足

煎

煮汁飲利五臟入散用下一切風氣水氣

調

中下氣消痰止渴開胃下食緩腹脹

蟲止霍亂吐瀉研汁治小兒天吊驚癇

疳

及傳病口瘡大驗

大

瀉肺利大小腸降氣散血

時

珍曰桑白皮甘以固元氣之不足而

云桑白皮瀉肺然性不純良不宜多用

時珍曰桑白皮長於利小水乃寔則瀉其子也故肺中有水氣及肺火有餘者宜之十劑云燥可

去濕桑白皮赤小豆之屬是矣宋醫錢乙治肺氣熱甚欲散而後喘而腫身熱瀉白散用桑白皮炒一兩地骨皮桔一兩甘草炒半兩每

服一二錢入粳米百粒水煎食後溫服桑白皮地骨皮皆能瀉火從小便去甘草瀉火而緩中粳米清肺而養血此乃瀉肺諸方之準繩也元醫羅天益言其瀉肺中伏火而補正氣邪所以補正也若肺虛而小便利者不宜用之頃曰桑根白皮作線縫金瘡腸出更以熱

雞血塗之唐安金藏

附方

新六放嗽吐血

甚者殷鮮桑根白皮一斤米泔浸三宿刮去黃皮剉細

剖腹用此法而愈

入精米四兩培乾為末每服一錢米飲下

經驗方

治瘍久不收口

入地三尺桑根剉取白皮炙

割腹用此法而愈

之亦可入少米勿

用鹽

肘后方

產後下血

飲之時后方

血露不絕酒服之日三服

時后方

墮馬拗損

已後亦無宿血終不發動

經驗后方

金刃瘡傷

新桑白皮燒灰和馬糞塗瘡上數

易之亦可敷汁服之

廣利方

桑物昧眼眼擦之白出

聖惠方

髮鬢落

桑白皮剉三升以水淹浸煮五六沸

桑根白皮五斤為末一升煎膏傅之便止

桑根白皮五斤為末煎膏傅之便止

桑根白皮柏葉各一斤

煎汁沐之潤

聖惠方

小兒重舌

桑根白皮煮汁塗乳

上飲之子母秘錄

小兒流涎

脾熱也脚脛百瘻新桑根白皮搗自

聖惠方

小兒天平

驚癇客忤家桑東行根

小兒火丹

桑根白皮煮汁浴之或為

小兒火丹

桑根白皮和塗之

十全方

石珊瑚膠和酒調傅以軟為度

千金方

皮中白汁

主治小兒口瘡白漫塗淨塗之便愈又塗金刃所傷燥痛須臾血止仍以白皮裹之甚良

蘇頌

蛇蠍蜘蛛傷有

取枝燒滌治大風瘡疥生膚髮

時附方

舊一小兒口瘡

桑皮汁和胡粉塗

桑木汁塗之即

解白毒氣

桑白汁一合服之須臾

止利自出

肘后方

石皮

傷中風度

桑瀝好酒對和溫服以醉為

傷中風度

醒服消風散

摘立方

桑椹

一名文武襄

主治單食止消渴

蘇利五臟急節病

血氣久服不飢安魂鎮神令人聰明變白不老多收暴乾為末蜜丸

九日服

研搗

膏

飲解中酒毒釀酒服利水氣消腫

時珍曰本經言桑其詳然獨遺烏椹桑之精英盡在於此采摘要研以布濾汁石器然成稀膏

及小腸熱其性微涼故也仙方曰乾為末蜜和為丸酒服亦良時珍曰椹有烏白二種楊氏產乳云

孩子不得與桑椹令心寒而陸機

詩疏云鳩食桑椹多則醉傷其性何耶四時月令云四月宜飲桑椹酒能理百種風毒其法用椹汁三斗重湯煮至

一半半入白蜜二合

酥油一兩生薑一合煮令得所瓶收每服一合和酒飲之亦可以汁熬燒酒藏之經年味力愈佳史言魏武帝

軍之食得乾椹以濟飢金末大荒民皆食椹獲活者不可勝計則椹之乾濕皆可救荒平時不可不收采也

附方

新六水腫

水腫脹滿

水不

附方

舊一水腫脹滿

水不

附方

新六水腫脹滿

水不

滿溢水下則虛竭還服十無一活宜用桑椹酒治之桑心皮切以水漂療結核文武膏用文武實即桑椹子二斗黑熟者以布取汁讚
二斗煮汁一斗入桑椹再煮取五升以糯飯五升釀酒飲普濟方銀石器熬成膏每白湯調服一匙日三服保命集讚
硬咽紅椹子細嚼先煎汁后熟津新小兒赤丸桑椹取汁頻

日盡化為黑泥以染白髮白不生聖惠方黑熟桑葉水浸日晒搽塗陳藏器本草令黑而復生也千金方陰證腹痛桑椹絹包風乾過伏天為末每
髮如漆

小兒赤丸桑椹取汁頻洗之三七日神效聖濟錄板白蠟重盛封閉縣屋東頭一百

孟煎飲利五臟通關節下氣嫩葉煎酒服治一切風寒熱搏音風痛出汗并撲損瘀血接爛金蛇蠍傷明研汁治金瘡及小兒吻瘡煎汁
眼止霍亂腹痛吐下亦可以乾葉裹之雞糞葉煮汁敷膏服去老風及宿血歲治勞熱欬嗽明目長髮時發明頤曰桑葉可常服神仙服
葉又十月霜後三分二分已落時一分在者名神仙葉即采取與前葉同陰乾搗末散肚服或煎水代茶飲之又霜後葉煮湯淋渫手
足去風痒殊勝又微炙和桑女煎服治痢及金瘡諸損傷止血霍寧白經霜桑葉研末米飲服上盜汗時珍曰桑葉乃手足陽明之藥十
前代若能舊二新前代若能昔武勝軍宋仲孚患此二十年用此法二年日明如故新研青桑葉焙乾逐月按日就地上燒存性每
十二月三十一月初二十日普濟方止消渴附方十一青盲洗法以一合於瓷器內煎減二分傾出澄清溫熱洗目至百度常試有驗正月初八二月初八三月初六四
月初四五六月初六月初七七月初八月二十九日十二月三十一月初二十日普濟方風眼下淚溫洗或入芒硝集簡方赤眼疼痛取效海上方也普濟方頭髮不
長桑葉麻葉煮治水沫之七次可長數尺千金方吐血不止止後用補肝肺藥聖濟總錄

煩悶桑葉一握煎飲一劑同黃皮桑樹葉三升水煎過用市毒風瘡狀如大風綠雲散用好桑葉洗淨蒸熟一粒不知痛痒霜降後桑葉
之直指方穿掌腫瘻新桑葉研爛盦之仁齋直指方月毒風瘡宿日乾為末水調二錢七服經驗方瘡口不收經霜黃桑
指方穿掌腫瘻即愈通玄論湯火傷瘡傳之三日愈醫學正傳手足麻木不知痛痒霜降後桑葉煎湯頻洗急救方

本草綱目卷三十六木部

枝氣味草主治偏體風癆乾燥水氣脚氣四肢拘攣上氣眼腫肺氣欬嗽消食利小便久服輕身聰明目令人光澤療口乾

及癰疽後酒用桑條細切一升熬杏黃飲亦無甚忌少服終身不患偏風

蘇頌〇出近效方名桑枝煎一法用花桑枝寸剗炒香瓦器煮減一半再入銀器重湯煎減一半或入少蜜亦可

發明

頌曰桑枝不令不熟可以常服抱朴子言仙經云一切仙藥不得桑煎不服時珍曰煎藥用桑者取其能利關節除風寒濕痺諸痛也觀靈樞經治寒痺內熱用桂酒法以桑炭炙布巾熨痺處治口僻用馬膏法以桑鈎鈎其口及坐桑灰上皆取此意也又癰疽發背不起發或瘡肉不腐潰及陰瘡瘻癰應流注賺瘡頭瘡惡瘡久不愈者用桑木炙法未潰則拔毒止痛已潰則補接陽氣亦取桑通關節去風寒火性暢達出醫毒之意其法以乾桑木劈成細片皴作小把然火吹息矣患處每吹炙片時以瘀肉腐動為度內服補托藥誠良方也又按趙潛養疴漫筆云越州一學錄少年苦喉百藥不效或令用南向桑桑條一束每條寸附方舊一服食蠶白久服通血氣利五臟雜桑嫩折納鍋中以水五盞煎至一盞盛瓦器中渴即飲之服一日而愈此亦桑枝變煎法耳附方新五服食蠶白取陰乾為末蜜和作丸每日

酒服六十九

水氣

腳氣

風熱臂彌

瘧

桑枝一小升切以水三升煎二升一日服盡許叔微云常病臂彌諸

聖惠方

每日空心服之無忌

聖濟總錄

桑枝不收服此數劑自愈觀本草切用及圖經言其不令不熟可以常

服抱朴子言一切仙藥不得桑煎

桑枝三斗煮取二斗澄清微火煎得五升空心服五合則吐盡毒出也

肘后方

刺傷手足

瘧多殺人

桑枝三條燒火炮熱斷之以頭熨瘡上令熱冷即易之盡二條則

聖惠方

瘡

白爛

仍取韭白或薤白

或薤白

急以帛裹之有腫更作

千金方

紫白癰

風

煎成膏

每臥時溫酒調服半合以愈為度

聖惠方

變動

其病

桑柴灰

氣味

辛寒有小毒

說曰林汁入鍊五金

珍珠附方

舊六

新六目赤腫痛

桑灰一兩黃連半兩為末每以

聖濟總錄

洗青盲眼

正月八二月八三月六四月四

五月五六月二七月七八月二

斗

生肌

朱砂霜

治噎食積塊

時珍附方

新六目赤腫痛

錢泡湯

湯洗

聖濟總錄

洗青盲眼

五月五六月二七月七八月二

斗

桑灰

一合煎湯沃之於瓷器中

登取極清稍

尸注

龍水論

變動

乃自三十六種至九十九種使人寒熱淋泄沉忽默點性不知所苦年累積月以至於死復傳親人宜急治之用桑樹白皮曝乾燒灰二

斗

着瓶中蒸透以盒中湯三四斗淋之又淋凡二度極濃澄清止取二斗以清赤小豆二斗一宿曝乾復清灰汁盡乃止以豆蒸熟或羊

斗

肉或鹿肉作羹進此豆飯初食一升至二升取飽微者三四斗愈極者七八斗愈病去時體中自覺痛痒澁澁若根本不盡再為之神效方也。時后方。腹中癰瘕。身面水腫重坐卧不得取東引花桑枝燒灰不得吃湯飲。梅師方。面癰。寒食前後取桑條燒灰淋汁入石灰熬頭面以大豆水研碎解澤灰味猶佳次用熟水入綠豆搗濯之三日一洗頭一日洗面不過十度良。聖惠方。白癩。風。頭皮以大豆水研碎解澤灰味猶佳次用熟水入綠豆搗湯洗不過五六度瘥。聖惠方。大風惡疾。桑柴灰二斗甌內熬之取金內熱。頭皮脫落以桑柴灰細搗湯洗不過五六度瘥。聖惠方。狐癩。刺人之令即易。時后方。金瘡作疼。桑柴灰搗細搗時后方。瘡傷風。腫疼入腹。則殺人以桑灰淋汁潰之。梅師方。瘡傷風。桑灰淋汁沐之。

復易

梅師方

頭風白屑

神良。聖惠方

桑耳桑黃

見桑部。木耳

桑花

見草部。苔類

桑寄生

見後寓。木類

桑柴火

見火部。

桑螵蛸

見虫部。

桑蠶

見虫部。

柘

宋嘉祐時珍曰接陸佃埤雅云柘宜山石。宋吳曰柘木裏有蠶亦可旋為器其葉可飼蠶曰柘蠶然葉硬不及桑葉入藥以無刺枝宜山草柘之從石其取此義與集角者良時珍曰處處山中有之喜叢生幹竦而直葉圓而厚圓而有大其葉飼蠶取絲作瑟瑟清響勝常爾雅所謂棘爾即此蠶也段工記云弓人取材以柘為上其寘狀如桑子而圓粒如椒名佳子佳音雖其木染黃赤色謂之柘黃天子所服相感志云柘木以酒醋調礪灰金之一宿則作閼道烏木文物性相伏也。

桑蠶

見虫部。

本草綱目

卷三十六

三

木白皮東行根白皮氣味甘溫無毒主婦崩中血結瘧疾

大黃汁釀酒服主風虛耳聾瘡瘍損傷腰冷夢

與人交接淺精者

藏自歸取汁五斗故鐵二十斤煅亦以水五斗浸取清合水一石五斗用米二石麪二斗如常釀酒成用真磁石三斤為末浸酒中三宿日夜飲之新

取小醉而眠聞人聲乃止

附方三 飛絲入目 拭去

醫學綱目 洗目令明 二月初二三月不洗四月初五五月十五六月十一七月初七八月初二九月初二十月十九十一月海上方 小兒鵝口 重舌柘根五斤剉水五升煮二升去滓煎

不洗十二月十四日徐神翁方也

海上方 小兒鵝口 取五合鹽茶末無根弓材亦可 千金方

柘黃

見菜部

奴柘

拾集解 瘡器曰生江南山野似柘節有利冬不凋時珍曰遺集解此樹似柘而小有利葉亦如柞葉而小可同蠶

刺

氣味苦小溫無毒主婦血癥男子痃癖悶脹最利和三棱草馬鞭草作煎如稠糖病在心食後在臍空心服當下惡物

藏語

楮

別錄 穗名穀音嬌亦上品

穀桑

謂之穀桑或曰楮桑詩疏云構幽州謂之穀桑或曰楮桑荆揚文廣謂之穀時珍曰楮本作檉其皮可績為紝故也楚人作檉

下集解 例錄曰楮窠生少室山所在有之八月九月采窠曰乾四十日成弘景曰此即今構樹也南人呼穀紙亦為楮紙武陵人作穀皮文言甚取好恭曰此有二種一種皮有班花文謂之班穀今人用皮為冠者一種皮白無花枝葉大相類但取其葉似葡萄葉作絲而有子者為佳其窠初夏生大如彈丸青綠色至六七月漸深紅色乃成熟八九月米水浸去皮穰取中子及成式酉陽雜俎云穀田久廢必生構葉有解曰楮無曰構陸氏詩疏云江南人績其皮以為布又搏以為紙長數丈光澤甚好又食其嫩芽以當菜如今楮紙用之最博楮布不見有之醫方但貴楮窠餘亦稀用大明曰皮班者是楮皮白者是楮時珍曰楮許慎說大言楮穀乃一種也不必分別惟辨班

雄耳雄者皮班而葉無經又三月開花成長穗如柳狀不結實軟年人采食之惟著皮白而葉有經亦開碎花結實如楊梅半熟

時水操去子蜜煎作果食二種樹並易生葉多澀毛南人糾皮搏者造紙亦鮮練為布不堅易朽

朽裴淵廣州記言蠻夷取皮熟搗為搗毡甚暖也其木齧後生菌耳味甚佳好

楮實亦名穀實

別銘

目脩治

穀得後水浸三日攪旋投水浮者去之晒乾以酒浸一伏時了蒸之從已至亥

謾氣味甘寒無毒主治陰虛水腫脾氣虛肌明久服不飢不老輕身

錄別

明月

搏取汁和丹用

亦乾服使人通神見鬼頌曰仙方單服其實正赤時收子陰乾飾末水服二錢七益久乃佳抱朴子云杼木實赤者服之老者成少令人

微視見鬼神道士深須年七十服之更少壯到百四十歲能行及走馬時珍曰別錄載楮實功用大補益而修真秘旨書言久服令人成

骨軟之疾濟生秘覽治骨哽用楮實煎湯服之豈非軟骨之微乎按南唐書云烈祖食餡喉中噎國醫莫能愈吳廷紹獨請進楮實

湯一服疾失去壅醫他日取用皆不驗扣廷紹答云噎因甘起故以此治之愚謂此乃治骨哽堅軟之義而醫用治他噎故不驗也附

新楮實子丸以潔淨金用楮實子一斗水二斗熬成膏候冷三兩白丁香一兩半為末以膏和丸梧子大千粒研

水氣脹脹

從少至多脹至小便清利脹減為度后服治中湯養之忌甘苦峻

補及發動之物

潔古活法要

月熱生翳

楮實子研

湯服一錢日再候喉瘻風五月五日或六月六日七月七日采楮桃陰乾毋

服愈直指方

口噙

用一個為末并華水服之重者以兩個集簡方

身面石疽

狀如座痴而皮厚穀子

搗傳之

外臺秘要

金瘡出

穀子搗傳之

外臺秘要

目

皆佳視桃荆芥穗各五百枚為末陳蜜丸彈子大食後

衛生易簡方

葉氣味甘涼無毒主治兒身熱食不生肌可作浴湯又主惡瘡毒別治利風鼻痒

大

明治鼻衄數升不斷者搗汁三升再三服之良

久即止嫩茹之去西臍風瘻亦白下痢蘇炒研搜作餅食之去水痢

頭

利小便去風濕腫脹白濁疝氣癰瘡附方

舊五新

水穀

下痢見果部老少瘧痢日夜百餘度者取乾楮葉三兩搗搗為末每服方寸匕烏梅湯下日再服取羊肉裹末納肛中痢出即止

楊氏南行方

小兒下痢

赤白作渴得水又嘔逆者搗葉炙香以飲

汁中熬二三沸細細飲之

五花構葉搗乾為末每服二錢

小便白濁

構葉為末蒸餅丸梧子大每服

飲之子母秘錄脫肛不收米飲調下兼塗腸頭聖惠方

精年氣上如水病但脚不腫用穀楮葉八兩以水一斗煮取六升去滓納米煮粥常食勿絕

外臺秘要

卒風不語

穀楮葉研末湯服多少日七飲之

肘后方

人耽睡

一二錢取瘥止

楊

堯輔
吐血丹

楮葉搗汁一二升旋

三月收穀木嫩葉晒乾為末入麝香少許

水酒糊丸楮子

桔葉雄黃等分為末酒糊丸楮子

大明曰能合硃砂為團故名五金膠

時珍曰搗汁最粘今人用枯金

時珍曰枯金

方
吐血丹

楮葉搗汁旋溫飲之

聖惠方一切眼翳每以桑大注目內其翳自落

聖惠方木腎疝氣大每鹽酒下五十丸

醫學集成楮葉搗

五月五日采穀樹葉陰乾為末每

水酒糊丸楮子

大每鹽酒下五十丸

醫學集成楮葉搗

氣入囊服一二匙空心溫酒下

簡便方癰瘍濕痒

楮葉搗傳

楮葉搗傳

楮葉搗傳

楮葉搗傳

楮葉搗傳

楮葉搗傳

楮葉搗傳

卜便
良方

枝莖主治癰瘍瘻瘍

湯洗浴

別錄

搗濃汁飲半升治小便不通

時方

舊一頭風肩

易新者

暴赤眼痛

時珍曰

湯清溫洗

聖惠方

樹白皮

氣味甘平無毒

主治水利小便不通

別錄

治水腫氣滿

甄權

吳普煮汁

酒飲治水腫入腹短氣欬嗽為散服治下血崩

時珍曰

附方

舊一腸風下血

秋采楮皮陰乾為末酒服三錢

新六普濟方

血崩

荅樹皮荆芥等分為末冷醋調服一錢血崩

男婦重病

不拘久近暴風入

腹婦人新產上風

或入麝香少許日二

普濟方

血崩

荅樹皮荆芥等分為末冷醋調服一錢血崩

男婦重病

不拘久近暴風入

腹婦人新產上風

或入麝香少許日二

普濟方

風入臟內腹中如馬鞭短氣楮皮枝葉一大束切搗汁

風水腫浮

一身盡浮楮皮散用楮白皮楮苓木通各一錢柴白皮

三錢生薑三片水二錢煎服日一劑

聖濟總錄

風水腫浮石水

陳皮橘皮一錢生薑三片水二錢煎服日一劑

聖濟總錄

時珍曰

酒不斷飲之不過三四日即退可常服之

千金方

風水腫浮

陳皮橘皮一錢生薑三片水二錢煎服日一劑

聖濟總錄

風水腫浮石水

陳皮橘皮一錢生薑三片水二錢煎服日一劑

聖濟總錄

時珍曰

四肢瘦削小腹脹滿構根白皮桑根白皮各二升白朮四兩黑大豆五升

流水一斗煮四升入清酒二升再煮至三升日再一七服之

集驗方

月中醫膜

楮白皮暴乾作繩子如臘股大燒灰細研

研每點少許日三五次瘥乃止

崔氏方

魚骨硬咽

時珍曰

楮樹嫩皮搗爛為丸水下

二十九衛生易簡方

皮間白汁

釋名

膠

大明曰能合硃砂為團故名五金膠

時珍曰搗汁最粘今人用枯金

時珍曰枯金

膠古法粘經書以楮樹汁和白及飛鶴調糊接紙水不脫解過於膠添

氣味甘平無毒

時珍曰

瘡癩傳

蛇蟲蜂蠅大咬

太附方

天行病後脹滿

隨意服之小便利即消外台秘要

楮皮紙

楮耳

見菜部

枳

本經校正

併入開寶

寶枳殼釋名枳實

本宋開寶

枳殼一物也小則其性酷而速大則其性詳而緩故張仲景傷寒之

用枳殼其義如此矣曰既稱枳實須合核殼今殊不然時珍曰枳乃木名從枳諧聲也實乃其子故曰枳實後人因小者性速又呼老者為枳殼生則皮厚而實熟則殼薄而虛正如青橘皮陳橘皮之義宋人復出枳殼一條非矣寇氏以為破結寔而名亦未必然也

集解

月既厚其辛舊云江南為橘江北為枳周禮亦云橘逾淮而北為枳今江南枳橘皆有江北有枳無橘此自別種非關變易也

月采者為殼今醫家以皮厚而小者為枳實完大者為枳殼皆以翻肚如盆口狀陳久者為勝近道所出者俗呼臭橘不堪用

枳實采破令乾陰核微炙令乾用以陳者為良俗方多用道家不須較

曰枳實枳殼性效不

同若使枳殼取辛苦腥并有陳油者要塵久年深者為佳並去穰核以小麥麩炒然集去麸用

枳實

本經別錄曰酸微寒善曰神農苦雷公酸無毒李當之大寒確曰辛苦元

素曰性寒味苦氣厚味薄浮而升微降陰中陽也宋曰沉也陰也

主治大風在皮膚中如麻豆苦痒除寒熱

結止癆長肌肉利五臟益氣輕身

本經除胸膈痰癖逐停水破結實消脹滿心下急疼痛逆氣脢脹腹脢渴潤目

別錄解傷寒結胸主上氣喘嗽腎內傷冷陰痿而有氣加而用之

頭消食散敗血破積堅玉虛中濕熱

元符震亨曰枳實瀉液能衝牆倒壁清氣破氣之

藥也元素曰心下痞及宿食不消並且枳實

則佐之以大黃牽牛硝芒此本經所以言益氣而復言消痞也非白朮不能去濕非枳實不能除痞故擇古制枳朮丸方以調胃脾張仲

景治心下堅大如鹽水飲所作枳實白朮湯用枳實六枚朮三兩水一斗煎三升分三服腹中軟即消也餘見枳殼下

附方新四平胸疼痛枳實橘木湯服方寸匕

舊九日三夜一肘后方胸痹結胸胸痹心下痞留氣

三兩水一斗煎三升分三服腹中軟即消也餘見枳殼下

附方新四平胸疼痛枳實橘木湯服方寸匕

舊九日三夜一肘后方胸痹結胸胸痹心下痞留氣

三兩水一斗煎三升分三服腹中軟即消也餘見枳殼下

附方新四平胸疼痛枳實橘木湯服方寸匕

舊九日三夜一肘后方胸痹結胸胸痹心下痞留氣

三兩水一斗煎三升分三服腹中軟即消也餘見枳殼下

枳實桂白湯主之陳枳實四枚厚朴四兩薤白半斤搗擗一枚桂一兩以水五升

傷寒胸痛傷寒後辛胸膈間痛枳實桂枝為末米

產後飲服二錢日二服

嚴子扎濟生方

先煎枳朴取二升去滓納餘藥煎三兩沸分溫三服當愈

張仲景金匱要略

傷寒胸痛飲服二錢日二服

嚴子扎濟生方

枳實桂枝炒芍藥酒炒各二錢水一

奔豚氣痛枳實炙為末飲下方言

堅痛枳實半斤碎以帛裹

枳實是矣等分為末飯九

痛腹枳實桂枝炒芍藥酒炒各二錢水一

婦人陰腫枳實炙為末飲下方言

堅痛枳實半斤碎以帛裹

分為末飯九

痛腹前服亦可為末服

聖惠方

外臺秘要

婦人陰腫日三夜一

米飲下危

枳實石上磨平塞入黃更

氏得效方

小

積癰脫肛互熨之縮乃止

千金方水穀不調枳實搗末飲

廣利方

時服二錢七糊丸亦可用

兒五痔不以年月枳實為末煉蜜丸梧子

小兒頭瘡枳實燒灰猪脂

調金

聖惠方

兒五痔不以年月枳實同果曰沉也陰也

王治風寒濕通利關節勞氣欬嗽片肺悶倦散留結胸膈痰滯逐水消腫

滿大脇風寒胃虛遍身風癩肌中如麻豆瘡瘍風寒疾腹結氣兩脇脹虛關膈壅塞

枳實桂枝湯主之

健脾開胃調五臟下氣止嘔逆消痰

治反胃霍亂消食破癥結痃癖五臟氣又肺氣腫大腸除風明目炙熟髮痔脣

元氣治寒熱除胸病

元素

時行

枳

殼破氣勝濕化痰泄肺走大腸多用損胸中至高之氣止可二三服而已藥奏素壯而氣刺痛者看在何部經分以別經藥導之稟曰氣

血弱者不可服以其損氣也古曰枳殼主高枳實主下高者主氣下者主血故殼主胸膈皮毛之大實主心腹脾胃之病大同小異未

肱活人書言治活宜先用桔梗枳殼湯非用此法不致於活也若已成痞而用此則失

之矣不惟不能消痞反損胸中之氣先之一字有謂也時珍曰枳實枳殼氣味功用俱同上世亦無分別魏晉以來始分實殼之用潔古

張氏東垣李氏又分治高治下之說大抵其功皆能利氣氣下則痞喘止氣行則痞脹消氣通則痛刺止氣利則後重除故以枳實利胸

膈以枳殼利腸胃然張仲景治胸痹痞滿以枳實為要藥諸方治下血痔病大腸枳實裏多後重又以枳殼為通用則枳實不獨治下而

膈不獨治高也蓋自飛門至魄門皆肺主之三焦相通一氣而已則二物分之可也不分亦無傷杜工部載湖陽公主苦難產有方士進

瘦胎飲方用枳殼四兩甘草二兩為末每服一錢白湯點服自五月後一日一服至臨月不惟易產仍無胎中惡氣也張景玄舌法機要

改以枳朮丸日服令胎瘦易生謂之東胎丸而寇宗奭行義言胎壯則子有力易生令服枳殼樂反致無力兼子亦氣弱難養所謂縮胎

易產者大不然也以理思之寇氏之說似覺為優或胎前氣感壅滯者宜用之所謂八九月胎必用枳殼蘇梗以順氣胎前無滯則產後

無虛也若氣熏弱者即大非所宜矣震亨曰難產多見于鬱悶安逸之人富貴奉養之家古方瘦胎飲為湖陽公主作也子妹苦於難產其形肥而好坐予思此與公主正相反也彼奉養之家其氣之實故耗其氣使平則易產今形肥則氣虛久坐則氣不運當補其母之氣

以紫蘇飲加補氣藥

舊三新門方

十五

傷寒呃噫枳殼半兩木香一錢為末每白湯服一錢未止再服

本事方老幼腹脹血氣凝滯用此寬腸順氣名四炒丸商州枳殼厚十數貼服之遂快產

同炒一兩用蘿蔔子一兩同炒一兩用乾漆一兩同炒一兩用蒼朮一兩只取枳殼為末以四味煎汁製麪糊和九楂子大每食後米飲下五十九王氏龍易方消積順氣治五積六聚不拘男婦老幼是氣去穰每個入巴豆仁一個食定扎煮慢火水煎一日湯減再加熱湯勿用令水待時足汁盡去巴豆切片晒乾勿炒為末醋煮楚糊丸每子大每服三四十九隨病湯使邵真人經驗方

順氣止痢為末每沸湯服二錢娶童

百疏導脚氣即上方用木瓜湯服直指方

小兒秘澀

枳殼煨去穰甘草各一錢

水煎服全幼心鑑

腸風下血末三錢五更空心米飲服人行五里再一服當日見效

簡便方用枳殼一兩黃連五

痔瘡瘻痛必效方用枳殼煨熟熨之七枚立定

本事裏治腹痛枳殼三兩炒黃芩一兩每服五錢水一

錢水一鍾煎半鍾空心服

痔瘡月漏方用枳殼末入瓶中水煎百沸先熏後洗

懷孕月漏益半煎一蓋服若張滿身重加白朮一

兩活血散不收枳殼煎湯浸之良

小兒驚風

豆豉等分為末每服一字其者半錢急驚驚癇自然汁下慢驚荆介湯入酒三五點

法機要產後腸出久即收也袖珍方

枳殼浸酒含

下日三服陳

子藥止痛枳殼浸酒含

文中小兒方風熱作痒枳殼六分去滓溫服仍以汁塗之

經驗方

小兒軟癩抹膏合鴉頭上能自出膿血盡更無疤痕也

利氣明目枳殼兩炒

下早成宿

傷寒陰證下早成宿心下滿不痛按之虛軟枳殼

危氏得效方枳殼兩炒

為末調湯下

擣榔等分為末每服三錢黃連湯調下

宣明方腸管疼痛因營傷肝炒枳殼兩桂枝生半蘇

枳殼如樹皮也或云枳

般上刮下皮也

王清風身直不得屈伸反復口僻眼斜刮皮一升酒三升漬一宿每溫服五合酒盡再作

蘇頌樹莖及皮

表脹氣鬱鬱節疼急景

根皮主治浸酒漱齒痛

煮汁服治便下衆服治野雞病有血器

嫩葉至海漁湯代茶煎

時珍
出茶譜

枸橘

綱釋名真橘
如枳實而殼薄不香人家多收種為藩籬亦或收小窠僞充枳實及青橘皮售之不可不辨

時珍曰枸橘處處有之樹葉並與橘同但幹多刺二月間白花青蕊不香結實大如彈丸形如枳實而殼薄不香人家多收種為藩籬亦或收小窠僞充枳實及青橘皮售之不可不辨

葉氣寒溫無毒

時珍曰枸橘等分存性研每茶調一錢服又治喉癰消腫毒

時珍曰枸橘根白皮等分炒研每茶調一錢服又治喉癰消腫毒

時珍曰枸橘細切炒研

時珍曰枸橘細切炒研

時珍曰枸橘細切炒研

時珍曰枸橘細切炒研

時珍曰枸橘細切炒研

時珍曰枸橘細切炒研

時久有致出臭氣發飲食用具摘葉煎湯連服必愈夏子益奇病方

葉煎湯連服必愈夏子益奇病方

刺去囊牙痛每以一盒汁含之

時珍曰初以枸橘煎湯洗患處救急方

橘核主治腸風下衆止同橘根白皮等分炒研每服一錢

時珍曰橘核等分研末每服一錢酒浸少時飲酒

時珍曰橘核等分研末每服一錢酒浸少時飲酒

樹皮主治風瘧宜不得屈伸細切一升酒二升浸一夜每日溫服半升酒盡再作

時珍曰樹皮也危子東之故名俗作梔司馬相如賦云鮮支黃檗註云鮮支即枝子

危子

本經中品釋名宋丹經越桃錄鮮枝名

時珍曰危子生南陽山谷九月米實暴乾弘景曰處處有之亦有三種小異以七棱者為良經霜乃取入染家用于藥甚稱頌曰今

集解別錄曰危子生南陽山谷九月米實暴乾弘景曰處處有之亦有三種小異以七棱者為良經霜乃取入染家用于藥甚稱頌曰今

南方及西蜀州郡皆有之木高七八尺葉似李而厚硬又似橘子二三月生白花花皆六出甚芬香俗說即西域荳蘭也夏秋結

實如訶子狀生青熟黃中仁深紅南人競種以售利更記貨殖傳云危子千石與千戶侯等言獲利溥也入藥用山危子方書所謂越桃

也皮薄而圓小刻房七棱至九棱者為佳其大而長者雷敷炮炙論謂之伏尸危子入藥無力時珍曰危子葉如鬼耳厚而深綠春榮秋

瘁入夏開花大如酒盃白瓣黃蕊隨即結實漿皮細子有贊

時珍曰危子葉如鬼耳厚而深綠春榮秋

焦去殼洗去黃髮炒用治血病炒黑用好

古曰去心胸中熱用仁去肌表熱用皮氣味苦寒無毒別錄曰大寒元素曰氣薄味厚輕清上行氣浮而味降陽中陰也暑曰沉也陰也入乎太陰肺經血分丹書危子柔全

主治五內邪氣

中熱氣面赤酒皰皮算鼻癧赤癩瘡瘍

本經曰赤熱痛胸心大小腸大熱心中煩悶

別錄曰五種黃病利五淋通小便

解渴明目主中惡殺蠭蟲毒

甄子主水毒引景羊躡躁也

主瘡疎癰風孟治心煩懊惱不得眠脣下無滯而小便不利素寫蕉火清晝

脫血治熱厥心痛解熱鬱行結氣

震卦主元氣治吐血衄血痢下血血淋損傷瘀血及傷寒勞復熱厥頭痛疝氣湯火傷

時珍發明

元素曰危子輕飄而象肺色赤

而象火故能瀉肺中之火其用有四心經客熱一也除煩燥二也去上壅虛熱三也治風四也震亨曰危子瀉三焦之人及瘧塊中火邪

最清胃脫之血其性屈曲下行能降火從小便中泄去凡心痛稍久不宜溫散反助火邪故古方多用危子以導熱藥則邪易伏而病易

退好古曰本草不言危子能吐仲景用為吐藥危子本非吐藥為邪氣在上拒而不納食令上吐則邪因以出所謂其高者因而越之也

或用為利小便藥實非利小便乃清肺也肺清則化行而膀胱津液之府得此氣化而出也本草言治大小腸熱乃辛與庚合又與丙合又能泄戊先入中州故也仲景治煩躁用危子攻渴煩者氣也躁者血也氣主肺躁主血故用危子色赤味苦入心而治煩齒色黑味

鹽入腎而治躁宋襄曰仲景治傷寒發汗吐下後虛煩不得眠若割者必反覆顛倒心中懊惱危子攻湯治之因其虛故不用大黃有寒

毒故也危子雖寒而無毒治胃中熱氣既亡血亡津液虧無潤養內生虛熱非此物不可去也又治心經留熱小便赤澀用去皮危子

火燒大黃連翹甘草等分末之水煎三錢服无不利也頌曰張仲景及古今名醫治發黃皆用危子菌陳甘草香附四物作湯飲又治

大病後勞復皆用危子鼠矢等湯舊十新十七

鼻中衄血山危子燒灰吹之屢用

危子仁十四個獨頭蒜一箇冷鹽少

利小便而愈其方極多不可悉載

附方十七有效

黎居士簡易方

小便不通許搗貼脣及囊良久即通普濟方

生山危子木滑石等分下利鮮血

危子仁燒灰水服一匙

老山危子仁培研每新汲

水服一錢七

聖惠方

熱毒血痢

危子大每服三丸日三服大效亦

可水煎服高建下痢

危子燒研空心熱酒服一匙

婦人胎腫

屬濕熱山危子一合炒研每服二

丹溪方

熱水腫疾

上焦熱者連殼用

丹溪纂要

霍亂轉筋

心腹脹滿未得吐下危子二七枚燒研細熟酒服之立愈矣

肘后方

冷熱腹痛

痔刺不思飲食山危子川烏頭等分生研為末酒糊丸如梧子大每服十五丸生薑湯下小腹痛茴香湯下

博濟方

胃脘火痛

大山危子七枚

或九枚炒焦水一盞煎七分入生薑汁飲之立止復

發者必不效用玄明粉一錢服立止

丹溪纂要 丹溪纂要

同煎飲之其捷

丹溪纂要

熱病食復及交接后發動欲死不能語危子三十

小兒狂躁畜熱在下身熱狂躁昏迷不食危子仁七枚豆豉五錢水

盤腸釣風 越桃仁

半兩草

放水三升煎一升服令微汗 梅師方

烏頭少許同炒過去草烏入白芷一錢為末每服半錢茴香忽白酒下

普濟方 赤眼腸秘

山危子七個鑽孔煨熟水一升煎半升去皮水

滓并入大黃末三錢溫服下

普濟方 喫飯直出

煎湯服下

怪證奇方

頭痛不可忍危子木和蜜濃濃研末炒黃蟻和丸彈子大每服一丸嚼細

茶下日二服忌酒勿煎久

許學士本事方 火燒丹毒

之梅師方

已成瘡燒白糖灰

眉中練解危子燒研和油傅之

折傷腫痛

危子白蔻同搗金石硫黃等分

湯溫火燒

危子末和

粉之 千金方

眉中練解危子燒研和油傅之

保幼大全方

集簡方

狗咬

犬咬

雞子清濃

掃之 救急方

花王治燒顏色千金翼西膏用之

時附錄木戰 別錄有名未用曰生山中葉如危子味辛溫無毒主皮癬氣在臍腑

酸棗

本經釋名 柔山

山棗集解 別錄曰酸棗生河東川澤八月采實陰乾四十日成弘景曰今出東山間云即山棗樹子似武昌棗而味

酸者是今醫以棘實為酸棗大誤矣臧器曰酸棗既是大棗中之酸此即是貢棗何復名酸既名酸又云小今棗中酸者未必即酸惟嵩陽子云全家於滑臺今酸棗縣即滑之屬也其樹高數丈徑圍一二尺木理極細堅而且重可為車軸及匙柄等其樹皮亦細而硬文似蛇鱗其棗圓小而味酸其核微圓而仁稍長色赤如丹此醫之所重居人不易得今市人賣者皆棘子也又云山棗樹如棘其子如生棗其核如晉其肉酸滑好食山人以當果頃曰今近汴洛及西北州郡皆有之野生多在坡坂及城廬間似棗木而皮細其木心赤色莖葉俱青花似棗花八片結實紫紅似棗而圓小味酸當月采實取核中仁孟子曰養其撢棗是也嵩陽子言酸棗縣所出為真今之貨者皆是棘實用者尤宜詳辨王曰酸棗即棘實更非他物若云是大棗味酸者全非也酸棗小而圓其核中仁微扁其大棗仁大而長不相類也宗奭曰天下皆有之但以上產宜與不宜論嵩陽子言酸棗本高大今貯者皆棘子此說未盡蓋不知小則為棘大則為酸棗平地則易長居崖巒則難生故棘多生崖巒上久不樵則成熟人方呼為酸棗更不言棘其實一本也此物纏及三尺便開花

結子但料小者氣味薄木大者氣味厚今陝西臨潼山野所出亦好乃土地所宜也後有白棘條乃
酸棗木長太時枝上刺也及至長成其實大其刺亦少故叢取大木刺取小料亦何必強分別焉

酸棗氣味平無毒

宗奭曰微熱時珍曰仁味甘氣平緩曰用

主治腹寒熱邪結氣聚四肢酸痛濕痹久服安五臟輕身延年

本經

煩心不得眠臍上下痛

轉久洩虛汗煩渴補中益肝氣堅筋骨助陰氣能令人肥健

別錄筋骨風火研湯服

新編卷一百一十一不得眠不用言仁

今方皆用仁補中益肝堅筋骨助陰氣皆酸棗仁之功也

宗奭曰酸棗經不言用仁而今天下皆用之志曰按五代史後唐刊石藥驗云

酸棗仁睡多生使不得睡炒熟陶云食之醒睡而經云廢不得眠蓋其子肉味酸食之使不思睡核中仁服之療不得眠正如麻黃於汗

根節止汗也時珍曰酸棗實味酸性收故主肝病寒熱結氣酸癆久泄臍下滿痛之症其仁甘而潤故熟

用瘡瘍虛不得眠須渴虛汗之證生用療瘍熱好眠皆足厥陰少陽藥也今人專以為心家藥殊昧此理

附方新二臍風沉睡臍風毒氣昏沉多睡用酸棗仁一兩生用全梃蠟茶二兩以生薑汁全蠟茶

心多驚悸用酸棗仁一兩炒香搗為散每服二錢竹葉湯調下

灸微焦為散每服二錢水七分煎六分溫服

簡要濟衆方臍虛夜不眠深師方酸棗仁湯用酸棗仁二升蠟母乾薑半錢各二

粒先煮一斗水一斗半加酸棗仁減三升乃同煮取三升和劑局方加入麥門冬砂半兩乳香二錢半陳皮丸服

悸不眠

胡治方酸棗仁湯用酸棗仁二升白伏苓生白朮人參甘草各二兩水八升煮三升

圖經

虛煩不眠

兩甘草炙一兩以水一斗先煮酸棗仁減三升乃同煮取三升

酸棗仁入參茯苓等分為末

分服

圖經本草

骨蒸不眠

心煩用酸棗仁一兩水一盞研絞取汁下粳米一合

中汗出

酸棗仁人參茯苓等分為末

每服一錢米飲下

簡便方刺入肉中水服立出

經本草

骨蒸不眠

養鴻臚熟下地黃汁一合再煮勺食

太平聖惠方日中汗出

每服一錢米飲下

秘要

白棘

本經正併入別錄葉之東南錄東鍼赤龍爪

別名刺原錄赤刺別名馬胸音近時珍曰獨生而高者為棗列生而低者為棘故

棘刺花中品校正棘刺花

別名刺

別錄葉之東南錄赤刺別名馬胸音近時珍曰獨生而高者為棗列生而低者為棘故

棘刺與大薺同

集解引別錄曰白棘生雍州川谷棘刺花生道旁冬至後一百二十日采之四月采實當之曰白棘是酸棗樹鍼今人用天

名非一物也

種切韻云棘小棗也田野間皆有之

高三二尺花葉莖葉俱似棗也

宗奭曰本文白棘一名棘鍼棘刺如此分明諸家疑生疑惑今不

取之白棘乃是肥盛紫色枝自有微毒白膜先剝起者故白棘取白之義不過如此

白棘

氣味辛寒無毒主治心腹痛癰腫脢上痛決刺結本經療大夫虛損陰痿精自出補腎氣益精髓棗鍼療腰痛喉痺不通

錄附

舊五方新七 小便尿血

棘刺三升水五升煮二升分三服外臺秘要腹脢刺痛一蓋煎五分入好酒半盞更煎三五沸分二服

因腎臟虛冷不可忍者棘鍼鉤子一合焙檳榔一錢半水頭風疼痛九個燒存性丁

赤龍水倒鈎棘也一百二十個地龍一條木賊一百二十節木鱉一百枚即棗樹刺

香一個麝香一皂子為末

眼聾牽毛子仁二個炒為末摘去睫毛每日以此噙鼻三五次

聖惠方普濟方

隨左右噙鼻水煮棘根汁洗

升含漱或燒活血水服

驚風不乳白棘燒末一小兒口噤水服一錢

聖惠方千金方

棘鍼燒灰水服一錢聖惠方之

傳推黃末即愈小臺秘要半錢聖惠方

小兒丹毒水煮棘根汁洗

小兒口噤水服一錢聖惠方千金方

棘鍼燒灰水服一錢聖惠方之

月之又方曲頭棘刺三百枚陳橘皮一兩水五升煎一升半分服

聖惠方諸腫有膿一夜頭出千金方

棘鍼燒灰水服一錢小兒諸疳棘鍼爪蒂等分

棘刺治瘍油膏解瘡藥

別錄氣味苦無毒主治金瘡內漏錄附

時珍曰爾雅棘刺生西山弘景曰今出彭城大如烏豆形圓而扁有文理狀似胡桃核今人皆名棘核

棘刺花

氣味苦無毒主治金瘡內漏錄附

別錄曰棘核生西山弘景曰今出彭城大如烏豆形圓而扁有文理狀似胡桃核今人皆名棘核

棘刺治瘍油膏解瘡藥

別錄氣味苦無毒主治金瘡內漏錄附

時珍曰爾雅棘刺生西山弘景曰今出彭城大如烏豆形圓而扁有文理狀似胡桃核今人皆名棘核

葉主治瘍瘍瘍傳子奇晒研麻油調傳

時珍曰爾雅棘刺生西山弘景曰今出彭城大如烏豆形圓而扁有文理狀似胡桃核今人皆名棘核

棘核

楚辭賦誰功釋名昌黎音棘時珍曰爾雅棘白而此也其花實棘刺

別錄曰棘核生西山弘景曰今出彭城大如烏豆形圓而扁有文理狀似胡桃核今人皆名棘核

破取仁秤之保昇曰今出班州樹生細葉似枸杞而根長化白子附莖生紫赤色大如五味子甚多細刺五月六月熟采實日乾頃曰今河東并州亦有之木高五七尺莖間有刺時珍曰郭璞云白桺小木也叢生有刺窠如耳墻紫赤可食即此也

仁眉治

毅曰凡使蕤核仁以湯浸去皮大擘作兩片毋四兩用

芒硝一兩木通草七兩同水煮一伏時取仁研膏入藥

氣溫無毒

別錄曰微寒善曰神農雷公

甘無毒生平地八月采之

主治心腹邪熱結氣明目

目赤痛傷淚出腫皆爛久服輕身益氣不飢

本選志明耳目

吳普破心下結痰瘡鼻竇

別錄曰醫

氣溫無毒

甘無毒生平地八月采之

主治心腹邪熱結氣明目

方惟以療眼

仙經以合守中丸也

頃曰按劉禹錫傳信方所著治眼法最奇云眼風症或生翳或赤皆一切皆主之宣州黃連末蕤核仁

去皮研膏等分和勻取無妙乾棗二枚剝下頭去核以二物填滿却以割下頭合定用少薄綿包之大茶盞盛於銀器中文武火煎取一

雞子大以綿濾罐收點眼萬萬不失前後

新方

春雪膏

治肝虛風熱上攻眼目昏暗疼痛隱深赤腫羞明不能遠視迎風有淚多見黑

試驗十數人皆應今醫家亦多用得效也

附方七

花用蕤仁去皮壓去油二兩腦子二錢半研勻生蜜六錢和收點眼

和劑局

方百點膏

治一切眼疾蕤仁去油三錢甘草防風各六錢黃連五錢共搗二十下

錢以三味熬取濃汁次下蕤仁膏日點

孫氏集效方

蜜膏如泥罐收點之

又方蕤仁一兩去油入白蓬砂一錢麝香二

分研勻收之去皮細辛半兩苦竹葉三握洗水

赤欄眼近效方用蕤仁四十九個去皮胡粉煅如金色一雞子大研

翳妙不可言

飛龍二升煎一升慮汗頻濕洗之

聖濟總錄

赤欄眼入酥一杏仁許龍腦三豆許研勻油紙裹收每以麻子許

塗大小皆上頻用取效

經驗良方用蕤仁杏仁各

一而去皮研勻入臘粉少許為丸每用熱湯化洗

經驗良方用蕤仁

各

目翳

別錄曰

吳普宗奭曰山茱萸與吳茱萸甚不相類治療大不同未審何緣

別錄曰

茱萸生漢中山谷及鄒琊句東海承縣九月十月米是陰氣頃曰葉如梅有刺二月開花如杏四月實如酸棗赤色五月米實引景曰

出近道諸山中大樹子初熟未乾赤色如胡頹子亦可噉既乾皮甚薄當合核用也

頃曰今海州兗州亦有之木高丈餘葉似榆花白色

雷巖地氣論言一種雀兒酥真相似只是核

八拔不入藥用時珍曰雀兒酥即胡頹子也

豐曰凡使以酒潤去核取皮一斤只取四而已來緩

氣味酸平無毒

別錄曰溫善曰神農黃帝雷公扁鵲酸無毒岐伯辛樞

實脩治火熱乾方用能壯元氣秘精其核能滑精不可服

曰誠平大熱好古曰陽中之陰入足厥陰少陰經氣分之

卷三十六 本部

九

才曰葉裏爲之使主治心下邪氣寒溫中逐寒還寒去三蟲入服輕身本腸胃風邪寒熱疝瘕頭風風氣去來鼻塞冒黃鼻癰面惡桔梗防風防已

氣出汗淫陰益精安五臟通九竅止小便利久服明日強力長年別治海膽膏療耳鳴補腎氣與陽道堅陰莖添精髓止老人尿少節治

面上瘡能發汗止月水不定

熱壅火腰膝助水臟除一切風逐一切氣破癥結治酒皁大明溫肝元陰月好古曰滑則氣脫澑劑所以收之山

以收滑也仲景八味丸用

附方新

草還丹益元陽補元氣固元精杜元神乃延年續嗣之至藥也山茱萸酒浸取肉一斤破故紙酒浸培

之為君其性味可知矣

附方草還丹乾半斤當歸四兩麝香一錢為末煉蜜九倍子大每服八十九丸臨臥盃酒下吳吳扶壽方

胡頹子

拾遺

釋名蒲頹子

細目

盧都子

細目

雀兒酥

細目

半含春

細目

董婆煩

細目

益人陳減器又於山茱萸下詳著之別无識者今攷訪之即雷敷

炮炙論所謂雀兒酥也雀兒喜食之越人呼為蒲頹子南人呼為盧都子吳人呼為半含春言早熟也襄漢人呼為黃婆煩象乳頭也劉績霏雪錄吉安南有小果紅色名盧都子則盧都乃蠻語也其葉微似蒙梨長狹而尖面青背白俱有細點如星老則莖起如麤經冬不凋春前生花朵如丁香葉極細倒垂正月乃數白花結實小長儼如山茱萸上亦有細星斑點生青熟紅立夏前采食酸澆核亦如山茱萸但有八棱軟而不堅核內白綿如絲中有小仁其木半夏樹葉花實及星斑氣味並與盧都同但枝強硬葉微圓而有尖其實圓如櫻桃而不長為異耳立夏後始熟故吳楚人呼為四月子亦曰野櫻桃其核亦八棱大

抵是一類二種也

子氣味酸平無毒

弘景曰寒熱病不可用

主治止水痢

藏器

根氣味

同王

治湯洗惡瘡疥并大馬瘧瘧吐血不止煎水飲之喉痙癇塞前酒灌之皆效時珍

藏器

葉氣味

同王

治肺虛短氣喘嗽劇者取葉焙研米飲服一錢時珍曰蒲頹葉治喘嗽方出中藏經云甚者亦效如神云有人患

時珍

三十年服之頓愈甚者服藥後胸上生小癰瘍作癰則瘥也

盧都

時珍

三十年服之頓愈甚者服藥後胸上生小癰瘍作癰則瘥也

甚加入參等分清肺散大抵皆取其
酸澀收斂肺氣耗散者之功用耳

金櫻子

蜀本草

釋名刺梨子

開

山石榴

綱

山雞頭子

時珍曰

金櫻當作金鶯謂其子形如黃鸝也

石榴雞頭皆象形又杜鵑花小

集解

韓保昇曰金櫻子在處有之花白子形似楊柳而小色黃有刺方術多用之

頌曰今南中州郡多有而以江西劍南嶺外者為勝叢生郊

野中大類苦櫟有利四月開花白夏秋結實亦有刺黃赤色彩似小石榴十一月十二月采江南蜀中人熬作煎酒服云補治有殊效宜

州所供云本草謂之營實令收之與營實殊別也時珍曰山林間甚多花最白

膩其實大如指頭狀如石榴而長其核細碎而有白毛如營實之核而味甚澗

子氣味酸澗平無毒主治脾洩下痢止小便利澗精氣久服令人耐寒輕身

蜀本草

附明

頌曰洪州昌州皆煮其子作煎寄餽人服食家用

日煎和雞頭實粉為丸服名水陸丹益氣補真氣微

曰沈存中筆談云金櫻子止遺泄取其溫且毒也世人待紅熟時取汁熬膏味甘全斷澗味都失本性大誤也惟當取半黃者乾搗末

用之宗奭曰九月十月霜熟時採用不爾反令人痢震亨曰經絡隨道以通暢為平和而昧者取澗性為快熬金櫻為煎食之自不作清

苔其抑將誰執時珍曰无故而服之以取快

舊一新二

附方

金櫻子煎

霜後用竹夾子摘取入木臼中杵去刺壁去核以水淘洗過搗爛入大

鍋水煎不得絕火煎減半濾過仍煎似稀湯每服一匙用淡酒一盞調

飲則不可若精氣不固者服之何咎之有

嚴繫絕妙方

瞿栗殼炒金櫻花葉

服活血駐顏其功不可

嚴繫絕妙方

瞿栗殼炒金櫻花葉

七丸陳皮煎湯化

下之
普濟方

花氣味

同

主治止冷熱痢殺寸白蟲和鐵粉研勻拔白髮塗之即生黑者亦可染鬚

大明

葉

蜀本草

治癰腫

研爛入盆塗之留頭淺氣又金瘡出五月吾采同桑葉茶葉等分陰乾研末傅之

止口合名軍中一捨

金珍

東行根氣味

同主治白蟲

割一兩入糯米三十粒水二升煎五合空心服須臾瀉下神驗其皮炒用止瀉血及崩中帶下大止

滑利煎醋服化骨硬珍時

郁李

本經下品釋名蕡李疏

別名李車下李錄

本經

詩

本經

詩

本經

詩

本經

本經

本經

曰郁李生高山川谷及邱陵上五月六月采根弘景曰山野處處有之子熟赤色亦可致保昇曰樹高五六尺葉花及樹並似大李惟子小若櫻桃甘酸而香有少清味也禹錫曰按郭璞云棠棣生山中子如櫻桃可食詩小雅云棠棣之華鄂不韙韓陸機注云白棣樹也如李而小正白今官園種之一名薁李又有赤棣樹亦似白棣葉如刺榆葉而微圓子正赤如郁李而小五月始熟關西水麓西多有之宗奭曰郁李子如御李子紅熟堪嚼微澀亦可蜜煎陝西甚多時珍曰其花粉紅色實如小李頌曰今汴洛人家園圃植一種枝莖作長條花極繁密而多葉者

亦謂之郁李不堪入藥

核仁

別名核治

本經

氣味酸平無毒

性平無毒

中之陽脾經氣分藥也

主治

大腹水腫面目四肢浮腫利小便水道

經

本經

本經

腸中結氣關格不通

別名壅塞

本經

氣味酸平無毒

性平無毒

中之陽脾經氣分藥也

主治

大腹水腫面目四肢浮腫利小便水道

經

本經

本經

大腸氣滯燥濁不通

李子研和龍膽點赤眼

本經

氣味酸平無毒

性平無毒

中之陽脾經氣分藥也

主治

大腹水腫面目四肢浮腫利小便水道

經

本經

本經

病盡為限不得食酪及牛馬肉等累試神驗但須量病輕重以意加減小兒亦可用

附方舊四

新二

小兒多氣

服二合

姚和衆至寶方

小兒閉結

福祿小兒大小便不通并營氣壅實欲得活動者

大黃酒浸炒

郁李仁去皮研各

熱米湯以利為度利不止以醋飯止之利後當虛冷病未盡一二日量力更進一服

姚和衆至寶方

不得臥用郁李仁一大合搗末和

錢滑石末一兩搗和丸泰米大二歲小兒三丸量人加減白湯下一錢乙直訣

腫滿氣急

趁作餅吃入口即大便通泄氣便

愈 楊氏

心腹滿大小便不通氣急喘息者郁李仁十二分搗爛水或溫湯下須
產乳方 研絞汁以薑搗如粟大三合同煮粥食之

韋禹獨行方 卒心痛刺史痛止却呻薄荷鹽湯 姚和眾至寶方 皮

筋

膿血汗 郁李仁去皮研一錢鵝梨
搗汁調下 聖濟總錄

根氣味酸涼無毒

主治斷腫癰瘍

去風寒

治風虫牙痛濃煎含漱治小兒身熱作湯浴之

明宣結氣破積聚

大經

小經

蘋

鼠李

本經

下品

釋名

猪李

錢別

牛李

別

牛皂子

綱

音卑時珍曰鼠李方音亦作楊李木

目

烏楂子

圖

詳名義可以染絲故俗稱皂李及烏

巢巢孫趙皆皇子之音訛也

一種

集角別錄曰鼠李生田野米無時頃

即烏巢子也今蜀川多有之枝葉

如李其實若五味子色堅黑

苦揪亦名鼠梓與此不同見梓下

其汁紫色熟時采日乾用皮米無時宗奭曰即牛李也木高七八尺葉如李但伏而不澤子於條

上四邊生生時青熟則紫重已至秋葉落尚在枝是處皆有令闕陝及湖南

江南北甚多時珍曰生道路邊其實附枝如穗人采其嫩者取汁刷漆綠色

子

氣味苦涼微毒

主治寒熱癆瘍

本經

水腫腹脹滿

大下血反碎肉除瘀積

冷九蒸酒清服三合日再服又搗牛馬六畜瘡

畫

本經

痘瘡癰疽及癰癧

有蟲時珍曰

牛李治痘瘡黑陷及出不快或觸穢氣熏陷古昔無知之者惟針乙小兒直針必勝膏耳

珍發明之云牛李子即鼠李子九月後采黑熟者入砂盆搘爛生絹捩汁用銀石器熬成膏收貯常

令透風每服一皂子大煎桃膠湯化下如人行二十里再進一服其瘡自然紅活入麝香少許尤妙如無生者以乾

新附方

諸瘡寒熱毒

大諸瘡寒熱

口瘡

禹禹

牛李煮汁空腹飲一盞

搗傳之

聖惠方

齒齦腫痛

牛李煮汁空腹飲一盞

仍頻含漱

聖濟錄

皮

氣味苦微寒無毒

本經曰皮子俱有

王治身皮熱毒

別

風痔

大諸瘡寒熱

蘇

口瘡

禹禹

齒齦

良說發明

頌曰劉禹錫傳信方治大人口中瘡發背不失一用山李子根一名牛李子薦微根野外者各細切五升水五大斗煎半日汁濃即

於銅銀器中盛之重湯煎至一二升待稠煮瓶收貯每少許含其瘡已瘥忌鹽醋油膩熟麪及肉如發背以帛塗貼之神效襄州軍事柳宗

妻李氏患口瘡十五年齒

盡落斷不可近用此而愈

女貞

本經釋名貞木山海經

冬青

蠟樹

時珍曰

此木凌冬青翠有贞守之操故以貞女狀之琴操載曾有處女見女貞木而作歌者即此

目蠟樹也蘇頌序云女貞之木一名冬青負霜慾翠振柯凌風故清士欽其質而貞女慕其名是矣別

有冬青與此同名今方書所用冬青皆此

女貞也

近時以放蠟虫故俗呼為蠟樹

集解

皮為表裏其樹以冬生可愛仙方亦食服之俗方不復用人無識者悉曰女貞葉似冬青

樹及狗骨其實九月熟黑似牛李子陶言與秦皮與秦皮葉細冬枯貞葉大冬茂殊非類也頌曰女貞處處有之山海經云秦

山多貞木是也其葉似狗骨及冬青木凌冬不凋五月開細花青白色九月實成似牛李子或云即今冬青樹也而冬青木理肌白文如

象齒實亦治病頌南一種女貞花極繁茂而深紅色與此殊異不聞入藥時珍曰女貞冬青狗骨三樹也女貞即今俗呼蠟樹者冬青即

今俗呼凍青樹者狗骨即今俗呼猶兒刺者東人因女貞茂盛亦呼為冬青與冬青同名異物蓋一類二種耳二種皆因子自生最易長

其葉厚而柔長綠色面青背淡女貞葉長者四五寸子黑色凍青葉微元子紅色為異其花皆繁子並墨紫滿樹冬月鸚鵡喜食之木肌

皆白膩今人不知女貞但呼為蠟樹立夏前後取蠟虫之種子更置枝上半月其虫化出延緣而上造成白蠟民間大得其利詳見虫部

白蠟下狗骨

詳見本條

實氣味苦平無毒

時珍曰溫主補中安五臟養精神除百病久服健輕身不老

本經強陰健腰膝白髮明日

時珍曰女貞實

藥而古方罕知用者何哉典術云女貞木乃少陰之精故冬不落葉觀此則其益腎之功尤可推矣世傳女貞丹方云女貞實即冬青樹

子去梗葉酒浸一日夜布袋擦去皮晒乾為末待早蓮草去多取數百搗汁熬濃和丸梧子大每夜酒送百丸不旬日間督力加倍老者

即不夜起又能變白髮方新

時珍曰

人服髮白再黑返老完童用女貞實十月上已日收陰乾用時以酒浸一日蒸透晒乾一斤四

為黑色強腰膝起陰氣附一虛損百病兩早蓮草五月收陰乾十兩為末桑根子三月收陰乾十兩為末陳葛丸如梧子大每服七八

丸淡鹽湯下若四月收桑椹搗汁和藥七

風熱赤眼

冬青子不以多大搗汁熬膏淨瓶收固

月收早蓮搗汁和藥即不用蜜矣簡便方

眼埋地中七日每用點眼

濟急仙方

葉氣味微苦無毒主治除風散血消腫定痛治頭目昏痛諸惡瘡腫疔瘡潰爛久者以水煮乘熱貼之頻煥易水醋者亦可口

童瘡舌腫脹出搗汁含浸延時

新珍附方

普濟方用冬青葉五斗搗汁浸新磚數片五日搗坑駕磚於內蓋之日久生霜刮

三

風熱赤眼下入腦子少許點之簡便方用雅州黃連二兩冬青葉四兩水浸三日後熬成

膏收

一切眼疾

冬青葉研糊入朴硝貼之海上方也

普濟方

黑眼

黑眼

黑眼

黑眼

冬青

細目校正原附女貞葉

之凍青

藏器曰冬月青翠故名

集解

山似椿子赤如郁李微酸性熱與此小異當是兩種冬青時珍曰凍青亦

女貞別種也山中時有之但以葉微圓而子赤者為凍青葉長而子黑者為女貞按救荒本草云凍青樹高大許樹似狗骨子樹而極茂

盛又葉似櫟子樹葉而小亦似椿葉微窄而頭頸圓不尖五月開細白花結子如豆大紅色其嫩芽滌熟水浸去有味淘洗五味調之可食

子及木皮氣味甘苦涼無毒主治酒去風虛補益肌膚皮之功

同藏器

葉主癰疽及入面膏治瘡瘍滅瘢痕殊效

蘇新集解

冬至日取凍青樹子鹽酒浸一夜九蒸九晒瓶

狗骨

細目校正原附女貞葉名狗兒刺

藏器曰此木肌白如狗之骨時珍曰葉有五刺

如狗刺如狗之形故名又衛矛亦名狗骨與此同名

集解

藏器曰狗骨樹如杜仲詩雲南山有狗是也陸機詩疏云山木也其狀似櫟木理白滑可為函

板有木虫在葉中卷之如子羽化為魚鴨曰多生江浙間南人取以旋器甚佳時珍曰狗骨樹如女貞肌理甚白葉長二三十寸青翠而厚

硬有五刺角四時不凋五月開細白花結實如女貞及接穗子九月熟時鮮紅色皮薄味甘核有四瓣人采其木皮煎膏以粘烏雀謂之

鵝

木皮氣味微苦涼無毒主治酒補腰脚令健

同藏器

枝葉氣味同王治燒灰淋汁或煎膏塗白癩

同藏器

本草綱目

卷三十六

十二

衛矛

本經
中品

鬼箭

別錄
時珍曰劉熙釋名言齊人謂箭羽為衛此物幹有直羽如箭羽矛刃自衛之狀故

神箭

名張擣廣雅謂之神箭冠宗廟衍義言人家多繩之遺崇則三名又或取此义也

集角

山谷八月采陰乾普

以

所在山分皆

以後生莖莖長四五尺許其幹有三羽狀如箭羽葉似山茶青色八月十一月十二月采陰乾其本亦名狗骨頭曰所在山分皆

有平陸未嘗見也葉絕少其莖黃褐色若築皮三面如鋒刃人家多繩之遺崇方樂少用時珍曰鬼箭生山石間小株成叢春長嫩條條

上四面有羽如箭羽視之若三羽耳青葉狀似野茶對生味酸澀三四月開碎花蕊綠色結實大如冬青子山人不識惟樵米之穀曰凡

使勿用石弟根頭真相似

數曰米得只使箭頭用拭去赤毛

只是上葉不同味各別耳

修治以酥拌炒每一兩用酥二錢半

氣味苦寒無毒

善曰神農黃帝苦無毒天

主治女子崩中下血腹滿汗

經解

瘡婦人血氣大效

蘇恭曰破陳血能活胎主百邪鬼魅

通月經破

瘀

頌曰古方崔氏瘡惡症在心痛不可忍有鬼箭羽湯妙僧坦集驗方療卒暴心痛

人產後血運血結血聚於胸中或偏於少腹或連於脇肋者

明確曰急氣毒痛大黃湯亦用之並大方也見外臺秘要千金諸書中時珍曰凡婦

四物湯四兩倍當歸加鬼箭紅花玄胡索各一兩為衣煎服

附方二產後敗血

兒枕塊硬疼痛發歇及新產乘虛風寒內搏惡寒不快膈

腹堅脹當歸散用當歸炒鬼箭去中心末紅藍花各一兩

每服三錢酒一大盞煎七

鬼箭羽鰓鱗甲燒灰二錢半為末每以一字發時噙鼻

又法鬼箭羽

細音
分食前溫服

和劑局方

鬼瘡

瘡末一分研霜一錢五靈脂一兩為末發時冷水服一錢

並聖濟總錄

山礬

釋名香

音石楠

木槿

定林

花

鄭

楊

暢

春桂

俗名

七里香

時珍曰芸盛多也老子曰方物芸芸是也此物山野叢生甚多而花繁香

詎鄭為瑤也黃庭堅云江南野中槿花極多野人采葉集

時珍曰山礬生江淮蜀中樹者大者株高丈許其葉似扁子葉生不對

葉以染紫為點不借攀而成子因以易其名為山礬集節光澤堅強畧有齒凌冬不凋三月開花繁白如雪六出黃蕊其芬香結子

大如椒青黑色熟則黃色可食其葉味澁人取以染黃及收豆腐或雜入茗中按沈括筆談云古人藏書辟蠹用芸香謂之芸草即今之

七里香也葉類豌豆作小叢生吸嗅之極芬香秋間葉上微白如粉污辟蠹殊驗又按蒼頡解語云芸香似邪蒿可食辟紙蠹許慎說文

云芸似苜蓿成公綏芸香賦云莖類秋竹枝象青松卯義恭廣志有芸香勝杜陽編云芸香草也出于閩國其香潔白如玉入土不朽元

載達芸暉堂以此為屑塗壁也據此數說則芸香非一種沈氏指為七里香不知何據所謂葉類豌豆吸嗅芬香秋間有粉者亦與今之

七里香不相類狀頗似烏藥葉吸沈氏亦自臆度耳曾端以七里香為玉芷花未知的否

葉氣味酸濃微甘無毒李淳甫用半斤同老薑三斤浸水蒸熟洗爛弦風眼

時珍

梗木

拾集角時珍曰此木今無識者其狀頗近山礬恐古今稱謂不同耳姑附其後

洗瘡癰搗碎封蛇傷

藏器

南燭

宋開寶釋名南天燭經南燭草木隱訣上男犧同染赤上猿舌草同草木之王上惟那木同牛筋拾烏飯草同墨飯草同楊桐同赤者多

燭時珍曰南燭諸名多不可解藏器曰取十

集角時珍曰南燭生高山經冬不凋頌曰今惟江東州郡有之株高三五尺葉類芭蕉而小

燭青木作鳥飯食之健如牛筋故名曰牛筋

集角凌冬不凋冬生紅子作穗人家多植庭除間俗謂之南天燭不拘時采枝葉用陶器居

登真隱訣載太極真人青精乾石飽飯法云其種是木而似草故號南燭草木一名男犧一名猴藥

集角一名後草一名惟那木一名草木之

王凡有八名各從其邦域所稱而正號是南燭也生嵩高少室抱犧雞頭山江左吳越至多土人名曰猴叔或曰染叔粗與真名相彷彿

也此木至難初生三四年狀若於菜之屬亦頗似瓦子三十一年乃成大株故曰木而似草也其子如朱臾九月熟酸美可食葉不相

對似芒而圓厚味小酢久夏常青枝葉微紫大者亦高四五丈而甚肥脆易摧折也作飯之法見穀部青精乾石飽飯下時珍曰南燭吳

楚山中甚多葉似山蓼光滑而味酸澀七月開小白花結實如朴樹子成熟生青九月熟則紫色內有細子其味甘酸小兒食之按古今

詩話云即楊桐也葉似冬青而小臨水生者尤茂寒食采其葉漬水染飯色青而光能資湯氣又沈括筆談云南燭草木本草及傳記所說人少識者北人多誤以烏臼為之全非矣今人所謂南天燭是妄空如藉

蓋有節高三四尺廬山有盈丈者南方至多葉微似棟而小秋則實赤如丹

枝葉氣味平無毒

時珍曰王淳甫除瘴筋益氣又服輕身長年不飢變白却老

藏器曰孫思邈千金月令方南燭煎益氣及容顏兼補緩三月三日采葉并嫩

子入大淨瓶中乾盛以童子小便浸滿瓶固濟其口置閑處經一周年取開每用一匙溫

酒調服一日二次極有效驗王元寶經曰服草木之王氣與神通食青燭之精神不復殞

方二舊一切風疾久服輕身明目黑髮駐顏用

南燭樹春夏取枝葉秋冬取

根皮細剉五斤水五斗慢火煎取二斗去滓淨鍋慢火煎如稀飯或

瓶盛之每溫酒服一匙日三服一方人童子小便同煎

時

聖惠方 懷石銅鐵 不下用南燭根燒研熱水

調服一錢即下

聖惠方

子氣味酸甘平無毒主治強筋骨益氣力固精駐顏

時

青精飯

見穀部

五加

本經上品

釋名

五佳

細

地文

文章草

綱目

白刺

追風使

圖

木骨

金盞

仙人指

別錄

本草

別節

加又名五花

楊慎丹鉛錄作五桂

云一枝五

絏

經

別錄

別節

別錄

別錄

葉者佳故也蜀人呼為白刺誰周巴蜀異物志名文章草有贊云文章作酒能成其味以金盞草不言其實是矣本草對漆羽節之名不知取何義也頌曰蘄州人呼為木骨吳中俗名追風使者陰乾弘景曰近道處處有之東間彌多四葉亦好煩曰今江淮湖南州郡皆有之春生苗莖葉俱青作葉赤莖又似藤葛高三五尺上有黑刺葉生五枚作簇者良四葉二葉者最多為次每一葉下生一刺三四月間白花結青子至六月漸黑色根若荆根皮黃肉白色骨硬一說今有數種京師北地者大片類秦皮黃葉莖平直如板而色白絕無氣味療風癟頗效餘無所用吳中乃剝野椿根皮為五加柔韌而無味殊為乖失今江淮所生者根類地骨皮輕脆分香其莖莖有刺類蕘薇長者至丈餘莖葉五出香氣如撤櫻春時結實如豆粒而扁青色得霜乃紫黑色但名為追風使以清酒療風乃不知其為真五加皮也今江淮吳中往往以為藩離正似薈薇金銀葦而北方多不知用此種號曰五加皮樹本是白楸樹其上有葉如蒲葉三花者是雄五加者是雌陽人使陰陰人使陽刺皮陰乾機日生

南地者類草故小生北地者類木故大時珍自春月於舊枝上抽條葉山人採為蔬如正如枸杞

生北方沙地者皆木類南方堅地者如草類也唐時惟取峽州者充貢雷氏言葉如蒲者非也

根皮

同氣味辛溫無毒

之才曰遠志為之

使更宜蛇皮

主治心腹疝氣腹痛益氣療癰小兒三歲不能行瘡瘍陰蝕

經男子陰瘻囊下濕小

便餘瀝女陰痒及腰脊痛兩脚疼痺風弱五緩虛羸補中益精堅筋骨強志意久服輕身耐老

別錄石逐惡風血四肢不遂賊風傷人軟

脚腫腰痛多年瘀血在皮肌治瘻濕內不足

動

明酒

大藥

飲治風痺四肢急

頃作末浸酒飲

脚腫腰痛多年瘀血在皮肌治瘻濕內不足

動

明酒

大藥

飲治風痺四肢急

頃作末浸酒飲

治目僻眼聾

雷

葉作蔬食

東膚風濕

太陰

弘景曰

煮根莖

釀酒飲益人道家用

此作灰煮石與地榆並有秘法

價微曰東華真人教

何不食石用玉政玉政地榆也金盃五加也皆是慈石而餌得長生之藥也昔王緯子董士固相與言云盃得一把五加不用金玉滿車

盃得一斤地榆不用明月寶珠又昔魯定公母服五加酒以致不死尸解而去張子聲揚達始王叔牙于世彥等皆服此酒而房室不絕

得壽三百年亦可為散以代湯茶王君云五加者五車星之精也水應五湖人應五德位應五方物應五車故精入莖則應東方之流

白氣入節則有西方之津赤氣入花則有南方之光玄精入根則有北方之精黃煙入皮則有戊己之靈五神鎮生相轉育成餌之者真

仙服之者反嬰時珍曰五加治風濕痺痺壯筋骨其功良深仙家所述雖若過情蓋贊詞多溢亦常理耳造酒之方用五加根皮洗淨去

骨莖葉亦可以水煎汁和麴釀米酒成時時飲之不可煮酒飲加遠志為使更良一方加木瓜煮酒服試野翁試驗方云神仙煮酒法用

五加皮地榆刮去粗皮各一斤袋盛入無灰好酒二斗中大罐封固安大鍋內文武大煮之罐上安米一合米熟為度取出火毒以渣

乾為丸每旦服五十九藥酒送下臨卧再服能去風濕壯筋骨順氣化痰添精補髓久服延年益老功難盡述王綸醫論云風病飲酒能

生痰火惟五加一味浸酒日飲數杯最有效方

舊二

虛勞不足

五加皮枸杞根白皮各一斗水一石五斗煮汁七斗分取四

益諸浸酒總惟五加與酒相合且味美也附方

新六

虛勞不足

斗浸麴一斗以三斗拌飯如常釀酒法待熟飲

千金方男婦脚氣

骨

皮膚腫疼痛服此進飲食健氣力不忘事名五加皮丸四兩酒浸遠志去心四兩酒浸並春秋三日夏二日冬小兒行遲

三歲不能行者用此便走

四日日乾為末以酒浸為糊丸梧子大每服四五十丸空心溫酒下藥酒壞別用酒為糊

隆謙齋瑞竹堂方

五加皮五錢牛膝木瓜二錢半為末每服

憔悴困倦喘滿虛煩喘翕少氣發熱多汗口乾舌澀不思飲食名血風勞油煎散用

五分米飲入酒二三點調服

全幼心鑒婦人血勞

五加皮牡丹皮赤芍當歸各一兩為末每用一錢水一盞用青錢一枚蘸油入藥

煎七分溫服常服能肥婦人

太平惠民和劑局方

五勞七傷

五月五日采五加莖七月七日采葉九月九日取根

人治下節每酒服方寸匕日三服久服去風勞

千金方

服石毒簇煮至二升半發時便服

外臺秘要

火龍丹毒

從兩腳起如火燒五加根葉燒灰五兩取

假鐵家槽中水和塗之愈

楊氏產乳

日偏身生瘡是毒出不出以生服石毒簇或蘋芽冷地臥五加皮二兩水四升

熟湯浴之取瘡愈

千金方

服石毒簇煮至二升半發時便服

外臺秘要

火龍丹毒

從兩腳起如火燒五加根葉燒灰五兩取

假鐵家槽中水和塗之愈

楊氏產乳

枸杞地骨皮

本經

上品

釋名

枸杞

爾雅音計別

枸

義

杞

詩

甘菜

圖

天精

地骨

本經

地節

本草

日記

別

別

別

別

母杖

時珍曰

枸杞二樹名此物棘如枸之刺莖如杞之條故兼名之

道書言

千載枸杞其形如大故得

集解

別錄曰

枸杞生常山平澤及

拘名未審然否頃曰

仙人狀有三種

一是枸杞

一是菜類葉似苦苣

一是枯死竹竿之黑者也

之春生苗葉如石榴葉而軟薄堪食俗呼為甜菜其莖幹高三四五尺作叢六月七月生小紅葵花隨便結紅實形微長如棗核其根名地骨
詩小雅云集於苞杞陸機詩疏云一名苦杞春生作薹亦微苦其莖似每其子秋熟正赤莖葉及子服之輕身益氣今人相傳謂枸杞與
枸棘二種相類其實形長而枝無刺者直枸杞也圓而有刺者枸棘也不堪入藥馬志注瀉疏條云瀉疏有刺枸杞無刺以此為別瀉疏
亦有巨骨之名如枸杞之名地骨當亦相類用之宜辨或云瀉疏以高大者為別是不然也今枸杞極有高大者入藥尤神良宗示與曰枸
杞枸杞徒勞分別凡杞未有無刺者雖大至於成架尚亦有棘但比物小則刺多大則刺少正如酸棗與棘其實一物也時珍曰古者枸
杞地骨取常山者為上其他邱陵阪岸者皆可用後世惟取陝西者良而又以甘州者為極品今陝之蘭州靈州九原以西枸杞並是大
樹其葉厚根粗河西及甘州者其子圓如櫻桃暴乾緊小核乾亦紅潤甘美味如葡萄可作果食異於他處者沈存中筆談亦言陝西
極豐生者高丈餘大可作柱葉長數寸無刺根皮如厚朴則入藥大抵以河西者為上也種樹書言收子及掘地種於肥壤中得苗生剪
為蔬食氣味枸杞苦寒無毒別錄曰根大寒子微寒無毒冬采根春夏采葉秋采莖實權曰枸杞甘平子葉同宗陳曰枸杞當用根皮地
甚佳骨當用根皮當用紅實其皮寒根大寒子微寒今人多用其子為補腎藥是未嘗攷竟經意當量其根實
冷熱用之時珍曰今攷本經止云枸杞不指是根莖葉子別錄乃增根大寒子微寒字似以枸杞為苗而甄氏藥性論乃云枸杞甘平子葉皆同似以枸杞為根冠氏衍義又以枸杞為梗皮皆是贊說按陶弘景言枸杞根實為服食家用西河女子服枸杞法根莖葉根實俱
采用則本經所列氣主治蓋通根苗花實而言初無分別也後世以枸杞子為滋補藥地骨皮為退熱藥始歧而二之王治枸杞主五
癥謂枸杞苗葉味苦甘而氣涼根味甘淡氣寒子味甘氣平氣味既殊則功用當別此後人發前人未到之處者也

和氣熱中消渴周痹風濕久服堅筋骨輕身不老耐寒暑本經下胸腸承熱頭痛補內傷大勞虛吸強陰利大小腸別錄建補精氣諸不足易

顏色變白明日安神令人長壽甄氏曰此乃通指枸杞根苗花實並

時珍曰此乃通指枸杞根苗花實並

苗氣味苦寒

權曰甘平時珍曰甘涼伏砒砂

主治除煩益志補五勞七傷壯心氣去皮膚骨節間風消熱毒散瘡腫

甄氏曰甘涼伏砒砂

主

時珍曰甘平時珍曰甘涼伏砒砂

主治除煩益志補五勞七傷壯心氣去皮膚骨節間風消熱毒散瘡腫

甄氏曰甘涼伏砒砂

主

地骨皮修治

甄氏曰凡使根掘得以東流水浸刷去土推去心以熟甘草湯浸一宿培乾

升也陰也好古曰入足少陰手少陽經

硫黃丹砂

王治細判詳

煮熟食之去家風藉氣

飄

去膏熱渴

孟解骨蒸肌熱消渴風濕痺堅筋骨涼溫

治在表無定之風邪傳尸有汗之膏蒸

元

素

治骨蒸肌熱消渴風濕痺堅筋骨涼溫

元

治在表無定之風邪傳尸有汗之膏蒸

陳

去膏熱渴

李

去膏熱渴

李

降肺中伏火去胞中火退熱補正氣

好古治上膈吐血煎湯散口止齒血

治骨槽風

吳瑞治金瘡神驗

承去下焦肝腎虛熱

時珍

枸杞子

修治

時珍白凡用棟淨枝梗取鮮明普洗淨酒潤一夜搗爛入藥

氣味苦寒

甘平主治取筋骨耐老除風去虛勞補精氣

孟說王心病嗌乾心痛渴而引

時珍曰

杞子葉作羹小苦俗謬云去蒙十里勿食蘿蔔枸杞此言二物補益精氣強盛

飲賢病治中

好古滋腎潤肺榨油點燈明日

時珍曰弘景曰枸杞葉作羹小苦俗謬云去蒙十里勿食蘿蔔枸杞此言二物補益精氣強盛

珍曰陰道也枸杞實為服食家用其說其羹名為仙人之杖遠有言乎頌曰葉及子服

之輕身益氣淮南枕中記載西河女子服枸杞法正月上寅采根二月上卯治服之三月上辰采莖四月上巳治服之五月上午采其莖

六月上未治服之七月上申采花八月上酉治服之九月上戌采子十月上亥治服之十一月上子采根十二月上丑治服之又有花實

根莖葉作煎或單榨子汁煎膏服之者其功並同世傳蓬萊縣南邱村多枸杞高者一二丈其根盤結甚固其鄉人多壽考亦飲食其水

土之氣使然又潤州閑元寺大井旁生枸杞歲久土人目為枸杞井云飲其水甚益人也鄭曰其根似物形狀者為上時珍曰按劉禹錫

枸杞井詩云僧房藥樹依寒井井有清泉藥有靈翠葉生籠石梵殿紅子熟照銅鏡枝繁本是仙人杖根老能成瑞火形上品功能甘露

根亦不止於退熱而已但根苗子之氣味猶殊而主治亦未必無別蓋其苗乃天精苦甘而涼上焦心肺客熱者宜之根乃地骨甘淡而

根亦不止於退熱而已但根苗子之氣味猶殊而主治亦未必無別蓋其苗乃天精苦甘而涼上焦心肺客熱者宜之根乃地骨甘淡而

寒下焦肝腎虛熱者宜之此皆三焦氣分之藥所謂熱淫於內瀉以甘寒也至於子則甘平而潤性滋而補不能退熱止能補腎潤肺生

精益氣此乃平補之藥所謂精不足者補之以味也分而用之則各有所主兼而用之則一舉兩得世人但知用黃芩黃連苦寒以治上

焦之火黃葉如母苦寒以治下焦陰火謂之補陰降火久服致傷元氣而不知枸杞地骨甘寒平補使精氣充而邪火自退之妙惜哉予

嘗以青蒿佐地骨退熱屢有殊功人所未喻者兵部尚書劉松石譚天和麻城人所集保壽堂方載地仙丹云昔有異人赤腳張傳此方

於荷氏縣一老人服之壽百餘行走如飛髮白反黑齒落更生陽事強健此藥性平常服能除邪熱明日輕身春采枸杞葉名天精草夏

采化名長生草秋采子名枸杞子又采根名地骨皮並陰乾用無灰酒浸一夜晒乾四十九晝夜取日精月華氣待乾為末煉蜜丸如彈

子大早晚各用一丸細嚼以隔夜百沸湯下

舊十新附方

枸杞煎治虛勞退虛熱輕身益氣令一切癰疽水不發用枸杞三十斤春夏

此藥采無刺味甜者其有利者服之無益也

十九

枸杞煎

治虛勞退虛熱輕身益氣令一切癰疽水不發用枸杞三十斤春夏

此藥采無刺味甜者其有利者服之無益也

附方

舊十新

枸杞煎用莖葉秋冬用根實以水一石煮取五斗以滓再煮取五斗澄清去

滓再煎取二斗入鍋煎如湯收。枸杞子逐日摘紅熟者不拘多少以無灰酒浸之蠟紙封固勿令泄氣兩月足取入沙盆中搗爛之每早酒服一合。千金方 金骨煎 濬取汁同浸酒入銀鍋內慢火熬之不住手攪或粘性不勻候成膏如湯半煎收每早溫酒服二大匙夜臥再服百日身輕乳壯。枸杞酒外臺秘要云補虛去勞熱長肌肉益顏色肥健人治肝腎衛下瘀用生枸杞子五升搗破絹袋積年不輟可以羽化也。經驗方枸杞酒盛淨好酒二斗中密封勿泄氣二七日服之任性勿醉。經驗方枸杞酒發白耐老輕身用枸杞子二升十月壬癸日面東采之以好酒二升瓷瓶內浸三七日乃添生地黃汁三升攪勻。密封至立春前三十日開瓶每空心緩飲一盞至立春後髮却黑勿食葷無葱蒜等物。

四神丸 治腎經虛損眼目昏花或雲霧遮睛甘州枸杞子一升好酒潤透分作四

分四兩用蜀椒一兩炒四兩用小茴香一兩炒四兩用脂麻一兩炒四兩用川棟肉一兩炒揀出枸杞加熟地黃白朮白茯苓各一兩為末煉蜜九日服。

瑞竹堂方 肝虛下淚 封三日代茶飲之 龍木論

枸杞子二升絹袋盛浸一斗酒

枸杞子搗汁日點眼內。枸杞子十斤生地黃三斤為末每服方寸

聖濟總錄 治枸杞子五味子研細滾水泡

三五次神驗 脾后方 白芷皮七溫酒下日三服久則童顏

聖惠方 治肝虛下淚 地黃根為末白湯調服有

枸杞根生地黃甘菊花各一斤搗碎以水一石煮取汁五斗坎糯米五斗細麴拌勻入甕如常封釀成持熟澄清日飲三盞

聖濟總錄 治肝虛下氣人勿服 龍木論

散地黃皮二兩防風一兩甘草炙半兩每用五錢生薑五片以水煎服

濟生方 治虛勞如瘡地黃皮二兩茱萸一兩為末每服

每服一升口渴枸杞根杜仲草薢各一斤好酒二斗清之翌即飲 千金方 治虛腰痛 中塞封鍋中煮一日飲之任意

千金方 治虛腰痛 中塞封鍋中煮一日飲之

汁每服一盞入酒少許 順氣方 帶下脉數 手煮五升日日服之 千金方 治虛腰痛 中塞封鍋中煮一日飲之

聖濟總錄 治虛腰痛 中塞封鍋中煮一日飲之

出亦可煎水飲 时后方 口舌糜爛地黃皮各三錢水煎服之

東垣蘭室秘藏 治虛腰痛 中塞封鍋中煮一日飲之

虎蓼州門錄

高文

氣運

瘡瘍

鱗

瘍

瘍

瘍

瘍

瘍

瘍

瘍

瘍

瘍

瘍

瘍

瘍

瘍

瘍

瘍

瘍

瘍

瘍

婦人陰腫 或生瘡枸杞根煎水頻洗 永類方

十三種 治口瘡名地黃並桑乾為末如不得依法未但得一種亦可用絳絹一片裹藥半黃一梧子大

及鉤棘針三七枚赤小豆七粒為末先於繒上鋪亂髮一雞子大乃鋪牛黃等末捲作團以髮束定
熨斗中炒令沸定刮搗為末以一方寸七合前鉤棘末二七空心酒服二錢半日再服 千金方 瘰瘍頭瘡 腹血不止地骨皮不拘多
少洗淨刮去粗皮取細白
穰以粗皮同骨煎湯洗令膿盡以細穰貼之立效有一朝士腹脇間病疽經盛或以地骨皮煎湯淋洗出血一
升家人懼欲止之病者曰疽似少快更淋之用五升許血漸淡乃止以細穰貼之次日結痂愈 唐慎微本草 瘰瘍出汗 累累如赤豆
用鉤棘根葵根葉煮汁煎
如飴隨意服之 十金方 足趾難眠 傷之次日即愈 閨閣事宜 火赤毒瘡 此患急防毒風入心腹鉤棘
懸陰地一夜取汁點之不 無七傷 房事衰弱鉤棘葉半斤切粳米一合煎
遇三五度 十便良方 汗和煮作粥日食之良 經驗方 溼浴除病 正月一日二月二日三月三日四月四日以至十
日 潛有翳兩接汁以桑葉包

病不生 洞天保生錄

溲疏

本經下品釋名

別錄曰溲疏生熊耳川谷及田野故墟地四月采當之

曰溲疏一名楊櫧一名壯荆一名空疏皮白中空

下品錄時有節子似鉤棘子冬月熟赤色味甘苦未代乃無識者比非人離援之楊櫧也

曰溲疏形似空疏樹

高丈許白皮其子八九月熟赤色似鉤棘必兩兩相對味苦與空疏不同空疏即楊櫧真子為美不似溲疏志曰溲疏鉤棘雖則相似然

溲疏有利鉤棘無利以此為別頌曰溲疏亦有巨骨之名如鉤棘之名地骨當亦相類方書鮮用宜細辨之機曰按李當之但言溲疏子

似鉤棘不曾言樹相似馬志因其子相似遂謂樹亦相似以有利無利為別錄又因巨骨地骨之名疑其相類殊不知鉤棘未嘗無利

但小則林多大則刺少耳本草中異物同名甚多況一骨字之同耶以此為言尤見穿鑿時珍曰汪機所斷似矣而自汗不能的指為何

物氣寒無毒 別錄曰苦微寒之主治皮膚中熱除邪氣止遺溺利水道 本經除胃中熱下氣可作浴湯 別錄時珍曰按孫真人千金

也才曰漏蘆為之使

主治皮膚中熱除邪氣止遺溺利水道 本經除胃中熱下氣可作浴湯 別錄時珍曰按孫真人千金

丸中
用之

楊櫧

唐本草集解系出楊櫧一名空疏所在皆有生立離垣間其子為美

葉氣味苦寒有毒治瘧惡瘡水煮汁洗之立瘥

唐本

木耳

石南

本經釋名風藥

時珍曰生於石間向陽之處故名石南桂陽呼為風藥尤茗及浸酒飲能愈頭風集解曰石南生華陰山谷三下品采葉八月采實陰乾故名

引景曰今東間皆有之葉如枇杷葉方用亦相似曰葉似芭蕉凌冬不凋闊中者葉細為好江山以南者葉長大如枇杷葉無氣味殊不任用保昇曰終南斜谷有石處甚銳今市人以石韋為之誤矣頃曰今南北皆有之生於石上株極有高大者江湖間出者葉如枇杷上有小刺凌冬不凋春生白花成簇秋結細紅實開隴間出者葉似芭蕉青黃色皆有紫點雨多則併生長及二三寸根橫細紫色無花實葉至凌寒南北人多移植亭院間陰翳可愛不透日氣入藥以關中葉細者為良魏王花木志云南方石南樹野生二月開花連着實會如燕覆子八月熟民采取核和魚羹尤美今無用者宗奭曰石南葉似枇杷葉之小者而皆無毛光而不皺正二月間開花冬有二葉為花苞苞既開中有十五餘花大小如椿花甚細碎每一包約彈許大成一穗一花六葉一朶有七八穗淡白綠色葉末微淡赤色花既開蕊滿花但見蕊不見花化後罷去年綠葉盡脫落漸生新葉京洛

河北河東山東頗少故人少用湖湘南北江西二浙甚多故人多用

石發動水服一錢 聖惠方

實 一方 王治蟲蠭毒破精聚逐風癆

本經

氣治軟脚煩悶瘦殺蟲逐風新風浸酒飲治頭風時珍曰恭曰石南葉為療風邪丸散之要今醫家不復用其實至權曰雖能養腎亦令

藥性論有令陰痿之說也殊不知服此藥者能令腎強者惑之人藉此放恣以致痿弱歸咎於藥良可慨也毛文附方新石南
錫茶譜云湘人四月采楊桐草搗汁浸米蒸作為飯食必采石南芽為茶飲乃去風也暑月尤宜楊桐即南堦也附方三鼠癟不合石南
黃芩芩黃伏堆黃等分並生地

黃芩芩黃伏堆黃等分並生地

為散日再傳之 肝后方 小兒通睛 小兒誤跌或打着頭腦當驚肝不受風致睡人不正觀東則見面觀西則見東宜石南散吹鼻通

石發動煩熱石南為末新汲

普濟方乳

牡荆

別錄上品

校正

併入別錄有

蔓荆

圖本

弘景曰既

是牡荆不應有子小別應是牡荆牡荆子大於蔓荆子而反呼小荆恐以

蔓荆子大牡荆子小故呼小荆時珍曰古者刑杖以荆故字從刑其生成叢而疎爽

故又謂之楚從林從疎疎即疎字也濟楚之義取此荆楚之地因多產此而名也

景曰論蔓荆即應是今作捶之荆其子殊細正如小麻子色青黃牡荆乃出北方始如豆大正圓黑仙術多用牡荆今人都無識者李當

之藥錄言漫疏一名楊爐一名牡荆理白中虛斷植即生按今澧疏主療與牡荆都不同形類乖異而仙方用牡荆云能通神見鬼非惟

其實枝葉正好又云荆樹必枝葉相對者是牡荆不對者即非牡荆也並莫詳虛更須博訪恭曰牡荆即作捶杖者所在皆有之實細

黃色蔓勁作樹生漢書郊祀志以牡荆為瑞等則明知非蔓荆也有青赤二種以青者為佳今人相承多以牡荆為蔓荆此極誤也頃

曰牡荆今蜀州眉州及近汴京亦有之俗名黃荆是也枝莖堅勁作杖不蔓如蕘麻更疎瘦花紅作種實而黃如麻子大或云即小荆也

按陶隱居登真隱訣云荆本之葉花通神見鬼精注云荆有三種荆木即今作捶杖者葉亦有花子者不染方所則用牡荆其子染藥

北人無識其木者天監三年天子將合神仙飲奉勅論牡荆曰荆花白多子子粗者厄疎疎生不過三兩莖多不能圓或扁或異或多似

竹節葉與餘荆不殊蜂多采牡荆牡荆汁冷而甘餘荆被燒則煙火氣苦牡荆蔓實烟火不入其中主治心風第一於時遠近尋逐

不值也徐昇曰陶氏不惟不別蔓荆亦不識牡荆蔓荆生牡荆樹生理自明矣時珍曰牡荆處處山野多有椎米為新年久不壅者其

樹大如盤也其木心方其枝對生一枝五葉或七葉葉於榆葉長而尖有鋸齒五月杪開花成穗紅紫紫色其子大如胡荽子而有白膜

皮裹之蘇頌曰葉似蕘麻者誤矣有青赤二種青者為荆赤者為搘嫩條可為苦箇古者貧婦以荆為糾即此二本也按裴潤廣州記

云荆有三種金荆可作枕紫荆可作履與他處牡荆蔓荆全異甯浦有牡荆治病自愈時節不相當者月嘗時刻之與病人身

齊等置床下病雖危亦無害也牡荆拾遺錄云南方林邑諸地在海中山中多金荆大者十圍盤而

屈彌尺又如美錦色如真金工人用之貴如沉檀此皆荆之別類也春秋運斗樞云王衡星散為荆

實氣味苦溫無毒

時珍曰辛溫之才曰王治陰骨間寒熱通利胃氣止欬逆下氣

別錄

之

以集為末飲服治心痛及

婦人白帶

新

用半升炒熟入酒一盞煎一沸熱服治小腸疝氣及浸酒飲治其龍

時珍曰新

方

一盞煎白湯

壯荆子炒為末每酒

葉氣味苦寒無毒主治久病霍亂轉筋血淋下部瘡瘍脚手腳氣腫滿

別錄

八月

崔元亮海上集驗方治腰脚風濕痛不止煎用

荆葉不限多少煎置大甕中其下着人溫之以病

人

水

洗

足

脚

風

濕

痛

不

止

煎

水

洗

足

脚

風

濕

痛

不

止

防已為之使畏石膏

時珍曰辛溫之才

曰王治陰骨間寒熱通利胃氣止欬逆下氣

別錄

之

以集為末飲服治心痛及

婦人白帶

新

用半升炒熟入酒一盞煎一沸熱服治小腸疝氣及浸酒飲治其龍

時珍曰新

方

一盞煎白湯

壯荆子炒為末每酒

水

洗

足

脚

風

濕

痛

不

止

煎

水

洗

人置葉中煑炭當汗出蒸時當旋旋飯稍倦即止便以被蓋避風仍進茶酒及豆酒亦可以瘧為度時珍曰蒸法雖妙上宜施之野人李仲南水類方云治脚氣諸病用荆荳於壇中燒煙熏涌泉穴及痛處使汗出則愈此法貴賤皆可用者又談楚翁試驗方治毒蛇望板歸整傷滿身洪煙發泡用黃荆嫩頭搗汁塗泡上潰益咬處即消此法乃出於丁子方舊一九駁血荆葉搗汁酒和服二合千金方

服二合

根氣味甘平無毒時珍曰

王宗永著服治風頭風肢體諸風角肌發

別錄時珍曰荆苦能降溫能散降則化痰散則祛風故

方云一人癲風數年予以七葉黃荆根皮五加

根皮接骨草等分煎湯日服遂愈蓋得此意也

荆荳

別錄有名未用云八月十月采陰乾藏器曰即今荆枝也煮汁堪裹

主治瘍瘍瘻瘍發熱效

瘍同荆芥草燒煎水漱風牙痛

時珍曰新采莖截尺五長架於兩磚上中間燒火炙之兩頭以器承取熱服或入於

心口氣味甘平無毒治飲之去

時珍曰荆荳氣平甘化痰去風為妙藥故孫思邈千金翼云凡患風人多熱嘔宜以竹瀝荆荳薑汁合五合和勑熱服以瘥為度

時珍曰陶宏景亦云壯荆治心風為第一延年秘錄云熱多用竹瀝寒多用荆瀝夏亨曰二汁同功並以薑汁助速則不凝滞但氣虛不能食者用竹瀝氣

時珍曰荆瀝日服候痘瘡腫脹水煎服之千金翼

初

春

時珍曰

荆瀝細嚙之或以荆

一

燒荆木取黃

實能食者用荆瀝

新一升

范汪方

頭風頭痛之

集驗方

喉瘡瘡腫

水煎服之

千金翼

目中卒痛

燒荆木取黃

汁點之

時

後

心口驚悸

瘦羸者荆瀝二升火煎至一分

赤白下痢

五年者荆瀝每

作四服日三夜一

見小品方

方心口驚悸瘦羸者荆瀝二升火煎至一分赤白下痢五年者荆瀝每作四服日三夜一見小品方

外臺秘要濕瘡瘡瘡金之深師方

本草集解卷之二十一

十一

蔓荆

本草集解卷之二十一

蔓荆

本草集解卷之二十一

有之大如豌豆蒂有輕軟小蓋子六七八月采之頃曰近汴京及秦瀛明越州多有之苗莖高四五尺對節生枝葉頭小棟至盛茂有花作穗淡紅色蕊黃白色花下有青蔓至秋結子舊說蔓生而今所有並非蔓也京叟曰諸家所解蔓荆壯荆紛糾不一經既言蔓荆明是

蔓生即非高本也既言壯荆則自木上生矣

何疑馬時珍曰其枝小弱如蔓故名蔓生

實脩治數日凡使去蒂子下白膜一重用酒浸一伏時蒸之

氣味苦微寒無毒別錄曰辛平溫元素曰味辛溫氣清陽中之陰入太陽經胃虛人不可服久生痰疾之十曰恐烏頭石膏王

治筋骨間寒熱濕痺拘攣目自堅齒利九竅去蟲久服輕身耐老小荆實亦等

本草集解卷之二十一

風頭痛勝鳴目淚出益氣令光澤脂緻別治風

長髮髮

頭風節治癆疾目明太陽頭痛頭沈音悶除昏暗散風邪涼諸經止目睛內痛

元搜肝風本草集解卷之二十一

其功與蔓荆同故曰亦

等也時珍曰蔓荆氣清味辛體輕而浮

附方新

蔓荆子熊脂等分醋

頭風作痛

蔓荆子一升為末絹袋浸一斗酒乳雞力起蔓

上行而散故所主者皆頭面風瘡之證

附方二令髮長黑調塗之

聖惠方

頭風作痛中七日溫飲日三次千金方

予以為末酒服方十七

漁傳之

危氏傳效方

欒荆

本草集解卷之二十一

欒荆

本草集解卷之二十一

葉都似石南幹亦反卷經冬不凋葉上有細黑點者真也今雍州所用者是而洛州乃用石荆

汾州所上者枝莖白葉小圓而青色頗似榆葉而長冬夏不凋六月開花有紫白二種子似太麻四月采苗葉八月采子宗奭曰欒荆

即壯荆也子青色如茱萸不合更止此條蘇恭又稱石荆當之轉見穿鑿時珍曰按許慎說天文云欒似木蘭木蘭葉似桂與蘇恭所說葉似石南者相近蘇頌所圖者即今壯荆與唐本草者不合欒荆是蘇恭收

似石南者相近蘇頌所圖者即今壯荆與唐本草者不合欒荆是蘇恭收
入本草不應自悞蓋後人不識遂以壯荆充之冠氏亦即指為壯荆耳

子氣味苦溫有小毒

權曰甘辛微熱無毒

主治大風頭項手足諸風癲癇狂瘲濕痺冷瘻瘍本四肢不遂通血脉明目精光數

合柏潤敷塗人頭瘡

頌

石荆

拾集品藏器曰石荆似荆而小生水旁廣濟方一
遺水荆是也蘇頌言洛人以當藥荆者非也

主治燒女淋汁浴頭生髮令長

藏器

紫荆

宋開寶拾正併入拾釋名珠遺皮名丙紅
內消時珍曰其木似黃荆而色紫故名其皮色紅而消

腫故瘡科呼為肉紅又曰內消與何首烏同名

種於庭院木似黃荆葉

小無花深紫可愛藏器曰即田氏之荆也至秋子熟正當圓如小珠名紫珠江東林澤間尤多宗更曰春開繁花甚細碎共作朵生出無常處或生於木身之上或附根上枝下直出花葉出光緊微圓園圃多植之時珍曰高樹系條其花甚繁歲二三天其皮入藥以川中厚而紫色味

苦如胆者為勝

木并皮氣味苦無毒

藏器曰苦寒大明日皮梗及花氣味功用並同

主治破宿血下五淋濃者汗服通小腸

大明解諸毒物

解喉癰飛石蠱毒腫

下

瘻蛇虺蟲蠭狂犬毒並煮汁服亦以汁洗瘻腫除血妄胃

藏器活血行氣消腫解毒治婦人血氣疼痛經水凝滯

時珍曰

紫荆氣味苦寒性

降火平足厥陰血分寒勝熱苦走胃紫入營故能活血消腫利小便而解毒楊清叟仙傳方有冲和膏以紫荆為君蓋得此意也其方治

一切癰疽發背流注諸腫毒冷熱不明者紫荆皮炒三兩獨活去節炒二兩赤芍藥炒二兩生白朮一兩木蠟炒一兩為末用葱湯調熱敷血得熱則行葱能散氣瘡不甚熱者酒調之痛甚者筋不伸者加乳香大城癰疽流注皆氣血凝滯所成遇溫則散遇涼則凝此方溫

平紫荆皮乃木之精破血消腫獨活乃土之精止風動火引拔骨中毒去瘡濕氣芍藥乃火之精生血止痛木蠟乃水之精消腫散血獨活能破石腫堅硬白朮乃金之精去風生肌止痛益血生則不死動則流通肌生則

張實之曰白朮新婦人血氣

紫荆皮為末不爛痛止則不收風去則血自散氣破則硬可消毒自除五者文治病安有不愈者乎

術亦可當正附

九婦人血氣醋和九櫻桃

大每酒化服一烏膠膠紫荆皮三錢老酒煎傷眼青腫紫荆皮小便浸七日晒研用生地黃大硝大哎傷

紫荆皮末和糖調塗留口退腫

丸熊氏補遺雀膠膠服日二次直指方傷眼青腫汁鹽汁調敷不腫用葱汁

永類方猶大哎傷口中仍嚼噙杏仁去毒仙傳

外鼻中瘡瘍紫荆花陰乾為末點

一切癰疽皆治單用紫荆皮為末酒調塗住自然擴

瘡未成用白芷紫荆皮等分為末酒

科鼻中瘡瘍之衛生易簡方發背初生一小不開內服柞木散子乃救貧良劑也仙傳外科癰疽未成調服外用紫荆皮木蠟赤芍

散子乃救貧良劑也仙傳外科癰疽未成調服外用紫荆皮木蠟赤芍

藥等分爲末酒調

荆皮五錢薪水食
作猛藥 同上

痔瘡腫痛 柴荆皮五錢半酒半水
前煎服 直指方

瘻瘍諸淋 煎溫服 能氏補遺

木槿

美釋名假音徒
亂切櫬音旨

日及

朝開暮落花網
潘蘋草

日花奴玉蕊

時珍曰此花朝開暮落故名日及曰槿曰舜猶僅榮一瞬之

假赤曰櫬魯齊謂之玉蕊言其

根赤曰櫬魯齊謂之玉蕊言其

集解

宋襄曰木槿花如小葵淡紅色五葉成一花朝開暮落湖南北人家多種植爲籬障花與枝兩用時

美而多也詩云頤如華即此

集解

珍曰槿小木也可種可插其木如李其葉末大而無鋸齒其花小而點或白或粉紅有單葉十葉者五月始開故逸書月令云仲夏之月木槿榮是也結實輕虛大如指頭秋深自裂其中子如榆莢

泡桐馬鈴之仁種之易生嫩葉可如作飲代茶今醫家用皮治瘡瘍多取中來者厚而色紅

皮并根

氣味甘平滑無毒 大明

主治止腸風瀉血痢後熱渴作飲服之令人得睡並炒用

藏器治赤白帶下腫痛亦解沈日令明闇

燥活血

時珍曰木槿花及皮並滑如葵花故能潤燥色如

紫荊故曰活血川中來者氣厚力優故尤有效

附方新

赤白帶下

槿根皮二兩切以白酒一碗半煎一盞空腹面食之

槿樹皮

為木醋調重湯頓如

牛皮風

川槿皮一兩大風子仁十五個半夏五錢剉河水井水各一盞浸露七宿入輕粉用

膠內傅之王仲勉經效方

槿皮

燒研入水中先筆掃塗覆以青衣數日有臭涎出妙忌浴潔夏月用尤妙

皮煎入肥皂浸水頻頻擦之或以

槿皮浸汁磨雄黃尤妙簡便方

痔瘡瘍瘍先

大腸脫工槿皮或葉煎湯熏洗後以

花氣味

同主治腸風瀉血赤白帶並培人藥作湯代茶治風

消瘡腫利小便除濕熱

附方新

下痢

口紅木槿花去蒂陰乾爲末

扶桑

同家名佛桑 霽雪

朱槿 草木赤槿 同

時珍曰東海日出處有扶桑樹此花光艷照日其葉似桑因

集解

時珍曰扶桑產南方乃木槿別種二枝柯柔弱

子氣味

同主治偏正頭風燒煙薰患處又治黃水瀉瘡燒存性

瘡膏調塗之

珍

本草綱目

卷二十六 木部

葉深綠微濶如桑其花有紅黃白三色紅者尤貴呼為朱槿植含草木狀云朱槿一名赤槿一名日及出南京郡花葉皆如桑其葉光而厚木高四五尺而枝葉婆娑其花深紅色五出大如蜀葵重數柔澤有蕊一條長如花葉上綴金屑日光所照疑若培生一叢之上日開數百朵朝開暮落自五月始至中冬乃歇換樹即活

葉及花氣味甘平無毒主治癰疽腮腫取葉或花同白芨研末蜜研膏敷之即散

時珍

木芙蓉

綱目校正 併入園經
日地芙蓉 采名 地芙蓉 經 木蓮 綱目

華木

榆木

拒霜

時珍曰此花豔如何花故有芙蓉木蓮之名八九月始開故名

拒霜俗呼為桃皮樹

相如賦謂之華木注云皮可為索也蘇東

坡詩云呼作拒霜猶未稱

看來却是最宜霜凜頌圖經

木蓮

時珍曰木芙蓉處處有之種條即生小木也其幹黃生如荆高者丈許其

草有地芙蓉云出鼎州九月采葉治瘡腫蓋即此物也

集角

葉大如桐有五六及七尖者

冬凋夏茂秋半始着花化類牡丹芍藥有紅

者白者黃者最耐寒而不落不結實山人取其皮為索川廣有添色拒霜花初

開白色次日稍紅又明日則深紅先後相間如數色霜時采花霜後采葉陰乾入藥

葉并花氣味甘平無毒主治清肺涼血散熱解毒治一切大小癰疽腫毒惡瘡疽腫排膿痛

時珍曰芙蓉花并葉氣平而不寒不熱味微辛

而性滑涎粘其治癰疽之功殊有神效近時場醫松其名為清涼膏清潔散極散皆此物也其方治一切癰疽發背乳癰惡瘡不拘已

成未成已穿未穿立用芙蓉葉或根皮或花或生研或乾研末以蜜調塗於腫處四圍中間留頭乾則頻換初起者即覺清涼痛止腫消

已成者即膿聚毒出已穿者即膿易出

附方

新久欬羸弱

無食屢效

危氏得效方

赤眼腫痛

穴名清涼膏

鴻飛集經

血不上

拒霜花

蓮蓬殼

等分為末每用米飲

芙蓉葉黃葉各三錢

為末以木盤子仁一

杜鵑重病

芙蓉花葉研末入皂角末少許

佳

重陽前取

下二錢

婦人良方偏墮作痛

個磨醋調塗陰囊其痛自止

簡便方

杜鵑腫痛

雜子清調塗之

方廣附餘

癰疽腫毒

芙蓉研

末端午前取蒼耳燒存性研末等分蜜水調貼次日用蚯蚓一個搗塗之普濟方豆上癰瘡先以松毛柳枝煎湯洗之

傳滋醫

湯火灼瘡

油調芙蓉末以

灸瘡不愈

芙蓉花研末敷

之奇效方

一切瘡腫

木芙蓉葉菊花葉同煎水

頻熏洗之

多能鄙事

山茶

時珍曰其葉類茗又目釋名可作飲故得茶名

集解

時珍曰山茶產南方樹生高者丈許枝幹空而堅硬有枝中間頭大而綠背淡深

躡躅茶花如杜鵑花宮粉茶串珠茶皆粉紅色又有一捻紅千葉紅千葉白等名不可勝數茶各小異或云亦有黃色者

南山茶花大倍中州者色微淡葉薄有毛結實如梨大如拳中有數核如肥皂子大周憲王救衆本草云山茶嫩葉煥熱水淘可食亦可

蒸晒

作飲

花氣味

缺

主治血衄血腸風下血

紅者為末入童弱蜜汁及酒調服可

麝金

湯火傷灼研末麻油調

金

火傷研末麻油調

金

火傷研末麻油調

金

火傷研末麻油調

金

子

主治婦人髮疽研末擦之

時珍

蠟梅

綱目釋名黃梅化時香又相近色似蜜蠟故得此名

集解

時珍曰蠟梅小樹叢枝末葉種凡三種以子種出不經接者臘月開小花

而香淡名狗蠟梅經接而花疎間時含口者名磬口梅花密而香濃色深

黃如紫檀者名蠟梅最佳結實如垂鈴大

長寸餘子在其中其樹皮浸水磨黑有光彩

花氣味

辛溫無毒主治解暑生津

時珍

伏牛花

宋開寶校正併入圖

經虎刺

未詳

集解

時珍曰伏牛花生蜀地所在皆有今惟益州蜀地有之多生川澤中葉青細侶黃馨葉

而不光莖亦有刺開花淡黃色作穗俗杏花而小三月采陰乾又睦州所生虎刺云

采根葉治風腫疾

渡冬不凋彼人無時

花氣味

甘平無毒主治久風濕痺四肢拘攣骨肉疼痛作湯治風眩頭痛五痔下血

開寶

時珍曰伏牛花治風濕有名而用者頗

寶

時珍曰楊子達護命方有伏牛花散治男女

一切頭風發作有時甚則大暍熟秘用伏牛花山茵陳桑寄生白牽牛川

芎藭白僵蠶蟬梢各二錢荆芥穗四錢為末每服二錢水煎一沸連滓服

本草綱目

卷三十一

根葉枝葉一切腫痛癰癧細判焙研每服一錢七用溫酒調下

頌

密蒙花

宋開正憲微曰自草實名水錦花炮炙論時珍曰其花繁

集解領曰密蒙花蜀中州郡皆有之樹高丈餘葉似冬青葉而厚

白有細毛又似橘葉花微紫色二月三月采花暴乾用宗

校正部移入木部

密蒙茸如簇錦故名

集解言白有細毛又似橘葉花微紫色二月三月采花暴乾用宗

校正部移入木部

密蒙茸如簇錦故名

校正部移入木部

密蒙茸如簇錦故名

陳曰利州甚多葉冬不凋亦不似冬青柔而不光

潔不深綠其花細碎數十房成一朵冬生春開

穀曰凡使揀淨酒浸一宿漉出候乾拌蜜令潤蒸之從卯至酉日乾再拌蒸如此三度日乾用每一兩用酒八兩蜜半兩

氣味甘平微寒無毒主治青盲膚翳赤腫多眵淚消目中赤脉小兒延安氣攻眼

附方新

目障翳

密蒙花蜜根各一兩為末水丸梧子大每臥時湯服十九至十五丸聖濟錄

校正部移入木部

密蒙茸如簇錦故名

校正部移入木部

密蒙茸如簇錦故名

木綿

綱目釋名古貝

時珍曰

木綿有二種似木者名古貝似草者名古終或作

木綿

吉貝者乃古貝之訛也梵書謂之跋婆又曰迦羅婆劫

附方新

目障翳

密蒙花蜜根各一兩為末水丸梧子大每臥時湯服十九至十五丸聖濟錄

校正部移入木部

密蒙茸如簇錦故名

校正部移入木部

密蒙茸如簇錦故名

校正部移入木部

密蒙茸如簇錦故名

桂惟收安羅木子中白絮級為絲織為幅名娑羅龍段枕穆方輿志言平緜出安羅樹
大者高三五尺結子有綿細織織為白氈與羅綿此亦班枝花之類各方稱呼不同耳

白綿及布氣味甘溫無毒主治金瘡燒炙用

時

子油

用兩餅合燒取脂

氣味辛熱微毒主治惡瘡亦可燃燈損目

時

柞木

宋嘉祐名鑿子木時珍曰此木堅忍可為鑿柄故俗名鑿子木方書皆作柞木蓋昧此義也柞乃櫟櫟之名非此木也集角處處山中有之高者大餘葉小而有細齒光滑而動其木及葉子皆有針刺經冬不凋五月開花

碎白花不結子其木心理青白色

木皮氣味苦平無毒

時珍曰主治黃痘病燒末水服方寸七日三藏器治鼠瘧難產催生利膈

附方二升服當有血肉出

酸澀

柞木皮五升水一斗者

而癰乃張子仁方婦人難產並寸折以斬水汲三升半同入新沙餅內以紙三重繫封文武火煎至一升半待腰腹重痛欲生時溫飲一小盞便覺下閉豁如渴又飲一盞至三四盞下重便生更無諸苦切不可坐草太早及坐婆亂為也

皆良虛實

葉毛治腫毒癰疽

時珍附方新作柞木飲治諸般癰腫發背用乾柞木葉乾何葉中心蒂乾薑甘草節地榆各四兩細剉每用半兩

一作木飲水二盞煎一盞早晚各一服已成者其膿血自漸乾涸未成者其毒自消散也忌一切飲食毒物

許學士本物

事普教方

黃楊木

細目集解時珍曰黃楊生諸山野中人家多栽植之枝葉搘簇上聳葉似初生槐芽而青厚不花不實四時不凋其性難長俗說歲長一寸遇閏則退令試之但閏年不長耳其木堅膩作梳刷印最良按段成式酉陽雜俎云世重黃楊以其無火也

用水試之沈則無火凡取此木必

以陰晦夜無一星伐之則不裂

葉氣味苦平無毒主治婦人難產催生散中用又主暑月生癆搗爛塗之

時珍

不凋木

拾遺集解葉似槐莖赤有毛如紫梨四時不凋氣味苦溫無毒主治調中補衰治腰脚去風氣却老變白

賣子木

唐本草釋名賣子木集解春生嫩枝條葉長二寸俱青綠色枝梢淡紫色四五月開碎花百十枝圓瓣作大朵葉紅色頭花

便生子如椒日在花瓣中黑而光潔每株花蕊三五大朵耳五月采其枝葉用時

珍曰宋史渠州貢買子木并子則子亦當與枝葉同功而本草缺載無從攷訪

木天蓼

穀曰凡米得粗搗每一兩用酥五錢同以乾入藥

氣味甘微鹽平無毒主治折傷內燭結補髓止痛安胎

唐本

木天蓼

草唐本

校正小天蓼

餅入拾遺釋名時珍曰其樹高而味辛如蓼故

集解宋曰木天蓼所在皆有山谷中今安州申州作藤蓼葉似柘白子如棗許無定形中鄭似祐子味辛微之以當莧入藏器

曰木蓼多時所用出山南鳳州樹高如冬青不凋不當以藤天蓼為注既云木蓼豈是蓼生自有藤蓼耳藤蓼生江南淮南山中藤着樹生葉如梨花而薄子如棗即蘇恭以為木天蓼者又有小天蓼生天日山四明山樹如危子冬月不凋野獸食之是有三天蓼俱能逐風而小者為勝頃曰木天蓼今出信陽木高二三丈三月四月開花似柘花五月采子子作球形似紫麻子可藏作果食之蘇恭所說自是篤天蓼也時珍曰天蓼雖有三種而功用彷彿蓋一類也其子可為燭其芽可食故陸機云木蓼為燭明如胡麻辟田水蜀詩有地丁葉嫩和風采天蓼芽

新入粉煎之句

枝葉

氣味辛溫有小毒治癥結積聚風寒細切釀酒飲

唐本舊附方新二

天蓼酒

治風立有奇效木天蓼一斤取皮細剉以生絹歲入好酒二十盞之春夏一七秋冬二七日每

空心日干下晚各溫一盞飲若常服

寒日一百五日采木蓼根乾用

大風白癩

天蓼刮去粗皮剉四兩水一斗煎汁一升煮糖時為末粥飲服一錢聖惠方大風白癩米作粥空心食之病在上吐出在中汗出在下

只飲一次老幼臨時加減

聖惠方氣痢不止時為末粥飲服一錢

聖惠方

大風白癩

天蓼米作粥空心食之病在上吐出在中汗出在下

泄出避風又方天蓼三斤大麻一斤半生剉以水三斗五升煎一斗去滓石

器慢煮如餚每服半匙荆芥薄荷酒下日二夜一月可以見效

聖惠方

小天蓼氣味甘溫無毒主治一切風虛羸冷手足疼痛無論老幼輕重浸酒及煮汁服之十許日覺皮膚間風出如癢

瘡瘍久不癒

子

氣味苦微熱無毒主治風口面渴辯冷瘡瘍氣塊

子虛勞

氣塊久不癒

藏器曰木天蓼出深山中人云久服損壽以其逐風損氣故也勝天蓼小天蓼二者俱能逐風其中復劣小者為勝

子氣味苦微熱無毒主治風口面渴辯冷瘡瘍氣塊子虛勞

氣塊久不癒

聖惠方

子虛勞

氣塊久不癒

根主治風寒痛搗丸塞之連易四五次除根勿噬汁

時珍
出貴濟

放杖木

拾釋名集解

器曰生溫拾曉攀諸州山中樹如木

氣味甘溫無毒治一切風血理腰脚輕身變白不老浸酒服之

歲天暖老人服之一月放枝故以為名

接骨木

唐本草拾釋名續骨木

木胡蘿頌曰接骨以功而名花葉都類蘿

根曰所在皆有之葉如陸英花亦相似但作樹高一丈許木體輕虛無心研枝折之便主人家亦種之

氣味辛溫無毒主治折傷續筋骨除風寒濕毒可作湯

甚草無毒

拾器曰搗汁亦吐人有小毒

主治折傷續筋骨除風寒濕毒可作湯

唐本

根皮

主癰飲下水腫及瘡瘍汁服之當利下及吐出不可多服

器打傷於四肢惡血一切血不行或不止並煮汁服

歲時珍出千金

根打傷於四肢惡血一切血不行或不止並煮汁服

附方舊一

折傷歸骨

接骨木半兩乳香半錢芍藥當歸各一兩為末化黃蠅四兩搘藥攪勻

新一丸子丸如芡子大若止傷損酒化一丸若碎折筋骨先用此敷貼乃服

衛生易簡

器

未破如算子一握用水一升煎取半升分服或小便頻數惡血

不止服之即瘥此木煮之三次其力一般乃起死妙方

產書

葉主瘦瘧人七葉小兒三葉生搗汁服取吐

器

靈壽木

拾釋名集解

老枝木根生劍南山谷元長皮紫漢書孔光年老賜靈壽枝顏師古注云木似竹有節長不過八九尺

根三四寸自然有合枝制不須削理作杖令人延年益壽時稱曰陸氏詩疏云根即樞也節中腫似

枝老即今靈壽也人以作杖

及馬鞭

弘農郡北山有之

根皮氣味草

主治水藏器

橡木

拾釋名集解

生江南山谷高丈餘直上無枝葉上有刺山人折取頭如食謂之吻頭時

拾釋名集解

根曰二山口木有二指直生葉一人足令謂之萬人踏以去多利而無復生也

白皮氣味平有小毒生治水陰煮汁服一盞當水如病已困取根搗坐之取氣水自下又能爛人齒牙有蟲者取片許

中當日爛落

藏器

木麻

拾
集解

胡麻

相對山谷澤葉似

江南山谷澤葉似

江寧

氣味甘溫無毒

主治老血婦人月閉風氣彌瘦癰瘕久服令人有子

器

大空

唐本
草

集解

大空生襄州

所在山谷中亦有之

秦隴人名獨空

作小樹

抽條高六七尺葉似楮

小圓厚根皮赤

色

葉似桐葉而不尖深綠而皺文根皮虛秋山人采殺武極妙搗漿師疏圃中殺虫

藏器

根皮氣味苦有小毒生治殺蟲作末和油塗髮則皆死

器

本草綱目卷第十六

L6931 p
1888
V135-36