


V.17 - V.18

亨
6

增廣本草綱目



本草綱目草部目錄第十七卷上

草之六 毒草類四十七種

毒草

本經

商陸

本經

狼毒

本經

防葵

本經

狼牙

本經

鵝鶴

本經

大戟

本經

澤漆

本經

蕡遂

本經

續隨子

開寶

莫若

本經

雲實

本經

蕡麻

唐本
博落迴附

當當

漆本經
吐釐山

藜蘆

本經

木藜蘆

拾遺
馬腸根附

附子

本經

天雄

本經

側子

別錄

漏蘚

綱目

烏頭

本經

白附子

別錄

虎掌天南星

本經

虫反

本經

鴟夷

閻寶
菩薩荳附

牛貢

本經

桑寄生

本經

鬼臼

本經

射干

本經

五薑

綱目

鳳仙

綱目

芒草

圖經
坤不盧附

曼陀羅花

綱目

羊踯躅

本經
蜀山躡羊不吃草附

芫花

本經

蕘花

本經

醉魚草

綱目

荊草

本經

齒頸

本經

本草綱目

卷十七

石龍芮

本經 即胡椒菜

格注草

唐本

毛茛

拾遺

每莖附

牛扁

本經

武建草附

鉤吻

本經

武建草附

蕁麻

圖經

右附方舊一百三十四新四百九十五

本草綱目草部第十七卷上

草之六

毒草類四十七種

大黃

本經下品

蜀藥

火參

吳普

景曰

大黃其色也

將軍之號

當取其驗快也

吳弘景曰

大黃生河而山

谷及龍

蜀郡北郡

或龍西二月

春生黃亦具葉

四四相當莖

高三尺許三月

花黃五月

實黑八月

采根有黃汁

切瓦陰乾

致太平所以有將軍之號

集解

西二月八月采根火乾

普曰

生

蜀中者

雖非河西龍西

好者猶作紫

地錦色味甚苦澀

色至濃黑

西川陰乾者

勝北部曰乾亦有火乾者皮小葉不如西附註

堪久此

至勁利粗者便不中服茶

似葉子並似羊蹄但莖高六七尺而脆味酸堪生啖

葉粗長而厚根紅者亦似宿羊蹄大者乃如

盤長二尺其性溫潤而易蛀壞火乾乃佳作時燒石使熱橫寸截者石上燒之一日微燥以繩穿眼乾今出宕州涼州西羌蜀地者佳燃

并以北者漸細氣力不及蜀中者陶言蜀地不及龍西誤矣

誠若曰凡用當分別之若取和厚深沉能攻病者可用蜀中似牛舌片緊硬

者若取渴澀駿快推陳去熱者當取河西錦文者頃曰今蜀川河東陝西州郡皆有之以蜀川錦文者佳其次秦隴來者謂之土番大黃

正月內生青葉似蕘麻大者如扇根如芋大者如盤長一二尺其細根如牛蒡小者亦如芋四月開黃花亦有青紅似蕃蓼花者越青紫

色形如竹二八采根去黑皮切作橫瓦火乾蜀大黃乃作緊瓦如牛舌形謂之牛舌大黃二者功用相等江淮出者曰土大黃二月開花

結細實珍曰宋祁益州方物圖言蜀大山中多有之赤莖大葉根巨若盤藥市以

正

吳公

鼎州出一種羊蹄大黃治瘧甚效初生

大者為極紫地錦文也今人以莊浪出者為最莊浪即古涇原龍西地與別錄相合

正誤

苗葉

年長大葉即似商陸而狹尖四月內抽

條出穗五七莖相合花葉同色結實如蓄來而輕小五月熟即黃色呼為金蕘麥三月采苗五月采實陰乾九月采根破之亦有錦文亦

呼為土大黃時珍曰蘇說即老羊蹄根也因其似大黃故謂之羊蹄大黃實非一類又一種酸模乃山大黃也狀似羊蹄而生山上所謂

土大黃或指此非

羊蹄也俱見本條

根修治

雷公

凡使細切以文加水旋班緊重剉片蒸之從未至亥如此凡七次剉乾却酒淡蜜水再蒸

者用之亦不須

更多炮炙蒸煮

氣味苦寒無毒

別錄曰大寒

神農

雷公苦有毒

李當之大寒

元素曰味苦氣寒氣味俱厚沉而降陰也

用之湊酒浸煖熟者寒因熱用酒浸入太陽經酒洗入陽明經餘經不用酒果曰大黃苦峻下走用之於

下必生用若邪氣在上非酒不至以用酒浸引上至高之分溫熱而下如物在高頭必射而取之也若用生者則遺至高之邪氣是以能後或目赤或喉痺或頭腫或膈上熱疾生也時珍曰凡病在氣分及胃寒血虛并妊娠產後並勿輕用其性苦寒能傷元氣耗陰火故也又才曰黃芩為之使無所畏權忌冷水惡乾漆王淳下瘀血寒熱破癰瘍積聚留飲宿食湯薄陽胃推陳致新通利水穀調中化食安和五臟本平胃

生草瘀血寒熱破瘀消積引飲宿食滯陽胃推陳致新通利水穀調中化食安和五臟本平胃

別列下氣除寒實腸間結熱心腹脹滿女子寒閉脈小腹痛諸老血留結通利經候利水腫利大小腸貼熱腫毒小兒寒熱時疫久熱

大寫者實熱不通除下焦濕熱消宿食滯下濡元下利亦是急症

痛小便淋瀝實熱是結胸丸證也。黃芩、牡蠣、細辛、桔梗、大棗、葛根、大黃、枳壳、杏仁、甘草、大腹皮、厚朴、白朮、白芍、白芷、白僵蚕、白附子、白芍、白朮、白芷、白僵蚕、白附子。

增其發明之才，得其樂道本杜蠻紅辛枝本病，驚走怒下，恃氣得消石紫石英桃仁、白芍、桂枝、大黃、黃芩、連翹、桔梗、甘草。

或曰心氣既不足而不用補心湯更用瀉心湯何也答曰若心氣不足則當不吐吸此乃邪熱因不足而客之故令吐衄以苦泄其熱以苦補其心蓋一舉而兩得之有是證者用之無不效惟在量其虛實而已震亨曰黃若寒善泄仲景用之瀉心湯者正因少陰經不足本經之陽元甚無輔以致陰血妄行飛越故用大黃瀉去亢甚之火使之平和則血歸經而自安夫心之陰氣不足非一日矣肺與肝俱受火而病作故黃芩救肺黃連救肝肺者陰之主肝者心之母血之合也肝肺之火既退則陰血復其舊矣究竟不明說而云邪熱客之何以明仲景之意而闇悟後人也大黃乃足太陰手足陽明手足厥陰五經血分之藥凡病在五經血分者用宜之若在氣分者用之是謂誣伐無過矣瀉心湯治心氣不足吐血衄血者乃真心之氣不足而手厥陰心包絡足厥陰肝足太陰脾足陽明胃之邪火有餘也雖曰瀉心實瀉四經之中之伏火也又仲景治心下痞滿按之軟者用大黃黃連瀉心湯主之此亦瀉脾胃之濕熱非瀉心也病發於陰而反下之則作痞滿乃寒傷營血邪氣乘虛結於上焦胃之上脘在於心故曰瀉心實瀉脾也素問曰太陰所致為痞滿又云渴氣在上則生腹脹是矣病發於陽而反下之則成結胸乃熱邪陷入血分亦在上脘分野仲景大陷胸湯丸皆用大黃亦瀉脾胃血分之邪而降其濁氣也若結胸在氣分則只用小陷胸湯痞滿在氣分則半夏瀉心湯矣成無己註繹傷寒論亦不知分別此義成無己曰熱淫所勝以苦泄之大黃之苦以涼降寒熱下燥結而泄胃強煩曰本草稱大黃推陳致新其效最神故古方下積滯多用之張仲景治傷寒用處尤多古人用毒藥攻病必隨人之虛實寒熱而處置非一切輕用也梁武帝因發熱欲飲大黃姚僧垣曰大黃乃是決藥至尊年高不可輕用帝弗從幾至委頓梁元帝嘗有心腹疾諸醫咸謂宜用平藥可漸宣通僧垣曰脉洪而實此有宿妨非用大黃無瘥理帝從之遂愈以此言之今醫用一毒藥而攻衆病其偶中便謂此方神奇其差誤則不言用藥之失可不慎哉蓋用藥中皆由審病未得其源也

附方

舊十四新
三十七

吐血

水血

治心氣不足吐血衄血者鴻心湯主之大黃二兩黃連黃芩一兩為散每服一錢以生地黃汁

水各一兩水三升煮一升熱服取利

張仲景金匱玉函

吐血刺痛一合水半盞煎三五沸無時服

簡要濟

衆傷寒癥濕病於陰而反下之心下滿而不痛按之濡此為痞也大黃黃連鴻心湯主之大黃九兩

連二兩黃連一兩以麻沸湯二升瀆之湏更絞汁分作二次溫服

張仲景傷寒論執病證症川大黃五兩剉炒微赤為散用

冷水下

財傷寒發黃

方同上○氣壯者大黃一兩水二升瀆一宿平旦煎要却

風氣作痛大黃二兩切如棋子和少酥炒乾勿令焦搗

惠方一升入芒消一兩緩服須臾當利下傷寒類要月用

篩每用二錢空心以水三大合人薑三片煎十餘

沸取湯調服當下冷臘惡物

一刀羅滯

經驗方治風熱精壅化痰涎治痞悶消食化氣導血用大黃四兩牽牛子半炒生四兩為末煉蜜

即痛止崔元亮海上方

一七瓣滯

九如梧子大每服十九粒白湯下並不損人如要微利加二十九粒衛生寶鑑用皂莢散膏和丸名

墮胎丸又名全真丸宣

瘻為膏

滾痰丸治瘻為百病惟水鴻胎前產後不可服用大黃酒浸蒸熟切晒八兩生黃芩八兩沉香半兩

青礞石二兩以焰消二兩同入砂罐固濟煅紅研末二兩右各取末以水和九梧子大常服一二

宗服之有驗賜名保安丸

瘻為膏

滾痰丸治瘻為百病惟水鴻胎前產後不可服用大黃酒浸蒸熟切晒八兩生黃芩八兩沉香半兩

青礞石二兩以焰消二兩同入砂罐固濟煅紅研末二兩右各取末以水和九梧子大常服一二

宗服之有驗賜名保安丸

瘻為膏

滾痰丸治瘻為百病惟水鴻胎前產後不可服用大黃酒浸蒸熟切晒八兩生黃芩八兩沉香半兩

青礞石二兩以焰消二兩同入砂罐固濟煅紅研末二兩右各取末以水和九梧子大常服一二

宗服之有驗賜名保安丸

瘻為膏

滾痰丸治瘻為百病惟水鴻胎前產後不可服用大黃酒浸蒸熟切晒八兩生黃芩八兩沉香半兩

青礞石二兩以焰消二兩同入砂罐固濟煅紅研末二兩右各取末以水和九梧子大常服一二

宗服之有驗賜名保安丸

瘻為膏

墮胎丸

黃連湯

川大黃五兩剉炒微赤為散用

冷水下

財傷寒發黃

方同上○氣壯者大黃一兩水二升瀆一宿平旦煎要却

風氣作痛大黃二兩切如棋子和少酥炒乾勿令焦搗

惠方一升入芒消一兩緩服須臾當利下傷寒類要月用

篩每用二錢空心以水三大合人薑三片煎十餘

沸取湯調服當下冷臘惡物

一刀羅滯

九如梧子大每服十九粒白湯下並不損人如要微利加二十九粒衛生寶鑑用皂莢散膏和丸名

墮胎丸又名全真丸宣

瘻為膏

滾痰丸治瘻為百病惟水鴻胎前產後不可服用大黃酒浸蒸熟切晒八兩生黃芩八兩沉香半兩

青礞石二兩以焰消二兩同入砂罐固濟煅紅研末二兩右各取末以水和九梧子大常服一二

宗服之有驗賜名保安丸

瘻為膏

滾痰丸治瘻為百病惟水鴻胎前產後不可服用大黃酒浸蒸熟切晒八兩生黃芩八兩沉香半兩

青礞石二兩以焰消二兩同入砂罐固濟煅紅研末二兩右各取末以水和九梧子大常服一二

宗服之有驗賜名保安丸

瘻為膏

滾痰丸治瘻為百病惟水鴻胎前產後不可服用大黃酒浸蒸熟切晒八兩生黃芩八兩沉香半兩

青礞石二兩以焰消二兩同入砂罐固濟煅紅研末二兩右各取末以水和九梧子大常服一二

宗服之有驗賜名保安丸

瘻為膏

滾痰丸治瘻為百病惟水鴻胎前產後不可服用大黃酒浸蒸熟切晒八兩生黃芩八兩沉香半兩

青礞石二兩以焰消二兩同入砂罐固濟煅紅研末二兩右各取末以水和九梧子大常服一二

宗服之有驗賜名保安丸

瘻為膏

積血癰瘍腹痛

男子五勞七傷小兒骨蒸潮熱等症其効甚速宜六癸日合之用錦紋大黃一斤分作四分一分用童尿一盞食鹽二錢

浸一日切晒一分用醇酒一盞浸一日切晒再以巴豆三十五粒同炒豆黃去豆不用一分用紅花四兩泡水一盞浸一日切晒一分

用當歸四兩入淡醋一盞同浸一日去歸切晒為末煉蜜九梧子大每服五十一

丸空心溫酒下取下惡物為驗未下再服此武當高士孫靈雲方也醫林集要心得諸病

三物備急丸治心腹諸疾卒暴百病大黃巴豆

服三九凡中客卒忤心腹滿痛如錐刀氣急口噤不復戶卒死者以暖水或酒服之或灌之未知更服三丸腹中

鳴轉當吐下便愈若口已噤者折齒灌之入喉即瘥此仲景方可空禁梨秀改為散用不及丸也

圖經本草

月中瘡塊散醋三升蜜

大黃十兩為末炒熟入桂心末半斤瓦器炒極熱稍冷入大黃末一兩炒熟入桂心末半斤瓦器炒

生薑湯下吐利為度外臺秘要月經積塊膏攤布熨之又方大黃二兩朴消一兩為末以大蒜同搗膏和貼之或加阿魏一兩先炒

丹溪久患牙齦二便不利上搶心腹脹滿害食大黃白芍各二兩為末單瓣研末

不拘大人小兒錦紋大黃三兩為末醋一盞沙鍋內文火煎成膏倘成膏後及上日晒夜露三日再研用船上硫黃

一兩形如琥珀者官粉一兩同研匀十歲以下小兒半錢大人一錢半米飲下忌一切

冷生魚肉只食白粥半月如一服不愈半月之後再服若不忌口不如勿服聖濟總錄

小兒無羣

門庭瘰疬或頭乾黃瘡或乍癆乍癩

狀多者大黃煎主之大黃九兩錦紋新

實者若微朽即不中用削去皮搗篩為散以好米醋三升和置瓦盤中於大鑄內浮湯上炭火慢煮至成膏可丸乃財器中三歲兒一服七丸梧子大曰再服以下出青赤綠為度若不下或下少稍加丸若下多又須減之病重者七八劑方盡根大人亦可用之此藥惟下宿膿不令小兒利也須禁食毒物乳母小兒者熟大黃煨熟黃芩各一兩為末煉蜜丸麻子大每服只可胃氣積熱漸漸黃瘦大黃四分亦禁之一加木香一兩半崔知悌方小兒者熟五丸至十九丸湯下加黃連石三黃丸錢氏小兒方骨蒸不熱以童子小便五六合煎取四合去滓空腹分為二服如人行五里再服廣利方

赤白濁淋

好大黃為末每服六分以雞子一個破頂入藥曰火必吉大黃末一兩牽牛頭末半兩每服三粒勻蒸熟空心食之不過三服愈簡便方

木香丸

錢有厥冷者酒服無厥冷五心煩渴

湯服劉河引力已大黃煨熟當歸各二三錢壯人各一兩

諸痢不走水煎服取利或加用枳榔集簡方

熱痢裏急大黃一兩酒浸半日

忽喘色不能言語涎流吐逆牙齒動搖前取利

集簡方

喘門急氣出轉大絕而復蘇名傷寒併

熱霍亂大黃人參各半兩水二盞

煎一盞熟服可安危氏得效方食已即吐胸中有火也大黃一兩甘草二錢半水尋人血草作痛大黃一兩酒二升煮

水

一升煮半升溫服仲景金匱玉函方婦人血癆十沸煖服取利千金翼產後血塊大黃

兩頭醋半升熬膏九梧子大每服乞

錦紋大黃酒漫晒乾四兩為末好醋一升熬成膏丸芡子大卧時酒化一丸入家病也大

五丸溫醋化下良久下千金方草氣痛丸服大便利一二行紅滿自下乃調經仙藥也或加香附董氏集驗方女家病也大

黃一兩酒一升煮一升

男子偏墮作痛大黃末和醋淹裹丸服之

傳信適用方

不可當者酒炒大黃為末茶清服

水

沸頓服千金方

之乾則易

梅師方

之熱自退

二錢急則治其標也丹溪纂要小兒月熱浸一夜一歲兒服半合餘者

塗頭上乾即再上姚和衆至寶方

暴赤目痛四物湯加大黃酒煎服之

口

隨左右噓鼻立止儒門事親

風熱牙痛

紫金散治風熱積壅一切牙痛

令燒存性為末早晚揩牙漱去都下一家專貨此藥

牙根常出血漸至崩落口具極效大黃米泔浸軟生地黃各切一分

口瘡

今兩宮常以數千購之貯加市也千金家藏方

蟲牙痛

瓦合定貼上一夜即愈未愈再貼忌說話恐引入風本事方

糜爛用大黃枯芩等分為末

蜜燬以擦之吐涎聖惠方

生大黃杏仁搗勻猪脂和塗又生大黃黃連

各一錢麝香少許為末生油調搽聖惠方

牙

毒發見仙茅下損傷瘀血治從高墮下木

石壓傷及一切損傷瘀血不可忍並以此藥推陳致新大黃酒蒸一兩杏仁去皮三七粒細研酒一盞煎六分雞

鳴時服至晚取下瘀血即愈。和濟方治跌壓瘀血在內服滿大黃當歸等分炒研每服四錢酒溫服取下惡物即愈。撲傷瘡

滾注

或作潮熱者大黃末薑汁調塗一夜黑

木瘡腫痛大黃末醋調塗之童尿金瘡煩

大便不利大黃苦茶等分為末蜜丸

先食水下十九日三服千金方

凍瘡瘍

大黃石蠅頭大黃末水

者紫二夜紫者白矣

瀕湖集簡方木瘡腫痛亦可調之醫方摘要

金瘡煩

大便不利大黃苦茶等分為末蜜丸

先食水下十九日三服千金方

調塗之
湯火傷火莊浪大黃生研蜜調塗之不惟止痛且減癰

生寶錄
燒藥因火炎訖火而便退瘡肉鮮肉乍飛如蝶形而云痛不

張景星

蠅咬瘡

大黃未塗

醫說

火丹

赤月頭創之

救急方

水走

涼水調塗日四五次

簡便方

瘡月火燒過數易即退其陰神方也

肘后

乳癰腫毒

全黃散用川大黃粉草各一兩

為末好酒熬成膏收之以絹襯貼

大風癩瘡

大黃燒一兩皂莢刺一兩

為末每服方寸

下再服即取下加亂髮之蟲取盡乃服

黃花蛇藥名通天再造散

十便良方

葉氣味酸寒無毒王治瘡爲下辟

蟲相感

商陸

本經

薯蕷

遂易湯

當陸

國

竇柳

宣實

馬尾

廣

夜呼

本經

珍曰此物能逐湯水氣故曰遂易訖為商陸又訖為當陸北音

集解

別錄曰商陸生咸陽川谷中如人形者有神菴曰此有赤白二種白者入藥用赤者見鬼神甚有毒害異曰所在有之葉大如牛舌

而厚晚赤花者根赤白花者根白二月八月采根日乾

俗名章柳根多生於人家園圃中春生苗高三四尺青葉如牛舌而長

葉青赤至柔脆

真秋開紅紫花作朵根如蘿蔔而長八九月采之爾雅謂之

遂蕷廣雅謂之馬尾易經謂之

莧陸農曰一種赤白葉絕

相類不可服之有傷筋骨消骨之毒惟花百日者仙人采之作脯可下酒也

時珍曰商陸昔人亦種之為蔬取白根及紫色者擘破作

畦栽之亦可食按周憲王殺荒本草云章柳幹似雞冠花幹微有綠楞色微紫赤極易生植

根

白

殺曰取花白者根銅刀刮去皮薄切以東流水浸兩宿出架剉以黑豆葉

氣味

辛平

有毒

別錄曰甘有大毒忌火

根株

之一重商陸一重如此蒸之從午至亥取出去豆葉剉用無豆葉以豆代之

因大明曰白苦冷得大蒜良亦

者有毒能伏硇砂砒石雌黃拔錫恭曰

赤亦可貼腫脹之傷人刺

不止殺人令人見鬼神

仲景曰商陸有毒陽中之陰其味酸辛其形類人其用療水其效如神

王治水腫疝瘕除癰腫

月殺鬼精物

經月中邪氣水腫疝瘕漏洪直疏五臟散水氣

別錄曰商陸以水服殺人某

曰商陸有毒陽中之陰其味酸辛其形類人其用療水其效如神

王通天小腸瀉鹽毒隨胎煥腫

毒物

毒浮者是防葵俗用亦稀為療腹內要藥耳。然曰今出秦州成州秦高原在二州之界秦隴地寒元無蝮蛇此物與防葵都不同類生處又別太山漢中亦不聞有陶說誤矣。急曰狼毒葉似商陸及大黃莖葉上有毛根皮黃肉白以實重者為良輕者為劣。秦亭在隴西秦高是太山下縣陶云沉者是狼毒浮者是防葵此不足為信假使防葵秋冬采者堅實得水皆沉狼毒春夏采者輕虛得水皆浮且二物金別不可比類此與麻黃橘皮半夏枳實吳茱萸為六陳也。保昇曰根似玄參惟虛浮者為劣也。頌曰今陝西州郡及遠石州亦有之狀如馬志所說時珍曰狼毒出秦晉地今人往往以草簡為之誤矣。見簡如下也。

根氣味辛有毒

天明曰苦辛有毒之才曰大豆為之使宜醋炒惡麥句薑裏占斯密陀僧也

主癰疽上氣破積聚飲食寒熱水氣瘡鼠瘻疽瘲精蟲蠶

鳥走獸除胸下積僻別治瘧飲燈心水殺龍明合野葛納耳中治聾子

附方舊四經除胸下積僻別治瘧飲燈心水殺龍明合野葛納耳中治聾子

新六心腹連痛梧子大一日服一丸二日二丸三日三

九止又從一丸起至三丸

九種心痛一蟲二蛀三風四悸五食六飲七冷八熱九氣也。又治連年積冷流注心胸及落馬墮車瘀血中惡止以瘥為度。射后方。

九種心痛等證九痛丸用狼毒炙香吳茱萸湯泡巴豆去心炒取霜乾薑炮入參各一兩附子泡去皮二兩為

未煉蜜丸梧子大每空服

夏中冷痛水穀陰精心下停痰而腸痞滿櫻之鳴轉害飲食用狼毒三兩附子一兩

溫酒下一丸和剷局方。月中冷痛旋覆花三兩搗未蜜丸梧子大每眼三丸食前白湯下日三服之。○射后方。

四兩防風二兩附子三兩燒以蜜丸梧子兩丸氣吉同腹中

大每服三丸日夜兩服急冷痛方

一刀圭川狼毒杵末每服一錢用錫一皇子大沙糖少許以乾黑蜜研

狼毒不拘多少搗爛以猪油馬油調搽患處方睡勿以被

積年瘡瓦器內以津液擦化為末同以清油浸藥膏一十三日侍藥沉油清

遇夜不見燈火龍油塗唇上以口鼻責

年乞生瘡搔之黃水出每逢陰即惡

於藥杯上吸氣以取效。永類方。聖惠方。

防葵

本經上品采之房苑別名甘吳普又名爵離益農果茶曰根葉

集解曰防葵生臨淄川谷及嵩高太山少室三月三日采

中紅白六月花白七月八月實白三月采根茶曰此物亦稀有襄陽望楚山東及興州西方有之興州者乃勝南者為隴蜀地也。頌曰今

惟出襄陽地他郡不聞也其葉似葵每莖三葉一本十數莖中發一幹其端開花如葱花景天輩而色白六月開花即結子根似防風香

惡瘧風瘡

狼毒秦艽等分為末每服方寸匕溫酒下日二服或一服千金方

防葵

本經上品采之房苑別名甘吳普又名爵離益農果茶曰根葉

集解曰防葵生臨淄川谷及嵩高太山少室三月三日采

中紅白六月花白七月八月實白三月采根茶曰此物亦稀有襄陽望楚山東及興州西方有之興州者乃勝南者為隴蜀地也。頌曰今

惟出襄陽地他郡不聞也其葉似葵每莖三葉一本十數莖中發一幹其端開花如葱花景天輩而色白六月開花即結子根似防風香

味亦如之依時采者乃沉水今乃用枯朽狼毒當之極為謬矣。正誤公景曰防葵今用建平者本與狼毒同根猶如三建其形亦相似但時珍曰唐時隴西虎州以之為貢按蘇頌之所說詳明可據也。正誤置水中不沉耳而狼毒陳久者亦不能沉矣。誤曰凡使防葵勿誤用狼毒緣真相似而驗之有異功又不能切須審之恐誤人疾其防葵在葵州沙土中生得二十日便生蛇用之惟輕為妙參曰狼毒與防葵都不同類生處亦別器皿曰二物一是上品蓋惡不同形質又別陶氏以浮沉為別後人因而用之將以防葵破堅積為下品之物與狼毒同功今古因循遂無甄別殊為謬誤。

根修治

〔徵〕曰凡使須揀去艸末用甘草湯浸一宿漉出暴乾用黃精自然汁一二升拌了土器中炒至汁盡用

氣孚寒無毒別錄曰廿苦普曰神農辛寒桐君扁鵲無毒岐伯雷公黃帝辛苦無毒權曰有小毒王治痘瘡湯酒

旁光熱結溺不下欬逆

濕瘡癩癩狂犬篤邪狂走久服堅骨髓益氣身本經療五臟虛氣小腹脹脹脰除督脈強志中火者不可服

令人恍惚見鬼

〔錄〕久服主邪氣驚狂參主瘡瘍氣塊膀胱宿水氣瘤大如瓠是能消散鬼瘡百邪鬼魅精怪通氣

〔本經〕曰時珍曰神農上品藥黃帝歧伯桐君雷公扁鵲吳普皆言其無毒獨別錄言中火者服之令人恍惚見鬼陳延之小品方云防葵多服令人迷惑恍惚如狂按難經云重陽者狂脫陽者見鬼是呈上品養性所宜乎是豈寒而無毒者乎不然則本經及蘇恭所列者是防葵功用而別錄所列者乃似防葵之狼毒功用非防葵也狼毒之亂防葵其來亦附方舊一腫滿洪大防葵研末溫酒服一刀圭至二三頭王狂疾方遠矣不可辨古方治蛇瘕竈疽大方中多用防葵皆是狼毒也附方新二腫滿洪大服身瞞及小不仁為效○附后方治牙疾同

上傷寒動氣

〔別錄〕曰傷寒汗下後臍左有動氣防葵散用防葵一兩木香黃芩柴胡各半兩每服半兩水一杯半煎八分溫服

雲岐子保命集

狼牙

〔本經〕

下品采桑子本經狼齒別錄狼子別

大牙吳吳抱牙普支蘭

李當之弘景曰具牙集解別錄曰狼牙生淮南川谷及冤句八月采根暴

七月華八月實黑八月米根保昇曰所在有之苗似蛇虐而厚大深綠色根黑若獸之牙三月

八月采根日乾嚼曰今江東濟東州郡多有之時珍曰范子計然云出建康及三輔色白者善

根氣吐苔有毒

〔別錄〕曰酸普曰神農黃帝皆有毒桐君辛岐伯雷公扁鵲皆無毒才曰萬夷為之使惡地榆棗核主治邪氣熱氣瘡瘍瘡瘻去膿本經治浮風瘡瘻煎汁洗

咽喉 毒攻作腫真簡始承甲大納口嚼汁

善忘不禁簡始二分甘草二兩消石為末每

喉嚨之當微覺為佳

張文仲備急方

中焦熱痞

服一錢雞鳴時溫酒下以知為度

聖惠下

肺瘡營養

簡始末入輕粉香油

大戰

本經置名印金雅下品采名印金雅

巨爾

下馬仙

綱目時珍曰其根辛苦

戰人咽喉故名今俚人呼為下

集錄別錄曰天戰生常山十二月采根陰乾保用

苦參皮黃肉黃白五月采苗二月八月采根用鹽曰近道多有之春生紅芽漸長叢高一尺以來葉似初生楊柳小園三月四月開黃紫

花圓似杏花又似蕪荑根似細苦參秋分采根陰乾淮甸出者莖圓高三尺葉黃莖至心亦如百合苗江南生者葉似芍藥時珍曰

大戰生平澤甚多直莖高二三尺中空折之有白數葉長狹如柳葉而不圓其稍葉密摺而上杭州紫大戰

為上江南土大戰次之北地綿大戰色白其根皮柔韌如綿甚峻利能傷人弱者服之或至吐血不可不知

根

徐浩穀曰凡使勿用附生者誤服令人洩氣不禁即煎薦危解之采得後於槐砧上細剉與海芋葉拌蒸

從已至申去半薦乾用時珍曰凡采得以漿水煮軟去骨晒乾用海芋葉麻而有毒恐不可用也

權曰苦辛有大毒元素曰苦甘辛陰中微陽瀉肺損血李時珍曰得棗即不損脾之

才曰反甘草用菖蒲解之朱曰畏菖蒲葷蘆草陳大明曰赤小豆為之使惡薦預

主治

毒藥泄天行瘧病破癰吉大

吐逆

本經取附生根頭痛發汗利大小便

別錄曰利

滌毒藥泄天行瘧病破癰吉大

吐逆

本經取附生根頭痛發汗利大小便

別

別
錄

蘇葉

卷

瘧疾消癥退明發時珍曰澤漆利水功類大戟故人見其莖有白汁遂誤以為大戟然大戟根皆有毒而苗皆有毒淺人而澤漆根硬不可用苗亦無毒可作菜食而利大便陰氣盛不相侔也

新六月

葛上氣

脉沉者澤漆湯主之澤漆三斤以東流水五斗煮取一斗五升去滓入半夏半升紫參白前生

心下伏瘕大如盃不得食澤漆四

節審丸桔子大每服二九

十重水氣

澤漆十斤夏月取嫩莖葉入水一斗研汁約二斗於銀鍋內慢火熬

每服二丸葛洪肘后方

每服二丸白湯下日二服覺腹

中緩小便利為度

乾坤秘韫脚氣赤腫

一雨水五碗煎三碗薰洗之

衛生易簡方

瘧癰

貓兒眼睛草一二絹井水二桶五月五日午時鍋內熬至一桶去滓澄清再熬

一碗瓶收每以椒葱枝煎湯洗瘧癰乃除此停數次愈

便氏圖纂方

瘧癰有蟲

調塗之

衛生易簡方

甘遂

本經

下品

名

甘蕷

別

陵蕷

別

澤

別

甘澤

吳

重澤

別

苦澤

吳

白澤

吳

主田

別

鬼醜

吳

普

錄

名義多未詳

集

魚米根陰乾苦

曰八月采弘景曰

澤漆其根皮赤肉白作連珠實重者良草甘遂乃是瘀血癥體全別苗亦不同俗名重臺葉似鬼臼莖麻根皮白色大明曰西京者上汴滻

吳者次之形似和皮甘草節

曰今陝西江東亦有之苗

似澤漆並短小而葉有汁根皮赤肉白作連珠大如指頭

根

修治

藥曰

凡采得去莖於槐砧上細剉用生甘草湯薑花自然汁二味攪浸三日其水如黑汁乃漉出用

東流水淘六七次令水清為度流出於土器中熬脆用以時珍曰

令人多以麪裹熟用以去其毒

氣味

甘草有毒

別錄曰甘

神農桐君苦有毒岐伯雷公甘有毒元素曰

純陽也之才曰瓜蒂為之使惡遠志反甘草

主治

大腹症

腹滿面浮腫

飲宿食破癰

堅積聚利水穀道

本

下五水散膀胱留熱皮

中痞熱氣

月滿

能瀉十二種水疾素瘧水

藥寫臂空

及隧道水濕脚氣陰囊腫疎迷癩癰噎膈瘻

珍

時發明

宗奭曰此藥專於行

水攻決為用元素曰

腎主水凝則為痰飲溢則為腫脹甘遂能泄腎經濕氣治癰之本也不可過服但中病則止可也張仲景治心下留飲與甘草同用取其相

曰凡使勿用蒼蠇子其形相似只是微赤服之無効時人多以雞之時珍曰張仲景金匱要略言菜中有水蘋苔葉圓而光有毒誤食令人狂亂狀如中風或吐血以甘草汁解之

子修治

驗

修事

養

苔子十兩

頭醋一錘

煮乾為度却用苦

氣味

苦寒無毒

明溫有

毒服之

熱發以綠豆汁

甘草汁

麻犀角並解

之穢

日有大毒

誠服之衝

人心大煩悶

眼生瘡火頭

曰本經言性

更後人多云大熱而史記淳于意傳云昔有淄川

王夫人懷子不乳飲以浪藥一撮以酒飲旋乳且不乳

益熱藥所治又古方主卒頭痛不單用良若性寒耶

主治齒痛虫蟲肉腫

拘急

久服輕身

使人健行走及奔馬

強志益力通神見鬼多食令人狂走

本經療癲狂風病頭倒狗蠻

別錄

安心定志聰明耳目除邪逐風變

白主癥瘕取子洗晒隔日空腹水下一指捻亦可小便浸令汝盡暴乾上服勿令子破破則令人發

少焦研末治下部脫肛止冷

痢主蛀牙痛咬之蟲止

頭瘡

魚蝨牙及洗陰汗

大

白孕景曰人

春頭狂方用

然不可過剝久服自無嫌通神健行足為大益而仙經不

<

本草綱目

卷十七

皮核每空心食一個水飲

青州乾棗十個去核入萸管填滿札

萸管子為末臘猪脂和丸綿裏裹許道下部可

下覺熱即止 聖濟錄

水漏曰久定燒存性每暮米飲服一錢

聖惠方冷腎利下因病出更納新者不過三度瘥○孟說必效方赤

臙刺一撮為末每服一錢米飲下

腹痛陽滑後重大黃燈半兩萸管子炒黑

飲下

色青州棗一升去皮核醃醋二升同着搗膏九梧子大

每服二十九食前米

變種種瘤兼脫肛萸管子一升淘去浮者者人牙出晒乾炒黃黑

聖惠方月腸風下血及五升即止慢火煎令可九大如梧子每旦取酒通下三九增至五七九止若丸時粘手則以兔絲粉糊隔之火候忌

擊藥焦則失力也初服微熱勿怪疾甚者服過

脫肛不收

火之

聖惠方

三日當下利疾去利亦止絕有効 築中方

脫肛不收

月經

臙刺一撮為末

每服一錢米飲下

普濟方久痢不止

色青州棗一升去皮核醃醋二升同着搗膏九梧子大

每服二十九食前米

變種種瘤兼脫肛萸管子一升淘去浮者者人牙出晒乾炒黃黑

聖惠方月腸風下血及五升即止慢火煎令可九大如梧子每旦取酒通下三九增至五七九止若丸時粘手則以兔絲粉糊隔之火候忌

擊藥焦則失力也初服微熱勿怪疾甚者服過

脫肛不收

火之

聖惠方

雲實

本經上品

釋名實錄

別

靈芝

大豆

馬豆

圓

羊石子

圓

薯蕷

唐

固

占

目

特珍

日

貴

亦音

雲

具義未詳

以

集解

曰雲實生河間川谷十月采皋普曰莖高四五尺大葉中空葉如麻雨兩相對六月花八月九月實十月采弘景曰處處有之子細如茅莖子而小黑其實亦類蕷若燒之致鬼未見其法術恭曰雲實大如黍及麻子黃黑似豆故名天豆叢生澤旁高五六尺葉如細槐亦如首蓿枝間微刺俗謂苗為草實母陶云似蕷蕨者非也保昇曰所在平澤有之葉似細槐花黃白色真莖如豆其實青黃色大如麻子五月六月采實謂葉如槐而根長枝上有刺苗名具草又名羊石子草實名馬豆三月四月采苗十月采實過時即枯落此時珍曰此草山原甚多俗名枯刺亦莖中空有刺高者如蔓其葉如槐三月間黃花纏然滿枝莖長三寸許狀如肥皂莖內有子五六粒正如鵝豆兩頭微尖有黃黑班紋厚殼白仁咬之極堅重有腥氣

實修治

穀旦見采得粗搗相對拌漬
頌核實蒸一日揀出暴乾

氣寒溫無毒別錄曰苦善曰神農辛

主治泄痢腸澼蟲蟲毒去邪惡氣止痛除寒熱消

本殺精物下水燒之致鬼

別錄發明蘇珍曰雲實花能令人見鬼發狂

經系精物下水燒之致鬼

別錄發明蓋有久服輕身之理此古書之記

本消

渴別治瘧多角

蘇頌王下醫臘血附方

新醫蠶不止

雲石實女萎各一兩桂半兩川烏頭二兩為末蜜

九梧子大每服五丸水下日三服

肘后方

根王治瘧及咽喉痛研汁嚥之時

蓖麻

蓖音里草

唐本草集解曰葉似大麻子形宛如牛虻故名

爵珍曰葉似大麻子形宛如牛虻故名

集解曰葉似大麻子形宛如牛虻故名

集解曰葉似大麻子形宛如牛虻故名

集解曰葉似大麻子形宛如牛虻故名

集解曰葉似大麻子形宛如牛虻故名

集解曰葉似大麻子形宛如牛虻故名

集解曰葉似大麻子形宛如牛虻故名

集解曰葉似大麻子形宛如牛虻故名

集解曰葉似大麻子形宛如牛虻故名

子修治

穀旦穀珍曰凡使勿用黑天赤利子綠在地莖上是顆頭大有毒核用之亦良保昇曰今在處有之夏生

苗葉似葎草而大厚莖亦有節如甘蔗高丈餘秋生細花隨便結實殼上有刺狀類巴豆青黃斑褐夏采莖葉秋采實冬采根月乾用時

珍曰其莖有赤有白中空其葉大如錢葉每葉凡五尖夏秋間極裏抽出花穗纏繫黃色每枝結實數十顆上有刺攢簇如蠍毛而軟凡

三四子合成一顆枯時劈開狀如巴豆殼內有子大如豆殼有斑點狀如牛虻再去

斑殼中有仁嬌曰如續隨子仁有油可作印色及油紙子無刺者良子有刺者毒

味辛草有小毒

穀珍曰凡服蓖麻油法用蓖麻仁五升搗爛以水一斗煮之有沫撇起待沫盡乃止去水以沫煎至點燈不祚滴水不散為度

王叔和曰凡服蓖麻者一生不得食炒豆

王叔和曰凡犯之必脹死其油能伏丹砂粉霜

王叔和曰凡服蓖麻者一生不得食炒豆

王叔和曰凡服蓖麻者一生不得食炒豆

王叔和曰凡服蓖麻者一生不得食炒豆

王叔和曰凡服蓖麻者一生不得食炒豆

王叔和曰凡服蓖麻者一生不得食炒豆

王叔和曰凡服蓖麻者一生不得食炒豆

王叔和曰凡服蓖麻者一生不得食炒豆

王叔和曰凡服蓖麻者一生不得食炒豆

寒熱身體瘡瘍浮腫石疽惡氣榨取油塗之本石傳瘡瘍疥癩塗毛足心催生

大

明治潔癩取炒熟麥芽時嚼服二三枚漸加至十

枚有效

家

主偏風不遂口眼喎斜失音口噤頭風耳聾腰痙攣脚氣腫丹焰湯傷風刺入肉女人胎衣不下子陽挺出

開通關竅止諸痛消腫追膿拔毒

時珍曰

震享曰

范麻屬陰其性善收能追膿取毒亦外科要藥能出有形之滯物故取胎產胞

其性善走能開通諸竅經絡故能治偏風失音口噤口目喎斜頭風七竅諸病不止於出有形之物而已蓋鵝鴨油能引藥入內范麻油能拔病氣出外故諸膏多用之一人病偏風手足不舉時珍用此油同羊脂麝香鮑魚甲等藥煎作膏膏日摩數次一月餘漸復兼服

搜風化痰養血之劑三月而愈一人病手臂一塊腫痛亦用范麻鴨膏貼之一夜而愈一人病氣鬱偏頭痛用此同乳香食鹽搗爛太陽穴一夜痛止一婦產後子腸不收搗仁貼其丹田一夜而止此藥外用累奏奇効但內服不可輕率耳或言搗膏以筋點鵝鴨六畜舌根

下即不能食或點肛內即下血

附方

舊九新

半身不遂

失音不語

取范麻油一升酒一斗銅鍋盛油

口目喎

斗范麻子仁搗膏左貼右

著酒中一日煮之令熟細細服之

外臺秘要

○目喎余右貼左即正○

婦人良

方用范麻子仁七七粒研作餅右喎安在左手心左喎安在右手心却以銅盞盛熱水

坐藥上冷即換五六次即正也一方用范麻仁七七粒巴豆十九粒麝五分餅如上用

風氣頭面右貼太陽穴解髮出氣甚驗○德生堂

方用范麻油紙剪花貼太陽亦効又方范麻仁半兩

八種頭風

范麻子剛子各四十九粒去殼金腦芎一大塊搗如泥糊丸梧子大綠穿

棗肉十五枚搗塗紙上捲筒插入鼻中下清涕即止

八種頭風掛風處陰乾用時先將好茶調成膏子塗鼻內後將灰火燒前藥烟起

以盃覆之待烟盡以百沸葱湯盃內茶藥

服之後以綿被裹頭卧汗出避風

袖珍方

鼻塞不通

之一日一易三十日可聞香臭也

聖濟錄

天柱骨倒

小兒疳疾及諸病後天

生筋散貼之木籠子六箇去殼范麻子六十粒去殼研

五種風頭

不問年月遠近用范麻子仁二兩黃連一兩石膏水一碗文武火煮之

勻先包頭擦頂上令熱以津調藥貼之

鄭氏小兒方

五種風頭

即漆水三日兩夜取出黃連只用范麻風乾勿令見日以竹力每個

切作四段每服二十段食後荆芥湯下日二

服終身忌食豆羆之必腹脹死

衛生寶鑑

舌上出血

范麻子油紙擦燒烟薰

鼻中自止

摘玄方

之未退再熏以愈為度有人舌腫出口外一村

人用此法而愈

急喉煙塞

牙關緊急不通此即破以范麻子仁研爛紙卷作

喉中瘡

石任方用范麻子仁一枚朴硝一錢同研新汲

水服之連進二三服效○三因方用范麻仁荆

經驗良方

芥穗等分爲末。審
丸綿包噙嚥之。**水氣脹滿**。蕓麻子仁研水解得三合清豆一顆服。盡日中當脚氣作痛。蕓麻子七粒去殼研爛同蘇合香。小便不通。丸綿包噙嚥之。
外臺秘要。脚氣貼足心痛即止也。
外臺秘要。小便不通。人蓋中即通。摘要方玄。鼻口噙嚥。見效終身不可食炒豆。衛生易簡方。催下胞。崔元亮海上集驗方。取蕓麻子七粒去殼研膏塗頂則腸自人也。○肘后方云。產難取蕓麻子十四粒。每孕各把七粒項史立見下也。

子宮脫。蕓麻子仁十四粒研膏塗項心即入。摘左盤腸生座。同上。
催生胎。不拘死胎。蕓麻二個。巴豆二個。麝香一分。研貼脐中。并一刀圭。重病不忍。蕓麻子仁搗足心又下生胎。一月一粒。溫酒吞下。集簡方。一切毒。月傳即止也。肘后方。癘風。蕓麻子一兩去皮黃連一兩。剉豆大以小瓶子入水一升。同浸。春夏二日。秋冬五日。後取蕓麻子一枚。劈破面東以浸藥水吞之。漸加至四五枚。若有微利。不妨瓶中水盡更添。兩月後。喫大蒜。豬肉試之。如不發是効也。若發動再服。直候不發乃止。杜壬。小兒丹瘤。入麪一匙水調塗之。甚妙。修真秘旨。療癩瘍。告戒。蕓麻炒去皮。每睡時服二三枚。取効。阮氏經驗方。療癩瘍。惡瘍。青膏溶膠投之。攬勻入油半匙。頭至點水中。試軟硬。添膠油得所以紺帛量瘡大小。撲貼一膏。可治三五痴也。儒門事親。月風面瘡。起白屑或微有赤瘡。用蕓麻子仁四十九粒。白果膠棗各三粒。瓦松三錢。肥皂一個。搗爲丸。洗面用之良。扶壽方。面上瘡。五錢爲末。用羊體和匀。夜夜傅之。摘玄方。且平龍頭。綿裹一枚。寒之覺中熱為度。每一日一易。大約二十日可癒。千金方。長黃不黑。三日後頻刷之。摘要方。湯火灼傷。蕓麻子仁。蛤粉等分研膏。湯傷以油試刺入肉。古今錄驗。金刺入肉。蕓麻子去殼十五枝。搗爛入乳。小兒乳汁和丸作鍊。每以鍊。黃。黑。。蕓麻子仁。香油煎焦去滓。研細沙糖丸。皇子大綿裹含無痰出。大良。製膏。疖子大。井花水化下半丸。即下惡。大吐傷。膏先以鹽水洗咬痛處。乃貼此紅麪等分研細。沙糖丸。皇子大綿裹含無痰出。大良。

膏袖珍方

葉氣味有毒。主治腳氣風腫。不仁。蒸搗裹之。日三三易。即消。又油塗支熱。厨顧上止鼻衄。大驗。

蘇恭治癰瘍咳嗽。時珍附方。新鈎嘴疾。喉門

事親方用九尖蓖麻葉二錢入飛過白藥二錢以豬肉四兩薄朴炒藥在內荷葉裹之文武火煨熟細嚼以白湯送下名九仙散○普濟

方治欬嗽涎喘不問年深日淺用經霜蓖麻葉經霜桑葉御米殼蜜沙各一兩為末塞九澤子大每服一丸白湯化下日一服名無憂丸

附錄博醫拾遺藏器曰有大毒主惡瘡櫻根瘤贅瘻肉白癰風疎疎精魅溪毒瘻癰和百丈青雞糞炭等分為末傳之蠱毒

附錄博醫

精魅當別有法生江南山谷蓖麻葉如蓖麻莖中空吹之作聲如搏落迴折之有黃汁藥人立死不可輕用入口

常山本經

蜀漆同上

普

吳茱萸本經

鴨屎草日華子

真定宣此藥始產於此得名歟蜀漆乃常山苗功用相同今併為一集蜀

別錄曰常山生益州川谷及漢中二月八月采根陰乾之曰蜀漆生江林山川谷及蜀漢中常山苗也五月采葉陰乾弘景曰常山出宜都建平細實黃者呼為雞骨常山用之最勝蜀漆是常山苗而所出又異者江林山即益州江陽山名固是同處爾坡人采得繫結作丸得時燥者佳卷曰常山生山谷間莖圓有節高者不過三四尺葉似若而狹長兩相當二月生白花青萼五月結實青圓三子為房其葉暴燥色青白堪用若陰乾便黑爛鬱壞矣徐昇曰今出金州房州梁州中江縣樹高三四尺根似荆根黃色而破五六月采葉名蜀漆也李舍允曰蜀漆是常山莖八月九月采之頃曰今汴西淮浙湖南州郡亦有之並如上說而海州出者葉似橄欖八月中花參台戰紅白色子碧色似山棟子而小今天台山出一種草名土常山苗葉種甘人用為飲甘味如蜜又名蜜香草性涼益人非此常山有之曰乾用其常山凡用以酒浸一宿漉出日乾熬搗用時珍曰近時有酒浸蒸熟或丸炒熟者亦不甚吐人醋制者吐人

常山氣味寒有毒

別錄曰辛微寒普曰神農岐伯苦桐君辛有毒李當之大寒權曰苦有小毒

小毒燭曰得甘草吐之才回異王札大明日忌勿采及松葉伏硫石

主治傷寒寒熱發溫瘧鬼疰病

結吐本經

療瘧症往來水脈酒惡寒氣瘻別錄

治諸瘻吐痰涎治項下瘻癰別錄

權

蜀漆氣味辛有毒

別錄曰微溫權曰苦有小毒元素曰辛純陽內
曰桔梗為之使之才曰桔梗為之使惡苦參

全治瘻症久寒熱腸中癥堅痞積聚氣蠭毒鬼疰

瘻胸中邪結氣吐去之別錄

鬼疰瘻多時溫瘧寒熱下胞氣破血洗去腥與苦酸同用導膽邪

元發月戰曰蜀漆春夏用莖葉秋冬用

山蜀漆為治瘻之最要不可多進令人吐逆震亨曰常山性暴悍善驅逐能傷真氣病人稍近虛怯不可用也外臺乃用三兩作一服殊雷公老人久病切忌之戒時珍曰常山蜀漆有却瘻截瘻之功須在發散去邪及提出陽分之後用之得宜神効立見用失其法其氣必

傷寒瘧有六經五臟瘧或濕食積瘧寒邪諸瘧分陰陽虛實不可一概論也常山蜀漆生用則上行必吐酒蒸炒熟用則氣稍緩少用亦不致吐也得甘草則吐得大黃則利得烏梅酸鯉甲則入肝得小麥竹葉則入心得秫米麻黃則入肺得草果則入腎得枳榔則入脾蓋無症不作瘧二物之功亦在驅逐痰水而已楊士瀛直指方云常山治瘧人皆薄之瘧家多畜痰涎黃芩或停諸心下或結滌膈間乃生寒熱法當吐痰逐水常山豈容不用水上焦則常山能破其滯而下其水須行血藥品佐助之必收十全之功其有純陽發瘧或溫熱內實之證投以常山大便點滴而下似泄不泄者復用北大黃為佐泄利數行然後獲愈也又待制李燾云嶺南瘧氣寒熱所感邪氣多任營衛皮肉之間欲去皮膚毛孔中瘴根本非常山不可但性此人惟以七寶散冷服之即不吐且付舊三新方二十三截瘧諸湯外臺秘要用常山三兩裝水三升浸一夜煎取一升欲發前服取吐○肘后方用常山一兩秫米一百粒水驗也附方二十三截瘧諸湯大升煮三升分三服先夜未發臨發時服盡○養生主論王隱者驅瘧湯云予用此四十年奇效不能盡述切勿加減萬一無吐者常山酒煮晒乾知母貝母草果各一錢半水一錘半煎半熟五更熱服渣以酒浸發前服○截瘧諸酒肘后方用常山一兩酒一升清二三日分作三服平旦一服少頃再一錢半水一錘半煎半熟五更熱服渣以酒浸發前服○截瘧諸酒服臨發又服或加甘草者服之○宋俠經心錄醉隔湯治間日瘧支太醫云乃桂廣州方也甚驗恒山一錢二分大黃二錢半炙甘草一錢二分水一盞半煎減半醇發日五更溫服再以水一盞煎減半日醞未發時溫服○虞搏醫學王傳治久瘧不止常山一錢半檳榔一錢丁香五分烏梅一個酒一盞浸一夜五更飲之一服便止永不再發如截瘧諸九千金方恒山丸治數年不瘥者兩劑瘥一月以來者一劑瘥恒山三兩研末雞子白和九梧子大丸熬煮殺腥氣則取晒神軌收之每服二十九竹葉湯下五更一服天明一服發前一服或吐或否即止○肘后丹砂丸恒山搗末三兩真丹一兩研白蜜和杵百下九梧子大先發時三丸少項再服三丸臨時服三丸酒下無不斬者○曾世榮活幼心書黃丹丸治大小久瘧恒山二兩黃丹半兩烏梅連核瓦焙一兩為末糯米糊丸梧子大每服三五十丸涼酒下隔一夜一服平旦一服午後方食○葛洪肘后方用恒山三兩知母一兩甘草半兩搗末蜜丸梧子大先發時服十九次服七丸後服五六丸以瘧為度○和劑局方膽仰丸治一切瘧常山四兩炒存性草果二兩炒存性為末薄糊丸梧子大每卧時冷酒服五十九五更再服忌齋羊熱物○又勝金丸治一切瘧胸膈停痰發不愈者常山八兩酒浸蒸焙枳榔二兩生研末糊丸梧子大如上法服○集簡方二聖丸治諸瘧不拘遠近大小用破陰丸瘧寒多熱少雞骨恒山雞心櫟榔各一兩生研鮫鱗甲煅焦一兩半為末糊丸菉豆大黃丹為丸每服三五十丸如上法服○破陰丸瘧喘息如死狀或小腹滿小便如膠不問久近不吐不泄加神恒山一兩醋浸一夜

太陰瘧瘧見恒山三錢甘草半錢秫米三十五粒水二鍊煎一鐘發日早分三次服 千金方少陰腎瘧一錢竹葉一錢半葱白三根水一升半煎一升發前分三服 千金方化瘧獨寒煩三日夜龍骨各二錢為末瓦器煮乾每用二錢水一盞煎半盞更令服之 趙真人濟急方

每服半錢臨發日旦一服發前一服酢漿水土調下溫瘧又蜀漆一錢○張仲景全醫要要牛瘧獨熱屬涼去沫入藥再煎至一鍾未發前溫服得吐則止。王燾外臺秘要方。**溫瘧散** 恒山一錢小麥三錢淡竹葉一錢水煎五更服甚良。藥性論三十年瘧。肘后方治三十年老瘧及積年久瘧常山黃連各一兩酒三升清一宿以瓦盆煮取一升。

龍骨五錢附子炮二錢半大黃一兩為末雞子黃和丸梧子大半發時五丸將發時五丸白湯下支太醫云北方神驗無不斷者。

瘧瘧寒熱 劉長春經驗方常山一寸草果一枚熟酒一碗浸一夜五香豉各一兩附子炮七錢搗末蜜丸梧子大空腹飲服四丸欲發時三丸至午後乃食女女瘧 酒蒸常山石膏梗各一錢烏梅炒五分 更望東服之蓋卧酒醒即愈○談楚翁試驗方用常山枳殼甘草各二錢黑豆一百粒水煎服之乃彭司寇所傳○葛稚川肘后方用常山黃連生辰

香豉各一兩附子炮七錢搗末蜜丸梧子大空腹飲服四丸欲發時三丸至午後乃食女女瘧

酒蒸常山石膏梗各一錢烏梅炒五分 更望東服之蓋卧酒醒即愈○談楚翁試驗方用常山枳殼甘草四分水一盞酒一盞浸一夜平旦

溫服

姚僧 **白兒瘧**

水鑑仙人歌曰瘧是邪風寒熱攻直須術治免成空常山刻作人形狀釘在孩兒生氣宮

坦集驗方

加金生人金生在己即釘己上木生人釘亥上火生人釘寅上水生人土生人釘申上也。小兒驚汗暴驚癲

漆炒二錢左顧右盼一錢二分漿水胸中痰飲

恒山甘草各一兩水五升煮取一升去滓入附錄杜莖山

圖經頌曰葉味苦寒主溫瘧寒

煎服當吐痰而愈名千金湯阮氏胸中痰飲審三合溫服七合取吐不吐更服

千金方

附錄杜莖山

熱作止不定煩渴頭痛心躁杵

爛新酒浸絞汁服吐出惡涎其效生宜用並高四五尺

葉似苦參春秋有花冬作實如枸杞子大而白色也

土紅山

頌曰葉甘微寒無毒主骨節疼痛等熱瘧瘧生南恩州山野中大者高七

葉似苦參春秋有花冬作實如枸杞子大而白色也

蓉葉其葉上青下白根如葛藟土人取板米泔浸一宿以清水再浸一宿炒黃為末每服一錢水

一盞生薑二片同煎服亦治勞瘧甚効時珍曰杜莖山即土恒山

紅山猶杜莖山之類故並附之

藜蘆

本經

山葱 別錄

葱 音桂

葱 並月桂

藜蘆 別錄

采根陰乳晉曰大葉小根相連弘景曰近道處處有之根下極似葱而多毛用之止剝取根微炙之襟

昇曰今陝西山西東西州郡皆有之遼州均州解州者尤佳三月生苗葉似初出櫻心

又似車前葉似葱白青紫色高五六寸上有黑皮裏莖似櫻皮有花肉紅色根似馬腸根長四五寸許黃白色二月三月采根陰乾此有

二種一種水藜蘆莖葉大同只是生在近水深澗石上根鬚百餘莖不中藥用今用者名葱白藜蘆根鬚甚少只是二三十莖生高山者

為佳均州土俗亦呼為鹿葱范

子計然云出河東黃白者善

根修治

雷曰凡采得去頭用糯米泔
汁煮之從己至未晒乾用

葱白服之吐不
止飲葱湯即止

主治蠅毒敷疎浸麻湯臘頭瘡亦蠻瘡受者雖每去死肌本
經療噦逐喉煙不通鼻中息肉馬刀爛瘡不入湯用別主

上氣毒積年腹血泄痢

點止膈風淫暗風痼病小兒

頭疽

蘇東坡治馬疥

宋徽宗頌曰梨蘆服錢匕一字則惡吐人久用通項令人

嚙別本云治噦逆甚効時以目噦逆用吐藥亦可
謂之梨蘆散

反胃用吐法去痰積之義吐藥不一常山吐瘧疲瓜丁吐熱痰烏附大吐

濕痰茱萸子吐氣寒梨蘆則吐風痰也按張子和儒門事親云
一婦病風癆自六七年得發風後每一二年一作至五七年五七作三十歲至四十歲則日作或甚至一日十餘作遂嘗知健忘求死而
已值歲大飢采百草食於野中見草若薑狀采歸蒸熟飽食至更忽覺心中不安吐涎如膠連日不止約一二斗江出如洗甚嘵因三日

后遂輕健病去食進百脈皆和以所食葱訪人乃葱茹也即本草葱蘆是矣圖經言能吐風病此亦偶得吐法耳我朝荆和王妃劉氏

年七十病中風不省人事牙關緊閉群醫束手先考太醫吏日月池翁診視藥不能入自午至于不

獲已打去一齒濃煎梨蘆湯灌之少頃噫氣一聲遂吐痰而甦調理而安樂弗瞑眩誠然

附方十三 諸風痰飲

梨蘆十分鬱

舊六新

一分爲末

每以一字溫漿水一盞

牙關緊患者梨蘆兩去苗頭濃煎防風湯浴過焰乾切炒做褐色爲末
和服探吐 經驗方 每服半錢小兒減半溫水調灌以吐風涎為效未吐再服

簡要濟衆

中風不語

喉中如鬼銼口中

天南星一個去浮皮於臍上剝一坑納入陳醋二祿斗四面火逼者風

頭痛方 九小豆大每服三九溫酒下之甚効 經驗方言風豆痛
黃色研爲末生麵丸大每服三九溫酒下之甚効 經驗方言風豆痛

方通頂散梨蘆半兩黃連三分噙鼻○聖惠方

久瘧疾多食

欲吐不吐梨蘆末半錢溫

梨蘆身英炙各一兩巴豆二十五枚熬黃研末蜜丸小豆大每
蘆木調下探吐 保命集 攻瘧瘧瘧

和州梨蘆一盞日乾研末入麝香少許吹鼻又

不

胸中結聚如駭駭不去者巴豆半兩去皮心炒搗如泥梨蘆炙研

身面黑痣

梨蘆皮五兩水一大碗淋汁銅器重湯煮成

分

雄黃一分爲末蜜和點之每日自消勿點兩畔○聖惠方

牙齒蟲痛

梨蘆末內入孔中勿

千金翼

日夜避風

惡瘡

惡肉反出如米粒者末脂

油和塗

効本事方

反花惡瘡

傳每日三五上

聖濟錄

疔瘻惡瘡

油和塗

銀一錢心吐出

德生堂方

附錄山慈石

別錄有名未用曰苦平無毒主女子帶下生山之陽正月生葉如蓼蘆並有灰一名爰此

參果根

日采根一名百連一名烏蓼一名鼠蕷一名虎蒲

馬

腸根

宋圖經頌曰苦辛寒有毒主鹽除風葉瘡瘍

瘡瘍亦生秦州葉似桑三月采葉五月六月采根

馬

木黎蘆

拾
遺

纂

木黎蘆

細

麻驥

集

生

如

茱萸

樹

高二尺

有毒時

珍曰

麻驥

人呼

黃黎蘆

小樹也

葉如櫻桃狹而長多號文四

月開細黃花五月結

氣味苦辛溫有羣治瘧藥

蟲器

小長子如小豆大

附子

本經

釋

箕母

名曰烏頭

別有草烏頭白附子故俗呼此

為黑附子

川烏頭以別之

諸家不分烏頭有川草兩種皆混雜註解今悉

正之

集解

別錄曰附子生犍為山谷及廣漢冬月采為附子春月采為烏頭弘景曰烏頭與附子同根附子八月采八角者良烏頭四月采

之

春時

並初生有腦頭如鳥烏之頭故謂之烏頭有兩歧其蒂狀如牛角者名烏喙取汁煎為射箭天雄似附子細而長乃至三四寸側子即附子邊角之大者並是同根而本經附子出犍為天雄出少室烏頭出朗陵分生三處當合有所宜也今則無別矣卷三天雄

附子烏頭並以蜀道綿州龍州者佳俱以八月采造餘處雖有造得者力弱都不相似江南來者全不堪用天明曰天雄大而長少角刺

而實附子大而短有角平穩而實烏喙似天雄烏頭次於附子側子小於烏頭連聚生者名為虎掌並是天雄一奇子母之類氣力乃有

殊等卽宿根與嫩者耳穀曰烏頭少有莖苗身長而烏黑少有旁尖烏喙皮上蒼色有尖頭大者孕八九個周圍底黑如烏鐵天雄身

全矮無尖周匝四面有附子孕十一個皮蒼色側子只是附子旁有小顆如棗核者木籠子是喙附烏雄側中毗患者不入藥用保昇曰

正者為烏頭兩歧者為烏喙細長三四十寸者為天雄根旁如半散生者為附子旁連生者側子五物同出而異名苗高二尺許葉似石龍

芮及艾宗奭曰五者皆為附子以八角者為上綿州彭明縣多種之惟赤水一鄉者最佳然收采時月與本草不同謹按本草冬采為附子春秋

五七遍以猪糞蓋之然後布種逐月耘耔至次年八月後方成其苗高三四尺莖作四稜葉如艾其花紫碧色作穗其實細小如桑椹狀

黑色本只種附子一物至成熟後乃有四物以長二三寸者為天雄剝削附子旁尖子為側子附子之絕小者亦名側子元種者為烏頭

苟及艾宗奭曰五者皆為附子以八角者為上綿州彭明縣多種之惟赤水一鄉者最佳然收采時月與本草不同謹按本草冬采為附子春秋

頭五年為天雄今一年種之便有此五物豈令人種時之法用力倍至故爾繁盛平時珍曰烏頭有兩種出彭明者卽附子之母今人謂之

烏頭博物志言附子烏頭天雄一物也春秋冬夏采之各異而廣志云妄毒附子也一歲為側子二年為烏喙三年為附子四年為烏頭五年為天雄今一年種之便有此五物豈令人種時之法用力倍至故爾繁盛平時珍曰烏頭有兩種出彭明者卽附子之母今人謂之

川烏頭是也春木生子故曰春采為烏頭冬則生子已成故曰冬采為附子其天雄烏喙側子皆是生子多者因象命名若生子少及獨頭者即無此數物也其產江左山南等處者乃本經所列烏頭今人謂之草烏頭者是也故曰其汁煎為射箭弘景不知烏頭有一以附子之烏頭注射前之烏頭遂致諸家疑訛而雷轂之說尤不近理宋人楊天惠著附子記甚悉令撮其要讀之可不辨而明矣其說云綿州乃故廣漢地領縣八惟彭明出附子彭明領鄉二十惟赤水廉水昌明會昌四鄉產附子而赤水為多至歲以上田熟耕作墾取種於龍安龍川齊歸木門青廸小坪諸處十一月下種春月生苗其莖類野艾而澤其葉類地麻而厚其花紫瓣黃蕊長苞而圓七月采者謂之旱水拳縮而小蓋未長成也九月采者乃佳其品凡七本同而末異其初種之小者為烏頭附烏頭而旁生者為附子又左右附而偶生者為烏子附而長者為天雄附而尖者為天錐附而上出者為側子附而散生者為漏藍子皆脈絡連貫如子附母而附子以貴故專附名也凡種一而子六七以上則皆小種一而子二三則稍大種一而子特生則特大附子之形以蹲坐正節角少者為上有節多鼠乳者次之形不正而傷缺風皺者為下本草言附子八角者良其角為側子之說甚謬矣附子之色以花白者為上鐵色者次之青綠者為下天雄烏頭天錐皆以豐實盈握者為勝漏藍側子則閩人以冗大不足數也謹按此記所載漏藍即雷轂所謂木鼈子大明所謂虎掌者也其扁子即烏喙也天錐即天雄參₁徐昇曰附子烏頭天雄側子烏喙采得以生熟湯浸半日勿令滅氣出以白灰裹之數易使之類醫方亦無此名功用當相同爾不₂之乾又法以米糊及糟糖等淹之並不及前法頃旦五物收時一處造釀其法先於六月內造大小麪糰未采前半月用大麥煮成粥以麪造醋候熟去糟其醋不用太酸酸則以水解之將附子去根續於新甕內淹七日日櫻一迦擣出以疎篩攤之令生白衣乃向慢風日中晒之百十日以透乾為度若猛烈日則破而皮不附內時珍曰接附子記云此物最多不能常孰或種美而苗不茂或苗秀而根不充或已釀而腐或已曝而爛若有神物陰為之者故閩人常構於神目為藥妖其釀法用醋醅安密室中淹覆彌月乃發出眼乾方出酢時其大有如拳者已定軟不盈握故及一兩者極難得土人云但得半兩以上者皆良蜀人餌者少惟秦陝閩浙人宜之然秦人籠市其下者閩浙纔得其中者其上品則皆貴人得之矣○弘景曰凡用附子烏頭天雄皆熱灰微炮令折勿過焦惟蓋附湯生用之俗方每用附子須甘草人參生薑相配者制其毒故也戰曰凡使烏頭宜文武火中炮令破析擘破用若用附子須底平有九角如鐵色一個重一兩者即是氣全勿用雜火只以柳木灰大中炮令破析以刀刮去孕子并去底火壁破於屋下午地上掘一土坑安之一宿取出焙乾用若陰制者生去皮火底薄切以東流水并黑豆浸五日夜流出日中晒用震亨曰凡用烏附及天雄須用童子小便浸透者過以殺其毒并助下行之力入鹽少許尤好或以小便浸二七日掠去壞者以竹刀每個切作四片并水淘淨逐日換水再浸七日晒乾用時珍曰附子生用則發散熟用則峻補生用者須加陰制之法去皮臍入藥熟用者以水浸過炮令發拆去皮臍乘熱切片再炒令內外俱黃去火毒入藥又法每一個用甘草二錢鹽水薑汁童尿各半盞同煮熟出火毒一夜用之則毒去也氣味辛溫有大毒別錄曰甘大熟者曰神農辛岐伯雷公甘有毒李

可升可降陽中之陰浮中沉無所不至為諸經引用之藥。附子曰人手少陰三焦命門之劑。其性走而不守。非若乾薑止而不行。趙嗣真曰熟附配麻黃發中有補仲景麻黃附子甘草湯是也。生附配乾薑稱中有發仲景乾薑附子湯通脉四逆湯是也。戴之才曰地膽為之使。惡蜈蚣畏冷風黑豆甘草人參黃耆時珍曰裏綠豆烏芷童便犀角忌政汁得蜀椒食鹽則下達命門。

王治風寒

欬逆邪氣寒濕踈蹠拘攣膝痛不能行步破癥取積聚血瘕金瘡本經腰脊風寒脚氣冷冷弱心腹冷痛霍亂轉筋下痢赤白溫中強陰堅

肌骨又僵胎為百藥長錄溫暖脾胃濕腎補下焦之陽虛元除藏腑沉寒三陽厥逆濕淫腹痛胃寒蠕動治經閉補虛散壅

李督脈為病脊強而厥

素

治三陰傷寒陰毒陰虛中寒中風痰厥氣厥柔溼癰潤小兒慢驚風濕麻痺腫滿脚氣頭風腎厥頭痛暴癇脫

陽久痢脾泄寒瘻瘧氣久病嘔噦反胃噎膈癰疽不斂久漏冷瘻急涕滯塞耳治聾時珍

烏頭

即附

王治

諸風風痺血痺半身不遂除寒冷溫養臟腑去心下堅痞感寒腹痛元除寒濕行氣散風邪破諸積冷毒

素

除寒濕

附子

不足肝風虛附助陽退陰功同附子而稍緩附子發明宗疏白補虛寒須用附子風家即多用天雄大略如此其烏頭烏喙附子則量其材

若是寒疾即用附子風疾即用川烏頭一云凡人中風不可先用風藥及烏附若先用氣藥後用烏附乃宜也又凡用烏附藥並宜冷服者熱因寒用也蓋陰寒在下虛陽上浮治之以寒則陰益甚而病增治之以熱則拒格而不納熱藥冷飲下咽之後令體既消熱性便發而病氣隨愈不違其情而致大益此反治之妙也昔張仲景治寒疝內結用審煎烏頭近切方治喉痙用審煎附子合之嗽汁朱丹溪治病氣用烏頭施子並熱因寒用也李東垣治鴻臚林姪陰盛格陽傷寒面白赤煩渴引飲脉來七八至但按之則散用蓋附湯加人參投半斤服之得汗而愈此則神聖之妙也冥經曰附子乃陰證要藥凡傷寒傳變三陰及中寒夾陰雖身大熱而脉沉者必用之或厥冷腹痛沉細甚則長青囊縮者惡湏用之有退陰回陽之力起死回生之功近世陰證傷寒往往疑似不敢用附子直待陰極陽竭而用之已遲矣且寒陰傷寒內外皆陰陽氣相處必須急用人參健脾以益其原佐以附子溫經散寒捨此不用將何以救之劉完素曰俗方治麻痺多用烏附其氣最能衝闢道路故氣愈麻及藥氣盡而正氣行則麻愈矣張元素曰附子以白术為佐乃除寒濕之聖藥溫藥宜少

加之引經又益火之原以消陰翳則便弱有節烏附是也。處得巨附子裏雄壯之質有新聞奪將之氣能引補氣藥行十二經以追復散失之元陽引補血藥入血分以滋養不足之真陰引發散寒開腠理以驅逐在表之風寒引溫暖藥達下焦以祛除在裏之冷濕。震亨曰：氣虛熱甚者宜少用附子以行氣肥人多濕亦宜少加烏附行經仲景八味丸用為少陰濟尊後世因以附子為補藥誤矣。附子走而不守取其健悍走下之性以行地黃之濡能致遠耳。烏頭大雄皆氣壯形偉可為下部藥之佐無人表其害人之禍相習用為治風之藥及補藥殺人多矣。王履曰：仲景八味丸兼陰火不足者設附子乃補陽之藥非為行滯也。古曰：烏附非身涼而四肢厥者不可僭用。附子以補火必妨潤水時珍曰：烏附毒非危病不可用而補藥中少加引導甚捷有人續服錢乙即發燥不堪而昔人補劑用為常藥豈古今運氣不同耶。荆府都昌王體瘦而冷無他病日以附子煎湯飲兼嚼礦黃如此數歲。新州衛張百戶平生服鹿茸附子藥至八十餘康健倍常安。張杲醫說載趙知府耽酒色每日煎乾薑熱附湯吞硫黃金液丹百粒乃能健啖否則倦弱不支壽至九十他人服一粒即為害若此數人皆其祿胎稟賦之偏服之有並無害。附方：舊二十六少陰傷寒初得二三日脈微細不可以常理概論也。又瑣碎錄言滑臺風土極寒民啖附子如啖羊棄此則地氣使然爾。附方：新八十七少陰病始得及發熱脉沉者麻黃附子甘草湯。微發其汗麻黃去節二兩甘草炙二兩附子炮去皮一枚水七升先煮麻黃去沫納二味煮取三升分作三服取微汗。張仲景傷寒論。

少陰下利或咽痛或利止脉不出者通脉四逆湯用大附子一個去皮生破八片甘草炙二兩乾薑三

二兩水三升煮一升分溫再服其脉即出者愈。面赤加葱九莖腹痛加芍藥。

二兩水一斗先煮麻黃去沫乃納二味同煮三升分三服。同上。

少陰發熱少陰病始得及發熱脉沉者麻黃附子細辛湯

二兩加生薑二兩咽痛加桔梗一兩利止脉不出加人參二兩。

同上。少陰發寒發熱附子湯溫之乾薑一兩生附子一枚去皮破作八片水三升煮取一升頓服。

少陰發寒已發汗不解反惡寒者虛也。附子炮去皮一枚細辛合分服。

少陰發寒未發汗者用大附子一枚水五

二兩加生薑二兩咽痛加桔梗一兩利止脉不出加人參二兩。

同上。少陰發寒未發汗者用大附子一枚水五

二兩加生薑二兩咽痛加桔梗一兩利止脉不出加人參二兩。

同上。少陰發寒未發汗者用大附子一枚水五

二兩加生薑二兩咽痛加桔梗一兩利止脉不出加人參二兩。

少陰病下利清穀裏寒外熱手足厥逆脉微欲絕身反不惡寒其人面赤色或復痛或乾嘔

二味同煮三升分三服。同上。

少陰病始得及發熱脉沉者麻黃附子細辛湯

二兩水三升煮一升分溫再服其脉即出者愈。面赤加葱九莖腹痛加芍藥。

二兩水一斗先煮麻黃去沫乃納二味同煮三升分三服。同上。

少陰發寒發熱附子湯溫之乾薑一兩生附子一枚去皮破作八片水三升煮取一升頓服。

少陰發寒已發汗不解反惡寒者虛也。附子炮去皮一枚細辛合分服。

少陰發寒未發汗者用大附子一枚水五

二兩加生薑二兩咽痛加桔梗一兩利止脉不出加人參二兩。

同上。少陰發寒未發汗者用大附子一枚水五

二兩加生薑二兩咽痛加桔梗一兩利止脉不出加人參二兩。

同上。少陰發寒未發汗者用大附子一枚水五

二兩加生薑二兩咽痛加桔梗一兩利止脉不出加人參二兩。

少陰發寒未發汗者用大附子一枚水五

二兩加生薑二兩咽痛加桔梗一兩利止脉不出加人參二兩。

同上。少陰發寒未發汗者用大附子一枚水五

二兩加生薑二兩咽痛加桔梗一兩利止脉不出加人參二兩。

○續傳信方治陰毒傷寒煩躁悶急者用半兩重附子一個生薑一大塊作三片糯米一撮以水一升煎六合溫服暖臥或汗出或不出候心定則以水解散之類解之不得與冷水和渴更煎滓服之屢用多效也

并體虛之人患瘧疾寒多者五生飲用生川烏頭生附子並去皮膽各半兩生南星一兩生木香二錢五分每服五錢生薑十斤水二盞煎取一盞溫服

水二盞煎七分溫

中風偏廢羌活湯用生附子一個去皮膽羌活烏藥各一兩每服服之

濟生方

中風氣厥南星去皮生木香半兩每服四錢薑九片遂令癲狂用附子一兩以無灰酒一升

王氏簡易方

半身不遂

浸一七日隔日飲一合

延年秘錄

風

病癰是手足轉口眼喝斜語音蹇澀步履不正宜神驗烏龍丹主之川烏頭去皮膽五靈脂各五兩為末入龍腦麝香五分滴水

濕痺麻木不仁或手足不遂生川烏頭末每以香白米煮粥一碗入末四錢慢熬得所下薑汁一匙蜜三大匙空腹啜之或入薏苡二錢左傳云風淫末疾謂四末也脾主四肢風淫客肝則侵脾而四肢病也此方極有力子每授人良驗

許學士本事方體虛

有風外受寒濕身如在空中生附子生天南星各二錢生薑十斤水一口眼喝斗生烏頭青藥各等分為末每用一字噙入鼻內

本事方

口卒噤

瘡卒忤停尸並用附子末吹入喉中瘡千金翼瘡後中風身如弓反張口噤不語川烏頭五兩剉塊黑大豆半升同炒半點以酒三升傾鍋內急攪以絳搗取酒微溫服一小盞取汗若口不開切開灌之未効加烏雞糞一合炒納酒中服以瘥為度

小品

諸風血風烏荆丸治諸風繼緩言語蹇澀偏身麻痛皮膚癢庠及婦人血風頭痛目眩腸風職毒下血不止者服之尤効有痛風掣搐頤

諸風血風領不收者服六七服即瘥也川烏頭炮去皮膽一兩荆芥穗二兩為末醋糊丸梧子大溫酒或熟水每服二十九

和剎方

婦人血風虛冷月候不匀或手腳心煩熱或頭面浮腫頑麻用川烏頭一斤清油四兩鹽四兩鑄內同熬令裂加桑椹

土川烏

薑汁調撒貼天柱骨內

全幼心鑑

小兒瘡頭瘡乃未葱根搗和作餅貼瘡處全幼心鑑瘡

瘡

瘡

瘡

瘡

瘡

瘡

四兩威靈仙五兩洗焙為末酒糊丸梧子大每服七丸

營衛不行川烏頭炮去皮以大豆同炒至汗出為度去豆焙乾全蠍要

至十九盞湯下忌茶此藥常服其効如神

普濟方

風痙肢痛

牛錢炮為末釀醋熬稠九綠豆大每溫酒下七丸日一服

聖惠方腰

脚冷痺

疼痛有風川烏頭三個生去皮臍為散
醋調塗帛上貼之湏更痛止

聖惠方

大風諸痺 痘癬脹滿大附子半兩者二枚炮折酒消之春冬不瘥者黑附子

散生薑汁調如膏塗之藥乾再

敷之以腫消為度

簡要濟衆

十指疼痛

生薑五片水煎溫服

王氏簡易方

搜風順氣湯

烏附丸用川烏頭二十個香附子半斤薑汁

十九肌體肥壯有風疾頭痛

外臺秘要用臘月烏頭一升炒令黃末以絳袋盛浸三斗酒中逐日溫服

○孫兆口訣附子炮石

者宜常服之

澹菴方豆頭痛

聖惠方治風毒攻注頭目痛不可忍大附子一枚泡去皮為末以生薑一兩大黑豆一

銚子內煮豆熟為度去附子食綠豆

風毒頭痛

聖惠方治風毒攻注頭目痛不可忍大附子一枚泡去皮為末以生薑一兩大黑豆一

頭生去皮四兩天南星炮一兩為末每服二錢細茶三錢薄荷七葉僵梅一個水一盞煎七分臨卧溫服

○朱氏集驗方治頭痛連睛者生烏頭一錢白芷四錢為末茶服一字仍以本喘鼻有人用之甚得効

風毒頭痛

聖惠方治風毒攻注頭目痛不可忍大附子一枚泡去皮為末以生薑一兩大黑豆一

銚子內煮豆熟為度去附子食綠豆

硬胸中寒痰嘔吐清水用大附子或大川烏頭二枚去皮蒸過川芎生薑各一兩研末

四日一服或加防風一兩○三因方必効散治風寒流注偏正頭痛年久不愈者有神効用大附子一個生切四片以薑汁一盞浸炙再

漫再炙汁盡乃止高良薑等分為末

頭風 沐頭中風多汗惡風當先風一日則痛甚用大附子一個炮去皮為末以生薑一兩大黑豆一

銚子內煮豆熟為度去附子食綠豆

頭風 合炒熟同酒一盞煎七分調附末一錢溫酒服又方治二三十年頭風不愈用大川烏

頭生去皮四兩天南星炮一兩為末每服二錢細茶三錢薄荷七葉僵梅一個水一盞煎七分臨卧溫服

○朱氏集驗方治頭痛連睛者生烏頭一錢白芷四錢為末茶服一字仍以本喘鼻有人用之甚得効

頭風

聖惠方治頭痛連睛者生烏頭一錢白芷四錢為末茶服一字仍以本喘鼻有人用之甚得効

頭生去皮生薑半兩水一升半煎分三服○經驗良方並根丸治元陽虛頭痛如破厥氣上衝痰膈炮附子三分蜜鹽四

頭

頭生去皮微炮全燄以糯米炒過去米等分為末

頭生去皮生薑半兩水一升半煎分三服○經驗良方並根丸治元陽虛頭痛如破厥氣上衝痰膈炮附子三分蜜鹽四

頭

頭生去皮微炮全燄以糯米炒過去米等分為末

頭生去皮生薑半兩水一升半煎分三服○經驗良方並根丸治元陽虛頭痛如破厥氣上衝痰膈炮附子三分蜜鹽四

頭

頭生去皮微炮全燄以糯米炒過去米等分為末

頭生去皮生薑半兩水一升半煎分三服○經驗良方並根丸治元陽虛頭痛如破厥氣上衝痰膈炮附子三分蜜鹽四

頭

頭生去皮微炮全燄以糯米炒過去米等分為末

頭生去皮生薑半兩水一升半煎分三服○經驗良方並根丸治元陽虛頭痛如破厥氣上衝痰膈炮附子三分蜜鹽四

頭

頭生去皮微炮全燄以糯米炒過去米等分為末

<b

本草綱目

卷十七

一
二

本草耳聾血生附子為末葱涕

附子去皮炮令折以蜜塗上灸之令密入舍之勿拾遺

久患口瘡

生附子為末醋搘調貼足心男左女右自再換經驗方

風蟲牙痛

普濟方用附子一兩燒灰枯藥一分為末指之又方川烏頭川附子生研麯糊丸小豆大每線包一丸咬之○刪繁方用炮附子末納孔中乃止

眼暴

赤肉蠶砂大者背中以定為度張文仲備急方一切冷氣去風痰定遍身疼痛益元氣強力固精並體令人少病川烏頭一斤用容五升大甕鉢子盛以童子小便浸七日逐日添令溢出掠去壞者不用餘以竹刀切作四片新汲水淘七次乃浸之日日換水日足取焙為末酒煮麯糊丸綠豆大每服十九

空心盃湯下少粥

附流熟附子一大個分作二服水二盞煎一盞入沉香汁溫服

和劑局方

中寒膏固一切虛寒之病生附子一兩去皮臍乾薑炮一兩每服

三錢水二鍾煎一鍾

心腹冷痛五九生薑湯下小腸氣痛加炒茴香酒下二十九王氏博濟方心痛止降溫熱烏頭破寒鬱烏頭

溫服和劑局方

烏頭桂枝湯主之烏頭一味以蜜二升煎減半入桂枝湯五合解之得一升初

服二合不知再服又不知加至五合其知者如醉狀得吐為中病也金匱玉函

寒疝

一

筋脉

皆痛諸藥不効者大烏頭五枚去角

用烏頭桂枝湯主之烏頭一味以蜜二升煎減半入桂枝湯五合解之得一升初

服二合不知再服又不知加至五合其知者如醉狀得吐為中病也金匱玉函

寒疝

一

筋脉

皆痛諸藥不効者大烏頭五枚去角

和九倍子大每服二十九崔氏方寒疝滑泄腹痛腸鳴自汗厥逆熱附子去皮臍玄胡索炒各一兩生木

小腸者一倉卒散治寒疝腹痛小腸氣冷鹽湯下水除

濟生方小腸者一倉卒散治寒疝腹痛小腸氣冷鹽湯下水除

汗出厥逆大附子炒去皮臍一枚山梔子炒焦四兩用二錢水一盞酒半盞煎七分入盞一盞

溫服○宣明方治陰疝小腹腫痛加蒺藜子等分入虛者加桂枝等分蜜糊為丸酒服五十九

寒疝

一

筋脉

皆痛諸藥不効者大烏頭五枚去毛酥炙微黃附子炮

悴醫不能治通判韓子溫篤檢聖方得此方令服旬餘腰痛減久服遂瘥心漏亦瘥精力倍常步履輕捷此方本治腰而効乃如此耳

元臟傷冷

經驗方用附子炮去皮臍為末以水二盞入藥二錢蜜熬溫藥同煎取一盞空心服去精冷暖下元陽肥益氣酒食無碍○梅師方二虎九補元臟進飲食壯筋骨用烏頭附子合四兩醃醋浸三宿切作片子搗一小坑炭火燒赤以醋三升同藥傾入坑

內用盒合之一宿取出去砂土入青鹽四兩同炒亦黃色為

胃冷有痰

脾弱咽吐生附子半錢薑十片水二盞煎七分

久冷反胃

未醋打麪糊丸如梧子大空心冷酒下十五丸婦人亦宜

奇效方

久冷反胃

經驗方用大附子一個生薑一兩剉細同煮研如麪糊每米飲化服一錢○衛生家寶方用薑汁打糊和附子末為丸大黃為衣每溫水

服十九○斗門方用長大附子一個坐于磚上四面着火漸逼以生薑自然汁渟之依前再逼再淬約薑汁盡半碗乃止研末每服一錢

藥米飲下不過三服瘥以猪腰子切片炙熟蘸食○方便集用大附子一個切下頭子剝一瓣安丁香四十九

脾寒瘧

濟生方云五蘆

個在內仍合定線繫入砂鉗內以薑汁浸過文火熬乾為末每桃少許置掌心舐喫日十數次忌毒物生冷

脾寒瘧

氣虛陰陽相勝

發為瘧寒多熱少或但寒不熱宜七薑湯主之用附子一枚炮七次鹽湯浸七次去皮臍分作二服水一碗生薑七斤棗七枚煎七分

露一宿發日空心溫服未久再進一服○王璣百一選方云寘瘧宜附子風瘧宜烏頭若用烏頭則寒多者火炮七次熱多者湯泡七次

去皮焙乾如上法用烏頭性熱炮多則熱散也又果附湯用熟附子去皮草果仁各二錢附子一枚重五錢者麴環人參丹砂半水一盞薑七片棗一枚煎七分發日早溫服○射后方臨發時以醋和附子塗于背上寒瘧瘧各一錢為末煉蜜丸梧子大每服二

十九未發時連進三服中病則吐或身體麻木未中病來日再服 麗安常傷寒論瘧寒熱四肢破每以一片水一盞生薑十片煎七分溫服李侍制云此方極妙章傑云嶺南

以啞瘡為危急不過一二日而死醫謂極熱感寒也用生附子一味治之多愈

雨足脉沉微用利小水藥不効者乃虛寒也附

非得謂以熱攻熱而發散寒邪乎此真起死回生之妙藥也嶺南衛生方 小便虛閉子一個炮去皮臍鹽水浸良久澤瀉一兩每服四錢水一盞半燈心七重

端滿大人小兒男女腫因積得既取積而腫再作小便不利若再服利藥性寒而小便愈不通矣醫者到此

並煎服即愈 普濟方腫滿多乘手蓋中焦下焦氣不升降為寒痞隔故水凝而不通惟服沉附湯則小便自通喘滿自愈用生附子一個去皮臍切片生薑干片入沉香一錢磨水同煎食前冷飲甲虛濕重大附子五枚去皮四破以赤小豆半升藏附子於中慢火煮

附子雖三五十枚亦無害小兒每服三錢水煎服 朱氏集驗方甲虛濕重豆培研末以薑苡仁粉打糊丸梧子大每服十九粒

湯下 朱陰水腫滿烏頭一升桑白皮五升水五升者一升去滓銅器盛之重湯煎至可九九小豆大每服三五丸取小便利為佳忌油

氏集驗方陰水腫滿賦酒麪魚肉又方大附子童便浸三日夜逐日換尿以布擦去皮搗如泥酒糊和丸小豆大每服三十九煎流氣飲送下 大腸冷秘 附子一枚炮去皮取中心如棗大為

不禁熟附子一兩赤石脂一兩為末醋糊

普濟方大腸冷秘末二錢蜜水空心服之 聖濟總錄老人虛世梧子大米飲下五十九 楊氏家藏方冷氣洞泄生川烏頭一兩木

丸梧子大每陳皮湯及老人中氣不足久泄不止肉荳蔻二兩煨熟大附子去皮臍一兩五錢為末糊丸梧子大每服八十九

下二十九 本事方臟寒脾泄肉煎湯下○十便方治脾胃虛冷大腸滑泄米穀不化乏力用大附子十兩連皮同大棗二斤於石器

內以水煮一日常令水過兩指取出每個切作三片再同煮半日削去皮切焙為末別以棗肉和九梧子大每空心米飲服三四十九

小兒吐泄注下小便少白龍丸用熟附子五錢白石脂煨龍骨煅各二錢半為末醋麯糊丸末米大每米飲量克大小服全

金

幼心靈亂吐泄不止附子重七錢者炮去皮臍為末每服四錢水二盞盃半錢煎一盞溫服立止

秘寶水泄久痢川烏頭二枚一生用一以黑豆半合同煮熟研九綠豆大每服五丸黃連湯下普濟方久痢赤白獨聖丸用

個灰火燒烟盡取出地上蓋良久研末酒化臍丸如大麻子大每服三丸赤痢黃連甘草黑豆煎湯冷吞如瀉及肚痛以水吞下忌熱物

經驗梧子大傾入沸湯煮數沸流出作兩服米湯送下

下痢數逆脉沉陰寒退陰散主之陳自明云一人病此一病為末每服三錢米

聖濟總錄下血虛寒不下血虛寒飲下○又方熟附子一枚去皮生薑三錢半水煎服或加

黑豆一百粒並聖惠方陽虛吐血生地黃一斤搗汁入酒少許以熟附子一兩半去皮曬切片入汁內石器煮成膏取附片焙乾入山藥三兩研末

以膏和搗九梧子大每空心米飲下三十九昔葛蔡判妻苦此疾百藥皆試得此而愈屢發屢効余居士選奇

方熟附子為末每服二錢量三片熟附子一枚去皮生薑三錢半水煎服普濟方虛火背熱于末津調塗涌泉穴摘玄方經水不調血藏令痛此方平易捷徑熟附子去皮

澆數白濁水一盞煎六分溫服

斷瘻下胎生附子為末淳酒和涂右足心胎下去之小品方折腕損傷草以膏用大附子一枚生切以猪脂一片三年苦醋同

乾財以米泔漬三宿取脂煎三上三下日摩傳之取効深師方瘻疽腫毒川烏頭炒黃髮炒各一

潤之同上瘻疽久漏瘻口冷膿水不絕內無惡肉大附子以水浸透切作大片厚三分安瘻口上以艾灸之隔數

此法極妙附子削如碁子大以唾粘貼上用艾火灸之附子焦復唾以濕之再灸令熟氣徹內即瘥也千金方

瘻疽肉突鳥頭五枚濃醋三升漬三日洗

古今錄驗丁瘻重病和附子末塗之留頭

汗川烏頭生切以水煎洗甚驗聖惠手足凍裂塗之良談楚翁試驗方足釘怪疾思飲酒此是肝腎冷熱相用炮川烏頭末傳之內服並子湯効

夏氏奇病方

烏頭附子尖生治未茶服半錢吐風痰癲癇時珍曰烏頭用尖亦取其銳氣直達病所爾無他義也保幼大全

時珍曰烏頭用尖亦取其銳氣直達病所爾無他義也保幼大全

為末薑汁麪糊丸黃米大每服十九粒飲下亦治久漏卮羸凡用烏附不可孰為性熱審其手足冷者輕則用湯甚則用九重者

舊

用膏候手足暖陽氣回即為佳也按此方乃和剗局方碧霞丹變法也非真慢脾風不可孰用是故初虞世有金虎碧霞之戒

附方一

新風厥癲謂凡中風痰厥癲癇皆屬風寒上壅牙關緊急上視橋搘並宜碧霞丹主之烏頭尖附子尖蠍稍各七十個石綠研九度飛過

七七風厥癲十兩為末麪糊丸桔子大每用一丸薄荷汁半盞化下更服溫酒半合須臾吐出痰涎為妙小兒驚癲加白僵蠶等分

和

剗局方
膽風撮口生川烏尖三個全足蜈蚣半條酒浸炙麝香少許為末以少許吹鼻得嚏以薄荷湯灌一字

集簡方

木舌腫脹川烏尖巴豆研細醋調塗刷

附子尖大雄火全蠍各

水類
奔豚疝氣作痛或陰囊腫痛去鈴丸用生川烏尖七個巴豆七枚去皮油為末糊丸桔子大

連年不愈川烏頭尖黃藥

方
參砂麝香為衣每服二丸空心冷酒或冷鹽湯下三兩日一服不可多

澹寮方

宮中成瘡等分為末洗了貼之以愈

今錄驗
老幼口瘡烏頭尖一個天南星一個研末薑汁和

為度
古

塗足心男左女右不過二三次即愈

本草綱目草部目錄第十七卷上終

本草綱目草部第十七卷下

草之六

天雄

本經釋名曰白幕。而不生子故曰天雄。其長而尖者謂之天雞。象形也。

長集注別錄曰天雄生少室山谷二月采根陰乾弘景曰今采用

附子三種本出建平故謂之三建今宜都恨山者最好謂為西建錢塘間者謂為東建氣力小弱不相似故曰西水猶勝東白也其用灰殺之時有水强者不佳朱曰天雄附子烏頭並以蜀道綿州龍川出者佳餘處縱有力弱不相似陶以三物俱出建平故名之者非也烏頭由名量音斯爾雅云苓莖草是也今訛莖為建遂以建平譯之矣承曰天雄諸說悉備但始種而不生附子側子經年獨長大者是也蜀人種之尤忌生此以為不利如養蠶而成臼還之意時珍曰天雄有二種一種是蜀人種附子而生出長者或種附子而盡變成長者即如穗芋形狀不一之類一種是他處草烏頭之類自生成者故別錄註烏喙云長三十已上修治教曰宜炮破去皮尖底用或陰制如者為天雄是也入藥須用蜀產曾經釀制者或云須重一兩半有氣眼者乃佳餘見附子下修治附子法亦得大明曰凡丸散炮去皮用飲藥即和皮生使甚佳時珍曰熟用一法母十兩以酒浸七日掘土坑用炭半秤假亦去火以醋一升沃之候乾來熟入天雄在內小盆合一夜取出去曬用之氣味辛溫有大毒

別錄曰甘大溫性曰大熱宜乾薑制之○才曰遠志為之使堅腐根也

本草集注王治大風寒濕瘧節癩拘攣緩急破積聚邪氣金瘡惡瘍骨穿健行經瘡頭面風去來疼痛心腹結聚關節重不能行步陰陽

汁治寒氣久病令人羸弱不倦別錄禹錫曰按淮南子云天雄雖難忘氣益忘之○才曰遠志為之使堅腐根也

痛長陰氣強忘令人武勇力作不倦云取天雄一枚納雄雞腸中搗食之令人勇

治風痰冷瘻軟腳毒風能止氣喘促急殺禽蟲毒

治一切風一切氣助陽道暖水臟補腰膝益精明目通九竅利皮膚調血脉四肢不遂下胸膈水破痃癰癰結排膿止痛續骨消瘀血

脊僵霍亂轉筋汗止陰汗炮含治喉痺大明宋炎曰補虛寒須用附子風家多用天雄亦取其大者以其辛熱性不苦就下為下部之佐時珍曰烏附天雄皆是補下集命門陽虛之藥補下所以益上也若上焦陽虛即屬心脾之分當用參芪不當用天雄也且烏附天雄之尖皆是向下生者其氣下行其體乃向上生苗之處寇宗奭言且不肯就下張元素言其補上焦陽虛皆是誤認尖為上

爾惟朱震亨以為下部之佐者得之而未發出此義雷敷炮附方三建湯治元陽素虛寒邪外攻手足厥冷大小便滑數小便白渾六爻論序云咳逆數聲酒服熟雄謂以天雄炮研酒服一錢也附方三建湯脉沉微除固冷扶元氣及傷寒陰毒用烏頭附子天雄並炮裂去皮膚等分㕮咀每服四錢水二盞十五片煎八分溫服時後方男子大精天雄三兩炮白术八兩桂枝六兩龍骨二兩為散每酒服半錢張仲景金匱要略大風濕續勿洗搗汁漬細粒黑豆摩去皮不滓者一夜取出晒乾又浸如此七次初呑三枚漸加至六七枚禁房至猪魚雞蒜犯之即死

側子

別錄

附子時珍曰生子附子之側生

引景曰此附子邊生之大者削取之昔時不用比來醫家以療脚氣多驗

附子時珍曰此附子邊生之大者削取之昔時不用比來醫家以療脚氣多驗

當陽以下江左山南高齊魯間附子時復有角如大豆許夔州以上劍南所出者附子之角但如黍粟豈可充用比來都下皆用細附

子有効未嘗取角也保昇曰今附子邊果有角如黍核及橫柳以來者形狀自是一顆且不小乃烏頭旁出附子旁出側子甚明

時珍曰側子乃附子旁粘連小者爾故吳普陶弘景皆指為附子角之大者其又修治同

氣味辛大熱有大毒

普曰神農岐伯有大毒

八月采畏惡與附子同

小子側子者即漏監子矣故楊氏附子記言側子漏監園人皆不重之

始乙役失作治

氣味辛大熱有大毒

八月采畏惡與附子同

主治癰腫瘡瘍腰腳疼冷寒熱鼠瘻又墮胎

別錄

酒調附子遍身風寒神妙靈丹

機曰烏頭

腦得母之氣守而不移居乎中者也側子散生旁側體無定在其氣輕揚宜其發散四肢尤達皮毛為治風之藥天雄長而尖其氣親上

宜其補上焦之陽虛木體則餘氣所結其形僵硬宜其不入湯服令人喪目也時珍曰唐元希聲侍郎治癰瘍風有側子湯見外臺秘

不錄

漏監子

御藥集

炮炙

論

虎掌

日善時珍曰此乃附子之瑣細未成者小而漏監故名南星之最小者名虎掌此物類之故亦同

虎掌

名大明會典載四川成都府威貢天雄二十對附子五十對烏頭五十對漏監二十對不知何用

虎掌

時珍曰服之

主治癰瘍冷瘡瘍瘧風

時珍曰

按楊士瀛直指方云凡漏瘡年久者復其元陽當用漏監子草加減

編云一人兩足生瘡瘍瘍難近夜宿五夫人祠下晏神授方用漏監子一枚生研

新

為末入膩粉少許井水調塗依法治之果應此物不堪服餌且入瘡科也

附方一

一切惡瘍

雜下及休息荆臭咸丸用漏監子一

半

編云生瘡瘍瘍難近夜宿五夫人祠下晏神授方用漏監子一枚生研

為末入膩粉少許井水調塗依法治之果應此物不堪服餌且入瘡科也

附方二

一切惡瘍

雜下及休息荆臭咸丸用漏監子一

半

兩俱炒焦存性入乳香少許為末糊丸梧子
大每一歲一丸米飲下 羅天益衛生寶鑑

烏頭

本經文
下品本正

獨白草

釋名

鳥喙

本經即

土附子

日美毒

本經取子

吳普

金龜

本經又

苦良枝

音

獨草

音拾

鷺

音鷺

音拾

鷺

音鷺

獨白草者然而岐者少若烏頭兩岐名烏喙則鳥之頭也有兩岐相合如鳥之喙者名曰烏喙即鳥之口也案曰烏喙即烏頭異名也此有三岐目三岐者射罔者也若烏頭亦曰竹節烏頭出江北者曰淮烏頭曰華子所謂土附子者是也烏喙即偶生兩岐者今俗呼為兩頭尖因形而名其實乃一物也附子天雄之偶生兩岐者外謂之烏喙功亦同于天雄非此烏頭也蘇軾不知此義故反疑之草烏頭取汁晒為毒藥射禽獸故有射罔之稱後魏書言遼東塞外秋收烏頭為毒藥射禽獸陳藏器所引續漢五行志言西國集卷之二曰烏頭烏喙生朗陵山谷正月二生獨白莖莖為樂教箭射人即死者皆此烏頭非川烏頭也荊譜云齊秦猶謂烏喙也正月始生葉厚至方中空葉四四相當與高相似弘景曰今采用四月亦以八月采搗杵莖汁日煎為射罔藥人以傳箭射禽獸十步即倒中人亦死宜速解之明陵屬汝南郡太明曰土附子生去皮搗濾汗澄清旋添晒乾取膏名為射罔以作毒箭時珍曰處處有之根苗花實並與川烏頭相同但此係野生又無釀造之法其根外黑內白皺而枯燥為異爾然毒則甚馬段成式酉陽雜俎言雀芋狀如雀頭置乾地反濕濕地反乾飛鳥觸之墮走獸遇之僵似亦草烏之類而毒更甚也又言建寧郡烏勾山有牧鹿草烏鵲誤食烏喙中毒必急食此草以解之收時珍曰草烏頭或生用或炮用靡不知何藥也

修治時珍曰以烏大豆同煮熟去其毒用

烏頭

氣壅溫

有大毒

別錄曰耳大熱大毒晉書曰神農雷公桐君黃帝均有毒權曰古辛大熱有大毒大明曰味辛熱有毒之才

解其王治中風惡風洗洗出汗除寒濕病數逆上氣破積聚寒熱其計煎之名射罔殺禽獸

本經消胸上痰冷食不下心腹冷堅腫滿不

可忍仰目中痛不可久視又墮胎

別錄主惡風憎寒冷痰包心腸腹痛症瘕氣塊齒痛益陽事姦志

甄氏治頭風候癰癧目干毒

時珍曰苦辛大熱○畏惡同烏頭

烏喙

一名兩頭

小六氣

辛微溫

有大毒

晉書曰神農雷公桐君黃帝有毒

王治風濕丈夫腎陰寒壅熱厥筋掣引腰

瘡不能行步癰腫膿結又墮胎

別錄

男子腎氣衰弱陰汗癰癩歲月不消

主大風頭痺

時珍

射罔氣味苦有大毒

之才曰溫大明曰人中射罔毒以甘草蜜

治戶庄徹堅及頭中風痺

別錄

瘡瘻根結核瘰疬毒瘡及蛇蛟先

取塗肉四畔漸漸近瘻

醫書逐病至骨瘻有熱膿及黃水塗之皆無膿水有生血及新傷破即不可塗立殺人

若川烏頭附子人所栽種加以釀制殺其毒性之比非風頑急疾不可輕投甄擇藥性論言益陽事治男子腎氣衰弱未可遽然此類能

搜風勝濕開頑瘀治頑瘻以毒攻毒豈有川烏頭附子補石醫命門之功哉新都知府自負知醫因病風解服草寫諸木籠子藥過多

南入腹而麻痺遂至不救可不慎乎機曰鳥喙形如鳥嘴其氣鋒銳通經絡利關節尋蹤遠徑而直抵病所前為射罔能殺禽獸非氣

之鋒銳能如是乎楊清叟曰凡風寒濕痒骨內冷痛及損傷入骨年久發痛或陰疽腫毒並真草烏頭兩星等分少加肉桂為末薑汁

熱酒調塗未破者能肉消久潰者能去黑癰

二藥

舊西新

性味辛烈能破惡塊逐寒熱遇令則消遇熱即潰遇寒則消遇熱即潰遇寒則消遇熱即潰

四十八陰瘻瘍

中名提解散

王海藏陰證客例

二便不通

即上方名

中風癱

薛憲翁

手足鶻掉言語蹇滯左經丸用草烏頭炮去皮四兩川烏頭炮去皮二兩乳香沒藥各一兩為末生烏豆一升以雞子湯

班蝥三七箇去頭翅同煮豆熟去蟄取豆焙乾為末和匀以醋麵糊丸梧子大每服三十九溫酒下

簡易方

癱瘓頑風

下元虛冷

諸風痔漏下血一切風瘻草烏頭川烏頭兩頭尖各三錢硫黃麝香丁香各一錢木蠶子

諸風不遂

宋氏集驗方用生草烏頭晚蠶沙等

五箇為末以熟斷火搗軟合成一處用鈔紙包裹燒熏病處名雷丸

孫天仁集効方

諸風不遂

分為末取生地龍搗和入少醋糊丸

梧子大每服四五丸白湯下甚妙勿多服麻人名鄧者小金丹○經驗濟世方用草烏頭四兩去皮大豆半升鹽一

兩同以沙瓶煮三伏時去豆將烏頭入木臼搗三百杵作餅焙乾為末酒糊丸梧子大每空心鹽湯下十九名至寶丹

一切頑風

用生草

烏頭生天麻各等分擂糊絞汁傾盆中砌一小坑其下燒火將盆放坑上每日用竹片攪一次

夜則露之晒至成膏作成小梃子每一梃分成三服用伊黨自然汁和好酒熱服

乾坤秘鑑

一切風證

碑生淮烏頭一斤生川烏頭

一枚生附子一枚並為末葱一斤薑一斤擂如泥和作餅子以草鋪盤內加楮葉於葉上又鋪草葉蓋之待出汗

破傷風

毒

黃一日夜乃晒之春為末以生薑取汁煮麵糊和丸梧子大初服三十九日二服服後身揮汗出即愈

乾坤秘鑑

石

久麻痺

或歷節走氣疼痛不仁不拘男女神授散

方用草烏頭為末每以一二分溫酒服之出汗○儒門事親方用草烏頭尖白芷并生研末每服半錢令酒一盞入葱白一根同煎服少頃以葱白熱粥投之汗出即愈

年久麻痺

用草烏頭半斤去皮為末以袋一箇或豆

腐半袋入烏末在內再將豆腐填滿壓乾入鍋中煮一夜其藥即堅如石取出晒
乾為末每服五分令風濕氣以生薑湯下麻木不仁以葱白湯下之 活人心統
服病甚一丸作二丸薄荷湯 方草烏食鹽同炒黑摃之 海上方
化下覺微麻為度 本事方 風濕走痛 大每服十九至三十九臨卧溫酒下忌油膩濕麵孕婦勿服
未醋調貼項臾痛來 風作痛 草烏細辛防風等分為末摻靴襪中及
止 十便良方 日安護膝內能除風濕健步 扶壽方 遠行腳腫 草烏細辛防風等分為末摻鞋底內如草鞋
間有核生草烏頭大黃木龍子作末薑汁煎調貼之○濕溼正腫 早輕晚重用草烏頭一兩以
又法草烏一味為末以薑汁或酒糟同搗貼之 永類方 湿溼正腫 忽白一兩同研文感一宿各焙乾為末酒糊九梧子大每服五十九
酒下 父元 除風去濕 治脾胃虛弱久積冷氣飲食減少用草烏頭一斤蒼术一斤以
英如意方 除風去濕者乾只挾烏木晒焙為末酒糊丸梧子大焙乾收之每空心溫酒下二三十九覺麻即漸減之名烏术九
偏正頭風 皇烏頭四兩川芎四兩蒼术半斤生甘草四兩黑豆三升水一石同
集間酒下 除風去濕更隨左右噙鼻 指南方 風痰頭痛 體虛傷風停聚痰飲上厥頭痛或偏或正草烏頭炮去皮尖半兩
半錢薄荷湯冷服更隨左右噙鼻 一分赤小豆三十五粒麝香一字為末每服
濟生方 脳淺氣穢丸綠豆大每服十九茶下忌一切熱物 聖濟總錄 耳鳴耳癢如流
風聲不治成聾用生烏頭掘得來濕削如棗 嘴單口噤 生方用草烏尖石膽等分為末每用一錢醋煮熟咬破敷於
核大塞之日易二次不三日愈 千金方 血風證草烏頭匣子等分為末自然急汁隨上厥頭痛或偏或正草烏頭炮去皮尖半兩
其毒即虛壅口瘡 滿口連舌者草烏一箇南星一箇生薑一大塊為末睡時以醋調塗
破也 虛壅口瘡 手心足心或以草烏頭吳茱萸等分為末蜜丸麻子大每酒
一兩細辛一錢為末楷之吐出涎 三十年射罔食茱萸等分為末蜜丸麻子大每酒
方草烏食鹽同炒黑摃之 海上方
皮一枚搗成九梧子大清旦先發甲寒厥瘧 先寒後熱名寒瘧但寒不熱少而黃頭痛名脾瘧三者並宜服此
時每服一丸白湯下 肝後方 月寒厥瘧 賈耘老用之二十年累試有効不甚草烏頭削去皮沸湯泡二七度以蓋蓋良久切焙研稀

糊丸梧子大每服三十九粒粟三枚葱三根煎湯清早服以粟裹燒熟食飴鹽射罔二兩椒三百粒搗末雞子白和水泄壓之如人行十里許再一服絕勿飲湯便不發也

蘇東坡良方

日後方水泄

寒痢大草烏一兩以一半生研一半燒灰醋糊和九綠豆三神丸治清濁不分泄瀉注下或亦或白腹臍刺痛裏急後重用草豆大每服二十九水漏流水下赤痢甘草湯

泄痢生下

三神丸治清濁不分泄瀉注下或亦或白腹臍刺痛裏急後重用草

下白痢薑湯下忌魚腥生令和劑局方

結陰下血水一盞入鹽少許煎八分去滓露一夜五更冷服

聖濟錄老人遺尿

不知出者草烏頭一

兩童便浸七日去皮同鹽炒為末酒糊

內痔不出

草烏頭為末津調點肛門內痔即出

九綠豆大每服二十九鹽湯下普濟

內痔不出乃用枯痔藥點之

外科集驗方

疔毒初起

走麵一兩為末無根水調搽留口以紙蓋之

以被厚益汗出為度亦治頭風

乾坤秘鑑

惡瘡

計之如有口即塗四邊乾再上亦可單用草烏頭磨醋塗之

永類方

大風癬

瘡遍身黑色肌體麻木痺痛非常草烏頭一斤刮洗去皮極淨搘乾以清油四兩鹽四兩同入銚內炒公深黃色傾出剩油只留鹽并藥

再炒令黑煙出為度取一枝擘破心內如末一點白者始好白多再炒乘熱杵羅為末醋麵糊丸梧子大每服三十九空心溫酒下草

烏性毒難制五七日間以里豆

陰囊兩腳尤甚者草烏一兩鹽一兩化水浸一夜炒赤為末撒腰子一具

一切諸瘡

未破者草

煮粥食解其毒繼洪滄齋方

瘡去膜壞熱竹刀切搗醋糊丸綠豆大每服三十九空心鹽湯下

滄桑方

人輕粉少許臘堵瘡歷初作未破作寒熱草烏頭半兩木鳖子二箇以米醋磨細入搗爛忍

馬汗入瘡

腫痛急癢之遲則毒深以生烏頭

油和搽普濟方

頭疽蠅糞少許調勻傅上以紙條貼令通氣孔炒

醫林正宗

馬汗入瘡末傅瘡口良久有黃水出即愈

靈死它蟲鑿人射因傳之頃易血

方虫蟲鑿人射因傳之頃易血

出愈梅師方

中沙虱毒住千金

白附子 別錄見後發

白附子生蜀郡三月末生葉曰此物久絕無復真者蔡曰本出高麗今出涼州以西蜀郡不復

新羅國及遼東苗與附子相似時珍根正

保昇曰甘辛溫大明日無毒珣曰小主治心痛血癆面上癰瘍行勢

如草烏頭之小者長寸許乾者號文有節氣味辛甘大溫有毒

毒入藥炮用茶曰純陽引藥勢上行

別錄 中風大音一切冷風氣面酐癱症明諸風冷氣足弱無力疥癬瘡陰下濕癰頭面癰入面脂用珣補肝風虛

李補肝風虛
古風痰氣發明

時珍曰

乃陽明經藥因與附子相似故得此名實非附子類也

接楚國

附方

新十中風口喎研為末每服二錢熱酒調下

楊氏家藏方

先賢傳云孔休傷頰有癥王莽賜玉屑白附子杳與之消癥

附方

偏正頭痛白附子白正猪牙角生皮等分研末

白附子

小兒暑風暑毒入心痰塞心孔昏迷搐搦此乃危急之證非此丸生料膜眩之劑不能伐之三生丸用白附子天南星

風痰吐運散

散附子硫黃等分研末生薑汁和丸乘米大量兒大小以溥荷湯下令兒側卧吐痰水即甦全幼心鑑風痰吐運散

散附子硫黃等分研末生薑汁和丸乘米大量兒大小以溥荷湯下令兒側卧吐痰水即甦全幼心鑑風痰吐運散

半夏並去皮等分生研猪膽汁和丸乘米大量兒大小以溥荷湯下令兒側卧吐痰水即甦全幼心鑑風痰吐運散

散附子硫黃等分研末生薑汁和丸乘米大量兒大小以溥荷湯下令兒側卧吐痰水即甦全幼心鑑風痰吐運散

散附子硫黃等分研末生薑汁和丸乘米大量兒大小以溥荷湯下令兒側卧吐痰水即甦全幼心鑑風痰吐運散

散附子硫黃等分研末生薑汁和丸乘米大量兒大小以溥荷湯下令兒側卧吐痰水即甦全幼心鑑風痰吐運散

不利白附子炮去皮搗半斤石膏煅紅半斤硃砂二兩二錢半龍腦一偏正頭痛白附子白正猪牙角生皮等分研末

白附子白正猪牙角生皮等分研末

白附子白正猪牙角生皮等分研末

白附子白正猪牙角生皮等分研末

丸綠豆大每服四十九食後鹽湯下濟生方赤白汗斑白附子硫黃等分研末

白附子硫黃等分研末

白附子硫黃等分研末

白附子硫黃等分研末

簡耳出膿水白附子炮羌活一兩為末猪羊鬚各一箇每箇入人乳等分研末

白附子硫黃等分研末

白附子硫黃等分研末

白附子硫黃等分研末

五壯即愈小兒吐逆不定虛風喘急白附子藿香等分研末

聖濟錄

白附子半兩天南星半兩附子一錢並炮去皮為末每服一錢

白附子半兩天南星半兩附子一錢並炮去皮為末每服一錢

楊起簡便方小兒吐逆末每米飲下半錢保幼大全方

聖濟錄

白附子半兩天南星半兩附子一錢並炮去皮為末每服一錢

用治吳內翰女孫甚効康州陳侍郎病風虛

楊氏家藏方

極昏吳內翰令服三四服即愈

楊氏家藏方

本經虎掌下品天南星宋開寶釋名虎掌曰

虎掌

曰虎掌因葉形似之非根也南星因根圓白形如老人星狀故

曰虎掌

時珍曰虎掌因葉形似之非根也南星因根圓白形如老人星狀故

曰虎掌

曰虎掌因葉形似之非根也南星因根圓白形如老人星狀故

曰虎掌

名南星即虎掌也蘇恭說甚明白宋開寶不重出南星條今併入集解

別錄

曰虎掌生漢中山谷及突厥二月八月采陰乾剉葉以近

道亦有形似半夏但大而四邊有子如虎掌今用多破作三四

片方藥不甚用也恭曰此是由跋宿根其苗一莖莖頭一葉枝了扶至根大者如舉小者如雞卵都似扁柿四畔有圓牙看如虎掌由跋

是新根大如半夏一二三倍四畔無子牙陶說似半夏乃由跋也保昇曰莖頭有八九葉花生莖間臘器曰

曰天南星生安東山谷葉如荷獨

莖用根頭曰虎掌今河北州郡有之初生根如豆大漸長大似半夏而扁年久者根圓及寸大者如雞卵周匝生圓牙三四枚或五六枚

三四月生苗高尺餘獨莖上有葉如瓜五六出分布尖而圓一莖生七八莖時出一莖作總直上如鼠尾中生一葉如匙裏望作房旁開

草部

草部

一口上下尖中有花微青褐色結實如麻子大熟即白名自落布地一子生一窠九月苗發取根今冀州人菜園中種之呼為天南星曰天南星處處平澤有之二月生苗似柯梗其莖高一尺似菜葉如蒟蒻兩枝相抱五月開花似蛇頭黃色七月結果似石榴子紅色二月八月采根似乎而圓扁與蒟蒻相類人多誤采了不可辨但蒟蒻莖斑花紫南星根小柔狀狀細炮之易裂為可辨爾南星即本經虎掌也大者四邊皆有牙子來時剝去之江州一種莖葉大如掌葉青甘紫四畔有牙如虎掌生三四葉為一本冬青不結花實治疫寒熱積氣亦與虎掌同名故附見之時珍曰大者為虎掌南星小參一名頃曰九月采虎掌根去皮臍入器中湯浸五七日日換三四遍者為由跋乃一種也今俗又言大者為鬼臼小者為南星殊為謬誤治洗去涎暴乾用或再火炮裂用時珍曰凡天南星須用一兩以上者佳治風痰有生用者須以溫湯洗淨仍以白礬湯或入皂角汁浸三日夜日換水暴乾用若熟用者須於黃土地掘一小坑深五六寸以炭火燒赤以好酒沃之安南星於內瓦盆覆定灰泥固濟一夜取出用急用即以濕紙包於爐灰火中炮裂也一法治風熱痰以酒浸一宿桑柴火蒸之常洒酒入瓶內令氣猛一伏時取出竹刀切開味不麻舌為熟未熟再蒸至不麻乃止脾虛多痰則以生薑湯和黃泥包南星慢熟去泥焙用造南星隨法以薑汁燙湯和南星末作小餅子安藍內楮葉包蓋待上黃衣乃取晒收之造胆星法以南星生研末臘月取黃桔牛胆汁和劑納入胆中繫懸風處乾之年久者稱佳氣味苦溫有大毒別錄曰微寒晉曰虎掌神農雷公皆有毒岐伯桐君有有毒大明曰辛烈平氣曰才曰蜀漆為之使惡猝大明曰畏附子乾薑生薑時珍曰得防風則不麻得牛胆則不燥得火炮則不毒生能伏雄黃丹砂焰首主治心痛寒熱結氣積聚伏梁傷節寒利水道本除陰下濕風眩別錄主症腹脹寒熱寒瘞天南星主中風麻痺除痰下氣利督脈攻堅積消癰散血墮胎開金瘡折傷瘀血搏腫之藏蛇蟲咬

疥癬惡瘡

大明奉上集及貯運

元主破傷風

禁身強

李時珍

補肝風虛治痰功同半夏

好治驚癇

眼斜斜喉痙攣

目瘡癰結核解

目瘡

時珍曰虎掌天南星乃手足太陰肺脾之藥味辛而麻故能治風散血氣溫而燥故能勝濕除涎性緊

時發

者開關散用天南星為末入白龍腦等分五月五日午時合之每用中諸風

口噤天南星地剉大人三錢小兒三字生薑五斤蘇葉一

指點末揩齒三二十遍揩大牙左右其口自開又名破棺散

經驗方言風口噤水煎減半入雄猪膽汁少許溫服

仁齋直指方小兒

口噤牙關不閉天南星一枚煨熟紙裹科包剪一小孔透氣千一

口鴟風降涎散用天南星一兩重一箇換酒浸七伏時取出安新瓦

小兒驚風上週迴炭火炙裂合濕地出火毒為末入硃砂一分每服半

錢荆芥湯調下每日空心
生薑湯，天王散治小兒吐瀉或誤服冷藥脾虛生風痰慢驚天南星一箇重八九錢者去臍黃土坑深三寸
一服午時一服 經驗方 滴竹炭火五斤煅赤入好酒半盞安南星在內仍架炭三條在上候發製取剉再炒熟為末用五錢天麻
煨熟研末一錢麝香一字和三分三歲小兒用半錢以
生薑防風煎湯調下亦治久嗽惡心 錢乙小兒方 膜痰迷 滋痰丸用天南星九蒸九晒為末薑汁麵糊丸梧子大每
能言以天南星濕紙包煨為末雄
諸膽汁調服二字○全幼心鑑 治癩利痰丸梧子大每防風湯化下一丸 普濟方 眼瞼赤之左貼右右貼左
南星半夏等分為末薑汁竹沥破傷寒瘡 胡氏奪命散又名玉真散治打撲金刀傷及破傷風陽濕發病強直如癩狀者天南星防風等
灌下一錢仍以印堂 摘玄方破傷寒瘡 分為末水調敷瘡出水為妙仍以溫酒調服一錢已死心尚溫者熟童便調灌二錢關殿內傷
墜瘡者酒和童便連灌三服
破傷寒瘡 生南星末水調塗疔四尋人頭風 攻目作病天南星一箇掘地坑燒赤安樂於中以醋一盞沃之
即甦亦可煎服 三因方 破傷寒瘡 闔水出有効 普濟方女婦人頭風 益定勿令透氣候冷研末每服一字以酒調下重者半錢 千
金解毒丸不可忽天南星一兩荆芥葉一兩為末薑汁糊丸梧子大每食後薑湯下二十丸○又
金解毒丸 上清丸用天南星茴香等分生研末鹽醋者麵糊丸如上法服 並出經効濟世方
一方 頭瘡豆痛上清丸用天南星茴香等分生研末鹽醋者麵糊丸如上法服 並出經効濟世方
各一兩天麻半兩白麵三兩為末水丸梧子大每服三十九以水當風流涕邪風入腦鼻內結硬遂流涕大白南星切片沸湯泡二次
先煎沸入藥煮五七沸漉出放溫以姜湯吞之 惠民和劑局方 日風流涕 培乾每用一錢棗七箇甘草五分同煎服三四服其硬物自
出腦氣流轉龍涕自收以大蒜華发末餅隔紗貼額 執毒壅滯涼心壓驚抱龍丸用牛膽紫星一兩入金錢薄荷十片丹砂
前頭斗熨之或以香附墨炭末頻吹鼻中 直指方 小兒風痰 執毒壅滯涼心壓驚抱龍丸用牛膽紫星一兩入金錢薄荷十片丹砂
全幼壯人風痰 及中風中氣初起星香飲用南星四錢木香一錢 痰迷 心竅言妄見天南星一斤先掘土坑一尺以炭火三十斤燒赤
心鑑 水二盞生薑十四片煎六分溫服 王碩易簡方 痰迷 心竅言妄見天南星一斤先掘土坑一尺以炭火三十斤燒赤
入酒五升滲乾乃安南星在內盞蓋是以灰塞之勿令走氣次日取出為末琥珀一兩硃砂二兩為
木生薑汁打麵糊丸梧子大每服三十九至五十九煎人參石菖蒲湯下一日三服 和劑局方
蒼术等分生薑三片 風痰咳嗽 大天南星一枚炮製研末每服一錢水一盞薑三
水煎服之 摘玄方 風痰咳嗽 片煎五分溫服每曰早午晚各一服 千金博濟 風痰咳嗽 天南星制
湯下寒痰去橘皮加官桂 東垣醫室秘藏 三仙丸治中脘氣滯痰延煩悶頭目不清生南星去皮半夏各五錢並湯泡七次為末自然薑汁和作
餅鋪竹篩內以楮葉包覆待生黃成翹晒乾每用二兩入香附末一兩糊丸梧子大每服四十九丸食後

薑湯下

王

溫中散帶

消導飲食天南星炮高良薑炮各一兩砂仁二錢半酒

積酒毒

服此即解天南星丸用正端

天南星一片土坑燒

膠百一選方

為末蓋汁糊丸梧子大母薑湯下五十九

和劑方

酒積酒毒

亦沃酒一斗入坑放南星盆覆泥固濟一夜取出

酒和水洗淨切片焙乾為末入硃砂末一兩薑汁糊丸梧子大

每服五十九薑湯下茶水相呴相當用有驗

楊氏家藏丸

口

泄不止

四肢厥逆虛風不省人事服此則陽回陽散天南星為

方醋調南星末貼

天南星石灰炒佳黃色為末酒

足心

普濟方

日

漏血

糊丸梧子大每酒下二十九

普濟方

吐血不止

研末每服一錢以自然銅磨酒調下

勝金方

切生貼

頭熱鼻塞者天南星炮為末水調

小兒解頭

頭開不合鼻塞不通天南星炮去皮為末淡醋調糊年頭

不能收上用南星末薑汁

貼頭上灸手熨之危氏得効方

小兒解頭

帛上貼頭門灸手熨之立効

錢乙小兒直決

角膜月

調塗兩頰一夜即止

醫說

小兒口瘡

白屑如鵝口不須服藥以生天南星去皮臠研

走馬疳

食汁以盞子合定出火毒去麵為末麝香少許拂瘡數日甚効

經驗

天南星末塞孔以霜梅

天南星一箇剜心入白僵蠶七枚紙包煨熟研末薑

膏治人皮肌癩面上生

方

靈牙痛

齒住去涎

摘玄方

風喉瘻

汁調服一錢甚者灌之吐涎愈名如聖散

博濟方

痰癥結核

瘤及結核大者如拳小者如

粟或軟或硬不疼不癢且用此藥不可輒用針灸生天南星大者一枚研爛濁好醋五七點

如無生者以乾者為末醋調先用針刺令氣透乃貼之覽瘻則頻貼取効

嚴子禮濟生方身癰子之

簡易方

由跋

本經釋名

由跋本草集解

根如雞卵保昇曰春抽一莖莖端有八九葉根圓扁而肉白時珍曰此即天南星之小者其氣未足不堪服食故醫

方罕用惟重八九錢至一兩餘者氣足乃

正吳弘景曰由跋本出始興今人亦種之狀如烏姜而布地花紫色根似附子若酒磨塗腫亦

佳正如附子之側子不如附子之義也

正言効本草曰陶氏所說乃鳶尾根即鳶頭也又言虎掌似半夏是以鳶尾為由跋以由跋為半

夏非惟不識半夏亦不識鳶尾與由跋也今南人猶以由跋為半

夏時珍曰陳延之小品方亦以東海鳶頭為由跋則其訛誤久矣氣味辛溫主蓄瘻結經

鳶頭

宋開

圖經

鳶頭

開

鬼頭

鬼羊生平澤極多人采以為天南星了不可辨市中所收往往是此但南星肌細膩而鳶頭莖斑化紫

南星莖無斑化黃為異爾時珍

曰鳶頭出蜀中施州亦有之呼為鬼頭閩中人亦種之宜樹陰下掘坑積糞春時生苗至五月移之長一二尺與南星苗相似但多斑點

宿根亦自生苗其滴露之說蓋不然經二年者根大如碗及半魁其外理白味亦麻人秋後采根須淨擗或搗或片段以鹽灰汁煮十餘沸以水淘洗換水更煮五六遍即成凍子切片以苦酒五味淹食不以灰汁則不成也切作細絲沸湯過五味調食狀如水母絲馬志言其苗似半夏楊慎丹鉛錄言搗醬即此者皆誤也王漁農書云救荒之法山有

松昌翁謂稼栗之利則此物亦有益于民者也其班竹即天南星之類有斑者

根氣味辛寒有毒李廷飛曰性冷甚不益人冷氣

治霍亂風毒瘧傳腫上搗碎以灰汁煮成餅五味調食去消渴

開目機曰按三

云有人患瘧百物不思見陽家修竣竊求食之美遂

附錄苦蘿蔔

宋圖經頌曰生江浙州郡凌冬不凋秋冬有花直出赤子如弱頭冬月采根用味苦無毒主中諸毒食毒酒研服之又諸虫傷搗汁飲并傳之

婦人妊娠效妙

搗篩蛋丸服効

半夏

本經釋名田水玉

本經別和姑本經時珍曰禮記月令五月半夏生益

集解曰半夏生槐里川谷五月八日采根暴乾

白花圓上弘景曰槐里屬扶風今第一出青州吳中亦有以肉白者為佳不厭陳氏纂曰所在皆有生平澤中者名羊眼半夏圓白為勝然江南者大乃徑寸南人特重之貢來互用功狀殊異其苗似是由跋誤以為半夏也頌曰在處有之以齊州者為佳二月生苗一莖莖

端三葉淡綠色頗似竹葉而生江南者似竹葉根下相重上大下小皮黃肉白五月八月采根以灰裹二日湯洗暴乾蜀圖經云五月

米則虛小八月采乃實大其平澤生者甚小名羊眼半夏由跋絕類半夏而苗不同數曰曰傍幾子真似半夏口是咬着微酸不入藥用

修治弘景曰凡用以湯洗十許過今滑盡不爾有毒斂人咽喉方中有半夏必須用生薑者以制其毒故也數曰修事半夏四兩用白芥

子末二兩鹽醋二兩滑石將半夏投中洗三遍用之若洗不盡令人氣逆肝氣怒滿時珍曰全治半夏惟洗去皮垢以湯泡浸七

日逐日換湯曝乾切片薑汁拌培入藥或研為末以薑汁和作餅子日乾用謂之半夏餅或研末以薑汁白礬湯和作餅楮包置藍中待生黃衣日乾用謂之半夏麪白飛霞醫通云痰分之病半夏為主造而

為麪尤佳治濕痰以薑汁白礬湯和之治風痰以薑汁及皂莢煮汁和之治火痰以

薑汁竹沥或荆棘和之治寒痰以薑汁攀湯入白芥子末和之此皆造翹妙法也

根氣味辛平有毒

別錄曰生微寒熟溫生令人吐熱令人下湯洗盡滑用元素曰味辛苦性溫氣味俱薄沉而降陰中陽也好古曰草

厚苦輕陽中陰也人手陽明太陰少陰三經之才曰射干為之使惡是災畏雄黃生薑乾薑秦皮龜甲反烏頭權曰

柴胡為之使忌羊血海藻蛤粉元素曰熟寒佐以黃芩風寒佐以熟地皮寒佐以陳皮白朮多用則鴻脾胃諸血證及口渴者禁用為其燥津液也孕婦忌之用生薑則無害

本經治心

月日

膈熱

滿結

欬嗽

上氣

心下急痛

堅脹

時氣

嘔逆

消癰

腫瘍

瘻瘍

明

治療

寒痰

及形寒

飲冷傷肺

而欬

消胸中痞

膈上痰

除胸寒

和胃氣

燥脾濕

治痰厥

頭痛

散結

元氣

治虛

積膏腫

寒補肝腎

虛古

除眼暉

目不得瞑

白濁

等遺帶下

時發

權曰半

夏使也

胃建脾止嘔吐去胸中痰滿生者摩腹腫除瘤氣

鼓

治吐食

反胃霍亂

轉筋腸

腹冷

瘻瘍

明

治療

寒痰

及形寒

飲冷傷肺

而欬

消胸中痞

膈上痰

除胸寒

和胃氣

燥脾濕

治痰厥

頭痛

散結

元氣

治虛

積膏腫

寒補肝腎

虛古

除眼暉

目不得瞑

白濁

等遺帶下

時發

權曰半

夏使也

膈上痰除胸寒和胃氣燥脾濕治痰厥頭痛治虛散結乘氣治虛積膏腫

震

補

肝腎

虛古

除眼暉

目不得瞑

遺帶下

時發

權曰半

夏使也

虛而有痰氣宜加用之須曰胃冷嘔噦方藥之最要威無已曰辛者散也潤也半夏之辛以散逆氣結氣除煩嘔發音聲行水氣而潤腎好古曰經云腎生五液化為五濕自入為喉人肝為泣人心為汗人脾為痰人肺為涕半夏曰欬無痰曰欬痰者因欬而動脾之濕也半夏能泄痰之標不能泄痰之本泄本者泄腎也欬無形痰有形無形則潤有形則燥所以為流濕閑燥也俗以半夏為肺藥非也止嘔吐為足陽明除痰為足太陰柴胡為之使故今柴胡湯中用之雖為止嘔亦助柴胡黃芩王註來寒熱是又為足少陽陽明也宗興曰今人惟知半夏去痰不言益脾益能分水故也脾惡濕濕則濡困則不能治水勝則瀉一男子夜數如廁或欬以生薑一兩半夏大棗各三十枚水一升置瓶中慢火燒為熱水時呷之便已也趙繼宗曰丹溪言二陳湯治一身之痰世醫執之凡有痰者皆用夫二陳內有半夏其性燥烈若風痰寒痰濕痰食痰則相宜至於勞痰失血諸痰用之反能燥血夜而加病不可不知機曰俗以半夏性燥有毒多以貝母代之貝母乃太陰脾經之藥半夏乃太陰脾經之藥陽明胃經之藥何可代也夫欬軟吐痰虛勞吐血或痰中見血諸鬱咽痛喉痺肺瘡肺痿疽婦人乳難此皆貝母為向導半夏乃禁用之藥石延者脾之液美味膏梁文博皆能生脾胃濕熱故涎化為痰久則痰火長聊攝成氏云半夏辛而散行水氣而潤腎燥又和劑局方用半硫丸治老人虛秘皆取其滑潤也世俗皆以南星半夏為性燥誤矣濕去則土燥痰涎不生非二物之性燥也古方治咽痛喉痺吐血下血多用二物非禁劑也二物亦能散血故破傷打撲皆主之惟陰虛勞損則非濕熱之邪而用利竅行濕之藥是乃重蹈其精液醫之咎哉甲乙經用治夜不眠是果性燥者乎岐伯云衛氣行于陽陽氣滿不得入于陰陰氣虛故目不得瞑治法飲以半夏湯一劑陰陽既通其卧立至方用流水千里者八升揚之萬遍取清五升煮

陽陽氣氣不得人子治之無能治之則安之重其不重者則無能治之也當人知其用經用治安不暇是果任將者者以治云無行于

之坎以爲新大拂入林米一升半夏五合煮一升半飲汁一盃

舊十五新附方 再沈如此七轉以濃米泔浸一日夜每一兩用

日三以知爲度病新發者覆盆則卧汗出則已久者三飲而已

附方 五十三 法制半夏

白礬一兩半溫水化浸五日焙乾以鉛白霜一錢溫水化又浸七日以

紅半夏法 消風熱清痰降氣利咽大半夏湯浸焙制如上法每

漿水慢火內煮沸焙乾收之每嚼一二粒置湯送化下

御藥院方

指厚排半夏于上再以燈草蓋一指厚以炒豆焙

桂風利膈辰砂半夏丸用半夏一斤湯泡七次為末篩過以水浸二日生絹

之候乾取出每嚼一兩粒溫水送下

御藥院方化痰鎮心

去滓澄清去水晒乾一兩入辰砂一錢蜜汁打糊九梧子大每蜜湯下六

十九此周府七疫利氣

三仙丸方消痰開胃

餅二錢入鹽五分煎一盞服之大壓痰及酒食傷極驗

○經驗用半夏天南星各一兩為方也

袖珍仁痰利氣

見虎掌下消痰開胃

餅二錢入蜜湯下

未水五升入壘內浸一宿去清水焙乾

中寒痰延利咽清頭目進飲食半夏泡七次四兩桔梗一兩為末蜜汁打糊或者棗肉和丸梧子

重研每服一錢水二盞量三片煎服

普濟方 去胸膈壅滯斗門方用半夏湯泡乾為末自然蜜汁和作餅濕紙裹煨香以熟水二盞同

乾每服一丸好茶或薄荷湯嚼下

御藥院方搜風化痰

半兩為末蜜汁打糊九梧子大每服三十九食後蜜湯送下

和劑局方

老人癰瘍

大腑熱不識人及肺熱痰實不利半夏炮七次焙硝石半兩禹腫

半夏半斤酸棗浸一宿溫湯洗五十遍去惡氣日乾為

普濟方 脳壅風痰

未漿水搜作餅日乾再研為末每五兩人生龍膽一錢

以漿水濃腳和丸雞頭子大紗袋盛避風處陰搜風化痰

定志安神利頭目辰砂化痰丸用半夏炮三兩天南星炮一兩辰砂桔梗各

乾每服一丸好茶或薄荷湯嚼下

御藥院方搜風化痰

半兩為末蜜汁打糊九梧子大每服三十九食後蜜湯送下

和劑局方

厥中風

省風湯用半夏湯泡八兩甘草炙二兩防風四兩

風痰頭痛

橘各一兩天麻半兩雄黃二錢小麥羹三兩為末水和成餅水煮浮起

奇効方 奇効方

搜風化痰

青空丸半夏一斤天南星半兩各湯炮晒乾為末蜜汁和作餅焙乾入神

漿出搗丸梧子大母服五十九薑湯下極効亦治風

頭風

搜風化痰

青空丸半夏一斤天南星半兩各湯炮晒乾為末蜜汁打糊九梧子大每服五十九薑湯

搜風化痰

本草綱目

卷十六下

草部

湯下三五丸

濕痰欬嗽

面着體重嘔

卧驚兼食不消

脉緩者白朮九

用半夏南星各一兩

白朮九用半夏南星各一兩

白朮九用半夏南星各一兩

白朮九用半夏南星各一兩

白朮九用半夏南星各一兩

摘玄方

濕痰欬嗽

面白氣促

西浙翼寒熱不樂

肺氣凝濁者玉粉九

用半夏南星各一兩

白朮九用半夏南星各一兩

白朮九用半夏南星各一兩

白朮九用半夏南星各一兩

白朮九用半夏南星各一兩

官桂半兩為末糊丸梧子大每服五七十九薑湯下

活法機要小結明痛

一箇水六升先煮桔梗至三升去滓內一味煮取二升分三服

仲景傷寒論

濕痰心痛急

者半夏油炒為末糊丸綠豆大急慢寒熱半夏四錢生薑七片酒一盞

丹溪心法急慢寒熱半夏四錢生薑七片酒一盞

語音不清年久者亦宜玉粉九半夏半兩桂心一字

每服二十九薑湯下

活法機要小結明痛

服五十九薑湯下

活法機要小結明痛

一箇水六升先煮桔梗至三升去滓內一味煮取二升分三服

仲景傷寒論

濕痰心痛急

者半夏油炒為末糊丸綠豆大急慢寒熱半夏四錢生薑七片酒一盞

丹溪心法急慢寒熱半夏四錢生薑七片酒一盞

語音不清年久者亦宜玉粉九半夏半兩桂心一字

每服二十九薑湯下

活法機要小結明痛

夜卧含糊○

停痰令飲

嘔逆橘皮半夏湯用半夏水煮熟陳橘皮各一兩

每服四錢生薑七片水二盞煎一盞溫服

和劑局方停痰留飲

夏易用半夏泡五兩後分三兩每服四錢薑七片

水一鍾半煎七分甚

支飲作嘔

半夏湯用半夏泡七次一升生薑半升水七升煮一升五合分服

張仲景金匱要略

旋徑和劑局方

停痰令飲

半夏湯用半夏泡七次一升生薑半升水七升煮一升五合分服

張仲景金匱要略

旋徑和劑局方

停痰令飲

半夏湯用半夏泡七次一升生薑半升水七升煮一升五合分服

張仲景金匱要略

旋徑和劑局方

之即上

痘瘡氣方同

痘瘡立季殺不得下半夏加稻米湯半夏一升生薑半斤

水七升煎一升半分溫服之

金匱要略目不得眠明下心下忪

心等分為末蜜丸小豆大

每服三十九日

易寒乾呕

半夏熟洗研末生薑湯湯透

半夏泡七次一升洗滑焙研小麥麴一升水和作彈丸水煮熟初吞四五

三金匱要略

寒寒乾呕

一錢七梅師方

口通厥逆

日三服稍增至十五枚旋復

從吞覺病減再作忌羊肉鷄糖此乃許仁則

方也

外區吐反胃

大半夏湯半夏三升人參三兩白蜜一升水一斗二升

和楊之一百二十遍煮取三升半溫服一升日再服亦治膈間支飲

金匱要略

寒寒吐

半夏生薑自然汁和丸麻子大

人參二兩

白蜜一兩為末

薑汁糊丸梧子大每空心

泡七次

水七升煮一升五合分

服四錢水一盞

仲景金匱要略

臺秘要

嘔吐反胃

二十遍煮取三升半溫服一升日再服亦治膈間支飲

金匱要略

寒寒吐

半夏湯半夏泡七次

水七升煮一升五合分

服四錢水一盞

仲景金匱要略

小兒吐瀉

脾胃虛寒

半夏十片水七升煎八分溫服

錢乙小兒

小兒吐

半兩丁香一錢以半夏末水和包丁香用麵包裹

煨熟去麴為末生薑自然汁

糊丸梧子大每空心

泡七次

水七升煮一升五合分

每服二三十九陳皮湯下

活法機要小結明痛

桔梗一箇水六升先煮桔梗至三升去滓內一味煮取二升分三服

仲景傷寒論

濕痰心痛急

者半夏油炒為末糊丸綠豆大急慢寒熱半夏四錢生薑七片酒一盞

丹溪心法急慢寒熱半夏四錢生薑七片酒一盞

語音不清年久者亦宜玉粉九半夏半兩桂心一字

每服二十九薑湯下

活法機要小結明痛

引食

脾胃不利消暑丸用半夏醋煮

一斤候芩半斤生甘草半斤

水七升煮一升五合分

服四錢水一盞

仲景金匱要略

寒寒吐

半夏少許酒和丸蜜末大每服二九薑湯下不瘥

日加之或以火炮研末蜜汁調貼臍亦佳

子母秘錄

黃疸

喘滿再服有人氣結而死

心下暖以此少許入口遂活

張仲景方

仲景金匱要略

寒寒吐

半夏少許酒和丸蜜末大每空心

水七升煮一升五合分

服四錢水一盞

仲景金匱要略

失血喘急

吐血下血崩中帶下喘急痰嘔中滿宿瘀用半夏糙扁以蜜汁和麵包煨黃研末米糊丸梧子大每服三十九白湯下直指方

鼻漏遺

火毒去猪苓入煅過牡蠣兩以山藥糊丸梧子半夏一兩洗十次切破以木猪苓二兩同炒黃出

大每服三十九淡令湯送下腎氣閉而一身精氣無所營攝妄行而遺者宜用此八般頭風

三次見効半夏末入百草霜少許作紙燃

方益半夏有利性者令導水使腎氣通也與下元虛遺者不同許學士本事方

八般頭風燒烟就鼻內噏之口中含水有涎吐去再

含衛少陰咽痛入半夏在內以銀子生于炭火上煎三沸去滓置盃中時時噏之極驗未瘥更作仲景傷寒論喉痺腫塞

當區出忌羊肉外臺秘要

生半夏末

生寶鑑少陰咽痛半夏白芷等分為末水服方寸

張大塞口半夏煎醋含漱之○又方半夏二十枚水煮過一小口頭脣乃冷也

集簡方骨哽在咽喉當區出忌羊肉外臺秘要

再炮片時乘熱以酒一升浸之密封良久熱漱冷吐之小兒頭脣乃水調半

夏末塗面上黑氣半夏培研米醋調敷不可見風不計遍數從早至晚

足心自然蓋汗出產時子陽先出產

紫靈鰐元五絕急病一曰自盤二曰墻廩三曰溺水四曰麌魅五曰產乳並以半夏搗敷背及乳瘡半夏末雞子吹

君方也

夏末約大豆一丸入鼻中心溫者一日可活也

子母秘錄

飛蟲

一方以半夏末隨左右鳴鼻打搗於廩即沒也

永類鈴方

飛蟲

劉長春經驗方

遠行足趼方金刀不出

入骨脉中者半夏白芍等分為末水服方寸

入耳生半夏末麻油調塗

錢相公箇中方

飛蟲

本事方

半夏末水調塗之立

通者半夏末水調

因喉骨硬半夏白芷等分為末水服方寸

七當唱出忌羊肉外臺秘要

雷

蚤休

本經

名室休別

錄葉紫河車

國重臺

唐重樓金線

本三層草

綱目七葉一枝花

蒙草

甘遂

唐白甘遂

時珍曰虫蛇之毒得此治之

臺三層因其葉狀也金線重樓因其花狀葉似桔梗也甘遂因其根狀也紫河車因其功用也不似一莖六七葉似王孫兒曰莖麻葉有三層根如肥大菖蒲細肌脆白保昇曰葉似兒

白牡丹年久者二三重根如紫參度苗內白五月采根日乾大明曰根如尺二蜈蚣大如肥紫烏蒲鴨曰即紫河車也今河中河陽華鳳文州及江淮間亦有之葉似王孫兒臼等作二三層六月開黃紫化蕊赤黃色上有金絲垂下秋結紅子根似肥薯皮赤肉白四月五月采之宋興曰蒼休無旁枝止一莖挺生高尺餘頭有四五葉葉有岐似苦杖中心又起莖亦如是生葉惟根入藥用時珍曰重樓全線處處有之生于深山陰濕之地一莖獨上當葉心葉綠色似勺藥入二二層每一層七葉莖頭夏月開化一花七瓣有金絲蕊長三四寸王屋山產者至五七層根如鬼臼蒼木狀外紫中白有粘糯二種外丹家采制二苦砂水入藥洗切培用俗謬云七葉一枝花深山是我家焉直如遇者一似乎拈擎是也

根氣味苦微寒有毒

大明日令無毒伏雄黃丹砂蓬砂及鹽

主癰癰瘍搗頭弄舌熱氣在腹中

本經頭瘡瘍瘻蝕下三蟲去蛇毒別集本食一升利水唐治

胎麝手足搘能吐泄癥瘕_大瘧疾寒熱時發時除

珍曰摩醋傅瘧腫蛇毒甚有効時珍曰紫河車足厥陰經藥也凡本附新服法紫

車根以竹刀刮去皮切作骰子大塊麵裹入瓷瓶中水煮候浮漂出疑令人新布袋中懸風處待乾每服三九五更初酉東念咒井水下連進三服即能休根若要飲食先以黑豆煎湯飲之次以藥丸者補粥漸漸食之咒曰天朗氣清金雞鳴吾今服藥欲長生吾今不飢復

不渴賴得神仙草有靈 小兒胎風手足搘搘用蒼休即紫河車為末慢火燒帶有陽證者白甘遂末即蒼休一錢枯樹根末二錢同干慢火炒焦黃研匀每服一字前麝香薄荷湯調下

錢乙小兒方中鼠 藥即愈 集簡方叫做羣母兩半夏泡一分為末蜜丸艾子大含之 聖惠方

鬼臼

本經下品校正併入圖經正絃田草

釋名曰鬼臼本經天臼別名鬼藥經解毒引

詩星本經害毒草圓葉花經木律草

目瑞草細獨脚蓮宿

本獨荷草上山荷葉細葉八角盤

弘景曰鬼臼根如射干白而味甘九臼相連有毛者良故名時珍曰此物有毒而曰如

有鏡盤荷蓮苦母諸名蘇東坡詩集云瑞田草俗號唐婆錢即本草鬼臼也歲生一臼如苗稍根而堅瘦可以辟穀不和剝南方物贊云羞天花蜀地處處有之依莖綠化散葉自隱俗名羞天子改為羞寒化即本草鬼臼也贊云冒寒而茂莖修葉廣附莖作花葉散其上以其自蔽若苟羞狀○別有委子別錄曰鬼臼生九真山谷及寃句二月八月采根弘景曰鬼臼生山谷中八月采陰乾似射干本草又天草與此不同即海芋也 集魚似鉤吻有兩種出錢塘近道者味甘上有叢毛最勝出會稽吳興者大而味苦無叢毛力劣今馬目草

公狀如黃精根其臼處似馬眼而柔潤今方家多用鬼臼而少用毒公不知此那復乖越如此叅曰鬼臼生深山巖石之陰葉如蓖麻多是射干而江南別送一物非真者今荊州當陽縣缺州遠安縣襄山縣山中並貢之亦極難得領曰今江甯府滁舒商齊杭襄峽州荆門軍亦有之並如蘇茶所說花生莖間亦色三月開後結實又一說鬼臼生深山陰地葉六出或五出如厲掌莖端一葉如織旦時東向及暮則西傾蓋隨日出沒也花紅紫如荔枝正在葉下常為葉所蔽未常見日一年生一莖既枯則生一臼及八九年則八九臼矣然一年一臼生而一白腐益陳新相易也故俗名害母草如芋魁鳥頭筆亦然新苗則舊苗死前年之臼腐矣而本草注謂全似射干今射干體狀雖相似然臼形淺薄與鬼臼大異鬼臼如八九箇商星側比相叠而色理正如射干用者當使入求苗采之市中不復有也時珍曰鬼臼根如天商星相叠之狀故市人道謂小者為商星大者為鬼臼殊為謬誤按黃山谷集云唐婆鏡葉底開花俗名春天花即鬼臼也歲生一臼滿十二歲則可為藥今方家乃以鬼燈檠為鬼臼誤矣又鄭樵通志云鬼臼葉如小荷形如鳥掌年長一莖莖枯則根為一臼亦名八角盤以其葉似之也據此二說則似是今人所謂獨脚蓮者也又名山荷葉獨荷草旱荷葉八角鏡南方處處深山陰密處有之北方惟龍門山玉屋山有之一莖獨上莖生葉心而中空一莖七葉圓如初生小荷葉面青背紫採其葉作瓜李香聞花在葉下亦有無花者其根全似蒼木紫河車丹爐家采根制三黃砂水或云其葉八角者更靈或云其根與紫河車一樣但以白色者為河車赤色者為鬼臼恐亦不然而唐罕玉冊謂蚤休陽草荷陰草亦有分別陶弘景以馬目毒公與鬼臼為二物殊不知正是一物而有二種也又唐獨孤滔丹房鏡源云宋律草有一種根皆似商星亦莖直上莖端生葉一種葉凡七瓣一種葉作數層葉似乳麻面青背紫而有細毛葉下附莖開一花狀如鈴鐸倒垂青白色葉心中空結黃子風

吹不動無風自搖可制砂水按此即鬼臼之二種也其說形狀甚明

根氣味辛溫有毒

別錄曰微溫引氣曰甘溫有

王叔和蟲毒鬼疰精物辟惡氣不祥逐邪解百毒

本經殺大毒療欬嗽喉結風邪煩惑失

魄妥見去目中瘡

別錄曰芳之才曰畏垣衣

王叔和蟲毒鬼疰精物辟惡氣不祥逐邪解百毒

本經殺大毒療欬嗽喉結風邪煩惑失

米瑞田草根葉焙鹽

附方新子死腹中胞破不生此方累效救人歲萬數也鬼臼不拘多少黃色者去毛為細末不用篩羅只燃之

揭末塞九服治風疾附方

時發明頌曰古方治五尸鬼疰百毒惡氣多用之又曰今福州人三月

中人寒熱發瘡鬼臼葉一把

酒清搗

黑黃面黑著身如土色不妨食脉沉若青脉入口者死宜烙口中黑脉耳會

取汁服一升日二次一千全方

黑黃急病玉泉章門心俞用生鬼臼搗汁一小盞服乾者為末水服

三十六黃方

射干

本經釋名管絅本馬尾別名鳥鴟土滿本

鳳凰遙鬼扇席竹目仙人掌

土生野菊花

土生野菊花

別名

吳普弘景曰射干方

書多音復頌曰射干

之形莖梗竦長正如射之長竿之狀得名由此爾而陶氏以夜音為疑蓋古字音多通呼若漢官僕射主射事而亦音夜非有別義也時珍曰其葉叢生橫鋪一面如鳥翅及扇之狀故有鳥扇即姜鳳翼鬼扇仙人掌諸名俗呼扁竹謂其葉扁生而根如竹也根葉又如蟹螯故曰烹蠚。姜氏別錄曰射干生南陽山谷田野三月三日采根陰乾弘景曰此是鳥翼根黃色庭臺多種之人言其葉是鳶尾而復音所甲切扇也。李時珍有鳶頭此若相似爾恐非鳥翼也又別有射干相似而花白莖長似射人之執竿者故阮公詩云射干臨晉城此不入樂用琴曰鳶尾葉卻似射干而花紫碧色不抽高莖根似高良莖而內白名鳶頭保昇曰射干高二三尺花黃實黑根多質處黃黑內黃亦所在皆有二月八月采根去皮日乾弘景器曰射干鳶尾二物相似人多不分射干即人間所種為殺草名鳳翼者葉如鳥翅秋生紅花亦點鳶尾亦人間所種苗低下於射干狀如鳶尾夏生紫碧花者是也大明曰射干根圓形似高良畫大小赤苦色淡硬五六七八月采頌曰今在處有之家種之春生苗高一二尺葉大類鸞薑而狹長橫張珠如翅膀狀故名鳥翼葉中抽莖似鳶尾莖而強硬六月開花黃紅色瓣上有細文秋結實作房中子黑色一說射干多生山崖之間其莖雖細小亦類木故荀子云西方有木名曰射干莖長四寸生於高山之上是也陶弘景所說花白者自是射干之類裴頌曰根為射干葉為鳶翼紫花者是紅花者非微曰按諸注則射干非一種有花白者花黃者花紫者花紅者丹溪獨取紫花者必嘗試有驗也時珍曰射干即今扁竹也今人所種多是紫花者呼為紫蝴蝶其花三四月開六出大如雪花結房大如拇指頭似泡桐子一房四隔一隔十餘子子大如胡椒而色紫極硬咬之不破七月始枯陶弘景謂射干鳶尾是一種蘇恭陳藏器謂紫碧花者是鳶尾紅花者是射干韓保昇謂黃花者是射干蘇頌謂花紅黃者是射干白花者亦其類朱震亨謂紫花者是射干紅花者非各執一說何以憑依謹按張揖廣雅云鳶尾射干也易過卦驗云冬至射干生土宿真君本草云射干即扁竹葉扁生如側手掌形並亦如之青綠色一種紫花一種黃花一種碧花多生江南湖廣川浙平陸間八月取汁煮雄黃伏雌黃制丹砂能拒火據此則鳶尾射干本是一類但花色不同正如牡丹芍藥菊花之類其色各異皆是同屬也大抵入藥功不相遠藏器曰射干之名有三佛經射干犯此是惡獸似青狼狗食人能緣木阮公

云射干臨晉城者是樹株有高大者本草射干是草即今人所種者也

根修二段曰凡木根先以米泔水浸一宿濾出

別錄

曰微久服令人癆瘍曰有小氣味苦平有毒

別用

氣味苦平有毒

元素曰苦陽中陰也時珍曰寒多服渴人

主治痰逆上氣喉癰

咽痛不得消息散結氣腹中邪逆食大熱本療老血在心脾間欬唾言語氣散胸中熱氣別氣味苦酒摩塗毒腫弘治瘡消瘀血通水

人月開

氣血虛寒之病

瀉火破癥結

胸膈滿腹脹氣喘

肺寒脾熱

痰火

心脾熱

利小便

去中寒

元氣

利積痰

山毒消

核

震驚

驚風

驚癲

驚瘧

驚癇

驚癲

驚癲

驚癲

驚癲

驚癲

驚癲

驚癲

火利大腸治瘧母

時珍曰震亨曰

射干二十

與生薑同煎食

利三兩行甚效

時珍曰射干能降火故古方治喉痺而上氣喉中作水鶴聲有射干苗苦湯又治瘧母

舊二因喉腫滿射干根山豆根

方治喉痺有烏翫膏張仲景金匱玉函治教而上氣喉中作水鶴聲有射干苗苦湯又治瘧母

鱗甲煎丸亦用烏扇燒過皆取其降厥陽相火也火降則血散腫消而痰結自解癰癰自除矣

附方新八

咽喉腫陰乾

未吹之如

神袖

傷寒咽門腫痛用生射干猪脂各四兩合煎令舊

喉痺不通

根擂汁熬之大腑動即解或醋研汁噙引涎出亦妙

使民方用紫

珍方

傷寒咽門去滓每禽糞許取瘥

龐安常傷寒論

喉痺不通

根擂汁熬之大腑動即解或醋研汁噙引涎出亦妙

使民方用紫

珍方

喉痺不通

根擂汁熬之大腑動即解或醋研汁噙引涎出亦妙

蝴蝶根一錢黃芩生甘草桔梗各五分為末水調頓服立愈名羣命散

如刺用生射干搗汁與服

取利亦可九服

肘後方乳癰半腫未審調傅之神功

水經刀重扁竹根如僵蠶者同羣草根為

中射工毒生瘡者

姜升麻各二兩水三升煎二

動搖水聲虛黑用鬼扇根搗

水盡頭大汗服一盃水即下

肘後方

陰山腫刺

腫痛

汗服以淬傅瘡上

姚僧垣集驗方

鶯尾

本經釋名鳥園

根名鳥頭

時珍曰正以形命

集解

別錄曰鳥

生九疑山

五月采弘景曰

方家言是射干苗而主療亦異當別

名鶯尾根名鶯頭亦謂之鶯根葉似射干布地生黑根似高良姜而節大數箇相連

九月十月采根日熟時珍曰此即射干之苗非別

一種也肥地者莖長根粗瘠地者莖短根瘦其花自有數色諸家皆是

生瘡者

姜升麻各二兩水三升煎二

動搖水聲虛黑用鬼扇根搗

水盡頭大汗服一盃水即下

肘後方

陰山腫刺

腫痛

汗服以淬傅瘡上

姚僧垣集驗方

鶯尾

本經釋名鳥園

根名鳥頭

別錄曰鳥

生東海

頭即由跋者亦訛也東海出之故耳

姜升麻各二兩水三升煎二

動搖水聲虛黑用鬼扇根搗

水盡頭大汗服一盃水即下

肘後方

增一分立驗不可多服

陳延之小品方

玉簪

綱目釋名鳥仙

時珍曰並以集解

魚上紋如車前葉青白色頗嬌瑩

六七月抽莖上有細葉中出花朶十數枚長二寸本小末大

欲令病人見鬼增防禁一分欲令知鬼又

增一分立驗不可多服

陳延之小品方

未開時正如白玉燈頭管形又如羊壯磨姑之狀開時微縱四出中吐黃絲頗杳不結子其根連生如鬼臼射干生薑葉有鬚毛舊莖死則根有一臼新根生則舊根腐亦有紫花者葉微狹皆鬼臼射干之屬

根氣味甘辛寒有毒主治癰一切毒下骨硬瘻癰腫時

附

新

乳

癰

刀

內

消

花

即

玉簪花

取根搗

搗

白鶴仙根白鳳

紫葳二錢半辰砂二錢搗末蜜和丸梧子大產內三十件解斑蝥毒時

附

上

藝

根

搗

水

服

以

酒

傅

之

海

上方

婦人

斷產

仙子

各一錢半

日以酒半盞服之不可着牙齒能損牙齒也摘立方解斑蝥毒時

附

上

藝

根

搗

水

服

以

酒

灌

山

裏

紅果

根

同

搗

自

然

耀仙乾利骨取牙玉簪根乾者一錢白砒三分白硇七分蓬砂二分威靈仙三分草

附

趙真人濟急方

下

魚骨哽

玉簪花根

山

根

筒

灌

入

咽

中

其

骨

自

下

坤生意刮骨取牙烏頭一分半為末以少許點瘡處即自落也余居士選奇方

葉橐味同生治蛇傷搗汁和酒服以瀉傷之中心留孔洩氣時

鳳仙

細釋名急性子救目金鳳花細

小桃紅救荒交竹桃救海病音染指甲草救菊婢

時珍曰其花頭翅尾足具翹然然如鳳狀故如小桃老則迸裂故有指甲急性小桃諸名宋光宗李后諱

鳳宮中呼為好女兒花張妃呼為羽客

集解時珍曰鳳仙人家多種之極易生二月下子五月可再種苗高二三尺

葉開花或黃或白或紅或紫或碧或雜色亦日變易狀如飛禽自夏初至秋盡開謝相續結果繁密大如櫻桃其形微長色如毛桃生青熟黃犯之即自裂皮卷如拳苞中有子似雞子而小褐色人采其肥莖汋配以光蕷筍嫩半酒浸一夜亦可食但此草不生虫蠭蝶

不能無毒也

子氣味微苦溫有小毒主治瘻積塊噎膈下骨哽透骨通寒時珍曰鳳仙子其性急速故能透骨軟堅庵人拿魚肉硬者投

服者不可着齒也附方新五瓣雞槿生

鳳仙子一錢研末水服勿近牙外以噎食不下鳳仙花子酒浸三宿晒乾為末酒丸綠豆大每服因多用亦戰人咽

口

中骨哽欲死者白鳳仙子研水一大呷以竹筒灌入咽

普濟方

牙齒欲取金鳳花子研末少許小兒瘻積急性子水紅花子大黃各一兩俱生研末每味取五錢外用皮消一

兩拌同將白鵝鴨一箇或白鴨亦可去毛屎剖腹勿犯水以布拭淨將末裝入內用線紮定沙鍋內入水二碗重重紙封以小火煮乾將鵝鴨翻調焙黃色冷定早晚食之日西時疾軟三日大便下血病去矣忌物百日

孫天仁集効方

花氣味甘滑溫無毒主治跌傷撞酒服即解治腰脇引痛不可忍者研餅晒乾為末空心每酒服三錢活血消積

時附方一風濕症

床不起用金鳳花柏子仁朴消木瓜煎湯洗浴每日二三次內服獨活寄生湯吳又扶毒精方

根葉氣味苦辛有小毒主治雞骨喉誤吞銅鐵杖樸腫瘻散血通經軟堅透骨

時附方新咽喉物硬

金鳳花根爛噙咽口目

口免損益也亦治誤吞大丈腫瘻鳳仙花葉搗如泥塗腫破處乾則又上一夜血散即愈

銅鐵

危氏得効方

才木日瘡冬月收取乾者研末水和塗之

葉研器通變要法

黑瘡

白鳳仙花連根葉敷膏遇馬有病

易簡

株其眼四角上即汗出而愈

衛生

坐鍊草宋圖集牛頸曰生江西及滁州六月開花結實采其苗入藥甚得後人用有効今賴貴雲時珍曰按一統志云出吉安永豐縣

經

神醫普救方治風癩中已有用者時珍曰危氏得効方麻藥煮酒方中用之聖濟錄治癩上虛熱咽喉嘈塞小便赤澑利因多

發明

頌曰神醫普救方治風癩中已有用者時珍曰危氏得効方麻藥煮酒方中用之聖濟錄治癩上虛熱咽喉嘈塞小便赤澑利因多

睡有坐鍊草大黃亦可樂本香升麻麥門冬黃芩木通酸棗仁薏苡仁枳殼等分爲末蜜丸梧子大每服二十九粒門冬湯附錄押不蘆時珍曰按周密癸卯雜志云漢北回地方有單名押不蘆土人以少許磨酒飲即通身麻痺而死加以刃斧亦不知至三日則以少樂投之即活御藥院中亦儲之貪官污吏罪甚者則服百日耳皆用此也昔華佗能割腸除胃豈不由此等

樂

耶

曼陀羅花

細葉名風船兒

生北土人家亦栽之春生夏長獨莖直上高四五尺生不芳列綠葉碧葉葉如荷葉八月開白花凡六瓣

狀如牽牛花而大倍花中折葉葉外包而朝開夜合結實圓而有丁房中有小子八月采花九月采實

花子氣味辛溫有壅涼諸風及寒濕脚氣前湯洗之又主驚癇及脫肛升入麻藥

時珍曰相傳此花笑采釀酒飲令人笑珍多明舞采釀酒飲令人舞子嘗試之飲須半

分為末熟酒調服三錢少頃昏如醉割瘻火宜先服此則不覺苦也

所方新

面上生瘡許貼之

衛生易簡方小兒慢瘡蔓陀羅

重一字天麻二錢半全蝎炒一枚天南星炮丹砂乳香各一錢半為末每服半錢薄荷湯調下

御藥院方

大腸冗工蔓陀羅子連殼一封橡斗十六個同判水

大腸冗工煎三五沸入朴消少許洗之

儒門事親

羊躡躅

本經羣書躡躅細葉杜鵑黃

行山川谷及淮南山三月采花陰乾

景曰近道諸山皆有之化黃似鹿色不可近眼

目花亦不似鹿色正似旋化色黃者也深昇曰

榴筆正黃色羊食之則死今嶺蜀道山谷遍生皆深紅色如錦繡然或云此種不入藥時珍曰

謂深紅色者即山石榴名紅躡躅者無毒與此別類張揖廣雅謂躡躅一名次尤者誤矣次尤次明也按唐

李紳文集言駢谷多山枳杷有毒能殺人其花明艷與杜鵑

花相似樵者識之其說似羊躡躅未知是否要亦其類耳

花氣味辛溫有大毒

霍曰慈諸石及麴不入湯使

本草

財風在皮膚中淫淫痛溫瘡惡毒讀讀

本草

形氣冤瘡毒讀讀

經方多用躡躅

利氣冤瘡毒讀讀

利氣冤瘡毒讀讀

利氣冤瘡毒讀讀

如胡治時行赤散及治五嶽四滿丸之類并治風諸酒方皆雜用之又治百病風濕等魯王酒中亦用躡躅花今醫方將腳湯中多用

之南方治盜毒下血有躡躅花散云甚勝時珍曰此物有大毒曾有人以其根入酒飲遂至斃也和劑局方治中風癰瘍伏虎丹中亦

用之不計新

方

新

風寒注痛

躡躅花

天南星並生時同搗作餅敷上蒸四五遍以稀臘裹盛之臨時取培為末

水

水

水

多服耳附方

四風注痛

躡躅花

天南星並生時同搗作餅敷上蒸四五遍以稀臘裹盛之臨時取培為末

水

水

水

水

水

黑豆半盞酒水各一盞徐徐服大良

時珍曰處處山谷有之高者四五尺低者一二尺春生苗葉淺綠色枝少而花繁一枝數萼二月始開

之追涎海上仙方

錄山躡躅時珍曰處處山谷有之高者四五尺低者一二尺春生苗葉淺綠色枝少而花繁一枝數萼二月始開

之追涎海上仙方

錄山躡躅時珍曰處處山谷有之高者四五尺低者一二尺春生苗葉淺綠色枝少而花繁一枝數萼二月始開

之追涎海上仙方

錄山躡躅時珍曰處處山谷有之高者四五尺低者一二尺春生苗葉淺綠色枝少而花繁一枝數萼二月始開

石榴一名映山紅一名杜鵑花
其黃色者即有毒羊躡頭也

美不哭草

拾遺藏器曰生蜀川山谷葉細長在諸草中羊不哭者是也味苦辛溫無毒主一切

芫花

本經

下品校正

自木部釋名杜元錄亦先

水經

毒魚錄頭痛記

綱兒草

吳敗華

別名黃大戟

吳蜀藥

別錄時珍曰芫或作杔其義

性大戟言其似也俗人因其氣惡呼為

年年別錄曰芫花生淮源川金三月三日采花陰乾晝曰芫根生邯鄲二月生葉青色加厚則黑

頭痛花山海經云首山其草多无是也集解有紫亦白者三月實落葉乃生五月采花五月采葉八月九月采根陰乾保昇曰近道

處處有之由高二三尺葉似白前及柳葉根皮黃似桑根正月二月花發紫碧色葉未生時收采日乾葉生花落即不堪用也頌曰在處

有之宿根舊枝莖紫長一二尺根入土深三五十白色似榆根春生苗葉小而尖似楊柳枝葉一月開花頗似紫荆而作穗又似藤花

而細今絳州出者花黃謂之黃芫花時珍曰顧野王玉篇云芫木出豫章煎汁咸果及卵不壞洪邁客齋隨筆云今饒州

參三乳景曰用

時珍曰張仲景治傷寒太陽證表不解心下有水氣乾嘔發熱而欬或喘或利者小青龍湯主之若表已解有時

飲啖辟膈下痛

時珍曰頭痛出汗惡寒心下有水氣乾嘔引兩脇或喘或利者十棗湯主之益小青龍治未發散表邪使水氣自毛竅

而出乃內經所謂開鬼門法也十棗湯驅逐邪使水氣自大小便而淺乃內經所謂潔淨府去陳莝法也夫飲有五皆由內啜水漿外

受濕氣鬱蓄而為留飲流于肺則為支飲令人喘欬寒熱吐沫背寒流于肺則為懸飲令人欬唾痛引缺盆兩脇流于心下則為伏飲令

人胸滿嘔吐寒熱腔運流于腸胃則為痰飲令人腹鳴吐水胸膈支滿或作泄瀉忽肥忽瘦流于經絡則為溢飲令人沉重注痛或作水

氣財腫芫花大戟甘遂之性逐水洩濕能直達水飲累囊隱僻之處但可徐用之取効甚捷不可過劑淺人真元也陳言三因方以十

棗湯藥為末用棗肉和丸以治水氣喘急浮腫之證益善變通者也楊士瀛直指方云破癰須用芫花行水後便養胃可也好古曰水者

肺腎脾三經所主有五臟六腑十二經之部分上而頭中四肢下而腰腳外而皮毛中而肌肉內而筋骨脉有尺寸之殊浮沉之別不

可輕溫當知病在何經何臟方可用之若誤投之則害深矣。芫花與甘草相反而相治居士。

正誤 憤機曰：三國志云：魏初平中有青牛先

方治瘧疾飲癖以甘遂大戟芫花大黃甘草同用益欲其大吐以泄濕因相反而相激也。

害服芫花年百餘歲常如五六十人

時珍曰：芫花乃下品毒物豈堪久服此方外迂怪之言不足信也。

附方 舊五新一十九卒得欬嗽四枚煮汁乾日食五枚必愈

時後卒嗽有痰取芫花連根一虎口切裹乾令病人以薦自裹春令反乞嘔膈痛

文仲備急方 咳嗽吞嚥飛揚入其七孔中當眼派出口鼻皆辣待芫花盡乃止病即愈

古今錄驗車嘔膈痛引兩脇乾嘔短氣汗出

不亞寒者表解裏和也十裹湯主之芫花熬甘遂大戟各等分為散以大棗十枚水一升半煮取

八合去渣納藥強人服一錢羸人半錢平旦服之當下利病除如不除明日更服仲景傷寒論

水腫支飲及癖飲用十聚湯加大黃校同煮如法服一方加芒硝一兩

胡洽百病方 天行煩亂凝雪湯治天行毒病七八日熱積胸中煩亂欲死用芫花一斤水三升煮取

兩硃砂五錢為末密丸梧子水鹽張滿芫花枳殼等分以醋煮芫花至爛乃下枳殼煮

大每服十九乘湯下直指

梧子大母服三十九白湯下普濟方酒燙屎黃分燒末水服半錢日二服時後

目盲眼

闔漏一證病不可忍者芫花根米醋調傅之如膏艾氣透

光花醋煮半兩玄胡索炒一兩半為末每服一錢男子元臟痛忽酒下瘧疾

仁台經候不通芫花根三兩炒蕎蕎為末每服一錢桃仁煎湯調下當利惡物而愈聖惠方催生胎陰穴三寸即下攝生妙用方

產後惡物為末調一錢服保命

心痛有蟲芫花一兩醋炒雄黃一錢為末每服一字溫醋湯下

乾坤生意牙痛難忍痛定以溫水漱之水類方

白頭瘡傳之集効方瘡月初起芫花末猪脂和推

癰瘡已潰生合令膿易竭也集簡方痔瘡乳核先根一握洗淨入木臼搗爛入少水絞汁於石器中慢火煎成膏將絲線於膏內度過

一夜用不得瘻瘡刀起氣壯人用芫花搗水一盞服大吐利即

使水經驗瘻瘡本走平黃州陳大用所傳瀕湖集簡方便毒刀起芫花搗水服以治瘡之得下即消

金全

千金

用芫花大戟甘遂等分為末醋調別以筆粧其中勿近甘草次日縮小

一切蟲毒汲水服一錢以利為度危氏得効方

又以甘草膏粧小量三次如前仍上此藥自然焦縮

危氏得効方

黃州熊珍所傳瀕湖集簡方督瘡僵法甘草煎膏糊瘤

疔瘡之四圍上三爻乃

因蛇蟲毒氣熏蒸所致用芫花生研新

水服一錢以利為度危氏得効方

蕘花

音既〇本草云時珍曰毫有節經下品程也其花繁既也集而極細白色茶曰似胡荽莖無刺花細黃色四月五月收與元花全不相似也保昇曰所在

有之以雅州者為好生岡原上苗高二尺許榮興曰今京洛間甚多時珍曰接蘇頌圖經言絳州所出芫花黃色謂之黃芫花其圖小株花成簇生恐即此芫花也工特色黃乾則如白故陶氏言細白也或言無芫花以桃花代之取其利耳

別錄曰辛主傷寒溫瘧下十二水破積聚大堅癥瘕湯滌胸中留癖飲食寒熱邪氣利水道經療瘻飲嗽錄治欬逆上氣喉中腫滿微寒有毒

瘻毒瘻瘻氣塊疽發明宗興曰張仲景傷寒論以芫花治利者取其行水也水去則利止其意如此今用之當斟酌不可過使與不及也須有是證乃用之好古曰仲景小青龍湯云若微利去麻黃加芫花如雞子大一枚令赤色用之益利水

也時珍曰芫花益亦芫花

之類氣味主治大暑相近

醉魚草

綱目釋名蘭蕙花

龜尾草

綱目槐木集鱗

時珍曰醉魚草南方處處有之多在塹岸邊作小株生高者三四尺根狀如枸杞莖似黃荊有微稜外有溥蓋皮枝易繁衍葉似水楊對節而生經冬不凋七八月開花成穗

紅紫色狀如芫花一樣結細子漁人采花及葉以毒魚盡圍而死呼為醉魚兒草池沼邊不可種之此花色狀氣味並如芫花毒魚亦同但花開不同時為異爾按中山經云熊耳山有草焉其狀如蘇而赤華名曰蒙常可以毒魚其此草之類與

花葉

綱目李時珍

氣味辛苦溫有小毒濃飲成齁遇寒便發取花研末和米粉作糊熟食之則效又治誤食石斑魚中毒止及諸

魚膏鯁汁和冷水少許啜之吐即止膏即化也久瘧成癖者以花填鯁魚腹中濕紙裹煨熟空心食之仍以花和海粉搗貼便消珍

莽草

本草綱目校正自本部釋名

莽草

山海經

馬草

正言

鼠莽

弘景曰莽草作兩字俗說呼爾時珍曰此物有

正吳別錄曰一名薅一名春草寓錫

下品校正移入此草

音芒草

固經

鼠莽

李時珍曰食之令人迷罔故名山人以毒風謂之鼠莽

正言

接爾雅云道春草孫炎注云

樂草也俗呼為榔草郭璞注云一名芒草所見異也時珍曰薅音尾白犧也微辨字

集解

正言

曰莽草生上谷山谷及窓句五月采葉陰

音相近爾別錄白犧下云一名春草而此又以為榔草益因孫炎之誤也今正之用搗以和陳粟米粉納水中魚吞即死浮出人取食之無妨頃曰今南中州郡及蜀川皆有之本若石南而葉稀無花實五月七月采葉陰乾

陰乾說藤生繞木石間既謂之草乃藤生者是也宗興曰莽草諸家皆謂之草而本草居木部今世所用皆木葉如石南葉枝梗乾則

謁採之其臭如椒殿曰凡用葉勿用尖及攀生

者時珍曰范子計然云芥草出三輔青色者善

葉修治

日使取葉細剉以生甘草水蓼二味同盛

氣寒溫有毒

普曰神農掌雷公桐房苦有毒時珍曰芥草制雌苦雄黃而有

根即爛性

主治頭癰腫乳癰癰瘕除結氣疥瘻殺蟲魚

本經療喉痺不通乳難頭風癢可用沐勿令人眼錄

治療

氣腫堅凝血治療

癰除濕風不入湯服主頭瘡白堊蟲與白欒亦小豆為末雞子白調如糊煑毒腫乾更易一

頭治反膚麻痺煎湯淋風蟲牙痛大發

明頌曰古方治風毒痔厥諸酒皆用筒草令醫家取葉煎湯執含少嘅吐之治牙齒風虫及喉痺甚効

蟲與曰濃煎湯淋帶皮膚麻痺周

經藥煎水除蟲物以論草重之則死時珍曰古方治小兒傷寒有芥草湯又瑣碎錄云邑村王氏之子生七日而兩脣縮入一醫云此

受寒氣而然也以硫黃茱萸大蒜研塗其口

舊四歲風腫瘡和醋一升漬一宿猪脂一斤煎三上三下絞去滓向火以手摩病上三百

度應手即瘳若且鼻疾可以綿裹壓眼極者日數十發又治大人賊風芥草雷丸各一雞子黃大化頭風

人日

頭後方用芥草煎湯熬秋冷吐一加山椒皮一加獨活一加郁李仁一加光花一加川椒細辛各等分煎

聖惠方

風蟲牙痛湯熬漱冷吐

聖惠用芥草半兩角三挺去皮子漢椒七粒為末囊內丸芥子大每以一丸塞孔中吐涎取効

癰結核

前草一兩為末雞子白調全草上

癰瘡未潰方同上得

日二易取効止

聖惠方

癰瘡未潰痛為良

忍

學易簡酒和傅之

衛生易簡狗咬唇腮傳之便民圖纂

四尺草亦葉似石榴而短厚又似石南葉四月開細白花五月結實三月四月七月采葉日乾

引錄曰微溫有毒

主治五臟邪氣心腹寒熱羸瘦如瘧狀發作有時諸關節風濕痺痛

本經療久風濕走四肢脚弱別

莖葉氣味苦溫有毒

引錄曰苦平有小毒

主治五臟邪氣心腹寒熱羸瘦如瘧狀發作有時諸關節風濕痺痛

本經療久風濕走四肢脚弱別

治男子女人軟腳毒風拘急攀癆頭一切冷風筋骨怯弱羸顛入藥多用

太醫珍曰千金外益諸古方治風病有因預丸治風肆有
明發明因預酒治婦人產後中風有因預膏風濕諸方多用之

茵預石南芥草皆古人治風妙

舊

因預酒治風手足枯痺用茵預附子天雄烏頭秦艽女萎防風防己石南芥躑躅花細

品而近世罕知亦醫家疏缺也

所新一

因預酒半桂心各一兩十二味切以絹袋盛清酒一斗漬之冬七夏三春秋五日樂成每服一

合日二服以微癢為度方出胡

圓經本草四十九半兩右為末煉蜜丸如梧子大每服二十九五更量裏湯下取利未利再服取快

本事方產後治居士百病方

治風氣積滯成脚氣發則痛者茵芋葉炒薑以仁各半兩郁李仁一兩牽牛子三兩生研末

合日二服以微癢為度方出胡圓經本草四十九半兩右為末煉蜜丸如梧子大每服二十九五更量裏湯下取利未利再服取快

本事方產後治居士百病方

中風茵芋五兩木防己半斤苦酒九升漬一宿猪脂四

斤煎三上三下膏成每服熱摩干遍一千金方

石龍芮

本經正併人采莖各地根本經天豆別能別

吳普言莖葉水莖又音片

爾雅莖蕷郭月椒菜

救荒本草根名別錄弘景曰生于石

名葵曰實如桑椹故名地椹禹錫曰爾雅云苦莖也

郭璞云即苦莖也本草言味甘而此云苦者古人語倒猶甘草謂之大苦也時珍

曰內肉細兒其椹之子細肉故名地椹以下皆子名也水莖以下皆苗名也苗作疏食味平而滑故有淑葵之名唐本草采部水莖條重

出今依吳普本草合併為一集解別錄曰石龍芮生大山川澤石邊五月五日采子二月八月采皮陰乾弘景曰今出近道子形粗似蛇狀子而扁非

草真好者人言是蕷菜也東山石上所生者其葉芮內短小其子狀如蕙蕊黃色而味小辛此乃是真葵曰今用

者俗名水莖苗以附子實如桑椹生下濕地五月熟葉子皆味辛山南者粒大如葵子關中河北者細如蕙蕊氣力劣於山南者陶以細

者為真木為通論又曰莖菜野生非人所種葉似鐵花紫色鐵器曰爾雅云爰莖草注云烏頭苗也蘇恭注天雄亦云石龍芮葉似莖草

故名水莖據此則莖草是烏頭苗水莖定是石龍芮更非別草也頌曰今惟出兗州一叢數莖青紫色每莖三葉其葉短小多刻缺子

如蕙蕊而色黃蘇恭所說乃水莖非石龍芮也兗州所生者正與本草及陶氏說合今得其真宗興曰石龍芮有兩種水中生者葉光而

子圓陸地生者葉毛而子銳入藥須水生者陸生者又謂之天癸而補不足莫令失精時珍曰蘇恭言水莖即石龍芮蘇頌非之非矣按

漢吳普本草石龍芮一名水莖其說甚明唐本草采部所出水莖言其苗也本經石龍芮言其子也寇宗興所言陸生者乃是毛莖有大

二尖多細缺江淮人三四月采苗嫩過晒至黑色為疏四五月開細黃花結小實大如豆狀如初生桑椹青綠色槎散則子甚細如蕙蕊

子即石龍芮也宜半老時采之沱子

計然云石龍芮出三輔色善者善

子

根皮氣味

草無毒

普曰神農苦平岐伯酸扁鵲大寒雷公誠同

無毒才曰大戰為之使畏采更蛇蛻皮

主治風寒濕痺心腹邪氣利關節止煩滿久服輕身明目不老

本平經半

醫胃氣補陰氣不足失精要令人皮膚光澤有子

別錄逐諸風除心熱燥大發月

時珍曰石龍芮乃平補之藥古方多用之其功與枸杞覆盆子相埒而世人不知用何哉水氣

味

甘寒無毒

時珍曰覆盆子辛苦溫

主治搗汁洗馬毒瘡并服之又塗蛇蝎毒及癰腫

唐本久食除心下煩熱主寒熱風濕瘡癰

生

霍亂又生搗汁半升服能殺鬼毒即吐出

孟诜曰莖葉止霍亂與香

附方同功散即香薷也

附方新一

結核氣莖葉日乾為末油煎成膏摩之

蛇傷瘡生

附方新一

結核氣日三五度便瘥

孟诜食療

蛇傷瘡生

桔汁塗之血止初起

胡椒菜葉接按

萬靈術

集簡方

毛茛

音良校正併入毛

釋名毛建草

拾遺校正

水良

綱目毛莖音天炎義

衍

時珍曰良乃草烏頭之苗此草形狀及毒皆似之故名

莖而有毛也山人截蘿采葉接貼寸口

集解器曰陶注鉤吻云或

是毛良蘇本云毛良是有毛石龍芮也有毒與鉤吻無干葛洪百一

一夜作泡如火燎故呼為天炎自灸

集解器曰菜中有水良葉圓而光生水旁有毒

并多食之人誤食之狂亂如中風狀或吐血以甘

草汁解之又曰毛建草生江東地田野澤畔葉如芥而大上有毛花黃色子如蒺藜時珍曰毛建毛茛即今毛莖也下濕處即多春生苗

高者尺餘一枝三葉葉有三尖及細缺與石龍芮莖葉一樣但有細毛為別四五月開小黃花五出其花艷紅色如欲採青桑椹如有

尖峭與石龍芮子不同人以為鵝不食草者大誤也方士取汁煮砂伏硫沈存中筆談

附錄海鹽陰命藏器曰陶注鉤吻云海鹽生海中

所謂石龍芮有兩種水生者葉先而末圓陸生者葉毛而末銳此即葉毛者宜辨之

命生海中亦色似木懸其

子有大毒今無的識者

葉及子氣味辛溫有毒主治瘡癰腫瘍疼痛未潰搗葉傳之不得入瘡令肉爛多瘡人以一握微碎繡於臂上裹左女右

令近肉即便成瘡和薑搗塗腹破冷氣

藏器曰

牛扁

本經卷之六

唐

本草拾遺錄

曰牛扁生桂陽川谷乳果曰人不復識此藥曰此藥似革草石龍芮草根如葵毫而細生平

等二月八月末根日乾謂曰今治州一種便特六月有花八月結實采其

葉而燒末油調殺蟻風主瘻大都相似疑即扁特也但聲近而字訛耳

根苗搗末油調殺蟻風主瘻大都相似疑即扁特也但聲近而字訛耳

療牛病本草錄

金匱要略

山足濕地發葉似山丹微亦高一二尺又有水竹葉生水中葉如竹葉而短小可

生食亦去蟻風

羃麻

本草綱目

拾遺藏器曰苦無毒主蟻風接汁沐頭氣盡死人有誤吞風成病者搗汁服一小合亦主諸虫瘡生

本草綱目

瘡之走漏

時珍曰羃字本作絃

本草綱目曰羃麻生江蘇府山野中時珍曰川黔諸處甚多其莖有刺高二三尺葉似花葵

或青或紫者入藥上有毛芒可畏觸人如蜂蠍聲

蟲以人溺灌之即解有花無實當

子美有除蟻草詩是也集角或青或紫者入藥上有毛芒可畏觸人如蜂蠍聲

蟲以人溺灌之即解有花無實當

子美有除蟻草詩是也集角或青或紫者入藥上有毛芒可畏觸人如蜂蠍聲

蟲以人溺灌之即解有花無實當

子美有除蟻草詩是也集角或青或紫者入藥上有毛芒可畏觸人如蜂蠍聲

蟲以人溺灌之即解有花無實當

子美有除蟻草詩是也集角或青或紫者入藥上有毛芒可畏觸人如蜂蠍聲

蟲以人溺灌之即解有花無實當

子美有除蟻草詩是也集角或青或紫者入藥上有毛芒可畏觸人如蜂蠍聲

蟲以人溺灌之即解有花無實當

子美有除蟻草詩是也集角或青或紫者入藥上有毛芒可畏觸人如蜂蠍聲

蟲以人溺灌之即解有花無實當

格注草

本草

集角有二十許

二月八月末根五月六月采苗日乾用

氣味辛溫有大毒主治瘧症諸毒瘡癰等

唐本草

海羊

綱目

本草綱目

出武都取汁熟鐵立成黃金有大毒人誤食之化為紫水又有金蘆草亦生蜀中狀如馬齒莧而色紅撲鐵成金亦有毒入口殺人須臾為紫水也又何遠春者紀聞云劉均父吏部罷歸成都有水銀一箇過嶺區漏急取渡旁叢叢之久而開視盡成黃金矣宋初有軍士在涇州澤中割馬草歸塚皆成金以草燃莖亦成黃金又臨安僧法堅言有客過於潛山中見一蛇腹脣一草以腹磨之而消滅此草必能消服取置囊中夜宿旅館間時爲有人病擾張呻吟以葦煎藥一盃既服頃之不復聞聲念已安至旦視之其人面目俱化為水獨散骨在林間視其金則通體成金矣觀何氏所載即此山根乃金英草之類如此毒草不可不知故備載之耳是透山根乃金英草之類如此毒草不可不知故備載之耳

鉤吻

本經華夏

吳用

胡蔓草

圓斤陽草

細鷄陽草

火把花

火把花也

或言吻當作曉字

牽挽人腸而絕

毒根

胡蔓草

細鷄陽草

火把花

云治地名也在東南其說甚通廣人謂之胡蔓草亦曰斷腸草人畜腹內即枯腸上半日則黑爛又名燭腸草滇人謂之火把花因其花紅而性熱如火也岳州謂之黃藤集魚青烟出者名固活一月八月采晝日參鉤吻一名除平生南越山及寒石山或益州某如昌亦呈大如箭而方根黃色正月采之繁曰野葛生桂州以南村墟間巷皆有彼人通名鉤吻亦謂苗為鉤吻根名野葛蔓生其葉如柿其根新采者皮白骨黃宿根似地骨嫩根如漢防己皮即斷者良正與白花藤相類不深利者顧不識之新者折之無鹿氣經年以後則有壓起從骨之細孔中出今折鉤吻根亦然本草言折之青烟起者名固活為良亦不違

之言也人誤食其葉者致死而羊食其苗大肥物何相伏如此博物志云鉤吻蔓生葉似鮑葵是也時珍曰稽含幽方草木狀云野葛蔓生葉如羅勒光而厚一名胡蔓草人以雜生蔬中毒人半日輒死段成式酉陽雜俎云胡蔓草生邕州容州之間叢生花扁如卮子而稍大不成朵色黃白且葉梢黑又極滑刺衛王方云胡蔓草葉如茶其花黃而小一葉入口口鼻潰血人無復生也時珍又訪之南人云鉤

吻即胡蔓草今人謂之斷腸草是也蔓生葉圓而先春夏嫩苗至秋冬枯老稍緩五六月開花似櫻桃花數十朵作穗生頸南者花黃生直南者花紅呼為火把花此數說皆與吳普蘇公說相合陶弘景纂別生分辨並正于下

正誤

弘景曰五行經

抽花黃色初生極類黃精故人采多誤之遂致死生之反或云鉤吻是毛茛參錯不同未詳云何殺曰凡使黃精勿用鉤吻真似黃精只是葉有毛鉤子二個苗精葉似竹葉又曰凡使鉤吻勿用地精莖苗相同鉤吻治人身上惡毒瘡其地精殺人也蔡曰鉤吻蔓生葉如柿陶言飛鳥不集者安也黃精直生葉似柳及龍膽殊非比類毛茛乃有毛石龍芮與鉤吻何干須曰江南人說黃精莖苗梢類鉤吻但草但不得指為鉤吻昔天姥對黃帝言黃精益壽鉤吻殺人是以二草善惡比對而言陶氏不審疑是相似遂有此說也餘見黃精根名野葛者亦非通論時珍曰神農本草鉤吻一名野葛一句已明草本狀又名胡蔓草顯是蔡生吳普蘇公說正合本文陶氏以藤生為野葛又指小草為鉤吻復疑是毛茛乃祖雷義之說諸家遂無定見不辨其蔓生小草相去遠也然陶雷所說亦是一種有毒小草

氣味辛溫大有毒此獨變文曰大有毒可見其毒之異常也之才曰半夏為之使惡黃芩主治金瘡乳瘡中惡風欬逆上氣水腫殺鬼

瘡蠱毒經破癥積除腳膝瘡痛四肢拘攣惡瘡疥蟲殺烏獸搗汁入膏中不入湯飲別主喉痺咽寒聲憂變吳發明藏器曰鉤吻食葉飲

毒也彼土毒死人懸尸樹上汁滴地上生菌子收之名國藥列於野葛也壅米搗汁解野葛毒取汁滴野葛苗即姜死南人先食壅米後食野葛二物相伏自然無苦魏武帝噉野葛至尺先食此米也時珍曰按李石續博物志云胡蔓草出二廣廣人負貢急母食此草而死以誣人以急水吞即死急憶水吞死稍緩或取毒蛇殺之覆以此草澆水生菌為毒藥害人葛洪肘後方云凡中野葛毒口不可開者取大竹筒洞節以頭柱其兩脇及腋中灌冷水入筒中數易水須臾口開乃可下藥解之惟多飲甘草汁人屎汁白鴨或白鶲斷頭潰血人口中或羊血灌之嶺南衛生方云即時取雞卵抱未成雛者研爛和麻油灌之吐出毒物乃生稍遲即死也

本草綱目草部第十七卷下終

本草綱目草部目錄第十八卷

草之七

蔓草類七十三種

附十九種

菟絲子

本經
難火蘭附

蓬蘽

本經

覆盆子

別錄
開寶

便嬖

開寶

木孽

開寶

懸鈎子

拾遺

橘梗

開寶

預知子

開寶

蕷子

綱目

桔梗

開寶

葛

本經

牽牛子

別錄

紫葳

本經
即凌霄花
骨路支附

蕷牆

本經

月季花

綱目

王瓜

本經
即土瓜

葛根

本經

黃環

本經即鼓子花

百部

別錄白
并附

何首烏

別錄

黃芩

別錄

白芍

別錄白

白芍

本經

黃連

別錄

伏雞

拾遺仰盆
人肝藤附

黃耆

別錄

葛根

開寶

草薢

別錄

土苓

綱目

白芍

本經

菟葵

李當之

諸葛

本經

葛根

開寶

九仙子

綱目

葛根

開寶

千金藤

開寶陳
鬼峩附

白蘿蔔

唐本
陳甘白蘿
會州白

葛根

開寶

解毒草

唐本即苦藥子
奴會子藥實根附

白蘿蔔

唐本
陳甘白蘿
衝洞根
突厥白附

葛根

開寶

大葉周

卷之二

目錄

本草綱目

卷十六

蘿本經
血藤附

蠶日華

防己本經

通草本經

通脫木法象天
毒根附

鈎藤別錄倒
挂藤附

黃藤綱目

白毛蠶本經

白花藤唐本

白英本經即鬼
目排風子

蘿藦唐本

赤地利唐本

紫葛唐本

烏欃唐本即
五葉藤

蘿藦唐本

羌活本經

絡石本經

木蓮拾遺地
錦附

蘿藦唐本

當春藤拾遺

千歲龜別錄

登參別錄即
金銀花

甘草嘉祐
甘露附

桑寄生海藥

天仙藤圖經

紫金藤圖經

南藤開寶
烈節附

清風藤圖經

百棱藤圖經

省藤拾遺

紫藤開寶

瀉膚木唐本
延母

折傷木
風每始王木附

千里光拾遺即
千里光

藤黃拾遺

甘草開寶

右附方舊一百二十七新三百二十八

附錄諸藤二十九種

本草綱目草部第十八卷上

草之七

莫草類七十二種附一十九種

菟絲子

本經釋名菟纏別著繫別菟蘆本菟子廣
上品采名菟纏別著繫別菟蘆本菟子廣

赤綱別

王委

爾雅

菟蘆

爾火

蔓草

綱目

野狐絲

綱金線草

禹錫曰

樞呂氏春秋云或謂兔

菟是

也抱朴子云菟絲之草下有伏菟之根無此菟則絲不得生於上然實不屬也伏菟抽則菟絲死又云菟絲初生之根其形似菟纏故割

其血以和丹服立能變化則菟絲之名因此也

弘景曰

益言下有伏菟上有菟絲不必爾也

頌曰

抱朴所說今未見豈一類乎孫炎

釋爾雅云唐也蒙也女蘿也菟絲也一物四名而本草唐蒙為一名詩云菟與女蘿毛萇云女蘿菟絲也而本草菟絲無女蘿之名惟松

蘿一名女蘿豈二物皆是寄生同名而本草脫漏半震亨曰

菟絲未嘗與伏苓共類女蘿附松而生不相鬭涉皆承訛而言也時珍曰毛

詩註女蘿即菟絲吳普本草菟絲一名松蘿陸佃言在木為女蘿在草為菟絲二物殊別皆由爾雅釋詩誤以為一物故也張揖廣雅云

兔邱鬼絲也女蘿松蘿也陸機詩疏言光絲蔓草上黃赤如金松蘿蔓松上生枝正青無雜蔓者皆得之詳見本草松蘿下又菟絲伏苓

說見談

集解

別錄曰

菟絲子生朝鮮川澤田野蔓延草木之上

九月果實養乾色黃而細者為赤綱色淺而大者為菟蘆功用並同弘景

答下

曰

田野墟落中甚多皆浮生藍綠藤蒿上其實仙經俗方並以為補藥須酒浸一宿用宜丸不宜煎大明曰

菟丝似黃絲無

根株多附田中草被纏死或生一葉開花結子不分明子如碎米粒八月九月以前采之頌曰

今近道亦有之以菟句者為

勝夏生苗初如細絲遍地不能自起得他草梗則纏繞而生其根漸絕於地而寄生空中或云無根假氣而生信然時珍曰

悽

密獻王庚辛玉冊云火鍼草即菟絲子陽草也多生荒園古道其子入地初生有根及長延草物其根自

斷無葉有花白色微紅香亦襲人結實如大豆而細色黃生於梗上尤佳惟懷孟林中多有之人藥更良

斷無葉

有花

白色

微紅

香亦

襲人

結實

如大

豆而

細色

黃生

於梗

上尤

佳惟

懷

孟

林

中多

有之

人藥

更良

子修治

數曰

凡使勿用

天葵草子

真相似

只是味酸

澆并粘也

菟絲子得去殼了

用苦酒浸

二日流

出以黃精

自然汁相對浸

一宿至

乾入凹中燒熟鐵杵一去

三千餘杵成粉用之

時珍曰

凡用以溫水淘去沙泥酒浸一宿曝乾搗之不盡者再

研末或云曝乾時人紙條敷杖同搗即刻成粉且省力也

人經

筋強陰莖

堅筋骨

玉莖中寒精自出溺口苦躁渴寒

濕為積久服明目輕身延年

錄治男虛冷添精益體去腰痠膝冷消

腫

人

經

渴熱中久服去面黓悅顏色

甄補

五勞七傷澆鬼交泄精尿潤心肺

大補肝臟風虛

好發明

義曰兔絲子稟中和凝正陽之氣一莖從

樹感枝而成從中春上陽結實故偏補人

衛氣助人筋脈頌曰抱朴子仙方單服法取實一斗酒一斗浸曝乾再浸又曝令酒盡乃止搗篩每

度事

陽氣虛損

簡便方用兔絲子熟地黃等分為末酒糊丸梧子大每服五十丸氣虛人參湯下氣逆沈香湯下經

驗方

林廣記

意飲之以止

酒服二錢日二服此藥治腰膝去風兼能明日久服令人光澤老變為少十日外飲啖如湯火雪也附新五消渴不止

兔絲子煎汁任

思慮太過心腎虛損真陽不固漸有遺瀝小便白濁夢寐泄毛絲子五兩白茯苓

和劑局方

小便淋漓

兔絲子夏汁飲范汪方

小便亦濁

心腎不足精少血

三兩石蓮肉二兩為末酒糊丸梧子大每服三五十丸空心鹽湯下

和劑局方

小便淋漓

兔絲子夏汁飲

心腎不足口乾煩熱頭暉

燥口乾煩熱頭暉

怔忡鬼絲子麥門冬等分為末要腰膝疼痛

或頑麻無力鬼絲子洗一兩牛膝一兩同入銀器內酒浸一寸五分

經驗方

肝傷目暗

兔絲子三兩酒

蜜炙梧子大鹽湯每下七十丸凡腰膝疼痛暴為末將原酒糊丸梧子大每空心酒服三二十九

身面卒腫

洪大用

鬼絲子一升酒五升漬二三宿

研油調傳

溫酒下二十九

聖惠方

身面卒腫

每飲一升日三服不消再造

附方

居四要素道赤痛

鬼絲子熬黃黑為末雞子白和塗之

附方

時后方

療如蟲咬上

苗氣味甘平無毒王冊云汁伏三黃硫汞結草砂

主治研汁塗而去面黓本接碎煎湯浴小兒療熱肺

附方

舊二新一面瘡粉刺

鬼絲子苗絞汁塗之不遇三上

附方

時后方

兒頭瘡

鬼絲苗煮湯頻洗

附方

野狐瘡草搗汁

附錄難火

附錄

拾遺藏器曰味酸溫無毒主冷氣風瘡開胃下食去

五味子

本經

知除

支交接

別錄曰五味子生齊山山谷及代

出高麗多肉而酸甜次出青州冀州味過酸其核並似豬腎又有連平者少肉核形不相似味苦亦良此藥多膏潤烈日暴之乃可搗篩

恭曰蔓生木上其葉似杏而大子作房如落葵大如雙子出蒲州及藍田山中今河中府歲貢之保昇曰蔓生莖赤色花黃白子生青熟

紫亦具五色味甘者佳頌曰今河東陝西州郡尤多杭越間亦有之春初生苗引赤蔓於高木其長六七尺葉光圓似杏葉三四月開黃

白花類蓮花狀七月成實叢生莖端如豌豆許大生青熟紅紫入藥主曝不去子今有數種大抵相近雷斅言小顆皮皺泡者有白樸莖

霜一重其味酸鹹苦辛甘皆全者為真也時珍曰五味今有南北之分南產者色紅北產者色黑入滋補藥必用北產者乃良亦可取根種之當年就駐若二月種子次年乃駐須以架引之修治數日凡用以銅刀劈作兩片用密浸蒸後已至申却以漿浸一宿焙乾用時珍曰入補藥熟氣味酸溫無毒好古曰味酸微苦鹹味厚氣輕陰中微陽入手太陰血分足少陰氣分時珍曰酸鹹入用入嗽藥生用

氣味酸溫無毒

肝而補腎辛苦人心而補肺甘入中宮益脾胃之才曰從谷為之使慈養壯筋烏頭

主治益氣欬逆

上氣勞傷羸瘦補不足強陰益男子精本經養五臟除熱止陰中肌別治中下氣止嘔逆補虛勞令人體悅澤

大生津止渴治濕痢補元氣不足收耗散之氣瞳散大果

消食反胃霍亂轉筋癰癧奔豚冷氣消水腫心腹氣脹止渴除煩解酒毒

大生津止渴治濕痢補元氣不足收耗散之氣瞳散大果

喘嗽嗽壯水鎮陽好發明

酸以收逆氣肺寒氣逆則宜此與乾薑同治之又五味子收肺氣以收逆氣而安肺果曰收肺氣補氣不足升也

外邪者不可驟用恐閉其邪氣必先發散而後用之乃民有痰者以半夏為佐喘者阿膠為佐但分兩少不同耳宗憲曰今華州以西至

秦多產之方紅熟時彼人采得蒸爛研濾汁熬成稀膏量酸甘入蜜煉勗待冷收器中肺虛寒人作湯時時飲之作果可以寄遠本經言

其性溫今食之多致虛熱小兒益甚藥性論謂其除熱氣曰華子謂其暖水臟除煩熱後鑿至此多感今既用治肺虛寒則更不取其除

熱之說震亨曰五味大能收肺氣宜其有補腎之功收肺氣非除熱爭補腎非暖水臟乎乃火熱嗽必用之藥履氏所謂食之多致虛熱

者蓋收補之驗也何惑之有又黃昏嗽乃火氣浮入肺中不宜入涼藥宜五味子倍子嗽而降之思邈曰五六月宜常服五味子湯以益

肺金之氣在上則溢源在下則補腎其法以五味子一大合木臼搗細裝瓶中以百沸湯投之入少蜜封置火邊良久湯成住飲元素曰

孫真人千金月令言五月常服五味以補五臟之氣遇夏月季夏之間固之無力無氣以動與黃芩參冬少加生黃芩煎湯服之使人精神頓加兩足筋力涌出也蓋五味子之酸輔人參能瀉丙火而補庚金收斂耗散之氣好古曰張仲景入味丸用此補腎亦兼通類象

形也機曰五味治喘嗽煩分南北生津止渴潤肺補腎勞嗽宜用北者風寒在肺宜用南者

慎微曰抱朴子曰五味治喘嗽煩分南北生津止渴潤肺補腎勞嗽宜用北者風寒在肺宜用南者

朴子云五味者五行之精其子有五味淮南公羹門子服之十六年面色如玉女人水不寒入火不灼

附方十一久嗽肺脹五味二兩

丹溪方用五味子五錢甘草一錢半五倍子風化消各二錢為末乾噙○攝生方用五味子炒過半兩為末白鷄丸每服一丸水煎服

衛生家寶方

兵黃六病此百藥不效於岳陽遇一道人傳此兩服病遂不發

普濟方

陽素起新五味子一斤為末酒服方寸七日三服忌猪魚蒜醋盡一劑即得力百日以

癥嗽并鳴五味子白芍等分為末每服三錢以生猪肺炙熟蘸末細嚼白湯下漢陽庫

陽素起新五味子一斤為末酒服方寸七日三服忌猪魚蒜醋盡一劑即得力百日以

上可御十女四時勿絕藥功能知千金方。腎虛遺精北五味子一斤洗淨水浸擣去核再以水洗核取盡餘味通置砂鍋中布濾過入好冬蜜二斤虛白湯及兩晉并背脊穿痛五味子一兩炒赤為末。醋糊丸梧子大每醋湯下三十丸。經驗良方。吳茱萸以除脾濕則泄自止矣。五味去梗二兩茱萸泡七次五錢同炒香為末。每日陳米飲服二錢。許叔微本事方。

五更腎泄。凡人每至五更即溏泄一二次經年不止者名曰腎泄。蓋陰盛而然脾惡濕濕則濡而困則不能治。水性下流則腎水不足用五味子以強腎水養五臟。

女人陰冷。五味子四兩為末以口中玉泉和丸。大頤納陰中取效。近效方。婦女眼五味子蔓荆子前丸大頤納陰中取效。談野

翁種赤遊風丹。漸漸腫大五味子焙研熟酒服。子方。

一錢自消瘰疬。保幼全安。

蓬蘽

音累。

本校正

自果部

移入此

釋名

覆盆

別錄

陵陰

別錄

編害田藨

會川

丘陵之間藤葉繁衍蓬蓬累累異於覆盆故曰蓬蘽陵蘿即藤

也其實八月始熟。早。別錄曰蓬蘽生荆山平澤及寃句弘景曰蓬蘽是根名方家不用乃昌客所服以易頭者也。覆盆是實名李當之人名割田藨。葉角互生人所食莓子以津汁為味其核微細。內用覆盆小異未詳。孰是。蓋曰覆盆蓬蘽乃一物異名本謂實非根也。李云莓子者近之矣。然生處不同沃地則子大而甘滑地則子細而酸此乃子有酸味根無酸味陶以根酸子甘列入果部重出二條殊為孟浪志。曰蓬蘽乃覆盆之苗莖覆盆乃蓬蘽之子也。按切韻莓音茂。其子覆盆也。蘿者藤也。則蓬蘽明是藤蔓矣。陶言蓬蘽是根蘇言是子一物異名皆非矣。頌曰蓬蘽是覆盆苗處處有之。秦吳尤多。苗短不過尺。莖葉皆有刺花白子亦黃如半彈丸大而下有蒂承之如柿蒂。小兒多食之。五月采實其苗葉未無時江南謂之蕃蕷。然其地所生差晚三月始有苗八九月花開十月實成則同士良曰今觀採取之家說蓬蘽似蠶莓子紅色而大其味酸甘葉似野薑微有刺覆盆子小其苗各別。諸家本草不識故皆說蓬蘽是覆盆子之根大莖細葉密結實小而成朵一則夏熟一則秋熟。豈得同哉。時珍曰此類凡五種予親嘗采之爾雅所列者校之始得其的。諸家所說皆未可信也。一種蓬蘽繁衍茎有倒刺遂節生葉葉大如掌狀類小葵葉面青背白厚而有毛六七月開小白花就蒂結實四十顆成簇生則青黃熟則紫黑微有黑毛狀如熟椹而扁冬月苗葉不凋者俗名割田藨即本草所謂蓬蘽也。一種蔓小於蓬蘽亦有鈎刺一枝五葉葉小而面背皆青光薄而無毛開白花四五月實成子亦小於蓬蘽而稀疎生則青黃熟則烏亦冬月苗凋者俗名插田藨即本草所謂

覆盆子爾雅所謂莖缺盆也此二種者俱可入藥一種蔓小於蓬榮一枝三葉葉面青背淡白而微有毛開小白花四月實熟其色紅如櫻桃者俗名蓬田藨即爾雅所謂藨者也故郭璞註云藨即莓也子似覆盆而大赤色酢甜可食此種不入藥用一種樹生者樹高四五尺葉似櫻桃葉而後長四月開小白花結實與覆盆子一樣但色紅為異俗亦名藨即爾雅所謂山莓陳藏器本草所謂懸鉤子者也詳見本條一種就地生蔓長數寸開黃花結實如覆盆而鮮紅不可食者本草所謂蛇莓也見本條如此辨析則蓬蘽覆盆自定矣李當之陳士良陳藏器寇宗奭汪機五說近是而久明慈陶弘景以蓬蘽為根覆盆為子馬志蘇頌以蓬蘿為苗覆盆為子蘇恭以為一物大明以樹生者為覆盆皆臆說不可據

氣長陰令人堅強志倍力有子久服輕身不老

本經療瘡中風身熱大驚別錄

益顏色長髮耐寒濕

蓬蘽子發明見覆盆

附方

新

一長髮不落

蓬蘽子柏油日

主治安五臟益精

氣味酸平無毒

別錄曰甘酸微熱

目當之曰子似覆盆之形故名之

宗與曰益腎臟縮小便服之當覆其

正言氣味功力同北上無懸鉤南地無覆

盆是土地有前後生非兩種物也時珍曰南土覆盆極多懸鉤是樹生

說曰覆盆子五月采之烈日曝乾不爾易爛雷曰凡使用東

流

水淘去黃葉并皮帶取子以酒拌蒸一夜以東流水淘兩

遍又晒乾方用時珍曰采得搗作薄

餅晒乾密貯臨時以酒拌蒸尤妙

氣味甘草無毒

權曰甘草微熱

主治氣輕身令髮不白

別錄補虛續絕強陰健陽悅澤肌膚安和五臟寧

苗葉

同覆盆子

塗之

聖惠方

覆盆子

別錄上品

移入此

音名莖

爾雅音金鑑

西國草經

圖

畢柳伽經

大麥莓音母

插田藨音烏藨子

音烏藨子

圖目當之曰子似覆盆之形故名之

宗與曰益腎臟縮小便服之當覆其

正言氣味功力同北上無懸鉤南地無覆

盆是土地有前後生非兩種物也時珍曰南土覆盆極多懸鉤是樹生

說曰覆盆子五月采之烈日曝乾不爾易爛雷曰凡使用東

流

水淘去黃葉并皮帶取子以酒拌蒸一夜以東流水淘兩

遍又晒乾方用時珍曰采得搗作薄

餅晒乾密貯臨時以酒拌蒸尤妙

益力療勞損風虛補肝明目並宣撓鍊每旦水服三錢。志男腎精虛竭陰痿能令堅長女子食之有子。食之令人好顏色榨汁塗髮不白。藏蓄臘縮小便取汁同少蜜煎為稀膏點眼治肺熱虛寒。定目明時珍曰覆盆子藥功用大抵相近雖是二物其實一類而二種可混采。附方新陽事不起。覆盆子酒浸焙研為末每者也。

附方一陽事不起。覆盆子酒浸焙研為末每旦酒服三錢。集簡方。

黃氣味微酸鹹平無毒主治擣絞取汁滴目中去膚赤出蟲如絲線。驗明目止淚收濕氣。時珍曰櫟雀元亮海上集驗方治目暗目暗等疾取西國草一名畢楞伽一名覆盆子日曝乾搗細以薄綿裹之用飲男乳汁浸如人行八九里人用點目中即仰卧不過三四日視物如少年禁酒凝油物時珍曰按洪邁夷堅忘云潭州趙太尉母病爛弦疳眼二十年有老嫗云此中有虫吾當除之入山取草蔓葉咀嚼留汁入筒中還以皂紗蒙眼滴汁漬下弦轉盼間虫從紗上出數日下弦。附方新牙疼點眼用覆盆子嫩葉搗汁點目。昔三四乾復如法滴上弦又得虫數十而愈後以治人多驗乃覆盆子葉也蓋治眼妙品。

乾者煎濃汁亦可即擦。摘玄方。曠瘡澁爛覆盆子為末用酸漿水洗後擦大麥毒也。

摘玄方。曠瘡澁爛覆盆子為末。用酸漿水洗後擦一次以愈為度。直指方。

根主治痘後目聾取根洗搗澄粉日乾蜜和少許點於聰丁上旦三三次自散百日内治之久即難療。時珍曰活。

懸鉤子

拾校正

自果部

移入此

釋名

沿鉤子

日詩爾雅

山莓爾

木莓郭璞

樹莓日華藏器曰莖上

刺生江淮林澤間莖上有刺其子如

有刺頗類金櫻四五月結實如覆盆子果之莖蒂而中實味酸覆盆則蒂脫而中虛味甘為異時珍曰懸鉤樹生高四五尺其莖白色有

刺其葉有細齒青色無毛背淡青頗似櫻桃葉而狹長又似地棠花葉四月開小白花結實色紅今人亦通呼為萬子爾雅云荊山

莓也郭璞注云今之木莓也實似蘿莓而大可食並說大明並以此為覆盆誤矣。

氣味酸平無毒主治醒酒止渴除痰去酒毒。驗搗汁服解射工沙蟲

珍

葉主燒研水服主喉中塞

喘

根皮氣味草無毒主治子死腹中不下破血婦人赤帶下久患赤白痢腹痛殺蟲卒下血並濃煮汁飲之

藏器附方二新編

新編

不止 木通根四兩酒一盃煎七分空心溫服

治婦人崩中及下痢日夜數十起欲死者以此入腹即活懸鈎根莖微根枯根拔莫各一斛剉入金中水淹上四五寸煮減三之一去滓取汁煎至可丸九梧子大每溫酒服十九日三

服半

金匱真

蛇莓

別錄名蛇藨音地蘡會鑑編

機曰近地而生故曰地蘡瑞曰蠶老時熟紅於地其中空者為蠶苗中實極紅者為蛇殘苗人不敢之恐有蛇殘也

集角似荳子而不堪啖亦無以此為藥者

保昇曰所在有之生下濕地莖頭三葉花黃子赤儼若覆盆子根似敗醬四月五月采子二月八月采根宗興曰田野道旁處處有之附地生葉如覆盆子但光潔而小微有皺紋黃花比蒺藜花差大春末夏初結紅子如荔枝色機曰蛇莓莖長不盈尺莖端惟結實一顆小而光潔誤食服人非若覆盆苗長大而結實數顆微有黑色也時珍曰此物就地引細蔓節節生根每枝三葉葉有齒刻四五月開小黃花五出結實鮮紅狀似覆盆而面與蒂則不同也其根甚細本草用汁當是取其莖葉並根也仇達碑文訛作蛇繆草言有五葉七葉者又言俗傳食之能殺人

亦不然上發冷涎耳

汁氣味甘酸大寒有毒主治胸腹大熱不止

別錄傷寒大熱及溼毒射工毒甚良景通月經協和腫脹蛇傷明主孩子口噤以汁灌之孟說

傳湯火傷痛即止 時珍附方舊二新一

口中生瘡天行熱甚者蛇莓自然汁半升稍稍噙之傷寒類要

傷寒下蟲

生瘡以蛇莓汁服二合日三服仍水清烏梅令濃入崖蜜飲之

水未服

之并導下部亦可飲汁一二升夏月欲入水先以少未投中流則更無所畏又辟射工家中以器貼水浴身亦宜投少許肘后方

使君子

宋開寶

釋名留求子

志曰俗傳潘州郭使君療小兒多是獨用此物後醫家因號為使君子也

時珍

志曰生交廣等州形如

似訶梨勒而輕硬

曰今嶺南州郡皆有之生山野中及水岸其莖作藤如手指大其葉如兩指頭長二寸三月生花淡紅色久乃深紅

五瓣七八月結子如拇指大長一寸許大類卮子而有五棱其壳青黑色內有仁白色七月采之宗興曰

其仁味如椰子醫家亦用同殼

時珍曰原出海南交趾今閩之紹武蜀之眉州皆栽種之亦易生其藤如葛繞樹而上葉青如玉加紫五月開花一簇

氣味甘溫無

十色紅色輕盈如海棠其實長寸許五瓣合成有核先時半黃老則紫黑其中仁長如榧仁色味如栗久則油黑不可用

利大腸瀉熱痔瘡癰

時珍曰

小便白濁殺蟲療濕痢健脾固除虛熱治小兒百病瘡癰

時珍曰

虫亦異也凡大人小兒有虫病但每月上旬侵晨

空腹食使君子仁數枚或以殼煎湯啜下次日虫皆死而出也或云七生七熒食亦良忌飲熟茶犯之即渴此物味甘氣溫既能殺虫又

益脾胃所以能斂虛熱而止瀉痢為小兒諸病要藥俗醫乃謂殺虫至盡無以消食鄙俚之言也樹有靈屋有蟻國有蓋福耶禍耶修養

者先去二戶

附方

新六小兒脾疳使君子膚食等分為末米

可類推矣

飲每服一錢

儒門事親

小兒痞塊

龍眼大每以一丸用雞子一箇破頭入藥在內飯上蒸熟空心食之

楊起蘭

小兒蛔痛

口流涎未

使君子仁為末米飲

便單方

五更調服一錢

全幼心鑑

小兒虛腫

頭面陰囊俱浮

用使君子一兩去殼五錢

頭瘡

面瘡少許浸三五箇臨

卧時細嚼香油送下

蟲牙疼痛

嗽

集簡方

久而自愈

普濟方

蟲牙疼痛

使君子煎湯頓

木鼈子

宋開

校正

自木部釋名

木蟹

志曰其核似鼈

生苗

志曰出朗州及南中七八月采實

頌曰今湖廣諸州及杭越全岳州皆有之

移人此

春生苗

作藤生葉有五極狀如山藥青色面光

四月生黃花六月結實似桔

櫻而極大生育熟紅黃色肉上有軟刺

每一實有核三四十枚其狀扁而如鼈

八九月采之嶺南人取嫩實及苗葉

作如蒸食宗奭曰木

鼈子蔓歲一枯但根不死春旋生苗葉如蒲荀其子一頭火者為雄凡植時須雌雄相合麻繩定及其生也則去雄者方結實

時珍曰木

鼈核形扁圓研大如圓碁子

其仁青綠色入藥去油者

仁氣味甘溫無毒

時珍曰苦微

主治折傷消結腫瘡生肌止腰痛除熱利小便婦人乳癰

月經腰痛消腫毒

大治疳積瘡塊

利大腸瀉熱痔瘡癰

時珍發明

機曰按劉績霏雪錄云木鼈子有毒不可食剖開有生二子恣食成瘡其父得一方以木鼈子煮豬

食之無忌則其母未應至此或者與猪肉

附方舊一新酒燙脾黃

木鼈子磨醋服一二盞見

利效

劉長春濟急方

脚氣腫痛木鼈子仁每個作兩邊炒過切碎再炒去油盡為度每兩人厚桂

半兩為末熟酒服二錢令醉得

汗愈夢秘授方也 永類方

濕瘡脚腫煩熱空心米飲下服後便伸兩腳如大便行者只喫白粥二三日為妙

楊珙醫方摘要

陰疝偏墜

痛甚者木鼈子一個磨醋調黃藥

末傳之即愈

壽域神方

久瘧有母

木鼈子穿山甲炮等分為末每服三錢空心溫酒下

醫方摘要

腹中痞塊

木鼈子仁五兩用獐豬腰子二副批

日湯下三十丸

醫方集成

小兒痘疾

木鼈子仁使君子仁等分搗泥米飲及芥子大

痘病目蒙不見物用木鼈子仁二錢胡黃連一錢

日湯下五六服

五分米飲下一日二服

孫天仁集效方

痘病目蒙為末米糊丸龍眼大入雞子內蒸熟連

雞子食之為倒睫拳毛

因風入脾經致使風痒不住手擦日久赤爛拳毛入內將木鼈子仁槌爛以絲帛包

補肺藥一方用木鼈子一個雄黃一錢

聖濟錄

小兒固鼻下即吐出癢重者三服效

摘玄方

水漏不止

木鼈仁五個母丁香五個

錢焚之吸煙良久吐涎以茶潤喉如此五六次後服

膏納臍中貼之外以膏藥

作條左患塞右鼻右患塞左鼻其毛自分上下次服蟬蛻藥為妙

孫天仁集效方

疾癒禁口

乘熱敷在病人臍上一時再換半個熱餅其利即止遂思飲食

邵真人經驗方

腸風瀉血

木鼈

護住

吳夾扶毒精方

桑柴燒存性候冷為末每服一錢煨葱

孫用秘寶方用木鼈仁三枚砂盆擂如泥入百沸湯一盃乘熱先薰後洗日用三次仍

白酒空心服之名烏金散

普濟方

月旦疼痛

塗少許瀕湖集簡方用木鼈仁帶潤者雌雄各五個乳細作七丸盃覆濕處勿令乾

每以一丸噙化開貼痔上其痛即止

一夜一丸自消也江夏鐵

丹經年

木鼈仁二個去油研以雞子白和入瓶內

小兒丹瘤

木鼈子仁研如泥醋

調傳之一日三五

是日熱腫木鼈子仁一兩赤小豆大黃各半兩

為風牙腫痛

木鼈子仁磨醋搽之

普濟方

上效

外科精義

是日熱腫木鼈子仁一兩赤小豆大黃各半兩

為風牙腫痛

搽之

番木鼈

綱目釋名馬錢子

木鼈把豆

火尖刻耙都

時珍曰

狀似馬之

蔓生

小於木鼈而色白

被人言治一百二十種病每證各

有湯引或云以豆腐制過用之良或云能毒狗至死

仁氣味蔓無毒主治傷寒咽喉腫痛消瘡塊並含之嚥汁或磨水噙嚥

時珍曰

番木鼈生回國今西土印州諸處皆有之蔓生

新附方

咽喉腫作痛

番木鼈青木香山豆根等分

線頭

風腫番木蓮仁一個木香三分同磨水調熊膽三分胎糸五分以雞毛掃患處取效。唐玷經驗方。海瘡入目苦實杞豆兒研膏納入。治物戶三寸。集聞方。

馬兜鈴

宋開寶

校正

併入唐本草

獨行根

唐本草

都淋藤

附

獨行根

唐本草

利人

微有香氣故有獨行木香之名

嶺南人用治

隱其名為三百兩銀藥

時后方作都淋蓋誤傳也

則頭開四系若囊其中實溥扁似榆莢其根扁而長尺許作葛根氣亦似漢防已

二月八月采根

頤曰馬兜鈴今關中河東河北淮豐浙

州郡皆有之春生苗作蔓繞樹而生葉如山蘿葉而厚大背白六月開黃紫花頗類枸杞花七月結實如大棗狀似鈴作四五瓣其根名

雲南根微似木香大如小指

赤黃色七八月采實暴乾

大明曰無毒志曰有毒

主治鬼疰積聚諸毒熱腫蛇蠍水磨為泥封之三四次立瘥水煮一二兩取

利人微有香氣故有獨行木香之名

嶺南人用治

隱其名為三百兩銀藥

時後方作都淋蓋誤傳也

則頭開四系若囊其中實溥扁似榆莢其根扁而長尺許作葛根氣亦似漢防已

二月八月采根

頤曰馬兜鈴今關中河東河北淮豐浙

州郡皆有之春生苗作蔓繞樹而生葉如山蘿葉而厚大背白六月開黃紫花頗類枸杞花七月結實如大棗狀似鈴作四五瓣其根名

雲南根微似木香大如小指

赤黃色七八月采實暴乾

大明曰無毒志曰有毒

主治鬼疰積聚諸毒熱腫蛇蠍水磨為泥封之三四次立瘥水煮一二兩取

利人微有香氣故有獨行木香之名

嶺南人用治

隱其名為三百兩銀藥

時後方作都淋蓋誤傳也

則頭開四系若囊其中實溥扁似榆莢其根扁而長尺許作葛根氣亦似漢防已

二月八月采根

頤曰馬兜鈴今關中河東河北淮豐浙

州郡皆有之春生苗作蔓繞樹而生葉如山蘿葉而厚大背白六月開黃紫花頗類枸杞花七月結實如大棗狀似鈴作四五瓣其根名

雲南根微似木香大如小指

赤黃色七八月采實暴乾

大明曰無毒志曰有毒

主治鬼疰積聚諸毒熱腫蛇蠍水磨為泥封之三四次立瘥水煮一二兩取

實修治

東屋角畔待乾劈開去革膜取淨子焙用

氣味苦寒無毒

權曰平時珍曰微苦辛寒曰味

厚氣薄陰中微陽入手太陰經

實肺氣上急坐息不得欬逆連連不止

甄二水腫腹大

附方

新二水腫腹大

日服之

千金方

肺氣喘急

馬兜鈴體輕而虛熱則懸而四開有肺之象故能入

散用之非取其補肺乃取其清熱降氣邪去則肺安矣其中所用阿膠糯米則正

附方

舊三水腫腹大

喘急馬兜鈴煎湯

馬兜

補肺之藥也湯劑中用多亦作吐故崔氏方用以吐鹽其不能補肺又可推矣

附方

新二水腫腹大

日服之

千金方

肺氣喘急

馬兜鈴一個燈上存蛇蠍毒飲食中得之咽中如

火

為末每服一錢水一盞煎六分溫呷或噙之

簡要濟衆一切心痛不拘大小男女大馬兜鈴一個燈上存蛇蠍毒飲食中得之咽中如

火

燒存性為末溫酒服立效

摘玄方角蛇蠍毒

有物嚥不下吐不出

心下熱悶

鈴一兩煎水服

即吐出

崔行功纂要方

痔瘻腫痛

以馬兜鈴於瓶中燒烟

熏病處良

日華本草

獨行根

氣味辛苦冷有毒

主治鬼疰積聚諸毒熱腫蛇蠍水磨為泥封之三四次立瘥水煮一二兩取

大明曰無毒志曰有毒

汁服吐蠭毒又搗末水調金丁腫大效

唐本治血氣

有利大腸治頭風癢痒秃瘡

時珍

附方

舊一

新四

五種蠭

附后方云席辟刺史言嶺南

食胸背漸脹先寒似瘴用郁

淋藤十兩水一斗酒二升煎三升分三服毒逐小便出十日慎食毒物不瘥更服

土人呼為三百兩銀藥

又支太醫云

燒鈴根一兩為末水煎頓服當吐蠭出未盡再服或為末水調服亦驗

中草鹽毒

此術在西良之

此毒入咽欲死者用燒鈴苗一兩為末溫

馬燒鈴藤數精草荆三枝川烏頭炒過三

水調服一錢即消化蠭出袖效

聖惠方

馬燒鈴根搗爛用蜘蛛網

水調服一錢即消化蠭出袖效

聖惠方

馬燒鈴根搗爛用蜘蛛網

水調服一錢即消化蠭出袖效

聖惠方

馬燒鈴根搗爛用蜘蛛網

水調服一錢即消化蠭出袖效

聖惠方

檳榔子

宋開寶

自木部

移入此

名象豆

寶華

象形故名之

其殼用貼丹藥經年不壞取其中仁入藥又用時珍白子紫黑

色微光大一二寸圓而扁人多剔去肉作藥舐垂於腰間也

校正

自木部

移入此

名象豆

寶華

象形故名之

其殼用貼丹藥經年不壞取其中仁入藥又用時珍白子紫黑

色微光大一二寸圓而扁人多剔去肉作藥舐垂於腰間也

校正

自木部

移入此

名象豆

寶華

象形故名之

仁氣味滌甘平無毒主治五痔蠭毒飛尸喉痙以仁為粉微熬水服一二七亦和大豆湯面去點黑器

治小兒脫肛血痢漏血並燒灰

服或一枚剗點研空腹熱酒服二錢不過三服必效

開諸蠭毒

時珍

附方

舊一

喉腫痛

一錢

聖惠方

燒存性

米飲服二錢有

腸風下血

華陀中藏經用

燒存性為末每服二錢溫酒下少頃再飲酒一盞趁口服

功

履氏衍義

聖惠方用檳榔子三枚厚者濕紙七重包煨熟去殼取肉為末每服一錢食前黃芪湯下日一服

附錄拿草

拾遺藏器曰

子及葉有小毒主蠭毒及蛇咬搗傅

附錄拿草

瘡上蔓生岸旁葉大花白子中有兩片如合子

預知子

宋開寶

釋名

聖知子

日華

聖亮子

日華

聖拿子

日華

仙沼子

日華

聖知子

有聲當預知之故有諸名

時珍曰

仙沼疑是仙茅之說

集解皮松其實如皂

莢子

頃不著所出州土今淮蜀黔壁諸州皆有之作蔓生依大木上葉綠有三角面深背淺七月八月有實作房生青熟者四面皆

深紅色每房有子五七枚如鬼芥子班褐色光潤如飛蛾今蜀人極貴重之云亦難得果無時其根冬月采之陰乾治蠭其功勝於子也

山民自薦
聖無憂

子仁氣味苦寒無毒

大明曰溫雙
仁者可帶

王治殺蟲療蟲治毒去皮研服有效

開寶

治一切風癆五勞七傷其功不可備述治痘瘡塊消

宿食止煩悶利小便催筆惡失音髮落天行溫疾

大明附方新
預知丸

一切病每曰吞二七粒不過三十粒永瘥

太醫方

治心氣不足精神恍惚語言錯忘忪憊憂愁慘懨喜怒多恐健忘少睡夜多異夢寤即驚蹶或發狂躁暴不知人並宜服此預知子

去皮白茯苓枸杞子石菖蒲伏神柏子仁人參地骨皮遠志山藥黃精熟朱砂水飛等分爲末煉蜜丸芡子大每嚼一丸入參湯下

和劑局方

耳聾聾聞八九月取石榴開一孔留蓋入米醋滿中蓋定麵裹燒火中煨熟取出入少

瘡瘍耳許仙沿子黑李子末取水滴耳中腦痛勿驚如此二夜又點一耳聖惠方

一斗銀鑄黃至五升入二末熬成膏瓶盛之每服

一匙溫酒調下有虫如尾隨大便而出

聖惠方

根氣味苦冷無毒主治蟲蠭石臼搗飾每用三錢浸水服

蘇頌

牽牛子

別錄
下品

名黑丑

綱目

草金鈴炮炙

盆蘿草

綱目
秋片

景曰牽牛作藤生花狀如扁豆黃色子作小房實黑色形如樣子核長

并形似象鼻形段成式酉
角亦不似扁豆頌曰處處有之二月種子三月生苗作藤蔓緣籬牆高者或二三丈其葉青有三尖角七月生花微紅帶碧色似鼓子花而大八月結實外有白皮裏作球每球內有子四五枚大如蕎麥有三棱有黑白二種九月後收之宗興

陽雜俎云盆蘿草蔓如薯蕷集子引景曰牽牛作藤生花狀如扁豆黃色子作小房實黑色形如樣子核長

并形似象鼻形段成式酉
角亦不似扁豆頌曰處處有之二月種子三月生苗作藤蔓緣籬牆高者或二三丈其葉青有三尖角七月生花微紅帶碧色似鼓子花而大八月結實外有白皮裏作球每球內有子四五枚大如蕎麥有三棱有黑白二種九月後收之宗興

曰花朵如鼓子花但碧色日出開日西萎其核如木猴梨子而色黑謂子似蕃麥非也時珍曰牽牛有黑白二種黑者處處野生尤多其

蔓有白毛斷之有白汁葉有三尖如楓葉花不作辦如旋花而大其實有蒂葉之生青枯白其核與棠棣子核一樣但色淺黑爾白者人多種之其蔓微紅無毛有刺刺斷之有濃汁葉圓有斜尖並如山藥莖葉其花小於黑牽牛花淺碧帶紅色其實蒂長寸許生青枯白其

核白色稍粗人亦采嫩實蒸熟為果食呼為天茄因其蒂似茄也

子修治

數回凡采得子晒乾水淘去浮者再晒拌酒蒸後已至未晒乾收之臨用

氣味苦寒有毒

惟曰甘有小毒說曰多食稍冷易曰辛熱雄烈泄人元氣天明曰味最得

青木香
乾薑良

王淳下氣療脚滿水腫除風毒利小便別錄

治療癰氣塊利大小便除虛腫落胎驅臤腰痛下冷膿濕蠱藥并一切氣壅帶大口

山茱萸服去水病孟

除氣分濕熱三焦壅結逐痰消飲通大腸無祕風祕殺蟲達命

時珍曰久服亦行脾胃氣故也好古曰牽牛

以氣藥引則入氣以大黃引則入血利大腸下水積色白者濁氣分濕熱上攻喘滿破血中之氣震亨曰牽牛屬火善走里者屬水白者屬金若非病形與證俱實不脹滿不大便祕者不可輕用驅逐致虛先哲深戒果曰牽牛非神農藥也名醫續注云味苦寒能除濕氣利小便治下注脚氣此說氣味主治俱誤矣何也凡用牽牛少則動大使多則泄下如水乃瀉氣之藥其味辛竦久嚼猛烈雄壯所謂苦寒

安在哉夫漏者水之別稱有形者也若肺先受濕氣不得施化致大小便不通則宜用之蓋牽牛感南方熱火之化所生火能平金而泄肺濕去則氣得周流所謂五臟有邪更相平也今不問有濕無濕但傷食或有熱證俱用牽牛冠化之藥豈不誤哉况牽牛止能泄氣中之濕然不能除血中之濕執氣從下受之下焦主血血中之濕宜苦寒之味反以辛藥泄之傷人元氣且牽牛辛烈比之諸辛藥泄氣尤甚其傷人必矣經云辛泄氣辛走氣辛泄肺氣病者無多食辛況飲食失節勞役所傷是胃氣不行心火乘之腸胃受火邪名曰熱中脾胃主血當血中泄火以黃芩之苦寒泄火當歸身之辛溫和血主地黃之苦寒涼血益血少加紅花之辛溫以泄血絡桃仁之辛溫除燥潤腸仍不可專用須於補中益氣泄陰火之藥內加而用之何則上焦元氣已自虛弱若反用牽牛大辛熱氣味俱陽之藥以泄水泄元氣利其小便竭其津液是謂重虛重則必死輕則夭人故張文懿云牽牛不可取嗜脫人元氣見人有酒食病者多服牽牛丸散取快一時樂過仍痞隨服隨效後復痞以致久服脫人元氣猶不知悔也張仲景治七種濕熱小便不利無一藥犯牽牛者仲景豈不知執此而論蓋矯枉過中矣牽牛治水氣在脾喘滿腹脹重及大腸風祕氣祕卓有殊功但病在血分及脾胃虛弱而痞滿者則不可取快一時及常服暗傷元氣也一宗室大人年幾六十平生苦腸結病旬日一行甚於生產服養血潤燥藥則泥膈不快服消黃通利藥則若罔知如此三十餘年矣時珍貽其人體肥膏梁而多憂鬱曰吐酸痰益許乃寃又多火病此乃三焦之氣壅滯有升無降津液皆化為痰飲不能下滋腸腑非血燥比也潤劑留滯消黃挾入血分不能通氣俱為痰阻故無效也乃用牽牛末早煎膏丸與服

草部

本草綱目

卷十八上

七

即使通利自是但覺腸結一服就順亦不妨食且復精糲善牽牛能走氣分通三焦氣順則緩逐飲消上下通快矣外甥柳喬素多酒色病下極脹痛二便不通不能坐卧立哭呻吟者七晝夜醫用通利藥不效遣人叩子予思此乃濕熱之邪在精道壅脹隧路病在二陰之間故前阻小便後阻大便病不在大腸膀胱也乃用棟實茴香穿山甲諸藥入牽牛加倍水煎服一服而減三服而平牽牛能達右腎命門走精隧人所不知惟東垣李明之知之故明之治下焦陽虛天真丹用牽牛以鹽水炒黑入佐沈香杜仲破故紙官桂諸藥得補瀉兼施之妙方見醫學發明又東垣治脾濕太過通身浮腫喘不得卧腹如_{附方}舊八新搜風通滯風氣所攻臟腑積滯用牽牛子以童尿鼓海金沙散亦以牽牛為君則東垣未盡棄牽牛不用但貴施之得道耳

_{三十} 搜風通滯風氣所攻臟腑積滯用牽牛子以童尿洗半日生絹袋盛掛風處令乾每日鹽湯下三十粒極能搜風亦消虛腫久服令人體清瘦

斗門方

三焦壅塞

英酥火二兩為末生薑自然汁煮糊

凡梧子大每服二十九荆芥湯下

王袞博濟

五般積氣成聚用黑牽牛一斤生搗末

一錢搗丸梧子大每服一二十九白湯下名順氣丸

普濟方

男婦五積八兩餘滓以新瓦炒香再搗取四兩搗

蜜丸梧子大至重者三十五凡陳橘皮生薑煎湯卧時服半夜未動

胸膈食積牽牛末一兩巴豆霜三個研末水九倍子大

氣壅衝可

再服三十九當下積聚之物尋常行氣每服十九甚妙

博濟方

腹痛每服二三十九食後隨所傷湯下儒門事親

氣壅衝可

忍牛即凡用黑牽牛半兩炒櫛榔二錢半為末每服一錢紫蘇湯下

普濟方追蟲取積方同上用酒川椒五十粒擦牽牛末入內扎定紙包煨熟空心食之酒下取

出惡物效楊傷寒結胸心腹硬痛用牽牛末一錢白便不通簡要方用牽牛子半生半熟為末每服二錢薑湯下未通

仁齋直指方

大腸風秘

結潘牽牛子微炒搗頭末一兩桃仁去皮尖炒半兩為末熟蜜丸梧子大每湯服三十九

履氏衍義

水壅脹滿

白牽牛黑牽牛各取頭末二錢大麵麥四兩和作燒

諸水飲病張子和云

餅卧時烙熟食之以茶下降氣為驗

河間宣明方諸水之人

如長川泛溢非盃杓可取必以神禹決水之法治之故名禹功散用黑牽牛頭末四

兩茴香一兩炒為末每服一二錢以生薑自然汁調下當轉下氣也

儒門事親

陰水陽水

黑牽牛頭末三兩大黃末三兩陳米飯鍋

湯下欲利服百

牽牛末每服方寸匕以烏牛尿浸一宿平日

腎濕腫滿方見海

金沙下

水氣浮腫

坐卧不得用牽牛子二兩微炒搗末以烏牛尿浸一宿平日

腎濕腫滿

未每服二錢薑湯下或臨時水丸每東湯五十九

薑湯下取小便利乃止亦可吞之其子黑

金散方

入葱白一握煎十餘沸空心分二服水從小便中出聖惠方

腎濕腫滿

金散方

水腫小便利為度千金方濕氣中滿足脰微腫小便不利氣急欬嗽黑牽牛末一兩厚朴制半兩為水腫

丸醫方捷徑水腫小便利為度千金方濕氣中滿足脰微腫小便不利氣急欬嗽黑牽牛末一兩厚朴制半兩為水腫

入葱白一握煎十餘沸空心分二服水從小便中出聖惠方腎濕腫滿金散方

水腫脚氣捻之沒指者牽牛子搗末蜜丸小豆大每服七

丸水氣浮腫

坐卧不得用牽牛子二兩微炒搗末以烏牛尿浸一宿平日

腎濕腫滿方見海

金沙下

水氣浮腫

色正如林小兒腫病 大便不利黑牽牛白牽牛各二兩炒取頭末并華水 水氣流腫膀胱實熱小便赤澑牽牛生研一錢

核 肺后方 小兒腫病和丸綠豆大每服二十丸蘿蔔子煎湯下 圣濟總錄

鄭氏小兒

兒膚氣浮腫 常服自消黑牽牛半生半炒取末陳皮青皮等分為末糊丸綠豆大每服三歲兒服二十九米湯下 鄭氏小兒方

小兒壅腫 常服自消黑牽牛半生半炒取末陳皮青皮等分為末糊丸綠豆大每服五

小兒壅腫 常服自消黑牽牛半生半炒取末以急白煮研丸綠豆大每服五

面癱 面上粉刺脂藥中日日洗之 聖惠方

摘玄方 摘玄方面上粉刺脂藥中日日洗之 聖惠方

面癱 面上粉刺脂藥中日日洗之 聖惠方

別錄曰旋花生豫州平澤五月采陰乾保昇曰此旋蕷花也所在川澤皆有蔓生葉似薯蕷而狹長花紅色根無毛節卷實堪啖味甘美名筋根二月八月根曰乾宗奧曰今河北汴西開陝田野中甚多最難鋤父治之又生四五月開花其根寸截置土灌漑旬苗生轉保昇說是矣時珍曰旋花田野壅莖皆生逐節蔓延葉如濃菜葉而小至秋開花白如牽牛之花粉紅色亦有千葉者其根白色大如筋不結子頌曰江南施州出一種旋花粗莖大葉無花不作蔓恐別是一物也

為山蠻南人呼為美草根似杜若亦似高良薑腹中冷痛煮服甚效作丸散服辟穀止飢近有人從江南遂用此術與人斷穀皆得半百日不飢不瘦但走淺嗜深不能久服爾其葉似薑花赤色味辛狀如荳蔻此旋花即其花也今山東甚多又註旋覆花曰別有旋蕷根出河南來北國亦有形似苦蕷惟合旋蕷通用之餘無所入○林曰旋花乃旋蕷花也陶說乃山薑爾山薑味辛都非此類又因旋覆化名金沸遂作此花別名皆誤矣又云從北國來者根似苦蕷與高良薑全無彷彿亦誤也

時珍曰花根莖葉並甘滑微苦能制確黃王治面酐黑色偏好蕷氣根主腹中寒熱邪氣本利小便久服不飢輕身續筋骨合金瘡別錄揭汁服主丹毒熱瘍

氣味花甘根辛溫無毒

攀蘋益精氣珍發月時珍曰凡藤蔓之屬象人之筋所以多治筋病旋花根細如筋可咬故別錄言其久服不飢附方新一被研斷筋當

根搗汁淹瘡中仍以滓傅之日三易半月即斷筋處必精益盡太乙金鎖丹用五色龍骨五兩研盆子五兩蓮花蕊四兩未開者陰乾敷便續此方出蘇景中療效有斂者王壽外臺秘要祐精益體子花三兩五月五日采之雞頭子仁一百顆並為末以金櫻子二百枚去毛木臼搗爛水七升煎濃汁一升去渣和藥杵二十下凡梧子大癰空心溫茲湯下三十丸服之至百日永不泄如要泄以冷水調車前末半合服之忌葵菜蔭謙齋瑞竹堂方

紫葳本經中品校正白木部移入此釋名凌霄恭陵苔本武威吳普醫普經時珍女蕊瞿華本武威吳普醫普鬼臼吳氏時珍曰俗謂赤艷曰紫葳藏此花正誤景

旦是瞿麥根方用至少博物志云郝晦行太行山北得紫葳華必當奇異今瞿麥處處有之不應乃在太行山恭曰紫葳瞿麥皆本經藥體性既乖生處亦不相間爾雅云苦一名陵苔郭璞注云一名陵苔一名陵時又名凌霄此為真也頌曰孔穎達詩疏亦云苦一名陵時今本草無陵時之名惟鼠尾草有之豈所傳不同抑陶諺之誤耶時珍曰按吳氏本草紫葳集角別錄曰紫葳生西海川谷及山陽恭曰此凌霄花一名瞿陵陶弘景誤作瞿麥字爾鼠尾止名陵翹無陵時蘇頌亦誤矣並正之

苦黃華葉白華爰山中亦有白花者頌曰今處處皆有多生山中人家園圃亦或栽之初作蔓生依大木久延至頭其花黃亦中乃盛今醫家多采花乾之入女科藥用時珍曰凌霄野生蔓縫數尺得木而上即高數丈年久者藤大如杯春初生枝一枝數葉葉火長有齒深

赤色自夏至秋開花一枝十餘朵大如牽牛花而頭開五瓣黃色有細點秋深更赤八月

結莢如豆莢長三寸許其子輕薄如榆仁馬兜鈴其根長亦如兜鈴根狀秋後葉之陰乾

花 根氣味酸微寒無毒

普曰神農雷公岐伯辛扁鵲苦鹹黃帝甘無毒權曰畏曲
誠時珍曰花不可近鼻聞傷腦花上露入目令人昏暎

王氏婦人產乳餘癰

中癰疽血門寒熱羸瘦養胎

本產後 血不定淋瀝主熱風風痛大小便不利腸中結實 數酒難熟 風利風婦人血膈避風崩中帶下

明時珍曰

大經

莖葉氣味 苣無毒主治瘧疾 別錄

明時珍曰

大經

莖葉氣味 苣無毒主治瘧疾 別錄

明時珍曰

大經

而寒莖葉帶苦手足厥陰經藥也 行血分能去血

附方

大經

中伏火故主產乳崩漏諸疾及血熱生風之證也 普二新婦人血崩

凌霄花為末每酒服二錢

大經

凌霄花一兩搗碎水一盞半 聖濟錄

凌霄花為末每酒服二錢

大經

煎一盞分二服 聖濟錄

凌霄花為末每酒服二錢

大經

普濟久近風癆 凌霄花或根葉為末每服三錢溫酒下服單解髮不住手梳口噙冷水溫則吐

醫學正傳

大風癆疾

方 去再噙再梳至二十口乃止如此四十九日絕根百無所忌○方驗奇效方

醫學正傳

大風癆疾

家珍用凌霄花五錢地龍焙鹽炒全炒各七箇為末每服二錢溫酒下

醫學正傳

大風癆疾

楊氏家藏方用凌霄花半兩硫黃一

醫學正傳

大風癆疾

兩胡桃四箇膩粉一錢研膏生絹包楷 聖濟錄

醫學正傳

大風癆疾

摘

玄方 **莖葉** **瓣** **閉** 凌霄葉杵取自然汁滴之

徐氏胎產方

營實牆蘚

音眉

本草名 营實別錄山棘錄牛棘經牛勒錄刺牛棘食之故有山刺牛勒諸名其子成簇而生如營莖然故謂之營

醫學正傳

大風癆疾

實集解 別錄曰營實生零陵川谷及蜀郡八月九月采陰乾引景曰營實即蕘微子也以白花者為良莖葉可煮作飯其根亦可煮釀酒

醫學正傳

大風癆疾

去皮刺食之既長則成叢似蔓而莖硬多刺小葉尖薄有細齒四五月開化四出黃心有白色粉紅二者結子成簇生青熟紅其核有白毛如金櫻子核八月采之根莖無時人家栽玩者莖細葉大延長數丈花亦厚大有白黃紅紫數色花最大者名佛兒笑小者名木香皆香艷可人不入藥用南番有薑薇露云是此花之露水香濃莖帶

營實氣味酸溫無毒

別錄微寒

主治癰疽惡瘡瘍肉跌筋敗瘡熱氣陰蝕不瘳利關節

本久服輕身益氣別錄治上焦有熱好眠時附方

新眼熱昏暗

營實枯杞子地膚子各一兩為末每服三錢溫酒下

聖惠方

根氣味苦澀冷無毒主治止洩痢腹痛五臟客熱除邪逆氣疽癰諸惡瘡金瘡傷撻生肉復肌

別錄

風除邪氣止赤白痢腸風瀉血通結血治牙齦痛小兒疳蟲肚痛癰疽瘧大頭瘡

甄明

頭瘡先

甄珍

風熱濕熱縮小便止消渴

時珍

除風熱濕熱能入陽明經除

方常用而滻利消渴遺尿好瞑亦當陽明病也附方新五消渴尿多

日服之

舊大消渴元

甄珍

除蟲故癰疽瘡瘍古方

瘤

頻數用生薑薇根洗切煎濃汁細飲以愈為度

千金方小便失禁

薑薇根黃汁飲或為末酒服之野生白花者更良

聖惠方

少小尿床夜飲外台秘要小兒

瘡三年已上不瘡

小兒月蝕

薑薇根四兩地榆二錢為末先以鹽湯洗過傳之全幼心鑑

瘡腫更炎熨之千金方筋骨盡痛

薑薇根白皮洗三斤水酒十斤煮

一炷香每日任飲以愈為度○鄧肇峰雜興方用刺薑薇根三

錢五加皮木瓜當歸茯苓各二錢以酒二盞煎一盞日服一次

金瘡痛

薑薇根燒灰每白湯服方抱朴子箭刺入內膿窠不出以薑薇根末擦

也外外瘡更不出薑薇根末水服方

台祕要

寸七日三

同上

葉主治下瘡瘍研洗傅之黃花者更良

楊生

月季花

綱目釋名

月月紅見勝春。瘦萼鬱雪紅葉角葉小於薔薇而花深紅千葉厚瓣逐月開放不結子也。

氣味甘溫無毒主治

溢消腫傳毒

時珍曰新附方

一癰癰未破用月季花頭二錢沉香五錢光花炒三錢碎剉入大鯽魚腹中就以魚腸封固酒水各一盞煮熟食之即愈或須安裏水內遊死者方効此是家傳古活人多矣。

談禁翁試驗方

桔樓

本經校正

併入圖經釋名果蓏音小婆

綱目

天瓜別錄黃瓜錄地樓經澤姑別錄根名白藥

圖經

天花粉

圖經

上曰果地下曰蓏此物生

附木故得兼名詩云果蓏之實亦施於宇是矣桔樓即果蓏二字音轉也亦作蓏蓏後人又轉為瓜蔓愈轉愈失其真矣古者小姑同音故有澤姑之名齊人謂之天瓜象形也雷數炮炙論以圓者為桔長者為樓亦出牽強但分雌雄也可其根作粉潔白如雪故謂之天花

粉蘇頌圖經重出天

集解

別錄曰桔樓生於農谷及山陰地根入土深者良生齒地者有毒二月八月采根暴乾二十日成弘景曰出

花粉誤矣今削之

集解

近道藤生狀如土瓜而葉有入人土六七尺大二三圓者服食亦用之實入摩膏用苯曰出陝州者白實最佳

頌曰所在有之三四月生苗引藤蔓葉如甜瓜葉而窄作人有細毛七月開花似牽牛花淺黃色結實在花下大如拳生青至九月熟赤

黃色其形有正圓者有銳而長者功用皆同根亦名白藥皮黃肉白時珍曰其根直下生年久者長數尺秋後掘者結實有粉夏月掘者

扁子大如絲瓜子殼色褐仁色綠多脂作煎氣炒乾搗爛水熬取油可點燈

實修治

藏器曰

凡使皮莖根其效各別其桔圓黃皮厚蒂小樓則形長赤皮帶粗陰人服樓陽人服桔並去殼皮

甘不主治

華氏

肺潤肺燥降火治嗽嗽滯痰結利咽喉止渴利大腸消癰腫瘍

時珍曰

子炒用梢處劈口乾潤心肺治吐血腸

風濕血赤白痢手面皰

太醫曰

食亨曰桔樓質治胸痹以其味甘能補肺潤能降氣胸中有痰者乃肺受火逼失其降下之令

時珍曰張仲景治胸痹痛引心背放睡喘息結構滿痛皆用桔樓實乃取其甘寒不犯胃氣能降火

附方

新八上焦之火使痰氣下降也成無已不知此意乃云苦寒以瀉熱蓋不嘗其味原不苦而隨文傳會爾

文略七分為

未以薑汁澄濃脚丸彈

熟瓜姜搗爛絞汁入蜜等分加白薑

末大噙之○摘玄方一錢熟膏頓含嚥汁楊起瘧便方效嗽有痰熟瓜姜十箇明礬二兩搗和餅陰乾研末糊

醫方摘要

療喘氣急

蘇軾二箇明礬一大棗同燒存性研末

以熟蘿蔔蘸食藥盡病除
普濟方 热欬不止 用濃茶湯一鍾蜜一鍾大熟瓜蔓一箇去皮搗入茶湯洗去肺熱痰熱胸膈塞滿

半夏湯泡七次焙研各一兩薑汁打麪糊丸梧子大每服五十丸食後薑湯下

嚴用和濟生方 肺癰發血不止用枯櫻五十箇連剝丸焙烏梅肉五十箇焙杏仁去皮炒二十一箇

錢酒痰嗽用此救肺瓜蔓仁青黛等分研末薑汁蜜丸大每丸梧子大每噙一丸 丹溪心法

月經不調用一捻以猪肺一片切薄捲末入內炙熟冷嚼喫之日二服
聖濟

炮炒半兩為末每服二錢 用葱白湯下
聖惠方

小兒瘧疾效嗽隔熱久不瘥小薑實一枚去子為末以寒食麵和作餅子炙熟夜熱瘧吸月經不調形瘦者

附童尿浸晒一兩五錢為末
黃再研末每服一錢溫水化下日三服效乃止

劉河間宣明方婦人夜熱瘧治效嗽用肥大枯櫻洗取子切焙半夏四十九箇湯洗十次焙一兩研末香

蜜調喻化之丹溪心法 胸痛徹背心腹痞滿氣不得通及治療嗽大瓜蔓去瓢取子炒熟

胸中疼痛守脈沈遲關上翳數用大枯櫻實一枚切薤白半斤以白酒七斤浸二升分再服加半夏四兩更善
仲景金匱方清痰利膈洗枯櫻水并瓠同煮成膏和丸梧子大每薑湯下五三十丸良
楊文蔚方

中風渴余熨之正使止勿令太過
聖惠方

熱病頭痛用熟湯一盞沐之蓋定良久去滓服
聖惠方

波水九合浸淘取汁入蜜半合朴消八分

分盡分再服便瘥
蘇頌圖經本草

小兒黃疸眼黃脾熱用青瓜蔓焙研每服一錢水半盞煎七分酒黃疸疾上

小便不通腹胀用瓜蔓燒灰少許水煎服

研每服二錢熟酒下頻服以通大度紹興劉駐云

消渴煩渴黃枯櫻一箇酒一盞洗去皮子取瓤煎成膏入白

米飲服日再服
聖惠錄

米飲服日再服

魏明府病此御醫用此方治之得效
聖惠方

吐血不止枯櫻泥固煅存性研三錢糯糲

大熟

葛粉銀石器中慢火炒熟為末食後夜

卧各以沸湯點服二錢
寇宗義衍行義

吐血不止
米飲服日再服
聖惠錄

米飲服日再服

一箇煅存性出火毒為末作一服溫酒服之胡大卿

一僕患痢半年杭州一道人傳此方而愈
本事方

大腸脫肛手接之令暖自入
葛洪肘后方

大腸脫肛昏瘡啼哭黃瓜蔓一箇入白

薯五錢在內固濟煅存性為末糊丸梧子大每米飲下二十丸
摘玄方

牙齒疼痛
荆柴根葱根煎湯漱之危氏得效方

咽喉腫痛草炒各二錢半為末每服三錢半薑湯下

或以綿裹半錢含喫一日二

堅齒齧

大枯樓一箇開頂入青鹽二兩杏仁去皮尖三七粒原頂合扎定蚯蚓泥和鹽固滲炭火煅存性

研末每日揩牙三次令熱口有驗如先有白鬚拔去以藥投之即生黑者其治口齒之功未易

服名發聲散

御藥院方

具陳

普濟方

靈丹白

枯樓斷三兩杏仁一兩桔梗一具同研如膏

每夜塗之令人光潤冬月不皴

聖濟錄

胞衣不下

枯樓實一箇取子細研以酒與童子小便各半盞

瓜子淘洗控乾炒香瓦上噙令白色酒服一

斗量取四

諸難發

初發

大熟枯樓一枚熟搗以白酒一斗量取四

諸難發

初起微赤枯樓搗末井華

錢七合面卧一夜流出

姚僧坦集驗方

孕癆初發

升去滓溫服一升日三服

子母秘錄

初發

黃瓜蔓一箇黃連五錢水煎

風瘡外

生枯樓一二箇打碎酒浸一

熱遊丹腫

枯樓子仁末二大兩醋

楊木梅瘡

瘡者先服敗毒散

梅師方

便毒

後用此解皮膚風熱不過十服即愈用枯樓

皮為末每服三錢燒酒下日三服

集驗方

周憲王曰秋冬采根去皮寸切水浸逐日換水

根條治天花粉

四五日取出搗泥以絹衣濾汁澄粉晒乾用

滿太熱補虛安中續絕傷本除腸胃中痼熱八瘕身面黃唇乾口燥短氣止小便利通月水

經別治熱狂時疾通小腸消腫毒乳癰發背痔

瘻瘍排膿生肌長肉消瘡損瘀血

大發月恭曰用根作粉潔白美好食之大宜虛熱人氣曰枯樓根純陰解煩渴行津液心中枯酒者

明發曰非此不能除與辛酸同用導腫氣成無已曰津液不足則為渴枯樓根味苦微寒潤枯燥而

通行津液是為渴所宜也詳珍曰枯樓根味甘微苦酸其葉味酸酸能生津

附方

舊十二消渴飲水

千金方作粉法取大枯樓根去皮

研濾過澄粉晒乾每服方寸匕水化下日三服亦可入粥及乳酪中食之

○外臺秘要用生枯樓根三十斤以水一石煮取一斗半去滓以牛脂五合煎至水盡用燒酒先食服如雞子大日三服最妙○聖惠方

用枯樓根黃連三兩為末蜜丸梧子大每服三十丸日二服○又玉壘

傷寒煩渴

思飲枯樓根三兩水五升煮一升分二服先以淡竹湯

丸用枯樓根人參等分為末蜜丸梧子大每服三十丸麥門冬湯下

楊起簡便方

小兒發黃

皮肉面目皆黃用生枯樓根搗取汁

二合蜜二大匙和勻暖服日一服

傳夏令病渴

枯樓根牡蠣熬等分為散

飲服方寸匕

永類方

黑瘡危疾

瓜蔓根一斤搗汁六合頓服隨有黃水

小兒發黃

皮肉面目皆黃

用生枯樓根搗取汁

外臺

卷之六

第十九

本草綱目

卷之六

第十八

上

草部

十一

廣利小兒熱病

壯熱頭痛用枯櫻根末乳汁調服半錢聖惠方

虛熱咳嗽

天花粉一兩人參三錢為末用絲袋包暖水袋取天花粉五錢每服一錢米湯下

集腋方偏心痛極以醇酒一盞浸之自卯至午微煎滾露一夜

次早低凳坐定兩手按膝飲下

小兒囊腫

天花粉一兩火甘草一錢半水煎入酒服全功心鑑

耳卒烘烘

枯櫻根削大以臘猪脂煎三沸取塞耳內三日即愈

煮汁如常釀酒人

產後吹乳

腫硬疼痛則為奶乳重則為乳癰用枯櫻根末一錢香一錢為末溫酒每服二錢李仲南永類方

乳汁不下

枯櫻根燒存性研末飲服方寸七粒腫初起或以五錢酒水煎服楊氏產乳方

益說食澄用枯櫻根苦酒熬燉搗篩以苦酒和蜜紙上貼

天泡癰瘡

天花粉滑石等分為末楊梅天泡

天花粉川芎各四兩槐花一兩水調搽之普濟方為末米糊丸梧子大每空心淡羹

湯下七八十九克傷腫痛

枯櫻根搗塗重布裹之效

折傷腫痛

枯櫻根搗塗重布裹之效葛洪肘后方

黃金不出

枯櫻根搗傳之日三易咸利入肉上

除痛即止葛洪肘后方

周密齊東野語

在內米泔汁煮熟切食次女病此

服之自餘而愈

周密齊東野語

莖葉氣味酸寒無毒主涼熱傷暑

錄別

王瓜

本經

釋名

王瓜

本經鉤輒

郭璞注

老鵠爪

郭璞注

馬腿瓜

爬音

赤瓈

行野甜瓜

綱目

師姑草

宿

公龜

頌

目

呼為

老鵠爪

亦曰

老鵠

雅云

老鵠爪

宿

公龜

呼為

老鵠

郭璞注云似土瓜而土瓜自謂之葵姑又名鉤蘿則老鵠爪別是一物也又曰蕘菲亦謂之土瓜別是一物非此土瓜也異類同名甚多不可不辨時珍曰土瓜其根作土氣其實似瓜也或云根味如瓜故名土瓜王字不知何義瓜似蕘子熟則色赤鵠喜食之故俗名亦蕘

鵠爪一葉之下一歧故俚人呼為公龜

別錄曰

生魯地平澤田野及人家垣牆間

三月采根陰乾

景曰

今土瓜生離院閭子熟時赤

公龜與地黃苗名婆婆奶可為羹對角如彈丸其根不入大方正單行小小爾鄭玄注月令四月王瓜生以為援羹殊謬矣

矣

公龜

殊

矣

公龜

生苗延蔓葉似枯櫻葉但無人缺有毛刺五月開黃花花下結子如彈丸生青熟赤根似葛而細多繆謂之土瓜根北間者其子葉葉相連大如東皮黃肉白苗子相似根狀不同若療黃疸破血南者大勝也

示曉曰王瓜其根徑寸長二十許上微圓下尖長七八月熟紅赤

色根中子如螳螂頭者今人又謂之赤蕘子其根即土瓜根也

於細根上又生淡黃根三五相連如大指許根與子兩用時珍曰王瓜三

月生赤蕘多嬌嫩時可茹其葉圓如馬蹄而有尖面青背淡澁而不光六七月開五出小黃花成簇結子纏繫熟時有紅黃二色皮亦

粗濶根不似葛但如桔梗根之小者搗粉甚白臘煩深滋二
三尺乃得正根江西人栽之沃土取根作蔬食味如山藥

根氣味苦寒無毒 權曰平藏器曰有小毒主治消渴內痔瘻血月閉寒熱酸瘞益氣愈聲

本療諸邪氣熱結鼠瘻散癰腫留血婦人帶

下不通乳汁止小便數不禁逐四肢骨節中水治馬骨刺人瘡

錄別天行熱疾酒黃病壯熱心煩肺熱勞排腹消撲搗瘀血破癰瘻落胎

大主蠭毒小兒門癱瘻漏瘻瘻并取根及葉搗汁少服當吐下

藏器利大小便治面黑面瘻

時附方舊五珍附方新七小兒發黃土瓜根生搗汁三合與服不過三次愈

蘇頌黃連變黑醫所不能治用土瓜根汁平旦溫服一

小便如泔乃暗虛也王瓜散用王瓜根一兩白石脂二兩光絲子酒浸二兩

圓經小升午刻黃水當從小便出不出再服桂心一兩牡蠣粉一兩為末每服二錢大麥粥飲下衛生寶鑑

不通土瓜根搗汁入少水解之

大便不通上方吹入肛門內二便不通

帶下土瓜根為末酒服一錢一經水不利帶下少腹滿或經

不通筒吹入下部肘后方

前後吹之取通

肘后方土瓜根搗傳媒

根散主之土瓜根芍藥桂枝蘆虫各三兩婦人陰癩方同

為末酒服方寸七日三服

仲景金匱方婦人陰癩上

一切漏疾土瓜根搗傳媒

中諸蠭毒

土瓜根大如指長三寸切以酒半面上研

瘻土瓜根搗末漿水和勻入夜別以漿水洗而塗藥且復洗

耳聾火法

濕土瓜根削半寸塞耳內以艾灸

瘻之百日光彩射人夫妻不相識也曾用有效

肘后方

七壯每旬一灸愈乃止

聖濟錄

子氣味酸苦無毒主治生用潤心肺治黃病炒用治肺痿吐血腸風瀉血亦白痢大主蠭毒

權反胃吐食

時附方新八消渴飲水

靈瓜

每食後嚼二三兩五傳尸勞瘵赤電兒俗名王瓜焙為末

反胃吐食

馬電兒燈上燒存性一錢入好棗肉平胃散末二錢

七度瘥聖惠方十藥神書酒服食即可下即野甜瓜北方多有之

丹溪纂要

痰熱頭風

懸桔

箇赤電兒七箇焙大力子即牛蒡子焙四兩為筋骨痛藥馬電兒子炒開口為末酒

未每食後或茶酒服三錢忌動風發熱之物

筋骨痛藥一錢日二服

集簡方

藥等分為末每服二錢臨

瘻血作痛

赤電兒燒存性研末無灰

指南方

藥等分為末每服二錢酒空心服二錢

集簡方

大腸下血王瓜一兩燒存性地黃二兩黃連半兩為

指南方

臥溫酒下衛生家寶方

酒空心服二錢

未蜜丸梧子大米飲下三十丸

指南方

葛 中品 **校正** 併入開釋名雞脣經鹿董別錄

葛粉黃斤未詳集解

別錄曰葛根生汝山山谷五月采根曝乾弘景曰

日乾之南康廬陵間最勝多肉而少筋甘美但為藥不及其本曰葛雖除毒其根入土五六寸已上者名葛脣脣者脣也服之令人吐以有微毒也本經葛穀即是其實也頌曰今處處有之江浙猶多春生苗引藤蔓長一二丈葉色葉頗似楸葉而小色青七月着花粉紫色似豌豆花不結實根形大如手臂紫黑色五月五日午時采根曝乾以入土深者為佳今人多作粉食宗奭曰澧禹之間冬月取生葛搗入水中揉出粉澄成塊入沸湯中良久色如膠其體甚韌以蜜拌食揉入生薑少許尤妙又切入茶中待質雖甘而無益又將生葛根煮熟作果實賣吉州南安亦然時珍曰葛有野生有家種其蔓延長取治可作繩給其根外紫內白長者七八尺其葉有三尖如楓葉而長面青背淡其花成穗纍纍相紛紅紫色其莢如小豆豆莢亦有毛其子綠色扁扁如藍梅子核生嚼腥氣八九月采之本經所謂葛根是也唐蘇恭亦言葛穀是實而宋蘇頌謂葛花不結實誤矣其花晒乾亦可煑食

葛根氣味甘辛平無毒

別錄曰生根汁大寒好古曰氣平味甘升也陽也陽明經行經的藥也

主治消渴身大熱嘔吐諸癰起陰氣解諸毒本經療傷寒中風頭痛解肌

發表出汗門腠理療金瘡止腸風痛

別錄曰升陽生津脾虛治胸膈煩熱發狂止血痢通小腸排膿血傳蛇蟲咬

蟲瘍傷寒散野葛巴豆百藥毒之生者鹽脂蒸食消酒毒可斷穀不餓作粉猶妙藏作粉止渴利大小便解酒去煩熱壓丹石傳小兒熱

瘡搗汁飲治小兒熱瘡

別錄曰生根汁大寒解溫病發熱五月五日中時取根為屑療金瘡散

瘡斷血為要藥亦療瘻及瘡至良頌曰張仲景治傷寒有葛根湯以其主大熱解肌發腠理故也元素曰升陽生津脾虛作渴者非此不除勿多用恐傷胃氣張仲景治太陽陽明合病桂枝湯內加麻黃

葛根又有葛根黃芩黃連解肌湯是用此以斷太陽入陽明之路非即太陽藥也頭癲痛如破乃陽明中風可用葛根葱白湯為陽明仙藥若太陽初病未入陽明而頭痛者不可便服升麻葛根發之是反引邪氣入陽明為引賊破家也震亨曰凡瘡痘已見紅點不可用葛根升麻湯恐未虛反增瘀瘧也東垣曰乾葛其氣輕浮鼓舞胃氣上行生津液又解肌熱治脾胃虛弱泄瀉聖藥也徐用誠曰葛根氣味俱薄輕而上行浮而微降陽中陰也其用有四止渴一也解酒二也發散表邪三也發瘡疹難出四也時珍曰本草十劑云輕可去實麻黃葛根之屬蓋麻黃乃太陽經藥兼入肺經肺主皮毛葛根乃陽明經藥兼入脾經脾主肌肉所以二味藥皆輕揚發散而所入迥然不同

附方 故十五數種傷寒

庸人不能分別今取一藥兼治天行時氣初覺頭痛內熱肺洪者葛根四兩水二升入豉一升後取半升服生薑汁尤佳 傷寒類要

時氣頭痛
壯熱生葛根洗淨搗汁一大盞加煎六分去滓分服汗出即瘥

未汗再服若心熱加危 傷寒頭痛二三日發熱者葛根五兩香豉一升以童子小便

子仁十枚

○聖惠方 傷寒頭痛八升煎取二升分三服食葱粥取汗

梅師方 嫩娘發熱葛根汁二升分三

預防熱病葛根粉二升生地

黃一升香豉半升為散每食後米飲服方辟瘴不染

生葛搗汁一小盞服去熱毒風也

聖惠方 煩躁熱渴出拌勻煮熟以糜飲和食

食醫心鏡小兒熱渴寸七日三服有病五服

龐安常傷寒論辟瘴不染

生葛搗汁一小盞服去熱毒風也

聖惠方 煩躁熱渴

久不止葛根半兩乾嘔不息葛根搗汁服一升度時後方小兒嘔吐

壯熱食癪葛粉二錢水二合調勻傾入錫鑊

心熱吐血

不止生葛搗汁半升

衄血

葛根搗汁飲乾者煎服仍既腰痛

腰脣傳之外臺秘要

腫脹

效乃止

時後方

金創中風

症強欲死生葛根四大兩以水三升煮取一升去滓分服口噤者灌

脊股食醫心鏡

大風頭痛

葛根搗汁飲乾者煎服仍既腰痛

腰脣傳之外臺秘要

腰脹

葛根搗汁飲乾者煎服仍既腰痛

蘿蔔中蟲

葛根搗汁服一升度時

葛穀氣味甘平無毒主涼膈十歲工本解酒毒

經角解酒毒珍時

葛花氣味同主治酒酒別葛根
葛根生葛酒服飲酒不醉也

葉主溫瘡止血搜傳之別

葛根生葛酒服飲酒不醉也

蔓主治喉瘡研水服方寸七

蘇消難腫時

附方新婦人咬乳服效

衛生易簡方

瘡子初起

葛蔓燒灰水調傳

病在咽中

如麻豆許令兒吐沫不能乳食葛蔓燒

附錄葛健久服治風癆

風生山南峽中葉似枸杞根如葛黑色

葛蔓燒灰水二升入豉一升後取半升服生薑汁尤佳

傷寒類要

時氣頭痛

壯熱生葛根洗淨搗汁一大盞

加煎六分去滓分服汗出即瘥

附錄葛健久服治風

風生山南峽中葉似枸杞根如葛黑色

葛蔓燒灰水二升入豉一升後取半升服生薑汁尤佳

傷寒類要

時氣頭痛

壯熱生葛根洗淨搗汁一大盞

加煎六分去滓分服汗出即瘥

附錄葛健久服治風

風生山南峽中葉似枸杞根如葛黑色

葛蔓燒灰水二升入豉一升後取半升服生薑汁尤佳

傷寒類要

時氣頭痛

壯熱生葛根洗淨搗汁一大盞

加煎六分去滓分服汗出即瘥

附錄葛健久服治風

風生山南峽中葉似枸杞根如葛黑色

葛蔓燒灰水二升入豉一升後取半升服生薑汁尤佳

傷寒類要

黃環

本經下品狼跋子別錄

澤名凌泉經

大就本

葛唐生芻

吳根韭

吳實名狼跋子

別錄廣穀唐本

時珍曰此物葉黃而圓故名黃環如蘿

庫呼白環之義亦是葛類故名就葛跋乃狼足名

其葉似之故

曰狼跋子

別錄曰黃環生蜀郡山谷三月采根陰乾善曰蜀黃環一名生芻二月生苗正亦高二尺葉黃圓端大經日葉有汁定非矣用甚稀市人訕有識者又曰狼跋子出交廣形扁制搗以雜木投水中魚無大小皆浮出而死宋曰黃環惟襄陽大有餘處雖有亦稀巴西人謂之就葛今園庭亦種之作藤生大者莖徑六七寸根亦葛類陶云似防己者近之取葛根誤食之吐利不止土聚解之此真黃環也今太常收斂南來者乃雞屎葛根非黃環也其花紫色其子名狼跋子角生似豆莢交廣送入太常者正

是黃環子也花實與葛同時時珍曰吳普所說甚詳而唐宋本草不收何也范子計然云黃環出魏郡以黃色者為善

黃環

根氣味苦無毒

小毒之才曰馬尾為之使惡伏苓防已乾薑

普曰神農黃帝有毒桐君扁鵲苦權曰大寒有

時附方新水腫

黃環根晒乾每服五錢水煎

水腫小便利為效

儒門事親

主治蠱毒兔症鬼魅邪氣在臟中除欬逆寒熱

經治上氣急

狼跋子

氣味苦寒有小毒主治惡瘡疥殺蟲魚

別錄苦酒

消水腫利小便

珍附方新水腫

黃環根晒乾每服五錢水煎

水腫小便利為效

儒門事親

主治蠱毒鬼症鬼魅邪氣在臟中除欬逆寒熱

經治上氣急

天門冬

本經下品

名豐冬

音貢力本頭棘爾

天棘

綱目

萬葉

尚錫曰摩爾雅

雲牆蘆豐冬注云門冬也一名滿冬抱朴子云一名頭棘或

在北岳名無不愈在南岳名百部在京陸山阜名頭棘在東岳名溼莖在中岳名天門冬在西岳名當松

而苗小異其苗似後契惟可治歟不中服食須別之時珍曰草之茂者為豐俗作門此草萬茂而功同參門冬故曰天門冬或曰天棘爾

雅云髦頭棘也因其細葉如髦有細棘也頭大音相近也按救荒本草云俗名萬歲藤又名婆羅

別錄曰天門冬生奉高山谷二月

樹其形與治肺之功頗同百部故亦名百部也牆蘆乃營實苗而爾雅指為門冬蓋古書錯謂也

集解曰三月七月八月米根曝乾弘景曰

奉高奉山下縣名也今處處有之以高地大根味甘者為好桐君樂錄云蔓生葉有刺五月花白十月實黑根數十枚張華博物志云天門冬莖間有逆刺若葉滑者名繩體一名頭棘按根入湯可以浣練素白如絳紅類也今越人名為浣草勝於用反此非門冬乃相似爾按此說與桐君之說相亂今人所采皆是有刺者本名頭棘亦粗相似用此浣衣則淨不復更有門冬恐門冬自一種或即是浣草耶又有百部根亦相類但齒異爾恭曰此有二種一種苗有刺而滑一種無刺而滑皆是門冬俗云頭棘浣草者形貌詔之雖作數名終是一

物二根洗垢俱淨門冬浣草互名也詔音命目之也頌曰處處有之春生蔭葉大如欽股高至丈餘葉如尚香極尖細而疏滑有逆刺亦有潔而無刺者其葉如絲而細散皆名天門冬夏生細白花亦有黃色及紫色者秋結黑子在其根旁人伏後無花暗結子其根白或黃紫色大如手指圓實而長二三寸大者為勝一科一二十枚同搗頤與百部根相類洛中出者大葉粗幹殊不相類嶺南者無花餘無他異禹錫曰抱朴子言山高地根短味甜氣香者為上生水側下地葉似細纈而微黃根長而味多苦氣是者次之若以服食令人下氣為益又遲也入山便可養煮啖之斷根或為散仍取汁作酒

服散猶佳詳珍曰生苗時亦可以沃地栽種亦堪種但晚成

根修治

分景曰門冬采得蒸剝去皮食之甚甘美止飢雖蠶乾猶潤難鳩必須曝於日中或火烘之今人呼苗為棘刺煮作飲宜人而終非真棘刺也頌曰二三七八月采根蒸剝去皮四破去心曝乾用數日米得去皮心用柳木甑及柳木柴蒸一伏時洒酒令遍更添火蒸作小架去地二尺攤於上曝乾用

氣味苦平無毒

別錄曰甘太虛好古曰氣寒味微苦而辛氣溥味厚陽中之陰入手太陰足少陰經氣分之藥之才旦垣衣地黃貝母為之使畏曾晳捐之曰服天門冬禁食鯉魚誤食中毒者浮萍汁解之

搗汁剝雄黃硝砂

主治諸風濕偏癱強骨髓殺三蟲去伏尸久服輕身羸延年不飢本保定肺氣去寒熱養肌膚利小便冷而能補

經保定肺氣去寒熱養肌膚利小便冷而能補

肺氣

欬逆喘息促急肺壅生離吐膿除熱通腎氣止消渴去熱中風濕并宜久服煮食之令人肌體潤澤而淨除身上一切惡氣不潔之疾

甄鑑心潤五臟補五勞七傷吐血治嗽消瘧去風熱煩躁大主心病嗌乾心痛渴而欲飲屢嘒卧足下熱而痛

古方治燥滋陰清金降火

時陽事不起寢常服之

思頌曰天門冬冷而能補患者五虛而熱者宜加用之和地黃為使服之奈老頭不白不羸曰治肺熱之功

珍

為多其味苦專泄而不專收寒多人集服之元素曰苦以泄滯血甘以助元氣及治血妄行此天門冬之功也保定肺氣治血熱侵肺上氣喘促宜加人參黃芪為主用之神效嘉謨曰天參門冬並入手太陰肺煩解渴止嗽消痰而麥門冬兼

行入手少陰清心降火使肺不犯邪故止嗽立效天門冬行足少陰滋腎助元全其母氣故消痰殊功蓋腎主津液燥則凝而為痰得潤

劑則化所謂治痰之本也好古曰手太陰足太陰經營衝枯涸宜以濕潤潤之天門冬人參五味枸杞子同為生脉之劑此上佳獨取寸口之意趙繼宗曰五藥雖為生脉之劑然生地黃貝母為天門冬之使茯苓為人參之使若有君無使是獨行

無功也故張三丰與胡深尚書長生不老方用天門冬三斤地黃一斤乃有君而有使也禹錫曰抱朴子言入山便可以天門冬養煮啖之足以斷駁若有力可餌之或作散酒服或搗汁作液膏服至百日丁壯兼倍駛於朮及黃精也二百日強筋髓駐顏色與煉成松脂

同蜜丸服尤善杜紫微服之御八十妾一百四十歲日行三百里慎微曰列仙傳云赤松子服天門冬齒落更生細髮復出太原甘始服

天門冬在人間三百餘年聖化經云以天門冬淡芩等分為末日服方寸七則不畏寒大寒時單衣汗出也時珍曰天門冬清金降火益水之上源故能下通腎氣入滋補方合群藥用之有效若脾虛人單餌既久必病陽消反成痼疾此物性寒而潤能利大腸故也

附方 盛三新服食法孫真人枕中記云八九月采天門冬根曝乾為

中益氣治虛勞絕傷年老衰損枯不隨風濕不仁冷痺寒瘲癰疽癩疾疊柱敗爛者服之皮脫虫出釀酒服去癥病積聚風痰癲狂三

虫伏尸除濕瘴輕身益氣令人不飢百日還年耐老釀酒初熟微酸久停則香美諸酒不及也忌鯉魚○體仙神隱云用乾天門冬十斤

杏仁一斤搗末蜜漬

母

杏仁不機

天門冬二斤熬地黃一斤為末煉蜜丸彈子大每溫酒化三丸日三服居山遠行辟穀良方服至十日

服方寸七名仙人糧

母

杏仁不機

身輕目明二十日百病愈顏色如花三十日髮白更黑齒落重生五十日行及奔馬百日延年

又法

天門冬搗汁微火煎取五斗入白蜜一斗胡麻炒末二升合煎至可丸即止火下大豆黃米和作餅徑三寸厚半寸一服

餅一日三服百日已上有益

又法

天門冬末一升松脂末一升蠟蜜一升和煎丸如梧子大每日早午晚各服三丸

臟調六腑令人無病

天門冬三十斤去心搗碎以水二石

煮汁一石糯米一斗細麪十斤如常炊釀酒熟日飲三盃

天門冬膏

氣令人不飢以天門冬流水泡過去皮心搗爛取汁砂鍋文武炭火

煮勿令太沸以十斤為準熬至三斤却入蜜四兩熬至滴水不散瓶盛埋土

土

中一七去火毒每日早晚白湯調服一匙若動大便以酒服之

醫方摘要用

天門冬膏

失血潤五臟殺三虫伏尸除瘻瘖輕身益

氣勿令太沸以十斤為準熬至三斤却入蜜四兩熬至滴水不散瓶盛埋土

土

中一七去火毒每日早晚白湯調服一匙若動大便以酒服之

</div

百部

別錄
中品

釋名

華野天門冬

綱目時珍曰其根名者百十
五寸切短合嚙汁主暴嗽甚良名為嗽藥疑此即百部也其土肥潤是以長大也

藏器曰天門冬根有十餘莖圓短實潤味甘百部多者

五六十莖長尖內虛味苦不同苗蔓亦別今人以門冬當百部說不明也頤曰今江湖淮陝齊魯州郡皆有之春生苗作藤蔓葉大而尖長頗似竹葉而青色而光根下一撮十五六枚黃白色二三八月采曝乾用時珍曰百部亦有細葉如蕘者其莖青肥嫩時亦可煮食其根長者近尺新時亦肥實但乾則虛瘦無脂潤爾生時擘開去心曝之鄭樵通志言葉如薯蕷者謬矣

根修治

徵曰凡米得以竹刀劈去心皮花作數十條懸搭下風乾却用酒浸一宿漬出焙乾剉用或一窠入十三條者號曰地仙苗若修事鮮之可千歲也

氣味甘微溫無毒
權曰甘無毒大明曰苦無毒恭曰微寒有小毒時珍曰苦微甘無毒

主治

咳嗽上氣火炎酒漬飲之

別錄

治肺熱潤肺

氣病

治瘧石骨蒸勞治痘殺蛇蟲寸白蟯蟲及一切樹木蛀蟲燼之即死殺虱及蠅蛆

弘景曰

曰作湯洗

火炙酒浸空腹飲治癬去蟲蠭咬毒

時珍曰百部亦天門冬之類故皆治肺病殺虫但百部氣溫

而不寒散宜之天門冬性寒而不熱熱嗽宜之此為異耳

附方

舊五

暴嗽

牛大去風

火炙酒浸空腹飲治癬去蟲蠭咬毒

時珍曰百部亦天門冬之類故皆治肺病殺虫但百部氣溫

而不寒散宜之天門冬性寒而不熱熱嗽宜之此為異耳

附方

新五

暴嗽

張文仲方用百部根漬酒每溫服一升日三服

葛洪方用百部生薑各搗汁等分煎服二合續十全方用百

部根搗自然汁和蜜等分沸湯煎膏噙喉

普濟方治卒效不止用百部根煎汁勿令人知

小兒寒嗽

舊五

部炒麻黃去

節各七錢半為末杏仁去皮炒仍以水畧煮三五沸研泥

入熟蜜和丸皂子大每服二三丸溫水下

錢乙小兒方

三十年嗽

百部根二十斤搗取汁煎始服方寸七日三遍身黃腫搗新鮮

百部根

外臺秘要

洗搗卷臍上以糯米飯半升拌水酒半合揉軟蓋在藥上以帛包住待一二日後口內作酒氣則水從小便中

出腫自消也

百部根一名野天門冬一名百奶奶狀如薏頭其葉赤細一根下有百餘個數

楊氏經驗方

誤吞銅錢

百部根四兩酒

附錄

白井行五臟令百病不起

一名王富

一名箭幹生山陵葉如小竹根黃皮白三月四月末

根曝乾時珍曰此物氣味主治俱近百部故附之

何首烏

宋開寶

釋名

藤本傳地精本

馬肝石

綱目

桃柳藤日九真藤

目赤萬斗

瘡瘍

目紅內消

大明曰其藥本草無名因

何首烏見藤夜交

何即采

本草綱目

卷十八上

十五

食有人因以采人為名爾時珍曰漢武時有馬肝石能灌人髮故後人隱此名亦曰馬肝石
赤者能消腫毒外科呼為瘡帝紅內消斗門方云取根若獲九數者服之乃仙故名九真藤
及河南柘城縣者為勝春生苗蔓延竹木墻壁間莖紫色葉葉相對如薯蕷而不光澤夏秋開黃白花如葛勒花結子有棱似蕎麥而雜
小繞如東大秋冬取根大者如拳各有五稜瓣似小甜瓜有赤白二種赤者雄白者雌一云春采根秋采花九蒸九曝乃可服此藥本名
交藤因何首烏服而得名也唐元和七年僧文采遇著山老人遂傳此事李翹乃著何首烏傳云何首烏者順州南河縣人祖名能嗣父
名延秀能嗣本名田兒生而闇弱年五十八無妻子常慕道術隨師在山一日醉卧山野忽見有藤二株相去三尺餘苗蔓相交久而方
解解了又父田兒驚訝其異至且攀掘其根歸問諸人無識者後有山老急來示之答曰子既無嗣其藤乃異此恐是神仙之藥何不服
之遂杵為末空心酒服一錢七日而思人道數月似強健因此常服又加至二錢經年舊疾皆痊髮烏谷少十年之內即生數男乃改名
能嗣又與其子延秀服皆壽百六十歲延秀生首烏首烏服藥亦生數子年百三十歲髮猶黑有李安期者與首烏鄉里親善鵠得方服
其壽亦長遂敍其事傳之云何首烏味甘性溫無毒菝葜為使治五痔腰膝之病冷氣心痛積年勞瘦瘦脾風虛敗劣長筋力益精髓壯
氣駐顏黑髮延年婦人惡血癥黃產後諸疾赤白帶下毒氣入腹久痢不止其功不可具述一名野苗二名交藤三名夜合四名地精五
名何首烏本出處州江南諸道皆有苗如木葵葉有光澤形如桃柳其背偏皆單生不相對有雌雄者苗色黃白雌者黃亦根連不過
三尺夜則苗蔓相交或隱化不見春末夏中秋初三時候晴明日兼雌雄采之乘潤以布帛拭去泥生勿損皮烈日曝乾密器盛之每月
再曝用時去皮為末酒下最良遇有疾即用茯苓湯下為便凡服用偶日二四六八日服訖以衣覆汗出導引良息猪肉血羊血無鱗
魚觸藥無力其根形大如拳連珠其有形如鳥獸山岳之狀者珍也掘得去皮生嚼得味甘甜可休糧讀曰神效助道著在仙書雌雄相
交後合查疏服之去穀日居月諸返老還少變安病脈有緣者過最爾自如○明州刺史李遠附錄云何首烏以出南河縣及領南恩州
韶州潮州賀州廣州潘州四會縣者為上邕州桂州康州春州高州勒州循州晉興縣出者次之真仙草也五十年者如拳大號山奴服
之一年鬚髮青黑一百五十年者如盤大號山伯服之一年齒落更生二百年者如斗榜大號山翁服之一年鬚髮童子行及奔馬三百年者如三斗榜大號山
山精純陽之體久服成地仙也時珍曰凡諸名山深山產者即大而佳也

根修治

志曰

春秋夏采其根

雌雄共用

乘濕以布拭去土曝乾

臨時以苦竹刀切米泔浸經宿曝乾木杵臼搗之忌鐵器慎微良方用

用何首烏赤白各一斤竹刀刮去粗皮泔浸一夜切片用黑豆三斗每次用三升三合三勺以水泡過沙鍋內鋪且一層首烏一層重鋪蓋蒸之且熟取出去且將何首烏晒乾再以豆蒸如此九蒸九晒乃用

氣味

苦澀溫無毒

時珍曰

狀苓為

之使忌諸血無鱗魚蘿蔔蕷葱等並鐵器同於地黃能伏硃砂

走

婦人產後及帶下諸疾

寶

久服令人有子治腹臍一切宿疾冷氣腸風大濕肝風

好發日

分赤者入血分皆主閉藏肝主疏泄此物氣

溫味苦澀苦補腎溫補肝能收斂精氣以能養血益肝固精益腎健筋骨烏髮髮為滋補良藥不寒不燥功在地黃天門冬

諸藥之上氣血太和則風虛癱腫癰癧諸疾可知矣此藥流傳雖久服者尚寥寥初邵應節真人以七寶美丹方上進

世宗皇帝服鮮有效連生

皇嗣於是何首烏之方天下大行矣宋懷州知州李治興一武臣同官怪其年七十餘而輕健面如渥丹能飲食叩其術則服何首烏丸也乃

傳其方後治得病感暑中半體無汗已二年竊自憂之造九服至年餘汗遂決體其活血治風之功大有補益其方

舊四新

用赤白何首烏各半斤米泔浸三夜竹刀刮去皮切焙石臼為末煉蜜丸梧子大每空心溫酒下五十九亦可末服附

十二

七寶美

髮烏髮髮壯筋骨固精氣續嗣延年用赤白何首烏各一斤米泔水浸三四日晝片刮去皮用淘淨黑豆二升以砂鍋水瓶鋪豆及首

龜

烏重重鋪蓋蒸之豆熟取出去豆暴乾換豆再蒸如此九次曝乾為末赤白猿苓各一斤去皮研末以水淘去筋膜及浮者取沉香

捨塊以人乳十盞浸勻晒乾研末牛膝八兩去苗酒浸一日同何首烏第七次蒸之至第九次止晒乾當歸八兩酒浸晒枸杞子八兩酒

浸晒免絲子八兩酒浸生芽研爛晒補膏脂四兩以黑芝麻炒香並忌鐵墨石臼為末煉蜜丸梧子大一百五十丸每日三丸清晨溫

酒下午時薑湯下卧時益湯下其餘並九梧子大每服食滋補和劑局方何首烏丸壯筋骨長精髓補血氣久服黑鬚髮堅陽道令人

日空心酒服一百丸久服極驗忌見前

積善堂方用赤白何首烏各半斤

大者八月采以竹刀削去皮切片用米泔水浸一宿晒乾以壯筋骨兒乳汁

未每旦無灰酒服一錢○積善堂方用赤白何首烏各半斤極大者八月采以竹刀削去皮切片用米泔水浸一宿晒乾以壯筋骨兒乳汁

泔水浸軟切之牛膝去苗

一斤切以黑豆一斗淘淨用木瓶鋪豆一層鋪藥一層重重鋪蓋瓦鍋蒸至豆熟取出去豆暴乾換豆又蒸如

此三次為末蒸棗肉和九梧子大每服三十五丸空心溫酒下忌見前○鄭巖山中丞方只用赤白何首烏各半斤去粗皮陰乾石臼杵

乳○肇峯雜興方用何首烏雌雄各半斤分作四分用當歸汁浸一分生地黃汁浸一分旱蓮汁浸一分

骨敷風疾

腰膝痛行步不得遍身

分人乳浸三日取出各曝乾瓦焙石臼為末蒸棗肉和九梧子大每服四十九丸空心百沸湯下忌見前

肇峯

乳○

花紋者同牛膝各一斤以好酒一升浸七宿曝乾木臼杵末

寬筋活

血

何首烏十斤生黑豆半斤同煎熟皂莢一斤燒存性牽牛十兩炒

棗肉和九梧子大每服三五十九空心酒下

經驗方

寬筋活

血

取頭末薄荷十兩木香牛膝各五兩川烏頭炮二兩為末酒糊丸

本草綱目

卷十一

一

桔子大每服三十九不問何處用何首烏末薑汁調成膏塗
茶湯下 永類方 皮裏作痛之以帛裹住火災鞋底熨之 經驗方
自汗不止 膜中 集簡方 腸風臘毒 下血不止何首烏二兩為
患小兒聾聾 魁尿調紅內消貼背 破傷血出 何首烏未傳之即止 療癰結核或破或不破下至胸前者皆治之用九真藥一名赤葛即何
方骨節久久自安 破傷血出 神效 筆峯雜興方 瘡癰結核首烏其葉如杏其根如雞卵亦類癰子取根洗淨日日生嚼
并取葉搗塗之數服即止其藥久服無害紅內消不限多少瓶中文武火熬煎醋熟入好無灰酒相等再煎沸時時飲之其滓焙研
服延年黑髮用之神效 斗門方 瘡疽毒瘍 為末酒煮麵糊丸桔子大空心溫酒下三十九疾退宜常服之即赤何首烏也連昌產者良
陳自明 大風瘧疾 何首烏大而有花文者一斤米泔浸一七九蒸九晒為末每酒服二錢日二服 聖惠方 斗門方 滌溝身 不可治者何首烏艾葉等分水煎濃湯
外科精要 麻四兩九蒸九晒為末每酒服二錢日二服 聖惠方 斗門方 滌溝身 洗浴甚能解痛生肌肉 王家博濟方

莖葉主治風瘧疥癬作藥煎湯洗浴甚效時珍

本草綱目草部第十八卷上終

本草綱目草部第十八卷下

草之七

蔓莖類

草薢

別錄
中品
釋名赤節

別錄
百枝

吳竹木

炮炙

白拔葜

時珍曰草薢名義未詳日華本草言時人呼

集解

別錄曰草薢生真定山谷二月八月

根曝乾

弘景曰今處處有之根似

菝葜而小異根大不甚有角節色小淺茶曰此有二種莖有刺者根白實無刺者根虛軟軟者為勝蔓生葉似薯蕷類

曰今河峽汴東荆蜀諸郡皆有之作蔓生苗葉俱青葉作三叉似山薯又似綠豆葉花有黃紅白數種亦有無花結白子者根黃白色多節二指許大春秋采根曝乾令成德軍所產者根亦如山薯而體硬其苗引蔓葉似蕎麥子三棱不拘時月采根利刀切片曝乾用時珍曰草薢蔓生葉似菝葜而大如蕷其根硬大者如商陸而堅今人皆以土茯苓為草薢誤矣莖葉根苗皆不同吳普本草又以草薢為狗脊亦誤矣詳狗脊後契而大如蕷其根硬大者如商陸而堅今人皆以土茯苓為草薢誤矣莖葉根苗皆不同吳普本草又以草薢為狗脊亦誤矣詳狗脊

下宋史以懷慶

之草解充貢

根氣苦平無毒

別錄曰甘之才曰薏苡為之使畏葛根大黃柴胡前胡

王治腰脊痛強骨節風寒濕周痺惡瘡不癆熱氣

本傷中恚怒陰瘡失溺老人五緩關

經

頭旋頭瘡補水臟堅筋骨益精中風失音

大補肝腎

明補肝

附方

舊二新三月腰脚痺軟行履不穩者

草薢二十四

節茎

別錄
冷風瘧癰腰脚痺緩不遂手足驚掣更子臂腰痛久冷腎間有膀胱宿水

頭旋頭瘡補水臟堅筋骨益精中風失音

大補肝腎

明補肝

附方

舊二新三月腰脚痺軟行履不穩者

虛舌

別錄
白濁草中痛痔瘻瘻瘻

時珍曰

草薢足陽明厥陰經藥也厥陰主筋屬風陽明主肉屬濕草薢之功長于去風濕所以能

治緩弱瘻痔遺濁惡瘻諸病之屬風濕者草薢拔葜莫土茯苓三物形雖不同而主治之功不相違

豈亦一類數種乎雷牧炮炙論序云囊胞漏多夜煎竹木竹木草薢也旋多白濁皆是濕氣下流草薢能治陽明之濕而固下焦故能去

濁分清楊氏家藏方治真元不足下焦虛寒小便頻數白濁如膏有草薢分清飲正此意也又楊子建萬全謙命方云凡人小便頻數不

計度數便室內痛不可忍者此疾必先大腑祕熱不通水液只小腸大腑愈加乾竭甚則渾身熱心躁思涼水如此即重症也此疾本

因貪酒色積有餘毒腐物血之類隨虛水入於小腸故便時作痛也不飲酒者必平生過食辛熱葷膾之物又因色傷而然此乃小便

頻數而痛與淋證澀而痛者不同也宜用草薢一兩水浸少時以鹽半兩同炒去鹽為末每服二錢用

水一盞煎八分和滓服之使水道轉入大腸仍以葱湯頻洗穀道令氣得通則小便數及痛自減也

附方

舊二新三月腰脚痺軟行履不穩者

草薢二十四

分杜仲八分搗篩每旦溫酒服三錢
七禁牛肉 唐德宗貞元廣利方 小便頻數 川草薢一斤爲末酒糊丸梧子
服四錢水一盞入鹽一捻煎七分清飲用萆薢石菖蒲益智仁烏藥等分每
分食前溫服日一服効乃止 腸風痔漏 如聖散用萆薢貫眾去土等分爲散欲
濟

錄

菝葜

上蒲八切下葉八

釋名援蕡金剛根

華葦角

綱目

王瓜草

日華時珍曰援蕡猶短結也短結短也此草莖莖強堅短小故名援蕡
而江浙人謂之菝葜根亦曰金剛根楚人謂之鐵葦角皆狀其堅而有

尖刺也鄭樵通志云其葉

頗近王瓜故名王瓜草

集解

別錄曰生山野二月八月采根曝乾弘景曰此有三種大畧根苗並相類菝葜莖紫而短小多刺小減草

細長而白色菝葜根作塊結黃亦色殊非狗脊之類頃曰今近道及江浙州郡多有之苗莖成莖長二三尺有刺其葉如冬青烏藥葉而
差大秋生黃花結黑子如櫻桃大其根作塊人呼金剛根時珍曰菝葜山野中甚多其莖似蔓而堅強植生有刺其葉圓大狀如馬蹄光
澤似柿葉不類冬青秋開黃花結紅子其根甚硬有硬鬚如刺其葉可飲酸澀野

人采其根葉入染家用名鐵葦角吳普本草以後菝葜爲狗脊非矣詳見狗脊下

根氣味甘酸平溫無毒主治腰背寒痛風痺益血氣止小便利

別利別治時疾瘧瘴大補肝經風虛古好治消渴月崩下利時珍曰菝葜

附方

小便滑數金剛骨爲末每服三錢溫酒下睡時儒門事親方沙石淋疾爲末每米飲服二錢後以地

椒煎湯浴腰腹須臾即通也

聖濟錄

附方

利尿不止梅一個煎一盞溫服 普濟方 下痢赤白金剛根蠟茶等分爲末白梅肉搗丸艾子大每服五七丸

即通也 毒脚弱 痛滿上氣田舍貧家用此最良後熟洗剉一斛以水三斛洗取良
九斗漬麪去滓取一斛清飲如常釀酒任意日飲之 腺後方

土茯苓

綱目校正併入拾遺

禹餘粮

釋名土革薢

綱目

刺猪苓

綱目

山猪苓

綱目

草薢

綱目

遺仙遺糧

綱目

冷飯團

綱目

山地藥

綱目

景注石部禹餘糧云

南中平澤有一種藤生葉如蘿蔓根作塊有節似菝葜而色赤味如薯蕷亦名禹餘糧言昔禹行山乏食采此充糧而棄其餘故有此名觀陶氏此說即今土茯苓也故今尚有仙遺糧冷飯團之名亦其遺意陳藏器本草草禹餘糧蘇頌圖經猪苓下利猪苓皆此物也今皆併之茯苓猪苓山地粟皆羣集詳載器曰草禹餘糧生海畔山谷根如盛連繖半在土上皮如茯苓肉赤味澀人取以當穀食不飢煩曰形也俗又名過岡龍謬稱也施州一種刺猪苓蔓生春夏采根削皮焙乾彼土人用俾瘧毒殊効時珍曰土茯苓楚蜀山筍中甚多蔓生如尊莖有細點其葉不對狀頗類大竹葉而質厚滑如瑞香葉而長五六寸其根狀如菝葜而圓其大若雞子連痏而生遠者離尺許近或數寸其肉軟可生啖有赤白二種入藥用白者良按中山經云鼓鐘之山有草焉名曰榮草其葉如柳其本如雞卵食之已風恐即此也昔人不知用此近時弘治正德間因楊梅瘡盛行率用輕粉藥取効毒留筋骨清爛終身至人用此遂為要藥諸醫無從考證往往指為草薢及菝葜然其根苗迥然不同宜參考之但其功用亦頗相近蓋亦草薢菝葜之類也

根氣味甘淡平無毒

時珍曰忌茶茗王治瘡之實堅不飢調中止洩健行不睡藏器健脾胃強筋骨去風濕利關節止泄漏治拘攣骨瘤瘻瘍

腫解承粉銀朱毒

時珍曰近有好淫之人多病楊梅毒瘡用輕粉愈而復發久則股體拘攣變為癰漏延綿歲月竟致廢篤惟剝土草薢三兩或加皂莢牽牛各一錢水六盞煎三盞分三服不數劑多瘥蓋此疾始由毒氣干於陽明而發加

以輕粉燥烈久而水衰肝火相火來凌脾土土屬濕主肌肉濕熱鬱蓄于肌腠故發為癰腫甚則拘攣內經所謂濕乘害人皮肉筋骨是也土草薢甘淡而平能去脾濕濕去則營衛從而筋脉柔肌肉實而拘攣癰瘡愈矣初病服之不効者火盛而濕未鬱也此藥長于去濕不能去熱病久則熱衰氣耗而濕鬱為多故也時珍曰楊梅瘡古方不載亦無病者近時起于嶺表傳及四方蓋銷衣風土卑炎蒸濕蒸飲啖辛熱男女淫猥濕熱之邪積畜既深發為毒瘡遂致互相傳染自南而北遍及海宇然皆淫邪之人病之類有數種治之則一也其證多屬厥陰陽明二經而兼乎他經邪之所在則先發出如兼小陰太陰則發于咽喉兼太陽少陽則發于頭耳之類蓋相火寄于厥陰肌肉屬於陽明故也醫用輕粉銀朱其性燥烈善逐痰涎濕蒸此物入胃氣歸陽明故涎被却隨火上升從喉頸齒縫而出故瘡即乾癥而愈若服之過劑及用不得法則毒氣留人經絡筋骨之間莫之能出痰涎既去血液耗涸筋失所養營衛不從變為筋骨繩痛發為癰瘡指漏久則生虫為癰手足破裂遂成瘻瘍惟土茯苓氣平味甘而淡為陽明本藥能健脾胃去風濕脾胃健則營衛從風濕去則筋骨利故諸證多愈此亦得古人未言之妙也今醫家有搜風解毒湯治楊梅瘡不犯輕粉病深者月餘淺者半月即愈服輕粉藥筋骨痙攣不能動履者服之亦効其方用土茯苓一兩薏苡仁金銀花防風木瓜通白鮮皮各五分皂莢子四分氣虛加人參七分血虛加當歸七分

新方新楊梅毒瘡附方新方新方用冷飯團四兩用水二大盃煎飲一日三服惟忌飲茶及牛羊雞鵝魚肉燒酒法廻房勞益秘方也

新方新方新方用冷飯團四兩水煎代茶飲淡者

二七深者四七見効

一方冷飯團一兩五加皮皂

角子苦參各三錢金銀花一錢用好酒煎日一服

小兒楊梅瘡起于口內延及遍身以土草解末

久而潰爛成癰連年累月至于終歲成廢疾者土草解一兩有熟加芩連氣虛加四君子湯血虛加四物湯水煎代茶

月餘即安朱氏集驗方用過山龍四兩即硬飯加四物湯一兩皂角子七個川椒四十九粒燈心七根水煎日飲

為末水煎服或入粥內食之須多食為妙江西

所出色白者良忌鐵器發物

陸氏續德堂方

白斂

本經釋名白草

下品經錄

別名鬼核別名狗頭

目毫蕊

別錄曰白斂

生衡山

別錄曰白斂服餌方少用惟斂瘡方多用之故名

白斂時珍曰鬼核貓兒卵皆象形也毫蕊言其皮黑也

集解曰白斂生衡山一月八月采根

曝乾弘景曰近道處處有之作藤生根如白芷破片竹穿日乾恭曰根似天門冬一株下有十許根皮赤果肉白如芍藥不似白芷蔓生枝端有五葉所在有之頌曰今江淮及荆襄懷孟商齊諸州皆有之二月生苗多在林中作蔓亦葉如小桑五月開花七月結實根如雞鴨卵而長三五枚同一窠皮黑白一

種赤斂花實功用皆同但表裏俱赤爾

根氣味苦平無毒

別錄曰甘微寒權曰有毒之
才曰代赭為之使反烏頭

主治癰腫疽瘻散結止痛除熱目中赤白

卽驚癲瘻溫瘻女子陰中腫痛當下赤白

本經曰白斂生根搗搘腫腫有効頌曰今醫

明解狼毒時珍曰白斂赤小豆蘭草為末雞子白調塗之治風及金瘻面藥方多用之往往與白及

殺火毒

別錄治發黃癰瘻面上疮瘡腸風痔漏血痢刀箭瘻損生肌止痛

大解狼毒時

弘景曰生取根搗搘腫腫有効頌曰今醫

解狼毒時珍曰白斂赤小豆蘭草為末雞子白調塗之治風及金瘻面藥方多用之往往與白及

相須附方新十發背初起水調白斂末塗

而用附方新十發背初起之時後方

丁瘡初起方同上

一切癰腫聖惠方

一切癰腫居方用白斂二分蓼蘆一分為末酒和貼之日三上

面鼻酒皁白陶隱

白石脂杏仁各半兩為末雞屎白一分

子清調塗豆洗

御藥院方面生粉刺

白斂二分杏仁半分雞屎白一分

凍耳成瘡白斂黃藥等分為末生

白斂白芷等分為末

白斂白芷等分為末蜜和雜水拭面

附方外臺方

哽咽白斂白芷等分為末水服一錢

聖惠方鐵刺諸哽

及竹木哽在咽中白斂半夏泡等分

水服半錢日二服

聖惠方刺在肉中方同

刺在肉中上胎孕不下白斂生半夏等分為末滴水丸梧子

大每擦皮湯下五十丸保命集

風運筋急腫痛屈轉易常處白斂一分熟附子一分為末每酒服半刀圭

日二服以身中熱行候十日便覺忌猪肉冷水

千金方諸瘡不斂白斂赤斂黃藥各二錢炒研輕粉一錢

瑞竹堂方

女萎

李當之本草

集解

恭曰女萎葉似白斂蔓生花白子細荆襄之間名為女萎亦名蔓楚用苗不用根與姜並

於槐砧上剗拌豆牀

酒蒸之從已

氣味辛溫無毒主治止下痢消食

當風寒酒酒霍亂利腸鳴逕氣上下無當驚寒熱百病出汗

唐附方新久痢脫肛女

至未出腋乾氣味辛溫無毒主治止下痢消食

當風寒酒酒霍亂利腸鳴�徑氣上下無當驚寒熱百病出汗

本附方三久痢脫肛女

切一升燒煮之蠶下不止女萎雲實各一兩川烏頭二兩桂心五錢為末審

楊氏產乳方丸水下一日三服

肘後方

身體癱瘓斑駁女威實用魯國女威白芷各一分附子一枚

香一錢以浮石磨破

日擦之古今錄驗

赭魁

本經

時珍曰其根如魁有才

別錄曰生山谷中二月采弘景曰狀如小羊肉白皮黃近道亦有茶曰赭魁大者如斗小者

如升蔓生草木上葉似杜衡陶所說乃土卵也土卵不堪藥用浪漢人蒸食之名黃獨非赭

魁也保昇曰苗蔓延生葉似蘿藦根若菝葜皮紫黑肉黃赤大者輪囷如升小者如拳所在有之時珍曰赭魁閩人用之染青誠中云易

上色沈括筆談云本草所謂赭魁皆未詳審今南中種多瘡黴服赤似何首烏切破中有赤理如檳榔有汁赤如赭彼人以染皮製靴聞

人謂之餘糧本草石部禹餘糧陶氏所引乃此物也謹按沈氏所說赭魁甚明但謂是禹餘糧者

非矣禹餘糧今乃之土茯苓可食故得糧名赭魁不可食豈得稱糧耶土卯即土芋也見菜部

根氣味甘平無毒

小毒

茶曰有

主治心腹積聚除三蟲

本經

集解

頌曰生宜州山林下附石而生作蔓似大豆其根形似茱

英圓薄似錢根似鳥形者良

氣味苦寒無毒主治解百藥毒諸熱煩悶惡黃天行黃痘瘡瘍中惡

氣味苦寒無毒主治風熱上壅咽喉腫痛及解蠶寄藥毒搗末

酒服有効亦消風熱結毒酒摩塗之立愈

蘇頌曰生宜州山林下附石而生作蔓似大豆其根形似茱英圓薄似錢根似鳥形者良

氣味苦寒無毒主治風熱上壅咽喉腫痛及解蠶寄藥毒搗末

酒服有効亦消風熱結毒酒摩塗之立愈

伏雞子根

拾遺集解

藏器曰生四明天台山蔓延生

葉圓薄似錢根似鳥形者良

氣味苦寒無毒主治解百藥毒諸熱煩悶惡黃天行黃痘瘡瘍中惡

氣味苦寒無毒主治風熱上壅咽喉腫痛及解蠶寄藥毒搗末

酒服有効亦消風熱結毒酒摩塗之立愈

蘇頌曰生宜州山林下附石而生作蔓似大豆其根形似茱英圓薄似錢根似鳥形者良

氣味苦寒無毒主治風熱上壅咽喉腫痛及解蠶寄藥毒搗末

酒服有効亦消風熱結毒酒摩塗之立愈

承露仙根圓如仰

盆狀大如雞卵

人肝膽拾遺藏器曰主解諸藥毒遊風手腳軟痺並生研服之塗之生嶺南山石間引蔓而生葉有三極

花紫色與伏雞子同名承露仙而伏雞子葉圓時珍曰以根三兩磨汁或煎濃汁服並解蠍毒

千金藤

宋開寶

校正自木部集解生南土者黃赤如細辛舒廣間有一種藤似木蓼又有烏虎藤遙樹生冬青亦名千金藤江西林間有

草生葉頭有腰子似鵝膝葉如柳亦名千金藤又一種似荷葉只大如錢許亦呼為千金藤又名古藤主病及小氣味缺

兜大腹千金者以貴為名豈俱一物亦狀異而名同耶若取的稱未知孰是又云嶺南有陳思發亦名千金藤

諸氣鬱亂中惡天行虛勞瘧疾數不利癰腫大毒藥石發癩癩悉主之

藏附錄陳思發拾遺藏器曰出嶺南山野蕷生如小豆根及葉

毒解諸藥毒熱毒丹毒癰腫天行壯熱喉痺蟲毒並磨汁
服之亦磨塗瘡瘍曰味苦平浸酒服治風補益輕身

九仙子

綱目宋開寶釋名仙女嬌集解時珍曰九仙子出均州太和山一根連纏九枝大者如雞子小者如半夏白色二月生苗蔓高六七尺莖

細而光葉如烏柏葉而短扁不圓每葉極生子枝或一或一叢下垂六七月開碎青黃色花隨即結實碎子叢簇如絞精

草子狀九月采根氣味苦涼無毒主治咽喉瘻散血以新汲水或醋磨汁含噙甚良

時珍曰味苦平解諸藥毒止痛消瘡腫毒發熱數嗽治人及馬忌黃殺小蟲

山豆根

宋開寶釋名解毒綱目黃目中藥時珍曰其蔓如大集解頌曰山豆根生劍南及宜州果州山谷今廣西亦有以忠州萬州者為佳

故嶺南人捕鼠取腸豆因以為名苗蔓如豆葉青經冬不凋八月采根廣南者如小槐高足餘石鼠食其根

胃膈乾解毒攻熱効氣味甘寒無毒

時珍曰按沈括筆談云山豆根味極苦本草一言味甘大誤矣

主治解諸藥毒止痛消瘡腫毒發熱數嗽治人及馬忌黃殺小蟲

含之嚥汁解咽喉腫毒極妙研末湯服五分治腹脹喘滿酒服三錢治女人血氣腹脹又下寸白諸蟲丸服止下痢磨汁服止卒患熱

厥心腹痛五腫痔痛研汁塗諸熱腫瘡蛇狗蜘蛛傷

時珍曰舊十解中蠍毒密取山豆根和水研服少許新三解中蠍毒未定再服已禁聲者亦愈

五般急黃

山豆根末水服二錢若帶盡氣以酒

下霍亂吐利山豆根末蜜丸梧子大每服二十九空

赤白下痢山豆根末蜜丸梧子大每服二錢

腹白湯下三服自止

已上並備急方水蟲腹大

有聲而皮色黑者山豆根末酒服二錢聖惠方

卒患腹痛半盞服入口

即頭風熱痛山豆根末油浸

山豆根末浸

頭上白屑山豆根末油日塗之

牙齦腫痛所

已上並備急方喉中發癰

煩以雞翎掃入喉中引涎出就能言語

永定頭風熱痛調塗兩太陽頭上白屑

山豆根末油日塗之

即愈

類然豆諸瘡煩熱甚者水研山豆根

疔瘻毒瘡

山豆根末臘猪脂汁服少許

經驗方

調塗備急方

喉風急證

牙關緊閉水穀不下山豆根白藥等分水

煎噙之嚥下三二口即愈

楊貴叟外科

黃藥子

米開寶

校正自本部釋名木藥子

綱目大苦

綱目亦藥圖紅藥子

時珍曰按沈括筆談云本草甘草注引郭璞注爾雅云薑大苦者云

即日草也蔓生葉似薄荷而色青黃莖亦有節節有枝相當此乃黃藥也其味極苦故

集解頌曰黃藥原出嶺南今蘇陝州郡及明越秦龍山中亦有之以忠州萬州者為勝生高三四尺根及莖似小桑

子今處處栽之其莖高二三尺柔而有節似藤實非藤也葉大如拳長三寸許亦不似桑其根長者尺許大者圍二三寸外褐內黃亦有

黃赤色者肉色頗似羊蹄根人擣其根入染藍瓶中易變色也唐韓恭言藥實根即藥子宋蘓頌遂以

為黃藥之實然今黃藥之枯春生開辟花無實編葵所謂藥子亦不專言黃藥則蘓頌所言亦未可憑信也

根氣味苦平無毒

馬心肺熱疾

王治諸惡腫瘡蛇咬研水服之亦含亦塗

開涼血降火消腫解毒

時珍發明頌曰孫思邈千

金月令方療鼻

生瘻疾一二年者以萬州黃藥子半斤須堅重者為上如輕虛即是他州者力慢須用加倍取無灰酒一斗投藥入中固濟瓶以糠火燒

一復時待酒冷乃開時時飲一杯不令絕酒氣經三五日後常把鏡自照覺消即停飲不爾便令人項細也劉禹鈞傳信方亦著其効云

得之邕州從事張蒼苔目擊有効復試其驗如神其方並同惟小有別

舊三項下藥氣

時珍曰藥黃子一斤洗剉酒一斗浸之每日早晚常服

一盞忌一切毒物及戒怒仍以線逐日度之乃

異處是燒酒候香出外瓶頭有津出即止不待一宿火不可得猛耳

附方新三項下藥氣

王亥博濟方用黃藥子一兩水煎

百一選方用蒲黃黃藥子等分為末掌中舐之

王亥博濟方用黃藥子一兩水煎

聖惠方

咯血吐血

藥子漢防已各一兩為末每服一錢小麥湯食後調服一日二服

鼻衄不止

木每服二

斗門方

吐血不止

藥子一兩水煎

百一選方用蒲黃黃藥子等分為末每服一錢水煎

錢前後膠湯下良久以新水調服一盞頓服

簡要濟眾方

產後血運婦人油釵二隻同煎一盞服大小便俱利血自下也

禹謹師經驗方

手集方只以新汲水磨汁一盞頓服

錢煎湯下良久以新水調服一盞頓服

禹謹師經驗方

天

泡水燒黃藥子末搽

集簡方

本草綱目

卷十八下

四

解毒子

唐本草

釋名地不容

唐本草學子

圖經

集解

恭曰

地不容生川西山谷采無時鄉人呼為解毒子也

頌曰出戎州蔓生葉青如杏葉而

州與元府出苦藥子大抵與黃藥相類春采根曝乾亦入馬藥用時珍曰四川志云苦藥子出忠州性

寒解一切毒川蜀諸處皆有即解毒子也或云邛州苦藥子即黃藥子也方言稱呼不同耳理亦近之

根氣味苦大寒無毒主治解蠱毒止煩熱辟瘧瘧利喉門及疫毒

唐本草

集解

恭曰氣清肺熱頃消疫降火利咽喉退目赤

時附方

新一咽

喉腫痛水漿不下苦藥子豆根甘草消石各一分射干

眉棱骨痛熱痛攻眼頭痛眉痛壯熱不止解毒子木香川大黃

附錄奴會子海

珣曰味辛平無毒主小兒無毒令眉脣脹脣脫骨立瘦損脾

聖惠方

各三分為末以水調膏貼乾即易之

普濟方

附錄奴會子海

本草經

味辛溫無毒主邪氣諸癰皮膚積絶傷補骨髓一名連木

胃不磨劉五娘方同為煎服生西國諸戎大小如苦藥子

海藥

別錄曰生蜀郡山谷采無時恭曰此藥子也當令盛用胡名那疏

出通州渝州其子味辛平無毒主破血止崩消腫除疎症蛇毒樹生葉似杏花紅白色子肉味酸止用其仁本經誤載根字時珍曰此藥

子雖似黃藥苦藥子而稍有不同二藥子不結子此則樹之子也葛洪肘後方云婆羅門名那疏樹子中國人名藥子去皮取中仁細研

服治諸病也

病也

白藥子

唐本草

集解

恭曰白藥子出原州二月生苗葉似苦苣四月抽莖長似壺蘆蔓六月開白花八月結子亦名瓜莖九月葉落枝

折采根洗切白乾根皮黃色名白藥子頌曰今夔施合州江西嶺南亦有之江西出者葉似烏柏子如綠豆至六月

變成赤色治

熟方用之

根氣味辛溫無毒

權曰

苦冷

主治金瘡生肌

唐本草

集解

恭曰白藥子出原州二月生苗葉似苦苣四月抽莖長似壺蘆蔓六月開白花八月結子亦名瓜莖九月葉落枝

折采根洗切白乾根皮黃色名白藥子頌曰今夔施合州江西嶺南亦有之江西出者葉似烏柏子如綠豆至六月

變成赤色治

熟方用之

馬氏

散大降血消瘀解毒

時珍附方

舊四

天行熱病腹鳴疼痛當吐利數行如不止喫冷粥一盞止之

新八

咽喉不利白藥三兩黑牽牛半兩同炒香去韋一錢

聖惠方

喉中熱塞痰白藥朴消

聖濟方

心痛解熱白藥根野猪尾二味洗去粗皮焙乾

等分搗篩酒服一錢甚効

人用之

風熱上壅

咽喉不利白藥三兩黑牽牛半兩同炒香去韋一錢

聖惠方

喉中熱塞痰白藥朴消

等分爲末吹之日

四五次直指

咽喉腫痛白藥末一兩龍腦一分密和丸

米飲服或煎湯洗鼻頭縮鼻令

人經胎熱不安

鐵罩散用白藥子一兩白芷半兩爲末每服二錢紫蘇湯下心煩熱入沙糖少許

聖惠方一具坡開參末五錢者熟食之

直指方

驗良方

錢紫蘇湯下心煩熱入沙糖少許

聖惠方一具坡開參末五錢者熟食之

上諸藥哽咽

白藥煎米醋細嚥在上即吐

癰腫不散生白藥根搗貼乾則易之無生

出在下即下出普濟方癰腫不散者研末水和貼乾易之

圖經毒水研服八股與毒相攻必吐出未

吐盡更服亦去心胸煩熱天行瘧瘴出蒼梧陳家故有陳家之號明山有之蔓及根並似土瓜葉如錢板似防己緊小者良人亦采食之

與婆羅門白藥及赤藥功用並相似時珍曰接劉恂續表錄云陳家白藥善解毒藥皆不及之救人甚多封州康州有種之者廣府中每歲充上貢按此藥當時充貢今無

復有或有之古今名謂有不同耳甘家白藥拾遺藏器曰味苦大寒有小毒解諸藥毒水研服即吐出未盡再吐與陳家白藥功相

似二物性冷與霍亂下利人相反出龜州以南生陰處葉似車前根如半夏其汁飲之

有如蜜因人而名嶺南多毒物物亦多解毒物豈天資之乎會州白藥碎末傳之出會州葉如白斂

衡洞根拾遺藏器曰味苦平無毒主熱毒蛇犬蟲瘻瘍等毒出

珣曰苗蔓如土瓜根亦相似味辛溫主平完毒

氣及蛇傷取根磨水服之諸毒悉皆吐出也突厥白諸藥合稱者志曰今所用者出潞州其根黃白色狀如茯苓而虛軟苗高三四尺

春夏葉如蓮荷花似牽牛而紫

上有白核二月八月采根曝乾

感靈仙

宋開寶釋名時珍曰感言其性猛烈

志曰出商州上洛山及華山并平澤以不聞水聲者良生先於衆草方莖數葉相對冬月

東河北汴東江湖州郡皆有之初生作萬葉如針股七月內生花六出淺紫或碧白色作穗似蒲臺子亦有似菊花頭者實青色根稠密

多鬚似毅每年朽敗九月采根時珍曰其根母年旁引年深轉茂一根叢鬚數百條長者二尺許初時黃黑色乾則深黑俗稱鐵脚威靈

仙以此別有數種根鬚一樣但色或黃或白皆不可用

根氣味苦溫無毒

元素曰味甘純陽入太陽經果曰可升可降陰中陽也時珍曰味微辛鹹不苦忌茗麯湯

主治諸風宣通五臟去腹內冷滯心膈痰氣久積癰癧痃癖氣塊膀胱

宿臘惡木腰膝冷疼痛折傷久服無溫疫瘧

開

推新舊滯消胞中瘀血散皮膚大腸風邪

李

發明頌曰唐貞元中嵩陽子周君巢作

二經脈朝服暮効踈宣五臟冷暖宿水變病微利不瀉人服此四肢輕健手足微緩並得清涼先時商州有人病手足不遂不履地者數十年良醫殫技莫能療所親置之道旁以求救者遇一新羅僧見之告曰此疾一藥可活但不知此土有否為之入山求索果得乃威靈

仙也使服之數日能步履其後山人鄧思齊知已遂傳其事此藥治丈夫婦人中風不語手足不遂口眼喎斜言語蹇滯筋骨節風寒

胎風頭風暗風心風狂大風皮膚風癬風熱毒風瘡頭旋目眩手足顛瘪腰膝疼痛久立不得曾經捐隊醫腰痛腎臟風寒

瘧氣憎寒壯熱頭痛流涕黃疸黑疸頭面浮腫腹內宿滯心頭痰水膀胱宿膽口中涎水冷熱氣壅肚腹脹滿好喫茶溼心痛注氣膈

氣冷氣攻衝脾肺諸氣凝熱欬嗽氣急坐不安氣衝眼亦攻耳成膿陰汗盜汗大小腸秘服此立通氣兩痔疾瘻瘍疥癬婦人月水不來動經多日氣血衝心產後秘塞孩子無事並皆治之其法采得根陰乾月餘搗末調一錢七空腹服之如人本性殺藥可加及六錢利過

兩行則減之病除乃停服其性甚善不觸諸藥但惡茶及麵湯以甘草卮子代飲可也又以一味洗焙為末以好酒和令微濃入在竹筒

內緊塞九蒸九曝如乾添酒酒之以白蜜和丸梧子大每服二十至三十九溫酒下崔元亮海上集驗方著其詳如此蓋曰腰腎腳膝積

風腸內諸冷病積年不瘥者服之無不立効宗奭曰其性快多服疏人五臟真氣靈亨曰威靈仙屬木治痛風之要藥也在上下者皆宜

服之尤効其性好走亦可橫行故崔元亮言其去衆風通十二經脈朝服暮効凡采得鮮流水聲者知其性好走也須不聞水聲者乃佳時珍曰威靈仙氣溫味微辛鹹辛泄氣鹹泄水故風濕痰飲之病人氣壯者服之有捷効其性大抵踈利久服恐損真氣氣弱者亦不可

服

舊四新

附方

十六脚氣入腹

痛減一分則藥亦減一分

簡便方

腰脚諸痛

千金方用威靈仙末空心溫酒服一錢逐日以微利為度

腰膝沉重

威靈仙末

大黃丸梧子大溫酒服八十九平明微利惡物如青膿膠即是風毒積滯

因患楊梅瘡

每服二十丸

膏臘風壅

滯如未利再服一百丸取下後食粥補之一月仍常服溫補藥孫兆方名放杖丸

集驗筋骨毒痛

服輕粉毒藥

年久不愈者威靈仙三斤水酒十瓶封煮一皮傷風病威靈仙半兩獨頭蒜一個香油一錢同搗

大以浸藥酒

腰膝沉重

威靈仙末

大溫酒服八十九平明微利惡物如青膿膠即是風毒積

滯如未利再服一百丸取下後食粥補之一月仍常服溫補藥孫兆方名放杖丸

集驗筋骨毒痛

服輕粉毒藥

年久不愈者威靈仙三斤水酒十瓶封煮一皮傷風病威靈仙半兩獨頭蒜一個灰火燶一

柱香出火毒逐日飲之以愈為度

集驗方石破膏

大溫酒衝汗出即愈衛生易簡方

手足麻痺

時發疼痛或打撲傷損痛不

五兩生川烏頭

靈脂各四兩

為末醋糊丸梧

子大每服七丸

用鹽湯下忌茶普濟方

男婦氣痛

宿五更視雞子殼軟為度去渣溫服以乾物壓之側睡向塊邊灑再煎次日服覺

塊刺痛是其驗

威靈仙一把醋蜜各半盃煎五分停瘡宿飲

端效咽送全不入食威靈仙焙半夏薑汁浸焙為末用皂角水熬

也摘玄方

噎塞膈氣

服之吐出宿痰愈唐瑞經驗方停瘡宿飲

膏丸綠豆大每服七丸至十九盞湯下一日三服一月為驗忌茶

麪

腹中痞積威靈仙楮桃兒各一兩爲末每溫酒服三錢名化鐵丸普濟大腸冷積威靈仙末密九倍子大一更時生薑湯下十九至二十九

經驗良方用風瀉血二升者乾炒爲末以雞子白和作

小餅炙乾再研每服一錢

聖濟痔瘡腫痛後洗冷再溫之外科精義諸骨哽咽威靈仙一兩二錢砂仁一兩沙糖一盞水二鍾煎一鍾溫

陳米飲下日二服

乾坤生意用威靈仙米醋浸二日晒研末醋糊丸梧

子大每服二三丸半茶半湯下如欲吐以銅青末半匙入油一二點茶服探吐

聖濟錄治雞發骨哽赤芷威靈仙五錢井華水煎服即軟如綿吞下甚効

飛絲纏陰腫痛欲斷以威靈仙搗汁浸洗痘瘡黑陷鐵脚

○聖濟錄治雞發骨哽赤芷威靈仙五錢井華水煎服即軟如綿吞下也甚効

李樓怪證方痘瘡黑陷一人病此得効

李樓怪證方痘瘡黑陷

仙炒研一錢腦子一分溫水調服取

下瘡瘍爲効意同百詳九儒門事親

茜草

本草

校正

併入有名未

釋名

音若

英

音如

地血

別錄

蜀

本血

見愁

宿

風車草

宿過

龍補

牛蔓

時珍曰

按陸佃云許氏

說文言

蕘乃人血所化

則草鬼爲鬼以此也

陶隱居本草古東方有而少不如西方多則西草爲茜又以此也

陸機云齊人謂之茜徐人謂之牛蔓又草之盛者

爲蒨牽引爲茹連覆爲蘆則蒨蘆之名又取此義也人血所化之說恐亦俗傳耳土宿真君本草云四補草其根茜草也一名西天王

草一名四岳近陽草一名鐵塔草風車兒草藏器曰有名

集解

別錄

曰茜根生喬山山谷二月三月采根曝乾又曰苗根生山陰谷中蔓

未用苗根即茜根也茜由二字相似傳寫之誤爾宜併之

芝草木上並有刺實如椒弘景曰此即今染絳茜草也東間諸處乃有而

不如西多詩云茜蘆在阪者是也孫昇曰染絳草葉似寒葉頭尖下闊莖葉俱濃四五葉對生節間蔓延草木上根紫赤色所在皆有八

月采頌曰今圃人亦作畦種蒔故史記云十畝危茜其人與千戶侯等言其利厚也時珍曰茜草十二月生苗蔓延數尺方莖中空有筋

外有細刺數寸一節每節五葉葉如烏蘞葉而糙澀面青背綠七八月開花結實如小椒大中有細子

根修治

數曰凡使

用銅刀於槐砧上剗

日乾勿犯鉛鐵氣勿用赤柳草根真

氣苦寒無毒

權曰甘

大明曰酸入藥炒用零亨曰熱元

相似只是味酸澀誤服令人患內障眼疼服甘草水止之即毒氣散

素曰微酸鹹溫陰中之陰

別錄曰苗根鹹

平無毒才曰畏

鼠姑汁制雄黃

主治寒濕風寒黃疸補中

經止血內崩下血膀胱不足踰疎久服益精氣輕身可以染絳又苗根主癰及熱中傷

跌折別錄治心肺吐血瀉血飄止鼻漏血產後血運月經不帶下損淤血泄精痔瘡瘧病排膿酒煎服

大明通經脉治膏節風

本草綱目

卷十八下

草部

六

痛活血行血

時發明

藏器曰

茵草主蠱毒

煮汁服周禮庶民掌除蠱毒以嘉草攻之

嘉草者蕘荷也

也主蠱為最靈

亨曰

令人治痛風

而行故亦暫効

若病深而血少者則愈劫愈虛而病愈深矣

時珍曰

茵根赤色而氣溫味微酸而鹹色赤入營氣溫行滯味酸入肝而

鹹走血手足厥陰血分之藥也專于行血活血俗方治女子經水不通以一兩煎酒服之一日即通甚効名醫別錄言其久服益精氣輕

身日華子言其泄精

附方舊三吐

用草藥取速効如石絲為君過山龍等佐之皆熱性而燥不能養陰却能燥濕病之淺者濕痰得燥而開淤血得熱

殊不相合恐未可憑

附方新八吐血不定

茵根一兩搗末每服二錢水煎服

及解毒用苦根雄黑豆去皮甘草炙等分為

附方周應簡要濟眾方

可水和二錢服

周應簡要濟眾方

錄鼻血不止

茵根炒葉各一兩烏梅肉二錢半為末煉蜜

九梧子大每烏梅湯下五十九

本事方

五行經

婦人五十後經水不止者作敗血論用茵根一名過山薑一兩阿膠

每帖水一盞半煎七分入

唐珪經驗方

女子經閉

方見前

心癲煩服

內熱茵根煮汁

解中蠱毒

吐下血如猪肝

茵根炒葉各三分水四升煮二

鬚髮灰服之

唐珪經驗方

心癲煩服

傷寒類要解中蠱毒

升服即愈自當呼蠱主姓名也

陳延之小品方

黑

黑

黑

黑

吐血躁渴

及解毒用苦根雄黑豆去皮甘草炙等分為

附方木井水丸彈子大每服溫水化一丸

聖濟

錄鼻血不止

茵根炒葉各一兩烏梅肉二錢半為末煉蜜

九梧子大每烏梅湯下五十九

本事方

五行經

側柏葉火黃芩各五錢生地黃一兩小兒胎髮一枚燒灰分作六帖

每帖水一盞半煎七分入

唐珪經驗方

心癲煩服

內熱茵根煮汁

解中蠱毒

吐下血如猪肝

茵根炒葉各三分水四升煮二

鬚髮灰服之

唐珪經驗方

心癲煩服

傷寒類要解中蠱毒

升服即愈自當呼蠱主姓名也

陳延之小品方

黑

黑

肛不收

茵根石榴皮各一握酒一百

時行瘡瘍正發服此則可無患

附方蓋煎七分溫服

聖惠方

解瘡瘍

根煎汁入少酒飲之

奇效良方

錄血勝

宋圓經頌曰

生信州葉如葵蘭葉根如大拇指

根煎汁入少酒飲之

奇效良方

錄血勝

其色黃彼人五月采用攻血治氣塊時珍曰按

虞博云

血藤即過山龍理

亦相近未知的否姑附之

剪草

日集解

草狀如茜草又如細辛

發台二州皆有之惟婺州者可用其說殊詳今遍詢訪無識者或云即茜草也未有的據

根氣味苦涼無毒

頌曰

王治諸惡瘡疥癬瘻瘍有蟲浸酒服明主一切失血

時發明

藏器曰

剪草生山澤間葉如芍药細江東用之頌曰生潤州二月三月采曝乾用時珍曰按許叔微本事方言明

吐血損肺及血妄行名曰神傳膏其法每用一斤淨洗晒為末人生蜜二斤和為膏以器盛之不得犯鐵器一日一蒸九蒸九曝乃止病

人五更起面東坐不得語言以匙抄藥四匙食之良久以稀粟米飲壓之藥只冷服米飲亦勿大熱或吐或否不妨如久病肺損咯血

只一服愈尋常嗽血妄行每服一匙可也有一貫婦病瘡得此方九日藥成前一夕病者夢人戒令翌日勿亂服藥次日將服藥屋上土

墜器中不可用再合咸將服為籍覆器又不得食再合未就而夫人卒矣此藥之異有如此若小小血妄行只一啜而愈也此藥絕妙若

此而世失
傳惜哉

附方新風蟲牙痛

草剪細辛葉本等分煎水熱漱少頃自止中藏經

滑肌散治風邪客于肌中渾身癢痒致生瘡疥及肺風毒攻衛生瘡乾渴日久不瘥用剪草七兩不見火輕粉一錢為末慘之乾者麻油調

摻和

防己

本經釋名解離經

中品

解離經

時珍曰按東垣李杲云防己如險健之人立炎熱禍能首為

亂階若善用之亦可禦敵其名或取此義解離因其紋解也

集解別錄曰防已生漢中川谷二月八月采根

亂階

金匱

曰其莖如葛蔓延其根外白內

黃如桔梗內有黑紋如車輻解者良弘景曰今出宜都建平大而青白色虛軟者好黑點木強者不佳服食亦須之頌曰今黔中亦有之

但漢中出者破之文作車輻解黃實而香莖梗甚嫩苗葉小類牽牛折其莖一頭吹之氣從中貴如不通然他處青白虛軟又有腥氣

皮繖上有丁足子名木防己蘇恭言木防己不佳用而古方張仲景治傷寒有增減木防己湯及防己地黃湯五物防

己湯黃芪六物等湯孫思邈治遺尿小便澀亦有三物木防己湯藏器曰如陶所說漢水一防己即是根苗為名

巴湯

木條色黃腥皮

根上有丁足子不堪用惟要心有花文黃色者細剉以車前草

根相對蒸半日晒乾取用時珍曰今人多去皮剉酒洗晒乾用

氣味辛平無毒

別錄曰苦溫普曰神農辛黃帝岐伯桐君苦無毒李當

大美權曰苦有小毒元素曰大苦辛寒陰也泄也之才曰

殷孽為之使殺雄黃毒惡細

王治

風寒溫瘧熱氣諸癰除邪利大小便

本經

療水腫風腫去膀胱熱傷寒氣邪氣中風手腳癱瘓通腰利

利

九竅止渴散癰腫惡瘡

別治渴風口面渴斜手足拘痛散留瘀肺氣喘嗽

甄氏曰治中下渴熱腫澆脚氣行十二經元本防

九竅止渴散

癰腫惡瘡

別治渴

風口面渴

斜手足拘痛

散留瘀

肺氣喘嗽

甄氏曰

治中下渴熱

腫澆脚氣

行十二經

元本防

已

主

治

男

女

肢

節

中

風

毒

風

不語

散結氣

擁腫

溫瘧

風水腫

去膀胱熱

熱

熱

已草龍膽為君黃藥知母甘草佐之防己乃太陽本經藥也吳曰本草十劑云通可去滯通草防己之屬是也夫防己大苦寒能瀉血中濕熱通其滯塞亦能瀉大便補陰瀉陽助秋冬春夏之藥也比之於人則險而健者也辛炎熱禍能首為亂階若善用之亦可敵兇突險此瞑眩之藥也故聖人存而不廢大抵聞其臭則可惡下咽則令人身心煩亂飲食減少至于十一經有濕熱壅塞不通及下注脚氣除膀胱積熱而底其基本非此藥不可真行經之仙藥無可代之者若夫飲食勞倦陰虛生內熱元氣耗食已虧以防己泄大便則重亡其血此不可用一也如人大渴引飲是熱在上焦肺經氣分宜泄而防己乃下焦血分藥此不可用二也外傷風寒邪傳肺經氣分濕熱而小便黃赤乃至不通此上焦氣病禁用血藥此不可用三也大抵上焦濕熱者皆不可用下焦濕熱流入十二經致二陰不通者

然後審附方舊三新九皮水附腫按之沒指不惡風水氣在皮膚中四肢蟲蟲動者防已伏苓湯主之防已黃芪桂枝各三兩茯苓六兩甘草三兩每服一兩水一升煎半升服日一服

汗出身重脉浮而用之

之防已一兩黃芪二兩二錢半白朮七錢半炙甘草半兩剉散每服五錢生薑四片棗一枚水一盞半煎八分溫服良久再服腹痛加芍藥仲景方

風濕相搏關節沉痛微腫咀水五升煎二升半膈間支飲其人喘滿心下痞堅面黎黑其脉沉緊得之數十日醫吐下之不愈木防已湯主之虛者即愈實者三日

分三服千金方脇間支飲復與之不愈去石膏加茯苓芒消主之用木防已三兩人參四兩桂枝二兩石膏雞子大十二枚水六升煮二升分服

張仲景方傷寒喘急防已參等分為末桑白湯服二錢不拘老小肺痿喘嗽煎七八分細呷儒門事親肺痿咯血米飲下每服一錢古今錄驗方鼻衄不止生防已末新汲水服二錢霍亂吐利防已白芷等分為末新汲水服二錢聖惠方目睛暴痛防已酒浸三次為末每一解雄黃毒汁服之

實主滯膈培研煎飲代茶附

后

通草

本經釋名木通士卒本丁翁萬年藤甄權子名蘆蕷

時珍曰有細細孔兩頭皆通故名通草即今所謂木通也今之通草乃古之通脫木也宋本草混注為一名實相亂今分出之集解別錄曰

通草生

石城山谷及山陽正月二月采枝陰乾弘景曰今出近道連樹藤生汁白莖有細孔兩頭皆通含一頭吹之則氣出彼頭者良或云即蒿藤莖也恭曰此物大者徑三寸每莖節有二三枝枝頭有五葉子長三四寸核黑熟白食之甘美南人謂為燕覆子或名烏覆子遇七八月采之藏器曰江東人呼為筭子江西人呼為擎子如筭子黑食之去皮蘇云色白者乃筭也頌曰今澤潞漢中江淮湖南州郡亦有之藤生蔓大如指其莖幹大者徑三寸一枝五葉頗類石葦又似芍藥三葉相對夏秋開紫花亦有白花者結實如小木瓜食之甘美即陳士良本草所謂櫻核子也其枝今人謂之木通而俗間所謂通草乃通脫木也古方所用通草皆今之木通其通脫木稀有用者或以木通為葡萄苗者非也按張氏燕吳行紀載楊州甘泉東院西廊前有通草其形如橋少葉子垂稍際如苦梗與今所說不同或別一物也時珍曰今之木通有紫白二色紫者皮厚味辛白者皮薄味淡本經言味辛別錄言味甘是二者皆能通利也氣味辛平無毒別錄曰甘權曰微寒普曰神農黃帝辛雷公苦果曰味甘而淡氣平味薄降也陽中陰也

王治除脾胃寒熱通利九竅血脉關節令人不忘去惡蟲本經療脾疸當欲眠心煩囁坐聲治耳聾散癰腫諸結不消及金瘡惡瘍鼠瘻疎折鴨鼻鼻漏

墮胎去蟲別錄治五淋利小便閉關格治人多睡主水腫浮大
權利諸經脉寒熱不通之氣說理風熱小便數急痛小腹虛滿具湯并

葱飲有効士安心除煩止渴退熱明耳目治鼻塞通小腸下水破積聚血塊排膿治瘡癥止痛推生胞女人血閉月候不勻天行時疾

頭痛目眩羸劣乳結及下乳大利大小便令人心寬下氣藏主諸瘡瘍喉痺咽痛濃煎含嚥珣通經利竅導小腸火是發明案曰本草十

通草防已之屬是也夫防已大苦寒能瀉血中濕熱之滯又通大便通草甘淡能助西方秋氣下降利小便專瀉氣滯也肺受熱邪津液

氣化之原絕則寒水斷流膀胱受濕熱癃閉約縮小便不通宜此治之其症胸中煩熱口燥舌乾咽乾大渴引飲小便淋瀝或閉塞不通

脛痠脚熱並宜通草主之凡氣味與之同者茯苓澤瀉燈草豬苓琥珀瞿麥車前子之類皆可以滲濕利小便泄其滯氣也又曰木通下

行泄小腸火利小便與琥珀同功無他藥可比時珍曰木通手厥陰心包絡手足太陽小腸膀胱之藥也故上能通心清肺治頭痛利九

竅下能泄濕熱利小便通大腸治遍身拘痛本經及別錄皆不言及利小便治淋之功甄權曰華子蠶始發楊之益其能泄丙丁之火則

肺不受邪能通水道水源既清津液自化而諸經之濕與熱皆由小便泄去故古方導赤散用之亦瀉南補北扶西抑東之意楊仁齋直指

方言人遍身胸腹隱熱疼痛拘急足冷皆是伏熱舊二附方新一心熱尿赤面赤唇乾咬牙口渴導赤散用木通生地黃炙婦人血氣木通濃

傷血血屬於心宜木通以通心竅則經絡流行也

金瘡疎折釀酒日飲鼠瘡不消上方同

盞飲之即通金瘡疎折通草煮汁

孟詵本草金瘡疎折釀酒日飲鼠瘡不消上

根王治項下癰瘤甄

子氣味甘寒無毒說曰平南人名食之之北人不知其功主治厚膔膔令人能食下三焦惡氣續五臟斷絕氣使語聲足氣通十二經脉和核食之孟除三

焦客熱冒口熱閉胃不下食士止渴利小便時良

通脫木法釋名通草綱音離南領曰爾雅離南活兒即通脫也山海經名冠脫又名倚商果曰陰竅濬而不利水腫閉象

之不行用之立通因有通草之名與木通同功嘉謨曰白蘞中藏脫木得之故名通脫集解曰通

脫木生山側葉似蕓麻其莖空心中有白瓤輕白可愛女人取以飾物俗名通草頌曰郭璞言生江南高大許
大葉似荷而肥莖中瓤正白今園圃亦有種蒔者或作蜜煎充果食之甘美時珍曰蔓生山中莖大者圍數寸氣味甘淡寒無毒果曰甘
陽中陰也主治利陰敷治五淋除水腫癰癧肺果解諸毒蟲痛蘇頌曰退熱下乳椎生汪榮明果曰通草瀉肺利小便甘平以陰緩血也與燈
草同功宜生用之時珍曰通草色白而氣寒味淡而體輕故入太陰肺經引熱下降而利小便入陽明

胃經通氣上達而下乳汁其氣寒降也其味淡升也附方新洗頭風痛新通草瓦上燒存性研末二錢熟酒下牙關緊者幹口灌之王璆百一選方

花上粉

主治諸蟲瘻瘍瘡瘍疾納之器療癰癧及胸中伏氣攻咽喉頌附錄天壽根圖經頌曰出台州每歲上貢其性

釣藤

別錄校正自木部釋名

弘景曰出建平亦作吊藤療小兒不入餘方移入此部釋名時珍曰其刺曲如釣鉤故名或作吊從簡耳集解恭曰釣藤出梁州葉細長其莖間有刺若釣鉤頌曰今秦

皆有之藤長八九尺或一二丈大如葍指其中空小人用致酒難中盜取酒以氣吸之涓涓不斷時珍曰狀如葡萄藤而有釣紫色古方多用皮后世多用鉤取其力銳爾

氣味甘微寒無毒保昇曰苦權曰甘平時珍曰初微甘後微苦平主治

兒寒熱十二驚癇

錄別小兒驚啼瘛瘲熱壅昏忤胎風權大人頭旋目眩平肝風除心熱小兒釣腹痛發斑疹時珍曰釣藤手足厥

手厥陰主火驚癇眩運皆肝風相火之病釣藤通心包于肝木

新附方三小兒驚熱釣藤一兩消石半兩甘草炙一分為散每服

風靜火息則諸證自除或云入數寸于小麥中蒸熟喂馬易肥附方三服名延齡散

聖濟錄卒得癇疾釣藤甘草炙各一錢水五合煎二合每服一錢溫酒服

錢氏方附錄倒掛藤拾遺藏器回味苦無毒主一切老血及產

每服一錢日五夜三度聖惠方斑疹不快釣藤鈎子紫草等分為末每服

附錄倒掛藤後諸疾結痛血上欲死煮汁服之生深山

有逆刺如懸鉤倒掛子樹葉尖而長

黃藤

別錄時珍曰黃藤生嶺南狀若防己俚人常服此藤

氣味甘苦平無毒主治飲食中毒利小便煮汁頓服即解時珍曰集解縱飲食有毒亦自然不發席辨刺史云甚有効

白兔藿

本經集解別錄曰生交州山谷弘景曰此藥解毒莫之與敵而人不復用不聞識者恭曰荆襄山谷今有之蔓生

白兔藿

本經集解別錄曰白葛苗似蘿藦葉圓厚莖有白毛與鬼草異用養療毒有効而交廣又有白花藤亦解毒

用根不用苗保昇曰蔓生葉圓者草人葉
州北汝州南岡上有五月六月采苗日乾
氣味苦平無毒主治蛇虺蜂蠍狗肉盜毒鬼疰風症諸大毒不可入口者食消除之又去

哥木番禹上立清毒入腹煮汁飲即解經
本風邪熱極汁飲搗不傳諸毒妙李

白花藤

唐本草集解恭曰生嶺南交州廣州平澤苗似野葛葉似文貞莖俱無毛而白花其根似葛而骨柔皮厚肉白大療毒用根不

白花藤味甘采得氣味苦寒無毒主治解諸藥物中毒瀆酒主虛勞風熱唐發明時珍曰蘇言用根雷公用苗都可用爾按葛洪肘后去根細剉陰乾用

多不即覺漸不能食或心中漸脹先似癟急含白銀一宿變色者即是也銀青是藍藥銀黃亦是箇藥蘭音混草名也但

取白花藤四兩出雋州者為上不得取近野葛生者洗切同乾藍寶四兩水七升煮取半空腹頓服少悶勿怪其毒即解

白英

本經上品校正錄鬼目錄名穀菜別錄白草上白幕遺排風子名鬼目子形別錄有名未用復出鬼目雖苗子不同實一物也故併之

集解別錄曰白英生益州山谷春采葉夏采莖秋采花冬采根又曰鬼目一名來甘實亦如五味十月采弘景曰鬼目俗人呼為白草子是矣又曰白英方藥不復用此有射葵花益州乃有苦菜土人專食之充健無病疑或是此恭曰白英鬼目草也蔓生葉似王爪小長而五棱實圓若龍葵子生青熟紫東人謂之白草陶云白草似識之而不力辨藏器曰白英鬼目草也蔓生三月延長爾雅名符郭璞曰似葛葉有毛子赤色如耳璫珠若云子黑誤矣江東夏月取其莖葉煮粥食極解熱毒時珍曰此俗名排風子是也正月生苗白色可食秋開小白花子如龍葵子熟時紫赤色吳志云孫昉時有鬼目菜緣棗樹長丈餘葉廣四寸厚三分人皆異之即此物也又羊蹄草一名鬼目嶺南有木果亦名鬼目葉似楮子大如鴨子七八月熟黃色味酸可食皆與此同名異物也

根苗氣味甘寒無毒主治寒熱入痘瘡補中益氣久服輕身延年本葉作姜飲其療勞瘵煩熱風癧丹毒瘡瘍寒熱小兒結熱毒

汁飲之器鬼目子氣味酸平無毒主治明目附方新目赤頭旋眼花面腫風熱上攻用排風子焙甘草炙菊花焙

蘿藦

唐本校正錄鬼目錄附方一赤頭旋眼花面腫風熱上攻用排風子焙甘草炙菊花焙
併入拾遺名譜音貴芝蘭詩自環藤拾實名惟瓢陸研合子拾羊蹄奶網婆婆鍼綠色藏器曰漢高帝用子傅軍士金瘡

研合子遺羊蹄草

之說也其實微時有漿裂時如瓢故有雀瓢羊婆奶奶之稱其中一子集解弘景曰蘿藦作膠生摘之有白乳汁人家多種之葉厚而大可有一條白絨長二寸許俗呼婆婆鍼線包又名婆婆鍼袋兒也氣強盛陰道與枸杞葉同也恭曰按陸機詩疏云蘿藦一名茺蘭幽州謂之雀瓢然雀瓢是女青別名也蘿藦似女青故亦名雀瓢女青葉似蘿藦兩葉相對子似瓢形大如棗許故名雀瓢根似白薇莖葉並臭生平澤別錄云葉嫩時似蘿藦圓端大莖實黑藏器曰蘿藦東人呼為白環藤生籬落間折之有白汁一名雀瓢其女青終非白環二物相似不能分別又曰所合子作藤生蔓延籬落間至秋霜合子如柳絮一名雞腸一名董葵時珍曰研合子即蘿藦子也三月生苗蔓延籬垣極易繁衍其根白軟其莖長而後入前尖根與莖葉斷之皆有白乳如構汁六月開小長花如鈴狀紫白色結實長二三十大如馬兜鈴一頭尖其殼青軟中有白絨及漿霜后枯裂則子飛其子輕薄亦如鳩鈴子商人取其絨作坐墊代綿云甚輕暖詩云茺蘭之支童子佩茺蘭之葉童子佩蹀躞音畦解結角雖也此物實尖垂于支間似之舞音涉張弓指強也此葉后萼似之故以比興也一種莖葉及花皆似蘿藦但根具根蒂結子圓大如豆生青熟赤為異此則蘇恭所謂女青似蘿藦陳藏器所謂一物相似者也蘇恭言其根似白薇子似瓢形則誤矣當從陳說此乃藤生女青與蛇虧根之女青名同物異宜互攻之

子

葉味甘辛溫無毒時珍曰甘微辛

王治虛榮補益精氣強陰道葉食功同子

唐橘子傳金瘡生膚止血搗葉傅腫毒

功同子

本橘子傳金瘡生膚止血搗葉傅腫毒

功同子

唐橘子傳金瘡生膚止血搗葉傅腫毒

功同子

本橘子傳金瘡生膚止血搗葉傅腫毒

功同子

腫及蛇蟲毒即消蜘蛛傷頻治不愈者搗封二度能爛絲毒即化作膿也

時珍附方新

二補益虛損

極虛勞用蘿藦四兩枸杞根及五味子柏子仁酸棗仁乾地黃各三兩為末

每服方寸匕酒下

損傷血出痛不可忍用雞上婆婆鍼袋兒

擂水服渣罨瘡口立効

袖珍

赤地利

草

唐李校正併入拾遺

釋名辟荔

綱目

五毒草

拾遺

拾遺

拾遺

拾遺

拾遺

拾遺

拾遺

拾遺

回所在皆有今惟華山有之春夏生苗作蔓繞草木上莖赤葉青似蕎麥葉七月開白花亦如蕎麥結子青色根若菝葜皮紫赤肉黃赤

八月采根晒乾收藏器曰五毒草生江東平地花葉並如蕎麥根堅硬似狗脊亦名蛇箇名同物異時珍曰五毒草即赤地利今併為一

根修治

數日人采得細剉用藍葉并根同入

氣味苦平無毒

藏器曰酸

平伏丹砂

王治赤白冷熱諸瘻斷血破血帶下赤白生肌肉

唐王豐通惡

瘡毒腫赤白游癰蟲蠶蛇大咬並醋磨傅之亦擣葉搗傳之殺毒人腹煮汁飲

時珍曰唐張仲文備急方治赤黃白等刺癰
草九方中用之則其功長于涼血解毒可知矣附

方舊二小兒熱瘡者赤地利末粉之大瘡減癥赤地利末油

身面皆有如火燒者亦地利末粉之大瘡減癥赤地利末油

紫葛

唐本草

集解吳恭曰生山谷中苗似葡萄長丈許根紫色大者徑二三寸保昇曰所在皆有今出雍州葉似蘿蔓根紫色

八月采

根度日乾大明曰紫葛有二種此是藤生者頌曰今惟江寧府及台州生之春生冬枯似葡萄而紫色

根皮

氣味甘苦寒無毒

大明日苦滑今燒灰制消石

主治癰腫惡瘡搗末醋和封之

恭主癰癧蠶毒并熱痛風通小腸

大明生肌散血

時珍附方二舊產

后煩渴

血氣上冲也紫葛三兩水

升煎一升去滓呷之

金瘡傷損

生肌破血用紫葛二兩順流水三盞煎

一盞半分三服酒煎亦妙並經効方

烏蔹莓

唐本草釋名五葉蕷草同

引爾雅同

赤葛同

五爪龍同

赤瀉藤同

時珍曰五葉如白蔹故曰烏蔹俗名五爪龍江東呼龍尾

景曰五葉每生蘿蔔間作藤搗根傅體齧有効攀曰蔓生平澤葉似白蔹四月五月采之保昇曰莖端五葉開花青白色所在有

葉黃色四出結實大如龍葵子生青熟紫內有細子其根白色大者如指長二尺擣之多

氣味酸苦寒無毒主治癰瘍瘡腫惡瘡根

延滑傳滋醫學集成謂即紫葛楊起簡便方謂即老鴟眼睛草牛門方謂即何首烏並誤矣

時珍曰龍尾

根皮

新附方五

小便尿血

五葉藤陰乾為末每服二錢白湯下衛生易簡方

口喫鹽入好酒一盞絞汁熱服取汁以渣傅之即散

傳之弘風毒熱腫游丹搗傳并飲汁

恭涼血解毒利小便根搗酒服消癰腫神妙

時珍附方五

小便尿血

五葉藤陰乾為末每服二錢白湯下衛生易簡方

口喫鹽入好酒一盞絞汁熱服取汁以渣傅之即散

一塊搗爛入好酒一盞絞汁熱服取汁以渣傅之即散

可壽域神方跌撲損傷酒服之取汗簡便方

葎草

唐本草校正

併入有名草錄萬草別經

葉草

未用勑草錄萬草別經

葉草

麻而小且薄蔓生有細刺亦名葛葎蔓古方亦時用之保昇曰野處多有之黃似大麻花黃白色子若大麻子俗名葛勒蔓夏采莖葉曝乾用別錄曰勒草生山谷如桔梗時珍曰二月生苗莖有細刺葉對節生一葉五尖微似毛麻而有細齒八九月開細紫花成簇結子狀如黃麻子氣味苦寒無毒主治勒草主瘀血止精益氣別錄曰蓮草主五淋利小便止水痢除瘧症熱渴者汁或生擣汁服生汁一合服治傷寒汗後虛熱宗頭痛膏淋久痢癩癰頌潤三焦消五穀益五臟除九蟲辟溫疫傳蛇蠍傷時方舊三小便石淋葛葎掘出根攢斷以益于范汪方小便膏淋葎草搗生汁三升酢二合尿血淋滲上產婦汗血同沾衣赤色方同上久痢成疳葛勒蔓以管吹入肛門中不遇數次如神新久瘧疾用葛葎一名勒蔓去兩頭秋冬用乾者恒山木等分以淡漬水一盞分二服以吐痰愈遍體癩瘡葎草一握大盞浸藥星月下露一宿五更前以水二石煮取一石清半煎分三服以吐痰愈遍體癩瘡之不過三作愈並草面獨行方治癩瘡葛葎草三秤切洗益母半盞水煎服半盞分三服以水二石五斗煮取一石五斗去滓入瓮中浸浴一時方出坐密室中又復湯浴一時乃出暖卧取汗勿令見風明日又浴如浴時癩瘡不可忍勿搔動少頃漸定后隔三日一作以愈為度聖濟錄

年桃本經本品釋名桃本經羊膚同華楚爾雅音姚七或作御弋細子詳集解別錄曰年桃生山林川谷及田野二月采陰乾引是曰山野多有勝似家桃又非山桃花甚赤子小細而苦不堪食詩云隰有苌楚即此方藥不復用保昇曰生平澤中處處有之苗長而弱不能為樹葉花皆似桃子細如棗核令人呼為細子根似牡丹也郭璞云羊桃葉似桃其花白色子如小麥亦似桃形陸機詩疏云葉長而狹花紫赤色其枝莖弱過一尺引蔓于草上今人以為沒澀重而善沒不如楊柳也近下根刀切其皮者熟灰中脫之可茹葉管也時珍曰羊桃莖大如指似樹而弱如蔓春長嫩條赤軟葉大如掌上綠下白有毛狀如芋麻而圓其條浸水有澀滑

莖根氣味苦寒有毒藏器曰甘無毒主治瘧熱身暴赤色除小兒熱風水積聚惡瘻經去五臟五水腹利小便蕁麻可作湯錄煮汁洗風瘻及諸瘡腫極効本草附方舊一傷寒癰瘻四肢煩疼不食多睡羊桃十斤搗熟浸熱湯二升日正午時入坐一坎久不過三次愈千金傷寒毒攻手足腫煮汁入少鹽清之財後水氣鼓脹大小便滯羊桃根桑白皮木通大戟炒各半水剉水一斗者五升熟如稀湯每空心茶服一匙二便利食渴補之聖惠方蜘蛛咬毒羊桃葉搗傅之立愈備急方

絡石

本經釋名石鱗吳普作
上品石鱗鱗石

石龍參別列

同耐冬恭

雲花普

雲丹普石血恭

雲珠別錄又名畧石領石明石石頭恭

曰俗名耐石血療產後

之石血療產後

血結大良也

集解

別錄曰絡石生太山山谷或石山之陰或高山巖石上或生人間五月采紅景曰不識此藥方法無用者或云是石

間者葉細厚而圓短遠樹生者葉大而薄人家亦種之為飾保昇曰所在有之生木石間凌冬不凋葉似細橘葉莖節著處即生根鬚包絡石旁花白子裏六月七月采莖葉日乾藏器曰在石者良在木者墮木性有功與蘇恭相似更有石血地錦等十餘種綠色皆主風血暖腰脚變白不老蘇恭言石血即絡石殊誤矣絡石葉圓正青石血葉尖一頭亦色時珍曰絡石帖石而生其蔓折之有白汁其葉小子指頭厚實木強面青背淡濁而不光有尖葉圓葉二種功用相同蓋一物也蘇恭所說不誤但又詳耳

莖葉

修治雷曰凡采得用粗布揩去毛子

以熟甘草水浸一伏時切晒用

氣味苦溫無毒

別錄曰微寒普曰神農苦一溫雷公苦平無毒扁鵲桐君苦無毒當之曰

惡鐵落畏貝母

主治風熱死肌癰傷口乾舌焦癰腫不消喉舌腫閉

水漿不下本大驚入腹除邪氣養脣腰體痛堅筋利關節久服

昌蒲殺肉蠶毒

大寒藥中君也采無時時珍曰味甘微酸不苦之才曰杜仲牡丹為之使

器

蟲蛇瘧毒心悶服汁并洗方斧傷瘡傳立瘥

恭

發明時珍曰絡石性

質耐久氣味平

和神農列之上品李當之稱為藥中之君其功主筋骨關節風熱癰腫癰白耐老即醫家少知用者豈以其近時而忽之耶服之當酒

耳仁存堂方云小便白濁緣心腎不濟或由酒色遂至已甚謂之上溫蓋有虛熱而腎不足故土邪干水史載之言夏則土燥水濁冬則

土堅水清即此理也醫者往往攻補其疾反甚惟服博金散則水火既濟源潔而流

附方舊二

一小便白濁方見

瘧月塞

喘息不通須臾欲絕神驗方用

絡石草一兩水一升煎一大盞細

細呷之少項即通外臺祕要

癰疽煩痛止痛靈寶散用兒搗腰生竹籜陰陽石岸間絡石而生者好絡木者無用其藤系細兩葉相

對形生三角用莖葉一兩洗晒不見火皂莢刺一兩新瓦炒黃甘草節半兩大瓜莖一個取

仁炒香乳香沒藥各二錢每服一盞

酒半盞慢火煎至一盞溫服

外科精要

木蓮

拾釋名辟荔拾

木餛頭網

鬼餛頭目

豆萬音壁利木

詳山海經作草荔

集解

三寸厚苦石草生子似蓮房打破有白汁停久如漆中有

細子一年一熟子亦入藥采無時頌曰辟荔絡石極相類莖葉粗大如藤狀木蓮更大于絡石其實若蓮房時珍曰木蓮延樹木垣牆而生四時不凋厚葉堅强大于絡石不花而實實大如盃微似蓮蓬而稍長正如無花果之生者六七月實內空而紅八月後則滿腹細子大如棋子一子一粒其味微澀其根虛輕烏鵲食皆食之

葉氣味酸平無毒主治百癰乾服之下痢即愈

頌

主風暖腰脚變白不衰

器

治血淋癆腰藥一握甘草炙一分煎服之

時發

日慎微曰圖經言辟荔治背瘡近月宣興縣一老舉人年七十餘患發背村中無醫藥急取辟荔

葉爛研絞汁和蜜飲數升以治傳之後用他藥傳帖遂愈其功實在辟荔乃知圖經之言不妄

藤汁主治風癓風瘡風惡瘡疥癬塗天木蓮氣味甘平潛無毒

時珍曰領南人

明治壯陽道尤勝

頌

固精消腫散止血下乳

治久痢腸痔心痛陰癩

時方

新篤學遺精木饅頭炒白牽牛等分爲末每服

人參懷遺精木饅頭炒白牽牛等分爲末每服

二錢用米飲調下

乾坤秘鑑

陰瘻囊腫木蓮即木饅頭燒研酒服二錢又方木饅頭

箇酒利腸風

黑散子治風入臟或食毒積熱大便鮮血疼痛肛出或久患酒痢木饅頭燒研酒服二錢

又方木饅頭

二錢用米飲調下

乾坤秘鑑

陰瘻囊腫木蓮即木饅頭燒研酒服二錢又方木饅頭

楊僕家

大腸脫下

木饅頭連皮子切炒

炒茶等分分爲末每服

萬氏和濁局方

大腸風血下等分爲末每服二錢水一盞煎服

通木連一個猪前蹄一個爛煮食之并飲汁盡一

附錄地錦

拾遺藏器曰味甘溫無毒主破老血產後血結婦人瘦損不能飲食腹中有

藤蔓着地節齊有根亦緣樹石冬月不死山人產後用之

一名地蠶時珍曰別有地錦草與此不同見草之六

扶芳藤

拾遺名淨藤集解

藏器曰生吳郡藤苗小時如絡石蔓延樹木山人取楓樹上者用亦如桑

莖葉氣味苦小溫無毒主治一切血一切氣一切冷大風腰腳去百病久服延年變白不老剉細浸酒飲

器

常春藤

拾遺釋名土鼓藤拾龍鱗薛方日華藏器曰小兒取其藤於地打作遺遺故名土鼓李邕改為常春藤

集解藏器曰生林薄間作蔓繞草木上其葉頭尖結子正圓熟時如珠碧色

氣味苦葉草甘

濕毒主治風血羸老腹內諸冷血閉強腰脚癱白煮服浸酒丸散

藏器

凡一切癰疽腫毒初起取葉搗研汁和酒溫服利下惡物去

其根本時珍外附方新丁瘡凹

用髮經剝住將尖葉碎搗汁和蜜一勺

盞服之外以葱薑搗傅四圍聖惠方血止

龍鱗薛荔研水

飲之

聖濟錄

千歲蘿

別錄上品校正

併入有名未

釋名

葛蘿別錄

葛蘿

拾遺藏器曰此藤冬只凋

集解

別錄曰千歲蘿生太山谷弘景曰藤生如葡萄

數處須之藏器曰蔓似葛葉下白其子赤條中有白汁陸機草木疏云一名葛瓜連蔓而生蔓白子赤可食酢而不美幽州人謂之推蔓毛詩云葛蘿注云似葛之草蘿恭謂為蘿蘿深是妄言頌曰處處有之藤生蔓延木上葉如葡萄而小四月摘其莖汁白而味甘五月開花七月結實八月采子青黑微赤冬惟凋葉春夏間取汁用陶陳二氏所說得之宋興曰唐開元末訪隱民姜撫年幾百歲召至集賢院

言服常春藤使白髮還黑長生可致藤生太湖終南帝遣使多取以賜老臣詔天下使自水之擢撫銀青光祿大夫號冲和先生又言終南山有旱鷄餌之延年狀類葛粉帝取之作湯餅賜大臣右驍騎將軍甘守誠云常春蘿乃千歲蘿也早鷄乃杜蒙也方家久不用故撫

易名以神之民以酒漬藤飲之多暴死乃止撫內懃乃請求華山遂逃去令書此以備世疑時珍曰按千歲蘿原無常春之名惟陳藏

器本草土鼓藤下言李邕名為常春藤浸酒服羸老變白則撫所用乃土鼓藤也其葉與千歲蘿不同或名同耳

正誤見果部

腹真下

氣味甘平無毒

治補五臟益氣續筋骨長肌肉去諸癰久服輕

身不饑耐老通神明別

藁根主治緩筋骨通

忍冬

別錄上品釋名金銀藤目聳聳藤目聳聳藤目左繩藤目金釵股

綱目通靈草土密補月忍冬時珍曰

處處有之

藤生凌冬不凋故名

而藤左纏故有金銀鴛鴦以下諸名金釵股貴其功也王宿

真君云密補藤陰草也取汁能伏硫制汞故有通靈之稱

集解

別錄曰忍冬十二月采陰乾恭曰藤生燒覆草木上莖苗紫赤色宿蔓

有薄皮膜之其嫩莖有毛葉似胡豆亦上下有毛花白藥紫令人或以

結石當之非矣時珍曰忍冬在處有之附樹延蔓莖微紫色對節生葉葉似薜荔而青有澑毛三四月開花長寸許一蒂兩花一瓣一大一小如半邊狀長蕊花初開者紫瓣俱色白經二三日則色變黃新舊相交黃白相映故呼金銀花氣甚芬芳四月采花陰乾腹葉不拘時采氣味甘溫無毒權曰辛藏器曰小陰乾寒二者溫非也

主治寒熱身腫久服輕身長年無害

錄治腹脹滿能止氣下澼

氣水痢濃煎服

治飛

蟲

器

藥

治

瘧

疾

症

尸遁戶風戶沉戶口注鬼擊一切風濕癰疽諸腫毒癰疽疥癬楊梅諸惡瘡散熱解毒

時發明

弘景曰忍冬煮汁釀酒飲補虛療風此既

之草人多不肯為之更求難得者貴遠賤近庸人之情也時珍曰忍冬莖葉及花功用皆同昔人稱其治風除張解利逐戶為要藥而後

世不復知用後世稱其消腫散毒治瘡為要藥而昔人並未言及乃知古今之理萬變不同未可一輒論也按陳自明外科精要云忍冬

酒治癰疽發背初發便當服此甚効甚奇勝于紅內消洪內輸邁沈內輸括諸方所載甚詳如痘醫丹陽僧江西僧鑒清金陵王

琪王尉子駿海州劉秀才純臣等所載療癰疽發背經効奇方皆是此物故張相公云誰知至賤之中乃有殊常之効此類也

附方一

舊

藥

治

瘧

疾

症

新十忍冬酒治癰疽發背不問發在何處發眉發頤或頭或項或背或腰或腸或乳或手足皆有奇効鄉落之間僻陋之所貧乏之中藥

材難得但虔心服之俟其疽破仍以神異膏貼之

甚効甚妙用忍冬藤生取一把以葉入沙盆研爛入生餅子酒少許稀稠

得所塗于四圍中留

一口洩氣其藤只用五兩木槌搗不可犯鐵大甘草節生用一兩同入沙盆內以水二盞文武火慢煎至一盞入

無灰好酒一大盞再煎十數沸去滓分為三服一日一夜啜盡病勢重者一日二劑服至大小腸通利則藥方到沈內輸

云如無生者只

用乾者然力終不及生者

忍冬圓

治消渴愈後預防發癰疽先宜服此用忍冬草根莖花葉皆可不拘多少入瓶內以無灰好酒浸以糠

大熗一宿取出生丸入甘草少許研為細末以浸藥酒打麪糊丸梧子大每服五十丸至百丸湯酒任

下此藥不特治癰疽大

方同

外

科

精

要

五痔諸瘻上一切腫毒

不問已潰未潰或初起發熱用

金銀花俗名甜藤米花連莖葉自然汁半盞

萬表精

臺方

丁瘡便毒

方同喉痺乳蛾上敷腫拔毒金銀藤大者燒存性葉焙乾為末各二錢大黃焙為末四錢

凡腫毒初發以水酒調搽四圍留心溴氣

楊誠經驗方

瘡疽托裏

治瘡疽發背腸離奶奶無名腫毒

實服之未成者內消已成者即潰忍冬葉黃芩各五兩當歸一兩甘草八錢為

細末每服二錢酒一盞半煎一盞隨病二下服日再服以渣傅之

和濟局方

惡瘡不愈在纏藤一把搗爛入雄黃五分水二升瓦礫煎

三時久出黃水後用

選奇方輕粉毒癰方同

瘡久成漏忍冬草浸酒日常熱毒血痢飲

聖惠方五腫戶注

飛尸者遊走皮膚洞穿臟腑每發刺痛變動不常也遁尸者附

生肌藥取効選奇方輕粉毒癰方同

瘡久成漏忍冬草浸酒日常

熱毒血痢飲

聖惠方五腫戶注

飛尸者遊走皮膚洞穿臟腑每

發刺痛變動不常也遁尸者附

骨入肉攻鑿血脉每發不可見死尸聞哀哭便作也風尸者沿蹠四末不知痛之所在每發恍惚得風雪便作也況尸者縛結臍肺冲引心腸每發絞切遇寒冷便作也尸注者舉身沉重精神錯雜常覺奇癱每節氣至則大作也並是身中尸鬼引接外邪宜用忍冬草葉剉數斛煮取濃汁煎稠每服雞子大許溫酒化下一日二三服。肘後方。鬼擊身毒。作痛用金銀花一兩水煎。腳氣作痛筋骨引痛鷺鷥藤即金銀花為末每服二錢熱酒調下。衛生易簡方。中野薯。急鴛鴦草咬之即今忍冬。口舌生瘡赤梗密補藤高脚地銅盤馬蹄香等分以法遵夷堅志。口舌生瘡酒搗汁雞毛刷上取涎出即愈。普濟方。忍冬膏。治諸般腫瘡金刀傷瘡惡瘡用金銀藤四兩吸鐵石三錢香油一斤熬枯去滓入黃丹八兩待熬至滴水不散如常摊用。

乾坤秘鑑

甘藤

宋善言

校正

自木部移入此

名甜藤

祐感藤

皆此類

並附之忍冬

一名甜藤與此不同

集角

己研斷吹之

氣出一頭其汁甘美如蜜

汁氣杳平無毒

海瀉中

無毒

諸病久服調中溫補令人肥健好顏色

天明日止

消渴潤五臟除腹內諸冷

餌食甜美止泄又治剝馬血毒入肉及狂犬牛馬熟黃傳

蛟蛇瘡又

有小葉尖長氣辛臭者搗傅小兒腹中門辟

含水藤

海瀉中

無毒

諸病久服調中溫補令人肥健好顏色

天明日止

消渴潤五臟除腹內諸冷

餌食甜美止泄又治剝馬血毒入肉及狂犬牛馬熟黃傳

蛟蛇瘡又

有小葉尖長氣辛臭者搗傅小兒腹中門辟

含水藤

校正

自木部移入此

名甜藤

祐感藤

皆此類

並附之忍冬

一名甜藤與此不同

集角

己研斷吹之

氣出一頭其汁甘美如蜜

水燭皮

敗藏器

人體有損痛

沐髮令長

時珍

附錄

蠶藤

拾遺

名

蠶藤

拾遺

藏器

曰生

江南山林下

蔓如葛

味甘寒

無毒

諸病久服調中溫補令人肥健

搗汁和米粉作糗

餌食甜美止泄

又治剝馬血毒入肉及狂犬牛馬熟黃傳

蛟蛇瘡又

有小葉尖長氣辛臭者搗傅小兒腹中門辟

藤中水

氣杳平無毒

藏器

主治解煩渴

心躁瘡癰丹石發動亦宜服之

李止渴潤五臟去濕火行時氣利小便其葉搗傅中

水燭皮

敗藏器

人體有損痛

沐髮令長

廣州記

附錄

蠶藤

拾遺

名

蠶藤

拾遺

藏器

曰生

海南山谷

作藤繞樹莖葉滑淨似枸杞花白有節心虛苗頭有毛被人食

之如甘葵味甘溫無毒主丈夫五勞七傷陰痿益陽道小便數白腰腳痛令除風氣壯筋骨補衰老好顏色濃者服之取微汗亦浸酒服性溫稍令人悶無苦也

天仙藤

宋圖經

集解頌曰生江淮及浙東山中春生苗蔓作藤葉似蕎麥圓而氣味苦溫無毒主治解風勞同麻黃治傷寒發汗同大黃

墮胎氣

蕪

頌流氣活血治心腹痛時新

附方六

疝氣作痛天仙藤一兩好酒一盃者至半

珍服之神効

孫天仁集効方痰注臂痛天仙藤白朮羌活白芷各三錢片子薑黃六錢半夏製五錢每服五錢薑五片水煎服仍間服千金五套餐妊娠水腫始自兩足漸至喘悶似水足趾出水謂之子氣乃婦人素有風氣或衝任有血風不可作水妄投湯藥

丸

楊仁齋直指方

妊娠水腫宜天仙藤散主之天仙藤洗微炒香附子炒陳皮甘草烏藥等分為末每服三錢水一大盞薑三片木瓜三片紫蘿三葉煎至七分空心服一日三服小便利氣脈通腫漸消不須

多服

此乃淮南名醫陳景初秘方也得于李伯時家

陳自明婦人良方產後腹痛兒枕痛天仙藤五兩炒焦為末每服炒生薑

多服

此乃淮南名醫陳景初秘方也得于李伯時家

陳自明婦人良方

產後腹痛兒枕痛天仙藤五兩炒焦為末每服炒生薑

汁童子小便和細酒調服

經驗婦人方

一切

無氣

腹痛即上方市熟鼻瘡

桐油入黃連末用天仙藤燒熱油傳之

摘玄方

紫金藤

宋圖經

集解頌曰生福州山中春初發葉青色至冬凋落其藤似枯條米皮晒乾

氣味缺

主治丈夫腎氣虛

頌消損燬血搗傅頭瘡腫毒

時新

附方二

紫金藤

補腎臟暖丹田興陽道咸小便填精髓駐顏色潤筋肉治元氣虛面目黎黑口乾舌濶夢想虛驚耳鳴目淚腰膝沉重百節酸

茱萸高良薑肉桂青鹽各二兩為末酒糊丸梧子大每服酒下二十九日三服

和濟方

死胎不下紫金藤葵根各七錢土牛膝三兩上當歸四錢肉桂二錢麝香三分為末

木米糊丸梧子大研砂為衣每服五十丸乳香湯下極驗

葛靜觀方

南藤

宋開寶

校正自木部移入此併入有名未錄

圖

集解別錄曰丁公寄生石間蔓逕木上葉細大枝赤莖甚大如磧黃有汁七月采頌曰南藤即丁公藤也生南山谷今泉州榮州有

之細藤圓臍紫綠色一節一葉葉深綠色似杏葉而微短厚其莖貼樹

氣味辛溫無毒

別錄曰生依南樹故號南藤叢器曰丁公寄

錄

南藤

宋開寶

校正自木部移入此併入有名未錄

圖

集解別錄曰丁公寄生石間蔓逕木上葉細大枝赤莖甚大如磧黃有汁七月采頌曰南藤即丁公藤也生南山谷今泉州榮州有

之細藤圓臍紫綠色一節一葉葉深綠色似杏葉而微短厚其莖貼樹

氣味辛溫無毒

別錄曰生依南樹故號南藤叢器曰丁公寄

錄

南藤

宋開寶

校正自木部移入此併入有名未錄

圖

集解別錄曰丁公寄生石間蔓逕木上葉細大枝赤莖甚大如磧黃有汁七月采頌曰南藤即丁公藤也生南山谷今泉州榮州有

之細藤圓臍紫綠色一節一葉葉深綠色似杏葉而微短厚其莖貼樹

氣味辛溫無毒

別錄曰生依南樹故號南藤叢器曰丁公寄

錄

南藤

宋開寶

校正自木部移入此併入有名未錄

圖

集解別錄曰丁公寄生石間蔓逕木上葉細大枝赤莖甚大如磧黃有汁七月采頌曰南藤即丁公藤也生南山谷今泉州榮州有

之細藤圓臍紫綠色一節一葉葉深綠色似杏葉而微短厚其莖貼樹

氣味辛溫無毒

別錄曰生依南樹故號南藤叢器曰丁公寄

錄

南藤

宋開寶

校正自木部移入此併入有名未錄

圖

集解別錄曰丁公寄生石間蔓逕木上葉細大枝赤莖甚大如磧黃有汁七月采頌曰南藤即丁公藤也生南山谷今泉州榮州有

之細藤圓臍紫綠色一節一葉葉深綠色似杏葉而微短厚其莖貼樹

氣味辛溫無毒

別錄曰生依南樹故號南藤叢器曰丁公寄

錄

強腰脚除痺癆白逐冷氣排風邪煮汁服冬月浸酒服

藏器

煮汁服治上氣欬嗽

時珍曰按南史云解叔謙雁門人母有疾夜擣閼空

藥至宜都山中見一翁伐木是丁公藤療風乃哭泣求翁并示以清酒法受畢失翁所任母服之即瘥訪醫及本草皆無此

遂愈也時珍曰近俗醫治諸風以南藤和諸藥熬膏市之號南藤膏白花蛇喜食其葉治諸風猶捷附錄方

宋圖經頌曰生崇州多在

林箐中春生莖苗莖葉俱

似丁公藤而纖細無花實九月采莖曝乾味辛溫無毒主肢節風冷筋脉急痛作湯浴之佳時珍曰楊僕家藏經驗方有烈節酒治歷節

風痛用烈節松節牛膝熟地黃當歸各一兩為粗末絹袋盛之以無灰酒二百盞浸三日每服一盞人生酒一盞溫服表弟武東叔年二

十餘患此痛不可忍涪城

馬東之以此治之而安

清風藤

宋圖經

釋名

藤

細

尋風藤

細

集解

目

述

曰

生台州

山中

春生苗蔓延木

上

四時常青土人采莖用

氣味

苦

治風疾

濕流注

筋骨

鶴膝

膝痺

瘡瘍

損傷

瘡腫入酒藥用

時珍附方

新

風濕痺

痛

入酒

一瓶

煮飲

普濟方

一切諸風

入金內微火熬七日夜成膏

收入瓶器內用時先備梳三

百稜藤

宋圖經

釋名

百靈藤

細

集解

目

述

曰

生南地深山皮赤

氣味

平

無毒

主治蛇蟲

煮汁服之齒痛打碎含之

煮粥

如指掌縛物片片自解也

氣味

平

無毒

主治蛇蟲

煮汁服之齒痛打碎含之

煮粥

如指掌縛物片片自解也

省藤

拾校正自不部遺移入此

名赤藤

細

集解

目

述

曰

生南地深山皮赤

氣味

平

無毒

主治瘧疾

煮粥

如指掌縛物片片自解也

狗去渴

藏器

治諸風通五淋殺蟲

時珍曰

赤藤善殺蟲

利小便

洪武

夷堅志

云趙子山苦寸白蟲

病醫令戒酒而素食耽之

一日寓居

腹煩宿疾遂愈

皆驚異之視所飲

水乃寺僧織草履浸紅藤根水也

附方

新

五淋澆痛

赤藤即做草鞋者

白茯苓

麻根等分

為

水

末百沸湯下每服一錢如神

究原方

腹煩宿疾遂愈

皆驚異之視所飲

之甘如飴迨晚蟲止夜席心

水乃寺僧織草履浸紅藤根水也

附方

二

五淋澆痛

赤藤即做草鞋者

白茯苓

麻根等分

為

水

末百沸湯下每服一錢如神

究原方

紫藤

宋開寶

集解

藏器曰

藤皮着樹從心重重有皮

四月生紫花可愛

長安人亦種飾庭也

江東呼為招豆

其子作角角中仁熬香

着酒中令酒不敗

敗酒中用之亦正其花

按碎拭酒醋白屬壞

氣味甘微溫有小毒

主治

煎

如糖服下水瘡病

藏器

落鴈木

海

校正

自木部釋名

珣曰

藤蘿高丈餘

雁過

皆緣其中或

集解

珣曰

按徐表南州記

云落鴈木生

南海山野中

蔓生四邊

如刀

移入此釋名

云鴈啣至代州鴈門而生

以此為名

集解

珣曰

按代州鴈門亦有之

蜀中雅州亦有

頌曰

雅州出者苗作蔓纏

大木苗葉形色大都似茶無

花實彼人四月采苗入藥用

大木苗葉形色大都似茶無

花實彼人四月采苗入藥用

莖葉氣味甘溫無毒主

治風痛傷折腳氣膿滿虛脹

粉木皮同煮汁洗之立効

又婦人陰瘡潰以椿木皮同煮汁洗之

珣曰

生資州

山谷藤繞樹木上葉似莽草葉而光厚八月九月采莖日乾

每始王木

唐本草

恭曰

生資州

山谷藤繞樹木上葉似莽草葉而光厚八月九月采莖日乾

苦平無毒主

傷折跌筋骨

血止痛

散血補血止痛酒水各半煮濃汁飲之

風延每

拾遺藏器曰

生南海山野中

他處無有也

蔓纏草木上細葉南郡賦

云風衍蔓延子衡旱是也

味苦寒無毒主小兒發熱發強驚癇寒熱熱淋利小便解煩明日並煮服之

珣曰主三消五淋下瘀小兒赤白毒痢蛇毒瘧氣一切瘡腫並宜煎服

千里及

拾校正

併入圖經

千里光

集解

人采花葉入服藥又筠州有千里光生淺山及路旁葉似菊而長背有毛枝幹圓而青春生苗秋有黃

花不結實采莖葉入服

藥名黃花演益一物也

氣味苦平有小毒

頌曰苦甘

寒無毒

主治天下疫氣結黃瘡瘍毒瘻煮汁服取吐下

搗傅蛇犬咬

藏器

同甘草煮汁飲退熱

藥名黃花演益一物也

氣味苦平有小毒

頌曰苦甘

寒無毒

主治天下疫氣結黃瘡瘍毒瘻煮汁服取吐下

搗傅蛇犬咬

藏器

同甘草煮汁飲退熱

藥名黃花演益一物也

氣味苦平有小毒

頌曰苦甘

寒無毒

主治天下疫氣結黃瘡瘍毒瘻煮汁服取吐下

搗傅蛇犬咬

藏器

同甘草煮汁飲退熱

明眞不入衆藥

種類

同小青煎服治赤痢腹痛

時珍

附方

一爛弦風眼

時珍

捨汁滴入目中

經驗良方

千里光草山斧殼葉包煨熟

珍

藤黃

海

校正

自木部

釋名

樹名海角

珣曰按郭義華廣志云出岳鄂等州諸山崖樹名海藤花有藥散落石上被人收之謂之沙黃就樹移入此

者輕妙謂之臘黃今人訛為銅黃銅綠音譌也此與石淚米之無異畫家及丹竈家時用之

時珍

曰今畫家所用藤黃皆經煎煉成者誠之麻人按周達觀真臘記云國有畫黃乃

樹脂

番人以刀斫樹枝滴下次年收之似與郭氏說微不同不知即一物否也

氣味酸澀有毒主治婦牙蛀齒點之便落

李珣曰

九種

附錄諸藤

十一

藤黃

海

校正

自木部

釋名

樹名海角

珣曰按郭義華廣志云出岳鄂等州諸山崖樹名海藤花有藥散落石上被人收之謂之沙黃就樹移入此

者輕妙謂之臘黃今人訛為銅黃銅綠音譌也此與石淚米之無異畫家及丹竈家時用之

時珍

曰今畫家所用藤黃皆經煎煉成者誠之麻人按周達觀真臘記云國有畫黃乃

樹脂

番人以刀斫樹枝滴下次年收之似與郭氏說微不同不知即一物否也

氣味酸澀有毒主治婦牙蛀齒點之便落

李珣曰

九種

附錄諸藤

十一

地龍藤

拾遺

藏器曰

生天目山

燒樹蟠屈如龍故名吳中亦有之

小異味

苦無毒主風血癱老腹內腰脚諸冷食不調不作肌膚浸酒服之

龍手藤

藏器曰

出安南浦石上向陽者葉如龍手采無時味甘溫無毒主偏風口喝

手足癱緩補虛益陽去冷氣風寒以醇酒浸近火令溫空心服之取微汗

牛領藤

主腹內

冷膝痛弱小便白數陽道乏者汁服或浸酒服

藏器曰

生深山大如樹牛好食之其中有粉味甘

溫無毒主救荒令人不饑其根食之令人髮落

鬼脯藤

藏器曰

生深山大如樹牛好食之其中有粉味甘

味苦溫無毒浸酒服去風血同葉搗傅癰腫

班珠藤

藏器曰

生山谷中不凋子如珠而班冬月取之

味甘溫無毒浸酒服主風血癱瘦婦人諸疾

息王藤

藏器曰

生嶺南山谷冬月不凋味苦溫

無毒主產後腹痛血露不盡濃者汁服

萬一藤

藏器曰

生嶺南蔓如小豆一名

萬古主蛇咬杵末水和傳之

曼遊藤

藏器曰生無為天門山谷狀如寄生着大樹葉如柳春花色紫蜀人謂之沉鴻藤味甘溫無毒久服長生延年去久嗽治癆

百丈青

諸毒物天行瘡瘍疫毒並煮汁服亦生搗汁服其根令人下利藏器曰生江南林澤藤蔓繁硬葉如薯蕷對生味苦平無毒解

溫藤

藏器曰生江南山谷有樹不凋葉味甘溫無毒浸酒服主氣血積冷

藍藤

藏器曰生新羅國根如細辛味辛溫無毒主冷氣咳嗽煮汁服

瓜藤

宋圖經頌曰生施州四時有葉無花采皮無時味甘涼無毒主諸熱毒惡瘡同刺猪苓洗去粗皮焙乾等分搗羅用甘草水調貼之

金稜藤

頌曰生施州四時有葉無花采無時味辛溫無毒主筋骨疼痛與續筋馬接脚同洗去粗皮焙乾等分為末酒服二錢無所忌

含春藤

頌曰生台州具苗延木冬夏常青葉治諸風有効

獨用藤

辛熱無毒主心氣痛和小赤頭葉焙等分研末酒服一錢

祁婆藤

頌曰生施州山中蔓延木上時常有土人采葉治諸風有効

野猪尾


頌曰生施州藤纏大木四時有葉無花味苦澀涼無毒主心氣痛解熱毒同百藥頭等分焙研為末每酒服二錢

石合草

頌曰生施州藤纏木上四時有葉無花土人采葉味甘涼無毒主一切惡瘡歎瘡口焙研溫水調貼

骨路支

拾遺藏器曰味辛平無毒主上氣浮腫水氣嘔逆婦人崩中餘血癥瘕殺三虫生昆蟲國苗似凌霄藤根如青木香安南亦有之名飛藤此條原附錄紫薇之后鈔書遺落附于此也



L69314
1888
V.17-18