

2


李氏東垣十書

Dr. Lee Ting-woon's
Methods of Treating
Disease. One of a
14th Century work in
Chinese.

Shanghai. 1906.

[C.]

Vol II



蘭室秘藏目錄

卷上

飲食勞倦門

飲食所傷論

勞倦所傷論

調中益氣湯

交泰丸

木香乾薑枳术丸

和中丸

消積滯集膏丸

黃氏當歸湯

益智和中丸

脾胃虛損論

三黃枳术丸

白术丸

中滿腹脹門

中滿腹脹論

諸腹脹大皆屬於熱論

中滿分消丸

中滿分消湯

廣茂瀆堅湯

半夏厚朴湯

破滯氣湯

草豆蔻湯

心腹痞門

消痞丸

失笑丸

黃連消痞丸

消痞湯

導應丸

胃脘痛門

草豆蔻丸

神聖復氣丸

酒客病論

葛花解醒湯

枳木丸

半夏枳木丸

橘皮枳木丸

除濕益氣丸

除濕散

升麻黃連丸

上二黃丸

瓜蒂散

消渴門

消渴論

和血益氣湯

當歸潤燥湯

生津甘露湯

辛潤緩肌湯

甘草石膏湯

甘露膏

生津甘露飲子

眼耳鼻門

諸脉者皆屬於目論

內障眼論

芎辛湯

碧天丸

廣大重明湯

百點膏

選奇湯

神効明日湯

羌活退翳膏

明日細辛湯

復明散

助陽和血湯

吹雲膏

防風飲子

撥雲湯

神効黃氏湯

圓明內樟升麻湯

黃芩黃連湯

蔓荆子湯

歸葵湯

救苦湯

熟乾地黃丸

益陰腎氣丸

羌活退翳丸

當歸龍膽湯

補陽湯

瀉陰火丸

升陽柴胡湯

溫衛湯

圓明膏

噙藥麻黃散

療本滋腎丸

加味滋腎丸

退翳膏

龍膽飲子

還睛紫金丹

羌活退翳湯

溫肺湯

禦寒湯

頭痛門

頭痛論

清空膏

川芎散

碧雲散

清上瀉火湯

細辛散

養神湯

半夏白术天麻湯

口齒咽喉門

口齒論

卷活散

麻黃散

治蟲散

蠍梢散

刷牙藥

徹清膏

白芷散

卷活清空膏

補氣湯

卷活湯

安神湯

半夏白术天麻湯

草豆蔻散

麝香散

益智木律散

白牙散

獨聖散

當歸龍膽散

牢牙地黃散

細辛散

立効散

牢牙散

清胃散

神功丸

桔梗湯又方

神驗法

嘔吐門

丁香朱萸湯

白朮湯

補肝湯

吳茱萸丸

衄血吐血門

麥門冬飲子

人參飲子

麻黃桂枝湯

黃芪芍藥湯

三黃補血湯

救肺湯

止衄血法

腰痛門

川羌肉桂湯

破血散瘀湯

地龍散

獨活湯

蒼朮湯

麻黃復前散

緩筋湯

拈痛湯

蒼朮復煎湯

羌活蒼朮湯

婦人門

經閉不行有三論

經漏不止有三論

升陽除濕湯

涼血地黃湯

酒煮當歸丸

固真丸

烏藥湯

助陽湯

水府丹

丁香膠艾湯

黃氏當歸人參湯

當歸芍藥湯

柴胡調經湯

益胃升陽湯

升陽舉經湯

半產慎用寒涼之藥論

全生活血湯

當歸附子湯

調經補真湯

坐藥龍鹽膏

勝陰丹

迴陽丹

柴胡丁香湯

延胡苦練湯

桂附湯

人參補氣湯

黃芪白朮湯

白朮茯苓湯

增味四物湯

補經固真湯

溫衛補血湯

立効散

四聖散

溫經除濕湯

補氣升陽和中湯

麻黃桂枝升麻湯

卷下

大便結燥門

大便結燥論

通幽湯

潤燥湯

潤腸丸

麻黃白朮湯

升陽湯

活血潤燥丸

潤腸湯

小便淋閉門

小便淋閉論

通關丸

導氣除燥湯

清肺飲子

腎疸湯

痔漏門

痔漏論

秦光白朮丸

七聖丸

秦光蒼朮湯

秦光羌活湯

秦光防風湯

紅花桃仁湯

當歸郁李仁湯

陰痿陰汗門

陰痿陰汗及臊臭論

龍膽瀉肝湯

清震湯

固真湯

清魂湯

椒粉散

補肝湯

溫腎湯

延胡丁香丸

瀉痢門

蘭室秘藏

目錄

五

訶子皮散

升陽去熱和血湯

升麻補胃湯

芍藥梔皮丸

益智和中湯

槐花散

和中益胃湯

黃芪補胃湯

茯苓湯

人參益胃湯

升陽除濕湯

瘡瘍門

散腫潰堅湯

升陽調經湯

連翹散堅湯

龍泉散

救苦化墻湯

柴胡連翹湯

桑桔子湯

淨液湯

消腫湯

內托養活湯

升麻托裏湯

內托黃芪湯

柴胡通經湯

白芷升麻湯

保生救苦散

一上散

聖愈湯

獨聖散

黃芪肉桂柴胡酒煎湯

雜病門

安神丸

補氣湯

柴胡升麻湯

小黃丸

補益腎肝丸

麻黃柴胡湯

除濕補氣湯

升陽湯

自汗門

自汗論

調衛湯

當歸六黃湯

活血通經湯

人參益氣湯

硃砂安神丸

當歸補血湯

火鬱湯

黃芩利膈丸

太陽經口藥

黃芪湯

參歸湯

黃連湯

補中湯

麻黃蒼朮湯

上清湯

木桂湯

正氣湯

趣痛丸

退熱湯

解表升麻湯

天麻黃芩湯

健步丸

白术除濕湯

加味四君子湯

鴻血湯

洗面藥

瑩肌如意散

面油摩風膏

小兒門

治驚論

益黃散

升陽益血湯

厚腸丸

補陽湯

大無羨湯

壘氣退黃湯

中滿分消丸

消痞丸


癰瘍論

消毒救苦散

黍粘子湯

桔梗湯

麻黃紫胡升麻湯



蘭室秘藏卷上

東垣老人 李杲 撰

明新安 吳勉學 校

飲食勞倦門

飲食所傷論

陰陽應象論云水穀之寒熱感則害人六府辨論云陰氣者靜則神藏躁則消亡飲食自倍腸胃乃傷此乃混言之也分之爲二飲也食也飲者水也無形之氣也因而大飲則氣逆形寒飲冷則傷肺病則爲喘咳爲腫滿爲水滯輕則當發汗利小便使上下分消其濕解醒湯五苓散生薑半夏枳實白朮之類是也如重而畜積爲滿者芫花大戟甘遂牽牛之屬利下之此其治也食者物也有形之血也如生氣通天論云因而飽食筋脈橫解腸澼爲痔又云食傷太陰厥陰寸口大數人迎兩倍三倍者或嘔吐或痞滿或下痢腸澼當分寒熱輕重而治之輕則內消重則除下如傷寒物者半夏神麴乾薑二稜廣木巴豆之類王之如傷熱物者枳實白朮青皮陳皮來蘖黃連大黃之類主之亦有宜吐者陰陽論云應象在上者因而出之如傷寒者不可過劑過劑則反傷腸胃蓋先因飲食自傷又加之以藥過故腸胃復傷越之瓜蒂散之屬主之然而不可過劑過劑則反傷腸胃蓋先因飲食自傷又加之以藥過故腸胃復傷而氣不能化食愈難消坐漸至羸困故五常政大論云大毒治病十去其六小毒治病十去其七凡毒治病不可過之此聖人之深戒也

勞倦所傷論

調經篇云陰虛生內熱岐伯曰有所勞倦形氣衰少穀氣不盛上焦不行下脘不通而胃氣熱熱氣薰胸中故內熱舉痛論云勞則氣耗勞則喘且汗出內外皆越故氣耗矣夫喜怒不節起居不時有所勞傷皆損其氣氣衰則火旺火旺則乘其脾土脾主四肢故因熱無氣以動懶於語言動作喘乏表熱自汗心煩不安當病之時宜安心靜坐以養其氣以甘寒瀉其熱火以酸味收其散氣以甘溫補其中氣經言勞者溫之損者溫之是也全匱要略云平人脉大為勞脉極虛亦為勞者矣夫勞之為病其脉浮大手足煩熱春夏劇秋冬差脉大者熱邪也極虛者氣消也春夏以黃氏建中湯治之此亦溫之之意也夫上古聖人刺者時助邪也秋冬差者時勝邪也以黃氏建中湯治之此亦溫之之意也夫上古聖人飲食有節起居有常不妄作勞形與神俱百歲乃去此謂治未病也今時之人去聖人久遠則不然飲食失節起居失宜妄作勞役形氣俱傷故病而後藥之是治其已病也推其百病之源皆因飲食勞倦而胃氣元氣散解不能滋榮百脉灌溉臟腑衛護周身之所致也故蒼天之氣貴清靜陽氣惡煩勞噫飲食喜怒之間寒暑起居之際可不慎歟

調中益氣湯 治因飢飽勞役損傷脾胃元氣不足其脉弦洪緩而沉按之中之下得時一渺其證四肢滿悶肢節疼痛難以屈伸身體沉重煩心不安忽肥忽瘦四肢懶倦口失滋味腹難舒伸大小便清利而數或上飲下便澀滯或夏月餐泄米穀不化或便後見血或便見白膿胸滿短氣咽膈不通痰唾稠粘口中沫食入反出耳鳴耳聾目中流火視物昏花努肉紅絲熱壅頭目不得安卧不思飲食並督治之

橘皮如腹中氣不轉連加木
一分如無此證不加

黃藥酒洗已上各二分

升麻此一味為上氣不足胃氣與脾氣下流乃補上氣從陰引陽各三

柴胡已上各三

分人參

有數者去之火甘草

蒼术

五分

黃芪一錢

如時顯熱躁是下元陰火蒸蒸然發也加生地黃

二分黃藥

三分

如大便虛坐不得或大便了而不了腹中常常逼迫皆是血虛血澀加當歸身

三分無此證則去之

如身體沉重雖小便數多亦加伏苓

一分黃藥

三分澤瀉

五分蒼术

一錢

時暫從權而去濕也不可用熟地太陰

已病其脉亦終於心中故顯溫熱相合而生煩亂

如胃氣不和加湯洗半夏

五分生薑

三片

有微者加生薑生地黃

二分

以製半夏之毒

如瘦厥頭痛非半夏不能除此足太陰脾邪所作也

如兼躁熱加黃藥生地黃

各二分

如無已上證口服前藥

右件判如麻豆大都作一服水二大盞煎去粗稍熱食透服之甯心絕慮靜坐少語藥必為効耳

如夏月須加白芍藥

三分

如春月腹中痛尤宜加

如惡熱而渴或腹痛者更加芍藥

五分生黃芩

二分

如惡寒腹痛加中桂

三分去黃芩謂之桂枝芍藥湯亦於前藥中加之

如冬月腹痛不可用芍藥益大寒之藥也口加乾薑

一分或加半夏

五分

宜以生薑少許製之

如秋冬之月胃脉四道為衝脈所逆脇下少陽脉二道而反上行名曰厥逆其證氣上衝咽不得息而喘

息有音不得卧加吳茱萸五分至一錢酒洗去節觀厥氣多少而用之亦於前藥中作一服服之
如夏月有此證為大熱也此病隨四時為寒熱溫涼也宜以黃連酒洗黃蘖酒浸知母酒浸已上各等分右
為細末熟湯為丸如梧桐子大每服一百丸或二百丸白湯送下空心服仍多飲熱湯服畢少時便以
美食壓之使不令胃中停留直至下元以鴻衝脉之邪也大抵治飲食勞倦所得之病乃虛勞七損證
也常宜以甘溫平之甘多辛少是且治也

實中喜食無厭丸一名實中進食丸資形氣喜飲食

木香五分

青皮

人參

乾生薑

以上各一錢

炙甘草

一錢五分

白茯苓

澤鴟

檳榔

橘皮

白朮

已上各二錢

縮砂仁

猪苓

已上各二錢五分

枳實

四錢

草豆蔻仁

五錢神曲

五錢五分炒

半夏

七錢

大麥蘖麵

一兩炒

右為細末湯浸餅為丸如梧桐子大每服三五十丸米湯下食達

交泰丸

升陽氣滌陰火調榮氣進飲食助精神寬腹脇除怠惰嗜卧四肢沉困不收

乾薑

炮炙三分

巴豆霜

五分

人參

去節

肉桂

去皮已上各一錢

紫胡曲

小椒

炒去汗子并開目

白朮

錢五分

厚朴

去皮膚四七錢

白茯苓

苦練

酒煮

縮砂仁

二錢已上各二錢

知母

肆錢一半酒炒

春夏用秋冬季去

川烏

炮

吳茱萸

湯先七錢五分

白角

水洗炮去皮殘

紫苑

去苗已上各六錢

黃連

減一錢五分

右除巴豆

木香人參生薑枳朮丸 開胃進飲食

乾生薑

五分

木香

三分

人參

三分

陳皮

四錢

枳實

一兩

白朮

五錢

右為細末荷葉裹燒飯

烏丸如梧桐子大每服三十九溫水送下食前

木香乾薑枳术丸 破除寒滯氣消寒飲食

木香三錢 乾薑五錢 炒白朮一兩 白朮五錢 右爲細末荷葉裹燒飯烏丸如梧桐子大每服三

五十九溫水送下食前

扶脾丸 治脾胃虛寒腹中痛溏瀉無度飲食不化

乾生薑 肉桂五分各 乾薑 霍香 紅豆一錢各 白朮 伏苓 橘皮 半

夏 蘋子皮 炙甘草 烏梅肉二錢各 大麥蘖炒

神曲炒各四錢

右爲細末荷葉燒

飯烏丸如梧桐子大每服五十丸白湯送下食前

和中丸 補胃進食

人參 乾生薑 陳皮一錢各 乾木瓜二錢 炙甘草三錢

右爲細末湯浸餅烏丸如梧桐

子大每服五十丸白湯送下食前

欖榔丸 破滯氣消飲食

炙甘草一錢 木香 人參 欖榔二錢各 陳皮五錢

右爲細末湯浸餅烏丸如梧桐

每服五十九白湯送下食前

消積滯集香丸 治傷生硬物不消

京三棱 廣皮 青皮 陳皮 丁香皮 益智 川綠子 茴香五錢各 巴

豆和梗米炒五錢 右爲細末醋糊爲丸如黍豆大每服五七丸溫水生薑湯任下食前服

黃芪湯 补胃除濕和血益血滋養元氣

木香

氣通去之

霍賈葉

已上各一錢

當歸

酒先一錢

陳皮

已上各二錢

人參

澤鴻五錢

黃芪

一錢

右咬

當歸身一錢酒先 黃芪五錢 右咬咀作一服水二大盞煎至一盞食前熱服

參术湯 治脾胃虛弱元氣不足四肢沉重食後昏悶

黃耆

浸酒先

當歸

已上各二分

柴胡

升麻三分

人参

陳皮

青皮

已上各五分

神麩

末七分

黃芪

二錢

右咬

咀都作一服水二大盞煎至一盞食達服

益智和中丸

李秋合

木香

黃連

生地

黃已上各二分

黃芪

升麻三分

柴胡

陳皮

青皮

已上各五分

神麩

末七分

黃芪

二錢

右咬

咀都作一服水二大盞煎至一盞食達服

乾生薑

陳皮

姜黃

已上各五分

縮砂仁

七分

桂花

一錢

桂枝

一錢

益智仁

二錢

炙甘草

七分

細嚼

亦當

益胃散 治因服寒藥過多以致脾胃虛損胃脘疼痛

人參

甘草

縮砂仁

厚朴

已上各二錢

白豆蔻

姜黃

乾生薑

澤鴻

三錢

益智仁

二錢

細嚼

亦當

益智仁

六錢

黃芪

陳皮

七錢各

右爲粗末每服三錢水一盞生薑五片煎至一盞去粗食前

溫服

脾胃虛損論

易水張先生常戒不可峻利食藥下咽未至藥丸施化其標皮之力始開便言快也所傷之物已去若更待一兩時辰許藥盡化開其藥峻利必有情性病去之後脾胃既損是真氣元氣敗壞促人之壽當時設下一藥枳實一兩炒黃色爲度白朮二兩只此二味荷葉裹燒飯爲丸以白朮甘溫甘溫補脾胃之元氣其苦味除胃中之濕熱利腰臍間血故先補脾胃之弱過於枳實耗化之藥一倍枳實味苦寒泄心下之痞悶消化胃中所傷此一藥下胃其所傷不能即去須待一兩時辰許食則消化是先補且虛而後化其所傷則不峻利矣當是之時未悟用荷葉燒飯爲丸之理老年味之始得可謂神生荷葉之物中央空象震卦之體震者動也人感之生足少陽甲膽膽者風也生化萬物之根蒂也左傳云履端於始序則不愆人之飲食入胃營氣上行即少陽甲膽之氣也其手少陽三焦經人之元氣也手足經同法便是少陽元氣生發也胃氣穀氣元氣甲膽上升之氣一也異名雖多止是胃氣上升者也荷葉之體生於水土之下出於污穢中不染挺然獨立其色青形乃空青而象風木者也食藥感此氣之化胃氣何由不上升乎其主意用此一味爲引用可謂遠識深慮合於道者也更以燒飯和藥與白朮協力滋養穀氣補令胃厚再不至內傷且利廣矣大矣若內傷脾胃辛熱之物酒肉之類日覺不快百藥於醫醫者亦不問所傷付之集杏丸小丁杏丸巴豆大熱藥之類下之大使下則物去遺留食之熱性藥之熱性重傷元氣則七神之集杏丸

不識經云熱傷氣正謂此也其人必無氣以動而熱因四肢不舉傳變諸疾不可勝數使人真氣自此衰矣若傷生冷硬物世醫或用大黃牽牛一味大寒藥投之隨藥下所傷去矣遺仍食之寒性藥之寒性重瀉其陽陽去則皮膚筋肉血脉無所依倚便爲虛損之證論言反此令人寒心夫辛辣薄味之藥無故不可亂服非止牽牛而已至真要大論云五味入胃各先逐其所喜攻攻者寇伐瀉也辛味下咽先攻瀉肺之五氣氣者真氣元氣也且牽牛之辛辣猛烈傷人尤甚飲食所傷腸胃受邪當以苦泄其腸胃可也肺與元氣何罪之有用牽牛大罪有五此其一也况胃主血所生病爲物所傷物者有形之物也皆是瀉其氣其罪二也且飲食傷之於中焦止合尅化消導其食重瀉上焦肺中已虛之氣其罪三也食傷腸胃當寒因寒用又曰寒因寒用枳實大黃苦寒之物以泄有形是也反以辛辣牽牛散瀉真氣大禁四也殊不知鍼經有云外來客邪風寒傷人五臟若怪瀉胃氣必死悞補亦死其死也無氣以動故靜若內傷腸胃而反瀉五臟必死悞補亦死其死也陰氣有餘故躁令內傷腸胃是謂六腑不足之病反瀉上焦虛無肺氣肺者五臟之一數也雖不即死若更旬日之間必暗損人壽數謂如人壽應百歲為牽牛之類朝捐暮損其元氣消耗不得終其天年但人不覺耳將為天年已盡此乃暗裏折人壽數大半五也故特著此論并方庶令四海聞而行之不至天橫耳此夫之用心也胃氣不可不養復明養胃之理內經云安穀者昌絕穀者亡水則榮散穀消則亡榮散衛亡神無所依仲景云水入於經其血乃成穀入於胃脉道可行故血不可不養胃不可不溫血養胃溫榮衛將行常有天命穀者身之大柄也書與周禮皆云金木水火土穀惟修以奉養五臟者也內傷飲食固非細事苟妄服食藥而輕生殞命其可乎哉黃帝鍼經有說胃惡熱而喜

寒因寒用

清冷大腸惡清冷而喜熱兩者不和何以調之岐伯曰調此者食飲衣服亦欲適寒溫寒無憚惄暑無出
飲食者熱益灼灼寒無淒淒寒溫中適故氣將得不致邪僻也是必有因用豈可用但寒俱熱之藥食卒
致損與以刀殺人者何異內經說內傷者其氣口脉反大於人迎一倍二倍三倍分經用藥又曰上部有
脉下部無脉且人當吐不吐者犯如但食不納惡心欲吐者不問一倍二倍不當正與爪帝散吐之但以
指或以物探去之若所傷之物去不盡者更診其脉問其所傷以食藥去之以應塞因塞用又謂之寒因寒用
泄而下降乃應太溪之用其中更加升發之藥令其元氣上升塞因通用因曲而為直何為曲內傷胃氣
是也何為直因而升發胃氣是也因其飲食之內傷而使生氣增益胃氣完復此乃因曲而為之直也若
分經用藥其所傷之物寒熱溫涼生硬柔軟所傷不難立定一法只隨所陽之物不同各立治法臨時
加減用之其用藥又當問病人從來稟氣盛衰所傷寒物熱物是喜食之耶不可服破氣藥若來飢困而
食之耶當益胃氣或為人所勉勸強食之宜損血而益氣也診其脉候傷在何臟可與對病之藥豈可妄
馳天真元氣以輕喪身寶乎且如先食熱物而不傷繼之以寒物因後食致前食亦不消化而傷者當問
熱食寒食孰多孰少斟酌藥無不當矣喻如傷熱物二分寒物一分則當用寒藥二分熱藥一分相合
而與之則榮衛之氣必得周流或有或失飲酒而後傷寒冷之食及傷熱食冷水與水如此不等皆當驗
其節次所傷之物酌量寒熱之劑分數各各對證與之無不取效自忖所定藥方未敢便謂能盡之理
姑用指迷辨惑耳

三黃枳木丸 治傷肉濕麵辛辣味厚之物填塞悶亂不快

朴實

炒

黃連

去頭酒洗

大黃

濕紙裹

神曲炒

橘皮

白术

已上各

黃芩

兩

右爲極細末

湯浸餅爲丸如菉豆一倍大每服五十丸白湯下臨時量所傷多少加減服之

巴豆三棱丸

一名木香

治傷生冷硬物心腹滿悶疼痛

巴豆霜

五錢分

木香

二錢

升麻

二錢

柴胡

已上各

草豆蔻

麵裹仁

香附子

炒之各

神曲炒

色黃

右爲極細末

右爲極細末

見曉丸

京三棱

提已上各一兩

右爲細末

湯浸餅

丸如菉豆一倍大每服一二十九溫白湯

下量所傷多少加減服之

白术丸 治傷豆粉濕麵油膩之物

白术

二錢

黃芩

五錢

橘皮

七錢

神曲炒

色黃

半夏

湯洗

白术

已上各

枳實

炒沙炒黃色

右爲極細末

極細末

湯浸餅

丸如菉豆大

每服三十五丸

白湯下

素食多用乾薑故加黃芩以馮之

草豆蔻丸 治秋冬傷寒冷物胃脘當心而痛上支兩脇咽膈不通

炒鹽

分

乾生薑

一兩

青皮

二錢

橘皮

已上各

來薰麵

炒黃

生黃芩

不用

半夏

湯洗

神曲

炒元上

草豆蔻

麵裹橘皮取仁

去

白术

已上各

枳實

一兩

右爲極細末

湯浸餅

丸如菉豆大

每服五十九丸

白湯下

中滿腹脹門

中滿腹脹論

六元政紀論云太陰所至爲中滿太陰所至爲毒滿諸經腹滿皆屬脾土論云脾乃陰中之太陰同濕土

之化脾濕有餘腹滿食不化天為陽為熱主運化也地為陰為濕主長養也無陽則陰不能生化故云藏
寒生滿病調經篇云因飲食勞倦損傷脾胃始受熱中未傳寒中皆由脾胃之氣虛弱不能運化精微而
制水穀聚而不散而成脹滿經云腹滿脢脹支膈胠脇下厥上冒過在太陰陽明乃寒濕鬱遏也脉經所
謂胃中寒則脹滿者是也鉞經二卷腹滿大便不利上走胸嗌喘息喝喝然取足少陰又云張取三陽三
陽者足太陽寒水為脈與通評虛實論說腹暴滿按之不下取太陽經絡胃之募也正同取者瀉也經云
中滿者瀉之於內者是也宜以辛熱散之以苦瀉之淡滲利之使上分消其濕正如開鬼門潔淨府溫
衣繆刺其處是先瀉其血絡後調其真經氣血乎陽布神清此治之正也或曰諸脹腹大皆屬於熱者何
也此乃病機總辭假令外傷風寒有餘之邪自表傳裏寒變為熱而作胃實腹滿仲景以太承氣湯治之
亦有膏梁之人濕熱鬱於內而成脹滿者此熱脹之謂也大抵寒脹多而熱脹少治之者宜詳辨之

諸腹脹大皆屬於熱論

諸腹脹大皆屬於熱此乃八益之邪有餘之證自天外而入是感風寒之邪傳裏寒變為熱作胃實日晡
潮濕大渴引飲讞語是太陽陽明并大實大滿者大承氣下之少陽陽明微滿實者小承氣下之泄之則
脹已此之謂也假令痰脹為脹滿亦有寒脹熱脹是天之邪氣傷暑而得之不即時發至秋暑氣衰絕而
瘧病作矣知其寒也局方用文解飲子者是也內虛不足寒濕令人中滿及五臟六腑俱有脹滿更以脉
家寒熱多少較之胃中寒則脹滿濁氣在上則生脜脹脹取二陽二陽者足太陽膀胱寒水為脹腹暴滿
按之不下取太陽經絡者胃之募也正同腹滿脢脹支膈胠脇下厥上冒過在太陰陽明胃中寒濕鬱遏

也太陰腹脹復不利不欲食食則嘔不得卧按所說寒脹之多如此中滿治法當開鬼門潔淨府開鬼門者謂發汗也潔淨府者利小便也中滿者瀉之於內謂脾胃有病當令上下分消其濕下焦如膚氣血自然分化不待泄溼穢如滿太實大滿大小便不利從權以寒熱藥下之或傷酒濕麵及味厚之物膏粱之人或食已便卧使濕熱之氣不得施化致令腹脹滿此脹亦是熱脹治熱脹分消丸主之如或多食寒涼及脾胃久虛之人胃中寒則脹滿或藏寒生滿病以治寒脹中滿分消湯主之

中滿分消丸 治中滿熱脹鼓脹氣脹水脹此非寒脹類

白术 人參 炙甘草

猪苓去黑皮

姜黃已上各一錢

白茯苓去皮

乾生薑

砂仁已上各二錢

澤瀉

橘皮已上各三錢

知母炒四錢

黃芩去腐炒夏用一兩二錢

黃連炒半夏湯洗七次

枳實炒已上各五錢

厚朴薑製一兩

右除茯苓澤瀉生薑外共爲極細末入上三味和勻湯浸餳餅爲丸如梧桐子大每服

一百丸焙熟白湯下食遠服量病人大小加減

中滿分消湯 治中滿寒脹寒疝大小便不通躊躇足不收四肢厥逆食入反出下虛中滿腹中寒心下

痞下焦躁寒沉厥奔豚不收

川烏

澤瀉

黃連

人參

青皮

當歸

生薑

麻黃

柴胡

乾薑

華澄柏已上各三分

益智仁

半夏

茯苓

木香

升麻已上各三分

黃芪

吳茱萸

厚朴

草豆蔻仁

黃蘖已上各五分

右剉如麻豆大都作一服水二大盞煎至一盞食前熱服

忌房室酒濕麵生冷及油膩等物

廣茂瀆堅湯 治中滿腹脹內有積聚堅硬如石其形如盤大入不能坐卧大小便澀滯上喘氣促面色
痿黃通身虛腫

廣茂 紅花 升麻 吳茱萸已上各二分 生甘草 柴胡 澤瀉 神麌 青皮
陳皮已上各三分 厚朴生用 黃芩 黃連 益智仁 豆蔻仁 當歸梢已上各五分 半夏
七分 如渴加 葛根四分 右剉如麻豆太水二大盞煎至一盞稍熱服食遠忌酒醋濕麵服二服之
後中滿減半止有積不消再服後藥

半夏厚朴湯

紅花 蘇木已上各半分 吳茱萸 乾生薑 黃連已上各一分 木香 青皮已上各二分 肉桂
蒼朮 白茯苓 澤瀉 柴胡 陳皮 生黃芩 草豆蔻仁 生甘草已上各三分 半夏
京三稜 當歸梢 猪苓 升麻已上各四分 神曲六錢 厚朴八錢 桃仁七箇 昆布
少許 如渴加 葛根三分 右咬咀作一服水三盞煎至一盞去粗稍熱服此藥二服之後前證又減
一半却於前藥中加減服之

破滯氣湯名木香化帶散 破滯氣治心腹滿悶

炙甘草四分 白檀 霍香 陳皮 大腹子 白豆蔻仁 白茯苓 桔梗五分 各
砂仁 人參 青皮 檳榔 木香 姜黃 白术已上各二錢 右咬咀每服二錢水
二盞煎至一盞去粗溫服不拘時

草豆蔻湯 治腹中虛脹

澤鴻分 木香三 分 神曲四 半夏製 枳實 草豆蔻仁 黃氏去之 春夏 益智 甘草已上

各五 分 青皮 陳皮已上各 六分 伏苓 當歸七分 各 右爲粗末都作一服水二大盞生薑三片煎至一盞去粗溫服冬月加黃芪五七分春夏止服正樂食達

心腹痞悶

消痞丸 治心下痞悶一切所傷及積年不愈者

乾生薑 神曲炒 炙甘草已上各 二分 猪苓二錢 五分 澤鴻 厚朴 砂仁已上各 三錢 半夏湯先洗 七次 人參已上各 四錢 枳實五錢 炒 黃連炒 黃芩已上各 六錢 姜黃 白朮已上各 一兩 右爲細末

失笑丸一名枳實 治右關脉弦心下虛痞惡食懶倦開胃進飲食

失笑丸一名枳實 治右關脉弦心下虛痞惡食懶倦開胃進飲食

乾生薑一錢 炙甘草 麥蘖麵 白茯苓 白朮已上各 二錢 半夏麴 人參已上各 三錢

厚朴四錢 炒 枳實 黃連五錢 上各 右爲細末湯浸餅爲丸如梧桐子大每服五七十九丸至百丸白湯送下食達服

下食達服

黃連消痞丸 治心下痞滿壅滯不散煩熱喘促不安

澤鴻 姜黃已上各 乾生薑二錢 炙甘草 茯苓 白朮已上各 三錢 陳皮五錢 猪苓已上

各五 分 枳實炒七錢 半夏九錢 黃連一兩 黃芩二兩 炒 右爲細末湯浸餅爲丸如梧桐子大每服

五十丸溫湯下食遠

消痞丸一名木香化滯湯 治因憂氣鬱結中脘腹皮裏微痛心下痞滿不思飲食

枳實炒當歸梢二分 陳皮 生薑 木香二分 各 柴胡四分 单豆蔻 無甘草五分

半夏一錢 紅花少許 右爲粗末作一服水二盞生薑三片前至一盞食遠服忌酒濕麵

草薢丸一名人參順氣散于 治心下痞胸中不利

半夏洗 厚朴炙 石膏 青皮五分 各 當歸身分 白豆蔻仁 縮砂 茵陳製

乾葛已上各一錢 炙甘草 差活 黃芩半錢 洗 芒草炒 人參 柴胡 獨活

右爲細末湯浸餅和勻篩于內擦如米大每服二錢臨卧用一口湯下

胃脘痛門

草豆蔻丸 治脾胃虛弱而心火來之不能滋榮上焦元氣遇冬腎與膀胱寒水旺時子能令母實以致肺金大腸相輔而來尅心乘脾胃此大復讐也經云大勝必大復理之常也故皮毛血脉分肉之間元氣已絕於外又大寒大燥二氣併乘之則苦惡風寒耳鳴及腰背相引而痛鼻息不通不聞香臭額寒腦痛大惡風寒目時眩不欲開腹中爲寒水反乘痰唾沫食則反出腹中常痛心胃作痛脇下縮急有時而痛腹不能努大便多濁而少秘下氣不絕或腹中鳴此脾胃虛之至極也胸中氣亂心煩不安而爲霍亂之漸咽膈不通極則咽塞有聲喘喝閉塞或於日陽處或於暖室中少緩口吸風寒之氣則復作四肢厥冷身體沉重不能轉側頭不可以回顧小便洩而時躁此藥主之秋冬寒涼大復氣之藥

也

神麴末

柴胡詳肠下痛
多用之

姜黃已上各四分

當歸身

青皮已上各六分

黃芪

人參

益

智仁

吳茱萸湯洗
焙乾

陳皮

曰僵蠶已上各八分

澤泻小便數度一錢半

半夏已上各一錢半

甘草生熟各六分

來蘖麵一錢五分炒

草豆蔻仁

麵裹燒熟為度一錢四分

桃仁七箇湯浸去皮尖

右除桃仁

別研如泥餘為細末同研

勻湯浸餌餅為丸

如梧桐子大

每服五十九

白湯下食達服

神聖復氣湯 治復氣乘冬陽太陽寒水足少陰腎水之旺子能令母竇手太陰肺竇反來赴土火木受邪腰背胸膈閉塞疼痛毒噦口中涎目中溢鼻中流濁涕不止或如息肉不聞香臭咳嗽痰沫上熱如火下寒如冰頭作陣痛日中流火視物瞭瞭耳聾耳鳴頭井口鼻大惡風寒喜日晴暖夜卧不安常覺痰塞咽喉不通口不知味兩脇縮急而痛牙齒動搖不能嚼物脣腹之間及尻脣足膝不時寒冷前陰冷而多汗行步欹側起居艱難麻木風痺小便數氣短喘喝少氣不足以息遺失無度及婦人白帶陰戶中大痛牽心而痛面色黧黑男子控睾痛牽心腹或面色如赭食少大小便不調煩心霍亂逆氣裏急腹不能努或勝鳴膝下筋急肩胛大痛此皆寒水來復火土之讐也

乾薑炮

黑附子炮已上各三分

防風

人參

郁李仁另研已上各五分

當歸身

酒洗六分先

半夏

升麻已上各七分

藁本

甘草已上各八分

柴胡

羌活

已上各

白芍花

五朵去心剪碎

右件都作一

服水五大盞煎至一盞入黃芪一錢橘紅五分草豆蔻仁一錢麵裹煨熟去皮一錢同煎至一盞再入下項藥黃芪三分酒浸黃連三分酒浸枳壳三分生地黃三分酒洗此四味預一日另用新水浸

又以華細辛二分川芎細末三分蔓荆子三分作一處浸此三味并黃藥等煎止藥作一大盞不去粗入此所浸之藥再上火同煎至一大盞去粗熱服空心又能治齒頰齶唇舌根強硬等證如神忌肉湯宜食肉不助經絡中火邪也大抵腎元與膀胱經中有寒氣不足者并宜服之於月生月滿時食隔三五日一服如病急不拘時候

麻黃豆蔻丸 治客寒犯胃心胃大痛不可忍

木香 青皮 紅花 厚朴已上各蘇木三分 華澄加四升麻 半夏湯 麥蘖麵
縮砂仁 黃芪 白朮 陳皮去白 柴胡 炙甘草 吳茱萸 當歸身已上各
益智仁八分 神鞠末二錢 麻黃下去節三錢 草豆蔻仁五錢 右爲細末湯浸餌餅爲丸如梧桐子大
每服五十丸白湯下或細嚼湯下亦可

酒傷病論

論酒大熱有毒氣味俱陽乃無形之物也若傷之則止當發散汗出則愈矣此最妙法也其次莫如利小便二者乃上下分消其濕何酒病之有今之酒病者往往服酒癥丸大熱之藥下之又用牽牛大黃下之是無形元氣受病反下有形陰血乖悞甚矣酒性大熱已傷元氣而復重瀉之况亦損腎水真陰及有形陰血俱爲不足如此則陰血愈虛真水愈弱陽毒之熱大旺反增其陰火是謂元氣消亡七神何依折人長命雖不即死而虛損之病成矣金匱要略云酒疸下之久為黑疸慎不可犯此戒不若令之上下分消其濕當以葛花解醒湯主之

葛花解醒湯

木香分五

人參去節

猪苓皮去黑

白茯苓橘皮錢上各一

乾生薑

神鞠炒

澤瀉二錢

蓮花青皮三錢

縮砂仁

白豆蔻仁葛花五錢

右爲極細末和匀每服

三錢七白湯調下但得微汗酒病去矣此益不得已而用豈可恃賴日日飲酒此藥氣味辛辣偶因

酒病服之則不損元氣何者敵酒病故也若頻服之損人天命

枳术丸 治痞消食強胃

枳實炒黃

白术二兩

右爲極細末荷葉裹燒飯爲丸如菉豆一倍大每服五十九白湯下不拘

時候量所傷多少加減服之

半夏枳术丸 治因冷物內傷

半夏湯洗七次一兩

枳實炒黃

右三味爲極細末荷葉裹燒炊飯爲丸如菉豆一倍大每服五十丸白

湯下量所傷加減服之

橘皮枳术丸 治元氣虛弱飲食不消或臟腑不調心下痞悶

橘皮枳實炒黃

白术二兩

右爲極細末荷葉裹燒飯爲丸如菉豆一倍大每服五十

丸白湯下量所傷加減服之

除濕益氣丸 治傷濕麵心腹滿悶肢體沉重

紅花三分

蘿蔔子五錢

炒熟

枳實炒黃

黃芩生

神鞠炒黃

白术一兩各

右同爲

細末荷葉裹燒飯為丸如菉豆一倍大每服五十九白湯下量所傷加減服之

除濕散 治傷馬痧并牛羊酪水一切冷物

甘草

炙
錢七
克

紅花

二錢

半夏

三錢

乾生薑

三錢

澤鴻

五錢

各

次

茯苓

錢七
克

神麴

一兩

右為極細末每服三錢

白湯調下食前

升麻黃連丸

治多食肉口臭不欲聞其穢惡氣使左右不得近

白檀

錢二
克

生甘草

三錢

生薑

取自
然汁

蓮花青皮

升麻

五錢

升麻

五錢

黃連

去鬚
一兩

黃芩

去腐酒
洗二兩

右為細末湯浸餅為丸如彈子大每服一丸細嚼白湯下食後

上二黃丸

治傷熱食痞悶兀兀欲吐煩亂不安

甘草

錢一
克

升麻

三錢

柴胡

已上各

黃連

酒洗
一兩

一方加

枳實

五
錢

右為細末

湯浸餅為丸如菉豆大每服五十丸白湯下食後

治傷冷飲者以五苓散每服二錢三錢七加生薑前服之

治傷食寒傷冷飲者煎五苓散送半夏枳朮丸

治傷冷飲不惡寒者腹中亦不覺寒惟覺悶身重食不化者或小便不利煎去桂五苓散依前斟酌服之

爪帶散 上部有脉下部無脉其人當吐不吐者死何謂也下部無脉此謂木鬱也飲食過飽填塞胸中胸中者太陰之分野經曰氣口大於人迎三倍食傷太陰故曰木鬱則達之吐者是也

爪帶

赤小豆

等分

各

右一味為極細末每服一錢七溫漿水調下取吐為度若不至兩手尺

脉絕無不宜使用此藥恐損元氣令人胃氣不復若止是胸中空塞悶亂不通以指探去之如不得吐者以物探去之得吐則已如食不去用此藥吐之解云盛食填塞於胸中為之塞塞兩寸脉當王者肺也為物所填肺者手太陰金也金生殺伐也與坤土俱在於上而旺於天金能克木故肝木生發之氣伏於地下非木鬱而何吐去十焦陰土之物木得舒暢則鬱結去矣食塞於上脉絕於下若不明天地之道無由達此至理水火者陰陽之徵兆天地之別名也故曰獨陽不生獨陰不長天之用在於地下則萬物生長矣地之用在於天上則萬物收藏矣此乃天地交而萬物通也此天地相根之道也故陽火之根本於地下陰水之原本於天上故曰水出高源故人五臟主有形之物物者陰也陰者水也右三部脉主之偏見於寸口食塞其上是絕五臟之源源絕則水不下流兩尺竭絕此其理也何疑之有假令所傷前後不同以分為率傷熱物二分傷生冷硬物一分用寒藥三黃丸二停熱藥巴豆三棱丸一停合而服之如熱物傷少而寒物傷多則寒藥少而熱藥多也假令夏月大熱之時傷生冷硬物當用熱藥巴豆三棱丸治之須加三黃丸謂天時不可伐故加寒藥以順時令若熱物則用三黃丸何謂此三黃丸時藥也假令冬天大寒之時傷羊肉大麵等熱物當用三黃丸治之須加熱藥少許草豆蔻丸之類是也為引用又為時藥經云必先歲氣無伐天和此之謂也

消渴門

消渴論

陰陽別論云二陽結謂之消脾要精微論云瘧成謂消中夫二陽者陽明也手陽明大腸王津病消則目黃口乾是津不足也足陽明胃主血熱則消穀善飢血中伏火乃血不足也結者津液不足結而不潤皆燥熱為病也此因數食甘美而多肥故其氣上溢轉為消渴治之以蘭除陳氣也不可服膏梁芳草石藥其氣剽悍能助燥熱也越人云邪在六腑則陽脉不和陽脉不和則氣留之氣留之則陽脉盛矣陽脉大盛則陰氣不得營也故皮膚肌肉消削是也經云凡治消癰仆擊偏枯痿厥氣滿發逆肥貴人則膏梁之疾也岐伯曰脉實病久可治脉弦小病久不可治後分為三消渴者舌上赤裂大渴引飲逆調論云心移熱於肺傳為膈消者是也是以白虎加人參湯治之中消者善食而瘦自汗大便硬小便數叔和云口乾饑飲水多則虛瘧成消中者是也以調胃承氣三黃丸治之下消者煩燥引飲耳輸焦乾小便如膏叔和云焦煩水易虧此腎消也以六味地黃丸治之總錄所謂未傳能食者必發膳痘背瘡不能食者必傳中滿鼓脹皆謂不治之證潔古老人分而治之能食而渴者白虎加人參湯不能食而渴者錢氏方白朮散倍加葛根治之上中既平不復傳下消失前人用樂厥有旨哉或曰未傳瘡痘者何也此火邪勝也其瘡痛甚而不潰或亦水者是也經云有形而不痛陽之類也急攻其陽無攻其陰治在下焦元氣得強者生失強者死未傳中滿者何也以寒治熱雖方士不能廢其繩墨而更其道也伏藏腑有遠近心肺位近宜制小其服腎肝位遠宜制大其服皆適其至所為故如過與不及皆誅罰無過之地也如膈消中消制之太急速過病所久而成中滿之病正謂上熱未除中寒復消者也非樂之罪矣其緩急之制也處方之制宜加意焉

和血益氣湯 治口乾舌乾小便數舌上赤脉此藥生津液除乾燥生肌肉

紫胡

炙甘草

生甘草

此味治口乾舌乾也

麻黃根

三分以上各

酒當歸梢

四分

酒知母

酒浸防已

羌活

五分以上各

石膏

六分治小便赤色

酒生地黃

八分治舌苔也

酒黃蘖

升麻

一錢以上各

杏仁

桃仁

六分以上各

紅花

少

右咬咀都作一服水二大盞

煎至一盞去粗溫服忘熱渴麵酒醋等物

當歸潤燥湯

治消渴大便閉澀乾燥結硬甚喜溫飲陰頭退縮舌燥口乾眼澀難開及於黑處見浮雲

細辛

生甘草

炙甘草

熟地黃

三分以上各

柴胡

七分

黃蘖

知母

石膏

桃仁

當歸身

麻子仁

防風

荆芥穗

一錢以上各

升麻

一錢五分

紅花

許

杏仁

小椒

三箇

右咬咀都作一服水二大盞煎至一盞去粗

生津甘露湯

治消中能食而瘦口舌乾目汗大便結燥小便頻數

升麻

四分

防風

生甘草

漢防已

五分以上各

當歸身

六分

柴胡

羌活

炙甘草

黃芪

酒知母

酒黃芩

一錢以上各

酒龍膽草

石膏

黃蘖

已上各一錢五分

紅花

少

桃仁

五箇

杏仁

十箇

右咬咀都作一服水二大盞酒一匙煎至一盞稍

熱服食速

辛潤緩脈湯

一名清神補氣湯

前消渴證纔愈上有口乾腹不能努此藥主之

生地黃

細辛已上各一分

熟地黃

三

石膏

四分

黃蘖

酒

生甘草

知母已上各

柴胡分

當歸身

荆芥穗

桃仁

防風

已上各一錢

升麻

五分一錢

紅花少許

杏仁六分一錢

小椒兩箇

右咬咀都作一服水二大盞煎至一盞食後稍熱服之

甘草石膏湯

渴病久愈又添舌白沫微腫咽喉嚙津作痛嗌腫時時有渴喜冷飲口中白沫如膠

生地黃

細辛已上各一分

熟地黃

黃連三分

甘草五分

石膏六分

柴胡分

當歸身

桃仁

防風

已上各一錢

黃蘖

知母

當歸身

桃仁炒去皮尖

荆芥穗

防風一錢

升麻五分

紅花少許

杏仁六分一箇

小椒兩箇

右如麻豆大都作一服水二盞煎至一盞食後溫服

甘露膏一名蘭香飲子

治消渴飲水極甚善食而瘦自汗大便結燥小便頻數

半夏二分

熟甘草

白豆蔻仁

人參

蘭香

升麻

連翹

桔梗五分一錢

生甘草

防風已上各一錢

酒知母五分一錢

石膏三錢

右為極細末湯浸餅和勻成劑捻作

溥片子

日中晒半乾擦碎如米大每服二錢淡生薑湯送下食後

生津甘露飲子

治消渴上下齒皆麻舌根强硬腫痛食不能下時有腹脹或瀉黃如屎名曰餐泄渾身色黃目睛黃甚四肢痿弱前陰如水尻臀腰背寒面生黧色脇下急痛喜嚏喜怒健忘

霍香二分

紫胡

黃連

木香三分

生甘草

山梔子

白豆蔻仁

白芷

連翹

姜黃已上各一錢

洛五

華澄茄

生甘草

山梔子

白豆蔻仁

白芷

連翹

姜黃已上各一錢

石膏一錢

杏仁去皮一錢

酒黃蘖已上各一錢

炙甘草

酒知母

升麻

人參已上各二錢

桔梗三錢

全蝎兩箇

去毒

右為細末湯浸餅和勻成劑捻作片子日中晒半乾擦碎如黃米大母

服二錢津唾下或白湯送下食達服

眼耳鼻門

諸脉者皆屬於目論

陰陽應象論云諸脉皆屬於目目得血而能視五臟六腑精氣皆上注於目而爲之精精之窠則爲眼骨之精爲瞳子筋之精爲黑眼血之精爲絡其窠氣之精爲白眼肌肉之精則爲約束裏擗筋骨血氣之精而與脉并爲系上屬於腦後出於項中故和中於項因達其身之虛其入深則即隨眼系入於腦則腦轉腦轉則引目系急目系急則目眩以轉矣邪中其精其精所中不相比也則精散精散則視歧故見兩物目者五臟六腑之精榮衛魂魄之所常營也神氣之所主也故神勞則魂魄散志意亂是故瞳子黑眼發於陰白眼赤脉發於陽故陰陽合傳而爲精明也目者心之使也心者神之舍也故神精亂而不轉卒然見非常之處精神魂魄散不相得故曰惑也夫十二經脈三百六十五絡其血氣皆上走於面而走空竅其清陽氣上散於目而爲精其氣走於耳而爲聽因心事煩冗飲食失節勞役過度致脾胃虛弱心火大盛則百脉沸騰血脉逆行邪憲空竅天明則日月不明矣夫五臟六腑之精氣皆稟受於脾上貫於目脾胃者諸陰之首也目者血脉之宗也故脾虛則五臟之精氣皆失所司不能歸明於目矣心者君火也王人之神宜靜而安相火代行其令相火者包絡也王百脉皆榮於目既勞役運動勢乃妄行又因邪氣所升而損血脉故諸病生焉凡醫者不理脾胃及養血安神治標不治本是不明正理也

肉障眼論

凡心包絡之脉出於心中以代心君之行事也與少陽為表裏瞳子散大者少陰心之脉挾目系厥陰肝之脉連目系心主火肝主木此木火之勢盛也其味則宜苦宜酸宜涼大忌辛辣熱物以助木火之邪也飲食中常知此理可也夫辛主散熱則助火故不可食諸酸主收心氣濁木火也諸苦濁火熱則益水也尤忌食冷水大寒之物此則能損胃氣胃氣不行則元氣不生元氣不生則胃氣下流胸中三焦之火及心火乘於肺上入腦灼髓火主散溢瞳子開大大熱之物又助火和此蓋不可食驗也藥中去羌蔚子以味辛及主益睛平者是助火也故去之乃加黃芩黃連鴻中焦之火芩能鴻上焦肺中之火以酒洗之乃寒因熱用也又去青葙子以助陽火也加五味子以收瞳人開大且火之與氣勢不兩立故內經曰壯火食氣氣食少火少人生氣壯火散氣諸酸之物能助元氣孫真人云五月常服五味助五臟氣以補西方肺金經云以酸補之以辛濁之辛濁氣則明矣或曰藥中有當歸其味亦辛而甘其不去者何此辛甘一味以其和血之聖藥況有甘味又欲以為鄉導為諸藥之使耳

芎辛湯 治兩眼晝夜隱澀難開羞明惡日視物昏暗赤腫而痛

細辛二分

芎藭一分

蔓荆子五分

甘草

白芷一錢上各

防風一錢

右㕮咀都作

一服水二盞煎至一盞臨卧溫服

碧天丸一名井珠丸 治目疾累服寒涼藥不愈兩眼蒸熱如火之熏赤而不痛滿目紅綠血脉貫睛督悶昏暗羞明畏日或上下臉赤爛或冒風沙而内外眞皆破洗之神功

枯白礬二分

銅碌七分

瓦粉炒黑兩

右先研白礬銅碌令細旋旋入粉同研勻熟水和之

共為一百丸每用一丸熱湯半盞浸一二箇時辰洗至覺微澀為度合眼半時辰許臨卧更洗之瞑目便睡一丸可洗十遍再用湯內坐令熱此藥治其標若裏實者不宜用

廣大重明湯

治兩目臉赤爛熱腫疼痛并稍赤及眼臉痒痛抓之至破眼弦生瘡目多眵淚隱澀難開

龍膽草

防風

生甘草

細辛已上各一錢

右剉如咀內甘草不剉口作一錠先以水一大

碗半煎

龍膽一味至一半再入餘二味煎至少半碗濾去粗用清汁帶熱洗以重湯坐令熱甘用五

七次但洗畢合眼一時去努肉泛長及痒亦驗

百點膏

張濟氏眼病醫六年以至遮瞳人視物不明有雲氣之狀因用此藥而効

蕤仁去皮尖三分

當歸身

甘草已上各六分

防風

黃連至二錢

剉如麻豆大蕤仁別研如泥同煎滴在水中不散入去沫蜜少許再熬少時為度令病人心靜點之

右件

至目中微痛日用五七次臨卧點尤疾効名之曰百點膏但欲多點使藥力相繼也

選奇湯 治眉痛不可以忍

炙甘草夏月生用

羌活

防風已上各三錢

酒黃芩一錢冬月不用此一味

右㕮咀每服五錢

水二盞煎至一盞去粗食後服之

神効明目湯

治眼瞼緊急致倒睫拳毛及上下臉皆赤同睛皮昏暗畫則冷淚常流夜則眼涩難開

細辛二分

蔓荆子五錢

防風

葛根一錢

甘草二錢

一方加

黃芪一錢

右㕮咀作

一服水二盞煎至一盞去粗食臨卧服之

羌活退翳膏一名復明膏 治足太陰寒水膜子遮睛白翳在上視物不明

椒樹東南根二分

藁本

漢防己二分上各

黃連

防風

麻黃去節去根

柴胡

升麻

生地黃三分上各

生甘草四分

當歸身一分

羌活六分

蕤仁六箇

右用淨水一

大碗先用漢防己黃連生甘草當歸身生地黃煎至一半下餘藥再煎至一盞去粗入銀石器中再

熬之有力為度

明日細辛湯 治兩目發赤微痛羞明畏日怯風寒怕火眼睫成紐眵糊多隱涩難開眉攢腫閉鼻塞涕

唾稠粘大便微硬

川芎五分

生地黃製酒

蔓荆子記上各六分

當歸梢

白茯苓

藁本一錢上各

荆芥

一錢
二分

防風二錢

麻黃根

羌活三錢上各

細辛少許

紅花許

椒八箇

桃仁二十箇

右㕮咀分作四服每服水二盞煎至一盞去粗稍臨卧熱服之忌酒醋濕麵

復明散 治內瘴

青皮三分

橘皮

川芎

蒼朮五分上各

炙甘草

生地黃

連翹

柴胡各一錢

錢

黃芪五分一錢

當歸身二錢

右剉如麻豆大都作一服水二大盞煎至一盞去粗稍熱服之

食後忌酒醋麵辛熱大料物之類

助陽和血湯 治眼發之後微有上熱白睛紅隱澀難開睡多眵淚

蔓荆子二分

香白芷三分

柴胡

黃芪

炙甘草

當歸身酒

防風五分上各

升麻分

右咬咀都作一服水一盞半煎至八分去粗稍熱服臨卧避風寒處睡

吹雲膏 治眼中淚及迎風寒泣羞明畏日常欲閉目喜在暗室塞其戶牖醫膜歲久遮睛此藥點之神驗

細辛分

升麻

蕤仁已上各三分

青皮

連翹

防風已上各四分

柴胡五分

生甘

草分

當歸身已上各六分

荆芥穗

一錢微取濃汁

生地黃

一錢五分

揀黃連

三錢

右咬咀除連翹外

用澄清淨水二碗先熬餘藥至半碗入連翹同熬至一大盞許去粗入銀石器內文武火熬滴入水成珠不散為度入煉去沫熟蜜少許熬匀用之

防風飲子 治倒睫拳毛

細辛

蔓荆子已上各三分

葛根

防風已上各五分

當歸身七分

炙甘草

黃連

人參已上各一錢

右剉如麻豆大都作一服水二盞煎至一盞食達服避風寒

撥雲湯 戊申六月徐總管患眼疾於上眼皮下出黑白腫兩箇隱澀難開兩目緊縮而無疼痛兩手寸脉細緊按之洪大無力知足太陽膀胱為命門相火前熬逆行作寒水腫及寒膜遮睛證呵欠善悲健忘嘔噴眵淚時自淚下面赤而白能食不大便小便數而矢上而喘

黃芪分

細辛

生薑

葛根

川芎已上各五分

柴胡

荆芥穗

藁本

生甘草

升麻

當歸身

知母已上各五錢

羌活

防風

黃藥已上各五分

右咬

咀都如麻豆大作一服水二盞煎至一盞去粗執服食後

神効黃芪湯

治渾身麻木不仁或頭面手足肘背或腿腳麻木不仁並皆治之如兩目緊急縮小及羞

明畏日隱澀難開或視物無力睛痛昏花手不得近或目少精光或目中熱如火服五六次可効

蔓荆子

一錢

陳皮

去白五錢

人參

八錢

炙甘草

一兩

白芍藥

已上各一兩

黃芪

兩

右哎咀每

服五錢水

二盞前至一盞去相臨卧稍熱服

如小便淋澀加澤瀉

五分

一服去則止

如有大熱證每服加酒洗黃藥

三分

如麻木不仁雖有熱不用黃藥止加黃芪

一通三兩也

如眼縮急去芍藥忌酒醋麵大料物葱韭蒜辛物

如麻木甚者加芍藥

一兩通用二兩

圓明內障升麻湯

一名中和養胃湯

治內障眼得之脾胃元氣衰弱心火與二焦俱盛飲食不節形體勞役心

不得休息故上為此疾

乾薑

一錢

五味子

二錢

白茯苓

三錢

防風

五錢

白芍藥

六錢

柴胡

七錢

人參

一錢

炙甘草

一錢

當歸身

酒洗

白朮

一錢

升麻

一錢

葛根

已上各一兩

黃芪

一錢

卷活

已上各一五錢

右

哎咀每服五七錢水三大盞前至一大盞入黃芩黃連

錢同前

數沸去粗前至一大盞熟服食達

黃芩黃連湯

黃芩

炒洗

黃連

酒洗

龍膽草

酒洗四次

生地黃

酒洗已上各一兩

右哎咀每服一錢水二

盞煎至一盞去粗熱服

蔓荆子湯 治勞役飲食不節內障眼病此方如神效

蔓荆子

五錢
一分

黃藥

酒拌炒
四遍

白芍藥

三錢
二分

炙甘草

八錢
三分

黃芪

一兩

人參

一兩
三分

右㕮咀每服二錢或五錢水二盞煎至一盞去粗熱服

歸葵湯

一名連
趙飲子

治目中溜火惡日與火隱澀難開小角緊視物昏花迎風有淚

柴胡

二分

生甘草

蔓荆子

連翹

生地黃

當歸身

夏月
減半

炙甘草

二分
一分

黃芪

至一盞去粗食後溫服

救苦湯 治眼暴發赤腫臉高苦疼不任者

桔梗

連翹

紅花

細辛

已上各
一分

當歸身

夏月
減半

炙甘草

二分
一分

蒼朮

草龍膽

已上各
七分

羌活

太陽

升麻

明

柴胡

少陽

防風

藁本

黃連

已上各
一分

川芎

三

右㕮咀每服一兩水二盞煎至一盞

生地黃

黃藥

黃芩

知母

已上各
五分

川芎

三

去粗食後溫服

若苦疼則多用苦寒者兼治本經之藥再行加減如睛昏加知母黃藥一倍

熟乾地黃丸 治血弱陰虛不能養心致 駐陽火甚瞳子散大少陰為火君主無為不行其令相火代之兼心包絡之脉出心系分為三道少陽相火之體無形其用在其中矣火盛則令母實乙木肝旺是

也心之脉挾於目系肝連目系况手足少陽之脉同出耳中至耳上角斜起於目外皆風熱之盛亦從此道而來上攻頭目致偏頭腫悶瞳子散大視物則花此由血虛陰弱故也法當養血涼血益血收火之散大除風之熱則愈矣

人參二錢

炙甘草

天門冬湯洗去心

地骨皮

五味子

枳殼炒

黃連三錢

各

當歸身酒洗培乾

黃芩五錢

生地黃酒洗七錢分五

熟地黃兩

柴胡錢

熟乾地黃兩

右件同為細

末煉蜜爲丸如梧桐子大

每服一百丸

茶湯送下食後日進二服

益腎腎氣丸

此壯水之主以鎮陽光丸

澤鴻

茯苓五錢

生地黃酒洗

牡丹皮

山茱萸

當歸梢酒

五味子

乾山藥

柴胡五錢

熟地黃酒洗

右為細蜜煉蜜爲丸如梧桐子大

硃砂爲衣每服五十

丸淡鹽湯下空心

羌活退翳丸

治內障石眼小眞青白翳大眞微顯白翳腦痛瞳子散大上熱惡熱大便秘澀小便如常

遇天氣暄熱頭痛睛脹可服此藥

智賢在大眞加葛根升麻賢在小眞加柴胡羌活是也

黑附子炮

寒水石一錢

酒防己二錢

知母炒

牡丹皮

羌活

川芎三錢

各

酒黃芩

生地黃炒酒洗

丹參

茺蔚子

酒當歸身

柴胡五錢

熟地黃八錢

芍藥一兩

右為細末煉蜜爲丸如梧桐子大

每服五七十九

白湯下空心宿食未消待餓則服之

藥後省語言以食壓之

當歸龍膽湯 治眼中白翳

防風

石膏已上各一錢五分

柴胡

羌活

五味子

升麻已上各二錢

甘草

酒黃

連

黃氏已上各三錢

酒黃芩炒

酒黃芩炒

當歸身酒洗

草龍膽酒洗

芍藥

已上各五錢

右咬咀每服五錢水

二盞煎至一盞去相入酒少許臨卧熱服忌言語

補陽湯

治陽不勝其陰乃陰勝陽虛則九竅不通令青白翳見於大眴乃足太陽少陰經中九原之下以益肝中陽氣衝天上升

陰肝經氣不得上通於目故青白翳內阻也當於太陽少陰經中先補其陽後於足太陽太陰標中標者頭也鴻足厥陰肝經火下伏於陽中乃次治也內經云陰盛陽虛則當先補其陽後鴻其陰此治法是也每日清晨以腹中無宿食服補陽湯臨卧服鴻瘗丸若天色

變經大寒大風并勞役預日飲食不調精神不足或氣弱俱不可服待體氣和平天氣如常服之先補其陽使陽氣上升通於肝經之末利空穀於目矣

肉桂一錢去皮

知母炒

當歸身酒洗

生地黃酒

白茯苓

澤瀉

陳皮

已上各各

白芍藥

防風五錢已上各

黃芪

人参

白朮

羌活

獨活

熟地黃

甘草已上各一兩

柴胡兩

右咬咀每服五錢水

二盞煎至一大盞去相空心服之

鴻陰火丸

益陰丸存性一名連藥

石決明三錢炒

益陰丸存性

羌活

獨活

甘草

當歸梢

五味子

防風五錢

已上各

草決明

四錢炒

細黃芩

黃連炒

黃芩

知母已上各一兩

右爲細末煉蜜爲丸如菉豆大毋

服五十丸至一百丸茶清下常多服補陽湯少服此藥多則妨飲食

升陽柴胡湯

肉桂五分

柴胡去節一錢

知母酒炒如大者

防風

白茯苓

澤鴻

陳皮已上各一錢

生地黃炒酒

楮實酒炒微潤

黃芪

人參

白朮已上各五錢

甘草稍

當歸身

羌活

熟地黃

獨活

白芍藥已上各兩

右剉每服五錢水二盞煎至一盞去粗稍熟食遠服

別合一料煉蜜爲丸如梧桐子大每服五十九茶清下每日與前藥各一服食遠不可飽服

如天氣熱加五味子三錢

天門冬心芍藥楮實已上各五錢

溫衛湯 治鼻不聞杳臭目中流火氣寒血熱冷淚多臍下冷陰汗足痿弱

陳皮

青皮

黃連

木香已上各三分

人參

炙甘草

白芷

防風

黃蘖

澤鴻已上各五分

黃芪

蒼朮

升麻

知母

柴胡

羌活已上各一錢

當歸身

一錢

右都作一服水一盞煎至一盞去粗食遠服之

圓明膏 治勞心過度飲食失節乃生內障及瞳子散大此方收睛圓明

詞子皮

濕紙裹煨

甘草已上各二錢

當歸身三錢

柴胡

生地黃

麻黃去節

搗開

黃連

已上

右七味先以水二碗煎麻黃至一碗掠去沫外六味各咬咀如豆大篩去未入在內同煎滴水中不散為度入熟蜜少許再熬勤點眼

噙藥麻黃散

治内外障眼

麻黃

兩
當歸身

右二味同爲粗末炒黑色入麝香乳香少許共爲細末含水真內噴之

療本滋腎丸

黃藥酒

知母

酒炒已上各等分

右爲細末滴水爲丸如梧桐子大每服一百丸至一百五十九空心

鹽白湯下

加味滋腎丸

肉桂

三分

黃連

一錢

姜黃

五分

苦參

三分

苦亭磨

酒洗

石膏

勿用

黃藥

酒炒

知母

酒炒已上各五錢

右爲極細末打薄麵糊爲丸如梧桐子大每服一百丸空心服白湯下食壓之

退翳膏 治黑目翳

蕤仁

三分

升麻

已上各

連翹

四分

防風

四分

青皮

配土各

甘草

各

紫胡

五分

升麻

二錢

當歸身

六分

荆芥穗

十錢

水半盞別浸

生地黃

一錢

黃連

三錢

右用

水

一碗

入前藥煎至半碗

去粗更上火煎至半盞入荆芥水兩匙入蜜少許再上火熬匀點之

龍膽飲子 治疳眼流膿生瘡醫濕熱爲病

穀精草

川芎

蛇退皮

炙甘草

已上各五分

麻黃

一錢

升麻

二錢

青蛤粉

草龍膽

黃芩

炒

羌活

已上各三錢

右爲細末每服一錢食後溫茶清調服之

柴胡聰耳湯 治耳中乾結耳鳴耳聾

連翹

四錢

柴胡

三錢

炙甘草

當歸身

人參

已上各一錢

水蛭

五分

別研炒

麝香

少許

軍虫三箇去翅足炒另研 右除三味別研外生薑三片水一大盞煎至一盞去粗再下三味上火煎一二沸

稍熱服食遠

羌活退翳湯 治太陽寒水瞖膜遮睛不能視物

羌活

一兩五錢

防風

一兩

荆芥穗

煎成藥加之

薄荷葉

藁本

七錢

酒知母

五錢

黃檗

四錢

川芎

當歸身

已上三錢

酒生地

一錢

細辛

許

麻黃

二錢用根

右咬咀每服三錢水二大盞煎至一盞半入荆芥穗再煎至一盞去粗稍熱服食遠忌酒醋濕麵等

還睛紫金丹 治目眶歲久赤爛俗呼為赤瞎是也當以二棱針刺目眶外以濕熱如眼生倒睫拳毛

兩目緊蓋內伏火熱而攻陰氣法當去其熱內火邪眼皮緩則毛立出瞖膜亦退用手法攀出內臉向外以針刺之出血

白沙蜜

二十兩

甘石

十兩燒七遍碎連水浸并

黃丹

六兩

水飛

揀連

三兩小便浸碎為末

南乳香

當歸

已上各

烏魚骨

二錢各上

硝砂

小盞口上熏乾瓶內放於

麝香

一錢已上各

白丁香

直者五分

輕粉

一兩

右

將白沙蜜於沙石器內慢火去沫下甘石次下丹以柳枝攬次下餘藥以粘手為度作丸如雞頭大

每用一丸溫水化開洗

麗澤通氣湯 治鼻不聞香臭

黃芪

四錢

荳木

羌活

獨活

防風

升麻

葛根

已上各三錢

炙甘草

二錢

麻黃

不去節冬月加

川椒

白芷

已上各一錢

右咬咀每服五錢生薑三片棗一枚葱白三十同煎至

一盞去相溫服食達忘一切冷物及風寒涼處坐卧行立

溫肺湯 治鼻不聞香臭眼多眵淚

丁香二分

防風 炙甘草 葛根

羌活已上各一錢

升麻

黃芪二錢已上各

麻黃不去節四錢

右爲粗末水一盞葱白二根煎至一盞去相食後服

禦寒湯 治寒氣風邪傷於毛皮令真確塞咳嗽上喘之證

黃連

黃檗

羌活已上各二分

炙甘草

佛甘草

款冬花

白芷

防風

三分已上各

升麻

人參

陳皮五分已上各

荳朮

黃芪一錢

右咬咀都作一服水一盞煎至一盞

去相食後熱服

蘭室秘藏卷中

東垣老人 李杲 撰
明 新安 吳勉學校

頭痛門

頭痛論

金匱真言論云東風生於春病在肝俞在頸項故春氣者病在頭又諸陽會於頭面如足太陽膀胱之脉起於目內皆上額交顙上入絡腦還出別下項病衝頭痛又足少陽膽之脉起於目鏡皆上抵頭角病則頭角額痛夫風從上受之風寒傷上邪從外入客於經絡令人振寒頭痛身重惡寒治在風池風府調其陰陽不足則補有餘則瀉汗之則愈此傷寒頭痛也頭痛耳鳴尤竅不利者腸胃之所生乃氣虛頭痛也心煩頭痛者病在膈中過在手巨陽少陰乃濕熱頭痛也如氣上不下頭痛癲疾者下虛上實也過在足少陰巨陽甚則入腎寒濕頭痛也如頭半邊痛者先取手少陽陽明後取足少陽陽明此偏頭痛也有真頭痛者甚則腦盡痛手足寒至節死不治有厥逆頭痛者所犯大寒內至骨髓髓者以腦為主腦逆故令頭痛齒亦痛凡頭痛皆以風藥治之者總其大體而言之也高顙之上惟風可到故味之薄者陰中之陽乃自地升天者也然亦有三陰三陽之異故太陽頭痛惡風脉浮緊川芎羌活獨活麻黃之類為主少陽經頭痛脉弦細往來寒熱柴胡為主陽明頭痛自汗發熱惡寒脉浮緩長實者升麻葛根石膏白芷為主太陰頭痛必有痰體重或腹痛為痰癖其脉沉緩蒼朮半夏南星為主少陰經頭痛三陰三陽經不流行

而足寒氣逆為寒厥其脉沉細麻黃附子細辛為主厥陰頭項痛或吐痰沫厥冷其脉浮緩吳茱萸湯主之血虛頭痛當歸川芎為主氣虛頭痛人參黃芪為主氣血俱虛頭痛調中益氣湯少加川芎蔓荆子細辛其効如神白朮半夏天麻湯治痰厥頭痛藥也青空膏乃風濕熱頭痛藥也羌活附子湯治厥陰頭痛藥也如濕氣在頭者以苦吐之不可執方而治先師嘗病頭痛發時而煩青黃單眩目不欲開懶言身體沉重兀兀欲吐潔古曰此厥陰太陰合病名曰風痰以局方玉靈丸治之更火鍼谿穴即愈是知方者體也法者用也徒執體而不知用者弊體用不失可謂上工矣

清空膏 治偏正頭痛年深不愈者善療風濕熱氣上壅損目及腦痛不止

川芎伍錢
剉一半酒炒 茄胡柒錢
去芦 黃連炒 防風去芦 羌活已上各壹兩
右為細末每服二錢七於盞內入茶少許湯調如膏抹在口內少用白湯送下臨卧
如苦頭痛每服加細辛貳分 如太陰脉緩有疾名曰痰厥頭痛減羌活防風川芎甘草加半夏壹兩
伍錢 如偏正頭痛服之不愈減羌活防風川芎一半加柴胡壹倍 如發熱惡熱而渴此陽明頭痛只與白虎湯加好吳白芷

徹清膏

蔓荆子

已上各壹分

薄荷葉

已上各叁分

生甘草

熟甘草貳分

藁本

壹錢

右為細

末每服二錢

食後茶清調下

川芎散 治頭目不清利

川芎

參分

柴胡

參分

羌活

藁本

生甘草

升麻

壹錢

熟甘草

酒生地黃

錢

酒黃連

炒

酒黃芩

已上各肆
錢伍分

右為細末每服一錢或二三錢食後茶清調下忌酒濕麵

白芷散

一名鬱金散

治頭痛

鬱金

壹錢

香白芷

石膏

已上各

薄荷葉

芒硝

已上各

右為極細末口含水鼻內噙之

碧雲散

治頭痛

細辛

鬱金

芒硝

已上各

蔓荆子

川芎

已上各

石膏

壹錢

青黛

壹錢

薄荷葉

貳錢

紅豆

壹箇

右為極細末口噙水鼻內噙之

羌活清空膏

蔓荆子

壹錢

黃連

參錢

羌活

防風

甘草

肆錢

黃芩

壹兩

右為細末每服一錢茶清
調下食後臨卧

清上瀉火湯

昔有人年少時氣弱常於氣海三里灸之節次約五七十壯至年老添熱厥頭痛雖久天
大寒猶喜寒風其頭痛則愈微來暖處或月烟火其痛復作五七年不愈此灸之過也

荆芥穗

川芎

已上各

蔓荆子

當歸身

蒼朮

已上各

酒黃連

生地黃

藁本

甘草

已上

升麻

防風

已上各

酒黃藥

炙甘草

黃芪

已上各

酒黃芩

酒知母

已上各

羌活

錢伍分

參錢

柴胡

伍錢

細辛

少許

紅花

少許

右剉如麻豆大分作二服每服水二盞煎至一盞去

粗稍熱服食後

補氣湯 服前藥之後服此藥

柴胡
貳分

升麻
參分

黃芪
捌分

當歸身
貳錢

炙甘草
肆錢

紅花
少許

右咬咀作二服

水二盞煎至一盞去粗稍熱服食後

細辛散 治偏正頭痛

細辛
瓦粉
已上各

生黃芩
貳分

芍藥
五分

酒黃連
已上各

川芎
柒分

炒黃芩
各壹

酒黃芩
已上各

柴胡
柒分

防風

細黃芩
伍錢

羌活湯 治風熱壅盛上攻頭目昏眩

炙甘草
柒分

澤瀉
壹錢

酒洗瓜萎根
各

白茯苓
各

酒黃芩
伍錢

柴胡
柒分

防風
已上各

細黃芩
伍錢

芩
酒洗

酒黃連
已上各

羌活
壹兩

右為麌末每服五錢重水用二盞煎至一盞取清食後臨卧通

口熱服之

養神湯 治精神短不得睡項筋腫急難伸禁甘溫宜苦味

木香
橘皮

柴胡
已上各

酒黃芩
貳分

人參
黃芩

白朮
白木

川芎
已上各

升麻
參分

肆分

蒼朮
麥蘖麵

當歸身
壹分

黃連
已上各

甘草
伍分

半夏
已上各

黃芪
壹錢

右咬咀每服五錢

水二大盞煎至一盞去粗稍熱服不拘時候

安神湯 治頭痛頭旋眼黑

生甘草
已上各

炙甘草
貳錢

防風
貳錢

柴胡
已上各

升麻
伍分

酒生地黃
已上各

酒知母
肆錢

酒黃檗
已上各

羌活
已上各

活已上各

黃芪二兩

右為麩末每服五錢水二大盞半煎至一盞半加蔓荆子五分川芎三分

分

再煎至一盞去粗臨臥熱服

半夏白朮天麻湯 范天驥之內有脾胃證時顯煩躁胸中不利大便不通而又為寒氣拂鬱頭目作火不伸故也疑其有熱服疎風丸大便行其病不減恐其藥少再服七八十九大便復見兩行前證不瘳增以吐逆食不能停痰唾稠粘湧出不止眼黑頭旋心煩悶氣短促上喘無力自言心神顛倒目不敢閉如在風雲中頭苦痛如裂身重如山四肢厥冷不得安臥余料前證皆是胃氣已損復下兩次則重虛其胃而痰厥頭痛作矣與此藥而治之

黃蘖

青分酒洗

乾薑

參分

澤瀉

白朮令

天麻

黃芪

人參

蒼朮

已上各

伍分

炒神曲

白

术記錢

各

麥蘖麵

半夏湯洗

橘皮

已上各

伍分

右㕮咀

每服五錢水

二大盞半

煎至一盞去粗

熱服食前一服而愈此頭痛甚謂之足太陰痰厥頭痛非半夏不能療眼黑頭旋風虛內作非天麻不能除黃蘖甘溫濕火補元氣實表虛止自汗人參甘溫濕火補中益氣二木俱苦甘溫除濕補中益氣澤瀉苓利小便導濕橘皮苦溫益氣調中升陽神曲消食薄胃中滯氣大麥麴實中助胃氣乾薑辛熱以滌中寒黃蘖大苦寒酒洗以療之天少火在泉發躁也

口齒咽喉門

口齒論

論曰夫齒者腎之標口者脾之竅諸經多有會於口者其牙齒是手足陽明之所過上齦隸於坤土乃足

陽明胃之脉所貫絡也止而不動下齦嚼物動而不休手陽明大腸之脉所貫絡也手陽明惡寒飲而喜熱足陽明喜寒飲而惡熱其病不一牙者腎之標亦喜寒寒者堅牢為病不同熱甚則齒動齦斷脫作痛不已故所治療不同也有惡熱而作痛者有惡寒而作痛者有惡寒惡熱而作痛者有惡寒飲少熱飲多而作痛者有惡熱飲少寒飲多而作痛者有牙齒動搖而作痛者有齒齦腫起為痛者有脾胃中有風邪但覺風而作痛者又有牙上多為蟲所蝕其齒缺少而色變為蟲牙痛者有胃中氣少不能於寒袒露其齒作痛者有牙齒疼痛而穢臭之氣不可近者痛既不一豈可一藥而盡之哉

羌活散 治客寒犯腦風寒濕腦痛項筋急牙齒動搖內齦袒脫疼痛

藁本 香白芷 桂枝已上各分 蒼朮 升麻已上各分 當歸身陸分 草豆蔻仁壹錢 羌活壹錢
伍分 羊脰骨灰鐵錢 麻黃根節 防風已上各分 茄胡伍錢 細辛少許 右為細末先用溫水嗽口淨擦之其痛立止也

草豆蔻散 治寒多熱少牙齒疼痛

細辛葉 防風已上各分 羊脰骨灰 熟地黃已上各分 當歸陸分 草豆蔻仁 黃連已上各分
升麻貳錢 右為細末同前牙痛處擦之

麻黃散 治冬寒時分寒濕腦痛項筋急牙齒動搖疼痛

防風 藁本已上各分 羊脰骨灰 當歸身 熟地黃已上各分 草豆蔻仁 升麻 黃連已上各分
羌活壹錢 麻黃不去 草龍膽酒洗 生地黃已上各分 細辛少許 右為細末依前藥法擦之

熱牙散一名麝香散 治大熱牙齒瘡露根肉齦脫血出齒動欲落疼痛妨食物餚反忤熱多

熟地黃二分

益智仁二分

當歸身

生地黃

麻黃根

酒漢防已

人參已上各參分

升麻

錢一

草豆蔻

黃連已上各錢五分

羊脰骨灰

二錢

麝香少許

右為細末如前藥擦之

治蟲散一名白芷散

治大寒犯腦牙齒疼痛及蟲癟胃經濕熱腫痛

桂枝一分

熟地黃二分

藁本

白芷已上各三分

當歸身

益智仁

黃連四分

羌活

伍分

吳茱萸八分

草豆蔻

黃芪

升麻已上各一錢

羊脰骨灰

二錢

麻黃不去節三錢

右為細末同前擦

之

益智末律散 治寒熱牙痛

木律二分

當歸

黃連已上各四分

羊脰骨灰

益智皮

熟地黃五分

草豆蔻

皮貳分

升麻

壹錢伍分

右為細末用度如前擦之

如寒牙痛不用木律

蠍稍散 治大寒風犯腦牙痛

白芷

當歸身

柴胡已上各貳分

桂枝

升麻

防風

藁本

黃芪叁分

羌活

伍分

草豆

蔻皮壹

麻黃去節壹伍分

羊脰骨灰

貳錢伍分

蠍稍

少許

右為細末如前法用之

白牙散

升麻壹錢

石膏

壹錢伍分

羊脰骨灰

貳錢

麝香少許

右為細末先用溫水嗽口擦

之妙

刷牙藥

麝香壹分 生地黃 酒防已 熟地黃已上各當歸身 人參已上各 草豆蔻皮伍錢 升麻壹錢
羊脛骨灰 黃連已上各 白豆蔻 草豆蔻已上各 參錢 没石子參箇 五倍子壹箇 右為極細末
如前法擦之妙

獨聖散 治一切牙痛風疳

北地蒺藜不以多少陰乾 右為細末每用刷牙以熱漿水漱牙外麌末熬漿水刷牙大有神効不可真述

當歸龍膽散 治寒熱停牙痛

香白芷 當歸梢 羊脛骨灰 生地黃 麻黃 草豆蔻皮 草龍膽 升麻 黃連已上各 錄
錢 右為細末如前法擦之神効

牢牙地黃散 治腦寒痛及牙痛

藁本貳分 生地黃 熟地黃 羌活 防已 人參已上各 當歸身 益智仁肆分 各 香白芷
黃芪已上各 伍分 羊脛骨灰 吳茱萸 黃連 麻黃已上各 草豆蔻皮貳錢 升麻壹錢 右為

細末如前法擦之

細辛散 治寒邪風邪犯腦牙齒痛

柴胡 防風 升麻 白芷貳分 各 桂枝貳分 麻黃去節 藁本 蒼朮已上各 當歸身肆分

草豆蔻

伍分 羊脰骨灰

羌活

已上各 錢伍分

細辛少許 右為細末先漱後擦之佳

立効散

治牙齒痛不可忍及頭腦項背痛微寒飲大寒飲其脉上中下三部陽虛陰盛是五臟內

盛六腑陽道脉微小小便滑數

細辛

貳分 天甘草

參分

升麻

柒分

防風

壹錢

草龍膽

肆錢

酒洗右咬咀都作一服水一盞煎

至七分去粗以匙抄在口中燙痛處待少時則止 如多惡熱飲更加草龍膽壹錢此法不定隨寒

熱多少臨時加減 若更惡風作痛加草豆蔻黃連

已上各 伍分勿加草龍膽

牢牙散

治牙齦肉綻有根牙疳腫痛牙動搖欲落牙齒不長牙黃口臭

羌活

壹兩

草龍膽

酒洗壹兩伍錢

羊脰骨灰

貳分

升麻

肆兩

右為細末以紗羅子羅骨灰作微塵末

和匀臥時貼在牙齦上

清胃散

治因服補膏熱藥致使上下牙疼痛不可忍牽引頭腦滿面發熱大痛足陽明之別絡入腦喜

寒惡熱乃是手陽明經中熱盛而作也其齒喜冷惡熱

當歸身

擇細黃連

如連不好更加

生地黃

酒洗製已上各分

牡丹皮

伍分

升麻

壹錢

右為細末都作

一服水一盞半煎至一盞去粗帶冷服之

神功丸

治多食肉人口臭不可近牙齒疳蝕牙齦肉將脫牙齒落血不止

蘭香葉

如無

當歸身

藿香用葉

木香

已上各

升麻

貳錢

生地黃

酒洗

生甘草

已上各參錢

黃連

去鬚淨

縮砂仁

已上各

右同為細末湯浸餅為丸如葵豆大每服一百丸或加至二百

丸止白湯下食遠服兼治血痢及血崩及血下不止血下褐色或紫色黑色及腸澼下血空心服米

湯下其脉洪大而緩者及治麻木厥氣上衝逆氣上行安聞妄見者

桔梗湯 治咽腫微覺痛聲破

當歸身 馬勃

已上各壹分

白僵蠶

黃芩已上各叁分

麻黃

伍分不

桔梗

甘草已上各壹錢

桂枝

少許

右為麌末作一服水二大盞煎至一盞去粗稍熱服之食後

又方 治口瘡久不愈者

黃藥

不計多少真者蜜塗其上又黃色

右為細末乾糝瘡上臨卧忌醋醬鹽

神驗法 治口瘡無問久新

夜間將二丸以勒繫左右交手揉三五十次但遇睡覺行之如此三五度因濕而生者一夜愈久病諸般口瘡三二夜愈如鼻流清涕者勒繫一丸揉之數夜可愈
內經云膀胱移熱於小腸隔腸不便上口為癰易老五苓散與導赤散合而飲之
嘔吐門

丁香茱萸湯 治嘔吐噦胃虛寒所致

黃蘖

參分

炙甘草 丁香 柴胡 橘皮

已上各伍分

升麻

柒分

吳茱萸 蒼朮 人參

已上各壹錢

當歸身

壹錢伍分

草豆蔻仁 黃芪

已上各貳錢

右為麌末每服五錢水二大盞煎至一盞去粗稍熱服

食前

白术湯

一名伏苓
半夏湯

治胃氣虛弱身重有痰惡心欲吐是風邪羈絆於脾胃之間當先實其脾胃

各伍錢

右㕮咀每

炒神曲

貳錢

陳皮 天麻

各伍錢

白术

白茯苓

麥蘖麵

炒黃

半夏

各伍錢

右㕮咀每

補肝湯

一名柴胡
半夏湯

治素有風證不敢見風眼澀頭痛眼黑胸中有痰惡心兀兀欲吐遇風但覺皮肉緊

手足難舉重物如居暖室少出微汗其證乃減再或遇風病即復

半夏

貳錢

生姜

拾片

柴胡 升麻 薑本

已上各伍分

白茯苓

茶分

炒神曲

蒼术

各壹錢

半夏

貳錢

生姜

拾片

右為麌末都作一服水一大盞煎至一大盞去粗稍熱服

吳茱萸丸

一名木香
利膈丸

治寒在膈上噎塞咽膈不通

木香 青皮

已上各貳分

白薑

蘇子

姜黃

澤鴻

柴胡

肆分

當歸身

陸分

災甘草

陸分

益智仁

各伍錢

麥蘖麵

伍分

人參 橘皮 升麻 黃芪

已上各捌分

半夏

壹錢

草豆蔻仁

吳茱萸

已上各伍錢

吳茱萸

伍分

麥蘖麵

伍分

當歸身

陸分

災甘草

陸分

益智仁

各伍錢

右為細末湯浸餅為丸如棗豆大每服二十九溫水送下勿多飲湯恐連下細嚼亦得

衄血吐血門

麥門冬飲子 治吐血久不愈以三棱鍼於氣街出血立愈

黃芪

壹錢

麥門冬

當歸身

生地黃

人參

伍分

五味子

拾箇

右為麌末都作一服水

二盞煎至一盞去粗熱服不拘時

人參飲子 治脾胃虛弱氣促精神短少衄血吐血

麥門冬
人參去芦
當歸身各一錢
黃芪
白芍藥
甘草各一錢
五味子伍箇
右

為麤末都作一服用水二盞煎至一盞去粗稍熱服

一貧者有前證以前藥投之愈繼而至冬天居曠室中臥大熱炕而吐血數次再來求治料此病久虛弱附腫有形而有火熱在內上氣不足陽氣外虛當補表之陽氣漏其裏之虛熱是其法也冬天居曠室衣蓋單薄是重虛其陽表有大寒壅遏裏熱火邪不得舒伸故血出於口憶仲景傷寒論中一證太陽傷寒當以麻黃湯發汗而不與之遂成衄却與麻黃湯立愈此法相同予遂用之

三黃補血湯 治六脉俱大按之空虛心面赤善驚上熱乃手少陰心脉也此氣盛多而亡血以甘寒鎮

墮之劑大瀉其氣以墮氣浮以甘辛微苦峻補其血

牡丹皮
黃芪
升麻各一錢
當歸
柴胡各一錢
熟地黃
川芎各一錢
生地黃各一錢
白芍藥
伍錢
右㕮咀如麻豆大每服五錢水二大盞煎至一大盞去粗稍熱服食前
如兩寸脉芤血在上焦或衄血或嘔血與犀角地黃湯則愈

救肺湯
散治吐血

甘草
蘇木
陳皮各一錢
升麻
柴胡
蒼朮各一錢
當歸稍
熟地黃
白芍藥
黃芪
人參各一錢
右為麤末都作一服水二大盞煎至一盞去粗稍溫良前服

麻黃桂枝湯

人參
益上焦元氣不足而濟其表也
麥門冬
保肺氣各一錢
桂枝
表虛
當歸身
和血養血各伍錢
麻黃根
甘草
補其脾胃之虛

黃芪實箭

白芍藥上各

五味子伍錢

真麻氣

右以水三盞先煮麻黃一味令沸去沫至二盞八

餘藥同煎至一盞去粗熱服臨卧只一服而愈更不再作

黃芪芍藥湯 治鼻衄血多而黃眼澀多眵手麻木

葛根羌活

已上各伍錢

升麻已上各

壹兩

炙甘草貞兩

白芍藥

黃芪參兩

右㕮咀每服伍錢水

二盞煎至一盞食後

六脉弦細而澀按之空虛其色必白而天不澤者脫血也此大寒證以辛溫補血益血以甘溫甘熱滑潤之劑以佐之則愈此亡血亦傷精氣

止衄血法 治鼻血久不生素有熱而暴作者諸藥無驗補法以大紙一張作八摺或十摺於水內濕置項中以熱熨斗熨至一重或二重紙乾立止

腰痛門

川芎肉桂湯

丁未冬曹通甫自河南來有役人小翟露宿寒濕之地腰痛不能轉側而脇痛急作痛已經月餘不愈矣腰痛論中說皆為足太陽足少陰血絡中有凝血作痛間有一二證屬少陽膽經外絡脉病皆去血絡之凝乃愈其內經有云冬三月禁不得用鍼只宜服藥通其經絡破其血絡中敗血以此藥主之

酒漢防已 防風已上各

卷分

炒神曲

獨活已上各

伍箇

川芎

柴胡

肉桂

當歸梢

炙甘草

蒼朮已上各

伍箇

桃仁

伍箇去皮

右㕮咀都作一服好酒三大盞煎至一大盞去粗粗

熱食遠服

獨活湯 治因勞後腰痛如折沉重如山

炙甘草 壹錢 羌活 防風 獨活 大黃 煨

澤鴻 肉桂 已上各參錢

當歸稍 連翹 伍錢各

酒漢防已 酒黃藥 已上各壹兩 桃仁 參拾

右㕮咀每服五錢酒半盞水一大盞半煎至一盞去粗熱

服

破血散疼湯 治乘馬損傷跌其脊骨惡血流於脇下其痛苦是不能轉側妨於飲食

羌活 防風 中桂 已上各壹錢

蘇木 伍分壹錢

連翹

當歸梢

柴胡 已上各貳錢

水蛭 參錢炒去

麝

香少許

右伴分作二服每服酒二大盞水一大盞除水蛭麝香另研如泥煎餘藥作一大盞去粗

上火令稍熱調一味空心服之兩服立愈

地龍散 治腰脊痛或打撲損傷從高處落至惡血在太陽經中令人腰脊痛或脰項臂股中痛不可忍算

塞不通

當歸梢 壹分 中桂 地龍 已上各肆分

麻黃 伍分 蘇木 陸分

獨活

黃藥 已上各

甘草 壹錢

羌

活 貳錢

桃仁 陸箇

右㕮咀每服五錢水二盞煎至一盞去粗溫服食遠

蒼木湯 治濕熱腰腿疼痛

防風 能勝濕

黃藥 已上各壹錢始得之時寒也久不愈寒化為熱除濕止痛

柴胡 貳錢行經

蒼朮 參錢去溫止痛

右都作一服水二大盞

煎至一盞去粗空心服

麻黃復煎散 治陰室中汗出懶語四肢困倦無力走注疼痛乃下焦伏火而不得伸浮而躁熱汗出一身盡痛蓋風濕相搏也以升陽發汗漸漸發之火鬱及濕在經者亦宜發汗况正值季春之月脉緩而遲尤宜發汗令風濕去而陽升以此困倦乃退氣血俱得生旺也

白朮 人參 生地黃 柴胡 防風已上各 羌活 黃藥已上各 麻黃去節微搗不令作末
沫煎至二盞入黃芪已上各 茯苓兩錢 甘草卷錢 杏仁三箇去皮 右咬咀都作一服入麻黃湯煎至一盞臨臥服之勿令食飽取漸次有汗則効

緩筋湯一名羌活湯 治兩目如火腫痛兩足及伏兔筋骨痛膝少力身重腰痛夜寒瘡瘍頸項皆急痛目外眵目急食不下

熟地黃壹分 生甘草 柴胡 紅花 炙甘草 蘆木 獨活已上各 藁本 升麻 黃芩
草豆蔻仁 酒黃藥 生地黃 當歸身 麻黃已上各 羌活卷錢 蒼朮伍分 右為麌末都作一服水二大盞煎至一盞去粗食遠服之

拈痛湯 治濕熱為病肩背沉重肢節即皮痛胸膈不利

白朮壹錢伍分 人參去芦 苦參酒炒 升麻去芦 葛根 蒼朮已上各 防風去芦 知母酒洗
澤瀉炒 黃芩酒洗 猪苓參錢 當歸身已上各 炙甘草 黃芩酒洗 茵陳酒炒 羌活已上各 伍錢
右 咬咀每服一兩水二大盞煎至一盞去粗食遠服

蒼朮復煎散 治寒濕相合腦后痛惡寒項筋脊骨強肩背肿眼痛膝臍痛無力行步沉重

紅花

壹分

黃藥

參分

柴胡

壹分

澤瀉

各

升麻

伍分

羌活

壹錢

蒼朮

肆兩水
二碗煎

二盞去
粗入藥

右㕮咀先煎蒼朮湯一大盞復煎前項藥至一大盞稍熱空心服取微汗為妙忌酒濕麵

羌活蒼朮湯 治脚膝無力沉重

炙甘草

黃藥

草豆蔻

生甘草

葛根

已上各
伍分

橘皮

陸分

柴胡

柒分半

升麻

獨活

縮

砂仁

蒼朮已上各

防風

壹錢
伍分

黃芪

貳錢

知母

貳錢
伍分

羌活

參錢

右㕮咀分作二服水二大

盞煎至一盞去粗空心服

婦人門

經閉不行有三論

陰陽別論云二陽之病發心脾有不得隱曲女子不月其傳為風消為濕實者不治婦人脾胃久虛或形羸氣血俱衰而致經水斷絕不行或病中消胃熱善食漸瘦津液不生夫經者血脉津液所化津液既絕為熱所燼肌肉消瘦時見渴燥血海枯竭病名曰血枯經絕宜溫胃之燥熱補益氣血經自行矣此證或經適行而有子子不安為胎病者有矣或心包脉洪數躁作時見大便祕澀小便雖清不利而經水閉絕不行此乃血海乾枯宜調血脉除包絡中火邪而經自行矣內經所謂小腸移熱於大腸為徵瘕為沈脉澀不利則月事沉滯而不利故云為徵瘕為沈也或因勞心心火上行月事不來安心和血瀉火經自行矣故內經云月事不來者胞脉閉也胞脉者屬心而絡於胞中令氣上迫肺心氣不得下故月事不來也

經漏不止有三論

陰陽別論云陰虛陽搏謂之崩婦人脾胃虛損致命門脉沉細而數疾或沉弦而洪大有力十關脉亦然皆由脾胃有虧下陷於腎與相火相合濕熱下迫經漏不止其色紫黑如夏月腐肉之臭中有白帶者脉必弦細寒作於中中有赤帶者其脉洪數疾熱明矣必腰痛或臍下痛臨經欲行先見寒熱往来兩物急縮兼脾胃證出月或四肢困熱心煩不得眠臥心下急宜大補脾胃而升舉血氣可一服而愈或人故貴脫勢人事疎少或先富後貧心氣不足其火大熾旺於血脉之中又致脾胃飲食失節火乘其中形質肌肉容顏似不病者此心病者不行於診故脾胃飲食不調其證顯矣而經水不時而下或適來適斷暴下不止治當先說惡死之言勸諭令拒死而心不動以大補氣血之藥舉養脾胃微加鎮墮六火之藥治其心補陰濡陽經自此妄擾論云非哀太甚則胞絡絕也陽氣內動發則心下崩數溲血也故本病曰大經空虛發則肌痺傳為脉痿此之謂也

升陽除濕湯一名調經升
麻除濕湯 治女子漏下惡血月事不調或暴崩不止多下水漿之物皆由飲食不節或勞傷形體或素有心氣不足因飲食勞倦致令心火乘脾其人必怠惰嗜卧四肢不收因倦乏力無氣以動氣短上氣逆急上衝其脉緩而弦急按之洪大皆中之下得之脾土受邪也脾土滋榮周身者也心主血血主脉二者受邪病皆在脉脉者血之府也脉者人之神也心不主令包絡代之故曰心之脉主屬心系心系者包絡命門之脉也主月事因脾胃虛而心包乘之故漏下月事不調也况脾胃虛氣陰陽之根蒂也當除濕去熱益風氣上伸以勝其濕又云火鬱則發之

當歸酒洗

獨活配土各

蔓荆子

桑分

防風 炙甘草 升麻

藁本

已上各
錢

柴胡

羌活

蒼朮 黃芪

已上各壹錢伍分

右剉如麻豆勿令作末都作一服以潔淨新汲水二大盞煎至一大盞

去粗空心熱服待少時以早飯壓之可一服而已如灸足太陰脾經中血海穴二七壯亦已
此藥乃從權之法用風勝濕為胃下陷而氣迫於下以救其血之暴崩也併血惡之物住後必須審
芪人參炙甘草當歸之類數服以補之於補氣升陽湯中加以和血藥便是也若經血惡物下之不
絕尤宜究其根源治其本經只益脾胃退心火之亢乃治其根蒂也若遇夏月白帶下脫漏不止宜
用此湯一服立止

涼血地黃湯 治婦人血崩是腎水陰虛不能鎮守包絡相火故血走而崩也

黃芩

荆芥穗

蔓荆子

已上各壹分

黃蘖

知母

藁本

細辛

川芎

已上各壹分

黃連

羌活

柴胡

升麻

防風

已上各卷分

生地黃

當歸

已上各伍分

甘草

壹錢

紅花

少許

右㕮咀都作一

服水三大盞煎至一盞去粗稍熱空心服之

足太陰脾之經中血海二穴在膝臍上內膝白肉際二寸中治女子漏下惡血月事不調逆氣腹脹其脉
緩者是也灸三壯

足少陰腎之經中陰谷二穴在膝內輔骨後大筋下小筋上按之應手屈膝取之治膝如錐不得屈伸舌
縱涎下煩逆溺難少腹急引陰痛股內膝痛婦人漏血不止腹脹滿不得息小便黃如蠱女子如妊娠
可灸一壯

酒煮當歸丸 治癩疝白帶下症脚氣腰已下如在冰雪中以火焙炕重重厚綿包裹其上猶寒冷不任

寒之極也。面白如枯魚之象。肌肉如刀割削瘦凌之速也。小便不止與白帶長流而不禁。固自不知覺。面白目青藍如荼。目眊眊無所見。身重如山行步欹側不能安地。腿膝枯細大便難秘。口不能言。無力之極。食不下心。下痘煩心懊惱不任其苦。而停垢背惡寒小便遺。而不知此。上中下三陽真氣俱虛。欲竭熾嘔不止。冒虛之極也。脉沉厥緊而澀。按之空虛若無。若脉洪大而澁。按之無力。猶為中寒之證。況按之空虛者乎。按之不敢是為陰寒。方氣血俱虛之極也。

茴香伍錢 黑附子炮裂去皮鹽 良姜已上各半錢 當歸壹兩 右四味剉如麻豆大以上等好酒一升半
同煮盦酒盡焙乾

炙甘草 苦練生用 丁香已上各伍錢 木香 升麻已上各壹錢 柴胡貳錢 炒黃鹽 全蠍已上各叁錢
延胡索肆錢 右與前四味藥同為細末。酒煎麵糊為丸。如梧桐子大。每服五十九。空心淡醋湯
下。忌油膩冷物。酒濕麵。

固真丸 治白帶久下。不止。臍腹冷痛。陰中亦然。目中溜火視物。眊眊然無所見。齒口是氣飲痛。須得黃連細末擦之乃止。惟喜乾食。大惡湯飲。此病皆寒濕乘其胞內。故喜乾而惡濕。肝經陰火上滯。走於標故上壅而目中溜火。腎水侵肝而上溢。致目眊眊而無所見。齒惡熱飲者。是陽明經中伏火也。治法當大瀉寒濕。以丸約治之。故曰寒在下焦。治宜緩。大忌湯散。以酒製白石脂。白龍膏以枯其濕。炮乾姜。太鼓半瀉寒水。以薑藥之大寒為因。用又為鄉導。故云古者雖有重罪不絕人之後。又為之伏其听主。先其所因之意。而又瀉齒中惡痰飲也。以柴胡為本經之使。以芍藥五分道之。蓋深恐辛散之藥太甚。損其肝經。是

故微瀉之以當歸身之辛溫大和其血脉此用藥之法備矣

黃蘖酒洗

白芍藥已上各伍分

柴胡

白石脂已上各壹錢水飛細研日乾

白龍骨酒煮日乾水飛為末

赤錢
乾薑肆錢

右件除龍骨白石脂水飛研外同爲細末水煮麵糊爲丸如雞頭仁大日乾空

心多用白沸湯下無令胃中停滯待少時以早飯壓之是不令欬嗽犯胃忌生冷硬物酒濕麵

烏藥湯 治婦人血海疼痛

當歸 甘草

木香已上各伍錢

烏藥

香附子貳兩炒

右㕮咀每服五錢水二大盞去相溫服

食前

助陽湯一名升陽燥濕湯

治白帶下陰戶中痛按心而急痛身黃皮緩身重如山陰中如水

生黃芩

橘皮已上各伍分

防風

高良薑

乾薑

郁李仁

甘草已上各壹錢

柴胡

白葵花

桑果

右剗如麻豆大分作二服

每服水二大盞煎至一盞去相食前稍熱服

水府丹 治婦人久虛積冷經候不行癥瘕塊腹中暴痛面有點點黎黑羸瘠

硇砂紙隔沸湯淋熱取

紅豆已上各伍錢

桂心木根爲

木香

乾薑已上各壹兩

砂仁

貳兩

經皮

花蕊石研末兩伍

錢

班貓壹百箇去頭翅

生地黃汁 童子小便升臘月狗膽茶一枚

芳蜻參百箇去頭足糯米一升炒米黃去米不用

右九味爲細末同三汁熬爲膏和丸如雞頭大硃砂爲衣每服一丸溫酒細嚼食前服米飲亦可孕婦不可服

丁香膠艾湯 治崩漏不止蓋心氣不足勞役及飲食不節所得經隔少時其脉二尺俱弦緊洪按之無

力其證自覺脣下如水未厚衣被以禦其寒白帶白滑之物多聞有如屋漏水下時有鮮血右尺脉時微洪也

熟地黃 白芍藥已上各川芎各 丁香四分 阿膠陸分 生艾葉壹錢 當歸二錢 右川芎當歸酒洗剉熟地黃丁香為細末艾亦剉都作一服水五大盞先煎五味作一盞零二分去粗人膠再上火煎至一大盞帶熱空心服之

黃芩當歸人參湯

丁未仲冬郭大方來說其妻經水暴崩不止先曾損身失血自後一次縮一十日而來今次不甚人心窄性急多驚以手料之必因心氣不足飲食不節得之大方曰無到彼診得掌中寒脉沉細而緩而沉數九竅微有不利四肢無力上喘氣短促口鼻氣皆不調果有心氣不足脾胃虛弱之證胃脘當心而痛左脇下縮急有積當脅有動氣腹中鳴下氣大便難虛證極多不能盡錄擬先治其本餘證可以皆去安心定志鎮驚其驚調和脾胃大益元氣補其血脉令養其神以大熱之劑去其寒凝在皮膚內少加生地黃去命門相火不令四肢痿弱

黃連壹分 生地黃參分 炒神麩 橘皮 桂枝已上各伍分 草豆蔻仁陸分 黃芪 人參 麻黃不去節已上各各壹錢 當歸身伍分 杏仁五箇另研如泥 右㕮咀作二服水二大盞半煎麻黃令沸去沫煎至二盞入諸藥同煎至一大盞於己午之間食消盡服之一服立止其胃脘痛乃胃上有客寒與大熱藥草豆蔻丸十五丸白湯送下其痛立止再與肝之積藥除其積之根源而愈

當歸芍藥湯 治婦人經脈漏下不止其色鮮紅時值七月處暑之間先因勞役脾胃虛弱氣短氣逆自汗不止身熱悶亂惡見飲食非惟不入亦不思食沉懶困倦四肢無力大便時泄後再因心氣不足經脉再下不止惟覺氣下脫其元氣逆上全無惟覺心腹中氣下行氣短少不能言是無力以言非懶語也此藥主之

柴胡

貳分

炙甘草

生地黃

已上各參分

橘皮

不去白

熟地黃

已上各伍分

黃芪

宣錢伍分

蒼朮

湘浸去皮

當歸

身白芍藥

白朮

已上各貳錢

右十味㕮咀加麻豆大分作二服水一盞半煎至一盞去粗稍熱空

心服之

柴胡調經湯 治經水不止鮮紅項筋急腦痛脊強痛

炙甘草

當歸身葛根

已上各參分

獨活

藁本

升麻

已上各伍分

柴胡

柴分

羌活

蒼朮

已上各壹

錢紅花

少許

右剉如麻豆大都作一服水四太盞煎至一盞去粗空心稍熱服取微汗立止

一婦人經候凝結黑血成塊左廡有血瘕水泄不止穀有時不化後血塊暴下并水俱作是前後一陰有形之血脫竭於下既久經候猶不調水泄日見三兩行食罷煩心飲食減少甚至瘦弱東垣老人曰夫聖人治病必本四時升降浮沉之理權變之宜必先歲氣無伐天和無勝無虛遺人天殃無致邪無失正絕人長命故仲景云陽盛陰虛下之則愈汗之則死陰盛陽虛汗之即愈下之即死大抵聖人立法且如升陽或發散之劑是助春夏之陽氣令其上升乃濫秋冬收藏殞殺寒涼之氣此病是也當用此法治之升降浮沉之至理也天地之氣以升降浮沉乃從四時如治病不可逆之故經云順天則昌逆天則亡可不慎

哉夫人之身亦有四時天地之氣不可止認在外人亦體同天地也今經漏不止是前陰之氣已脫下矣水泄又數年是後陰之氣血下陷以脫矣後陰者主有形之物坐前陰者精氣之戶下竭是病人周身之血氣常行秋冬之令陰主殺此等收藏之病是也陽生陰長春夏是生左人之身令氣升浮者殺氣上行是也既病人周身血氣皆不生長殺氣又不勝其肌肉消少是兩儀之氣俱將絕矣既下元二陰俱脫血氣將竭假令當是熱證今下焦火脫化為寒矣此病久沉久降寒濕大勝當急救之濕寒以熱除濕以燥大升大舉以助生長補養氣血不致偏竭聖人立治之法既濕氣大勝以所勝治之助甲風木上升是也故經云風勝濕是以所勝平之也當先調和胃氣次用白朮之類以燥其濕而滋元氣如其不止後用風藥以勝濕此便是大舉大升以助春夏二濕之久陷下之至治也

益胃升陽湯 血脫益氣古聖人之法也先補胃氣以助生發之氣故曰陽生陰長諸甘藥為之先務舉世皆以為補殊不知甘能生血此陽生陰長之理也故先理胃氣人之身內胃氣為寶

柴胡

升麻

各五分

炙甘草

當歸身酒洗

陳皮

各一錢

人參

去芦有

炒神曲

各一錢

黃芪

葛根

各一錢

白朮

各一錢

生黃芩

少許

右㕮咀每服二錢水二大盞煎至一盞去粗稍熱服

如腹中痛

每服加白芍藥

各三分

桂枝

少許

如渴或口乾

加葛根

各二分

不拘時候

升陽舉經湯 治經水不止如右尺脉按之空虛是氣血俱脫大寒之證輕手其脉數疾舉指弦緊或濶皆陽脫之證陰火亦亡見熱證於口鼻眼或渴此皆陰躁陽欲先去也當溫之舉之升之浮之燥之此法當大升浮血氣切補命門之下脫也

肉桂去皮盛夏勿用白芍藥 紅花已上各伍分

細辛陸分

人參去芦 熟地黃 川芎已上各壹錢

獨活

根 黑附子炮裂去皮臍

炙甘草已上各伍分

羌活 藁本去土

防風

已上各貳錢

白朮 當歸

各參錢

柴胡已上各叁錢

桃仁拾箇湯浸去皮尖細研

右㕮咀每服三錢若病勢順當漸加至五錢每服水三

盞煎至一盞空心熱服

半產誤用寒涼之訥論

婦人分免及半產漏下昏冒不省瞑目無所知覺蓋因血暴亡有形血去則心神無所養心與包絡者君火相火也得血則安亡血則危火上熾故令人昏冒火勝其肺瞑目不省人事是陰血暴亡不能鎮撫也血已虧損往往用滑石甘草石膏之類乃辛甘大寒之藥能濁氣中之熱是血虧濁氣乃陰虧濁陽便二者俱傷反為不足虛勞之病昏迷不省者上焦心肺之熱也此無形之熱用寒涼之藥驅令下行豈不知上焦之病悉屬於表乃陰證也汗之則愈今反下之幸而不死暴虧氣血生命豈能久活又不知內裡有說病氣不足宜補不宜瀉但瞑目之病悉屬於陰宜汗不宜下又不知傷寒鬱冒得汗則愈寔是桂附寒涼藥也分免半產本氣不病是暴亡其血亡血補血又何疑焉補其血則神昌常時血下降亡今當補而升舉之心得血而養神不昏矣血若暴下是秋冬之令大壯今舉而升之以助其陽則目張神不昏迷矣今立一方補血養血益陽以補手足厥陰之不足也

全生活血湯

紅花參分

蔓荆子 細辛已上各伍分

生地黃夏月多加之

熟地黃已上各伍分

藁本

川芎已上各壹錢

芍

防

風諸陽既陽何以知羌活 獨活 炙甘草 柴胡去苗當歸身酒洗葛根上各貳錢白芍藥

升麻已上各參錢右咬咀每服五錢水二盞煎至一盞去粗食前稍熱服

當歸附子湯 治臍下冷痛赤白帶下

當歸貳分炒鹽參分燉梢 升麻已上各伍分甘草陸分柴胡三分黃檗少許引附子錢當歸身酒洗葛根上各貳錢白芍藥

乾薑良薑各一錢右為麌末每服五錢水五盞煎至一盞去粗梢熱服或為細末酒麌糊為丸亦可調經補真湯 冬後一月微有地況水泮其白帶再米陰戶中寒一服立止

獨活 乾薑炮藁本 防風 蒼朮已上各貳分麻黃不去炙甘草 人參去芦當歸身 白

木 生黃芩 升麻已上各黃氏生分 黃芩去芦澤瀉 羌活宣錢柴胡肆錢杏仁貳箇

桂枝少許白葵花朵朵去萼右咬咀除黃芩麻黃各另外都作一服先以水三大盞半煎麻黃一味令沸掠去沫入餘藥同煎至一盞零余分再入生黃芩煎至一盞空心服之候一時許可食早飯

坐藥龍鹽膏

茴香參分桔梗伍分良薑 當歸梢 酒防已 木通已上各壹錢丁香 木香 川烏炮已上各壹錢

龍骨伍分炒鹽 紅豆 肉桂已上各貳錢厚朴參錢延胡索伍錢全蠍伍箇右為細末煉

蜜為丸如彈子大綿裹留系在外內丸藥陰戶內日易之

勝陰丹 為水藥力小再取三錢內加行性熱藥項下

柴胡 羌活 枯白芩 甘松 升麻記上各參錢川烏頭 大椒 三奈子記上各蒜生分 破故

紙糊分與蒜同
全蠍參箇 廉香少許 右為細末依前法用

迴陽丹

羌活 全蠍 升麻根 甘松已上各 草烏頭 水蛭炒已上各 大椒 三奈子 華撥 桔梗
已上各 柴胡 川烏已上各 炒黃鹽為必用之藥去之則不効 破故紙 蒜已上各 蚊蟲三箇去足炒 右
為極細末依前製用臍下覺暖為効

柴胡丁香湯 治婦人年三十歲臨經先腰脣痛甚則腹中並痛經縮三兩日

生地黃 貳分 丁香 肆分 當歸身 防風 羌活已上各 柴胡壹錢 全蠍壹箇 右件都作
一服水二盞煎至一盞去粗食前稍熱服

延胡苦棗湯 治臍下冷癢痛陰冷寒白帶下

黃藥壹分為引 延胡索 苦練子已上各 附子炮 肉桂已上各 炙甘草 伍分 熟地黃壹錢
引用 附子炮 肉桂壹錢 右都作一服水二大盞煎至一盞食前服

桂附湯 治白帶腥臭多悲不樂太寒

黃藥為引 知母已上各 肉桂壹錢 附子壹錢 右咬咀都作一服水二盞煎至一盞去粗食
遠熱服 如少食常飽有時似腹脹分悶加白芍藥伍分 如不思飲食加五味子貳拾箇 如煩
惱面上如蟲行乃胃中元氣極虛加黃芪壹錢 人參參分 炙甘草升麻已上各
伍分

人參補氣湯 治四肢懶倦自汗無力

丁香末

生甘草稍

炙甘草已上各
卷分

生地黃

白芍藥

熟地黃伍分
陸分

人參

防風

羌活

黃蘗

知母

當歸身

升麻已上各
卷分

五

味子

蜀拾

右剉如麻豆大都作一服水二盞

煎至一盞去粗心稍熱服

黃芪白朮湯

治婦人四肢沉重自汗上至頭際頸而還惡風頭痛躁熱

細辛

吳茱萸卷分

川芎已上各
伍分

柴胡

升麻已上各
壹錢

五

羌活

五味子卷錢

白朮

人參已上各
伍錢

黃芪壹兩

五

薑五片

煎至一盞去粗食前熱服如腹中痛不快加炙甘草

壹錢汗出不止加黃蘗

壹錢

白朮茯苓湯

治胃氣弱身重有痰惡心欲吐是風邪羈絆於脾胃之間當先實其脾胃

白朮

白茯苓半夏

壹兩炒麵貳錢

麥蘖麵伍分

右㕮咀每服五錢水二大盞入生薑

五片煎至一盞去粗不拘時服

增味四物湯

治婦人血積

當歸

川芎

芍藥

熟地黃

京三棱

乾漆炒燥烟
盡

五

肉桂

廣茂去皮
等分

右爲纖末

每服五錢水二大盞煎至一盞去粗食前稍熱服

補經固真湯

白文舉正室白帶常漏久矣諸藥不効診得竈尺脉微其白帶下流不止叔和云正明中日久為白帶漏下時多骨木枯筋少者始病血崩久則血少復亡其陽故白滑之物下流不止是本經血海將枯津

清華堂本草
液復亡枯乾不能滋養筋骨以本部行經藥為引用為使以大辛甘油膩之藥潤其枯燥而滋益津液
以大辛熱之氣味藥補其陽道生其血脉以苦寒之藥泄其肺而救其熱傷氣以人參補之以微苦溫
之藥為佐而益元氣

白葵花去萼研

甘草

郁李仁去皮尖研泥

柴胡

乾薑

細末

人參

細末

生黃芩

細末

升麻

細末

地骨皮

細末

升麻

細末

生甘草

細末

黃芪

細末

當歸

細末

白綿子

細末

紅花

細末

茅花

細末

已上各

錢 陳皮留皮 右件除黃芩外以水三盞煎至一盞七分再入黃芩同煎至一盞去粗滓心熱服
少時以早飯壓之

溫衛補血湯治耳鳴鼻不聞香臭口不知穀味氣不快四肢困倦行步軟側髮脫落食不下膳冷陰汗
帶下喉中吟吟不得臥口舌益乾太息頭不可以回顧項筋緊脊強痛頭旋眼黑頭痛各症

生地黃 皂角 薤香 黃藥已上各 牡丹皮 蒼朮 王瓜根 橘皮 吳茱萸已上各 當

歸身川牛膝 柴胡 人參 熟甘草 地骨皮已上各 升麻肆分 生甘草伍分 黃芪壹錢

丁香壹箇 桃仁叁箇 菊花朵朵 右咬咀作一服用水二大盞煎至一盞去粗食前熱服

立効散 治婦人血崩不止

當歸 蓮花心 白綿子 紅花 茅花已上各 右剉如豆大白紙裹定浸固炭火燒灰存性為

細末

如乾血氣研血竭為引好溫酒調服加輕粉壹錢 如血崩不止加麝香引好溫酒調服

四聖散 治婦人赤白帶下

川烏炮製

生白礬

已上各
壹錢

紅娘子參箇

班猫桔箇

煉蜜為丸如皇子大綿裹坐之

溫經除濕湯

十月霜冷後四肢無力乃痿厥濕熱在下焦也醋心者是濁氣不下降欲為滿也合眼麻木作者陽道不行也惡風寒者上焦之分皮膚中氣不行也閉目不寐者目閉助陽道故陰寒之氣少退也頭旋肢運者風氣下陷於血分不得伸越而作也近火則有之

黃連壹分

柴胡

草豆蔻

神曲炒

木香

已上各
貳分

麻黃節不去

獨活

當歸身

黃蘖

已上各
壹錢

升麻伍分

羌活

桑分

炙甘草

人參

白朮

猪苓

澤瀉

已上各
壹錢

黃芪

橘皮

蒼朮

已上各
貳錢

白芍藥

叁錢

右剉如麻豆大分作二服水二盞煎至一盞食遠服治支節沉重

痛無力之勝藥也

補氣升陽和中湯

李正臣夫人病診得六脉俱中得弦洪緩相合按之無力弦在上是風熱下陷入陰中陽道不行其證閉目則渾身麻木晝減而夜甚覺而閉目則麻木漸退久則絕止常開其目此證不作懼其麻木不敢合眼致不得眠身體皆重時有痰嗽覺胸中常似有痰而不利時煩躁氣短促而喘肌膚尤盛飲食不減大小便如常惟畏其麻木不敢合眼為最苦觀其色脉形病相應而不逆內經曰陽盛瞑目而動輕陰病閉目而靜重又云諸脉皆屬於目靈樞經云閉目則陽道行陽氣遍布週身閉目則陽道閉而不行如晝夜之分知其陽衰而陰旺也且麻木為風三尺之童皆以為然細較之則有區別耳久坐而起

亦有麻木為如繩縛之久釋之覺麻作而不敢動良久則自己以此驗之非有風邪乃氣不行主治之當補其肺中之氣則麻木自去矣如經脈中陰火乘其陽分火動於中為麻木也當兼去其陰火則愈矣時痰嗽者秋涼在外在上而作也當以溫劑實其皮毛身重脉緩者濕氣伏匿而作也時見躁作當升陽助氣益血微微瀉陰火與濕通行經脈調其陰陽則已矣非五臟六腑之本有犯也此藥主之

生甘草

去熱

酒黃藥

滿火除濕

白茯苓

除濕

澤瀉

除濕

升麻

行陽

柴胡

已上各壹錢

蒼朮

除濕

當歸身

白术

已上各貳錢

白芍藥

人參

已上各叁錢

佛耳草

炙甘草

補中

草豆蔻

仁益陽退外寒已各壹錢伍分

橘皮

當歸身

右㕮咀每服五錢水二盞

煎至一盞去粗食遠服之

黃芪

伍錢

右㕮咀每服五錢水二盞

煎至一盞去粗食遠服之

麻黃桂枝升麻湯

治婦人先患渾身麻木睡覺則少減開目則已而全愈又證已痊又因心中煩惱

遍身骨節痠身體沉重飲食減少腹中氣不運轉

木香

生薑

已上各壹分

桂枝

半夏

陳皮

草豆蔻仁

厚朴

黑附子

黃藥

已上各貳分

炙甘草

升麻

白朮

茯苓

澤瀉

已上各叁分

黃芪

麻黃

不去節

人參

已上各伍分

右都作

一服水二

蓋煎至一盞去粗食遠服之

東坦老人 李杲撰

明 新安 吳勉學校

大便結燥門

大便結燥論

金匱真言論云北方黑色入通督脈於二陰藏精於腎又云腎主大便大便難者取足少陰火腎主五液津液潤則大便如常若饑飽失節勞役過度損傷真氣及食辛熱味厚之物而助火邪伏於血中耗散真陰津液虧少故大便結燥然結燥之病不一有熱燥有風燥有陽結有陰結又有年老氣虛津液不足而結燥者治法云腎惡燥急食辛以潤之結者散之如少陰不得大便以辛潤之太陰不得大便以苦泄之陽結者散之陰結者溫之仲景云小便利而大便硬不可攻下以脾約丸潤之食傷太陰腹滿而食不化腹響然不能大便者以苦藥泄之如血燥而不能大便者以桃仁酒製大黃通之風結燥而大便不行者以麻子仁加大黃利之如氣澀而大便不通者以郁李仁枳實皂角仁潤之大抵治病必究其源不可一槩用巴豆牽牛之類下之損其津液燥結愈甚復下復結極則以至導引於下而不通遂成不救噫可不慎哉

通幽湯 治大便難幽門不通上衝吸門不開噎塞不便燥秘氣不得下治在幽門以辛潤之

炙甘草 紅花已上各一分 生地黃 熟地黃配生地黃各升麻 桃仁泥 當歸身已上各錢 右都作一

服水二太盞煎至一盞去粗調檳榔細末五分稍熱食前服之

潤燥湯

升麻 生地黃已上各
煎錢熟地黃 當歸梢 生甘草 大黃煨 桃仁泥 麻仁已上各
煎錢紅花粉
右除桃仁麻仁另研如泥外剉如麻豆大都作一服水二盞入桃仁麻仁泥煎至一盞去粗空心稍熱服

潤腸丸 治脾胃中伏火大使秘澀或乾燥閉塞不通全不思食及風結血秘皆令閉塞也以潤燥和血
疎風自然通利矣

桃仁湯浸去皮尖
煎兩 麻仁已上各
煎兩 當歸梢 大黃煨 差活已上各
煎錢 右除桃仁麻仁另研如泥外搗
為極細末燥蜜為丸如梧桐子大每服三五十丸空心白湯下

如病人不大便為大便不通而澀其氣盛者急加酒洗大黃以利之 如血燥而大便燥乾者加桃仁酒
洗大黃 如風結燥大使不行者加麻仁大黃 如風濕而大使不行加煨兒角仁大黃秦艽以利之
如脉澀覺身有氣澀而大使不通者加郁李仁大黃以除氣燥 如寒陰之病為寒結閉而大使不通
者加郁李仁大黃以除氣燥 如寒陰之病為寒結閉而大使不通者以局方中牛硫丸或加煎附子
乾薑湯水冷與之其病雖陰寒之證當服陽藥補之若大使不通者亦當半服中與一服藥微通其大
便不令結閉乃治之大法 若病人雖是陰證或是陰寒之證其病顯燥脉實堅亦宜於陽藥中少加
苦寒之藥以去熱燥止勿加 如陰燥欲坐井中者其二腎脉按之必虛或沉細而遲此易為辨耳

知有客邪之病亦當從權加藥以去之

麻黃白朮湯 治大便不通五日一遍小便黃亦渾身腫面上及腹尤甚其色黃麻本身重如山沉困無力四肢痿軟不能舉動喘促唾清水吐噦痰唾白沫如膠時躁熱發欲去衣須臾熱過振寒項額有時如冰額寒尤甚頭旋眼黑目中溜火冷淒鼻不聞香臭少腹急痛當脅中有動氣按之堅硬而痛

青皮去腐

酒黃連

已上各 酒黃蘖

橘紅

甘草炙半

升麻已上各

黃芪

人參

桂枝

白

赤朴

柴胡

蒼朮

猪苓已上各

吳茱萸

白茯苓

澤瀉肆分

白豆蔻

炒麵已上

右㕮咀分作二服水二太盞半先煎麻黃令沸去沫再入諸藥

各伍分

麻黃不去節伍錢

杏仁肆箇卷分

右㕮咀分作二服水二太盞半先煎麻黃令沸去沫再入諸藥

同煎至一盞去粗稍熟食遂服

此證宿有風濕熱伏於榮血之中其木火乘於陽道為上盛元氣短少上喘為陰火傷其氣四肢痿在腎水之間乃所勝之病今正遇冬寒得時乘其肝木又實其母肺金克木凌火是大勝必有大復其證喜恐多噫鼻中如有物不聞杳臭目視睽睽多悲健忘少腹急痛通身黃腹大脹面目腫尤甚食不下痰唾涕有血目眴瘡大便不通並宜此藥治之

升陽湯一名升陽瀉溫湯 治膈咽不通逆氣裏急大便不行

青皮

槐子已上各

生地黃

熟地黃

黃蘖已上各

當歸身

甘草稍已上各

蒼朮

伍分

升麻柒分

黃芪壹錢另研

桃仁拾箇

右㕮咀如麻豆大都作一服入桃仁泥水二太盞煎至一盞

去粗稍熟食前服

活血潤燥丸 治大便風秘血祕常常燥結

當歸梢 壹錢 防風 叁錢

大黃 濕紙裹煨

羌活 已上各壹兩

皂角仁

燒存性去皮壹兩得溫則滑溫滑則燥結自除

桃

仁 或兩研如泥

麻仁 或兩伍錢研如泥

右除麻仁桃仁另研如泥外為極細末燥蜜為丸如梧桐子大每服

五十九白湯下三兩服後須以蘇麻子粥每日早晚食之大便日久不能結燥也以磁器盛之紙封

無令見風

潤腸湯 治大腸結燥不通

生地黃 生甘草

已上各壹錢 大黃 火煅

熟地黃 當歸梢 升麻 桃仁 麻仁

已上各壹錢 紅花

卷分

右㕮咀水二盞煎至一盞去粗食遠溫服

小便淋閉門

小便淋閉論

難經云病有闊有格闊則不得小便又云闊無出之謂皆邪熱為病也分在氣在血而治之以渴與不渴而辨之如渴而小便不利者是熱在上焦肺之分故渴而小便不利也夫小便者膀胱之分太陽膀胱經所主也長生於申申者西方金也肺合生水若肺中有熱不能生水是絕其水之源經云虛則補其母宜清肺而滋其化源也故當從肺之分助其秋令水自生焉又如雨如露如霜皆從天而降下也乃陽中之陰明秋氣自天而降下也且藥有氣之薄者乃陽中之陰是感秋清肅殺之氣而生可以補肺之不足淡味滲泄之藥是也茯苓澤瀉琥珀燈心通草車前子木通瞿麥而薑之類以清肺之氣泄其火資水之上源

也如不渴而小便不通者熱在下焦血分故不渴而大燥小便不通也執閉於下焦者腎也膀胱也陰中之陰陰受熱邪閉塞其流易上老云寒在胸中遏絕不入熱在下焦填塞不便須用感北方寒水之化氣味俱陰之藥以降其熱泄其閉塞內經云無陽則陰無以生無陰則陽無以化若服淡滲之藥其性乃陽中之陰非純陽之劑陽無以化何能補重陰之不足也須用感地之水運而生大苦之味感天之寒藥而生大寒之氣此氣味俱陰乃陰中之陰也大寒之氣人稟之生膀胱寒水之運人感之生腎此藥能補腎與膀胱受陽中之陽熱火之邪而閉其下焦使小便不通也夫用大苦寒之藥治淫熱因熱用又云必伏其所主而先其所因其實則氣同其終則氣異也

通蘭丸一名滋腎丸 治不渴而小便閉熱在下焦血分也

黃藥

去皮剉酒洗培乾

知母

剉酒洗培乾肉桂

伍分各壹分

右為細末熟水為丸如梧桐子大每服一百丸空心

白湯下頓兩足令藥勿下行故也如小便利前陰中如刀刺痛當有惡物下為驗

清肺飲子 治渴而小便閉澀不利邪熱在上焦氣分

燈心

壹分

通草

貳分

澤瀉

瞿麥琥珀

伍分各

右為細末熟水為丸如梧桐子大每服一百丸空心

芩

去皮

猪苓

去皮

叁錢

右為麩末每服五錢水一盞半煎至一盞稍熱食遠服或局方八正散五

芩散亦宜服之

導氣除燥湯 治小便閉塞不通乃血澀至氣不通而竅澀也

茯苓

去皮

滑石

炒黃各一錢

知母

剉酒各一錢

澤瀉

叁錢

黃藥

去皮酒

右㕮咀每服五錢水三盞

至一盞去粗稍熱空心服。如急閉不拘時服。

腎疽湯 治腎疽目黃甚至渾身黃小便赤澀。

羌活 防風 茜本 獨活 柴胡已上各伍分

升麻伍錢

巴上治腎疽目黃渾身黃 白茯苓武分

澤瀉參分 猪苓肆分 白朮伍分 蒼朮壹錢

已上治小便赤澀 黃藥貳分

人參叁分 萬

根伍分 神曲陸分 甘草叁錢

右剉如大豆大分作二服水三盞煎至一盞去粗稍熱食前服

痔漏門

痔漏論

內經曰：因而飽飣筋脈橫解腸澼為痔大腸庚也主津本性燥清肅殺之氣本位主收其司行津以從足陽明旺則生化萬物者也。足陽明為中州之土若陽衰亦殃殺萬物故曰萬物生於土而歸於土者是以手陽明大腸司其化焉既在西方本位為之害輩司殺之府因飽飣行房及泄前陰之氣歸於大腸木乘火勢而侮燥金克火就燥也大便必閉其疾其者當以苦寒瀉火以辛溫和血潤燥疎風止痛是其治也。以秦艽當歸梢和血潤燥以桃仁潤血以兒角仁除風燥以地榆破血以枳實之苦寒補腎以下泄胃實以澤瀉之淡滲使氣歸於前陰以補清燥安胃之濕邪也白朮之苦甘以苦補燥氣之不足其甘味以澑火而益元氣也故曰甘寒泄火乃假枳實之寒也古人用藥為下焦如瀆又曰在下者引而竭之多為大便秘澀以大黃推去之其津血益不足以當歸和血及油潤之劑大便自然輕利矣宜作剉湯以與之是下焦有熱以急治之之法也以地榆酸苦而壞胃故宿食消盡空心作丸服之。

秦艽白朮丸 治痔疾并痔漏有膿血大便燥硬而作疼痛不可忍

秦艽去芦

桃仁湯浸去皮尖

皂角仁燒存性各一兩

當歸梢酒浸

澤鴻

枳實炒

白朮各伍錢

地榆參錢

右為細末和桃仁泥研勻煎熟湯打麵糊為丸如雞頭仁大令藥光滑焙乾每服五七

十九白湯下空心服待少時以美餽壓之忌生冷硬物冷水冷菜之類并濕麵酒及辣辛熱大料物之類犯之則藥無驗也

秦艽蒼朮湯 治痔疾若破謂之痔漏大便秘澀必作大痛此由風熱乘食飽不通氣逼大腸而作也受

病者燥氣也為病者胃濕也胃刑大腸則化燥火以乘燥熱之實勝風附熱而來是濕熱風燥四氣而合故大腸頭成塊者濕也作大痛者風也若大便燥結者主病兼受火邪熱結不通也去此四者其西方肺主諸氣其體收下亦助病為邪須當破氣藥兼之治法全矣以剉湯與之其効如神

秦艽去苗

桃仁湯浸去皮另研各壹錢

皂角仁燒存性另研各壹錢

蒼朮製

防風各一兩

黃蘖洗伍分

當歸梢洗

澤瀉三分

棗身檳榔壹分另研

大黃少許雖大便過澀亦不可多用

右除檳榔桃仁皂角仁三味外餘藥㕮咀

如麻豆大都作一服水二盞煎至一盞二分去粗入檳榔等三味末再上火煎至一盞空心熱服待少時以美餌壓之不犯胃氣也服藥日忌生冷硬物及酒濕麵大料物乾薑之類犯之則其藥無効如有白膿加白葵花頭五朵去萼心青皮半錢不去白入正藥中同煎木香三分為細末同檳榔等三味依前煎服餌古人治此疾多以歲月除之此藥一服則愈

七聖丸 治大腸疼痛不可忍叔和云積氣生於脾藏傍大腸疼痛陣難當漸交稍瀉三焦火莫謾多方

立紀綱

羌活

壹兩

郁李仁

湯浸去皮另

大黃

研宣兩伍錢另

大黃

煖

檳榔

桂去皮

木香

川芎

已上各伍錢

右除郁李

仁另研入外共為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三五十丸白湯下食前取大使微利一服而愈切禁不得多利大使其痛滋甚

秦艽防風湯 治痔漏每日大便時發疼痛如無疼痛者非痔漏也此藥主之

秦艽

防風

當歸身

白朮

已上各壹錢伍分

炙甘草

澤瀉

已上各伍分

黃藥

伍分

大黃

煖

橘皮

已

各參分

柴胡

升麻

已上各貳分

桃仁

參拾箇

紅花

少許

右剉如麻豆大都作一服水二盞煎至一

盞去粗稍熱空心服之避風寒忘房事酒濕麵大辛熱物

秦艽羌活湯 治痔漏成塊下垂不任其養

羌活

壹錢

秦艽

黃芪

已上各壹錢

防風

桑分

升麻

炙甘草

麻黃

大黃

煖

柴胡

伍分

細辛

少許

紅花

少許

右剉如麻豆大都作一服水二盞煎至一盞去粗空心服之忌風寒處

小便

當歸郁李仁湯 治痔漏大使硬努出大腸頭下血苦痛不能忍

郁李仁

兒角仁

已上各壹錢

枳實

參分

秦艽

麻仁

當歸梢

生地黃

荅木

已上各伍分

大黃

煖

澤瀉

已上各

參分

右剉如麻豆大除兒角仁別為末水二盞煎至一盞去粗入兒角仁末調空心食前

服之忌如前

紅花桃仁湯 治痔漏經年因而飽食筋脉橫解腸僻為痔治法當補北方瀉中央

黃藥

壹錢伍分 生地黃

壹錢

澤瀉

捌分

蒼朮

陸分

當歸梢

漢防己

防風梢

猪苓

壹錢伍分

麻黃

貳分半分

紅花

半分

桃仁

拾箇

右剉如麻豆大水三盞煎至一盞去粗稍熱食前服之忘如

前

秦艽當歸湯 治痔漏大便結燥疼痛

大黃

煨肆錢

秦艽

枳實

已上各壹錢

澤瀉

當歸梢

皂角仁

白朮

已上各伍分

紅花

少許

桃

仁箇拾 右都作一服水三盞煎至一盞去粗食前熱服忘如前

陰痿陰汗門

陰痿陰汗及臊臭論

一富者前陰臊臭又因連日飲酒腹中不和求先師治之曰夫前陰者足厥陰肝之脉絡循陰器出其挺末凡臭者心之所主散入五方為五臭入肝為臊此其一也當於肝經中瀉行間是治基本後於心經中瀉少衝乃治其標如惡針當用藥除之酒者氣味俱陽能生裏之濕熱是風濕熱合於下焦為邪故經云下焦如瀆又云在下者引而竭之酒是濕熱之水亦宜決前陰以去之

龍膽瀉肝湯 治陰部時復熱痒及臊臭

柴胡梢

澤瀉已上各壹錢

車前子

木通

已上各伍分

生地黃

當歸梢

草龍膽

參分已上各

右剉如

麻豆大都作一服水三盞煎至一盞去粗空心稍熱服便以美膳壓之此藥柴胡入肝為引用澤瀉

車前子木通淡滲之味利小便亦除躁氣是名在下者引而竭之生地黃草龍膽之苦寒濕酒濕熱更兼車前子之類以散肝中邪氣肝主血用當歸以滋肝中血不足也

清震湯 治小便溺黃躁莫淋澀兩丸如水陰汗浸多

羌活 酒黃藥壹錢升麻 柴胡 蒼朮 黃芩伍分澤瀉肆分 麻黃根 猪苓 防風
已上各 炙甘草 當歸身 荚本已上各 紅花壹分 右剉如麻豆大都作一服水二盞煎至
叁分 一盞去粗臨臥服大忌酒濕麵

固真湯一名正元湯 治兩丸冷前陰痿弱陰汗如水小便後有餘滴尻脣并前陰冷惡寒而喜熱膝下亦冷

升麻 羌活 柴胡壹錢 各 炙甘草 草龍膽 澤瀉壹錢 黃藥 知母貳錢 右剉
如麻豆大分作二服水二盞煎至一盞去粗空心稍熱服以早飯壓之

清龜湯一名柴胡勝濕湯 治兩外腎冷兩髀陰汗前陰痿陰囊濕痒臊氣

柴胡 生甘草 酒黃藥壹錢 升麻 澤瀉壹錢 當歸梢 羌活 麻黃根 漢防已
草龍膽 茯苓壹錢 各 紅花 少許 五味子貳拾 右剉如麻豆大分作二服水二盞煎至一盞

去粗食前稍熱服忌酒濕麵房事

椒粉散 治前陰兩丸濕痒痛秋冬甚夏月減

肉桂貳分 小椒 當歸梢 猪苓三份 蛇床子 黑狗脊以上各伍分 麻黃根壹錢 輕粉炒

紅花少許

班貓兩枚

右為末乾糲上避風寒冷濕處坐臥

補肝湯

治前陰冰冷并陰汗兩脚痿弱無力

黃芪

茶分多甘草伍分

升麻

猪苓

已上各四分

白茯苓

葛根

人參

已上各三分

柴胡

羌活

陳皮

連翹

當歸身

黃藥

炒四分

澤瀉

蒼朮

麴末

知母

防風

已上各貳分

右剉如麻豆大

都作一服水二大盞煎至一盞去粗空心稍熱服忌酒濕麵

溫腎湯

治面色痿黃身黃腳痿弱無力陰汗

柴胡

麻黃根

已上各陸分

白茯苓

白术

酒黃藥

猪苓

升麻

已上各一錢

蒼朮

防風

已上各半錢

澤瀉

二錢

右分作二服每服水二大盞煎至一盞去粗食前稍熱服一時辰許方食

延胡丁香丸

一名丁香疝氣丸

治臍下撮急疼痛并周身皆急痛小便頻數及五脉急獨腎脉按之不

急皆虛無力名曰腎疝

羌活

參錢

當歸

茴香

已上各二錢

延胡索

麻黃根節

肉桂

已上各一錢

丁香

木香

甘草

川烏頭

已上各伍分

防己

參分

蠍

拾參

右為細末酒煮麯糊為丸如雞頭大每服五十丸空心鹽白

湯服

瀉痢門

訶子皮散

癸卯冬白樞判家一老僕面瘦脫色神氣特弱病脫肛日久服藥未驗復下赤白膿痢作裏急後重白

多亦少不任其苦以求其治曰此非肉食膏粱必多蔬食或飲食不節天氣雖寒衣蓋猶薄不禁而脣頭脫下者寒也真氣不禁形質不收乃血滑脫也此乃寒滑氣泄不固故形質下脫也當以澀去其脫而除其滑微酸之味固氣上收以大熱之劑而除寒補陽以補氣之藥升陽益氣

御米殼去蒂落炒蜜炒 橘皮已上各分

乾薑炮陸分

诃子煨去核三分

右為細末都作一服水二盞煎至一盞

和粗空心熱服

升麻補胃湯 治宿有陽明血證因五月間大熱喫杏腸澼下血唧遠散漫如篩腰沉沉然腹中不痛血色紫黑病名濕毒腸澼屬陽明少陽經血證也

白芍藥壹錢伍分

升麻 羌活 黃芪已上各分

生地黃 熟地黃 獨活 牡丹皮 炙甘草

柴胡

防風已上各分

當歸身 葛根已上各分

肉桂 少許

右剉如麻豆大分作二服每服水二盞煎至

一盞去粗食前稍熱服

升陽去熱和血湯 治腸澼下血另作一派其血即出有力而遠射四散如篩腸中血下行腹中大作痛乃陽明氣衝熱毒所作也當升陽去濕熱和血脉是其治也

橘皮貞分 熟地黃 當歸身 蒼朮 泰艽 肉桂已上各分

生地黃 牡丹皮 生甘草

已上各分

白芍藥壹錢伍分

右㕮咀都作一服水四盞煎至一盞去

粗空心稍熱服立効

益智和中湯 治腸澼下血或血色紫黑腹中痛腹皮惡寒右手關脉弦按之無力而喜熱物熨之內

寒明矣

肉桂壹分

桂枝肆分

牡丹皮

柴胡

葛根

益智仁

半夏

已上各伍分

當歸身

炙甘草

黃芪

升麻已上各壹錢

白芍藥壹錢

乾薑少許

右為麌末都作一服水三盞煎至一盞去相合

後溫服

芍藥蘖皮丸 治濕熱惡刺血刺頻併瘡癥無問膿血並皆治之

芍藥

黃蘖已上各壹兩

當歸

黃連已上各伍錢

右為末飯為丸如雞頭大每服五七十九食前米飲

湯下忌油膩酒濕麵等物

和中益胃湯 治太陰陽明腹痛大使常泄若不泄即秘而難解在後傳作濕熱毒下鮮紅血腹中微痛
腸下急縮脉緩而洪弦中之下得之按之空虛

蘇木壹分

藁本

益智仁已上各二分

熟地黃

炙甘草已上各卷分

當歸身四分

柴胡

升麻各伍分

分 右㕮咀都作一服水二盞煎至一盞去粗空心溫服

槐花散 治腸澼下血濕毒下血

川芎四分

槐花

青皮

荆芥穗

熟地黃

白朮已上各陸分

當歸身

升麻各伍分

末每服三錢米飲湯調下食則忌酒濕麵生冷硬物

茯苓湯 治因傷冷飯水泄一夜走十行變作白痢次日其痢亦白腹中疼痛減食熟躁四肢沉困無力

生黃芩三分

當歸身

肉桂

炙甘草已上各肆分

猪苓

茯苓已上各陸分

澤瀉

芍藥壹錢

伍分 蒼朮 生薑 升麻 柴胡已上各錢 右咬咀如麻豆大分作二服每服水二盞煎至一盞去粗稍熱食前服之

黃芪補胃湯 治一日大便三四次溏而不多有時作泄腹中鳴小便黃

黃芪 柴胡 當歸身 益智 橘皮已上各卷分 升麻陸分 炙甘草貞錢 紅花少許 右咬咀都作一服水二盞煎至一盞去粗稍熱食前服之

升陽除濕湯 自下而上者引而去之

蒼朮壹錢

柴胡

羌活 防風

升麻 神曲

澤瀉

豬苓已上各分

炙甘草

陳皮

麥芽

麵已上各三分

右都作一服水二盞煎至一盞去粗空心服之

如胃寒腸鳴加益智仁半夏各伍分

生薑三片棗一枚同煎至非腸鳴不得用

人參益胃湯 治頭悶勞動則微痛不喜飲食四肢怠墮躁熱短氣口不知味腹鳴大便微溏身體晝渴

覺渴不喜冷物

黃芪 甘草

當歸梢

益智已上各分

人參

黃芩

柴胡

半夏

白朮已上各卷分

陳皮

升麻

伍分

蒼朮壹錢

紅花

少許

右都作一服水二盞煎至一盞去粗稍熱食前服之

升麻補胃湯 治因內傷服牽牛大黃食藥泄瀉過多腹中大痛

甘草柒分

升麻

柴胡

草豆蔻

黃芪已上各伍分

半夏

全分

當歸身

乾薑已上各貞分

紅花

少許

右都作一服水二盞煎至一盞去粗稍熱食遠服之

瘡瘍門

散腫潰堅湯 治馬刀瘡結硬如石或在耳下至缺盆中或有上或於脣下皆手足少陽經中及瘻癰漏於頰或至頰車堅而不潰在足陽明經中所出或二證瘡已破流膿水並皆治之

黃芩一分半生用半炒 草龍膽酒洗炒四遍 瓜蔞根剉碎酒洗 黃藥酒製 酒知母 桔梗 昆布伍錢 各

肆錢

各貳

升麻陸分

錢

升麻

陸分

右咬咀

每服六錢水

一盞零八分

先浸多日

煎至一盞

去粗食

後熱服

於非

處伸足

在高處頭低垂

每含一口

作十次

嚥服畢

依常安卧

取藥在脣上停

以錢也另

擗米料作細

末

煉蜜為丸如棗豆大

每服百餘丸

用此藥湯留

一口送下

或加海藻

五錢炒亦妙

升陽調經湯 治療癰瘍頸或至頰車此皆由足陽明胃經中來若瘡深遠隱曲肉底是足少陰腎經中處伸足在高處頭低垂每含一口作十次嚥服畢依常安卧取藥在脣上停以錢也另擗米料作細末煉蜜為丸如棗豆大每服百餘丸用此藥湯留一口送下或加海藻五錢炒亦妙

升麻捌錢 葛根葛根 草龍膽酒製 黃芩酒製 廣茂酒洗 京三稜炒 炙甘草酒洗 黃連酒洗 連翹桔梗 伍錢 生黃芩肆錢 當歸梢當歸 芍藥參錢 黃藥酒洗 知母酒洗炒 右另

秤一半作末煉蜜為丸如棗豆大每服百餘丸一半作咬咀每服五錢若能食大便硬可旋加至七八錢水二盞先浸半日煎至一盞去粗臨卧熱服足高去枕仰卧噙一口作十次嚥之留一口在後送下丸藥服畢其臥如常

連翹散堅湯

治耳下或至缺盆或肩上生瘡堅硬如石動之無根名曰馬刀從手足少陽經中來或

蘭室秘藏

卷下

生兩脇或已流膿作瘡未破並質治之

柴胡

壹兩
武錢

草龍膽

酒洗
四次

土瓜根

酒製
上壹兩

黃芩

酒炒
次米錢

當歸

酒炒
精

生黃芩

廣茂
京三稜

右另秤一半為細

同廣茂
酒炒

連翹

伍錢
已上各

炙甘草

參錢
伍錢

黃連

酒炒
二次

蒼朮

已上各
二錢

末煉蜜為丸如棗豆大每服百餘丸一半㕮咀每服五錢水二盞先浸多半日煎至一盞去粗濁
卧熱服去枕仰臥每口作十次嚥之留一口送下丸藥服畢臥如常更以後藥塗之

龍泉散

龍泉粉

瓦粉

廣茂

京三稜

酒洗
炒

昆布

伍錢
已上各

右同為細末煎熟水調塗之用此藥去

疾尤速

救苦化堅湯

治癰癰馬刀挾癰從耳下或耳後下頸至肩上或入缺盆中乃手足少陽之經分其癰癰

在頸下或至頰車乃足陽明之經分受心脾之邪而作也今將二證合而治之

黃芪

壹錢

護皮毛間腠理虛及活血脉生血亦瘡家聖藥也又能補表實元氣之弱也

人參

補肺氣之藥也如氣短不調及喘者加之

炙甘草

伍分

能調中和諸藥燄火無害氣亦能去瘡

邪

真漏蘆

升麻

已上各
壹錢

葛根

伍分

此三味俱足陽明本經藥也

連翹

壹錢

此一味十

二經瘡中之藥不可也

能散諸血結氣聚此瘡家之神藥

牡丹皮

卷分

去腸胃中留滯宿血

當歸身

生地黃

熟地黃

已上各
卷分

此三味諸經中和血生血涼血藥也

白芍藥

卷分

如夏

月倍之其味酸其氣寒能補中益肺之虛弱治腹中痛必用之冬寒則不可用

肉桂

貳分

大辛

熱能散結積陰證瘡瘍須帶少角之此寒因熱用之意又為寒陰復蓋其瘡用大辛熱以消浮凍之氣如有煩躁者去之 柴胡半錢
分 功同連翹知瘡不在少陽經則去之 羌桔子參分 無腫不用
羌活全錢 獨活 防風已上各五分 此三味少陽手足太陽經證亦當用之為能散經去上部更似拔者是少陽之風一味辛溫若瘡在脣口上雖無手足太陽經證亦當用之為能散經去上部更邪病人身拘急者風也 昆布威分 其味大鹹若瘡堅硬結硬者宜用 咳能軟堅京三棱炮頭分

廣慈蠅冬分 此二味若瘡堅硬甚者用之如不堅硬勿用 益智仁貞分 如唾多者胃不和也或

病人吐沫吐食冒寒者加之無則去之 大麥蘖麵全錢 治腹中痞急兼能消食補胃 神麴
末炒黃色貞分 為食不消化故也 黃連去頭參分 以治煩悶 黃蘖炒參分 如有熱或腿脚無力加如

有躁煩欲去衣者醫中伏火也更宜加之無此證勿用 厚朴參錢貞分 薑製如腹脹者加之無則勿用右為細末湯浸餽餅和丸捺作餅子日乾搗如米粒大每服三錢白湯下如氣不順加橘皮甚者加木香少許量病人虛實臨時斟酌與之無令藥多妨其飲食此治之大法也 如止在陽明分為瘻癰者生用大胡蘿蔔子二味餘皆用之如在少陽分為馬刀挾癰者去獨活漏蘆升麻葛根更變之權也宜加黃芩黃連黃檗知母防己之類視邪氣在上中下三處假令在上煎加黃芩一半酒洗

加瞿麥穗三分 如本人素氣弱其病勢來時氣盛而不短促者不可考其平素宜作氣盛而從病生用在中焦加黃連一半酒洗 在下焦則加酒製黃檗知母防己之類選而用之 如本人大便不通而滋其邪盛者加酒製大黃二味 如風結燥

不行者加麻仁大黃。如風澀而大便不行加煨白角仁大黃秦艽以利之。如脉澀覺身有氣澀而大便不通者加郁李仁大黃以除氣燥也。如陰寒之病為寒結閉而大便不通以蜀方中半硫丸或加煎附子乾薑水冷與之大抵用藥之法不惟瘡瘍一說諸疾病量人素氣弱者當重安寒之藥多加人參黃芪甘草之類溫火而先補其元氣餘皆倣此。

柴胡連翹湯 治男子婦人馬刀瘡

中桂三分 當歸梢五錢 以上各一錢 秦粘子二錢 以上各一錢 炙甘草 酒黃藥 生地黃以上各三錢 柴胡 黃芩以上各一錢 酒知母
連翹以上各五錢 以上各一錢 聾鳴德以上各一錢 右剉如麻豆大每服五錢水二大盞煎至一盞去楂稍熱食後服之

秦粘子湯 治耳痛生瘡

昆布 蘇木 生甘草 蒲黃草龍膽以上各一分 秦粘子 連翹 生地黃 當歸梢 黃芩 炙甘草 黃連以上各二分 柴胡 黃芪以上各三分 桔梗三錢 桃仁三箇 紅花少許 右剉如麻豆大都作一服水二盞煎至一盞去粗稍熱食後服忌寒藥利大便

淨液湯一名連翹防風湯 治皮膚痒腋下瘡背上瘡耳聾耳鳴

桂枝二分 連翹 生地黃 桔梗 升麻 甘草以上各五分 寶歸梢七分 麻黃 草豆蔻仁羌活 防風 柴胡 蒼朮以上各一錢 酒黃芩一錢 紅花少許

消腫湯 治馬刀瘡

秦粘子炒 黃連以上各一錢 寶歸梢 甘草以上各一錢 瓜蔞根 黃芪以上各一錢 生黃芩 柴胡以上各一錢

各二

連翹

紅花少許

右咬咀每服五錢水一盞煎至一盞去渣稍熱食後服忌酒濕麪

內托羌活湯

治足太陽經中左右足脈俱繫接之無力尻臀生癰堅硬腫痛大作

肉桂三分

連翹 羌甘草 蒼朮 橘皮

已上各伍分

當歸梢 防風

藁本已上各一錢

黃芪伍分

黃蘖酒製

羌活已上各三錢

右咬咀都作一服水一盞酒一盞煎至一盞去粗稍熱空心服以來

蓋離上使藥力行罷去蓋之衣

升麻托裏湯

治婦人兩乳間出黑頭瘡瘍下作黑眼子真脉弦洪按之細小

黃蘖二分

肉桂三分

秦粘子伍分

黃芪 羌甘草

當歸身已上各一錢

連翹

升麻

葛根

錢伍分

右咬咀都作一服水一大盞酒半盞煎至一盞去粗稍熱空心服

內托黃芪湯

貴德茂小男於左大腿近膝股內出附骨癰不辨肉色漫腫皮澤木硬脣勢甚大其左腳

乃肝之離土也更查是厥陰肝經之分少侵足太陰脾經之分其脉至三部細而弦按之洪緩微有力此藥主之

生地黃一分

黃蘖一分

肉桂三分

羌活伍分

當歸梢半錢

土瓜根

酒製

柴胡梢各一錢

連翹一錢

黃芪二錢

右咬咀都作一服酒一盞水二盞煎至一盞去粗空心服

柴胡通經湯

治小兒項側有瘡堅而不潰名曰馬刀瘡

柴胡 連翹

當歸梢 生甘草 黃芩

秦粘子 京三棱

桔梗已上各二分

黃連伍分

紅花

少許

右剉如麻豆大都作一服水二盞煎至一盞去粗稍熟食後服忌苦藥泄大使

白芷升麻湯

母老家素貧寒形志皆苦於手陽明大腸經分出離幼小有頰疝其臂外皆腫痛在陽明

左右寸脉皆短中得之俱弦按之洪緩有力此雖得自八風之變以脉斷之邪氣在表其證大小便如故飲食如常腹中和口知味知不在裏也不惡風寒止熱燥脈不浮知不在表也表裏既和邪氣在裡脉之中內經云凝於經絡為瘡癰其癰出身半已上故風從上受之故知是八風之變為瘡者也故治其寒邪調其經脉中血氣使無凝聚而已

炙甘草

壹分

外麻

桔梗

伍分

白芷

柒分

當歸梢

生地黃

已上各壹錢

生黃芩

壹錢伍分

酒

黃芩

連翹

黃茂

已上各武錢

中桂

少許

紅花

少許

右㕮咀分作二服酒水各一大盞半同煎

至一盞去粗稍熱臨卧服一服而愈

保生救苦散 治火燒或熱油烙及脫肌肉者

生寒水石

大黃

火煨

黃藥

油炒已上各等分

右為細末用油調塗之或乾用此藥塗之其痛立止日

近完復永無破傷風之患

一上散 治諸般瘡癰必効

雄黃

通明子呼政者

黑狗脊

蛇床子

炒

熟硫黃

已上各伍錢

寒水石

陸錢

班貓

拾隻去翅足毛研碎

右另研雄

黃硫黃寒水石如粉次入班貓和蛇牀子黑狗脊為細末同研勻先洗瘡癰令湯過去加油調手中擦熱以鼻中臭三兩次擦上可一上即愈如痛甚及腫滿高起者加寒水石一倍 如不苦癢只加黑狗脊如微癢又加蛇牀子 如瘡中有蟲加雄黃 如喜火矣湯浴者加硫黃
聖愈湯 治諸惡瘡血出多而心煩不安不得睡眠亡血故也以此爲主之

生地黃 熟地黃 川芎 人參已上各 當歸身 黃芪已上各 右㕮咀如麻豆大都作一服

卷分

水二大盞煎至一盞去粗稍熱無時服

獨聖散 治湯泡破火燒破瘡毒疼痛

生白礬 右為細末艾麻油調掃瘡破處不拘時候

黃芪肉桂柴胡酒煎湯 治附骨癰堅硬漫腫不辨肉色行步作痛按之太痛

黃芪 當歸梢已上各 柴胡壹錢

伍分

蒸粘子炒

連翹

肉桂已上各

升麻

柒分

炙甘草

黃

藥已上各

右㕮咀好糯酒一大盞半水一大盞半同煎至一

大盞去粗

心溫服少時便以早飯

壓之不致大熱上攻中上二焦也

雜病門

安神丸 治心神煩亂怔忡兀兀欲吐胸中氣亂而熱有似懊懨之狀皆膈上血中伏火蒸蒸然不安宜用權衡法以鎮陰火之浮越以養上焦之元氣經云熱淫所勝治以甘寒以苦瀉之以黃連之苦寒去心煩除濕熱為君以甘草生地黃之甘寒瀉火補氣滋生陰血為臣以當歸補血不足以硃砂納浮留之火而安神明也

黃連壹錢伍分酒洗

水飛

壹錢

硃砂水飛

壹錢

酒生地黃 酒當歸身 炙甘草已上各

伍分

右件除硃砂水飛外搗四

味為細末同和勻湯浸餅為丸如黍米大每服十五丸津嚥下食後

硃砂安神丸 治心煩懊懨心亂怔忡上熱胸中氣亂心下痞悶食入反出

硃砂

肆錢

黃連伍錢 右為末湯浸餅為丸如黍米大每服十九食後津唾嚥下

補氣湯 治皮膚間有麻木乃肝氣不行故也

白芍藥

橘皮

不去白各一兩伍錢炙甘草

黃芪已上各一兩

澤鴻伍錢

右咬咀每服一兩水二盞煎至

蓋去粗溫服

當歸補血湯 治婦人肌熱躁熱目赤面紅煩渴引飲晝夜不息其脉洪大而虛重按全無內經曰脉虛血虛脉實血實又云血虛發熱證象白虎惟脉不長實為辨也若慢服白虎湯必死此病得之於肌困勞役

黃芪壹兩

當歸身酒製貳錢

右咬咀都作一服水二盞煎至一盞去粗稍熱空心服

柴胡升麻湯 治男子婦人四肢發熱肌熱筋骨熱表熱如火燎以手觸之烙人手足四肢者屬脾土也熱伏地中此病多因血虛而得之又有胃虛遇食冷物鬱遏陽氣於脾土之中此藥主之

升麻

葛根

獨活 羌活 白芍藥

人參已上各伍錢

炙甘草

柴胡已上各三錢

防風

二錢伍分生

甘草二錢

右咬咀每服五錢水二大盞煎至一盞去粗熱服忌寒冷食物

火鬱湯 治五心煩熱是火鬱於地中四肢者脾土也心火下臨於脾土之中鬱而不得伸故經互火鬱

則發之

升麻

葛根

柴胡

白芍藥已上各壹兩

防風

甘草已上各伍錢

右咬咀每服五錢水二大盞入連翹

葱白三寸煎至一盞去粗稍熱不拘時候服

小黃丸 化痰涎和胃氣除濕治胸中不利

黃芩 一兩 半夏 湯鹽
製 白朮 已上各
伍錢 陳皮 青皮 去白 黃茋 已上各
三錢 濤瀉 二錢 乾薑 錢

黃芩 五分 右為末湯浸餅為丸如棗豆大每服五十丸食遠溫水下

黃芩利膈丸 除胸中熱利膈上疾

生黃芩 炒黃芩 已上各
一兩 半夏 湯鹽
製 黃連 已上各
伍錢 濤瀉 已上各
伍錢 南星 枳殼 陳皮 已上各
三錢 白朮 二錢

白礬 伍分 右為末湯浸餅為丸如梧桐子大每服三五十丸食遠溫水下忘酒濕麵
補益腎肝丸 治目中流火視物昏花耳聾耳鳴困倦乏力寢汗惡風行步不正兩足欹側臥而多發脚

膝無力腰以下消瘦

柴胡 羌活 生地黃 苦參 炒
各伍分 防己 炒已上
各伍分 附子 肉桂 已上各
一錢 當歸身 二錢 右為細

末熟水為丸如雞頭仁大每服五十九食前溫水下

太陽經嘔藥 防風 二分 羌活 三分 紅豆 二箇

右為細末鼻內噙之

麻黃茶萸湯 治胸中痛頭痛食減少咽嗌不利右寸脉弦急

麻黃 羌活 已上各
伍分 吳茱萸 黃芪 升麻 已上各
三分 黃芩 當歸 黃檗 藜本 已上各
一分 川

芍藥 荆子 柴胡 蒼朮 黃連 半夏 已上各
一分 細辛 少許 紅花 少許 右剉如麻豆大都
作一服水二盞煎至一盞去粗稍熱服食後

黃芪湯 治表虛惡風寒

黃芪

伍錢

甘草

三錢

香白芷

二錢

藁本

升麻

已上各

草豆蔻

橘皮

錢伍分

麻黃

當歸身

已上各

蓮花青皮

七分

柴胡

六分

黃蘖

少許

右哎咀每服五錢水

二盞煎至一盞去

粗不拘時服

濕補氣湯

一名清神補氣湯

治兩腿麻木沉重無力多汗喜笑口中涎下身重如山語聲不出右寸脉

洪大

升麻

六錢

蒼朮

四錢

酒黃蘖

柴胡

黃芪

已上各

當歸身

三分

熟地黃

升麻

五錢

五味子

陳皮

已上各

右剉如麻豆大每服五錢水

二盞煎至一盞去粗空心服之待少時

以早飯下之

參歸湯補氣血俱不足

黃芪

十分

甘草

生地黃

已上各

柴胡

草豆蔻仁

升麻

四分

當歸身

三分

人參

已上各

益智仁

少許

紅花

少許

右剉如麻豆大

都作一服水

二盞煎至一盞去粗食遠

服

升陽湯治陽躄癆足太陽經寒熱前氣下行宜升陽氣

炙甘草

伍錢

麻黃

不去節

防風

已上各

羌活

壹兩

右咬咀每服五錢水

二盞煎至一盞去粗

稍熱空心服

自汗門

自汗論

或問濕之與汗為陰乎為陽乎曰西南坤土也在人則為脾胃也人之汗猶天地之雨也陰涵其濕則為霧露為雨也陰濕下行地之氣也汗多則亡陽陽去則陰勝也甚為寒中濕勝則音聲如從瓮中出濕若中水也相法家有說土畜如居深瓮裏言其壅也遠更不出也以明其濕審矣又知此二者亦為陰寒也內經云氣虛則外寒雖見熱中蒸蒸為汗終傳大寒知始為熱中表虛亡陽不任外寒終傳寒中多成渾塞矣色以候天脉以候地形者乃候地之陰陽也故以脉氣候之皆有形無形之可見者也
調衛湯 治濕勝目汗補衛氣虛弱表虛不任風寒

黃芪 麻黃根已上各宣錢 炙活朮分 生甘草 當歸梢 生黃芩 半夏蓋製已上各伍分 麥門冬 生地黃已上各分 猪苓歲分 蘇木 紅花已上各壹分 五味子朮箇 右剉如麻豆大都作一服水二盞煎至一盞去粗稍熱服 中風證必自汗不得重發其汗

清燥湯 治六月七月間濕令大行子能令母實而熱旺濕熱相合必利庚大腸寒冷以救之燥金受濕熱之邪絕寒水生化之源源絕則腎虧痿厥之病大作腰已下痿軟難瘞不能動行步不止兩尺軟則此藥主之

黃芪壹錢 伍分 橘皮 白朮 漚瀉已上各 人參 白茯苓 升麻已上各 無甘草 麥門冬
當歸身 生地黃 神麯末 猪苓已上各 柴胡 酒黃蘖 黃連 蒼朮已上各 五味子朮箇
右剉如麻豆大每服五錢水二盞煎至一盞去粗空心熱服

當歸六黃湯 治盜汗之聖藥也

當歸 生地黃 熟地黃 黃藥 黃芩 黃連已上各等分 黃芪倍 右為麩末每服五錢水二盞煎至一盞食前服小兒減半服之

紅豆散 治頭重如山此濕氣在頭也

麻黃根炒伍錢分

苦丁香伍分

羌活炒各半分

連翹炒已上各半分

紅豆

柏箇

右為細末鼻內噙之

治血通經湯 靈壽縣董監軍癸卯冬大雪時因事到真定忽覺有風氣暴至診候得六脉俱弦其按之洪實有力其證手擎急大便秘澀而赤熱此風寒始至加於身也四肢者脾也以風寒之邪傷之則擣急而擎痺乃風淫未疾而寒在外也內經曰寒則筋掣正謂此也本人素飲酒內有實熱乘於腸胃之間故大便秘澀而面赤熱內則手足陽明受邪外則足太陰脾經受風寒之邪用桂枝甘草以却其寒邪而緩其急擣又以黃藥之苦寒滑以潤實而潤燥急緩腎水用升麻葛根以升陽氣行手足陽明之經不令遏絕更以桂枝辛熱入手陽明之經為引用潤燥復以芍藥甘草專補脾氣使不受風寒之邪而退木邪專益肺金也加入參以補元氣為之輔佐加當歸身去裏急而和血潤燥此藥主之

芍藥伍分

升麻 葛根 人參

當歸身 羌甘草已上各

壹錢

酒黃藥 桂枝已上各

貳錢

右剉如

鴻榮湯 治癰風滿面連頭極癢不任眉毛脫落先破其處令毫髮消盡後服此藥

連翹

陸分

桔梗五分

生黃芩

生地黃已上各四分

黃芪

蘇木

黃連

地龍

全蠍

當歸已上各三分

白豆蔻

人參已上各二錢分

甘草半一分

梧桐液一分

麝香少許

桃仁三箇

並

蟲去趨足炒三箇

水蛭卷箇炒令烟盡

右判如麻豆大除連翹梧桐淡白豆蔻另為細末麝香蜜蠟水蛭三味

同為細末都作一服水二盞酒一盞入連翹煎至一盞去粗再入白豆蔻二味并麝香等再煎至七

分稍熱早飯後午前服之忘酒濕麵生冷硬物

人參益氣湯 治兩手指麻木四肢困倦怠惰嗜卧乃熱傷元氣也

黃芪捌錢

生甘草

人參已上各伍錢

白芍藥叁錢

柴胡貳錢伍分

炙甘草

升麻已上各肆錢

五味

子壹百肆拾箇

右哎咀分作四服每服水二盞煎至一盞去粗稍熱食遠服

導氣湯 治兩腿麻木沉重

黃芪捌錢

甘草陸錢

青皮肆錢

升麻

柴胡

當歸梢

澤瀉已上各貳錢

橘皮

壹錢

紅花

五味子壹百貳拾箇

右哎咀分作四服每服水二大盞煎至一盞去粗食前熱服

補中湯 治面黃汙多目赤四肢沉重減食腹中時時痛噉嗽兩手寸脉短右手脈弦細兼澀關脉虛

升麻

柴胡

當歸已上各貳分

神麪叁分炒

澤瀉

大麥蘖麵

蒼朮已上各伍分

黃芪貳錢伍分

炙甘草捌分

紅花少許

五味子貳拾箇

右哎咀分作二服水二盞煎至一盞去粗食遠服

麻黃蒼朮湯 治秋冬每夜五更噉連聲不絕乃至天曉日高方緩口苦兩脇下痛心下痞悶臥而多驚

筋攣肢節疼痛瘲腫涎沫日晚神昏呵欠不進飲食

麻黃捌錢

蒼朮伍錢

黃芪壹錢伍分

草豆蔻陸分

柴胡

羌活已上各伍分

生甘草

當歸梢

防風

肆分

炙甘草 黃芩

已上各
參分

五味子

玖箇

右㕮咀分作二服水二盞煎至一盞稍熱

臨卧服

上清湯

清利頭目寬快胸膈

人參

蔓荆子

已上各
伍分

防風

壹錢

葛根

壹錢

黃芪

參錢

甘草

肆錢

右㕮咀分作二服水二

盞煎至一盞去粗

盞去粗臨卧熱服以夾衣蓋覆不語須臾汗出為効

木桂湯

一名麻黃蒼朮湯
蒼朮 貳錢

治寒濕所客身體沉重胃脘痛面色痿黃

蒼朮

貳錢
已上各

麻黃

炒神麴
伍分

橘皮

白茯苓

澤瀉
壹錢

桂枝

半夏

草豆蔻仁

猪苓

已上各
五分

黃芪

參分

炙甘草

貳分

杏仁

拾箇

右都作一服水二盞生薑五片煎至一盞去粗

食前熱服

正氣湯 治盜汗

炒黃藥

炒知母
錢伍分

炙甘草

伍分

右為麩末作一服水二盞煎至一盞食前溫服

趣痛丸 治打撲閃損腰痛不可忍

白葛苣子

壹兩
炒黃

烏梅

壹箇

白粟米

一錢
炒黃

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸細嚼溫酒空

心下

退熱湯 治表中虛熱或遇夜則甚

黃芪

壹錢

柴胡

柒分

生甘草

黃連酒製

黃芩

芍藥

地骨皮

生地黃

去血

蒼朮

已上

各五當歸身升麻以上各三分右咬咀作一服水二盞煎至一盞去粗食遠溫服如身體力困

者加麥門冬五味子已上各五分人參甘草已上各壹錢

解表升麻湯治遍身壯熱骨節疼痛

升麻羌活蒼朮已上各壹錢防風捌分柴胡甘草已上各柒分當歸藁本已上各伍分橘皮叁分

冬加麻黃不去春加麻黃去節右咬咀作一服水二盞煎至一盞去粗溫服後以葱醋湯發之

得微汗為効

天麻黃芪湯治表有風證因連日酣飲其證復來右口角并眼頰有側視及左手左腳腿麻木痠痛

天麻芍藥神麌炒羌活肢節不痛去之桔梗已上各叁分人參黃連肆分當歸伍分黃芪

甘草升麻葛根黃蘖已上各陸分澤瀉柒分柴胡玖分右咬咀作一服水三盞煎

至一盞去粗食遠溫服或加猪苓陸分

健步丸治膝中無力伸而不得屈屈而不能伸腰背腿膝沉重行步艱難

防己酒洗壹兩羌活柴胡滑石炒炙甘草瓜蔞根酒洗已伍錢澤瀉防風已上各叁錢苦參酒洗

川烏已上各壹錢肉桂伍分右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服七十九煎愈風湯下空心服

白木除濕湯治午後發熱背惡風四肢沉重小便或多或少少黃色此藥又治汙後發熱

白术壹兩生地黃炒地骨皮澤瀉知母已上各柒錢赤茯苓人參炙甘草柴胡已上各伍錢

右為麩末每服五錢水二盞煎至一盞去粗食遠溫服如小便快利減茯苓澤瀉一半如

有刺痛一料藥中加當歸身

酒洗
茶錢

加味四君子湯 治久瘧熱多寒少不止

白朮 白茯苓 人參 甘草 柴胡 薄荷

等分
上各

右㕮咀每服五錢水二盞生姜

三片棗一枚煎至一盞去粗不拘時候服

瀉血湯 治發熱晝少而夜多太陽經中尤甚晝病則在氣夜病則在血是足太陽膀胱血中浮熱微有

氣也既病人大小便如常知邪氣不在臟腑是無裏證也外無惡寒知邪氣不在表也有時而發有時而止知邪氣不在表不在裏知在經絡也夜發多而晝發少是邪氣下陷之深也此雜證當從熱入血

室而論之

生地黃

酒洗炒

熟地黃

丹參酒炒

當歸

酒洗去土

漢防己

酒洗

柴胡

去芦炒

甘草梢

炙炙

羌活

已上各
壹兩

桃仁

去皮參
錢湯浸

右為麌末每服五錢水一盞半煎至一盞去粗空心溫服

洗面藥

治面有黑點或生瘡或生痤瘡及粉刺之類并去皮膚燥癢去垢膩潤澤肌膚

皂角

荳子另搗好升麻另搗

桔實子

伍兩

白芨

壹兩細剉

甘松

茶錢

縮砂連皮

白丁香

散月

三柰子

五分上各
另搗

菉豆

搗合

糯米

壹升貳合

右為細末用之如常

瑩肌如玉散

白丁香 白芨 白牽牛 白欵

已上各
壹兩

白芷

茶錢

當歸梢

白蒺藜

升麻

各五

錢 白茯苓

楮實子

已上各
參錢

麻黃

去節
貳錢

白附子

連翹
錢伍分

小椒

壹錢

右為細末用之如常

面油摩風膏

麻黃 升麻去黑皮

防風已上各
錢

羌活去皮

當歸身 白芨

白檀已上各
錢

右用小油半斤

以銀器中熬綿包定煎藥於油中熬之得所澄淨去粗入黃蠟一兩再熬之為度

小兒門

治驚論

外物驚宜鎮心以黃連安神丸若氣動所驚宜寒水石安神丸大忌防風丸治風辛溫之藥必殺人何也辛散浮溫熱者火也能令母竇助風之氣盛皆殺人也因驚而泄青色先鎮肝以硃砂之類勿用寒涼之氣大禁涼驚丸風木旺必克脾胃當先實其土後瀉其木關孝忠編集錢氏方以益黃補土慢矣其藥有丁香辛熱助火火旺土虛虛妄青橘皮瀉肺金丁香辛熱大瀉肺與大腸脾實當瀉子今脾胃虛反更瀉子而助火重虛其土殺人無疑矣其風木旺證右關脉洪太掌中熱腹皮熱竊可以助火瀉金如寒水來乘脾土其病嘔吐腹痛瀉利青白益黃散聖藥也今立一方先瀉火補金然後再大補其土是為神治之法

法

黃芪湯 黃芪

或錢

人參

壹錢

炙甘草

伍分

右㕮咀作一服水一大盞煎至半盞去粗食遠服加

白芍藥尤妙此三味皆甘溫能補元氣甘能瀉火內經云熱淫于內以甘瀉之以酸收之白芍藥酸寒寒能瀉火酸味能瀉肝而大補肺金所補得金土之位大旺火虛風木何由而來尅土然後瀉風之邪夫益黃散理中丸養神丸之類皆治脾胃寒濕大盛神品之藥也若得脾胃中伏熱火勞役不足

之證及服熱藥巴豆之類。肖虛而成慢驚之證用之必傷人命。夫慢驚風者皆由久濁脾胃虛而生也。錢氏以卷活膏療慢驚風誤矣。脾虛者由火邪乘其土位故曰從後來者為虛邪火旺能實其木木旺故來克土當於心經中以甘溫補土之源更於脾土中濁火以甘寒更於脾土中補金以酸涼致脾土中金旺火衰風木自虛矣。損食多進藥愈前藥是也。

益黃散 治胃中風熱

黃芪

兩錢

陳皮

去白

人參

二兩

黃芩

一錢

芍藥

三分

生甘草

一錢

熟甘草

五錢

黃連

少許

右

為細末每服二錢水一盞煎至五分食前服

升陽益血湯

二月間有一小兒未滿一百日病腹脹二日大便一度瘦弱身黃色宜升陽氣滋血益

補血利大便

嫩梢

貳分

神麴末

升麻

二分

當歸

一錢

厚朴

一錢

桃仁

拾箇

右都作一服水一大盞煎

至半盞去粗食速服

厚腸丸 治小兒失乳以食飼之未有食腸不能消化或生腹脹四肢瘦弱或利色無常

厚朴

青皮

各

橘紅

半夏

蒼朮

人參

各

枳實

麥蘖麵

神麴末

各

右為極細末水煮糊丸如麻子大每服二十丸溫水送下食前忌飽食

補陽湯 時初冬一小兒二歲大寒證明堂青脉額青黑脣後青絡高起舌上白滑喉鳴而喘大便微
青耳尖冷目中常帶淚下仍多眵眼中不利卧而多驚熱擗則寒

黃藥 橘皮 萬根 連翹 岩梢 羌草

已上各
壹分

升麻

黃芪

柴胡

已上各
貳分

當歸身

麻黃

已上各
卷分

吳茱萸 生地黃

地龍

已上各
伍分

右咬咀都作一服水

一大盞半煎至六分去粗

乳食後熱服

藥之後添喜笑精神出氣和順乳食旺

大蕪荑湯

一名梔子茯苓湯

治黃疳土色為熱為濕當小便不利令反利知黃色為燥胃經中大熱發黃脱落知膀胱與腎俱受土邪乃大濕熱之證鼻下斷作瘡者上逆行榮氣伏火也能乳者胃中有熱比寒則食不入喜食者胃不足也面黑色者為寒為癥大便青寒褐色血黑苔熱畜血中間黃色腸中有熱治法當滋榮潤燥除寒熱致津液

防風

黃連

已上各
壹分

黃藥

炙甘草

麻黃

不去根節
貳分

羌活

已上各
壹分

山梔子仁

已上各
伍分

柴胡

茯苓

各卷
肆分

當歸

大蕪荑

白朮

已上各
伍分

右剉如麻豆大都作一服用水

一大盞半煎至六分

去粗食前稍熱服

瑞氣退黃湯

一名茯苓滲濕湯

治小兒面色痿黃腹脹食不能下

白朮

茱胡

已上各
半分

升麻

壹分

桂枝

麻黃

吳茱萸

厚朴

羌活

草豆蔻

神麃末

蒼朮

澤瀉 白茯苓

猪苓

黃藥

橘紅

已上各
貳分

青皮

黃連

已上各
伍分

杏仁

貳箇

右都

作一服水二大盞煎至一盞去粗食前溫服

中滿分消丸

枳實

黃連去鬚

伍分

厚朴

配生薑各

生薑

薑黃

已上各
壹錢

橘皮

甘草

已上各
伍分

白朮

砂仁

澤瀉

茯苓已上各參錢

牛夏肆錢

黃芩壹兩

右為細末湯浸餅為丸如黍米大每服

三十九溫水下

消痞丸

黃連

伍錢

黃芩貳錢

厚朴柒分

薑黃伍分

乾生薑

人參已上各肆分

甘草

參分

枳實

貳分

橘皮

壹分

右為細末湯浸餅為丸如黍米大每服三十丸隨乳下

斑疹論

夫癰疹始出之證必先見面燥腮赤目胞亦赤呵欠煩悶乍涼乍熱嗽噦噴足稍冷多睡篤並瘡疹之證或生膿胞或生小紅斑或生癰疹此二等不同何故俱顯上證而後乃出蓋以上諸證皆太陽寒水上於右腎之下煎熬左腎足太陽膀胱寒水夾脊逆流上頭下額逆手太陽丙火不得傳導逆於面上故顯是證蓋壬癸寒水尅丙丁熱火故也諸斑證皆從寒水逆流而作也醫者當知此理乃敢用藥夫胞者一名赤宮一名丹田一名命門主男子藏精施化婦人繫胞有孕俱為生化之源非五行也非水亦非火此天地之異名也象坤土之生萬物也夫人之始生也血海始淨一日二日精勝其血則為男子三日四日五日血脉已旺精不勝血則為女子二物相搏長生先身謂之神又謂之精道釋二門言之本來面目是也其子在腹中十月之間隨母呼吸呼吸者陽氣也而生動作滋益精氣神饑則食母血渴則飲母血兒隨日長皮肉筋骨血脉形氣俱足十月降生口中尚有惡血啼聲一發隨吸而下此惡血復歸命門胞中僻於一隅伏而不發直至因內傷乳食濕熱之氣下流合於腎中二火交攻致營氣不從逆於內理惡血

乃發諸斑疹皆出於膀胱。士水其癥後聚肉埋歸於陽明。故三番癥始顯之症皆足太陽。士膀胱經內小腸其始出皆見於面終歸於陽明。肉理熟化為膿者也。二火熾盛反勝寒水遍身俱出此皆出從足太陽傳變中來也。當外發寒邪使令消散內濁二火不令交攻其中令濁氣上歸復其本位可一二服立已仍令小兒以後再無二番斑出之患。此內經之法覽者詳之。

消毒救苦散 治癥證悉具消化便令不出如已出布者再不生癥

防風

羌活

麻黃根

升麻

生地黃

連翹

初出者減
出大者加

酒黃藥

已上各
伍分

當歸身

黃連

已上各
半分

細辛

生甘草

白朮

陳皮

蘇木

紅花

已上各
壹分

吳茱萸

半分

右剉如麻豆大

每服五錢水

二天蓋煎至一盞去粗

稍熱空心服

夫癥疹出者皆因內傷必出癥營氣逆故也。大禁牽牛巴豆食藥宜以半夏枳术大黃益智仁之類去其泄濁止其吐若耳尖冷呵欠睡中驚嘯噴眼澀知必出癥也。諸大膿泡小水泡癥疹癰三色皆營氣逆而寒復其表宜以四味升麻湯中加當歸身連翹此定法也。

如肺成膿癥先嗽喘或氣高而喘促加人參少加黃芩以濁伏火而補元氣。如心出小紅癥必先具嗌乾驚悸身熱肌肉腫脉弦洪少加黃連。如命門出癥疹必先骨疼身熱其疼痛不敢動搖少加生地黃又加黃藥諸癥疹皆為陰證瘡須皆因內傷飲食脾胃不足營氣逆行雖大熱內熾陰覆其外治法

如前

辯小兒癰證

呵欠 嘴噴 睡中發驚 或耳尖冷 眼澀

或辨復食

口熱 或口醋氣 妥辨不消 或腹中痛

如癰證少真其癰未發乃與升麻湯三五錢帶熱服之待身表溫和癰疹已顯服藥乃止 如其身涼其
癰未出辨得是癰證無間服數真候身表溫和及癰瘡已顯然後乃止只時時與桔梗湯竄胸膈利咽
喉


桔梗湯 如癰已出只時時與之快咽喉寬利胸膈


桔梗貳錢 甘草壹錢 右為靈末每服三錢水一大盞煎至六分去粗大溫時時服之不可計服
數 如見傷食證又見癰證先與不犯大黃巴豆藥蔻化過再與升麻湯 如食重傷前藥不能過
再與犯大黃巴豆藥過 如大便行當即使與升麻湯服之恐癰子內陷已後臨時作罪過 如癰
子已出稠密身表熱急與下項

秦粘子湯 如癰子已出稠密身表熱急與此藥服之防後青乾黑陷

秦粘子炒香 當歸身酒洗 多甘草已上各壹錢 柴胡 連翹 黃芪已上各壹錢 地骨皮伍分
各減 麻黃紫胡升麻湯 治小兒寒鬱而喘喉鳴腹中鳴腹滿鼻流清涕脉沉急而數

麻黃 草豆蔻仁 益智仁已上各錢伍分 吳茱萸 厚朴已上各兩分 當歸梢 甘草 柴胡 生黃芩
升麻 神麴 蘇木已上各半分 全蠍貳箇 紅花少許 右剉如麻豆大分作一服水一大盞煎至七分食遠服忌風寒微有汗則効





L693L
1907
V. 2