


v. 8



D. Chinese.

(Last) Vol. VIII

111 V. 301 (1922)

河間劉守真傷寒論方卷下

臨川 葛 雖 編
新安 吳勉學 校

習醫要用直格

諸證藥石分劑

麻黃散

麻黃一兩半去節湯泡去黃汁焙乾秤桂枝一兩削去皴皮甘草半兩

右剉如麻豆大每服五錢七匙也謂錢水一盞半煎至八分濾去滓溫服半也杏仁二十粒湯浸去皮尖者下並同法

取微汗是抄也或溫病身煩痛小便自利者加白朮四分微汗之每一分二錢半也

益元散

一名天水散

一名太白散

滑石六兩膩好者甘草一兩

右為細末每服三錢蜜多許溫水調下或無蜜亦可

每時日三服或欲冷飲者新井泉調下亦得

解利發汗前芻白豆豉湯下每服水一盞葱白五十豆豉五十粒煮取汁七分調併三四服以効

為度此藥是寒涼解散熱鬱設病甚不解多服無害但有益耳本世傳名太白散俗惡性寒葱易

得之賤物而又不明素問造化之理故不取本草神驗之言而多不用焉若以隨證驗之乃凡人

之仙藥也何可缺歟○夫傷寒當汗則不可下當下則不可汗且如誤服此藥則汗自不出而

裏熱亦復不效亦有裏熱使得宣通而愈者也或半在表半在裏可和解而不可吐下發汗者若

服此藥多愈或不愈亦小減加涼膈散和解尤佳○或自當汗解者更加蒼朮粗末三錢同葱豉

煎湯調服尤良或孕婦不宜滑石麻黃桂枝單發汗即用甘草一兩蒼朮二兩同為粗末每服四

錢水一盞葱白五十豆豉五十粒同煎至六分濾去滓熱服併二三服取微汗是名逼毒散非孕婦

亦可服或大白散加麻黃二兩去節如法煎服世云神白散○或逼毒散加麻黃與蒼朮等分去
節濟衆云青龍散○或青龍散更加滑石末與蒼朮二倍是為發汗之妙藥名曰大逼毒散此方
唯正可汗者即用誤服之則轉加熱也或解利兩感煎涼膈調下益元散四錢○或下乳用豬肉
鷄羹粥飲湯之類調下四錢不拘時候日三服及宜食肉鷄羹粥○催產溫香油漿調下五錢併
二三服以產為度○或死胎不下者煎三乙承氣湯一服調下益元散五錢須臾更煩用油漿調
益元散溫服前後俱下而胎下可活產母也凡難產或死胎不下皆由風熱燥滯緊致結滯而不
能舒緩故產戶不得自然開通也此藥力至則結滯頓開而產矣後慎不可溫補而反生燥熱也
俗未知產後亡液損血疼痛怖懼以致神狂氣亂則陰氣損虛邪熱太甚而為諸熱證由不讀素
問不知造化故不識證候陰陽反以妄為產諸虛百損便為虛冷而無熱也誤以熱藥溫補或見
煩渴者不令飲水本雖善心為害多矣豈治病之道但以臨時審其臟腑六氣虛實明其標本如
法治之而已矣此藥泛常多用然須為效至大而俗以病異藥同將謂妄行反招悔慢今以黃丹
加令桃紅色名曰紅玉散 加青黛令輕碧色名碧玉散 加薄荷葉一分名雞蘇散主療不殊
收效則一俗目懵然何能別此可遠安侮可顯立功後之學者其究心焉

桂枝湯

桂枝去皴

芍藥

甘草炙等分
分為率

右剉如麻黃大每服八錢水一盞半姜二片東三枚擘破煎至七分令去滓溫服續後啜熱稀粥
溫覆令遍身微汗或暖也及初夏可加黃芩一兩名陽旦湯大熱之分及素有熱人可再加知母
半兩石膏一兩為末或更加升麻一分禁生冷粘滑肉鷄五辛酒酪息物等桂枝證反下之不成
結胸及痞但腰滿証在者本方倍加芍藥大實痛者更加大黃半兩脉弱自利者不加
桂枝加葛根湯

桂枝 荻藥 甘草各六錢

葛根三兩

右如桂枝湯服。謂如桂枝湯對煎。

此下並倣此。

葛根湯

葛根一兩

麻黃泡去黃汁

乾秤三分

桂枝去皺

芍藥

甘草炙各半兩

大青龍湯

麻黃如前

石膏製為末各半分

桂枝一分

甘草炒一錢

杏仁皮尖雙仁去

右剉如麻豆大抄五錢水一盞生姜三片棗三枚擘破煎至半盞濾去滓溫服令身汗濕未潤再服。

小青龍湯

麻黃如前

半夏湯洗

芍藥

細辛

乾姜

甘草炙各半兩

桂枝去皺

各三分

五味子二錢

右剉麻豆大每服八錢水一盞半生姜四片前至七分綃汁溫服渴者去半夏加桔梗根三錢微利去麻黃加芫花殫子大噎者去麻黃加附子二錢泡以開佛熱結滯小便不利少腹滿者去麻黃加茯苓四錢喘者去麻黃加杏仁製如前法此方燥至溫散其水以潤腸胃臟腑之燥以開發佛熱結滯者也。

小柴胡湯

柴胡去苗二兩

黃芩甘草人蔘各三兩

半夏六錢

甘草各半兩

桂枝去皺

各三分

五味子二錢

甘草炙各半兩

桂枝去皺

各三分

涼膈散

名連翹

大抄五錢生姜三片棗二枚切前至半盞濾去滓溫服日三小兒一服作三服

諸藥同法

連翹一兩

山梔子

大黃薄荷葉去毛

黃芩各半兩

甘草半兩

朴硝一分

右為粗末每服二三錢水一盞蜜少許。或無蜜亦可。舊用煎至七分濾去滓溫服。熱甚者可服四錢。亦有可服一二十錢者。竹葉或亦不須用。前煎至七分濾去滓溫服。熱甚者可服四兩。每服生姜三片煎。衄嘔血者加當歸芍藥各半兩。荆芥穗半兩。咳而嘔者本方加半夏半兩。風眩者加川芎。防風各半兩。石膏三兩。酒毒者加葛根一兩。斑疹痘瘡加荆芥穗赤芍藥川芎。防風桔梗各半兩。三歲兒可服七八錢。或熱甚黑陷腹滿喘急小便赤澀而將死者此一服更加大承氣湯約以下之得利立甦。

凡言加者皆自本方加也。但加者每服五七錢以意加減調理。兩感傷寒下證前後以退表裏之熱者。前本方四五錢調下益元散三四錢其本方皆能治此諸證但加即為效也。

白虎湯

知母半兩甘草一兩粳米一合石膏四兩爲末

右剉麻豆大炒五錢水一盞煎至六分去滓溫服無時日三四服。熱甚者服七八錢至十餘錢。或眩或嘔或咳者加半夏半兩陳皮半兩。每服用生姜三片煎服。或傷寒發汗不解脉浮者加蒼朮半兩。名曰蒼朮白虎湯。或發汗或下後煩渴口乾或脈洪大或微惡寒者或不可下者或除可者之外並宜加入參半兩以調之。名人參白虎湯。

五苓散

猪苓去黑皮茯苓白朮各半桂一分去皴澤瀉一兩

右為細末每服二三錢熱湯調下惡熱欲冷飲者新水調下或生姜湯調下愈妙。或加滑石二兩甚或喘嗽咳煩心不得眠者更加阿膠半兩泡

桂苓甘露飲一名桂苓

桂半兩茯苓白朮各半

甘草炙澤瀉

石膏

寒水石

滑石

一兩

如前

製

右為極細末。熱湯調下三錢。欲冷飲者。新水調下。或生姜湯調下。尤良。小兒服一錢。

白朮散

茯苓去皮人復

藿香葉半兩甘草一兩半木香分葛根一兩

右為細末。白湯調下三錢。若煩渴者。加滑石二兩。病甚者為粗末。每服一兩半。水一大升煎至七合。絞汁放冷。從意續續飲之。小兒尤宜。

四逆湯

甘草炙乾姜各一附子半個

去皮臍

凡用附子以半兩重者佳。小者力弱。大者性惡。非稱處方之宜也。世皆美其大者。未知古人之有則也。

右剉麻豆大。用水兩盞。煮至一盞。絞汁分溫二服。強實人二劑作三服。或畜熱極深者。手足厥冷。則不宜此方。當以下之也。

茯苓半夏湯

茯苓去皮及生姜取汁各半夏一錢

右剉麻豆大。用水一盞。煎至四分。絞汁下。姜汁溫服。

半夏橘皮湯

半夏泡如陳皮湯浸洗

甘草炙人復

茯苓

黃芩去腐心

葛根半兩厚朴去皮各

一分

根半兩厚朴去皮各

右剉麻豆大。用水三盞。生姜一分切。煎至一盞半。絞取汁。分四服。作一日食後溫服。

黃連解毒湯

黃連去須黃芩

黃芩大梔子各半

右剉麻豆大。每服半兩。水一茶盞。煎至四分。絞取汁。溫服無時。日三四以效為度。每一二服效。

或腹滿嘔吐或欲作利者每服加半夏三枚全用厚朴二錢剉。茯苓去皮剉水一盞半生姜三片煎至半盞絞汁溫服名曰半夏黃連解毒湯。或欲急下者本方加入承氣湯一服生姜煎如前法以利為度。一法為細末水研如小豆大溫水下二十丸治積熱勞欬渴利甚良。

瓜蒂散

瓜蒂赤小豆等分

右為細末以青豉半合。豆豉水一盞半煮取汁半盞調下一錢七不吐加服得快吐乃止虛人不宜

大柴胡湯

柴胡去苗大黃各半黃芩芍藥各一半夏二錢枳實三錢生用

半兩者亦得
枳實不去穰為效甚速下並同

右剉麻豆大分作三服每服水一盞生姜三片棗三枚煎至半盞絞取汁溫服未利再服

大承氣湯

芒硝朴硝有芒頭者亦得厚朴去皴枳實各半

大黃

加甘草一兩是名三乙承氣湯。

右剉麻豆大分一半用水一盞半生姜三片煎至六分納硝煎一二沸絞去滓熱服。

凡前藥須慢火煎沸即下火為一沸或言煎至幾分亦如此法煎不可強火耗去其水也。凡病熱甚而冷服寒藥則病能拒藥多不能下故經曰寒因熱用未利再服熱甚者此一劑分大半作一服未利再服少半熱更甚者一劑都作一服熱勢甚者亦可併此二劑為一服剉分劑方得利而效者臨時消息以利為度消息謂損益多少也。

凡用藥多少倣於此耳。

小承氣湯

大黃半兩厚朴三錢枳實三錢

右剉如麻豆大作二服每服用水一盞生薑三片煎至半盞。取汁熱服未利再服。或微下者一劑分作二服。或和胃氣不欲利者一劑分為四五服。

調胃承氣湯

甘草 大黃 芒硝各半

右剉如麻豆大分一半用水一大盞煎至半盞。絞去滓。納硝煎一二沸熱服。不利再服。

十棗湯

芫花慢火炒變色大戟 甘遂各等

右為散。末用水一盞肥棗十枚切開。煮取汁半盞。調下半盞。強實人服一錢。以意加減。快利為度。

桃仁承氣湯

桃仁湯去皮尖雙仁用板槌碎芒硝半兩 大黃六錢桂皮甘草各三

右剉如麻豆大分作三服。每服用水一盞煎至半盞。下硝絞取汁熱服。日三以微利為度。

抵當圓

水蛭炒蟲蟲炒去翅足七枚桃仁八粒 大黃一錢

右為細末。蜜和作二圓。用水一小盞。煮一圓。至六分溫服。時血未下者再服。

抵當湯

水蛭炒蟲蟲炒去翅足各十枚桃仁七枚 大黃一錢

右剉如麻豆大分作二服。每用水一盞煮半盞。絞去滓溫服未下再服。蛭之吉丁結二切。水蛭也。蟲蔓庚切。

茵陳湯

茵陳蒿去莖一兩一川大黃半兩山楂子七枚

者十枚

右剉如麻豆大用水兩盞半慢火煮至一盞。絞取汁溫服六分。未利再服四分。以利為度。勢甚者作一服。未利再作。以意加減。當下如爛魚肚及膿血膠膜等物。及小便多出金色。如皂角汁。或見證將欲發黃者。此一劑分作四服。每服調下五苓散三錢。凡治發黃亢越此法也。

世俗有傳烙黃而愈者。或此強實之人素本中氣不衰。而及濕熱鬱之微者。烙之而誤。中強劫開發得開氣血宣通。即作汗而愈。或體質本虛濕熱結甚。則劫發不發。而反致死者。不為少矣。莫若仲景法對證以藥致之。則免致強劫不開。而反誤人生命也。及夫近世妄傳有寒極陰黃而內外極救其陽為害多矣。設若病微而誤中開發得愈。亦以鮮矣。而傷生者不可勝言也。大抵凡諸黃者有二。一則濕熱氣而黃。萬物皆然。又如麥秀而鈴雨濕熱過極則黃痘者也。及水滯而天氣濕熱則草木將死而色變黃者也。或病血液衰。則虛燥熱太甚而身面痿黃者。猶亢旱而草木萎黃也。夫病燥熱而黃者。當退熱潤燥而已。此傷寒濕熱極其而發黃者。開結退熱雙利大小腑。以除水濕。則利加而愈也。於林切

結胸而發黃者。同陷胸湯各半服下之。或誤服巴豆熱毒圓藥下之。及損陰氣。遂協熱利不止而發黃者。同大承氣各半服下之。亦有協熱利不止。更或結胸而發黃者。用茵陳五分。同陷胸湯三分。大承氣二分以下之。或兩感發黃者。本方加黃連解毒湯一服急下之。或頭微汗。小便利而微黃者。濕熱微也。宜此施子藥皮湯。

大山梔子十五甘草一錢黃蘖半兩

右剉如麻豆大。此劑則作二服。每服水三盞。煮至一盞。絞取汁分三次。作一日服。

大陷胸湯

大黃 芒硝各三錢

甘遂末三字

右剉如麻豆大一劑。分作二服。每服用水一盞。煮大黃至六分。內消至一二沸。絞汁一字匕半溫。服未快利再服。熱惡不利者以意加服。

大陷胸圓

大黃半兩 草庵三錢

微炒芒消一分

杏仁十二個草

灰炒色變

右大黃為細末。下草庵杵。再羅研杏仁消如泥。和圓如彈子大。每服一圓。入甘遂末三字。匕白蜜半匙。水一盞。煮至半盞。溫服。當一宿許乃下。未利再服。

小陷胸湯

半夏四錢 湯洗 生姜二錢

黃連二錢 拘蕓實大者半個惟剉其壳子則不全用不剉

但用或其中子者非也

右以水三盞煮。括蕓取汁一盞半。內餘藥煮至一盞。絞取汁一盞。分兩次溫服。以效為度。

大黃黃連瀉心湯

大黃 黃連

黃芩各一

一法加生姜一分。甚良。

梔子湯

大梔子七枚 剝碎豆豉半合

右以水兩盞煮。梔子至一盞半。內豆豉煮至半盞。絞汁溫服。

凡加煮皆用梔子先煮。

或吐者止後服。凡諸梔子湯皆非吐人之藥。以其燥熱鬱結之甚。而藥項攻之不能開。通則鬱發而吐。因其嘔吐發開鬱結。則氣通津液竄行而已。故不須再服也。

梔子厚朴湯

大梔子七枚 厚朴半兩 枳實二錢

右剉如麻豆大以水一盞半煮絞汁半盞溫服

泛論

凡傷寒熱病下後熱不退下證尚在者再三下之以熱退為度雖熱退尚未痊愈者隨證調之凡下之前後或大汗將出或大汗已出俗是好汗或汗後煩渴及諸吐瀉雜病一切煩渴者須以細細飲之渴未止者頻頻時與但不可過多以成留飲不散者也

留飲一名水畜經曰積飲

夫留飲謂水液留積蓄聚於內而不濕潤傳化者也夫腸胃燥熱大甚則結滯而氣液不能宣通故雖飲而難以止其煩渴也若以頻飲過多則水濕過極而腸胃燥熱怫鬱轉以加其水濕痞閉故成留飲而心腹滿痛或為吐瀉也

設若不與飲之則燥熱轉甚危而死矣

夫腸胃之燥濕猶地最澇適當其宜皆不可過與不及凡治病之道以調六氣陰陽使無偏頗各守其常平和而已嗟夫世俗或以妄為冷水寒藥水損脾胃隔卻大汗但令中外俱熱而欲望其作大汗者或大汗欲出腸胃燥熱煩渴及汗已出反慮水却大汗不與水者或氣弱久虛煩渴者或吐瀉煩渴者或產婦煩渴皆以妄為氣虛不可飲水也此乃未知古人云渴欲飲水為熱在裏也若夫正氣既衰邪熱燥甚而煩渴者若非水液寒藥滋潤救其殘陰退其邪熱則陽熱暴甚而為害甚大也不與水而反以大毒熱藥燥之寧無損者耶且如酒之體者水也比之飲水則過能多飲而旋能消散之外轉能發於渴者以其苦熱養於心火則陽盛陰衰而燥去水濕之體故旋能消散而善多飲水也其酒之善多飲者以其酒之熱毒若非復以水體勝之則亦少飲疾醉者強以飲多則燥熱太甚而多生病也然酒力之熱善消水體復制酒力以其熱力多於水體故飲多即熱醉而燥盡水體勢力尚在則燥熱煩渴而病於酒也然酒之熱耗盡水體之外尚能燥熱煩渴為病况病於燥熱太甚而煩渴又不與水者豈不知其害耶况燥熱煩渴者腸胃易為怫鬱

當以退熱開結散水潤燥之藥調之。免致燥熱太甚。則怫鬱以成留飲。雖多飲不入。止其陽胃。膩腑之燥熱煩渴。而成腸胃之內熱。甚以成吐瀉也。涼膈白虎五苓及桂苓甘露之散類。隨證以調之也。

或成留飲諸病者。隨證燥之。

宜小青龍湯。五苓桂苓甘露黃連解毒湯。小陷胸大承氣之類。證本方論中。

戰汗

夫熱病大汗將出而反寒戰者。

古人以百病皆為雜病。惟傷寒名曰大病。俗言汗病是也。經言大汗者。非謂邪熱自汗大出者也。乃陽氣怫熱鬱結。後得開通發散宣通。則蒸蒸而為汗出。是謂大汗。言大病怫熱邪毒之氣鬱極。迺發以為汗出。故曰大汗也。故經曰大氣皆去。病得已矣。

表之正氣與邪熱并甚於裏。大熱亢極而反兼水化制之。故反寒慄也。謂造化

經曰少陰所至為驚。或惡寒戰慄譖妄。謂少陰君火熱氣之所至。而為此等之病也。又經曰。諸禁鼓慄如喪神守。皆屬於火。注云熱之內作然禁。俗作噤。鼓振搖而動也。言禁冷振慄反寒戰也。經曰亢則害。承乃制。謂五行之道微者。當其本。此實其過亢。則反兼勝己之化以制其甚。老子云。天地其張弓乎。高者抑之。斯其道也。經云。水曰靜順。謂靜而自己無為。但順物之氣味也。及方圓不與物爭。乃至柔順者也。水本寒。寒極則水。水如地而能載物。又經曰。水發而雹雪。是水寒亢極而反似乾水之土化。是謂兼化也。故病寒極者。反堅滿也。夫土主濕。雲雨而安靜。雨濕極甚。則飄驟散落。是反兼風木制其土濕也。故經言。座為濕極而反似風強病也。○木主生榮而旺於春。不與物爭。乃至柔順者也。水本寒。寒極則水。水如地而能載物。又經曰。水發而雹雪。是水寒亢極而反似乾水之土化。是謂兼化也。故風病過極。則中外燥濕。皮膚皴揭。反其氣濕其本。風大則反涼而毀折。是兼金化制其木也。故風病過極。則中外燥濕。皮膚皴揭。反氣運行之燥澀。而筋脉癱緩。是反兼金化也。○金主於秋。而屬於陰。其氣涼涼極則天氣清明而

萬物反燥。燥物莫若火。是金極反兼火化制之也。故為病。血液衰少。燥金之化極甚。則反熱也。燥物莫若火。夏月火盛。熱極甚。則天氣曠昧。而萬物反潤。以出水液。林木流津。及體熱極。而反出汗液。以火煉金。熱極而反化為水。是火極而反兼水化制之也。故病熱極。則反出五溫。婦人帶下淋瀝。及厥逆身冷。或為惡寒戰慄。而或反令痛也。俗以帶下直言冷病。及惡寒戰慄。便為陰寒者。俗極反似濕土。熱極反似寒水之化也。嗟夫。百病之極甚者。其狀反似於己之相反者。俗醫不求其病之本氣。而百端擬疑。莫知真源。不得已而但隨兼化之虛象。妄為其治。反助其病。而害於生命多矣。以至舉世皆云。病至危極之時。則陰陽反變。而無能辨別也。殊不知。但以運氣造化之理推之。則設若干變萬化。而歸其要。則一也。何得有難易之二耶。故經曰。夫標本之有道要而博小。而大。可以言一而知百病之害。經又曰。善言始者。必念於終。善言近者。必知其遠。是則至數而道不惑。所謂明矣。故老子曰。不窺牖見天道。不出戶見天下。其出彌遠。其知彌少。蓋知要與不知要也。古聖曰。反常合道。謂古聖天理大道合同。而常俗之心。則有相反者也。然古聖道不離於俗者。謂常合道。是謂變。以其取變於本化之相。而反見勝己之化也。變化之道。多端。此則微其外相之變化也。故仙經曰。大道似不肖。厚德若不足。即藏其本相於內。而反變化勝己之化於外。無相乃反行之變化。微則守常。而本化自見。乃有相之俗。是化以自見也。甚則反以勝己之化。乃無相而反常合於道者也。却以道眼觀之。則求其內也。若但以俗眼觀其外。則逐相而遷。何由得其要也。故聖經所論。天地變化與道合同。而俗無所慊。但隨俗見編集方論。有乖其理。祇合俗心。致使後人皆由說反。自以為是。而聖經之妙理。普然罔究。病者無章。竟罹橫夭。吁可痛者。且如經言陽勝則熱。陰勝則寒。俗直謂陽熱之氣勝。則發熱。陰寒之氣勝。則發寒者。皆經之本旨也。此言表裏之陰

陽正氣之虛實。言正氣勝者為不病而不勝者為病也。故經曰。陰勝則陽病。陽勝則陰病。陽勝則熱。陰勝則寒。是謂表陽之正氣為不病。裏陰之正氣衰而為受病也。裏陰之正氣勝為不病。表陽之正氣衰而為受病者也。此皆熱在表裏陰陽之部分者也。然病勝在裏為陽勝虛。虛病當發熱故發熱為病。熱在裏。陽勝陰虛下之則愈。汗之即死者是也。表熱裏和則病當惡寒。為陰勝陽虛汗之則愈。下之即死者是也。故熱在表為陰勝陽虛而言惡寒之寒則為寒也。熱在裏為陽勝陰虛而言發熱之熱則為熱也。故傷寒表熱則惡寒當汗。裏熱則發熱而當下之。又經曰。重寒則熱。重熱則寒者。非謂病寒而極重反變也。此重言當有兩重。惡寒則不惡寒而惡熱。謂表熱惡寒為一寒也。若裏之陽和正氣又出之於表。則又當有一重惡寒。是謂重寒則反不為寒而為發熱也。若表之正陽之氣與邪熱并入於裏。則為兩重發熱。則不發熱而後禁慄寒戰也。此反言陽和衛氣并之於表。陽分則病氣之勝為陽勝也。病氣與衛氣并其於裏之陰分。則為陰勝也。此亦表裏之陰陽正氣之與邪熱相併。而以言為虛實也。然邪熱在於表。則惡寒而熱與裏之衛氣并之於表。則反煩熱也。邪熱獨在於裏。則發熱而表之正氣與邪熱并之於裏。則反寒戰也。故經云陽虛則外寒。陰虛則內熱。此言不併者也。正氣虛而受邪熱。故言虛也。又曰陽勝則外熱。陰勝則內寒。此言併者也。夫表裏陰陽之分。受其邪熱之所。在其冲和正陽之衛氣。又為邪熱相并。而為病之所。正氣轉實而不虛。故經言勝也。○故經瘡論云。陽氣并於陰。當是之時。陽虛而陰實。外無氣。故先寒慄也。陰氣逆極。則後出之陽。陽氣後併於外。則陰虛而陽實。故先熱而渴。又曰併於陽則陽勝。並於陰則陰勝。陰勝則寒。陽勝則熱。是言表裏之陰陽。欬氣之虛實。非寒熱陰陽之虛實也。故經曰。病在陽則熱。而脉燥在陰則寒。而脉靜。然氣并於內。而外無氣。故寒戰脉不能燥。其而沉細欲絕。靜或不見也。○夫瘡者。邪熱與衛氣并。則作發。而不并則休止也。故經曰。衛氣相離。或病得休。衛氣集。則復病也。故又云陰虛而陽實。實則熱矣。良則氣復反入。入則寒矣。此故言表裏之陰

陽氣不并者為虛而并者為實。其為病之氣者乃熱之一也。俗未明之。直以經言陰勝則寒。不明其經意。以病熱而反惡寒戰慄。便為陰寒之病。誤之久矣。其陰寒之為病者。脉遲細不煩渴。小便清白。吐利腥穢。屈伸不便。厥逆禁固。體寒而不熱。不惡寒無戰慄者也。故經言人多病氣也。陽少陰多。故身寒如從水中出。又曰人有身寒。湯火不能熱。厚衣不能溫。不凍慄。此是陰寒為病而直云不凍慄寒冷也。夫陽動陰靜。故經云戰慄動搖為陽火熱氣以為病也。反寒冷者亢則害承。乃制是火熱極而反似寒水者也。故病寒戰者反渴。及雜病而害戰者。多有燥薑也。及夫平人冒寒而戰慄者。寒主閉藏而外冒於寒。則裏熱怫鬱。而表之陽和衛氣。以外寒逼入於裏。則陽并於陰而寒戰也。夫恐極而戰者。經言五志過極則勞傷。本藏久為腎。故經曰。恐傷腎。然腎傷而虛則腎火自甚而熱也。又經曰。恐則氣下。然陽生出行。舒榮故心火之志喜則身心放肆。而陰主收藏。故腎水之志恐則身心收斂也。夫恐則腎虛心實而熱。正氣收藏陷下於裏。亦是陽并於陰而寒戰也。夫酒噤而戰者。腸胃酒熱未散。身表酒力已消。則陽熱易為蓄熱入裏。故但冒於寒。則陽并於陰而寒戰也。夫欲汗而寒戰者。傷寒日深。表證罷畜。故於裏則發熱也。若表裏之正氣并入裏。則火熱無極而反寒戰也。陰分陽熱之氣逆極而後出之。陽則煩熱而大汗作也。

世所謂交陽者。非陰寒交熱以為陽熱也。乃怫熱畜之於裏。而鬱極迺發。則交傳出之於表之陽。分是謂交陽而後作汗也。或怫熱過極而不能交出於表者。是鬱極不發。否極不泰。即正氣衰竭。陰氣先絕。則陽氣後竭而死矣。夫欲汗而脉忽沉細。而或不見者。陽表正氣并入於裏故也。交陽而燥亂昏冒者。裏熱鬱極迺發而欲出。以怫鬱而陽之氣極不能出。故氣亂則神昏而燥擾也。○凡欲作汗無問病之微甚。或以經新下者。或下證未全者。恒以涼膈散調之。甚者宜黃連解毒湯。或下後二三日。或未經下。腹滿煩渴脉沉實而有下證者。三一承氣湯下之。勢惡者。加黃連解毒湯下之。或已戰不快者。或戰後汗出不快者。或微戰數次。經大戰而汗不出者。乃并之不甚。而病之不速也。通宜三

一承氣湯或更加黃連解毒湯下之以散怫熱而開鬱結也。○大法曰脉浮不可下傷寒病已有裏証脉沉之下裏証尚在脉漸浮至一二日汗不能出者裏証鬱發之不峻病已三乙承氣湯微下之凡此諸可下者或得利而汗使出者或服藥而怫鬱頃然開發先汗出而後利者或利性但隨汗出泄則氣和而愈更不利者說不快交不過而死者止由裏熱極甚而不能開發也故常以寒涼或下佛熱免致但以其作汗而為邪熱耗絕陰氣而死也或不戰而汗出者衆不能盡而陽不并陰也或戰而無汗而自愈者津液已衰以經發汗吐利或自汗吐利亡液過多則津液衰竭無由作津但氣和而愈也。

或不戰無汗而愈者陽不并陰則不戰津液已衰故無汗而已也。

世俗未知而直以惡寒戰慄名陽熱氣虛陰寒實勝因而為治誤人多矣

受汗

夫大汗將出者慎不可恨其煩熱而外用溫水及風涼制其熱也。

陽熱開發將欲作汗而出者若為外風涼水濕所薄則怫熱反入於裏而不能出泄病多危極而死矣。

亦不可恨其汗遲而厚衣壅覆欲令大汗快而早出也。

怫熱已甚而鬱極乃發其發之微則順甚則逆順則發易逆則發難病已怫熱作發而煩熱悶亂更以厚衣擁覆太過則陽熱暴然大甚陰氣轉衰而正氣不榮則無由開發即燥熱喘滿危而死矣。

汗後

雙解散 普解風寒暑濕饑飽勞逸憂愁思慮恚怒悲恐四時中外諸邪所傷億覺身熱頭疼拘倦強痛無間自汗無汗增寒發熱渴與不渴有甚傷寒疫癘汗病兩感風氣雜病一切舊病作發二日

裏外並宜服之。設若感之，勢甚本難解者。常服三兩日間亦無不可。並無所損。或裏熱極甚，腹滿實痛，煩渴，諸妄緩，喘急下者。以大承氣湯下之。三乙承氣湯亦妙也。○下後未愈，或證未全，或大汗前後逆氣，或汗後餘熱不解，或遺熱勞復，或感他人病氣，汗毒傳染，或中瘴氣，馬氣，羊氣，一切穢毒，并漆毒酒食一切藥毒，及墜墮打撲傷損，皮痛或久新風眩，頭疼，中風偏枯，破傷風，洗頭風，風癆病，或婦人產後諸疾。小兒驚風，積熱，瘡瘍，疹痘諸證，無問日數，但服之，周身中外，氣血宣通，病皆除愈。○
水散各一半
風通聖散加天

防風

川芎

當歸切焙芍藥

薄荷葉淨大黃

麻黃去根連翹

芒硝別研各石膏別研

桔梗各一兩

滑石十五兩

別研

白朮

山梔子

荆芥葉

甘草四兩

剉鹽

黃芩各一

右為末。每服五錢六錢水一大盞半，入葱白五十。薑豉五十粒，生姜三片，煎至一盞，濾汁去滓，溫服無時。日三四服，以効為度。常服三錢水一中盞，煎六分，絞汁溫服，不拘時，兼夜四服，設痊愈後，更宜常服，使病不再作。新病不生，並無過竟無問歲數，乃平人常服之仙藥也。凡人已衰老，則腎水真陰損虛，即風熱燥鬱，其精血涸竭，枯燥而死。但以此藥扶補滋潤者也。嗟夫，世俗反以妄傳中年以上火氣漸衰，止是虛冷，更無熟病，誤服熱毒之劑，害人無數，豈知識病之法全憑勝證以別寒熱，陰陽虛實，豈可以中年上下為則耶？此藥除孕婦及產後月事經水過多，并泄瀉者不宜服。或治雜病，亦宜治風熱極妙。一名通氣防風散，一名通解散。

傷寒傳染論

夫傷寒傳染之由者，由聞大汗穢毒，以致神狂氣亂，邪熱暴甚，於內作發於外而為病也。則如西山記曰：近穢氣而觸真氣，錢仲陽云：步履糞穢之處，無使近於嬰兒。若聞其氣，則令兒急驚風搖也。真人云：來馬遠行，至暮當沐浴更衣，然後方可近於嬰兒。使不聞馬汗氣毒，不然則多為天吊急驚風搖也。故利死馬者，感其毒氣而成馬氣，丁黃之疾，皆由聞其毒氣之所作也。故聖惠方一法，大汗

出則懸藥於戶。辟其大汗。機毒無使傷於人也。世以艾灸席隅者。皆其義也。多染親屬憂戚侍奉之人勞役者。由其神氣怯弱易為變亂故也。何以知傳染。脉不浮者是也。若誤以熱藥解表。不惟不解其病。反甚而危殆矣。其治之法。自汗宜以蒼朮白虎湯。無汗宜滑石涼膈散。熱散而愈。其不解者。適其表裏微甚。隨證治之。而與傷寒之法。皆無異也。

張介賓類經

十六本洋元

校正溫病條辨

四本洋角券

葉天士醫案存真

二本洋三角

喉科紫珍集

二本洋角

齊有堂醫案

六本洋角

吳氏痢症匯參

二本洋四角

雷少逸醫家四要

四本洋四角

新增疔瘡要訣

二本洋三角

陸亭圃冷廬醫話

四本洋六角

陳氏評批眼科銀海精微

二本洋四角

舒馳遠傷寒論

四本洋六角

校正女科輯要

二本洋三角

龐氏傷寒總病論

四本洋六角

校正外科輯要

二本洋三角

傷寒微旨論旅舍備要方合刻

一本洋一角券

全生指迷方

一本洋角

洪氏集驗方

二本洋四角

小兒藥症直訣

一本洋角

王孟英溫熱經緯

四本洋角券

周慎齋幼科指南

二本洋四角

千頃上堂書局出版廣路

傷寒標本心法類草卷上

河間劉守真編集

新安吳勉學校正

傷風

傷風之證。頭疼項強。肢節煩疼。或目痛。肌熱乾嘔。鼻塞。手足溫自汗出。惡風。其脈陽浮而緩。陰浮而弱。此為邪在表。已上傷風之證。皆宜桂枝湯。第二次以解明傷寒。汗出怕風而加項強痛者。桂枝葛根湯。第三傷風及無汗者。雖已服桂枝湯。反煩不解而無裏證者。先刺風池風府。却與桂枝葛根湯服之。不若通用雙解散五十一。免致有桂枝麻黃之誤。傷風自汗白虎湯。二十二。金匱方太陽病無汗而渴者。不可與白虎湯。

傷寒

傷寒之證。頭項病疼。腰脊強。身體拘急。惡寒不煩燥。無自汗。或致頭面目疼。肌熱。鼻乾。或胸滿而喘。手足指末微厥。脈浮數而緊者。邪在表。以上傷寒之證。皆宜麻黃湯。第一以發其汗。傷寒冒風頭目痛。四肢拘倦。比金散四十六。不若通用天水散四十九。或雙解散之類。五十一甚佳。無使藥不中病而益加害也。○白虎合涼膈散二十三。乃調理傷寒之上藥。傷風甚妙。

中暑

中暑之證。身熱頭痛。背寒而拘。目汗煩燥大渴。口乾倦怠而身不痛。或時惡寒。或是日氣脈虛而弱。無問表裏。通宜白虎。夏月感冒。發熱煩渴。五苓散二十四。桂枝甘露飲三十四。黃連香薷飲五十二。或雙解散。或裏熱甚。腹滿而脈沉可下者。大承氣湯下之。或三一承氣湯尤妙。半表半裏者。小柴胡涼膈天水散。

中濕

中濕之證。一身盡疼。重者發黃。關節煩疼。發熱。鼻塞時。或腹滿脹大便利。脈沉而緩。以上中濕之證。

傷寒標本

卷上

先用雙解散。微微汗之。次用五苓散或淡滲散。桂苓甘露飲。曾用甘露飲不愈。却用黃連解毒則愈。問曰。苦劑止土之甘。此屬土。故以火劑燥土。其病則愈。

風寒俱中

風寒俱中之證。頭痛項強。肢體疲。手足溫為中風。反無汗惡寒。脈浮緊為傷寒也。或頭項疼。腰脊強。身體拘急。指木微厥。不自汗為傷寒。反煩躁而脈緩者為傷風也。風則傷衛。寒則傷榮。榮衛俱傷。則表裏熱甚者。通宜以大青湯。或雙解散最妙。

内外傷寒

始得脈便沉。而裏病表和者。內傷也。脈浮而表病裏和者。外傷也。病在身體四肢為表病。病在胸腹之內為裏病。內傷通解散。外傷雙解散。內外一切所傷。通神散。然不若雙解散。以子和為之三法。至神。

一切汗候

風寒暑濕。飢飽勞逸。憂愁思慮。悲恐怒。四時中外諸邪所傷。但覺身熱頭疼。拘倦強痛。無問自汗。無汗。增寒發熱。渴與不渴。微甚。傷寒疫癟。汗病。兩感風氣雜病。一切舊病發作。三日裏外。並宜雙解散。設若感之勢甚。本難解者。常服雙解散。三兩日間亦漸可減。並無所損。或裏熱極甚。腹滿實痛。煩渴譁妄。須可下者。三一承氣湯為妙。或下後未愈。或下證未全。或大汗前後逆氣。或汗後餘熱不解。或遺熱復勞。或染他人病氣。汗毒傳染。或中瘴氣。羊氣。牛氣。一切穢毒。并漆毒酒毒食毒。一切藥毒。及墜墮打撲傷。損疼痛。或久患風眩頭疼。中風偏枯。破傷風。洗頭風。風癇病。或婦人產後諸疾。小兒驚風積熱瘡瘍疹痘。無問日數。但以雙解散服之。周身中外氣血宣通。病皆除愈。然雙解乃通仙之藥。但除孕婦及產後月經過多。并泄瀉者勿與服之。惟年老人最宜。自有造化於中矣。

傳染

凡傷寒疫癘之病。何以別。蓋脈不浮者傳矣也。設若以熱藥解表。不惟不解。其病反甚而危殆矣。其治之法。自汗宜以蒼朮白虎湯。無汗宜滑石涼膈散。散熱而愈。其不解者。迺其表裏微甚。隨證治之。而與傷寒之法皆無異也。雙解散益元散皆為神方。

表證

凡表證脈浮。身體肢節疼痛。惡風惡寒者可汗之不可下也。傷寒無汗。麻黃湯。傷風自汗。桂枝湯。一法不問風寒。通用雙解散。或天水散最妙。

裏證

凡裏證脈實而不浮。不惡寒及惡風。身不疼。自汗諱語。不大便。或咽乾腹滿者可下之不可汗也。以上之證。宜小承氣湯。大承氣湯。調胃承氣湯。選而用之一。法不問風寒暑濕。或表裏兩證俱不見。但無表證而有可下者。通用三一承氣湯下之。此藥發峻効。使無表熱入裏。而無結胸及痞之衆疾也。或熱結極深。而諸藥數下。畢竟不能利。不救成死者。大承氣湯加甘遂一錢七下之。病在裏。脈沉細者。無問風寒暑濕。或表裏證俱不見。或內外諸邪所傷。有汗無汗。心腹痛滿。諱妄煩燥。高熱內盛。但是脈沉者。宜三一承氣湯合解毒湯下之。解毒調胃承氣湯能瀉大熱。

表裏證

表裏俱見之證。或半表。或半在裏之證者。謂前表裏二證。病在相參。有欲汗之而有裏病。欲下之而表病未解。汗之不可。吐之又不可。法當和解。傷風白虎湯。傷寒中風。或兩感。小柴胡湯。一法不問風寒暑濕。用涼膈散。天水散。二藥合一服。用煎解之。或表熱多。裏熱少。天水一涼膈半。或裏熱多。表熱少。涼膈一天水半。表熱極。裏有微熱。身疼頭痛或眩。或嘔不可汗。吐下者。天水涼膈散合和解之。解之又不能退其熱者。用黃連解毒湯。表裏之熱俱微者。五苓散。表裏之熱俱盛者。大柴胡湯。微下之。更甚者。大柴胡合大承氣湯下之。雙除表裏之熱。服雙解散之後。若不解。病已傳變。後三日在裏法。

當下之殊不知下之太早。則表熱乘虛而入裏。遂成結胸虛痞懊憹發黃之證。輕者必危。危者必死。但宜平和之藥宣散其表。和解其裏。病勢或有汗而愈。或無汗氣和而愈。用小柴胡涼膈天水合和主之。病在半表半裏。用小柴胡涼膈散合和而解之。或小柴胡合解毒湯如服。熱勢未退者。大柴胡合三一承氣湯。表裏俱微。半表半裏。若裏微者。宜大柴胡合黃連解毒湯合服。諸小柴胡湯證。後病不解。表裏熱勢更甚。而心下急鬱微煩。或發熱汗出不解。心下痞。鞭。嘔吐不利。或陽明病多汗。或少陰病下利清水。心下痛而口乾。或太陰病腹滿而痛。或無表裏證。但發熱七八日。雖脈浮而數。而脈在肌肉實數而滑者。並宜大柴胡湯。病至七八日。裏熱已甚。表漸微。脈雖浮數。用三一承氣湯合解毒下之。下證未全不可下者。用白虎湯。或知母石膏湯。脈洪燥。裏有微熱。不可汗者。用黃連解毒湯。

汗後不解

凡是表證法當汗之。依法汗之。其病又不解。汗後不解。其證前後別無異證者。通宜涼膈散調之。以退其熱。無使熱甚危極也。除此之外。遠勝小柴胡湯。兩感至此而已。汗後餘熱。用益元散或小柴胡湯。宣武人參石膏湯。傷寒大發汗。汗出不解。反無汗。脈尚浮者。蒼木白虎湯解之。傷寒用桂枝湯。發後半日許復熱煩脈浮者。再宜桂枝湯。汗後不解。下證未全者。白虎湯。汗後煩燥不得眠。微熱而渴。五苓散。汗後不解。中外有熱。口乾煩渴。柴胡飲子。解表之後。尚未愈者。解毒涼膈天水散能調順陰陽。洗滌臟腑。

下後不解

凡是裏證法當下之。依法下之。其病又不解。或大下後。或再三下後。熱勢尚甚而不退。本氣虛損而不能實。擬更下之。恐下晚而立死。不下之則熱極而死。寒涼諸藥不能退其熱勢之甚者。或濕熱內餘。下利不止。熱不退者。或因大下後。濕熱利不止。而熱不退。脈弱氣虛。不可更下者。或諸濕熱內餘小便赤澁。大便溏泄。頻併少腹而急痛者。必欲作痢也。通宜黃連解毒湯以解之。傷寒下之太過。胃

中無熱飲水無力白朮散。又有大下之後。其熱不退。再三下之。熱愈甚。若下之不止。其人脈微氣虛。氣弱。不加以法。無可生之理。至此下之亦死。不下亦死。但用涼膈合解毒湯調之。陽熱退除。陰脈漸生。為之妙法。下之前後無間日數餘熱不解。小柴胡湯汗下後。胃虛大橘皮湯汗下後。胸膈滿悶。赤茯苓湯。

在上涌之

言病在膈者。當用瓜蒂散吐之。或表證罷邪熱入裏。結於胸中。煩滿而飢不能食。四肢微厥而脈乍急者。宜瓜蒂散吐之。傷寒頭痛久不愈。令人喪明。胸膈亦有宿痰故也。當先涌之。次以白虎湯加減。

在下泄之

言病畜熱下焦。則承氣抵當之類泄之而可也。

合病

三陽合病。腹滿身重。難以轉側。口燥而垢。譫語遺尿。如誤發汗。則譫語益甚。下之則便。厥額上汗出。後必發黃。白虎湯。

兩感

兩感。謂一日太陽少陰兩證俱見。二日陽明與太陰俱病。三日少陽與厥陰俱病。前六經之證是也。小柴胡湯涼膈散五苓散。天水散。通聖散。雙解散。大柴胡湯。可選用之。熱勢甚。欲可下者。三一承氣湯。或解毒合承氣湯。

痘病

痘之為病。發熱腹滿。口噤頭搖。瘡痏不語。項強背直。腰身反強。或目痛。或目赤。或閉。或反目。或足溫。或妄行其脉。沉弦而遲。或帶緊者。無汗曰剛痘。有汗曰柔痘。通宜三承氣湯合解毒下之。

頭疼

頭疼之證無問風寒暑濕雜病自汗頭疼俱宜白虎湯或加川芎荆芥尤妙頭疼久不愈必致喪明宜先涌痰次用白虎加減風眩痰迷喘嗽頭痛半夏茯苓湯頭痛肢體痺黃連解毒湯頭疼口乾桂枝甘露飲風痰喘嗽頭疼白虎半夏橘皮湯風熱頭疼心煩昏憤人參石膏湯傷寒壯熱頭疼不卧散

身疼

身疼之證無問風寒通解散表熱甚頭項肢體疼痛黃連解毒湯傷寒瘟疫遍身疼痛少力頭旋腰脚麻重嘔噦壯熱減食三一承氣減硝加貫眾紫河車入金銀煎名銀煎散中濕周身盡痛五苓散

腹脹滿痛

腹脹滿脈沉者以三一承氣湯合解毒下之諸腹滿實痛煩渴譖妄脈實數而沉者無問日數三一承氣湯少陽證腹中痛者小柴胡去黃芩加芍藥湯少陽證腸下痞鞕者小柴胡去棗子加牡蠣太陰證腹滿時痛桂枝加芍藥痛甚加桂枝大黃

往来寒熱

往来寒熱屬少陽一日二三作來往無期用小柴胡湯主之

潮熱

潮熱屬陽明一日一發日晡而作也陽明裏熱極甚或吐下後不解大便五六日至十餘日日晡潮熱心胸煩熱而懊惱如瘧狀脈沉實者三一承氣湯陽明少陽合病下利日晡發熱如瘧者大柴胡湯通宣三承氣合解毒

自汗

自汗者不發表解肌自出汗也傷風自汗也傷風自汗桂枝湯傷寒自汗脈沉數而實表裏俱熱者三陽合病自汗者厥逆自汗者頭疼自汗者傷寒自汗未解半入於裏者中暑自汗脈虛者俱宜白

虎湯傷寒。寢汗不止。白虎湯加麻黃根浮參。傷寒汗下後。自汗脈虛熱不已。白虎加人參。蒼朮服之。
汗止身涼。通仙之法也。

中暑自汗。白虎湯後。以滻滲湯調之。自汗多。宣武人參石膏湯。

自利并誤下

自利者。不經下藥攻裏而自利也。麻浮表不解自利。或小便不利者。五苓散。一切瀉痢間作。桂苓甘露飲。溫濕內甚而作痢者。黃連解毒湯。或自利清水色純青。心下痞痛口燥者。皆濕熱相搏於腸胃之內。而成下利者。三一承氣湯。當汗而反下。反不成結胸。而但下利清穀不化。表證在表。熱裏寒也。急以四逆湯。溫裏利止。裏和急以桂枝解表。或用巴豆熱藥下之。而協熱利不止。皆宜五苓散止利兼解表。

小便不利

小便不利者。小便難而赤澀也。中暑并傷寒。大發汗後。胃中乾煩燥不得眠。脈浮。小便不利。微熱煩渴者。口乾煩渴。小便不利者。小便赤澀。通宜五苓散。桂苓甘露飲主之。

嘔吐

凡嘔吐者。火性上炎。也無問表裏。通宜涼膈散。傷寒雜病。一切嘔吐。調胃承氣湯。煩悶乾嘔。黃連解毒湯。嘔煩渴者。桂苓甘露飲。五苓散。眩暈嘔者。白虎加半夏橘皮。傷寒嘔吐。四肢厥逆清冷。調胃散。濕溫內甚。惡心嘔吐者。白虎合解毒湯。

吐瀉

吐瀉者。上吐下瀉。亦名霍亂也。一切吐瀉霍亂。通宜五苓散。益元散。白朮散。吐瀉霍亂煩渴。升中外諸邪所傷而吐瀉。腹滿痛悶者。並皆桂苓甘露飲。淡滲湯。

喘嗽

大熱喘噯而滿者。黃連解毒湯或熟甚咳嗽悶亂。三一承氣湯少陽咳嗽者。小柴胡去人參大棗生薑加五味子乾薑。喘噯頭疼者。從今半夏湯。咳嗽者。白虎湯加半夏桔梗。咳嗽不已人參石膏湯。或宣武人參石膏湯。痰迷咳嗽半夏橘皮湯。汗之後氣悶咳嗽五味子湯。

渴

凡口乾煩渴者。傷寒汗出而渴者飲水反吐。名曰水逆。俱宜五苓散。少陰病二三日。口燥咽乾。三一承氣湯或裏熱燥甚。傷寒怫鬱。留飲不散。煩渴不止。則腹高起痛不忍。但嘔冷涎。大渴不能飲。飲亦不能止其渴。喘急悶亂。但欲死者。三一承氣湯。熱下咽立止其渴。有若無病之人。須臾大汗而愈。至此往往多有不利而汗出。亦有藥力。但隨汗之。宜通不利而愈。或汗吐下後。煩渴口乾脈浮。大白虎湯。加入參煩燥多渴涼膈散。加滑石。

煩燥

傷寒煩燥多渴涼膈散。加滑石中暑傷寒汗後煩燥。五苓散。一切火熱狂躁喘滿。黃連解毒湯。煩燥而渴。白木散。或加滑石。甚者加薑汁。

懊惱

虛煩

不得眠

懊惱煩心。反復顛倒。不得眼者。煩熱怫鬱於內。而氣不能宣通也。或胸滿結痛。或煩微汗出。虛煩者。梔子湯主之。或氣少者。加甘草一錢。或嘔者。及初懊以圓藥下者。加生薑半兩。凡懊惱虛煩者。皆用涼膈散甚佳。及宜湯灌手足。使心胸結熱宣散而已。心煩腹滿。坐卧不安。梔子厚朴湯主之。或陽明病下之後。燥熱而懊惱者。三一承氣湯。汗後煩燥不得眠。五苓散。或涼膈散。口燥呻吟錯語不得眠。五苓散。黃連解毒湯。煩心者。涼膈散。少陽證。胸中煩而不嘔者。小柴胡去半夏人參。加瓜萎實主之。

留飲

一切留飲不散。五苓散。桂苓甘露飲。黃連解毒湯。涼膈散。白虎湯。小陷胸湯。三一承氣湯。選用。傷寒

表未罷心下有水氣。乾嘔發熱而咳或嘔或利或噎。或小便不利。小腹滿或喘者。小青龍湯。

痞

傷寒表裏俱熱。下證未全。法當和解。誤下之。益則成痞。心下痞滿而不痛。按之虛軟者。痞脈浮而尚惡寒者。表未解也。當先桂枝解表。已而後用大黃黃連瀉心湯攻痞也。或只用五苓散使除表裏甚良。或痞惡寒而汗出者。或痞而煩小便不利者。或痞留飲濕熱下利者。或已成痞。因藥尚不止。以其痞滿誤更下之。其痞轉甚。嘔下利心煩躁者。無問痞脉浮沉。並宜生薑煎湯調下。五苓散頓服之。或痞不已。則後亦濕熱煩滿。或譙。舌脈沉無他症者。宜大黃黃連瀉心湯。或小陷胸湯亦可。下早成痞。橘梗散。

結胸

結胸之證有三。不按而痛者。名大結。按之而痛者。名小結胸。心下怔忡。頭汗出者。名水結胸也。汗下之後。不大便五六日。舌乾而渴。日晡少有潮熱。從心下至小腹。鞭滿而痛。不可近。而脈沉緊滑數。或但關脈沉緊者。宜大陷胸湯。或陷胸員下之。或脈浮者。表未罷也。不可下。下之則死。宜小陷胸湯。及小柴胡湯之類。和解之。表罷者方可下之。或結胸雖脈浮而裏熱勢惡。須可下者。宜三一承氣湯分作三次。約三時許服。訖得利甚。雖未稍減。脈必沉。病微者。止用三一承氣半服。按法而下之。裏熱甚者。以大陷胸湯大半服而下之。或但結胸。別無大股熱證。但頭微汗出。脈沉潛者。水結胸也。通宜大陷胸。小結胸心下按之而痛。脈浮而滑。別無大股熱證。及水結胸者。小陷胸湯。傷寒下之。太陽結胸。黃連解毒湯加枳殼。傷寒結胸虛症涼膈散加枳殼桔梗。或但自熱結胸者。其胸高起。腹雖不滿。而但喘急悶結譙。妄昏冒。關脈沉數而緊者。用大承氣湯加甘遂一錢七下之。表證罷熱入裏。結於寒熱。熱汗發作。有時頭痛。心下痞。鞕滿引脇下痛者。十棗湯結胸而發黃者。茵陳湯。陷胸湯各半服。

下之。協熱下利不止。更結胸發黃。茵陳湯五分。陷胸湯三分。大承氣湯二分。下之為佳。脈浮不可下者。小陷胸湯合小柴胡湯。

血證

太陽病日深。表證仍在。循經熱蓄於下焦。脈微而深。不結胸而發狂者。熱在下焦。小腹當鞭滿。小便自利也。血下而愈。宜攻之。或太陽病身黃。脈沉者。循經而畜熱下焦也。小腹鞭。小便不利。為無血。小便自利如狂者。瘀血證。或陽明畜熱內甚。而喜妄或狂。大便雖鞭而反易其色者。有畜血也。或無表裏證。但發熱日深。脈浮者。亦可下。或已下後。脈數。胃熱消穀善飢。數日不大便。有瘀血也。並宜抵當湯下之。傷寒有熱。小腹滿。小便自利者。為有血也。當下。未敢用湯。用抵當丸最為穩。當太陽病不解而蓄熱下焦。先以桂枝解表已。而下血。宜桃仁承氣湯。或抵當圓攻之。傷風汗下。不解。欬鬱經絡。隨氣湧泄為衄。或清道閉流。入胃脘。吐出清血。及鼻衄。吐血。不盡。餘血停留。以致面黃。大便黑。犀角地黃湯。發狂加黃芩大黃。

譖語

三一承氣湯合解毒湯。下之若傷寒過經。譖語以有熱也。當以湯下之。若利小便。大便當不醫。以圓藥下之。非其治也。若自利者。腹當膨。今反和。此為內實。調胃承氣湯。或涼

飲。不敢以致濕熱相搏而身體發黃。其候。但頭汗出身無汗。臍頭而體發黃。宜茵陳湯。調下五苓散。結胸而發黃者。茵陳同陷胸湯各半。下之。損陰氣。遂協熱利不止。更或結胸而發黃者。用茵陳湯五分。陷胸湯三分。感發黃者。用茵陳湯加黃連解毒湯。一服急下之。頭微汗。小便利而發微

黃者濕熱微也。施子藥皮湯發黃甚者茵陳合三一承氣湯。

發班

發班下證未全涼膈散未曾下。胃熱發班白虎湯加入參白朮陽明胃熱發班脈沉煩可下者三一承氣湯下之。傷寒胃熱發班涼膈散加滑石調五苓散甚妙。傷寒七八日發黃有班微熱腹滿者或痰實壅上雖諸承氣湯不過者仲景曰寸脈浮滑者可用瓜蒂散吐之。

發狂

傷寒發狂奔走罵詈不避親疎此陽有餘陰不足三一承氣湯加當歸薑棗名當歸承氣湯以利數行候微緩以三聖散吐之後用涼膈散洗心散黃連解毒湯調之。譖妄發狂踰垣上屋赴井投河皆為陽熱極甚用三一承氣合解毒下之。驚悸顛狂三一承氣湯發狂極甚投河入井者三下不過不可下攻便當涌之以瓜蒂散吐出痰涎宿物一掃而愈後以甘露飲之類調之。

發厥

凡熱病大汗將出而反寒戰者表之正氣與邪氣併甚於裏火熱亢極而反兼水化制之反為寒戰脈微欲絕者三一承氣湯或十棗湯下之。凡欲作汗無問病之微甚或已經新下者或下證未全者但以涼膈散調之甚者黃連解毒湯或下後二三日或未經下腹滿煩渴脈沉實而有裏證者三一承氣湯下之勢惡者加黃連解毒湯或戰不快者或戰後汗出不快者或戰數次經大戰而汗不當者乃拜之不甚而法之不違通宜三一承氣湯或更加黃連解毒湯下之以散怫熱而開鬱結也。

發厥

或表熱極甚而恐承氣不能退者或已下後而熱不退者或蓄熱內甚陽厥極深以陽氣怫鬱不能營運於身表四肢以致通身清冷痛甚不堪項背拘急目睛疼脣肢恍惚咽乾或痛躁渴虛汗嘔吐下利腹滿實痛煩冤悶亂喘急鄭聲脈雖疾數以其畜熱極深而脈道不利反致脈沉細而欲絕

俗未明其造化之理而反謂其傷寒極陰毒者或始得之陽熱暴甚而便有此證候者或兩感熱勢甚者適宜解毒加入承氣湯下之熱不退者宜再下之然雖古人云三下之而熱不退卽死矣亦有按法以下三五次利一二十行熱方退而得活者免致不下退其熱而必死也下後熱少退而未愈者黃連解毒湯調之或失下熱極以致身冷脈微而昏冒將死者若急下之殘陰暴絕而死蓋陽氣後竭而然也不下亦死宜涼膈散或黃連解毒湯或二藥合服或白虎合涼膈散養陰退陽積熱漸以宣散則心胸溫緩脈漸以生至於脈復有力方可以三一承氣湯下之或解毒加六一散調之愈後宜服退熱之藥已發熱諸物裏熱脈厥者宜白虎湯熱極厥深而諸藥下畢竟不能利者不救必死黃連解毒湯更加甘遂末一錢匕下之

循衣摸床

陽明病脈遲汗出不惡寒身重短氣狂語如見鬼狀劇者發則又識人循衣摸床惕而不安直視微喘三一承氣湯

勞復食復

汗下後勞復柴胡飲子飲酒復劇黃連解毒湯或雙解加黃連在裏者三一承氣湯在表者益元散或雙解散半表半裏大柴胡湯小柴胡湯涼膈散解毒湯隨證用之食復三一承氣湯

傷寒標本心法類萃卷下

河間劉守真編集

新安吳勉學校正

麻黃湯 一

麻黃六錢桂枝四錢甘草二錢杏仁七枚

右作二貼水二鍾煎八分取汁。麻黃性熱。惟冬及春癩病人素虛寒者乃用正方。夏至之後服之必發斑黃。須加知母半兩。石膏一兩。黃芩一分。桂枝加減月令同。

桂枝湯 二

桂枝芍藥各二半甘草一錢

右作一貼。薑三片。棗一枚。煎服取微汗。倍加芍藥名桂枝芍藥湯。加大黃名桂枝大黃湯。金匱方曰太陽病自汗而小便數者不可與桂枝湯。

桂枝葛根湯 三

桂枝芍藥甘草錢半生薑四錢大棗二枚葛根五錢

右作二服水煎取微汗。

葛根湯 四

葛根四兩麻黃三錢生薑三錢桂枝甘草芍藥各二錢一枝

右作二貼水煎服。衣覆取汗為度。

升麻葛根湯 五

升麻乾葛芍藥甘草錢三

右作二服水煎。若大便寒即熱服。若熱即溫服。身涼為度。

太青龍湯 六

麻黃

石膏各四錢半桂枝一錢甘草同上杏仁三枚

右作二貼

薑三片

棗一枚水煎取微汗不可太過恐亡陽以溫粉撲之

小青龍湯

七分

半夏六分

北五味二錢

麻黃

芍藥細辛

甘草

乾薑

桂枝八分

一錢

大柴胡湯

八分

柴胡三錢

黃芩一錢將軍七錢芍藥錢半半夏一錢枳實二錢

右作一貼

生薑五片棗一枚煎大柴胡合三一承氣湯合黃連解毒湯合大承氣湯

小柴胡湯

九分

柴胡八錢

黃芩

甘草

人參各三分半夏半錢

右五錢

生薑五片棗一枚煎溫服

一法本方合涼膈天水

一法本方合涼膈散

一法本方合解毒湯

一法本方去棗子加牡蠣

蠅一法本方去人參大棗生薑加五味子乾薑

一法本方去半夏人參加括裏實

大承氣湯

十分

大黃

芒硝錢二厚朴四錢枳實三分

右作一貼

水二鐘先煎厚朴芒硝次下大黃煎取八分去滓入硝煎一二沸放溫服

一法本方加甘遂末一錢匕

調胃承氣湯

十一分

大黃三

芒硝二

甘草半錢

右作一貼

水二鐘煎溫服

小承氣湯

十二

大黃三
厚朴一錢
半枳實一錢

右作一貼水二鍾煎溫服

三承氣湯

十三

大黃二
芒硝一錢厚朴錢半
枳實一錢甘草二錢

右作一貼水煎溫服

一法本方減硝加貫眾紫河車入金銀煎名銀煎散。一法本方加當歸藥名當歸承氣湯。

桃仁承氣湯

十四

桃仁去皮芒硝錢半大黃二錢桂枝

甘草各一
錢半

右作一貼水煎空心服

犀角地黃湯

十五

犀角白芍藥牡丹皮各五分生地黃四錢

右作一貼水煎有熱加黃芩一錢發狂血證加大黃本方無大黃血證內有

大陷胸湯

十六

大黃二錢芒硝半錢甘遂一分些小便是

右作一貼水煎溫服未快再服勢惡不利以意加之。

大陷胸湯

十七

大黃半兩芒硝二錢葶藶二錢炒杏仁一枚炒

右大黃末下葶藶杵羅研杏仁芒硝如泥圓如彈子大每服一丸入甘遂末三字白蜜半匙水一
鍾煎至半鍾溫服當一宿未利再服。

小陷胸湯

十八

半夏

黃連

括蒌實一枚四分用之二

右作一貼水煎溫服未利再服微利黃涎即愈

一法本方合小柴胡湯。

抵當湯

十九

水蛭

蟲蟲各七箇去足翅炒

杏仁十枚大黃二錢

右作二貼水煎再服

抵當圓

二十

水蛭

蟲蟲各七箇去足翅炒

杏仁七枚大黃二錢

右細末煉蜜作二圓用水二鐘煎一圓至六分溫服。時血未下再服。

黃連解毒湯

二十一

黃連

黃芩

梔子

每服五錢水煎溫服。

本方合大承氣湯。

一法本方加枳殼。

本方合三一承氣湯。

一法本方加甘遂末一錢七本

方合調胃承氣湯。

一法本方合涼膈天水散。

白虎湯

金匱方云太陽病無汗而渴者不可服。

知母

半兩

甘草

一兩

粳米一合石膏四兩

右五錢水煎溫服。

一法本方加蒼朮。

一法本方加半夏橘皮。

一法本方加甘遂末一錢七本

一法本方加半夏桔梗。

一法本方加蒼朮。

一法本方加半夏橘皮。

一法本方加甘遂末一錢七本

涼膈散 二十二

連翹一兩 黃芩半兩 梔子半兩 甘草半兩 朴硝一分 薄荷 大黃半兩
右五錢水煎入蜜少許。

一法本方合解毒湯。一法本方加滑石。一法本方加桔梗枳厥。一法本方合天水散。
一
法本方加滑石調五苓散。
金匱方云陽明病汗多而渴者不可服

五苓散

金匱方云陽明病汗多而渴者不可服

猪苓 伏苓

白朮錢各五桂心一分 澤瀉一兩

右或調或煎。

一法本方加生薑汁調服

澹滌湯即五苓合益元是也二十五

瓜蒂散細剉炒赤小豆等分又用茶少許 二十六

右為末豆豉半合水一錢半煮汁半錢調下一錢匕不吐加服。頭痛加鬱金。脇痛竭三聖散見吐門二十七

食前先食薑汁半錢後調藥服一半用鵝翎探引吐出如吐少更以熱薑汁投之不已用麝香煎湯服半錢立止。

梔子湯 二十八

大梔子七枚 豆豉半合

右以水煎梔子至一盞半入豆豉者至半盞溫服

梔子蘖皮湯 二十九

大梔子十五黃蘖半兩 甘草二錢

右咬咀水二鐘煎

梔子厚朴湯

三十

大梔子七枚厚朴半兩枳實二錢

右咬咀水煎

十棗湯

三十一

芫花 大戟 甘遂等分

右為末水一錢棗十枚劈開煮汁半錢調藥末半錢匕實者一錢七

茵陳湯

三十二

茵陳一兩大戟半兩梔子十枚

右五錢水煎

本方合膈胸湯 本方合大承氣湯 本方五分膈胸湯三分大承氣二分 本方合解毒湯

大黃連瀉心湯

三十三

大黃 黃連 黃芩等分

右五錢方煎

一法加生薑甚良

桂苓甘露飲卽五苓散加寒水石石膏三十四

右為末或溫湯或新水生薑湯調或煎

一方不用猪苓 一方加甘草 一方有人參藿香木香葛根滑石甘草共一十三味一名桂苓白术散

人參石膏湯

三十五

人參二錢白术半兩知母半兩黃芩三錢川芎半兩茯苓半兩半夏

山梔三錢甘草一錢

石膏三兩

右咬咀薑煎。

極宣武入參石膏湯 三十六

人參二錢 石膏一兩 川芎二兩 黃芩二錢 茯苓

防風錢三 甘草五錢

右五錢水煎。

半夏橘皮湯 三十七

半夏 陳皮

甘草 人參 茯苓

厚朴各二葛根半兩

右五錢薑五片。

茯苓半夏湯 三十八

茯苓 半夏

生薑各一錢 取汁索門蓋煎至四分綃

汁却下生薑汁服。

右水煎。

一方加黃芩甘草陳皮各一錢

大橘皮湯 三十九

陳皮

甘草各一兩 人參二兩

右五錢薑三片。

赤茯苓湯 四十

陳皮

甘草各一兩 人參二兩 半夏

白朮

川芎

赤茯苓各半兩

右五錢薑五片。

柏榔散 四十一

柏榔

枳殼等分

右為末三錢 黃連煎湯調下或黃連解毒湯調下或瀉心湯調下

白术散 四十二

白术

茯苓

人参

藿香各半兩

甘草

葛根各一木香二錢

右末白湯調下二錢熱加滑石或加生薑

四逆湯 四十三

甘草一錢

乾薑一分

附子 中者半箇

水煎溫服

五味子湯 四十四

五味子半兩

麥門冬

人參

杏仁

陳皮二錢

不卧散 四十五

川芎一兩

石膏半兩

藜蘆七錢

甘草半兩

人參

細辛各二錢半

右為末口噙水搐鼻少時飲白湯半碗汗出而解

一方無人參細辛

川芎湯 川芎

藁本

蒼朮等分

右為末湯調三錢須臾嘔汗便解

柴胡飲子

人參

甘草

大黃

當歸

芍藥

右剉五錢薑五片水煎 宣武加半夏五味子桔梗

劉庭瑞方 四十五

柴胡

甘草二兩黃芩

當歸

芍藥一兩參

半夏

大黃

大勞熱五七分以為度。

北金散 四十六

荆芥

麻黃

白芷

細辛

何首烏

菊花

防風

石膏

川芎

薄荷

全蝎

草烏

送

右為末各等分。每服一錢煎服或茶酒盃下。

調胃散 四十七

水銀

舶上硫黃

右研至黑。服一錢末飲下。重者二錢。

通神散 河間另有六神通解散於此加麻黃發汗最佳。和劑方中葱白散於此去黃芩滑石。加川芎

白木乾葛亦妙方也。

四十八

蒼术

石膏四兩 甘草

黃芩二兩 滑石六兩

益元散

卽天水散 四十九

滑石六兩

甘草一兩

右為末水調。或加蜜或葱豉湯調。一名天水散。一名六一散。
通聖散 五十一

防風

川芎

當歸

芍藥

大黃

薄荷

麻黃

石膏一兩

黃芩

桔梗各

一兩

滑石一兩

甘草二兩

荆芥

白朮

右剉五錢。薑五片水煎。

雙解散 五一

益元散

通聖散各半兩

右一兩薑芻豉水煎此藥雙解加減在通聖散

黃連香薷飲 五十二

香薷一兩厚朴半兩白扁豆二錢半
香連三錢

右剉五錢入酒少許水煎冷服

治腰脚骨骱痛不止 用歲靈仙煎酒食前溫服極妙

無憂丸 治一切食積氣積茶積酒積瀉痢氣壅腹脹膨悶肚腹疼痛

黑牽牛一斤取末 槟榔好者猪牙皂角二兩 三稜二兩 藥木二兩

紙燃香熟用好醋浸濕取切碎

右同前藥晒乾為末又用大角二兩煎湯打麪糊為丸每服二錢半白湯送下茶亦可。薑湯下。

太乙神鉢

羌活

黃連各四兩 腐乳香二錢 乳香二錢

獨活

黃連各四兩 腐乳香二錢 巴豆各等分

右用三月三日父四月八日亦可。晒乾打茸入前藥末和勻用好白紙卷包前藥如筋大治風痺或在腿或在腰在肱灸七炷二七炷三七炷甚效

治風蟲牙疼方

防風去蘆草烏取尖細辛去葉巴豆去殼油

右各味等分為細末擦牙痛處涎出立止切勿嚥下如食飲食以鹽湯灌漱飲無碍。神效追蟲取積感應丸廣大至道高七沈道宣傳

樟柳根莖半斤樟柳根皮半斤大黃半斤三棱四兩雷丸四兩苦練根皮八兩黑牽牛二斤半取頭

醋煮者使君子四兩未十兩為衣皂角菌陳藿香

自樟柳黑牽牛為末外用皂角等三味濃煎汁為丸如梧桐子大每服三錢重。

金刀如聖散 又名惡瘡方

茅山蒼木

六兩米泔
日一浸

白芷二兩

川烏四兩

防風四兩

細辛三兩

去皮淨

細辛三兩

白木五錢

草烏四兩

本方用兩頭尖無則用

川芎四兩 雄黃五兩 另研細末入藥

右件俱各生用 晒乾為末用度

一切金瘡及多年惡瘡用自己小便洗過帖藥立效破傷風緊急用好酒調藥半錢或一錢服之蛇傷入枯白礬少許調藥付之蝎蟹傷用吐服蓋之汗也如汗不出再服或涎出亦驗傷處付藥可

風狗咬傷處口噙水洗净將藥貼傷處

湯火傷燙者以新汲水調藥付之

雷頭風并乾濕癬麻痺每服半錢服之立效

蘆薈九

治小兒瘻疾疳瘍肚大腹脹面黃肌瘦脾胃不和驚積食積並皆治之

蘆薈

麥芽

胡黃連各一兩 黃連五錢 蘭夷

內豆蔻

木香

龍膽草各一錢

川練子五十箇

取肉三錢

蓬木鑊六錢 檳榔八錢 史君子散六十 陳皮

青皮鑊八錢

麝香一錢

神曲半

取肉一兩

乾蝦蟇

右為細末薄荷猪膽汁為丸粟米大每服一錢空心米湯下

無價寶一名壯陽丹專治五勞七傷四肢無力脚腿沉困骨節酸疼面目無光陽痿不起下元虛冷夢失精液服至十夜面目光滑二十夜老轉少年一月後陽道復原四十夜增進飲食至一百日萬病皆除冬不寒夏不熱鬚髮不白婦人服之強陰暖子宮陰陽有益最有功效

川練子二兩

牛膝酒浸橘榔

一兩

兔絲子一兩

另研

酒浸蛇床子一兩

乾薑五錢

穿山甲一大片

蓮肉

一兩 不

乳香三錢

另研沉香五錢

白檀香

另研鹿茸

一兩 巴戟

一兩 大茴香

一兩 仙靈皮

三錢 破故

紙五錢

鳳眼草三錢

另研

葫蘆巴五錢

人參一兩

澤鴻一兩

山藥一兩

五味子一兩

熟地黃二兩

麥芽

門冬

白從容

茯苓

白芍藥五錢
一兩各

右二十七味除乳香沉香白檀香免絲子四味另研為細末其餘二十三味各搗爛為細末同前四味煉蜜為劑同搗一二百千杵丸如梧桐子大每服三十九增至十九丸好酒送下以乾物壓之修合之日再加丁香一錢

膏藥方

和尚傳

黃杏三斤麻油半斤穿山甲

白芨

二味各少許做點藥華麻粒研細

定子藥

白礬

一兩火煅同信一處

信五錢乳香二錢沒藥二錢辰砂五分

生肌散

龍骨

火煅

赤石脂

火煅名

乳香半兩

沒藥

海螵蛸

輕粉

全蝎

洗焙乾

血竭

二錢

黃丹

一錢

右為末待瘡頭落盡此藥填滿在瘡口上以膏藥貼之一日甘草湯洗二次膏藥一二日一換追風託裏散

甘草

桔梗

當歸

芍藥

白芷

防風

川芎

官桂

瓜蔞仁

每服水酒共二鍾煎至一鍾空心服

象牙丸

金銀花

桔梗

當歸

芍藥

白芷

防風

川芎

官桂

瓜蔞仁

象牙五錢蜂房三錢蟬蛻三錢木香三錢沒藥一錢乳香三錢全蝎一錢僵蠍三錢先將黃蠟半斤化開待黑色過却將前藥為細末入蠟內攪勻傾入水內取出冷定為丸如棗大

每服空心一丸。滾酒化開。連三日三服。待藥從漏痕出。隔三日再一服。第五日再服一丸。後下定于藥。

傷寒用藥加減賦

萬物之生也。人之最靈。四時有變兮。百疾兆生。欲辨陰陽之證。必明天地之情。稽寒溫表裏之疑。式明標本施汗下補吐之法。溥濟羣生。始而毫毛。次傳膚腠。惡風自汗。乃桂枝之證。喘熱惡寒。則麻黃之候。陰陽俱虛。而身必痒。各半同功用。大黃代寒熱共作。而脈尚虛。一二共湊桂枝麻黃各一。於是助以薑棗。雜以豉葱。使利惡風者乾薑。心悸腹痛者建中。脈熱極而煩者入人參於白虎。脈煩盛而喘者。加杏子以青龍。恍惚下痢而陰虛。朱雀取效。頭眩肉瞤而水泄。玄武當功。致使桔梗寬咽。甘草平肝。腹內脹滿兮厚朴薑。心中懊憹兮梔子豉。小便不利。則投之以猪苓。膈間有痰。則吐之以瓜蒂。或乃熱作而腹脹脹滿。又若狂妄而潮熱發憇。或裏以入而表未除。或小便澀而大便秘。必明大小柴胡。直敍前後承氣結胸。多渴祝侍者。議任陷胸。譴語發狂。委將軍卽大黃功。先調胃。當知青龍十乘兮。水有表裏三黃。四逆兮。利有寒溫下利者。甘草煩躁者。茯苓。苓。四逆湯。脈絕用當歸。當歸四逆湯。治濕證亡血。須人參。四逆加人參。汗出加附子。附子瀉心湯。惡風入黃芩。黃芩瀉心湯。臍下有水則生薑。生薑瀉心湯。心中嘔逆則人參。人參瀉心湯。上四者同歸於四逆。下四者乃同於瀉心。溫寒而結積。薑三白之功效。生津液而逐水道。加五苓之最深。吐血則黃耆宜服。便脹則桃仁可加黃疸。茵陳必求之瓜蒂。先瓜蒂後茵陳。班毒紫雪。當宜用於升麻。先升麻後紫雪。溫濕之土桂附蒼术可入。就中之內附子宜加。此外若青龍血柴胡有加減之餘。議身有餘熱者桂枝。肠下硬滿者大黃可陪。多汗者附子加小柴胡。奔豚者桂枝加桂喘者小青龍加杏仁。微者小柴胡加五味。瓜蒂治煩渴。未除茯苓醫小便不利。內寒者茱萸外腫者防己。生薑止嘔。半夏療噦。用枳殼兮緣。酒毒留胸有黃蘖兮。因衄血出鼻。或得人參以除煩。或取茯苓而愈。悸頭疼如破。葱白連鬚咳逆欲絕。乾柿併蒂。

傷寒標本

卷下

七

下利則乾薑身痛則施政。豈二方之獨用亦衆藥之同推妙哉。吾今精此四十餘年活人之功。嘗識

附河間傷寒心要

都梁錦 洪編集

新安吳勉學校正

傷寒心要論

夫傷寒者前三日在表法當汗可用雙解散連進數服必愈若不解者病已傳變後三日在裏法當下殊不知下之太早則表未虛入裏遂成結胸虛痞懊濃斑疹發黃之證輕者必危者必死但當以平和之藥宣散其表和解其裏病勢或有汗而未愈或無汗而愈當用二小柴胡涼膈天水三藥合而服之

病若半在表半在裏法亦當和解三小柴胡涼膈主之

若裏熱微者則當微下四大柴胡合解毒湯主之熱勢未退又以大柴胡合三一承氣下之兩除表裏之熱病至七八日裏證已甚表熱漸微脈雖浮數則以三一承氣合解毒下之

其病胸膈滿悶或喘或嘔陽脈緊甚者可用瓜蒌散涌之

汗吐下三法之後別無異證者涼膈散調之

大熱已去微熱者以益元散服之無令再病此傷寒治法之大要也

或傷風自汗脈浮緩者十雙解去麻黃以汗之

其病半表半裏十一白虎湯和解之

病在裏脈沉細者無問風寒暑濕或表裏證俱不已

或內外諸邪所傷有汗無汗心腹痛滿譫語煩

躁畜熱內盛但是脈沉者並用十二承氣合解毒下之

或中暑自汗解以白虎湯

直格云夏至前為濕夏至後為暑是以至後立秋後不用白虎子和云若有白虎證亦不用乎却用詳審之耳

白虎解後以五苓合天水調之多進數服無妨

或腹脹滿脈沉者亦當承氣合解毒微下之

傷寒心要

或發汗之後熱不解。脈尚浮者。十六白虎加蒼朮再解之。

或裏熱內盛。陽厥極深。皆因失下而成此證。以致身冷。脈微。昏懵將死。切不得以寒藥下之。誤下即死。又一輩庸醫妄言是陰厥。便欲易換用玄武四逆溫熱之劑。投之下咽立死。殊不知此證乃陰耗陽竭。陰氣極弱謂之耗。陽厥極深謂之渴。當熱。怫鬱將欲絕者。凡此之證。寒劑熱劑俱不可投。但進涼膈解毒。十七以養陰退陽。宣散畜熱。脈氣漸生。得大汗而愈。使汗氣和而愈者。未愈却解毒合承氣。十八下之。次以解毒涼膈天水合而為一。十九調和陰陽。洗滌臟腑。則其他證自不生矣。

有大下之後。熱不退。再三下之。熱愈盛。若下之不愈。脈微氣虛力弱。不加以法。則無可生之理。若輒而不下。則邪熱極盛。陰氣極衰。脈息斷絕。必不可救。似此之證。是下之亦死。不下亦死。醫者到此。活人殺人一彈指間。其不至手足失措者幾希矣。直格云。傷寒汗後。汗出不解。或反不汗。脈尚浮。白虎不已。白虎加蒼朮。參一服。如神。汗止。身涼。此通仙之法也。如此則汗下之後。不復有汗無汗。通宜白虎加蒼朮。解之。又如人參妙。仍服涼膈解毒調之。經云三下而熱不退者。卽死。後人有四五次下。以十數行而生者。此乃誤中耳。活者未一二死者乎。百後學切不可以為法。但當依前用解毒合涼膈調之。使陽熱徐退。陰脈漸生。庶不失命。若傷飲不解散。成結胸之證。臨時擇用二十大小陷胸湯九累下之。脈浮者不可下。是表證未出。小柴胡合小陷胸湯。二十一投之脈雖浮而熱太極者。二十二承氣徐徐疎利之。或有留飲過度。濕熱內生。自利小便。濕熱未退。以解毒湯治之。

陽證生班。二十四涼膈加當歸。

煩心不得卧。二十七梔子湯。

怫鬱熱盛在表。燥而無汗。濕熱在裏。不能發於外。相搏遂成發黃。二十五茵陳湯調五苓散。

二

誤下太早遂成結胸虛痞。二十八涼膈加枳殼桔梗剛柔二症譖語發狂踰垣赴井。皆陽熱極盛者
二十九承氣合解毒下之。
汗下之後煩渴飲水則三十涼膈減桂五苓甘露並元選而用之。小便不通五苓泄之。大便閉結承
氣下之更有外證加減通聖散方內隨證用藥。
婦人證治皆然。惟孕婦三四月并七八月不用硝。其餘月分用之無妨。
小兒減劑服之。

此中有古人治傷寒不傳之妙。後之學者其慎寶之。

第二雙解散

防風通聖散

防風去蘆川芎

當歸

焙

赤芍藥

大黃

麻黃

連翹

芒硝

半兩

石膏

黃芩

去腐

桔梗

一兩

甘草

二兩

滑石

三兩

荆芥

白朮

施子

二錢

半錢

右為散每服三錢水一盞薑三片煎六分溫服。大黃芒硝麻黃三味對證旋入自利去大黃芒硝。

自汗去麻黃。

天水散 益元 六一

滑石

六兩

甘草

一兩

右為末每服三錢溫蜜水調。暑月冷水亦可和解。傷寒傷風發汗葱白五寸。豆豉五十粒煎一盞。調四五錢并二服解利為度。加薄荷尤妙。
通賜合益元。

右七兩和勻每服三錢水一盞半葱白五寸豆豉五十粒煎一盞溫服。

第二小柴胡涼膈天水合服

傷寒心要

小柴胡湯

北柴胡三兩

黃芩 人參 半夏 生薑 甘草 大棗一兩

右為散每服五錢

涼膈散

連翹二兩 桃子

大黃 薄荷

黃芩一兩 甘草

芒硝

右為散母服三錢水一盞煎七分入蜜少許竹葉五片

第三涼膈合小柴胡

第四大柴胡合黃連解毒湯

大柴胡湯

柴胡去苗 大黃半兩 黃芩

白芍藥一分

半夏泡七次

二錢 松實生三錢

右為散分三服水一盞半生薑三片大棗一枚煎半錢溫服

黃連解毒湯

黃連 黃芩 桃子等分

右為散每服一兩水一盞煎五分溫服

第五大柴胡合三一承氣湯

三一承氣湯

大黃

芒硝

厚朴

枳實各半
兩 甘草一兩

右剉每服一錢半水一大盞量三序煎六分入硝再煎一二沸

第六承氣合解毒湯

第七分帝散

瓜蒂

赤小豆等分

右為木豆豉湯調下一錢未吐再服

第十八涼膈散

第九益元散

風

第十雙解散

第十一白虎湯

知母兩半
甘草一兩
粳米一合
石膏四兩

右剉每服五錢水一盞煎六分溫服

第十二承氣合解毒湯

暑

第十三白虎湯

第十四芩散合天水散

五苓散

猪苓

茯苓三錢
去皮官桂一分澤瀉一兩白朮一錢
活人書三分宣明論半錢

第十五承氣合解毒湯

第十六白虎湯加蒼朮

第十七涼膈合解毒湯

第十八解毒合承氣湯

傷寒心要

三

第十九解毒涼膈天水合

結胸

第二十大小陷胸湯丸

大陷胸湯

大黃

芒硝三錢甘遂三字七

右剉四錢水一煎。大黃六分內消。再煎一二沸內甘遂溫服。未利再與。

小陷胸湯

半夏

四錢生薑切

黃連二錢

括婁實半個全蠅

右剉水三盞煎。括婁至盞半內藥煎至一盞。分作兩服。

大陷胸丸

大黃

半兩。蓼蕘二錢微炒

芒硝一錢杏仁十二枚去皮尖

右大黃為末。研蓼蕘杏仁為膏。圓如彈子大。甘草末三字。蜜半匙。水一煎半煎。溫服一丸。一宿

若下未利。再與。

第二十一小柴胡合小陷胸湯

第二十二承氣湯

大黃

綿紋芒硝朴硝有芒頭者厚朴去

枳實各半

右剉如麻豆大。分一半。用水一碗。一生薑兩三片。煎至六分。納硝煎一二沸。絞去滓。熱服。

第二十三解毒湯

發斑

第二十四涼膈散加當歸

發黃

第二十五茵陳湯調五苓散

茵陳湯

茵陳一兩大黃半兩梔子十枚

右剉水二盞煎一盞溫服利為度

第二十六茵陳合承氣

煩心不腫

第二十七梔子豉湯

梔子七箇豆豉二合

右水二盞先煮梔子盞半內豉水半盞

第二十八五苓空腸煎涼膈加桔梗枳殼

剛柔二症

第二十九承氣合解毒湯

汗後煩渴

第三十涼膈減桂五苓甘露益元散

甘露散

茯苓澤瀉

石膏寒水石二兩白朮

桂枝

猪苓半兩滑石四兩

右為末每服三錢湯調或新汲水薑湯尤妙

右共十八方如無大承氣係第五三一承氣代之亦妙通三十九件藥味調理傷寒曲盡其妙。百發百中後之學者詳辨脈證審而用之起沉疴於指掌策奇功以活人方知其妙也。

新增病後四方

小半夏湯治汗下後嘔吐不已。

半夏五兩赤茯苓三兩

右剉每服半兩水二盞煎至一盞半薑汁更煎一二沸
五味子湯治汗下後氣閉咳嗽。

五味子半兩

人參

杏仁

陳皮

生薑

一錢棗子二枚

右剉每服二錢水二碗煎一碗作二服。

大橘皮湯治汗後胃虛。

陳皮

甘草一兩人參二兩

右剉每五錢水盞半薑二片煎至一盞溫服。

赤茯苓湯治胸膈滿悶頭痛已得汗者。

陳皮

人參

半夏

川芎

白朮等分

右剉每服五錢水盞半薑三片煎一盞溫服。

傷寒心要餘論

五臟六腑應五運六氣。凡病微則當其本化甚則兼其鬼賊之化亢則害承乃制微則是其本經本臟之本化造化之化也。病甚則如金衰不能制木木則生火木火者皆陽也。故風火多兼化則風熱相搏賊其金也。臍脈之氣應乎三陰三陽實則行乎本化之氣濁之衰則行其勝己之氣濁之是為殺其鬼賊也。如諸陽蓄熱以涼膈合解毒服之解散極熱。如濁火熱解毒調胃承氣是也。

如吐法用二仙散

如調理傷寒白虎涼膈合服解之

傷寒三日以裏連進雙解。如無汗必是傳變。待三四日之間以小柴胡解表裏之熱。仍間服白虎涼膈。蘊熱七八日之間欲下而表證猶在。以大承氣湯大柴胡湯雙行。并煎攻裏發表最為穩當。若是溫熱內甚。自利者止涼膈却進解毒問白虎服之。或惡心乾嘔吐者。白虎大作一劑。調解毒木五錢。服之即止。大小便不通。併有腹痛不能忍者。以無灰酒煎朴硝三兩。熱服即愈。亦按從治之法也。熱中伏寒下之矣。或大承氣湯加木香鴻之尤妙。

傷寒失下。始病時又誤服麻黃熱劑大甚。致熱極。或有陽厥極深。身冷脈微。陽極似陰之證。庸醫以為陰證是也。須當急救其陰。以白虎涼膈日進三服。脈氣漸生。身體漸溫。然後以大承氣下之。夫大承氣救急之妙劑。如咽喉吐逆不利。當令熱服。開其鬱結。利而即愈也。

如傷寒汗下之後。自汗虛熱不止。於白虎湯加人參。蒼朮。一服如神。汗止身涼。此法至妙。不容詳盡。如赤白痢。先服黃連阿膠九次。服解毒湯。

傷寒瘡瘍破傷風與傷寒治法一同。但以雙解湯與白虎承氣臨時斟酌用之。雙解涼膈白虎鴻心物。乃鴻中之有補也。

此理傷寒之妙劑。涼膈同四物名玉燭散。婦人產後之妙劑。

涼膈四物合大承氣湯。名三和湯。

孕婦臨月可服。益元涼胎產後仍服。如血不盡。則以涼膈與四物合煎。調理經血。甚者大承氣合四物。乃鴻中之有補也。

元散時時灌之。如小兒夜啼。用涼膈調之。肚飢臨睡服。

傷寒心要

凡瘡瘍癰癧涼膈加當歸治之

附張子和心鏡別集

鎮陽常德編集

新安吳勉學校正

傷寒

傷寒論雙解散

守真制雙解散。通聖益元各七八分。入生薑葱白煎。解傷寒三二日間。以其初覺亦傷寒疑似之間。解表恐傷於內。然攻裏恐傷於表。故制雙解。以其表裏齊見俱解。甚為得法。然間有不解。猶未盡善也。子和增作法。亦用前藥煎一椀。令飲其半。探引出風痰。次服一半。仍用酸辣湯投下。使近火衣被覆蓋。汗出則解。八九分矣。此法子和得之規繩之。入世所未知也。

論發汗

世人只知桂枝麻黃發汗。獨不知涼藥能汗。大有盡善者。熱藥汗不出者。反益病。涼藥發之。百無一損。素問云。辛甘發散為陽。白粥配葱食之。便能發汗。益元加薄荷亦能發汗。承氣用薑棗煎以辛甘發散之意。守真雙解散。子和演為吐法。豈非涼藥亦能發汗也。

論攻裏

攻裏之藥。當用寒涼。世人畏之。是不知藥隨病而俱出。何曾留於中乎。桂枝下咽。陽盛則薨。承氣入胃。陰盛乃亡。此語惑人久矣。鮮有解者。因有知幾窮理。偶於守真醫書註中。稍見其意。此陽實陰實。陽實發散。陰實宣泄不同。實謂不受病也。陰實本不受病。何用承氣宣泄反之。則有斃亡之失也。此二句。蓋謂傷寒之設也。

論攻裏發表

素問云。攻裏不遠寒。發表不遠熱。啟玄子云。世人直疑攻裏合用寒藥。發表合用熱藥。似是而非也。蓋攻裏不遠寒。是不遠司氣之寒。雖嚴凝盛寒之際。若合攻。裏不可畏天寒。而不用寒藥。發表不遠

熱者是不遠司氣之熱雖流金燭石炎蒸盛暑合用發表之藥不可畏暑而不用熱藥此不遠寒熱之理也

擣衣撮空何臟所主

擣衣撮空許學士說作肝熱風淫未疾故手為擣衣摸空此論雖當莫若斷之為肺熱以為愈矣其人必讞語妄言經曰肺熱必為讞語兼上焦有病肺必主之手經者上焦也二者皆當其理果何如哉天地為體用肺為體肝為用也肝主諸血者陰物也此靜體何以自動蓋肺主氣氣所鼓舞故靜得動一說肝之用者一說肺之用者此天地至為體用二者俱為當也是知用臟血自寅至申行陽二十五度諸陽用事氣為肝所使肺主氣自申至辰行陰二十五度諸陰用事肺為所用

傷寒口傳足經不傳手經論

傷寒口傳足六經仲景本論無說古今亦無言者惟龐安常謂主生故太陽水傳足太陰土土傳足少陰水水傳足厥陰水為賊邪蓋牽強穿鑿胡不觀內經陰陽雜合論云太陽根於至陰名陰中之陽少陽根起於竅陰名陰中之少陽太陰根起於隱白名曰陰中之太陰少陰根起於湧泉名陰中之少陰厥陰根起於大敦名曰陰中之厥陰其次序正與此合太抵傷寒始因中風得之於陰是以正傳足經者陰中之陽陽中之陰也又以六氣者之厥陰為初之氣少陰為二之氣太陰為三之氣少陽為四之氣陽明為五之氣太陽為終之氣此順也逆而言之正與此合緣傷寒為病逆而非順也

亢則害承乃制

假令水為母木為子當春旺之時冬令猶在即水亢也水既亢極則木令不至矣木者繼久而承水也水既亢則害其所承矣所以木無權則無所制土土所旺則水受制噫夫人必自侮然後人侮之旨哉木黃春之令也水受土制熱免其寒變而為濕也

育哉木黃春之令也水受土制熱就其大度、寢而為溫

L783l

1909

v.8