


西藥畧釋

卷三

3

B. Chinese:

Vol III



補藥論

夫能令胃消化及能令腦與肌肉生力者，卽謂之補劑。顧補劑不一，亦宜分晰。其助胃消化而令生血者，如服黃連、瓜沙及龍膽草等藥是也。其入血養腦而能助腦發力者，如服金雞砂霜及桂拏、先高拏等劑是也。其入血而能助血變赤及助肌肉生力者，如服鐵劑等類是也。然而補藥之宜服，正不僅有此妙用也。舉凡士農工商勤勞過度而致胃弱，身則虛，皆宜服也。卽推之婦人月經過多，白帶過多，及瘡疥流膿過多而致面則白辱，則亦宜服也。惟補藥則由漸獲效，非若吐瀉等劑隨服隨應耳。且補身之道，雖藉藥力，然或擇醫不精，信醫不專，亦終

無濟此所以得良醫而能篤信亦卽補身之一道也。至醫士務宜品學兼優技則熟而心則細彼病者方能以身命相託誠以醫道所關甚重不容不慎也。他如身熱及內腑有炎此則雖應服補劑亦不宜驟服蓋必先清後補庶得妥適。且補劑雖能補胃益身然使過服久服則或令胃難消化而身體亦將四而轉弱此又不可不知也。

鐵劑總論

用金類作補藥當以此劑爲上品蓋世上有多少種

動植之物內面有鐵卽人血亦然此醫者所爲設鐵劑也 功用補而斂能開胃助消化服之可令血多而紅 凡血弱血少者宜服 或瀉大便過多或癰疽潰膿過多宜服 婦人胃不消化面白唇青係因癰癰白帶而致者宜服 小兒骨軟係由鼻內牙內流血過多所致者宜服 服此藥忌空腹飯後服之可也 大抵乍服鐵劑不甚見驗惟連服數旬或數月方獲功效 鐵劑服後翌日糞色必黑若服至十餘日而覺大便艱澀即宜暫停惟俟糞色如常方可再服 且服鐵劑而致大便乾結宜兼服輕瀉藥誠以瀉藥亦能助鐵入血而有以補之也

鐵散 製法 以鐵锈入筒火煅至紅而卽以輕氣過之令其
食出養氣自可成爲純鐵但此物亦無甚功用究不如服鐵劑
妙

鐵養溼散

此散本函有水

製法

鐵養礮養水

四安土量

銻炭養水

三十三安土量

清水

二十安土量

先將鐵養礮養水與清水相和然後以銻炭養水加入少
頃則用布濾去該水而所濁之溼散復以清水漂洗漂至
濾出之水以銀絲投入而不能結鹽爲度此散須帶溼
入罐不必弄乾誠以散之乾者每百分亦必函水十八分
也

功用 能作補劑 服法 每服一分至二分

但醫家亦鮮用

雜治通用

誤服信石用此救之甚驗緣該散一經入腹卽能與信石相合而結爲水不能溶之鹽也但此藥新製者方能解

信石之毒若稍舊便不堪用

鐵礦散

卽鐵紅散

製法

用鐵礦

俗名青礦

及鏽炭

俗名青礦

養水化和勻將

見墮底者卽此散也

形色

新製者色青黑少頃卽吸養氣

變爲紅色

氣味

味澀無臭

溶化

水不能化

服法

作補藥每服八釐至四分每日三服凡身弱血虛者服之宜

方劑 一方 婦人閉經孱弱而致面青唇白者宜服

鐵紅散

一分二釐

衣單格

二釐

汞石散

三釐

和勻作一服，每日二服，或間服鴉囉瀉藥少許亦妙。但此症須連服二十餘日，亦見效驗。

方論　或面上半邊腦筋痛係由身虛血弱而致者，每服一錢，每六點鐘一服，但須以漸加多服至獲效爲度。其在小兒七八歲者，每服五分，每日四五服。血少心跳，每服一二錢，每日二三服。或婦人陰戶潛流惡水，或小孩麻痘後而耳出膿，每次服五分，每日三服，均妙。

鐵炭養糖散

製法

鐵礦養二兩
六錢 輻淡炭養一兩

各以沸水四角溶化，然後將兩水和勻，急急攪之，隨卽凝固，俟

過十二時將水倒去而所曠之粉再用沸水八觔攪勻俟其凝
定又復倒去該水而後將粉入袋用法壓去餘水壓畢取出加
入白糖八錢和勻研幼慢火焙乾用樽貯密又法用鐵炭
養糖散八錢玫瑰花膏二錢和勻作丸功同鐵劑

主治 身虛血弱 服法 每服一分至五分每日二三服

淨鑷石粉

製法

雙鐵礦養水

五安半量

鐵礦養

兩安土量

鉬炭養水

六十四安土量

清水

足用

先用清水

三十二安十量

次將鐵礦養

兩安土量

放入清

水內俟溶化再加雙鐵礦養水後將鉬炭養水和勻浸滾
約兩點鐘時時攪之隔以綿花布再過水至加入銀綠此

水不見起烟爲度用火焙乾火之熱一
百二十度即此藥也

形色

此散棕黑色用磁石試之可吸起此磁石係鐵養極
猛烈在出所生者同

功用

同鐵養散 藥法 每服入釐半至一分七釐

青礬

卽鐵
礬養

製法

以淡礦強水化鐵碎俟化盡煎去水自可凝珠然此猶未淨也惟將該珠再用水化瀘隔加入礦強水少許同煎俟其再復結珠庶得純淨

形色

綠豔

味澀

溶化

水能溶若經煅則本體之水可

化已質

功用

補斂爲鐵劑之上品凡血弱身虛者宜服

服法

每服此珠二釐至八釐若用枯者一釐至三釐

水化服或
劑量各均

宣尼

但此藥不宜過服多服否則未免腹痛作嘔或至壞身

血少面白者宜合龍膽草膏及鴉囉硫磺等藥作丸服之甚驗或以青礬水化並加些礞強水同服均妙

方剗 一方 身弱血少心跳婦人月經不行等症

青礬

二釐一分

鴉囉

二釐一分

玉桂末

二釐三分

以水和勻作丸

八粒每日飭後服二粒

一方 瘟疾之後脾或發脹服之效

青礬

五分

清笠散

一錢

大黃散

一錢

鉢葡萄酸散

一錢

加林呻散

一錢如無此藥不用亦可

共研勻作散分十包每日早晚

服一包至瀉爲度若猶未瀉則每日須多服二次

鐵火燐養

製法

鐵礦養四兩

鎬燐養四兩

汽水一百二十
八安士量

卽將汽水分作兩盤，一化鐵礦養，一化鎬燐養。化訖，則以二水相和，貯俟結鹽，此則鐵火燐養也。由是以熱水漂洗，微火焙乾。

功用 同鐵劑 服法 療治各症，悉照鐵劑服之。

鐵火燐養

製法

鎬燐養七安

鐵礦養水或足用

檸檬酸兩安士

輕淡

水五安半量

清水足用

先將鎬燐養全放入磁鍋內，燶鎔復煎至乾，卽將此乾散，另置鐵鍋內煎至僅見紅色，取起加入清水四十八安，再慢火煎至

鎔化隔淨俟其冷至五十度係法國度表乃以鐵礦蓄水漸漸加入

加至全結成鹽爲度攪勻用布隔時布面有鹽珠再加清水以過出之水味淡極爲止用磁鍋一個先稱過重若干將布面取出之鹽珠放入磁鍋內另用器將樟檬酸與輕淡水全併和勻化清即傾入磁鍋內與鹽珠和勻慢火煎至濁十六安士爲度攤勻在厚玻片面冷定成爲薄皮即此藥也入玻柱樽貯密收在暗處以不見光爲妙

形色 薄片色綠 氣味 無臭味微鹹頗澀
化 功用 此藥鐵質多故鐵類補藥之內此爲上品

服法

鐵鍊葡萄鹽

製法

鐵礦養水十六安
土量

鍊葡萄散七安
土量

清水六十四
安土量

先將鐵礦養水照上文第十篇內製成鐵養濕散。另將鍊葡萄酸散和清水六十四安土燶熱至一百四十度，勿令熱度減少。將鐵養濕散逐漸加入，至不能化爲止。將此水隔淨，另以一鍋盛熱水，以此藥水鍋置其中，隔水炖之，限以熱不可過一百四十度爲式。直煎至如糖水之稠，即攤匀於厚玻片上，或磁片上，乾成薄片，即是藥也。收取入樽。

形色

色紅，燶熱則變黑。

氣味

味甜略澀，經火燶發出氣

息如沙糖，溶化水能溶化。

功用 凡水能化之鐵劑，此屬佳品。因其氣味純而易入口也。

又與別等鐵類之藥能令大便結者不同。服之胃亦無礙。

服法 每服八釐半至三分四釐。每日三服。宜空腹爲佳。

鐵檸鹽

製法

檸檬酸

五安半

鐵礦膏

十二安上

清水

五士

先以清水化檸檬酸，再以鐵礦膏照上法做成鐵養溼散。復將檸檬酸水燶熱，限以不可過一百四十度爲式。到此熱度時，則可漸次加入鐵養溼散，加至不能化乃止。將水隔淨，用隔水鍋炖至如糖水之稠，即攤勻於玻片上，或磁片上，乾成薄片，即此藥也。

形色 結片色黃能過光 氣味 甘濶 溶化 水易化化
得之水作櫻色 功用 平和清補最宜於小兒及虛怯
之人 服法 每服八釐半至三分四釐每曰三服

鐵桂拏樟片

形色 薄片棕色 氣味 苦澀 溶化 伊打火酒不能化
冷水亦久而始化惟沸水方易化

功用 功同鐵劑及同金雞衲霜能補血補腦

服法 每服三釐至一分 主治 婦嬰身弱血虛面白或胃
口不能遽受鐵劑等類者宜服之

鐵士的尼檸鹽 製法

鐵轄淡檸鹽八錢五分 士的尼八釐半 檸檬酸八釐半

清水一錢量

先以青水一安化鐵轄淡檸鹽又以清水一錢加入士的尼檸
檬酸和勻俟化盡併歸一器勻和照上文隔水炖法限以熱不
可過一百四十度爲式煎至稠如糖水攤勻於厚玻片上或磁
片上俟乾成薄片卽是藥也收貯入樽

形色 紅

氣味 苦

功用

助胃補腦筋卽鐵與土的尼之功力

服法

每服一釐七或三釐四此藥有毒切宜慎用

鐵綵水

製法

西藥書

卷之三

調補門

鐵綵水

輕綠酸八安士量

汽水八安士量

和勻次將鐵線一兩六錢同入瓦

鍋慢火煎之俟鐵線化盡取出濾淨復加入輕綠酸四安士量

淡養五酸九地廉量然後加火幅之幅至發出紅煙而該水變作

橙黃之色由是再將水煎去至濁有十安士爲度

形色

橙黃

氣味

澀

功用

補斂內服外用均能止血

服法

內服者每次宜用五滴加水冲服

外用

或以之射入肉瘤令其血凝而結自可化成實物抑或

以療腿下迴管生大之症亦可但此法每易壞人未可妄

用肉瘤破口血箭血痔及子宮瘤破噴血等症即以此

藥水射入立能止血顧射入之藥水亦不宜過濃大約

每用鐵綠水五錢當以清水八兩調勻方合。至醫者多
用此製鐵綠酒，誠以該酒功用而尤勝於此也。

鐵綠酒

用鐵綠水一

火酒三

和勻卽此酒也。

形色

紅黃

氣味

臭同鹽強伊打味酸澀

功用

補斂

服法

每服十滴至三十滴加水冲服。

主治

凡內腎膀胱患症，係由虛弱而致者，宜服。小兒夜間

遺尿及婦人月經過多者，宜服。

方劑

一方 婦人行經作痛，及患白帶者，服之甚驗。

鐵綠酒八滴

鴉片酒十滴

汽水二

兩或

和勻作一服，每四點鐘服一次。

雜治
通用

久患白濁經別藥而莫治者卽以此酒及加些斑蟊酒
同服甚效。內傷盜汗每服二十滴每日三服。若外塗
潰爛瘡疔能去腐生新割症或以之充止血藥亦可。

鐵碘

製法

幼鐵線八錢

碘質一兩
六錢

清水三安
士量

入鍋同浸隨以慢火燶熟至水面浮泡變爲白色然後取出瀝
隔其瀝出之水宜乘熱加入白糖二十八安土秤清水十安和勻由是
復用慢火溶化化畢貯入玻璃。此藥水有鐵劑及碘質功用。
每服三十滴至六十滴須加清水調服。

鐵綠鐵養水

製法

鐵碘 鐵綠鐵養水

九

鐵綠水加入鐵 養再加輕養加至不能化爲度 製此
藥水要遵照西法用兩層盤器上層盤底以軟皮或豬小
吐爲之以到下盤之水面下盤盛滿清水日日換之或十
餘日不等以下盤之水吸至無酸味爲度上層器內之水
乃可用也

形色 棕紅色 氣味 無鐵質之味

功用 補血和別藥同服亦可

服法 每服可用五滴至三十滴

金雞衲樹

此樹產南亞美利鴕之山其山高約五百餘丈而

赤道之南二十度至北一十一度皆產有此樹近十餘年印度

西藥畧釋

卷三

調補門

金雞衲樹

山上瓜哇境皆種故出產日多金雞衲霜等類乃采其樹皮製成者也共查得此樹皮有二十六種而可入藥者不過數種耳
辨别 藥肆所售者三種 一色灰白 一色黃 一色紅

白色者其厚自半分至一分每截長八寸捲作筒形味苦而澀但其苦猶遜紅黃二種若研幼則色略白 黃色者二 一形若捲筒其長自二寸半至八寸其厚自一分至三分 一屬平片研末卽作橙黃色味苦而澀顧平片者乃樹身之老皮捲筒者乃樹枝之皮是宜分辨蓋此種則較諸紅白者尤佳緣其中函霜殊勝也 至紅色者味亦苦澀其形或作捲筒或作平片或破邊所贅該木長數寸

至尺六徑約八分或至四寸厚二分至六分大抵白者內
函先高擎多於桂擎黃者桂擎多於先高擎若紅者則二
質不相上下也且該樹皮內函霜計分四種一桂擎
一先高擎一桂呢吶一先高呢吶

形色 桂擎乃金雞衲樹皮內所函白霜之一色白

氣味 無臭而味極苦

溶化

冷水四百分方能化一沸水二百五十分卽能化一若

油亦可化惟伊打火酒化之殊易但火酒所化者則苦甚

考覈 此物本蛤利之類也與強酸相合可作鹽類若合炭匿

酸及葡萄酸所作之鹽則水油火酒均不能化惟加

強酸少許方可化也

先高罌 形色 作珠色白 味苦

溶化 冷水不能化沸水二千五百分方能溶一若油及伊打
亦祇化些須惟沸火酒乃能化盡但化後而冷則仍凝少
許且伊打及油所化者入口苦甚

考覈 緣此蛤利與酸相合作成鹽類而革去酸味也合鹽強
礦強及硝強光強醋強所成之鹽而水皆可化

桂呢叻 形色 與桂罌所賸之鹽及強水所賸之鹽相似

溶化 冷水千五百分能化一沸水七百五十分能化一濃火

酒冷的四十五分方能化一若係沸的三分七可能化一

先高呢附

形色

恍同桂笙礦養乃製取桂笙所臘之水用

法製令凝結成珠者

功用 同桂笙礦養

餘論

顧先高笙輕綠及先高笙礦養其製法固易於桂笙礦

養而該價亦祇值其四分之一又况形色恍拂相同但功力遜半若取以內服則昭桂笙礦養倍用便得此誠爲利便之妙藥也近來先高笙輕綠先高笙礦養甚屬通行卽中國藥肆亦時有所售用藥者切勿因其價值相宜而遂疑其功用不同也

參訂

昔人未諳用霜惟研此樹皮以作服劑其功用非不相同但所服藥末必須太多則未免致悶故不若服霜尤勝

桂翠礦養

製法

黃金雞衲樹皮

十二兩
搗爛

輕綠酸

三安
土

鑄養水

八十
安士

淡礦養酸

足用

清水
備足

先將輕綠酸與清水

二百安
土量

和勻

此即是淡
輕綠酸水
以該樹皮置磁盤

內將淡輕綠酸水溼透少時撥轉令勻浸足十二個時辰用漏

斗以淡輕綠酸水過之過至此水無苦味爲止加入鑄養水和

勻俟所結珠墜底傾去上面之水將珠放在布上下盛以器清

水淋洗洗至該水無色此珠即係桂翠呢叻等類另入在磁

盤內加清水二十安士以隔水法炖熱漸次加入淡礦養酸水
燉至珠將化完趁水緩用紙再隔隔後將其水煎至上面起一

層薄皮爲度俟其結珠隔紙提去溼氣及乾即是藥也然要
將桂笙礦養及桂呢打礦養逐一分清殊屬縉繁法亦不一此
不過略述梗概而已

形色 此物結槍珠色白淡強水化盡後一滴放玻片上乾作
珠形有圖係用顯微鏡察出繪之

氣味 極苦

溶化

受熱至水沸之度能發光冷水七百四十倍能化一沸
水三十倍雖能化一而冷則復凝火酒六十分可溶一甘
油四十分能化一伊打酒亦略化少許惟淡強水化之殊

易

覈辨

桂笙礦養一物或有以別物攪入者顧此物原身本函

有少水製時以二百一十二分熱焙去數分水汽乃成是

霜若將其露置半旬則每百分能食水汽二十八分有奇

此藥乾溼必不同功在善用者神而明之耳以霜秤準焙

乾再秤即可覈驗此物恒攪鉢礦養或別種鹽類或樹

膠及糖漿粉等物

驗法

以霜入瓶加火煅煉若真霜自可甄去餘別鹽類不能

也或以火酒驗之第見火酒能化霜而不能化粉及樹

膠倘雜蠟槍之類而以水及淡礦強化之則水亦只能

化霜而不能化油蠟也

功用 能作補劑及可治瘧。凡身體虛弱者宜服。

服法

每服二三釐，每日三服。空腹服之，其功勝於飯後。

但未服之先宜預服瀉藥。

宣息

大抵此霜服少許，未覺別徵，惟脈則略數而快耳。若多服智宗至錢，則頭困耳鳴，喉悶，或眼角火燭，或語亂神昏。

藥者，倘覺如此，即應停止。

相佐

凡服此霜而加入淡礦強少許，功力彌峻。若服藥覺

苦悶不能下咽，則每霜一分七釐，宜加入炭僵酸二釐，便不覺苦。且此霜合鴉片、青礬、信石等藥同服，尤見功效。

主治

隔日瘧疾，須於疾未起時，先以此霜二分至四分，分數

次服每次服二
三釐至五
六釐如無別症而只屬瘧疾者
必可十服十愈也。其或患瘧而兼肝腹有症者宜先服
吐瀉等劑後服是藥。倘服此截瘧而未獲效則兼服青
礬信石之類可也。

截瘧之法

一於瘧疾未起前四點鐘每點鐘各服三釐連服
四次如或仍發下期照服當必獲效。一於該疾未作前
六點鐘連服四次每服二釐每點鐘一服至臨作之際再
以六釐作一服。

一法

自熱退後起隔兩點鐘一服每服八釐或連服二次或
連服三次至耳鳴爲度如此自能止瘧倘有復發則照

此再服無不應驗，然或依此服之而仍有未愈者，是又當細覈該霜之真否也。瘡止之後至第七日或十四日，仍須再服此藥，庶絕其患。若潮熱退後服之亦妙。第須先服吐瀉藥，或表劑，方易奏效。症重者每服八釐，間一鐘一服，連服三次。症輕者每服四釐，亦連服三次。自可告痊。

方劑

一方 治瘧疾，宜於未作前每四點鐘各一服。

桂罌礦養

三釐

葡萄酸

二分半

清水

一兩

共貯一杯，調

勻 鎘炭養

三分

白糖

五分

清水

二兩

另以一杯

開化，由是將二杯合而爲一，當卽作沸，但乘沸時，卽宣內

服

丸方

桂笙礦養一錢

麪粉二分

糖水備足

先將桂笙礦養與麪粉和至極勻而後攪入糖水作丸五十粒如此則每粒函有藥霜二釐

又 方 治瘧疾發熱後尚覺舌白口乾者宜服

桂笙礦養二分

迦路米六釐

鴉片末五釐

和糖水麪粉調勻作丸十二粒早晚各服一丸

又 方 治同上

桂笙礦養二分

汞藍丸料二分

鴉囉粉二分

糖水和勻作丸十二粒每日服三四粒

又 方 療瘧

桂罌礦養三分半 磺強水一滴 白糖一錢 桂皮水二

兩 和勻每點鐘服一酒杯甚妙

雜治 又 方 作補劑凡面黃胃不消化者宜服

桂罌礦養三分半 青礬七分 清水一斤 和勻每服四

錢至八錢每日二三服

凡戒煙胃不消化宜服此藥水若無腹瀉則服之能養胃去痰補腦並除痼癮此誠爲戒煙之妙藥也頭面腦筋作痛係屬有定候者服霜能截每用一分至分半分數次

服 療內傷作補藥，每服霜二釐，每日三服，但須加

入青礬少許。凡內傷盜汗，胃不消化者，服之最驗。

桂罇雙礦養

製法

桂罇礦養 加入淡礦養酸煎至水乾結珠

形色 三角或似針能過光，味極苦

溶化 火酒兩份化一 冷水十一份化一 隔水鍋炖可以

炖溶

考覈 每百份內有桂罇六十份。

桂罇輕綠

製法

淡輕綠酸燶，加入淨桂罇加至酸味解盡爲度。

形色

結珠白色恍似星之光芒

溶化

凍水廿四份化一

火酒三份化一 哥囉方九份化一

桂罌醣鹽

製法

桂罌礦養十七分

鋗醋鹽六分

熱水足用

先將熱水化桂罌礦養，加入鋗醋鹽，俟凍結珠，傾去水，將珠用法焙乾。形色長而似針潔白。溶化冷水難化沸水及淡強酸易化。

考覈

此珠每百份內面桂罌八十四份

桂罌燐養

製法

煖燐養，熱水化淨桂罌所結之珠白色極幼

西藥畧釋

卷三 調補門

桂罌醣鹽

桂罌燐養

七

桂罌沙泐先 製法

桂罌輕綠 輕淡沙泐先 以清水和勻俟其凝珠卽桂

罌沙泐先也

溶化

水二百二十五份可能化一

濃

火酒二十份卽能化一

功用

同桂罌礦養

桂罌信養 製法

信養酸用沸水開化加入淨桂罌至不能化爲度凍結珠

形色 長而三角

溶化

冷水化少許熱水易化

桂呢咗礦養 形色

珠細而白似桂罌礦養

溶化

冷水

三百五十分能化一 濃火酒三十二分能化一

功助 治病服法均同桂罌礦養該價祇值其半

先高呢咁礦養

形色

白味頗同桂罌礦養

溶化

冷

水一百份能化一火酒能化功助與桂罌礦養同價
值祇三分之一治病服法亦同

桂罌炭匿

桂罌檸檬

桂罌葡萄散

桂罌淡養

桂罌鐵辰

淡桂罌甘松

桂罌礦加播匿

桂罌安息

先高呢填沙

泐先

右各種桂罌鹽類西國藥肆雖有發售究非通行之品因
桂罌本屬蛤利類合酸類便可成鹽其功力在桂罌不關
乎酸類也茲特表而出之以便後學得有考云

瓜沙

此樹產南亞美利鴕及西印度等處樹高四丈或八丈

西藥畧釋

卷三

調補門

先高呢咁礦養 瓜沙

六

身徑一尺或二尺半入藥取其木泡水而用彼藥肆所售者多橫鋸作片

形色 白而黃 氣味 苦而臭

功用 開胃補身凡虛弱神氣不足胃不消化及病後無熱者

服之均安惟不能取以治瘧耳

服法

每服一錢卽以水一碗泡之空心服誠爲通行之品也

西國嘗將此木雕杯內貯清水俟浸半點鐘藥味發出而
取以內服功用亦同昆杯可以服用不
識別具妙若

龍膽草 此草高約三尺產歐洲之南及中國齊朐山谷等處
以根入藥用 色黃 味苦

功用 補身開胃內服則用水泡酒泡俱可

方劑 一方 療治功用與瓜沙同

龍膽草

二錢

柑皮末

五分

八角末

五分

火酒

二兩

清水

六兩
五錢

先以火酒浸此三藥約兩點鐘久然後將水

加入濾淨每服四錢至八錢

製龍膽草膏法

龍膽草粗末

十二兩

清水

備足

先以布鋪路器上而後置藥於中隨以清水淋之淋至該藥無味爲止由是將水煎沸再濾然後入釜熬煎爲膏每服一分至三分

作丸方 用龍膽草膏 大黃末 番鱗 各等分卽以龍膽

草膏加水和勻爲丸每服二丸凡身弱胃不消化者服之甚驗

加林草 此藤類也產亞非利加之東入藥取其根用

形色

根形頗圓彼藥肆所售者多橫鋸作片該片則有團圓

圓紋環繞

其圓紋則自大至小自厚而至薄

且近皮處復有一黑圈濶約

五分至二寸半厚約一分至三分若片之外皮則厚約一

二分也該片色黃略綠函有微漿而無炭疽酸之雜質用

水泡之加入碘酒即變藍色

氣味 苦而微香

功用

補身開胃

服法

取片研末每服宜用一分半至四

分

方劑 一方 加林簾片

四錢

清水八兩 約浸一點鐘

濾淨每服一兩日服二三次但此藥水不宜久貯須隨製而隨服若用以熬膏宜倣照製龍膽草膏法

一方 治胃不消化腹痛

加林簾

八錢研末

柑皮

四錢

太和酒

一兩六錢

清水

十一兩

共浸十二點鐘濾淨每服八錢若大便結則加入大黃

末一錢可也

介利大

此樹產印度高約二三尺入藥則取其全樹而用藥

肆貨者多綑成一捆形色

氣味

苦

卷二十一 黃連 郁李皮

功用 補身開胃在印度最爲通行之品也

服法 取以研末每服宜用三分

方劑

燶水八西

約浸半點鐘瀉

淨每服一兩或二兩每日兩次空心服

黃連 生巫陽川谷及蜀郡泰山之陽樹高尺許取根入藥

形色 根色外棕內黃
氣味 味苦無毒

功用 與瓜沙龍膽草同。凡身虛胃弱者，用以療之可也。

考訂 時珍本草誇其並能療治各症，誠未必然也。

郁李皮 此樹產美國及中華河南山西甘肅等處樹高二三

丈入藥則取樹根之皮而用惟外面粗皮仍宜刮去庶爲合用

形色

棕紅

氣味

苦香臭同苦杏仁研末殊易

功用

補身平腦病後久補尙有微熱者宜服之

方劑

一方

郁李皮

四錢

清水十二兩

約浸半天濾淨每服半茶杯

又 方 治久咳內傷

郁李皮

四兩

卽以清水潤之入罐蓋密俟過廿四點鐘而

後倒入器內略爲壓實由是加水淋之淋至有十六安

士爲度

濾淨入樽

再加白糖二十八

安土秤

和勻俟其溶化方可

內服此藥水香甜可口每服一酒杯

柳樹皮

此樹中外各國隨處俱有高約一二丈入藥則取其

樹枝之皮研末而用

形色

氣味

苦澀微香

功用 補斂開胃

服法 每服藥末五分至一錢。

主治 凡身弱胃不消化者宜服。久咳痰多者宜服。

作藥水方 柳樹皮

八錢搗爛

沸水

十二兩

和勻濾淨

每服一茶杯

覈取 此藥內函有沙利先

毒利先一物形狀似金雞精色
臭味苦澀幼珠與火酒搗碎化

用法取出功

力尤峻。用以療瘧，宜於疾未作時每服八釐，連服六次。

自能奏效。

玉桂

此樹產粵西安南等處取皮入藥，色棕黑，味辛甜。

功用

補斂，若入補劑可止痛、治氣臌，亦有取其味之香，以佐別藥氣味也。蓋桂皮內函有油及炭匿酸二物，若去此

別藥氣味也。

蓋桂皮內函有油及炭匿酸二物，若去此

二者卽全無功力用藥者宜知也

方劑 一方

玉桂末

一兩
六錢

薑末

一兩
六錢

荳蔻末

八錢

八角末

八錢

和勻每服分半至五分

玉桂酒方 療腹痛氣臌

玉桂粗末

八錢

八角

四錢

乾薑

三錢

淡火酒

一觔

浸十四日瀘淨每服一二錢

作藥水方

玉桂油

三十滴

鎂炭養

一錢

汽水

半觔

先將鎂炭養與玉桂油和勻然後加水攪瀘此藥水恒以

西施露擇

二分三

調補門

玉桂 丁香 三

和各方劑甚爲通行

丁香 此藥產中國東南洲島蓋取其未放之花而用也

形色

氣味 辛香

功用 補而去風宣合他藥同服或取助別藥功力 大抵丁

香一物內面有油功在油宣
用法取出

方劑

一方 凡身弱胃不消化者服之良

丁香 二錢 沸水 八兩 浸半點鐘濾淨每服一兩 或

用丁香油 三五 滴沖水服亦妙

雜治 婦人胎前作悶服丁香水卽能止嘔每服五錢至一兩

牙痛有枯穴綿蘸此油塞入而痛可止

水菖蒲

此物產美國歐洲印度及中土等處蓋草類也每向

水溼之處而生其根頭大約五分長約數尺而形狀則似分數截而實相連由根頭而發葉該葉闊約八分長約二三尺入

藥用根

形色

色白根下復生多蘊氣味臭微香味略苦辣

功用

補身開胃止腹痛治氣臌此藥頗通行恒合別藥作

補劑

服法 宜研末每服分半至三分

方劑

一方

水菖蒲

根一兩六錢搗爛

沸水一觔

浸半點鐘瀘淨每服一

兩

西藥醫譜

卷三

調補門

水菖蒲

三

考覈 此藥功力不外在根之油，若歷久，則該油洩去，恐不堪

用也

陳皮

此樹產中國及印度呂宋等國，入藥蓋取其果皮而用

形色

氣味 臭頗香，而味略苦辣。

功用

助胃消化，治腹痛及去風。此物宜合他藥同服，並能

助別藥功力。

考覈

但陳皮一物，以內尚函有油者，方能行血祛風，補胃，否

則該油全行洩去，而功力亦減，此又不可不知也。

方劑

一方 開胃止腹痛。

陳皮絲二錢

生檸檬皮一錢

丁香粗末五分

沸水

八兩

共浸半點鐘蓋密浸畢瀝淨每服一兩每日三服

乾薑 產粵東四川等處

形色

氣味

辛辣

功用 作補劑能療血滯身冷等症 入鼻則能作嚏入口則

令喉熱生津液入胃亦能令內皮發煖行血

服法 研末每服一分半至三分

方劑 一方 止腹痛氣臌

乾薑四錢 沸水十六安 滬半點鐘瀝淨每服一二兩
搗爛土量

宜乘熱服 或輕病症服此亦效

考訂 查此物除治腹痛氣臌而外甚少獨用大約多偕別藥

而作補劑也

薑酒方

乾薑二兩
搗爛

火酒十二兩

浸滲每服十滴至四十滴

水調服
宜用暖

凡輕痢症服此良

餘論

或以薑入瀉劑亦妙，蓋能止瀉藥之烈並可免瀉時腹

痛至若以薑搗爛外敷則詳見下文引炎法也

錠礦養

此藥製法形色氣味已詳上吐藥篇

助用

若用作補斂劑每服釐半至一分但須由漸加多庶免

服法
悶吐此藥初服不甚見效惟服至數旬乃能開胃補身益

腦及治抽搐

瘡瘍二症西醫名高靈療以此藥甚驗服三分百三服是隨
昇加量服覺有發悶則暫停若瘡瘍等症而服法亦宜故此也

方劑

一方 補虛弱等症

銻礦養

一分
七釐

沒藥

一錢
五分

和灰麪糖水共作丸二十粒

每日服三四丸

一方 治胃不消化

銻礦養

一釐
七

每日分三次服

又 方

銻礦養

三分
半

鴉片末

八釐
半

和米餬作丸六粒飯後服

一二丸服至數日後將方內鴉片減去加入硫礦末或龍膽草膏作丸照前再服彼身弱胃不消化及有風在大腸

之間者服此最驗

一方 銻礦養

二釐
半

龍膽草膏

一分
三釐

和糖薑汁作丸二粒，每曰早晚各服一丸，可治羊癩等症。
若以此藥療瘧，則功同信石也。

銀淡養

卽硝
強銀

製法詳化學初階

形色

結珠大而過光

氣味

苦澀

溶化

水一化一沸火酒四分方能化一

洗脫
誤染

但水所化者苟塗皮肉，即變黑色難脫，一法。

棉麻布質經之亦然，惟先以碘酒酒之，次以銀水滴上，然後復以暖水揉之，奇堅。

一法。
用銀淡養三錢半，碘片三分半，兩三安土，和化能勝一切硝強銀之毒，皮肉衣服者。

煅化
成條

硝強銀受熱至二百一十九度卽能化液，而可入管印成條子，受熱至三百一十五度，則壞不堪用，故煅時最宜

小心

辨別

內服宜用其珠，條子者勿用，蓋恐其內函雜質也。

功用 補腦

主治

凡抽搐轉筋、胃不消化、肚痛、嘔酸及腹

瀉、羊癇等症。

服法
宜忌

每服半釐至二釐

三

此藥固須服至月餘方獲功效

然連服至八九天又宜暫歇改服瀉藥

三

四日方可再行

續服且此藥不宜過服否則壞人誤服者須食生鹽水

解之

方劑

一方 治小兒腹痛

硝強銀

一釐半

淡硝強水

五滴

粥水

六地

糖水

六地

和化每服一錢每點鐘四服

外治詳下文

礦養酸

此卽礦強酸也內服宜用淡礦強水及礦強香酒二

種

卷二

淡礦強水

礦強香酒

淡礦強水

製法

礦強水

汽水

三安量或用雨水亦可

須由漸相和

形色 似水無色

氣味

略酸濁

服法 每服

二十滴以水冲服

礦強香酒

製法

礦強水

三安量

火酒

四十安土量

桂皮

一兩六錢

乾薑末

一兩

先以火酒由漸與礦強相合然後以薑桂粗末入浸七日每日攪動俟過七日濾淨

形色 淡黃

氣味 酸香

服法 每服五滴至十五滴

功用 補胃除痰退熱止血並治鉛病腹痛

主治

身弱胃不消化，內傷盜汗或羸弱服
當均止，疗後體弱或痢症

服之能補，吐血及大腸便血，肺經咳血，婦人月經過度

服之皆可療治，鉛病腹痛宜以濃礦強水半滿

汽水酌

和勻每曰服此水二角，每角分數次服，輕症者服三

日，重症者服五六日，甚驗

一法 服此藥後隨將衣服

卸去坐在透氣椅上，其頸脖之下，以衾圍覆而椅下則焚

礦，薰之如此，則鉛病尤易愈也，泰西鉛匠恒服淡礦強

水，故鮮發鉛病。

雜治

砂淋症以草藍紙覈得非由酸者宜服，瘡疥及皮膚

西藥畧釋

調補門

礦強香酒

毛

等症宜內服兼外塗

淡養酸

此卽硝強酸也入服劑應用淡者

淡硝強水

製法

硝強水一安土量

汽水六安土量

調勻

形色

純清如水無色

氣味

酸嗅之刺鼻

功用

入補劑與淡礦強相仿

病後欠補者宜之

服法

每服二十滴至四十滴

雜治

砂淋症係非由酸者亦宜服 痘毒骨痛鼻有透癬者

每日三服

膀胱積熱而流涎如白濁者宜用淡硝強十

滴汽水一安土量

和勻以水節射入尿管少頃可旋放出大抵

始則宜兩日射一次繼則每日射一次甚驗

若療肛門

流血又宜以濃硝強塗之

至於角以作丹
則覓下盃

輕綠酸即鹽
強水

製法

鋗綠四十八安
土秤焙乾

礦養酸四十四
安士量

清水三十六
安士量

先以水三十二安士將礦養酸由漸和勻俟冷放入膽瓶膽能
盛六然後加入鋗綠由是復設玻璃樽兩箇一用三口之樽宜列左一用一口常樽宜列右大抵三口之樽須將所臘之水四安士納入樽中其左右兩口均以通心木柱塞之管柱塞頭鑄一孔以爲
容水者乃鬆根其水氣免氣中間一口則以玻管插入令其略爲容水管柱塞頭也下微此
蓋水氣隔絕無氣至若一口常樽宜內貯汽水至安仍以通心木柱塞口各器既備卽將膽瓶之嘴插入三口玻樽左便之口其餘右便之口及所貯

汽水玻璃樽之口，則另用一彎曲玻璃管插入兩處，蓋欲其互通氣也。佈置停妥，即向膽瓶用火燶熱，令藥氣先透過列左之樽，然後透至列右之樽。此以全玉分幾大樽，則每樽之水約共六十六安士，即可成爲輕綠酸也。但當此製變時，而所貯汽水，須用法金鑄方安，則恐致變也。製成後，宜用玻璃貯密，若露置，即有黃煙上升。

形色 此水新製清而無色，久則變淡黃。

氣味 酸嗅之刺鼻，倘變壞，則臭味酸辣，殊不堪嗅。

功用 能作補劑。主治 凡病後身弱，內傷盜汗，胃不消化，

及患疔毒等症，服之均驗。

作淡鹽強水法 鹽強水一安士量 清水三安士量 和勻，每服二十

滴至六十滴加水冲服能補氣血

外治

或因體弱而生瘻癰或因疔毒而致喉爛均宜用此藥

水搽之

一方 鹽強水

一安士量
兩安士量

十二安士量

並加白糖少許和勻用以漱口而喉症可治

皇強水

製法

先以硝強

一安士量
兩安士量

相和後將汽水

十
三

安士量加入和勻隨用綠玻璃樽貯密

形色

櫻紅色

氣味

酸刺鼻濃者起黃烟

功用

能作補劑

服法

每服十滴至二十滴

主治

久患肝症及疔毒宜以少許加水冲服

外治亦頗有效

卷三

三

論行氣血之劑

夫能令心脈發力先自內腑而遞及遍體者卽謂之行血氣劑也顧所謂氣者非屬呼吸之氣乃指腦氣而言蓋行氣之藥本先入血而令血行彌快及令微絲血管受血亦多此所爲通身發緩而行氣卽並行血也大抵此藥略同補藥所判者補藥則由漸而令身體康健此藥則驟然而令氣血通暢耳故補藥每日宜服一次此藥每日宜服數次或每點鐘服一次誠以此藥發力雖速而要不免旋發旋散故必須頻服而方獲功效也但此藥雖能令氣血流行而究之力渙之後又將反成困憊故亦不可常服譬諸飲酒少飲則能令血行快捷而各臟功用亦

覺爽利惟過飲則反以貽害耳。

費醫者以酒癆病而要不敢飲者
蓋虛病者虛後而暑煙之癖也

由是觀之服此藥者正宜合度。功用氣虛血弱宜服。病後體羸宜服。行役勞苦跌打損傷宜服。中毒或被蛇傷宜服。腦病譫語由於孱弱者宜服。至若臟腑發炎及身有熱者則忌服也。

電氣

夫電氣能隨筋絡運行意與精神相類此所以實能療

病也顧電分乾溼其用強水而發者則爲溼電其用磁石而發者則爲乾電雖功用彼此相同而要以乾電較爲易用

製造

電氣箱製造不一而其中則均有陰陽二線每長約

二

三尺線之末則有柄其柄有製爲實心者亦有製爲通心者若屬通心則宜以溼海絨納入其內令電氣易行以此震動患處尤爲應驗且該柄花樣甚多凡用以入目入耳入鼻入口與夫人前後陰等處者均皆巧妙蓋西土所論電學極其詳晰今則愈求而愈精此不過言其大略耳

用法 用以療症則令病者執其二柄而一經電發自能震動

通身又或執其一柄餘一柄則任向身上患處而以電氣

震動亦妙

功用 能行氣血

主治 初患風癱約震二三月可愈

但患此症者並宜擦藥酒及時常伸動手足筋骨瘡瘍者恐難治也

產後膀胱大腸失厥功用大小便閉 凡眼畏光或目發青光者 或月經不行而服藥罔效者 濕積膀胱而致眼滿者 均宜用此震之 未產血流既產血溢卽以此法震其子宮而血自止 久患腦氣筋痛間或可愈 氣喉之筋或有變壞而致口不能言者宜以電氣震之一線入其口內一線震其頸後 耳聾先入以水隨用電氣震

之一線入其耳一線震其項但須徐徐震動並勿過久
鼻失功用亦宜療以此法 胃不消化又宜以一線震其
胃部餘一線則向舌上或頸後震之大約療至數月方獲
功效 誤服鴉片先用藥令吐出隨卽震以電氣可獲安
痊 救溺水則先去溼衣易以煖衣隨發電氣震之奏效
甚捷 割症異法 法將鉑金線先置患處隨發溼電傳
之令其發熱由是乘熱而卽以此線割症則較之用刀更
爲奇妙

番木籐

一名馬

此樹高二三丈產印度安南小呂宋及諸海洲而

樹身樹根其味皆苦果大如橙皮黃而硬肉有汁液並函多核

土人用以療瘡多取其核

形色

該核面則凸而底則凹、厚約分餘、徑約五分、且全身有
灰色之毛、厥色光豔、毛連有皮、皮內卽肉、肉硬而韌、碎之
不易、色頗白而略過光、恍如明角、亦間有色稍黑、不能過
光者也。

氣味

核肉無臭味、辛而苦

覈取

清水能提其功力、淡火酒浸提尤佳、此物內函植物之

霜二種、一土的年

鷺

一布老時亞

考訂

古時印度亞利伯醫士雖曾以之人藥、而要未洞悉其
品、惟自嘉慶二十三年、有法國名醫不加氏、悉心細覈

然後深知其妙用，即在此二種內也。

功用 能行腦筋肉筋脊髓使之發力。

主治

風癱、膀胱癱、膀胱口癱或小便不利或不能忍溺自遺，均效。惟腦部有炎者須去清方可服。

眼法

以子作散，此物堅韌，欲研末須先鉗碎，則
隔年遂取出燒乾，再研方成幼末。每服宜用三釐，每日三服。

方劑

藥酒方

番木鼈散

二安
土秤

火酒

二十安
土量

用以作酒，宜照上文製

路卑利酒法

此酒

功用
服法

每服五滴至十滴，能補身

每服十滴至三十滴，能令腦筋肉筋發力。

方論 此藥少服則補而利小便，服略多乃入肉內之腦筋，而

令肉筋發力也。凡內服此藥，始則四肢覺重，漸則軟弱微
瘡，而並覺頑木。若多服則恒自驚戰亂其方寸。久服則尤
慄慄顫跳不能自己，甚至肉筋或有抽搐，莫能復鬆。腹熱
如焚，喉忽緊窄，而呼吸吞咽均覺窒礙。由是或頭昏或眼
蒙，瞳人縮小，皮覺針刺皆在所不免。惟脈則無甚變動，或
略快些耳。要之此藥高下不一，品質參差，故西醫多捨
是而用土的年也。

士的年此藥卽番木蠶之精也。藥性酷烈毒極，有非他藥所能擬者。服法每釐須分作十服或八服。

戒慎以飼巨蟇末及一釐而立斃。人服釐半亦卽傷生。

功用

能療全身風癱及膀胱癱症惟服藥須由少漸加不宜

躁急若既服數日又宜暫停且以此療四肢癱症數服後

則受病處必先覺徵驗誠久服之自可由漸發力惟半身不遂及因腦髓脊髓受病而致癱者服之罔效且該處倘

若發炎服之反以增害眼瞼係由腦筋孱弱而致者服

之宜若眼內腦筋已壞服亦罔濟腦筋痛服他藥而弗

驗者服此少間獲奇效腦衰意服

思慮過度及身弱者服此可作補劑服法宜以一釐分二十次服

方劑

藥水方此藥水每一安士宜分二服或三服發腦筋肉筋

力

士的年珠

四釐

淡鹽強水

六滴

火酒

二地

清水

六地

廉量先將清水

四地

和鹽強水煙熱以鎔化土的年隨將

餘水及火酒投入後再加清水

十五安

和勻

逼路度先

即稽矯
勒

此樹產印度入藥用其果核蓋該核內面有霜

用法取出其霜毒甚醫者慎毋妄用

彼人嘗以此餌鷺
魚之前羹而宰

功用能入腦祇宜外用不宜內服倘誤服之大有筋抽之患

形色

氣味

方劑

一方用此核

一錢三分半搗爛

豬油八錢

和勻擦之

能治頭癬及殺頭蟲

子葛

此另一種麥子與小麥不同未變壞時粒不甚大已壞

丫葛

每粒長約四分

至二寸三分闊
約一公分半



形色

每粒均有深紋

該紋有二

質頗脆，色外棕黑而內灰白。

氣味

氣息別成一種，味頗苦辣。

考覈

此物內面有油，及面有二精，一名丫葛頭，一名士加利。

亞而功力卽在丫葛頭也。

功用

專行脊髓及自和腦根，故能令婦人臨產子宮發力。

用以節射入皮止血亦妙。

主治

凡臨盆乏力者，或胎衣不下者，宜服。

但胎兒橫塞及產後未開兒頭者，
落着切忌勿服。恐勞過甚，子宮寒。

通義
意

或產後或小產子宮流血服之能止 閉經服此亦
或可治 凡鼻血咳血大小腸流血內腎流血等症服之
皆驗 凡大人小兒或日間或夜裡渴急卽遺不能忍耐
者服之可愈 遺洩者亦效

方劑

製了葛酒方

了葛五安土粗末

火酒二十安土量

製法同上文路寧利酒方

每服十滴至一錢

了葛水製法

了葛十二兩搗爛

伊打酒二十安土或足用

清水七十安土量

火酒

八安土

先將伊打酒放入樽內加清水十安土撒勻少頃

又將伊打酒取出祇留清水旋將了葛放入漏斗卽以伊
打酒逐少緩緩漂淋之葛打酒罷去葛所要油

取出丫葛用器皿以清

二百一十二

度表燶至一百六十度之熱

浸十二點鐘搘盡了葛之水用隔水法炖之至臍水九安

士爲止俟凍加入火酒八安土約歇一點鐘瀝隔淨要得

藥水十六安土爲式此藥水每服三十滴至一錢可令

子宮發力每一點鐘服三四次

又 方

丫葛粗末新采者二錢 沸水十安 漫半點鐘每服半安至

兩安

西藥畧釋

卷三

益髓腎和筋骨門

丫葛

三

一方 止咳血

丫葛水

三安
土量

衣畢格水

半安
土

鴉片酒

半安
土

和勻每一點鐘服一錢止血溢甚捷

一方 節射入皮止血溢甚捷

丫葛水

一錢

甘油

一錢

清水

七錢

和勻

每次用十滴

滴至二十滴節射之 凡遇血流不止危急之時用此法

勝內服也

粟米子葛

粟米變壞恍同上文變壞之麥故亦名之

功力開

皆同不必再述

毛地黃

酉晉地

出處形色氣味已詳上文利小便篇內茲論其平

脈功用而已

功用 平脈 **主治** 凡心經有壞而致血不流行眼蓋略腫
面色發紅脈數氣緊服此均妙 婦人月經過多宜服
內傷服之雖不能愈亦可止喘寧睡

服法

以葉作散每服二釐至四釐每日兩服

方劑

藥酒方

毛地黃葉

二兩
搗爛

淡火酒

二十安
土量

製法宜照上文路卑

利酒方每服十滴至二十滴每日二三服患心症者服之

可治

一方 地治低連 三釐先以火酒化之後加糖水十六安土

西藥四錢

六三

行營歸首龍鵝

毛地黃

三

和勻每服一錢如此則是每劑一百四十分也每日三四服

顛茄 此樹產歐洲美國等處高約三尺所結之實狀如李子
中有多核 **形色** 始則綠色漸則紅色迨熟時則變爲深紫
之色

考覈

此樹全身皆具功力而入藥則多取其子及花葉搗濾
熬膏或以酒浸濾煎作膏

氣味

功用

提神寧睡

服法

用此膏者宜以一釐分四次或分兩次服甚驗
若以

葉作末始則宜服釐半由漸而加至三釐亦妙
若氣喘作時宜以一釐分八次或六次服每點鐘一服

宜忌

但此藥不宜過服，否則喉渴目眩頭昏，或如沉醉而輒

易傷命。他如蛤利類及斂劑能敗此藥功力，又不可同

服

顛茄膏製法

新鮮顛茄葉及嫩枝

一百二十克
二兩

用大石臼搗爛，搾取

其汁煎至一百三十度之熱

傍晝
十三度

以綿布瀝淨，隔水鍋

煎去水汽，煎至糖膠之稠，將初次青色渣放入再煎，用木片不住手攪，勻煎至僅足一百四十度之熱便可，不可過此稠至可以埋丸爲度。此乃英國通行之法。

製顛茄酒方

顛茄葉

八錢
搗爛

淡火酒

二十安
土量

倣上文路卑利酒製法

西藥學釋

卷三

行醫總要

顛茄

卷三
每服十滴至二十滴

一方 治氣喘

顛茄酒三地廉量 鍼鍼三分四釐 鍼炭七錢 清水十六安士量
和勻，每服半安，日二服，三服。

一方 腦氣筋痛

顛茄膏四錢 鴉片末六分八釐 豬油四錢 玉桂油六滴

調勻外搽即效。

又 法 先服瀉藥後用顛茄膏三釐，分作三服，每點鐘一服。俟其痛止，每日用一釐，分早晚午三次服，自可告痊。

餘論 要之此藥功力而有如是之峻烈者，實以其內函有丁

刀邊也

丁刀邊 此物以顛茄根製煉而成蓋用法取出其霜也功同

顛茄而力尤猛 製法

顛茄根末三十八兩四錢

嚙囉方三兩六錢

火酒

淡礦強水

鍀養水 清水 各宜備足先以火酒

十六安士量

浸藥末隨

置漏斗濾隔復以火酒淋漂淋至共濾得二百五十六安

士爲率出是將此酒入甌以甌去一百九十二安士爲度

其餘甌內所存之物加入淡礦強水隨以草藍紙覆之至

略成酸味而再入甌甌至臘有八安士卽加清水八安士

冲和濾淨乃將嚙囉方一兩二錢加入復投以鍀養水至成蛤

利味

卽酸味敗盡也

於是頻頻攪動歷半點鐘許放定令水分爲上下二層然後用酒角將輕清者提出提出後再加入噶

囉方

一兩隨卽攪動

俟其凝定再分兩層則亦將輕浮者

提出其餘尙有噶囉方

一兩二錢盡行加入頻攪放定俟分二

層仍將上層輕浮者提出至於下層三次所賸重墜之水

宜合貯於大該碗中令其陰乾迨乾後爰將碗底之散取

出卽了刀邊也

形色

所結珠恍似三角槍形純者色白用上法製成者色微

黃

氣味

無臭味苦辛

溶化 受熱至九十分則成液受熱至一百四十分則可飄然

受熱而至此亦已毀敗過半矣

功用 能行腦氣筋療眼各患

主治 眼科欲作假瞳人或炎症而必須亟散瞳子者均宜用

丁刀邊開水滴入 明角簾生炎粒而洞穿者須以丁刀
邊水外搓令其開散瞳人蓋此症眼簾恒粘簾穴其後每
失舒縮功用也凡欲覈眼之後房各症應用丁刀邊散開
眸子庶易用鏡覈驗 晴珠起膜或針或割亦宜用此藥
也 用丁刀邊入眼法先以此藥水蘸紙眼乾將紙裁作
小塊貼入睫內此法亦可用顧或謂眼液不能化紙貼後

仍須將紙取出，不若以樹膠作薄片而蘸丫刀邊水入眼，是殆比紙尤妙也。

方劑

藥水方 療眼各症

丫刀邊

六釐

火酒

一地
釐半

清水

七地
釐半

和化藥水一清

水四滴之

又 方 塗治腦氣筋痛

丫刀邊

一分三
釐半

火酒

三十

豬油

八錢

攬勻作膏

又 方 治同上

丫刀邊

一分
七釐

豬油

四錢

攬和以荳許搓患處，每日三次，其痛自止。

方論

此藥功力甚峻雖以極少入眼亦能令瞳子散大昔人療眼症多用顛茄膏及其根惟今時精益求精乃知用刀邊也藥性毒而烈入服劑最宜小心或以此藥調水射入皮裏亦可奏效

佛茄兒

此樹產歐洲美國及中華等處高約三尺每年換生一次恍若鬧羊花也所結之果大如李子外有刺而內無肉惟圓多核入藥用核及葉

形色

核小如栗色棕黑

氣味

嗅之昏悶

功用

同顛茄能提神寧睡

主治

凡氣喘症每服此藥酒三十滴加水調服或用乾葉作

用法

西藥畧擇

卷三 行竅竈瘡

佛茄兒

四

卷三
煙燃吸每次三分亦間有獲效者不妨試之也

蓄此法愈能止
嘴亦有不能喘

者惟是敷則緩
之苦則易用 頑狂症服之亦驗久患風溼宜搗鮮葉敷患處或用葉和豬油熬膏塗之俱妙

方劑 藥酒方

佛茄兒核二兩搗爛

淡火酒二十安土量

倣照上文路卑利酒

製法 此酒每服三十滴每日二三服

藥膏方 用此核十二兩搗爛

伊打酒二十安土量

火酒清水並宜

備足先將伊打入樽加清水十安土量撒勻放定俟伊打酒在上而清水在下隨將伊打倒去別樽餘水棄之由是用一漏斗插入樽口即將該核放在斗內而以伊打酒徐徐漂

淋令其食出核內所函之油，旋即將油及伊打倒去，倒畢插回漏斗，另用火酒淋之，令其提出此藥功用然後復將火酒煎去，煎至無幾，又宜隔水煎之，使其慢慢去清，方妥。其餘所存者，卽成爲膏也。該膏須熬如葷，膏方易便，此膏每服一釐至三

四釐，或用以作丸內服，或和豬油外塗均妙。

方論

若用葉而服至三四釐，則脈略數，頭略昏，由是通體發煥，而面與手亦旋發汗，抑服葉而至八九釐，則能令人醉，身略發熱，語多含糊，甚至瞳人散大，作渴作悶，小便發多，而大便亦相隨而出。至若服至過多者，則尤覺語言顛倒，而恍如沉醉也。

開羊花

此樹中國秦西均有產焉。高二尺至五尺。每年換生

一次。若開花結子後。而該樹旋即枯萎。俟至下年。則又由新種子而發生也。該樹全身皆具功力。而醫家所恒用者。則多取其葉與子。

形色 子有胞衣。衣有多刺。

氣味 嗅之昏悶。

功用 提神止痛。寧睡。

服法

以葉作散。每服三四釐。以子研末。每服一釐。用子熬膏。每服半釐至一釐。若既服鴉片。而仍未寧睡者。服此即

驗。

主治

癲狂症。應用寧睡劑者。服此尤效。氣喘症。即以焦葉

燃吸作煙，每日三四次，問亦獲效。久咳無痰者，亦宜用

之。眼科欲瞳子開啟者，宜以此藥膏

乃用其孚所
熬之膏

和水外搓

外治

疔毒風溼骨痛，以此葉蘸酒敷貼

外包布
繩紮

一方用

此葉末一分，豬油四分，同煎攪和作膏，用以外塗甚妙。

方劑

藥酒方

開羊花葉

二兩

淡火酒

二十安
土量

倣上文路卑利酒製

法

每服八滴至六十滴

又法

用乾葉分半至五分，作煙燃吸亦妙。

慎用

服此藥後，若覺頭昏喉渴，目眩，即宜暫停。此藥不宜

多服，久服，否則眸子散大，眼花神亂，及頭昏痛，或致沉睡。

西藥畧釋

卷二 行督督和腰筋門

開羊花

四

而死

名二 煙腦氣箭 檀腦

四三

樟腦 此樹產日本及中國粵東臺灣等處樹高而大凡木葉皮均有樟腦之質以木作片浸甌可成樟腦然此猶未淨也

製淨珠法 用樟腦

五十兩

石灰

一兩用新鐵而過水者合

和勻而以圓鐵鍋盛

之

該鍋須角弇的深
尋濶盡爲尼

鍋上並設鐵蓋

此蓋須以薄鐵爲之

蓋中預開一孔上復

用一小鐵帽

形狀恍似涼帽亦須薄鐵鑄

蓋密由是將此鍋坐沙釜上

釜須沙預貯沙

下用慢火炙熟至鎔令樟腦升上鐵蓋及由蓋孔而升至小鐵帽內如此可成淨珠凡入藥分兩均以升淨而論彼

溷有雜質者慎勿濫用

形色 色白 氣味 臭烈氣味自成一種

溶化 水不能化惟火酒可鎔其味辛質韌如人火酒數滴方

易研末大抵濃火酒每効能化十二兩之多若樟腦酒而入以少水旋卽變白恍如牛奶各淡強水及伊打酒油均能化之惟濃強水能敗是物

功用
服驗

初服能令腹之內皮發熱其後則人腦而壯腦力間或發表惟不至令脈洪數耳大約服一二次則能平腦安身戒慎若過服則壞人真瘡瘍箭瘻作吐繼則神昏譯遂薨死宜慎用之

炎
症忌服

主治 凡轉筋症服此最驗但須先服涼劑而後服是藥方妙且身弱而四肢不安者宜服月經不調及酒醉過度者亦宜服

外治

至以酒調化或薑油外擦風溼頗獲功效

荅
嘉
藥
酒
方
佳

神昏作悶，嗅樟腦或樟腦酒亦妙。

服法

凡以此藥療症，每服八釐至分半。人服劑用酒化，或以樹膠沙糖和樟腦同研，加水調服。但此法調水後，而樟腦之質恒旋自墜。惟於研時，加沒藥少許，則調水可略經久。

方劑

一方 樟腦水製法

樟腦八分先以火酒少許和研，再加入镁炭養一錢。然後

徐徐加水和之，至藥水共有十六兩爲度。每服一茶杯。

樟腦酒方

樟腦三兩

火酒三十二

安士量

和化，每服五滴至三

十滴。但此酒多用以外擦風溼跌打等症，甚少內服。

一方 凡風溼骨痛，癩癰跌打等症，用此療治甚效。

樟腦八錢

番鹼二兩
四錢

火酒十六安
土量

丁香油一錢

先以瓦盤坐沙盆上，隔沙炙盤令熱，隨以番鹼火酒同納盤中，俟番鹼溶盡，然後加入樟腦香油攪和製成後，用瓶貯密。

一方 治風溼症

樟腦酒 清油 濃輕淡水 各等分，和勻，擦患處妙。

一方 療風溼骨痛

樟腦二兩
四錢 橄欖油十二安
土量 攪和擦之。

阿魏 出處形色功用及行氣血等方，已詳列上文化痰第

十篇內矣，茲不再述。

甘松

此樹產於歐洲高約二三尺入藥則用其根而根復有

小蘿

形色 色棕黃

氣味 苦辣自成一種氣味

覈取

根函有油用法取出其油色頗青其油味則香如樟腦

蓋功力卽在是油也

功用

平腦治抽筋

服法

以根研末每服三分半至六分若用油每服三滴至五

滴加白糖調服

主治

腦筋痛 婦女月經過多作痛 弱婦遍身不安或血

薄或心驚或頭昏或腹痛等症 嘔吐及腹扭痛 因胃

滯而致心跳均宜服

初患羊癇

瘧疾

久服之亦可獲

效

方劑 一方 療治以上各症

甘松根二錢
搗爛

清水六兩

同煎分數服以一日服畢爲度

甘松輕淡酒方

甘松根兩安士半
秤搗爛

輕淡香水二十安
土量

共入玻樽封密

連浸七日瀘淨由是再加入輕淡香水以仍有二十安士
爲度
醫書
畫出每服三十滴至一百二十滴功效同上

士班釐

出美國草類高八寸根長約一寸厚一分下多幼強

形色

棕黃 氣味 味略苦香

功用

行氣行血化痰

主治 大熱身弱肺內皮發炎

方劑 一方化痰補益

士班釐水

四安士

轄淡炭

六分釐

和勻

每服半安

三點鐘一服

加嚙嘴

大麻

此藥原產波斯現在印度歐洲各國中國皆有而

印度所種高山者枝函漿汁最多樹身高四五尺至八九尺不等一年即槁入藥采樹稍嫩枝及花或子陰乾用亦有取枝內

漿汁爲藥者

形色 西國藥肆所售者有兩等一每枝截成二三寸者色棕綠一連枝葉帶子裹漿汁成一餅形者

氣味 新鮮者味苦辣

功用 行大腦氣 主治 抽筋症令婦人子宮發力頗同丁

葛凡婦人白帶白濁及月經過多服之均效

方劑 一方 製膏法

加礞嘴十二兩
搗爛 火酒八十
安 浸七日搗盡藥內之酒傾

去藥滓用隔水法熬至成膠即是膏也

又 方 止痛止抽搐等症

加礞嘴膏八錢
濃火酒二十
安浸之每服十滴至六十滴

又藥酒方 加礞嘴漿一安
火酒二十安
士量浸七天隔淨隔

時加些火酒以得回二十安士爲度 每服五滴至二十

滴

餘論

印度上人采嫩枝及子焙炒煎代酒飲或作烟吸或以漿爲丸吞初則微醉恍似酒又似鴉片烟其功力亦相類故能止痛寧睡止抽搐也西國人有用以代茶者然飲多則未免頭痛心跳胃不消化之患近年西醫究出行腦氣各藥多有功力倍勝者故此藥不甚通行耳

郁加列賈酒

製法未詳 每服五分至二錢

郁加列賈膏

製法未詳 每服一釐七至三分四釐

形色氣味容俟查出續爲譯刊

郁加列賈油

名郁加
列托

製法

形色

氣味 辛苦而溫味如樟腦亦如畢澄茄入口灼辣生津固非美味也

功用 此藥溫補能長肌肉與嘔瀉發表者相反故能緩胃助消化且能發胃腸津液見功甚速

服法 每服五滴至三十滴以樹膠蜜燉之或以樹膠水開服亦可

考覈 函有樟腦松香炭匿酸等味嘗之略如松節油功力全在於油則用油較捷於用藥也

相反

蛤利類 各等強水 有鹽鐵劑 水銀所製之藥

鉛錠所製之藥 皆不可同時並用 大瀉大表嘔藥亦

不_合

相佐 辛溫味苦之藥 先高拿 檉腦 松節油 畢澄茄
哥拜把 各等藥油 凡藥內有油者皆相合

主治

口內及杏仁核發炎日久用葉搗敷 小腸生線蟲用
以射入肛門 胃炎名瘡胃不消化或胃大小腸內皮發炎
或大小腸有蟲或嘔吐胃不消化兼見極小之蟲名瘡
納黃皆可服之 凡病後身弱心血虧薄婦人月經枯竭或腸風
心跳面色艶變或子宮不安週身受病或抽筋氣喘腦部
受病或虛弱腦欠血等症極其效驗永不復發

雜治
此藥亦可引病外出用葉和佛茄兒顛茄菸葉燒嗅之

可止氣喘症。又可減炎去痰。故氣管內皮肺本體並炎舊症日久。嗽膿者。

新舊

屢經奏效。其得力在能由氣管內皮

引病外洩。內腎發炎。或溺管內皮發炎。致內皮腐脫。服此可引炎由小便洩去。切須小心。不可多用。服過久。恐致腎內皮積血。卽松節油。哥拜把果。澄茄等。皆宜慎用也。

治膀胱發舊炎。尤有奇功。服後小便有藥味。可見藥經膀胱內皮發洩之據。治瘧疾。功力似相反。然雖可見效。而截瘧不似金雞納霜之妙。惟應時輕重熟症。暨瘧疾或感受霉毒各症。將愈則用此較勝。瘡爛臭穢。可用油或以葉浸水洗之。又有用此藥水。以和化別藥。節射入

皮者，但以蛤利類之藥如丁刀邊、麼啡開此藥水可免變壞之患。

論列 但此藥雖有緩胃之功亦不宜多服。服多反令胃腸不安打噎氣胃不消化所泄下亦有此藥味。至藥內之油

入血內如何變化雖未能核確其促心脈而長身之熱度以致呼吸改常足見藥力之一端故平人服之必軟弱無力懶言思睡且藥之氣息由內達外或隨汗而出或由氣管呼出或由大小便洩出小便內數日尚有藥味臭惡難聞論鼻吸與內服功力不同惟氣管內皮受鬱呼吸緊速則吸與服無異。

咖啡樹 產於南亞非利駕亞喇啤亞印度等國野生者樹高

二丈至二丈餘園種者則截去頂枝樹僅高五六尺耳

形色 所結之子每個內有核兩枚核長二三分半圓半平平處有瓣裂色灰其核未炒時質甚堅實入藥要炒至棕

黑色乃可用炒透質脆搗研亦易

氣味 炒透味略苦嗅之焦香

考覈 此物內函有咖啡精功力尤峻

功用 解酒毒及解吸鴉片煙過度者西國人以之代茶或

和以白糖牛奶晚間飲之但太濃或飲多反致胃不消化

不能寧睡

咖啡喉

製法

咖啡炒透研末，沸水煎之，加入鉛霜過輕礦酸，再加入輕淡水煎乾，俟其結珠，即是藥也。

形色 白色似針之幼珠。氣味 嗅之無氣息，味略苦。

溶化 此物雖餽亦不變壞，惟水或火酒能化。

服法 每服半釐至二三釐，和白糖服。

功用 補腦開胃。

主治 凡大熱症退熱初愈時服此甚有功效。凡頭痛者，每

半點鐘服一釐甚效。

火酒 製法 即以葡萄甘蔗等類取汁，或以穀麥發芽亦可。

第該物須具有糖質者方堪作釀若薯米亦可入釀者緣其函
有漿質而漿質則可遞變爲糖也釀時作沸乃發出炭氣而然
釀成加甑即可提酒蓋酒不須水沸之度乃卽沸而化汽上騰
可離糟粕升出

考覈

但該酒恒溷雜質必須用法濾淨連甑三次方成爲濃
火酒也此酒每百分內函水一十六而實得醇酒八十
四乃藥肆中通行之品欲再濃者須於購時酌加顧該
酒與水及伊打無論多寡皆能相合而且與水相和其色
弗變若酒之內函水者多則重少則輕故以驗酒尺探
之自知酒之濃淡蓋酒本輕於水嘗以二者比較如同是

一瓶在水一百兩而在酒亦只八十二兩耳且水受熱至一百度乃沸而酒則受熱至八十度卽沸按此可辨且該酒能化汽升散無水者名爲酒精遇火能焚燒時不作煙煤焚後復無灰滓其與油薪等物有別大抵焚時則化爲水及炭氣也

形色 無色過光 氣味 臭香烈而味辛辣濃者不堪入口

功用 行血提神其能令人醉者實在酒精之力也 濃者惟

利於泡藥蓋能熔提藥內功用之質也 尋常方劑所用

淡火酒亦有定率蓋以火酒清水各半而相和者也若欲

從中加減亦須註明方內

化物 若以火酒化各物亦不一致 其在硫磺燐質則祇化

些少而在碘質及輕淡水則可化殊多且鍊養及鎔養亦

皆可化惟鍊炭養與鎔炭養則不能化耳 其在植物之

類如炭匿酸樟腦樹蕊樹脂與夫各種可飛之油及番麻

等物則俱能化 其在油類亦均能熔化少許而惟蓖麻

油則化略多 其在酸類則有可相和者且有與酸類相

合而成爲伊打者 其在鹽類則除矽沙之外凡能發潮

者皆可熔化若發燥之鹽及水所難化者而火酒亦不能

化 輕淡綠鹽及水所能化之各綠氣鹽則酒多可化淡養

酸合底類所成之鹽亦間可熔若礦養合金類所作之鹽

則又非火酒所能化也。

慎用

若濃酒而驟服過多，則毒甚。將見或發昏，或傾倒，而面色忽轉青白。淡酒服後，亦能令脈數力雄，精神提振，迨酒力過後，則神倦身疲，各腑汁液略少，而頓覺口渴舌燥。

醉者往往胃發熱難化
食者甚肝體發熱而腦亦壞

所以凡用火酒者宜知其詳也。

雜用

他如生物遺體，而以火酒浸之，又能經久不壞。

菩提酒

此酒製自呂宋及法美等國，有數種，或酸或甜，或濃或淡，不一。而要之，均有火酒功力在內。

形色

或黃或棕。

氣味

其臭香辣，其味酸甜。

若覈

比如該酒一百分，其內函有火酒七八分者，此則酒之

淡者也。其內函有火酒二十四分者，此則酒之濃者也。
然要以內函十五六分者爲通行之品。

功用

行血提神

服法

每服一酒杯或兩酒杯

主治

身弱胃不消化宜服

病後熱退可服些須蓋與服補

藥同科也。

宜忌

身有大熱、舌焦、喉渴、腦痛譫語者均忌用。

啤酒

製法

麥子
米
槐花
或加土的年
或加瓜沙以製成者
也。此酒內每百份有火酒六份或有火酒四份二三份不等

形色

氣味

功用 凡熱症退後身弱者或割症後或大膿瘡日久流膿過多者皆可用作調補之劑

宜忌 凡六熱症身熱時或發炎甚少用此必俟熱退炎消病勢漸愈乃可用

伊打酒

製法

此蓋以火酒及濃礦強水同甌而用法製成

者也但須加銚養水再甌令除去礦養酸且以清水和勻而復甌之務使火酒去清庶得純淨此乃淡伊打酒也 欲製濃者卽以此酒貯罐加入銚綠石灰撒勻少頃俟伊打酒上浮隨卽倒去其餘則用火再甌以甌濁一半爲度此卽濃伊打酒也

但
還

火最易變故需所用一切器皿
必須繩可合
武庫舞吉之弊

形色

此酒無色其清如水

氣味

臭香味辣

此火酒
苦

覈驗 輕於水四分之一大抵受熱至一百零五度而此酒卽沸若斟入掌內旋卽飛去而並令掌冷且當此酒氣與天氣相和之時而或近火則將突然而焚儼如火藥轟烈所以凡近火處不可妄斟此酒

功用

行血行腦氣服後先覺腹煖次則臟腑亦煖

服法

每服宜用一地廉量加白糖調服

主治

婦人身弱頭昏宜服腹有風痛服之可治或嘔吐

或打息逆

體打

服此亦能止用療氣喘間獲奇效

外治
嗅用

牙爛作痛用此酒化樟腦隨以綿蘸塞入患處分娩

艱苦嗅此亦可止痛。產婦或遇筋抽尤宜嗅之。月經作痛嗅此可治。顛症夜不安寢嗅之可安。腦筋痛宜嗅此酒及用喝羅方搽患處。腹內作痛如係因生膳淋而致或因內腎有砂墜落膀胱而致嗅此酒均可止。

宜忌 惟老人及小孩不宜嗅。大人虛弱者亦不宜嗅。肺有壞及腦有症均忌嗅。

輻淡炭養 此卽炭強阿麼尼亞也。

形色 新製者色白略過光而不甚堅硬露置則牽吸天空之炭氣而成白散卽化作輻淡炭養也。

氣味 臭辛烈味辣而鹹

溶化 冷水用四倍可化一沸水能敗其力淡火酒亦可熔若置在玻片炙之則質體化氣飛盡

相反 凡酸類底類及鎂養石灰水炭氣蛤利等項均能敗是鹽也

功用 行血發表化痰解酸及治轉筋並可作吐劑 若論其行血之功乃令心經發力而非補腦也

服法 每服八釐每二分半若服至五分則吐

服驗 此藥連服日久能令頭頂四肢及外皮作癢

主治 凡病後氣虛血弱者宜服 胃有酸腹脹作痛者

多宜服 小便頻數尿味變甜者此症一
名糖尿病宜服 肺熱將退

者宜服 飲酒過度者服之能補胃 患羊癇症者服此亦妙 久咳者每服三釐至一分 麻症初起者每服八釐每兩點鐘一服 紅疹似麻及患癬症者服之均驗

方劑

一方

治暇症心經有病服之良 外嗅其氣亦能

提神

轎淡炭養

一分四釐

鋤鏹葡萄散半釐

八角水

一兩二錢

利勻作一服 彼頭困或驟跌發昏者尤宜嗅之

作香鹽法

轎淡炭養鹽

一瓶雀粗
兩地廉半量如無
未生紡末

丁香油

一地廉量

臘芬大油

一地廉量

巴機密油

兩地廉半量如無
另種膏奇

輕淡水

十安士量

先以各香油和輕淡水攪勻然後滴入輕淡炭養鹽中至
不能食爲止便可製成也功用同上

輕淡香水方

輕淡炭養鹽

八錢研末

輕淡水

三安士量

檸檬油

兩地麻半量

荳

蔻油

四十滴

臘芬大油

十五滴

火酒

二十四安士量

汽水

備足

先以輕淡水加入清水四安土然後以輕淡炭養末投之
另將各香油合而爲一隨以火酒由漸加入置該爲正頻頻攪
動由是以輕淡水與香酒相和再加入清水以合共有三
十二安土爲率功同輕淡炭養凡氣虛血弱者宜之每
服三十滴至六十滴

方論 凡應用輕淡者無論外嗅內服均以此水爲最通行之品蓋外嗅則香而宜鼻內服亦不甚辛烈而易飲也

松節油

製法形色功用詳上利小便篇此專論其行血而已

功用

行血服之能令脈行加快

主治

凡虛熱症身弱舌乾胃不消化腹脹有風身有微熱而非烈者服此均驗更有一種虛熱症數日後而竟致昏蒙譫語及微抽搐甚或大小二便自遺者服此可行血通腦氣而甦且能和血脈而安各經也婦人虛弱腦筋不安服此亦佳

服法

每服三十滴至六十滴加蓖麻油一酒杯和服

如無淨蓖麻油
或和櫻櫻油同

服
可
每六點鐘一服

雜治通用

凡瘧症由腸壞而致者，如症尚未深，服此則猶可治。若待垂危而試，恐難見效也。

肺熱痰塞

服之或效。

鼻衄

每服十滴，每兩

三點鐘

一服服至血止爲度。

嘔血或小

便流血，或大腸便血，每服三十滴至六十滴，和雞蛋白服。

每二點鐘服一次，若用以療實熱炎症，先宜放血，或瀉

或表，然後服此方。安每服六十滴，和白糖水，或和蓖麻油，

及櫟油同服。每日三服，但須實炎將退，而後服之無礙。若熱勢未退，而誤服太速，則必致脈愈數，而病益劇。同日須

兼服迦路米，或鋸錦葡萄散。

外治

倘服此若不能下膈可由糞門外導或以外擦腹皮亦

糞敷驗

外部炎腫先以絨布浸沸水隨卽扭乾次以此

油灑在該布敷之經數刻後或覺難忍撤去可也喉與

肺或發炎症亦宜以絨布仿照前法而敷貼患部或用以

外擦亦妙

火氣

論自然而然之火凡人身體無病則火氣充足而氣血

自然流行卽各腑功用亦覺舒暢此不特人類爲然卽推之畜
類亦然也

論物化

凡物一經變化卽能發熱譬諸用強酸化金類即可
悟其由變化而生火氣也且人當食物消化之後輒能

發出火氣而令身體溫暖血脉運行是火氣之功誠不可少矣

論天氣 試思天氣和暖則能助內臟發液而外皮發汗汗既發而熱自出若天氣寒冷及虛弱有病而人又必須火烘然後身始煖而血始行是可想火氣之妙用矣然則醫者以火氣入行血劑詎無深意於其間哉

外用

第用火氣療症其法有三

一用火氣而烘 一用

水而薰

一則熱水之汽而令體發煖此三法皆西醫所

重也

夫引火氣之法須預備一小房

先着醫署內隨封密處

房外即發

火爐

此時燃火最合天之鑿蓬

隨以引氣管搭至房裏

密閉

使之相通將

見煖氣則騰騰而入也大概按寒暑表受熱至一百二十二度而人之在房中者則面漸熱脈漸數而身亦旋發汗抑受熱至一百三十一度則通體將必發紅而略覺微腫此時則發汗愈多夷居不外受熱九十六度等體得和若過則有弊凡用火氣療症殆莫善於此法也

熱水薰法 其法先將衣服卸去卽坐諸透氣椅上而頸脖之下則以衾圍覆隨用熱水一盤放在椅下薰之水若少冷續加煨紅石卵投諸水中使水之熱汽騰蒸自可令病體發暖也

熱水汽洗 令病者卧於榻上而擁被蓋之其被高由是在榻旁

置一鍋煎水至沸隨以引氣管由鍋裏搭至被裏將見熱

水之汽紛紛透入而病者之弱體亦可令其發煖

此法或用薑
鬱或角薑

生薑或用薑二三足
均可用破之蓋多疊疋已上三法皆能令血氣流行醫者宜悉察也

雜治通用

凡久患風溼症卽宜烘以火氣或用布焙煖鋪之或炒

熟生鹽裹而熨之亦妙救溺死則先去溼衣易以煖衣

隨用火氣烘之務使身體復煖庶易療治小兒麻痘或

未出齊或出而復收宜用熱水薰之以助其出皮膚生

鱗而致污垢者宜先薰以熱水後用藥塗且飲熱水熱

茶或用甘菊薄荷煎水而飲均能令血快行並令小便及

汗多發葛根一用煖水浴身大約受熱至九十度或一

百度便合。凡浴以暖水，不特去其污垢，及令患處塗藥易入。彼皮膚症或生鱗或結膿，即以暖水浸之，能令患處血行，而鱗膿盡去。月經停滯及患白帶，用水節納，暖水射入前陰。大便乾澀，及患紅痢，亦用暖水射入糞門。一用熱水浸身。凡浸身者，該須用一
六插此法可療多症。大約受熱至一百度，或一百一十度便合。凡工作疲倦，宜浸以熱水。腹痛吐瀉，亦宜浸以熱水。久患風溼，及顛狂等症，用熱水浸之，良。小兒筋抽，卽以熱水浸之尤妙。大小便痛，及溺不能出，月經不調等症，用熱水浸下身。傷風及頭痛，喉痛，宣用熱水浸足，浸時則以衾圍身，並飲熱茶，自可發表。

論止痛寧睡之劑

凡人痛不止、寢不安，則每易損身。此止痛寧睡之劑所由重也。大抵該劑屬脂，服少許，則能令血行，服略多，則能令腦安。身安，睡可寧，而痛可止。若服過多，則反令沉睡，而莫能喚醒也。蓋該藥多屬毒品，醫者用之慎，毋過多。凡止痛寧睡，當以鴉片及綠養冰爲最。惟鴉片服後，則能令各臟津液減少，大便乾結，而瞳人亦縮小也。閼羊花、佛茄兒及顛茄等藥，亦能止痛寧睡，而究之功力遠遜。且服後，能令眸子散大，惟不至大便乾結耳。

已上各藥功用，正宜分晰。若夫病者之痛不一，有宜於服是劑者，亦有不宜於服是劑者。醫者於此，又須細辨，毋謂凡

遇有痛概宜服也。蓋忌服此藥者亦不一端。一孩稚不可
安服。一孕婦慎勿過服。一凡腦有炎者概勿服。他如慣
服此等藥者，又須略爲多服，方能獲效。譬諸有煙癮者，若祇服
鴉片輕劑，殊無效驗也。此種藥宜服在晚間，若身弱而症重
者，服此應由少漸加，不宜急躁。且用是藥者，其法有三。一
由口服。一以藥化水，用水節射入肛門。一用小水節刺入
皮內，而以藥水射之，均妙。

鴉片

此物以產土耳其者爲上次則印度再次則中國

割取

該樹莖高二尺子在囊中囊形墮圓而扁徑二三十囊即有汁流出凝粘殼外次早收取其汁而再割之以間日一割爲度可割六七次由是將各汁積聚器中而結成大塊此卽鴉片土也

形色

囊嫩色綠者汁多乾老則少汁在殼不在子而子無功

辨別

力故割之宜淺勿令穿破汁色白如牛乳曬乾則變稷黑考其樹原產波斯今西國通用者則以土耳其與埃及之所產爲重也若入中國者多產自印度但印度所產原

有二種一作球形而大如柚者此則俗呼爲公也一作餅塊而無皮者此則俗呼爲白也彼產自雲南者亦呼爲白然功力之峻烈則究以公爲最至若將業經取液之囊熬水成膏而用以攏入此則屬最下之品也

上內
形色 棕黑稠如膠露置漸成堅硬若作散其色棕黃

氣味 味苦辛臭腥悶

溶化 此散入火可焚清水淡強水及火酒均能提其功力而伊打則否火酒能鎔五分之四清水或溶四分之三而水所化者亦呈棕色

考叢 其質內原函有鴉片精十餘種如摩啡高底亞等葛定

美幹泐酸等類乃最顯著者也但功用究以麼啡爲最大評論高下卽以函有麼啡多寡而定其品蓋麼啡多則力峻而價昂也且鴉片每百分則以函有麼啡六七分者方堪入藥若過少便不足用曾覈土耳其所產之鴉片每百分函有麼啡十分者上等間有函至十五分者至摯葛定則鴉片內函多少不等少則每百分函一分半多者函十分

覈取

法用熱火酒

須以姜煮熟至
至三分微

六十分隨以鴉片十五分投入

浸泡濾淨取汁復以熱火酒

置

熟四十分浸其餘滓隨用麻

布絞搾取汁而與前汁和勻再行濾淨加入輕淡水四分

貯十二點鐘久俟結珠置麻布上而以水淋漂數次卽貯於水盤中如此則所製得之物內有二種一屬擎葛定此則體輕而上浮於面也一屬麼啡此則體重而下墜於底也若取墜底者提去水溼焙乾最爲上品彼上等鴉片每十五分可得麼啡一分或一分半然必須產自土耳其次其麼啡方有如是之多若產印度中華等處則不及也

標驗此等物聯質太雜查驗不易惟麼啡及美幹泐酸二種究爲他物所無如覈物內之函有此二種者卽知其溷有鴉片誠以鴉片中方有此兩物也覈美幹泐酸卽將所

試之物用水開化加入鐵綠酒其或變紅色則約略內函
美幹泐酸然不論色變與否而將水瀘淨多加醋強鉛水
倘有鴉片則美幹泐酸與鉛相合而作鹽墜底其所餘之
水則函有醋強麼啡及醋強鉛由是將其水入以輕礦酸
氣使作成礦鉛隨卽瀘出然後將水煎去輕礦氣分作三
竇如此則自有法可覈出麼啡也其一加以硝強水令
麼啡變作紅色其二加以碘養酸則麼啡敗卻碘養而
水變棕紅抑或有漿溷雜則水成藍色其三逐漸加入
輕淡水倘或成鹽而鹽卽麼啡且復多加以輕淡水或鍛
養水倘復鎔去即可定爲麼啡也蓋麼啡珠合硝強水則

成紅色合鐵綠水則成藍色此卽麼啡之確據也。一法

加入炭匿酸則麼啡與酸相合而自結珠

毒化學初階卷四醫學幹筋酸在第一百五十一節腹壁

第一百至五百

功用

能止痛補腦平腦。平人略服則益腦提神而令脈快

有力遍體筋肉皆覺收滯惟腦則受功力最多故至略醉
然未幾而醉氣胥捐自覺心神舒暢而忘卻平夙經歷之
苦於是越三四刻卽睡越四時始醒醒後頭昏喉悶倘
不繼服則越二三日而復如平人凡鴉片服後則內腑汁

液略少而皮外汁液反多能止痛而緩筋彼四肢不安者
服之可忘且服鴉片若未及致睡之分兩則精神提振而

腦筋肉筋發力略久自覺不能酣睡也若過服則未久卽
睡歷半日或經日而始醒醒後則身驟弱而腦幾不能主
體其脈慢而無力其目倦而欲睡睡後難醒醒後忽仍再
睡鼻息作聲倘當其痰凝氣管而突然呼醒則又將神昏
而譫語也若夫誤服過多係自取滅亡者始則頭昏繼則
不醒人事脈沉目閉眸子收縮將見逼身不能運動而呼
吸欲絕久之則痰塞氣管而呼吸極其艱辛面白唇青呼
之不醒如此則或五六點鐘或十一二點鐘而氣絕矣但
已上所言皆作藥服而非吸食也

論止痛 此物首能止痛蓋症有多等痛不可當者服此可止

臟腑發炎作痛先用涼劑去炎隨用鴉片止痛甚驗惟身
尚有大熱者俟熱退方可服也心痛腹痛係由胃不消化
者先服吐瀉等藥後服鴉片而痛可止若膽淋及內腎淋
等症作痛先以熱水浸身次服鴉片止之小便痛及婦人
經痛亦先以熱水浸下身而後服此庶易全愈牙痛耳痛
眼之良或用綿蘸鴉片酒塞入患處初患風溼時或作痛
服之可治或用鴉片酒射入糞門有等毒瘡雖不可療而
當其痛劇服此亦可緩痛

論寧睡 有等症不能安寢及憂勞過甚夜不成寐者服此能
治甚至或發瘋顛或發酒顛而竟夕喧嘩者服之亦可就

寢

論平腦 且鴉片能治抽筋，蓋該症有由羊癇而發者，有因產後而起者，要之抽筋一症，實由腦力妄發服此即可平腦。至於能止瀉嘔，及可發表，止咳，止紅白痢，亦足見鴉片之妙用也。

論調佐

他如服別藥而仍貴以鴉片加入者，其妙有二：一能禁止別藥之烈，一能助起別藥之功。如服各等瀉劑，而貴加些鴉片者，是以鴉片制其猛烈也。如用迦路米汞藍丸等作改病劑，而必合鴉片同服者，是以鴉片助其功力也。如用衣畢格作表藥，而必偕以鴉片者，是以鴉

片助其發表也如用樟腦療痛而貴加以鴉片者是以鴉
片助其止痛也

宜忌 顧鴉片一物惟身熱腦炎大便艱澀及內腑將作炎症
者均宜忌服

外治
通用

用鴉片之法除內服外或取以化水用水節射入肛門
或用小水節刺入皮內隨以藥水射之均獲功效 止痛
寧睡及治各症每服一釐或二三釐若有煙癮者宜重服
然或多服而仍不應則以藥水由肛門射入立驗 嘔吐
不止及大腸痛內又胃痛膀胱痛等症亦宜以藥水射入糞

門

相反

石灰水 炭匿酸 鈦炭養 鉻炭養 鉛銅錠鐵汞

等質所製之藥

鯪茄

丁刀邊

咖啡

相佐

酒 綠養冰

佐平心力草烏頭

黎蘆

路卑利

方劑

一方 止肚痛

鉢養 或鉢淡養

三錢一釐七或三釐四

麼啡

一釐七或三釐四

香散 一錢

和勻分十二包空肚服一包和粥水或牛奶服

附香散方

丁香玉桂等類合成者

方論

凡紅白痢宜先服大黃等類以去其積滯後服鴉片丸
或鴉片酒或麼啡均效。論止咳凡乾咳無痰者方合如
痰多用此恐至痰塞氣管宜佐以化痰藥爲妥。如鴉片表

散是也。

覺世子評曰試思鴉片一物俗名罌粟又名米囊時珍采入本草其花名阿芙蓉汁液名阿片治久痢脫肛爲丸可止脅下腹痛今觀西藥亦用是物療症止痛但西醫不僅徒知其益更能預防其害旣考別其物理之當然愈窮極其物性與人身之所以然詳讀上文服後入腦情形足見體驗功深非格致精微之學具憫世濟人之衷曷克臻此故能用此治病畱心撙節不令病者久服以致一患除一患復生之弊慨夫衣冠下士搢紳濁流短榻橫陳忘形脫略或以燈燒而吸或以爐炭而吹甚者及其二沙三沙終年如是晝夜相沿癮重

者四肢柴瘠骨瘦筋疲無志營生家財消耗既顛倒平晨昏
又暗竭其髓海蓋腦部既涸五官百骸無非受病如朝廷昏
蔽於上賢才屈抑於下而欲久安長治得乎緬昔通商互市
海水羣飛烽起一燈毒流宇內致令多方設法明禁之而不能
重稅之而愈盛真乃飲狂泉而逐臭升厝火於積薪不啻長
沙痛哭年也而尙忍心蔑理甘之如飴者不第仇忘君父
居然嘯傲烟霞是真全無心肝空負栽培高厚有志斯世斯
民者當如何禔躬飭已使之返樸還淳勤儉風行雖賞之羞
慚不吸古聖王帥天下以正不令而從蓋徒託空言總不若
徵諸實政之捷如影響也更有無知婢妾吞膏殞命者不勝

枚舉願諸君未食者切勿逢場作戲誤墮迷途既誤者及早猛醒回頭齊登覺岸實自愛愛人之道也大造生成一物自有一物之用亦庶乎無憾焉矣

鴉片表散

製法功用已詳土文發表第十篇內茲不再述

製鴉片丸方

鴉片土

一錢研末

番鹹

二分

以水調勻作丸六十顆

按此則

九內約有鴉片一釐七也

主治功用與鴉片同每服一丸

鴉片酒方

乾鴉片土

二兩

火酒

十六安士量

清水

十六安士量

先將水浸鴉片三日夜，每日攪數次，然後加入火酒，再浸三日濾，攬餘滓，則復用淡火酒漂淋至前後共濾得三十安土爲度。每服十五滴至三十滴或四十滴。

樟腦鴉片酒

製法

乾鴉片土一錢
辨佐匿酸一錢
樟腦七分
八角油

蜜糖二安
淡火酒三十
安士量

以上各味和勻浸

七日濾淨，每服一錢至二錢。小孩咳瀉腹痛，每服五滴至十滴，蓋此酒不甚峻烈，乃西國最通行之品也。

鴉片苦提酒

製法

乾鴉片土一兩
六錢

桂皮末一錢

丁香末一錢

苦提酒

西藥界釋

卷三 止痛寧腫 樟腦鴉片酒 鴉片苦提酒

七

十六安
士量

和勻浸七日浸畢入路器濾隔由是再加些酒
至濾淨共有十六安土爲度每服六七滴但此酒之味比
上方略濃兩倍多作外用而甚少內服

功用

久患眼熱及有膜者加水冲淡滴入眼內

無臭鴉片酒

製法

乾鴉片土

兩安土
研末

伊打酒

八安
士量

火酒

八安
土

清水

足
用

先將清水八安土浸鴉片末足十二個時辰搘盡其水再
換清水八安土浸如前搘盡其水二次之水和併一處煎
至濁四安土爲度俟冷加入伊打酒八安土和勻貯好俟
伊打酒升騰浮上將上面之伊打酒傾出然後再煎至伊

打酒之氣息全無加入清水二十安土用紙瀘隔後再加
些清水取足二十四安土爲度乃入火酒八安土以樽貯
密卽無臭鴉片酒也

氣味 較鴉片酒略淡

功用 與鴉片酒相同

相反 與鴉片同

磨咗
製法

鴉片土十二兩
切薄片

鉢綠六錢

獸炭二錢

輕淡水足用

汽水足用

先以汽水四十二安土浸鴉片土十二個時

辰將水傾出貯好換加汽水四十安土浸如前將水傾出

和初次之水同貯復加汽水如前法將其渣內之汁搾盡
用隔水法將前後三次搾出之水炖至臘二十安土乃止
用布瀘隔又以汽水四安土和鉛綠一併放入隔淨之鴉
片水內再煎至冷定可成實體爲度俟冷時以布包兩層
用重力壓之壓出之水用器貯好布包內之膏渣以沸水
十安土和勻隔以紙隔時加些沸水隔出後再煎至稠結
仍照前布包壓盡其水又將其渣如前法隔煎包壓至乾
三次搾出之水同貯一器其渣卽以滾汽水和勻加入獸
炭二錢浸三十味呢之久隔淨後以漏斗加些沸水過之
加入輕淡水略多冷定結珠卽磨啡也以冷汽水洗之焙

乾入樽 上三次壓出之水色黑加些汽水及鋸養水以隔之加輕綠酸略多和勻以獸骨炭投入再隔淨加入輕淡水俟冷定能結些沙麼啡

形色

珠形三角不甚長色白過光

氣味

無臭而味苦

溶化

冷水一千分能化一沸水五百分能化一冷火酒五

一分能化一 沸火酒三千分能化一 哥囉方二十分

能化一 甘油二百二十分能化一 伊打酒不能化

麼啡鹽

夫麼啡水既不能化故入藥須用其合強酸所成之

麼啡鹽水乃易化也

功用

蓋麼啡卽鴉片之精而功力尤峻醫家用此實取其服

卷三 麻啡礦養

少而見效大也。

服法

麻啡鹽每用一釐 清水

一安
土量

開化或分三次服或

分兩次服如應服多者須一次服清

相反

與鴉片同

一磨啡礦養

製法

磨啡

八錢
粗末

汽水

八安
土

淡礦強水

足用

先以磨啡末和入汽水再加礦強水漸漸滴至磨啡化盡
但加時不生手攪勻以無酸及無蛤利味爲化盡再以沙
鍋隔水炖之炖去水俟冷結珠以紙澀去水溼微火焙乾
人樽貯密比如用滾水兩安半和磨啡八錢淡礦水足用加人時
不生攪勻則不用再煎後自然燒鍊仍須燒乾方可

形色

似針之珠色白能過光

一氣味

味苦

溶化

水二能化一、火酒多於水乃能化一、甘油五能化

一 伊打酒不能化

服法 每一釐七分五次服至兩次服

評定

論各種麼啡鹽以此最爲通行

方劑

一方 戒洋煙

麼啡礦養

三釐

金雞衲霜

五釐

丁香末

二分

桂皮

末

二分

清水

五兩

和勻，彼有煙癮者，其始早晚每服

五錢，越兩日早晚每服三錢或二錢，以漸減少，至服畢，則

癮可斷。若作丸，則除去清水加糯米粉及甘草末和勻

爲丸三十粒，始則朝夕每服三四粒，由漸而減，俟至服完

卷三 麻啡輕綠

煙癮自脫，但麻啡須用之有度不可過多，誠能依此戒之，自可斷癮，若多用則反難戒也。

麻啡輕綠

製法

麻啡末

八錢

汽水

四安

土

輕綠酸

足用

製同麻啡礦養

形色

珠白細如絲或三角長珠

氣味

苦

溶化

冷水二十分能化一

沸水一能化一零

凍火酒六

十分能化一

沸火酒十分能化一

甘油十九分能化

一伊打酒不能化

功用

服法

同麻啡礦養

麻啡醋鹽

製法

磨啡八錢 汽水八安 醋强酸足用

土

製法與磨啡礦養同，但煎去水時須煎至如糖水之稠，俟其冷結珠。形色 新者色白，貯久色變黃灰，終則轉爲棕色，不堪用。要再製方合用。氣味 味苦，微帶水醋之氣，息貯久漸漸失卻醋強酸，故臨用時酌加些醋強酸，令其易化。

溶化 水易化，火酒化之略難。哥囉方六十分能化一

伊打酒不能化。

主治 外用節射止痛。凡腦筋痛劇，諸藥固效者，宜用此。

磨啡醋鹽八釐半 清水一安 土量 調勻

凡用以節射入皮裏者，始則約用十滴，以漸而至十五滴。

每日射一次或兩次如此立能止痛較勝於內服也且此法有宜貼近患處而射者有不必貼近患處而射者均能見效

總論

以上所用麼啡三種皆屬通行之品另有所謂數種一麼啡雙味哥瀝鹽一麼啡輕溴鹽一麼啡炭匿鹽和甘油一麼啡輕碘鹽一麼啡甘松鹽此數種不甚通行姑存其名耳要之內服用麼啡既比鴉片省少而以麼啡水射入皮裏又省少於服也

高底亞礦養
製法 其在以鴉片製取麼啡之時尙有高底
亞在內須設法取出

形色

氣味 味苦有蛤利力

溶化

沸水十七分能化一 冷水八十分能化一 火酒伊

打酒能化 功力與麼啡同而略遙 用四釐可及麼啡

一釐

功用

止痛寧睡而寧睡尤勝於麼啡 寢寐安恬絕無煩躁之

患

相反 與鴉片同

哥囉碘

製法

哥囉方

四安

麼啡輕綠

二錢

輕炭淡酸

二錢淡

薄

荷油

十滴

磺強伊打酒

一安

糖水

四安

些的

甘草膏

兩

安

半

火酒

四安

先以火酒化麼啡及薄荷油後加哥囉

酸加入

形色 色黑 氣味 香甜

服法

每服十滴至三十滴

每一錢內有
磨咗一釐七

功用

止痛寧睡止嘔止瀉但用此極宜小心謹慎切勿過服

多服也

加味伊打酒方

伊打酒

八安士

火酒

十六安

伊打油

六地廉

三味和勻

形色

無色見火易焚和水則略渾濁因在內有油故也

氣味

氣香味頗甜辣

服法 每服三十滴至六十滴和水飲之

功用 行血氣止痛但有身熱時勿遽服 凡腦部不安睡不

寧及腹有風者服之均效

附伊打油製法 用火酒礦強水清水伊打酒和勻用法製成者

綠養冰

西名咭
噶利

製法

先以醇火酒貯玻樽次用法令綠氣入火酒裏如此則兩物相合俟略久則成爲綠養冰

考覈

覈以化學詳此物質乃炭輕綠加輕養也若無輕養在

內似油之流質重過水一零五有輕養在內卽聯珠爲綠

養冰若和火酒銑養燶熱則轉凝銑蟻鹽

形色 聯珠爲塊人清水能發出似油之點

氣味 其臭辛烈其味另成一種乃邇來新製成者也

溶化 和水燶熟能化若以珠炙熟則熔而化氣升散故可飄

功用 寧睡安腦彼患病腦不安睡不寧而服此可治

叅訂 他如麼啡一藥雖亦寧睡惟服後則各臟津液未免減

少卽大便亦未免乾結若服綠養冰則無此弊

主治 凡腦筋骨鉗有痛及割症傷口發痛服此可止 喘

服之而氣亦順 筋抽及狂症服之能安腦 婦人臨盆

服之能止痛

服法 此藥每服一分半至五分加白糖調水服惟初服者六分

不宜多用以漸加之可也

枯奴頓冰

化學覈出此物質炭輕綠養加輕養也

形色

若輕養在內形似油無色重於水加輕養則結珠成片

覈如銀繭

氣味

臭與綠養外相似

溶化

火酒甘油或熱水皆易化 冷水難化

功用

止痛寧睡安腦與綠養冰同 面部之腦筋痛尤效

服法

每服三釐四至二分半用多水調服

主治

婦人作悶頭痛服之痛止每服八釐半每三點鐘一服

鍊溴 製法略同鍊碘、形狀亦相似。

形色 白而不過光，其結珠則作立方形。

氣味 辛而鹹。溶化 冷水能化，而沸水所化尤多，惟火酒
祇化些少。

覈驗 法以鍊溴入玻璃樽用水化之，加入綠氣水少許，由是再
將伊打酒加入攪勻，將見伊打能化溴成紅色，而自升浮
也。

功用 此亦入改病藥，略同鍊碘，服之能令各腑多發津液及
能平腦，若過服，則頭昏痛，奄奄欲睡，而足脛亦將失力。
服法 每服五釐至二分半，用水中化，每日三服。

主治

夢寐不寧及狂症夜不安寢者服此能治 且服是藥

能禁慾火及治遺精每服宜用三分半日服三次服藥後

並宜屏除慾念調養身體方驗

肝脾發大每服五釐至

分半

癩症腦體未壞者服此可治 白濁及婦人月經

過多宜服

小兒或疳積或筋抽均宜服

疔後皮膚發

症亦宜服 初起羊癧輕症服此最效

方論

至若瘻癰癰癰等症其藥力不及鍼碘故醫者多捨
是而用鍼碘也 凡用此藥瘻症必須久服方獲功效若

偶服之殊無徵驗

作藥膏方

鍼溴

五分至二錢

淨豬油

八錢

攪勻外塗功用同上

正統

卷三

改病藥論

凡人體內體外或久患病症或久患疔毒而服藥能漸除者卽謂之改病劑也。顧改病名藥類多酷毒尙或多服輒能壞人且此藥與吐瀉等劑不同。蓋吐瀉等劑乍服卽驗而此藥則久服乃效所以凡用此藥者宜少服亦宜久服然後有濟也。大抵該藥服後或在腦或在血或在臟腑等處而徐發其功如鏡質功力則多在腦處而發如汞藥功力則多在臟腑肌肉等處而發如服碘質其功用固發於臟腑肌肉而尤發於體內肉核如服僵質多則能令血薄肉削而少則乃獲其效然則改病之劑不一豈得渾視而弗辨醫者須驗其究屬何症究宜何藥而

後能奏效也。服藥後切宜戒口，須擇其合宜者食之。推之寢室亦宜通爽，毋使陰翳。四肢亦宜運動，毋過安逸，而庶易告痊。但華人服藥，多求速效，倘經服一二次而猶未應，旋即棄去，故往往輕忽是藥耳。惟西醫深知此藥之性，務令病者久服，不厭，所以能收其效也。

山水內有蛤蜊力 西國近年覈出山水內有面蛤利力者卽
取此水以治病功力甚捷云附錄於此方用未詳

山水內有鹽類 同上

輜淡

查化學初階卷二第十一篇十九章內 此物本雜質也惟含養氣成蛤利與銻鏑合養氣成蛤利同

論列

此氣功用治病雖未詳述但輜淡綠由此質加銻鏑水銀而成輕淡水又用輜淡綠製就可知化學格物之功於

西藥大有關涉欲精習西藥者不可不於化學立其基也

輶淡炭養

製法形色功用治病俱詳卷二行氣血門第一篇

內茲選入改病門方劑俱仍舊

輶淡甘松鹽

製法

甘松酸 輶淡綠 石灰

和勻用法將輶淡氣放

出入一樽內該樽先貯甘松酸使之相合卽成鹽

形色 成四角珠無色

氣味 臭如甘松酸味甜辣

溶化 水及火酒能化

功用 改病止痛寧睡

主治

腦氣痛頭痛腦不安夜不能睡心跳等症

服法 每服三釐四至一分七釐

輕淡燐養

一製法

燐養酸

二十
安士

濃輕淡水

足用

以輕淡水漸漸加入燐養酸內加至輕淡水略有蛤利味
然後煎乾再和輕淡水少許至仍有蛤利味爲止收存結
珠速以紙澀乾入樽

功用

改病

主治

風溼尿有酸者服之甚效

輕淡水

西名亞
磨尼亞

製法

輕淡水

西名亞
磨尼亞

製法

改病藥譜

輕淡燐養

輕淡水

丸

石灰 四磅 輕淡綠 三磅

共和勻倒入鐵槽隨將樽坐

入沙釜 由是復設玻璃四箇分列次第

在第二第三者宜用
之樽第四者用一日常樽

即將通氣玻璃一一插入各樽之口而並以象皮管鑲連

蓋其五
相通氣也其第一第二之玻璃不用貯水第三者則貯水三十

二安土 量歸須
大分別鑄第四者則貯水十安土 量佈置停妥即在沙

益之下用火燶熱 益加火燶至藥氣
貯入第三玻璃爲度令藥氣由鐵樽發出先透

過一二三之玻璃然後透至第四如此則可成爲輕淡水
也 製成後其玻璃之第四者則屬淡水而玻璃之第三

者則屬濃水蓋內有輕淡水四十三安土也

又法 用瓶裝水所裝之水加入礦養水先行和勻次以石灰

又法 用氯氣水之水加入礦鹽水先行和等於以石炭
調水調至略稠然後一併攪勻入鑄仿照上法製之 大概用此法者其價頗廉而且可用巨鑄多製輕淡水也

藥肆所售者多屬如是

形色

形同清水比水還輕試以三者比較大約在清空重一千分而在些濃淡則重八百九十分藥水則重五百九十分而已

氣味

臭味殊辣

濃淡

此藥水其濃者每百觔內有輕淡氣三十二觔半其淡

者卽用此濃水一和以清水二便可製成

相合

若與酸物相合則又可成爲鹽品誠以此水原屬蛤利

之類也

功用

療症功同輕淡炭養內外用之均能獲效 若以濃水

方劑

一方 外用搽風溼骨痛甚驗

輕淡水

安

白欖油

安或
星油亦可

凡腦筋作痛布蘸藥水敷

上

紫潤約五
分便合

外用銅片壓實片刻

或以綿蘸此水敷之隨

用小標蓋密令皮發紅爲度二法均妙

心口痛及喉痛

宜以布蘸藥水敷其胸脅或外塗亦妙

氣喘以些少搽

喉亦可略止

毒蛇咬傷宜服淡藥水十滴至二十滴每

半點鐘一服並外搽傷口

蜈蚣咬傷及被蜂蟄卽用此

藥水一生油一鴉片酒一三者同重和勻塗之

凡以此水療症均宜

用淡不宜用濃
否則反以貽害

輜淡醋水

製法

醋强酸

十安
士

輜淡炭養

三安
半

清水

五十
安士

先以輜淡炭養研末放入醋強酸內加至無酸無蛤利味
後乃加入清水卽是藥也

形色 淸如水無色

氣味 酸嗅之刺鼻

功用 改病

服法 每服一錢至一安

主治

礦養酸

硫磺

山水內有硫礦味

白

輶淡香酒

即輶淡
香水

製法形色氣味功用服法主治均詳卷行

血及氣門第十篇內茲改病門亦可通用故再列之

礦養酸

製法形色功用服法主治均詳上文補藥門第十

篇內矣茲改病門亦可通用故再列入

硫礦

形色氣味功用服法主治均詳上文瀉藥門篇內矣茲

改病門亦可通用

山水內有硫礦味

西國中國皆有此水 功用略同硫礦

碘質

西名挨阿頤

此物原質也由鹹洋草灰甌製而成

形色

作片珠色頗黑略返光如金類燬熟化氣即呈紫色露

置則旋化散

氣味無臭味苦濁

溶化

清水難溶每七千分方能化一若以鍶碘水及伊打火

酒均能鎔化

功用

碘質服少許可作補藥及改病藥服後則胃自消化全

身覺有補益能令內腑多發津液及口生涎

慎服

但此藥性甚烈多服則能壞人若服七釐至一分而喉

即緊悶及腹痛作嘔凡服碘劑若覺有此徵者即應停服

服法

服此藥者照三方次第輕重切勿增減爲要

首方 碘片

一釐半

銕碘

二釐半

清水

八安土量

和化初服每日

宜分三次共服此水六安士歷十日後則加至每日共服

八安士

次方 碘片

一釐半

銕碘

三釐半

清水

八安土量

和化既服首劑

歷二十餘日之後宜將此分開三次限一日服盡約以照

服十餘日爲度

三方 碘片

二釐半

銕碘

四釐半

清水

八安土量

和化亦宜分三

次一日服盡惟已服首次劑後方可服此須服至全愈爲率大抵雖遇極重之症亦不宜越此分兩也以上三方

所用碘片銕碘係由漸而加多凡患各種雜症係因疔毒

而致者，服此甚效。昔有法國名醫嘗以此法療人，而屢經應驗者也。

外治 三法 或作藥酒外擦 或作藥膏外塗 或以碘片

化氣而薰患處。如用碘酒、碘膏外搽皮內，而覺有針刺及作紅黃色，此乃碘質透皮入血而然。惟連搽數日，其外層之皮則漸次而脫。**碘酒方** 碘片三錢 鍶碘一錢 八分

半 火酒十九安士量 和化此酒可入服劑，並可外搽。內服

則每次自五滴至二十滴，加水沖服。外搽則能治癩癰脫皮，癬骨，骨鈍腫，俗名鶴膝 及由疔毒發出各症。

碘膏方

碘片

五分

鍶碘

五分

火酒

六十

淨豬油

一兩六錢

法先以碘片銻碘和酒研化復以猪油加入研和至若以碘氣療症與其用氣之熱者不如用氣之冷者蓋以碘質炙熟化氣而由呼吸入肺則不免作喘及令肺之內皮發熱惟吸冷碘氣者庶無害礙並可療久咳及內傷暇症法以碘片三分四釐貯入大口瓶內基瓶以龍膽清水三鬱爲度令病者在瓶口吸此藥氣每日吸一百日自可獲效

服驗

凡內服碘劑及外塗碘質而欲覈其是否入血則有一法法以紙蘸漿水晒乾隨將紙以試曰津或溺亦可倘紙色由漸變藍即可驗有碘所存故服碘劑者宜連日內食忌一切米薯具有漿質之物蓋漿質喜吸碘而相合也凡

服此藥宜在飯前一點餘鐘 服碘劑後若覺有腹痛作
悶則應略爲減輕或加鴉片少許和服若大便乾結則應
兼服瀉劑然或作瀉略多則應兼服止瀉藥

主治

癩癰症宜以碘酒內服外搽但須小心不可將皮擦破
倘癰已略潰宜搽淡碘膏若潰已久宜洗以碘酒並內服
碘劑 凡患各部癩症者恒多血質虧壞縱有子嗣其背
骨及手足長骨亦多軟弱而微曲耳流膿水眼發虛熱等
症患此症者甚難除
則瘡而有體也 倘各症有其一均宜以碘合鍊碘和水服服
鑑
並宜以碘酒外塗眼蓋 療癩癰眼膜方 碘片一
釐 鍊碘二釐 清水半安 和化滴入眥內 痘疔初起

宜外搽日久疔毒入骨須外搽及內服。毒瘡係由疳疔起者宜外搽淡碘酒並服碘劑。日久潰瘍先以藥膏塗患處隨以布夾碘末二三釐蓋上其布面則再蓋錫薄令碘片不能化散自可治也。婦人氣癰初起內服外搽甚驗。昔有西醫嘗以碘質療是症者凡一百二十名其獲痊者八十七獲微功者十而不效者僅二十三耳。乳核硬症宜外搽內服日久可消。病後肝經發大及瘧後脾體作脹均宜用碘片內服外塗。療粉瘤法先以刀將瘤割開令該粉去盡而後以濃碘酒用筆塗入搽畢俟半點鐘或一點鐘久其瘤袋自可鉗出也。厚皮癬千層癬亦

宜以碘酒搓之 水疝經針之後宜以小水節納碘酒射
入此酒得角碘酒 清水三相和如此則能令腎囊內皮發炎而一經炎退其內
皮卽行合連而不復生水

外搽碘水三方 首方 碘片三釐半 鍑碘七釐 清水十二兩
和化

次方 碘片五釐 鍑碘一分 清水十二兩 和化

三方 碘片七釐 鍑碘一分

四釐

清水十二兩

和化 此碘水

分濃淡三種彼患癰癧各症者酌用之可也

又 方 骨鉗發大骨痛及疔毒等症搽之自可獲效

碘片四錢 鍑碘八錢 清水六安

和化此方亦可外塗不能內服 患囊味極濃不可畜用

弔水泡碘酒方

碘片九錢
三分

鋸碘七錢
三錢

火酒五安
土量

和化

此酒不入服劑以筆蘸塗皮上每日二
三次能作水泡

弔水泡碘膏方

碘片八錢
一分

甘油一安
土量

先以碘片四
錢投甘油

中俟化復將餘碘鑊投之俟化盡用以外塗可弔水泡

又 方 鋸碘一分

甘油二分
調勻再加碘片一分攪和以

筆搽在皮上加紙蓋之勿令碘質化氣約歷一
二點鐘亦

可作水泡

外浴方 碘片一錢

鋸碘二錢

清水一百二
十觔

和化凡患

瘻癰等症者卽以此水浸遍體甚驗若以浴小孩則碘及
鋸碘各分兩須減去三分之二至若浴四肢之一則碘藥

及水又應酌用十分之二便合

銻碘 此物由碘合銻養煅製而成也

形色 色白不過光凝珠作立方形能牽吸天氣之水溼而自化
氣味 味辛而鹹

溶化 清水化之甚易以火酒化則不及水

覈驗

法以銻碘一粒放入銅杓隨加濃礦強水數滴燭熱

目能令碘質分出若復將該碘而投入漿水內卽呈藍色也
功用 略同碘質亦可作改病藥並治風溼鉛病腹痛及疔毒

舊症

服法 每服自三釐至分半日服三次以多水沖服此藥能

西藥畧釋

卷三 改病藥論

銻碘

六

療癆癰疔症服法則詳碘質篇內

經驗

疔墜骨痛服此多效昔有西醫嘗以鉛鎘療是症者凡二百五十名每症每日投以此藥三分八釐分三次服每次以清水一兩二錢沖服所有各症約經服三十八日其中獲全愈者一百四十五獲功效者四十九而不驗者僅五十六云大抵服後間有喉涸或鼻流水恍若傷風而且久服是藥或致舌腫作紋蓋人若與是藥不相宜者服後輒多作悶腹痛發瀉然亦有恒服鉛鎘而弗患此者變通用之可也入藥或合碘用之或獨自用之均可蓋碘質則須合鉛鎘方能化惟鉛鎘則用水即可溶而不必區

區合碘也

雜治通用

由疔毒而生骨衣症者宜以此藥合金雞衲霜同服

疗後皮膚起症服此甚驗 水臌係因肝症而致者宜服
面風溼痛係非由腦氣筋者宜服 半身不遂及久咳
症服此藥間獲功效 凡各種雜症係因久患疔毒而致
者卽以鈸碘治之遠勝別藥每服八釐每日三服大約服
至半月或一月方見應驗然或服至一月仍未見功每次
須服一分半或三分日服三四次自可獲效

論列 遷來藥肆所貨沙沙把列藥水其能療治花柳等症而
實因內有鈸碘之力也

信石 此物本靈藥也。由礦採得者多溷雜質。惟甌淨方堪入藥。法以礦信入膽瓶。將及半而卽以瓶嘴套連別瓶。其膽瓶之上蓋護鐵套。俾免熱耗。而瓶下則以煤氣燈或炭火煅煉。使靈養化氣而過冷瓶。如此即可成淨珠。

形色

新出甌者作塊。過光恍似玻璃。若經久則漸變白。不復

透明。

氣味

此物無味。亦幾無臭。

溶化

新鮮透明者。用水十二

兩則能溶五錢。其陳舊色白者。用水十二兩則祇化一錢。

五分六釐耳。若以清水十二兩煎沸。則可化一兩三錢七

分之多。

戒慎

第信石一物，酷毒異常，倘服一釐至數釐，卽能傷生。然

或服至數分，則又將大吐，故有多服而反不傷生者。惟服

後不吐，必致戕命。凡服信毒者，則作渴作吐，腹熱如焚。

將必痛至力乏而後死。此物能齶肉不敢齶信石，鑿其堅，懸臂而猶垂，欲嚼

死，則以信石置於齒間，則舌頭脣齶皆以信石為界，遍體如此。可謂

信石

解救

先以膽礬或銻礦養化水灌之，令其作吐。同時或用牛

奶或用雞蛋白調水，或用麵粉攪水，令其咽服，而並以水

節洗胃，依此救法，若及早者多獲效。

一法 先投藥令

吐，隨卽服溼鐵養散。川新製未乾者 令鐵敗厥信毒，自不致傷生也。

此法早用必驗。

功用 此藥略服則開胃，補身能令各腑多發津液。凡疾作
係屬有定候者，如瘧癆之類 用藥療治固首推金雞衲霜。其次
莫如信石，然亦有服金雞衲霜莫愈，而服信石乃獲痊也。
久瘡不愈服之尤宜。

主治 一切延纏之症，如久患牛皮癬、魚鱗癬、水蠍癩，及遠年
風溼骨痛等類，服之甚驗。他如手足交節腫，或半邊腦筋
作痛等症，服此亦效。醫者用以作改病藥，誠上品也。

服法 信石入服劑，每釐應分作十服，或數服。

服驗 若久服，則頭皮眼皮作腫，面部頑梗而癢，口覺熱痛，腹

覺脹悶，而胃亦多滯。凡服信石劑後，而倘有此各徵者，即

應停服然使過服此藥則縱無已上各徵亦將髮甲自脫而口多涎沫

信石水 製法

淨臺養

一錢零
九釐

鍛養炭養

一錢零
九釐

臘芬大酒

四地
廉量

清水備足

先以玻瓶貯水十二安士

量加入臺鍛二散

煎沸以化盡爲度取起俟冷而後加入臘芬大酒且再將清水

攪入以共有十六安士爲率

此芳所用臘芬酒不過聊以設置俾免人錯服耳餘別用

此藥水每半安士

內函有信石三釐半故內服亦祇宜每次五滴每日三服凡應服信石者宜服此所製之水忌服散末

方劑

汞臺碘水方

西藥畧釋

卷三 改病藥論

信石水

僵碘六分 紅汞碘六分

清水八安士量

法先以二散和

水半安，土同研，俟化而後加入餘水，瀝淨。此藥水色微黃而略濁，每服五滴至二十滴，每日三服。能療疔毒及皮膚生鱗之症。但須連服數月，方獲功效。倘服後或胃不消化，頭覺昏痛，大便艱澀，卽宜暫停。大抵間十餘日，須服瀉劑一次。

信石汞水

製法

銻碘六分

水銀六分

丫士的六分

清水八安士

研勻加水便是

解花柳毒。每服三滴至十五滴。

方論

西醫以信石療癬症，自古已然。除瘋癲疔毒癬向外，其

餘一切頑癬卽以此藥治之多獲功效。初服信石水，每
次勿逾五滴。日服三次，宜服在飯後。大抵照此法連服半
月，或一月之久，自獲徵驗。倘服後眼內發熱，或眼胞略腫，
則每服宜減一滴。若夫眼起紅筋，是卽頑癬漸愈之徵。而
無庸過慮。惟以溼布外敷可也。所以眼雖作熱，仍須連服。
二月庶易獲痊。至若內服略久，而手心腳心，或有發熱，或
作水泡，抑或神倦腹痛，而夜不能寐如此，亦無妨礙。誠以
果能久服，定必獲效。蓋恒有久服信石劑，而身體轉健者
也。倘經服一月，眼無發熱，則第二月應每服六滴。如連服
兩月，仍未告痊，則第三月應每服七滴。如此，則未有不全

愈者也。且全愈後，尙須再服數月，庶無復發。

外治 作藥水一方 信石外搽，具丹力。

信石一分 錫炭養一分
三釐 清水四安
土量 和化

又 方 藥膏

信石五分 白藥膏六錢

研和此二方均治已潰頑瘡

用以外塗甚妙。惟小兒不宜用，蓋因信石酷毒，倘或誤糊

入口，卽妨生命也。

鉢綠養夏吉魯
噶打沙 此藥製始於一千七百八十六年，漸次通行。

形色 作片珠色白，內不函水，露天氣亦不變。

氣味 無臭味，略鹹似火硝。

溶化 冷水二十倍方能化一沸水兩倍便能化一此藥燶熱

卽發養氣大約每百分能發養氣三十九分

凡作養氣當此爲上品

功用

能作涼劑及改病劑頗利小便此藥或內服或以水化

用水節射入迴血管均能令血變爲赤色

雜治
服法

若用發熱而致口爛及發出小瘡者每日宜服此藥三

分或一錢分數次服若在小兒每服五釐可也

見小兒瘡毒
爛服之亦效

外治一方用鍼綠養

一錢至二錢

清水

十六安士量

和勻搽之

因疔毒而發瘡者宜內服兼外搽 口渴及舌有白胎

用此煎水作茶飲之 身熱用鍼綠養

一錢

清水

十六安士量

量和勻分數次服 小兒瘡疥由父母疔毒傳染而致者

用鍤綠養一錢 清水十六安和勻每服一錢每日四服

大抵服至二三十日自可獲效

輕淡綠砂 即硝

即硝

此物出於火山卽生煤處亦有之曩者多用駱駝

之糞燃燒其中卽有硝砂此特舊法耳近來卽將製煤氣所剩

之水加入礦強酸和勻如此卽成爲輕淡綠礦養也由是再加鏑

綠鹽 即生

煎熟則見其一變爲輕淡綠一變爲鏑礦養然此猶未淨

也用鐵釜再將此二者同甑將見輕淡綠卽行升上用法收取

其氣而自離去鏑礦養矣若加入鍤養或鍤養燶熱卽有輕淡

氣發出

淨輕淡綠

製法

轄淡綠二十
安士

轄淡水五錢
清水三十二

安士

先將轄淡綠搗爛入磁鍋內再以清水放入燶熟化淨然後加入轄淡水再燶熟一刻之久乘熱隔淨後仍用磁鍋煎乾水汽煎時不住手攪勻煎至稠結成粗粒爲度若隔淨後俟其冷凝珠用布濾隔出汪乾溼氣則爲極淨之轄淡綠也

形色 白軟過光剖開則其紋多直

氣味 無臭味鹹而涼殊不可口

溶化 火酒冷水均能化熱水化之尤易化時則能令水略冷

若覩之可令化盡無餘滓

功用 化痰易出兼可節射外治各症

方劑 一方 淡者主治喉症使痰易出 喉痛漱含亦佳

轎淡綠三釐 清水一安
土量 和化

一方 濃者主治喉症使痰不作用法吹藥氣入病者之口
透入肺內可化痰止咳

轎淡綠一錢 清水一安
土量 和化 凡大小腸內皮與肺

內皮積血肺久患熱症皆效

一方 治同上

轎淡綠一錢 甘草膏三錢 鍔錦葡吐散三釐 清水

八安
土量 和勻每服五分每兩三點鐘一服 若作嘔則去

鍔錦葡吐散可也

一方 治吐血肝發大水蠱症由肝壞而致者均效

轎淡綠一錢五分 輕綠酸水三十滴 清水十六安士量

和勻每服一兩每兩三點鐘一服

一方 白濁白帶 以水節射入前陰

轎淡綠二分半 清水四安士量 和化用

又 方 外治塗疥癬

轎淡綠一錢半 猪油一兩 和勻

久患喉咳方 以轎淡綠置鐵板上炙令化氣吸入喉內可治

外治 藥酒方 治風溼或跌打骨鋟腫熱或腎子發熱均效

轎淡綠二錢半 火酒兩安士 清水兩安士 和勻以布溼透

敷患處，頻頻換之。

魚肝油

製法 用水甌熱鐵板，即以鮮魚肝在鐵面炙之，令

受熱至一百八十分，便可煉成。

辨別

但此油分三種，一色白，一色棕，一色黑。

形色

色白者乃鮮魚肝製成，而無甚臭味，最上品也。色棕者

其魚肝恐不鮮，若由火煎煉而致黑色者，則敗餒魚肝所

製矣。

發明 此油創自日耳曼部前於道光末年，西醫已將該油功用，達諸新報，而刻下則尤爲通行之品。凡內傷風溼，鶴膝瘻癰，及遍體發癬等症，均能療治。而內傷服此尤勝。醫者

用以入改病劑誠爲絕妙之品也。

經驗

昔有名醫以此油療內傷症凡一百三十四名而獲有效驗者二百零六名其中有全愈者有獲愈過半者大抵內傷人久服此油能令肌肉生長嘗有人連服四月而身比未服之先重逾三十觔者又嘗有連服二十八日而比舊則加重十四觔有奇雖此種奇效未必盡人皆然而要之獲驗者多矣凡內傷者之血水液多而無甚實質惟此油能調補故服之必效也若癰癧裂爛係由先天虛弱而致者服之多驗但此症在貧者少肉食服此尤易見效惟富者慣肉食而服此或難見效耳

通用
服法

西醫

卷三

奇

因瘻癰而致骨爛發膿者服此最佳 小兒身弱血薄而致骨軟無力服之尤妙但須連服旬餘始見徵驗大約歷四十日後多可獲愈也 蟲食桑症每日宜服八錢或一兩二錢惟服至數月方能奏效且此症須兼服鍼碘鐵碘等藥庶易告痊 內傷症肺內發瘻服此油勝服別藥但該瘻之發多寡快慢不一其屬多而快者難治其屬少而慢者則服此可愈 此物大人內服覺有腥悶而小孩啖之則甘甚凡在小兒每服宜用五分至三錢以白糖或者糖水和服 內腑核症宜服 肌肉消瘦係由胃不消化因而益身或云此油

具有補腦功力及能改變血毒 外治塗癬亦見功效

一方

魚肝油四安土量

炒米粉二錢

白糖二錢

桂皮水或

薄荷水四安土量

相和每服四錢至八錢

又 方

魚肝油一安士量

桂皮糖水一安士量

八角水一安士量

玉桂油

一滴

和勻每服一錢每日三服

方論

倘或應內服而不能下咽者則用此擦腹部亦驗

沙沙把列

此樹藤本也產於南美利駕麥西哥星架波等處

該樹原有數種皆根小而長數尺粗若鷺毛管久藥用根

形色

氣味 頗辛

提取 用酒或水浸泡均能提出其功力

功用 此藥能改病及去毒發表。凡疔毒頑癰，並日久風溼等

症，均能療治。

方劑

一方 沙沙把列根二兩 沸水一觔 泡一點鐘

然後入鑄，再煎一刻，煎畢取出貯鑄。此藥水每服一兩，六至三兩，能發表去疔毒。

又 方 沙沙把列根十二兩 楊柳葉十二兩

圭厄木末二錢

一兩

玫瑰花八

錢 辛拿葉八錢

甘草八錢

八角油五滴

火酒二

觔 清水二觔 冰花糖三觔

先將酒水相和，浸各藥

一十四天浸畢瀘淨而後入鑄煎使去水至餘二十五兩六錢爲度由是加入白糖俟化乃取藥水少許令與香油調和隨卽投入鑄內合共攪勻然後取起貯入玻瓶此

藥水每服四錢日服三次能療上文所列各症或用此藥水八錢加鍼碘八釐化服亦能解疔毒及散瘍癰等症

但英國亦嘗有醫士細驗藥而謂其無甚功效些不可不知也

水銀

此物入金類亦屬流質形色狀似珠色似銀能返光與水比較則重逾十三倍半其在寒暑表冷至三十九分則變爲實物並可鑄薄若熱至六百六十二分又能作沸大抵此物不特烈火能飰而慢火亦可飰誠以其遇平

常之熱亦能上升也

配合 水銀一物和人油類則可作藥膏和人火石粉則可作藥散而且與伊打火酒及硫磺等物亦能相和此物能食別種之金若與別金和勻亦能成爲雜金之品

論服食 昔有英國婦人取以內服蓋欲增其姿色之美也而卒罔效又嘗有老人日服八錢連服九月而究屬如常審是則專服水銀殊無應驗矣惟和別藥以作丸散方有功效

宜忌

此物不宜多服否則或口損或流涎未免貽害且大小腸或有爛處其素則將墜下乘爛處而泄出試觀製汞工

匠每被汞氣入血而致生病端是知以汞入藥惟得法方有濟耳

汞藍丸 製法

淨水銀一兩
六錢 玫瑰糖二兩
四錢 甘草末八錢

法以水銀合玫瑰糖

附作玫瑰糖蜜
用將數枝玫瑰花去蒂連蜜三兩
置冰桶爛架冰糖熬十六兩和匀
蜜离

先研至不見

水銀星爲度然後加入甘草末和勻貯罌用時取以作丸照此
製法則是藥料每三釐卽函有水銀一釐在內也

形色

氣味

功用 凡用水銀所作各藥當以此爲通行之品蓋藥性純和

可入兒科而且能療各症亦頗同迦路米惟功用則稍遜

而已

主治
服法

若作改病藥，每服一釐半至三釐半。若欲輕瀉，則每

服八釐至一分六釐。止瀉，則早晚每服八釐，加入鴉片

少許。

至釐

大抵連服三日，口必發涎，彼胃不消化口苦

舌白，而身覺不安者，宜投一服，兼服輕瀉劑。如大黃、芒硝、桑葉等類。如此

則能令內腸之積滯瀉出，而且所服之藥亦從此而出

也。若宿症初起，一日每服藍丸二釐，日服二次，倘服後

而覺牙肉略腫，口涎多流，則暫行停止。蓋服是藥者究以

口不流涎爲貴也。然俟口愈之後，則仍須輕輕再服，誠以口流涎者，乃服藥見效之徵，而仍當服至三十日，庶易告

瘡或云疔毒未易去清服此藥者須至六月之久方能斷根也大抵用汞治疔每日不宜多服惟能久服不厭自可全愈

迦路米 製法詳上瀉藥篇內而炎症服此尤驗蓋炎症不一或肺內發炎或肺之胞衣發炎或頭腦發炎或肝胃及大小腸發炎或婦人產後發炎皆能療治

服法 凡以上各症初起時宜以迦路米先行令瀉後再用此藥一釐至五釐加入鴉片半釐至釐半和勻內服每六點鐘服一次抑或八點鐘服一次十二點鐘服一次亦可惟視症之輕重何如耳重者多服輕者少服無不見效倘服

至數日而或口損發涎大瘡服至分齷齪有微即宜暫停

作藥膏方 迦路木一錢三分半 猪油八錢 和勻而用以外治亦妙

紅汞礦 製法

汞綠毒藥三兩

鋶碘四兩

清水八十安士量

先將水二十安土開化鋶碘次用水六十安土開化汞綠毒藥由是將兩藥水和勻煎沸俟令凝定倒去上面之水其餘聚於底者則復用清水漂洗二次然後焙乾以鐵器三百三十分度爲式此即紅汞礦也

功用 療治各症功同汞綠毒藥 服法 每一釐須分十二次服

外治

作藥膏方 紅汞碘

二分六釐研幼

白藥膏

八錢

和勻思

瘻症者宜將此膏搽十咪呢之久搽畢即向太陽曝之曝至覺有痛苦即宜停止依此治法而瘻症可愈 大沙蹄

症用此搽之亦妙

青汞碘

製法

用淨汞

一安士量

碘質

二百七十八釐

宜照西戥和

勻研之隨將火酒少許以漸加入須研至弗見水銀星及呈青色爲度研畢宜在暗室焙乾並用黑鑄存貯

功用 同紅汞碘

服法

每次宜服一釐半至五釐

外治

藥膏方

青汞碘

一錢

豬油

八錢

和勻

凡瘻癰裂

爛及惡瘻等症即以此膏搽之甚妙

轉淡汞綠

製法

汞綠毒藥

二兩
四錢

清水

六十安
土量

和勻，燶熱至化，加入輕

淡水

四安
土量

頻頻攬動，俟其凝珠棄去餘水，而復以清水漂洗數

次漂畢，用銀淡養水試驗

些微強，以不起鹽爲佳。由是將珠

焙乾

其以熟至百
十二分之式

貯入玻樽

功用

此藥惟用外治，不入服劑。

藥膏方

轉淡汞綠

一錢
研末

白藥膏

八錢

和勻，凡久患皮膚

各症，及眼邊有爛者，卽用此膏搽之甚驗。

汞綠

製法

淨汞

二觔

硫磺

六兩

先以硫黃下鍋煎熔，而後以汞

由漸加入頻頻攬之至全塊發大隨卽取起蓋密百首發
首焚俟冷定取出研細復行入甑升煉而成

形色 此物作長珠其體重其色鮮紅 氣味 無臭無味

溶化 火酒清水蛤蜊水冷礦強硝酸鹽酸均不能化惟皇強水乃能化之大抵露置鍋上燒煅卽能毀敗惟加蓋方可飄而不變也

外治 因疔毒而致喉爛者宜以汞礦化氣而口吸之 或置

鐵板上炙令化氣薰身亦能治疗毒

紅汞養散

卽

製法

淨汞

六兩

硝強水

四箇半

清水

兩安

安土量

先將此兩水和勻，隨以淨汞三兩二錢加入，令其熔化，用火煎乾，然後將所濾之汞入磁鍋燶熟，合共調勻如此，即成爲三仙丹也。凡爛瘡卽用此散摻之可作丹用。

紅汞養膏

製法

紅汞養散

一錢研細

黃蠟

二錢

杏仁油

六錢

先將黃蠟燶熔，次以杏仁油和入，俟其將冷，然後加入汞養散一併和勻。形色此膏新製其色紫，日久則漸變灰色，入藥宜用新製者也。

又 方

紅汞養散

一錢

豬油

六錢

白蠟

二錢

法將油蠟先行煎溶，隨以紅汞養散加入和勻。

主治 凡久患惡瘡及眼邊有爛均宜用此二膏搽之

汞黃膏 製法

淨汞 一兩 淡養酸 二兩 生油 九兩 豬油 三兩
二錢 八錢 六錢 六錢

先以水銀投淡養酸中俟其化盡次則另將生油豬油鎔合然後將已化之汞由漸加入卽用薄木條頻頻攬之至冷定將凝而再復力攬攬至結稠爲度

功用

功同汞藍膏而性尤酷烈

服法

每服分半至五分

但用以內
服者亦鮮

外治

若搽小兒頭癬須以番�洗淨而後薄搽或再以豬油和淡搽之尤妥風眩爛睫宜以汞黃膏一豬油二和勻

外塗 隱囊痒症宜先洗以白醋後搽此膏 皮膚各種
癬症用以外塗俱妙 凡用此膏療症皆宜搽至極薄庶
免口涎多發

一方 藥膏 茉礦 二錢

鴉片酒

二地廉量

硫黃末

四錢

白藥膏

四兩

和勻凡手內癬症發痒搽之甚妙

汞藍膏 製法

用淨汞

一觔

淨羊油

一兩

豬油

一觔

法先以全汞一觔羊油一兩和豬油二錢力研至不見水銀星
然後將所臘豬油煎熔加入再復細研蓋製此膏者慎毋急躁
須有耐性研至極勻方妥

又淡汞藍膏製法

汞藍膏

四兩
八錢

黃蠟

二兩

白欖油

二兩四錢或
用生油亦可

樟腦

末

一兩二錢但此物須加
入火酒少許方能研末

先將黃蠟煮熔次以欖油相

和俟其將冷然後加入樟腦及汞藍膏一併攪勻

功用

此二膏主治骨鏗發腫及皮膚發症係因久患疔毒而致者但須在兩腋下及兩髀裏搽之庶易令汞入血而發其功力也


論釋

已上用汞所作各藥或內服或外塗或化氣薰之均能入血而發其功力大抵內服汞藍丸汞鉛散及迦路米等類則能作瀉詳瀉
鷄內若作改病藥則每服宜少許彼內腑若積餘水服此能消而發炎後若生膜服此能去初服二日

Last page

Vol III

則臟腑多發津液頗利大便至久服則胃不思食轉覺多瀉而肉漸削面漸白眼蓋及脚略覺微腫抑或舊瘡復穿而致流水且服略多則脉數胃滯口損發涎覺有銅味時噴臭氣牙肉浮腫而並現出紅線由是流涎愈多每著流至筋者舌起白苔甚至齒則鬆喉則爛醫學要略言之則不甚爛妙奇石也既難咽亦難言然此不特內服爲然也卽用以外治亦無不有如是之徵是知汞藥酷烈不善用之反以貽害惟善用之方能獲效耳



H87374
1914
Y.3