

西藥畧釋

卷四


4

B.

Chinese

Vol. IV.

4



平脈平腦論

凡脈頻數及脳不安，均能致痛。此平脈平腦之劑所由設也。
顧脈之數有數端。一因身熱而致。一因心之下左房肉生
厚，及其房門有壞而致。一因心房生大，而令房外之肉軟薄
而致。一因血流過多而致。一因久病血薄而致。是皆能
令脈急促，而貴有以平之也。惟欲平其脈，須先療其症。症既
稔，二藥爲最。此則不論有症無症，而胥能平脈也。乃有時平
脈之劑，亦能平腦。而平腦之劑，亦能平脈。是豈必區區致辨哉。
惟二者雖頗相通，而或則平脈之功居多，或則平腦之功居多。

故聊分其類耳。若夫平腦之藥亦不一。如草烏頭與白匪鏹，
稔則能治身中骨痛及腦筋痛也。如謙落，則能療胃不消化及
大小腸久失功用也。如菸與路卑利，則能令沉悶昏倦及肉
筋無力，而用以續骨，鎗等症也是知平腦之藥。實與平脈之藥
同重而缺一不可矣。至於並行不悖，而脈與腦均能平者，則
惟輕炭淡酸，及雪水二物，而始有此妙用也已。

謙落

西名高尼亞

此樹產歐洲美國等處高三尺其臭恍若麝香

四

五

六

七

八

九

十

十一

十二

采葉及果核入藥用

覈取

葉與果核內皆函有精液可用

法取出

形色

其精液能過光而比水還輕色黃似油

氣味

味辣臭似菸葉

功用

平腦脊髓及自和腦根並可止痛

服法

若以葉研末作散每次宜服

五
六
七
八
九
十
十一
十二

用作藥膏每次宜

服

三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二

外治

皮膚各症宜以此膏調水搽之

論訂

惟性甚酷毒而且所製之藥其功力或輕或重殊不足

靠故醫家鮮用

洋茉莉

又名遮
司味

藤本蔓生，沿高樹旁過別枝，產美國南邊春月

開黃花，瓣長寸許，氣甚香，採根入藥用，又可作藥酒。

功用 平脊髓及自和腦根，減少心之發力，故能止腦筋作痛。

主治 乾咳過甚，不拘老幼服之見效。婦人行經覺身體不安者，服之甚效。

亞匿加

產歐洲亞細亞洲北邊，樹約高八九寸，采花及根入

藥用

形色

根約長二寸，厚不及一分，外皮深棕色，內層白

色，中心黃色，氣味

功用

平腦脊髓，平心脈。

相反

輕淡水 火酒 鴉片酒 樟腦

相佐

藜蘆 毛地黃 草烏頭

方劑

一方 大熱症熱盛時可減心脈之數疾

亞匿加根

二錢
粗末 清水

九安士

煎至臍六安士爲度

每服一酒杯每兩點鐘一服

又藥酒方

亞匿加根

八錢
粗末

火酒

二十
安士

浸兩日隔淨隔時

加些火酒得回三十安士爲度每服一錢至二錢

主治

主治大熱症退熱未盡時日久身弱服之甚效 每服

五滴和水飲之每三點鐘一服 頽狂將作心內煩躁異

四

常服此甚效 飲酒醉甚狂妄不知兇險者服之亦效

風溼症日久不愈者服之可愈 走風腳亦可治 凡跌

撲打傷骨痛，外皮未損破者用此藥酒搓之甚效。西國以此爲治風溼跌打通行之方也。

帶微搭連 此藥以各等花加魚肝油或加牲畜骨油或加雀屎或加浸鹹魚之水蒸製而成。

形色 清稀無色有輕淡在內其氣能焚。

氣味 臭似鹹魚

水 水能化火酒亦能化

功用 平腦平脈能減少心脈之發力故能令身熱略減。

主治 風溼骨痠腫痛

服法

每服四滴至八滴以水和化

配合 此水合綠氣可成鹽類名綠氣鹽每服三釐每三點鐘四

一服

乍波蘭啲

出產製法氣味功用俱詳卷 發表門內茲再列

入平脊髓門內以便臨症查閱云

加喇巴豆

加喇巴在亞非利加之西而此豆產於其地故因

以命名也

其莢長約五寸內面豆三粒每粒長約八分濶約五

分

考訂 用以作藥其性甚毒

辨謬

彼土人嘗以此試驗淑慝謂服之立斃者卽爲罪人服

而不死者乃非罪人蓋謬論也而實因其性酷毒過服則

必傷生耳

功用

平腦平脈療眼症用以縮小瞳人

服法

研末每服一釐半若作藥膏每一釐宜調水分作十服

外治 眼科用以外塗，或將膏開水滴入眼內，均能令眸子縮

小。此與丁刀邊能令眸子散大者，實相反也。

朱侯乾貼入處裏素炒
甚詳上丁刀邊篇

凡服丁刀邊及顛茄過多，又宜用此藥解之。

亞司連

卽加喇巴豆之精，功助主治皆同，不復再述。

菸葉

原產美國，後各國均有植焉。此葉內函有液，用法取出

西國呼爲尼哥顛者，卽此物也。

形色

其液無色，過光，露天氣則漸變黃。

氣味

味甚辣性，甚毒。

考覈

大約乾葉每百分多則能提出該液六分或八分，少則能提出分或二分。此物若與酸品相合，則可製成鹽類。

溶化 伊打火酒能化而水與油亦能化

功用 頗能平腦平脈

主治

猝然抽搐牙關緊閉

此症脣者宜之弱者用鐵利即燃此葉用法令煙納入糞門

俱此法在者宜之弱者用誠以此法甚險不可妄用也

一法以葉泡水用水節射入大腸或將

所泡之水外敷亦妙此則能令肉筋寬鬆也 氣喘令吸

其煙亦可略止 服士的尼過多者服此可解之

方劑

作藥水方

乾菸葉

三分半

沸水

十八安土量

浸一點鐘濾淨彼大便艱

澀者宜以此水用法射入肛門但須先射一半如歷半點鐘不驗則再將一半射入可也

蓋以藥水射入肛門嘗有用至五六分而能便通者故凡用此法療治宜用葉三分半或三分便通

藥酒方

乾菸葉八錢

車釐酒十六安
土量

浸七日瀘淨每服十滴

至三十滴

論列

此物氣芳通腦生津故世俗取其葉而製爲各色菸品

迄今各國靡不尚焉抑知燃其葉而吸其烟實多貽害試

觀蝕斯葉者除菸蟲外更無別物是可知其酷毒矣

大

抵初吸其煙雖些少亦覺悶若吸過多則頭昏面白脈沉
身軟手足覺冷呼吸覺慢或作嘔或發顫甚至或有昏迷

欲絕之狀其在吸食已慣者將必菸癮頻作然或間斷

略久頓覺頭腦不安迨吸煙既久則菸癮彌深將見病

端迭起輕則恒覺胃不化而心不安重則令目之腦筋變壞而間或失明此蓋因於毒由漸入腦而日積月累故不免壞人也

路卑利 出處形色功力製用俱詳上文吐藥篇內茲特再列入平腦門以便查閱

輕炭淡酸

卽西名威度
德國酸

製法

用鉢鐵炭淡加入礦強水及清水甌

製而成

具晉桃李二樹其花葉與
均含有此藥醫署亦宜加也

又法

用銀炭淡

八分

輕綠酸

六分

九釐

雨水

一安士量

同入黑樽和勻

綠此藥水不能見光故用黑
樽存貯或用黑紙封密可

此藥水之淡

者也用以療症甚合

蓋此水每一百分而該藥只值三分而已

功用 平脈止痛 **主治**

筋抽

服法

每服

二三滴日服

西藥畧釋

卷四

平脈及自和脣齶

輕炭淡酸

六

次加水調服

但此藥水毒極並不能久貯故醫家鮮用

鉢炭淡

碧石泥

製法

用鉢鐵炭淡及鉢炭養和勻入鍋煙熔將

見上浮者卽鉢炭淡而下墜者卽鐵養也由是取出鉢炭淡而

棄去鐵養俟冷凝爲實物貯入玻璃樽

形色

其色白儼如磁塊

氣味

其臭恍若桃仁

彼誤想家
恆用些藥

功用

功同輕炭淡酸

服法

每一釐宜分五服

方劑

一方 外治頭痛

鉢炭淡

三釐或
五釐

清水

一安
士量

調化布蘸此水敷之甚效

他如破銀燬養其
指卽以此水潑之可除

惟藥性毒甚若以三釐飼犬則立斃醫者宜

慎用也

亞咪咧淡養

製法

亞咪力火酒一份 淡養酸一份 同

入一大玻樽略燶熟然後餽之用法收取再行製淨乃可用

形色 色淡黃恍同伊打酒或云略似油能飛

氣味 別具一種氣息

溶化

水不能化火酒能化

功用 專屬脈管故行血氣能令心跳速逾平時而在脈管之

腦筋反令力緩故云平腦卽平脈管內之腦筋也

用法 凡療症每用兩滴至五滴洒在手巾內鼻吸其氣乃可

此物毒甚切勿多用

主治 羊弔症將起時以此藥聞之可止 婦人頭痛面色變

白者聞三滴卽止 氣喘症因腦部不安者 鎮喉症及

抽筋者，心痛垂危以致肺部悽苦難堪者聞之均止。但初聞之際，病人面色通紅，有覺危險者，有不覺者，但總宜小心慎用，逐少試之，庶獲萬全之效。

草烏頭

中國西國皆有該樹，高尺六至五尺，而根則頭大而

未削及多橫，蘊長約三寸，根色外棕內白，入藥則取其根與葉

用，但根之功力比葉尤峻，故釀作藥酒者，或根或葉亦須聲明。

考訂　查時珍本草言烏頭辛溫大毒，各方主治大風、頑痺、風

溼、癱瘓、頭風等症，而不知其有平腦之功也。西醫用化學

覈明內函蛤利之味，卽草烏頭之霜，西名厄哥匿顛者是

也。質類鴉片之麻，唯不易製耳。

辨別

其在鮮葉味苦而辛嗅之令人欲睡若以葉含數刻其

喉舌始則刺而木繼則腫而熱其在乾葉則服後略久而始有此徵惟葉既陳則不堪用也根作泥氣入口則先覺甜而後覺苦辣此藥自古原人毒品人所鮮服而用作服劑者僅百年耳

服驗

以根少許入口卽能發涎唇舌間覺有針刺服後則能平腦而令遍體腦筋麻木不寧四肢如觸叢針肉筋亦隨減力若服稍多則必致渙而無力眼簾收縮又甚甚者或服至壞人之分兩則尤覺喉刺熱腹痛甚作渴作吐作瀉通身麻木而愈形軟弱惟終不至昏蒙抽搐耳火酒浸

之能提出其功力故尋常用者多以此所浸之酒入藥

內服藥酒方

草烏根

一兩四錢研粗末

淡火酒

二十安士量

先將火

酒十五安士浸此根末兩日隨用一漏斗插入樽口卽將

該酒連藥倒在漏斗令其流進樽內其餘火酒尙有五安
土亦用以漂淋至藥滓則仍須揃出餘酒然後濾淨由是
再加入淡火酒以共得三十安土爲度此酒酷毒凡內
服者務宜小心每服五滴至十滴每日三服

【服法】首

一日每次服五滴第二日每次服六滴嗣後每日每服均
加一滴最多者每次服十滴爲率倘服至四肢覺有頑木
卽宜暫停待此微過盡之後方可再服也至若服後而身

驟弱或氣喘或脈過慢應卽停止勿服蓋此藥服後

能令脈沈也

外治藥酒方 草烏頭一觔 樟腦八錢 法以淡火酒和藥

先浸七日隨以紙瀘隔至乾復加火酒漂淋以共瀘得十

六安士爲度凡外皮用以擦療者均以此酒爲上品

惟忌內服

主治 腦氣筋痛或服飲劑或以外治之酒頻擦甚驗 牙部

腦筋作痛宜先用酒外擦腮頰俟數日未愈方可內服又

牙痛卽以綿蘸藥酒塞入牙穴而痛卽止 初患風溼每

日宜服此藥三次連服數日可愈若舊症骨衣生厚亦宜

日服飲劑四次兼擦外治藥酒 跌打損傷用酒外擦奇

效 胃不消化及舌有白苔宜與瀉藥或表藥同服

大熱盛時寸脈數疾服此雖覺驟平究不能使其熱速退也醫者不可不知

血囊

方論

西醫以草烏根作酒嘗有比尋常分兩加至六倍而內服仍每次用五滴者蓋準此療治而自能獲效誠以用藥稍多便不穩妥故往往多用平淡之劑耳然使服平淡者久不見效則又應改服濃劑也

白藜蘆

西名白
匪鏽稔

此樹高

三

尺歐洲中國俱有而入藥則用其根

形色

根大如指色白

氣味

嗅之令人掩鼻惟乾者無

臭厥味則乍覺甜而漸覺苦辣

考覈

根內函有霜用法取出其霜甚毒西醫所謂匪鏽地丁

者卽此物也

功用

平腦

服法

每一釐須分四十服

若以根研末嗅

之能令嘔嘔或用以壯
蟲亦可 且內服藥末並能令吐瀉 惟

此藥酷毒異常醫者鮮用

青藜蘆

西名青
匪諱

出產美國中土樹之枝幹形狀與白藜蘆同唯

白者產於岡陵青者產於澤畔耳

氣味

功用

擦外皮立見紅熱其霜嗅之令人嘔嘔不休內服則嘔

吐大作間有服後作瀉者

其平脈甚速服少許俟兩

點鐘再服可使脈弦數者轉爲遲緩

比如平人試之服

後可減少平日至數三分之一或甚至減少一半不等可

見其能銷弱心脈之力故各脈管亦因之無力也

宜忌

此藥性力過烈吐後憊弱難當故不列入吐藥之用

主治

凡心跳症或因吸生熟烟飲濃咖啡而致者服此可止

心肌肉生厚跳動逾常有力者服此可減緩略安
倘心脣腫脣瘡不宣服

腦部肺肝各臟腑積血多尚未發炎之先服此藥能免其

既發炎則不宣服

跳盪囊

用此藥以減少心力跳動兼外治療之

外治

比如患在何處或夾東以壓止之或用拇指摘緊或用

線綁紮如是則可令血囊內之血易於凝結漸就見效也

方劑

一方 藜蘆酒

青藜蘆

十六安士用
美國斤兩

火酒

倘足

先將藜蘆搗成粗末以火酒四安士浸透入漏斗漸加火
酒至收足三十二安士爲度 每服五六滴每三點鐘一

服服至作悶或服至寸脈已緩則減少服之或停服。比
如放血或瀉劑欲減輕其血脉急迫之患者此藥皆足以
佐之。

相反 燒酒 鴉片 輕淡水 倘誤服此藥過多卽用鴉片
等服而解之便可。

相佐 草烏頭酒 路卑利酒

冰水 凡以冰水療症功能平脈及可去炎或用冷水代之亦
可。主治週身發熱卽以布蘸冰水鋪之而熱可略散。頭
腦積血作痛及身上或有腫痛亦以布蘸冰水敷之自可

散血止痛消腫。如被湯火所傷卽照上法敷之亦驗俱此
證

須熟
水方能獲效

卷四

冷水

如大腸及胃發炎宜飲冰水並用水節納水射入肛門。如月經過多卽用冰水一盤橫搭以板令坐其上將見冷氣透入而經水自止。如遇割症先以冰置割處片時而後割之則痛可略減。已上各症均宜療以冰水惟臟腑發炎者忌用。

冷水

功用與冰水同

外用

以冷水浴身先覺涼後覺暖則其能行氣血可知矣

跌打損傷宜以布蘸冷水敷之能散血止痛。扭傷骨鋟

宜用冷水浸三點鐘並敷以溼布。刀傷鎗傷等症卽以溼布敷之庶免積血發炎。腹內熱痛用布帶蘸水纏之

外加乾布擁護。若療大熱症其法有三。一以冷水抹

身

此一瀆時可用

一以冷水淋身。一以衾蘸水覆蓋全身外加

衣被護衛

此一法須用諸葛亮熟時

令冷氣透入臟腑俟歷二點鐘並飲些

冷水方能散血退熱。以上敷法悉宜頻頻換水庶易奏

效。

檸酸。此物乃用檸汁製煉而成者也。

形色

作珠無色

性味

性涼味酸

溶化

冷水易化

功用

止渴消炎

主治

凡身熱作悶及胃發炎卽以檸酸調水飲之立效。有

一症西名士加肥者而服此尤妙。

蓋該症牙肉腫痛苔爛即腫多由人居船中及食鹹物太過所致也故西人行船必多補

檸酸檸
汁等物

卷四

三

方劑

一方

礀炭養一錢

清水四安
土量

和勻卽將此水

一錢加入檸汁四錢內服能止渴退熱發表

又方

檸珠二分
八釐

鑪炭養三分
四釐

卽用二杯各貯一藥以水調

化然後彼此和勻令作沸狀隨卽飲之亦驗

解毒殺微細生物藥論

陽長陰消造化具循環之理秋霜春露上主顯生殺之權祛害物之物以保全生物除害人之物以顧惜吾人無非欲盡人之性以盡物之性而已也西國醫生近年救世心切格物功深不僅化製金石以拯瘡痍兼且洞達細微以防隱患用顯微寶鏡以察受病之肌膚使伏匿無不昭然卽目力不及見者亦可得見特創解毒殺蟲之品詳列方論其微細蟲有數種或膿瘡臭爛而生或膀胱內變壞臭穢而發又考覈造酒令其發變成醋者以顯微鏡細察有微細草類在內一發霉衣物之處亦然一皮膚之間發變或生微細蟲或微細草類不等一喉

內生假皮之症亦有微細蟲在內。於是西醫用心研究何藥可以除殺此等患害。故譯錄以示後學。夫患每忽於隱微。禍終成於糜爛。可不慎歟。人又何可自矜察察之明。徒治其可見之患而不究人所不及見之暗毒。可乎。是在知微知著之君子。

養氣

製取之法

用錳養

卽黑蒙散

鍊綠養

各等分

二味分焙乾入堅玻筒

或銅罐

下以酒火燶之

銅罐則用炭

筒未通連

玻管管末過水接以別罐可以收存待用

餘古詳化學初階首卷內

無色無臭無

味

溶化

水或火酒能化少許

功用

天氣中每五分淡氣居四養氣居一人畜晝夜呼吸皆

賴此氣以養生命功用極大

凡肺氣管痰多及哮喘不能接納天氣如常者或曾吸毒氣入肺者或喫蒙藥太過

危殆者以上各等阻吸養氣之患用淨養氣一味設法導進以治之婦人血薄病後血弱紅輪減少可聞養氣兼

服鐵劑甚效症屬重則用淨養氣症略輕者可用養氣

一分和入天氣二分或三分以用之亦可

相合 此質與各質能相合而成各等藥類

變化

但經電氣或以燐質在溼天氣時能變爲阿純

詳花燐
嗜首禽

阿純

味如硫黃辟穀力甚偉禽獸肉經腐穢者置阿純瓶中

穢氣頓革力大於原養氣如以銀薄投阿純瓶中阿純立

食銀薄而爲散金類亦然 碘已與金類相合者遇阿純

碘卽食金而驅出挨阿純原養氣亦無是力也 阿純瓶

加熱逾沸水之度其阿純還原爲養氣天氣由外洋吹至

者內有阿純若雷電之際地面風內亦必有阿純不可不

知

綠氣 製取之法

黑蒙散 四錢 輕綠酸

二兩
四錢

清水 廿四安士

先以黑蒙散四錢入一玻璃瓶，再將清水兩安加入。輕綠酸內和勻，同入玻璃瓶，慢火燶熱，瓶頂連曲玻璃管一支，接入別玻璃瓶，內貯水二十安士。俟綠氣由玻璃管直透至瓶底，於是另一玻璃管並列瓶口之右，運綠氣轉過倒接，一可承六十四安水之大玻璃瓶。瓶內預放清水二十安士，其玻璃亦直透至大瓶底。此瓶除水外，可收綠氣甚多。共用玻璃瓶三個，第二個瓶口塞密，第三個大玻璃瓶，瓶口只用綿花封之，取其可通進天氣。察看大瓶內收滿綠氣時，取去玻璃管綿花，以玻桿塞緊，撤令極勻，隨卽放開玻桿，收入天氣，又塞回，再撤勻。

再放開如是者五次不等則綠氣全被清水食盡遂成爲綠氣水矣貯以恰盛二十安士之樽塞密樽口放在黑暗之處方免變壞凡製取綠氣之時最宜謹慎勿被其氣入人口鼻爲要且能壞名譽顏色

功用

解毒解穢洗潰爛毒瘡腐肉最效 内服解毒用一錢至四錢須以清水開淡方可若濃或多服必致喉痛之憊之 凡喉嚨痛爛用

五滴至十滴清水兩安士開之用樹膠水飭逼其汽射入喉內甚效

一方 治喉症爛痛或口內糜爛

綠氣水四錢 清水三安半 糖水四錢

每日含漱數次自愈但慎勿吞嚥

溴質

此物用鹽鹵製成

形色

屬流質能化氣飛去須密

罐收貯水色深棕紅其升散之烟色橙黃

氣味

味與

綠氣碘質頗同而臭惡過之能壞各等物之顏色蝕入

木則能腐木

溶化

水三十三份能化一火酒伊打酒二十餘份能化一

受熱至百度表之六十三分則沸而漸化氣冷至百度表

之下二十三分則凝結如冰

功用

解毒凡瘡潰日久有死肉處或奸炒瘤用淨溴質以木

條紮綿花蘸藥搽之但搽處痛甚故少人用搽疖每藥一

錢須開清水七錢乃可。又可製成鉢溴。詳見下文

方劑 一方 治傷風初起，鼻內皮爛久臭穢，聞之可解。

溴質三十滴

火酒四安上

和勻 每用一錢以小盅手握

漸暖就鼻聞之。又有暑月園林濃茂，有不好花草氣息，吸入鼻致患喘逆者，聞此自可解散而愈。

加播匿酸 此物係由煤炭氣所釀之油，而用法製成者也。

形色 一屬水其色棕黑，而函有雜質。一屬冰其色清白而

結珠形，二者行血之功同。

氣味 濃者入口涼甜，後辣

熱淡者，入口清涼，後溫暖。

收藏 藥珠宜用玻璃貯密，露置則發潮而漸化。

溶化

水百分能溶化三分甘油伊打火酒化之甚易

若受

熱至九十五分或用樟腦少許則變爲流質而如油之稠

功用

淡者能行血氣濃者具有丹力能打爛皮肉

搽在外皮覺熱
火焰初搽處發紅

後則變爲棕色該處不知痛痒刀刺不覺若敷久捺多能入血裏
人倘誤服入胃內皮情狀與外皮同誤服半安至一安均能壞

能殺目看不見之微細

生物

比如醉水發癢糲糊發癢或潤濕衣物發癢用額微鑿
之前見有微細之生物在其間即生瘡發癢時其瘡亦然

用法

加搗匿酸一分水九十九分和勻或加入酵糊或酒刷

衣物或搽洗膿瘍可辟除此等微細生物免其發變

主治

久患皮膚癬疥有蟎蟲在胯間陰處作痒不休開淡頻

頻擦洗自可斷根

服驗

此藥服後先入血之據一由內腎隔出小便略黑起烟

一由肺內皮亦有隔出氣味

辟穀

淡者可辟除病房毒穢之氣且用以浸肉久而不腐濃者若放入尿裏則該尿亦久而不變

方劑

一方 止悶嘔胃內腦筋不舒

加播匿酸珠

六釐八

鉢養散

二錢

樹膠水

一安土

樟腦

水

三安士量

每服四錢

每兩點鐘或

三點鐘

一服

或初起

嘔瀉

胃內積腐呃逆臭惡等症皆效

一方 止霍亂

加播匿酸珠

六釐八

碘酒

十六滴

樟腦水

四安土

和勻每服四錢每一點鐘一服

一方 孕婦作嘔

加播匿酸珠一分

清水半安

和化每服三十滴加

水調服日服二三次可止

又一方將此藥水一分和清

水九十九分貯入小壺內以手握暖令其藥氣上升或用
樹膠水節袋鼓動其氣升騰均可或加碘酒數滴亦妙

一鼻內皮發舊炎流濁涕腥臭者照此法治之

一肺內

皮舊炎亦可用上法治之

一因吸入花草不正之氣味

致氣喘者照法治之

一方 貼毒瘡

播匿酸珠八釐

錠膏八錢

和勻紗

紙開勻貼之 又方 播匿酸珠八錢

甘油四安

士量 和

化擦皮膚各症甚效。腐瘡有深穴以布條蘸藥水插入
穴內能祛臭去毒。膿瘡擦之能令膿水不臭並能令血
氣流行而瘡口易收。凡耳鼻口喉之內及前後陰等處或
有臭氣用此藥水開淡洗之自可辟除。他如屋有白蟻
將此藥水洒在該處亦可屏絕。

又 方 老人皮膚白屑作痒效

播匿酸珠二錢 甘油八錢 清水六兩
四錢 開勻搽之

一方 皮膚癬疥甚效

播匿酸珠一錢 甘油八錢 和勻搽之

一方 寒天腳生蘿白

播匿酸珠一錢 碘酒二錢 岩匿酸二錢 白藥膏四

錢 和勻作藥膏搽之

作丹用 凡男婦因疔毒前後陰等處生小蕊出惡水用濃加

播匿酸冬月須燬化塗之搽時以玻條搽之或用木條搽之片响拭去以花士玲貼之每兩三日搽一次 好眇毒

瘤輕症者亦可用此治之 凡惡毒爛瘡或割肉瘤傷口

略開濃些亦可

幾阿蘇 此藥水係用木甌製而成者也

形色 該水似油甚清亦有色黑者

氣味 氣息恍如焚木發出之煙味頗辣入口能令肉爛若入服劑

宜加水
沖服。

溶化 水能化少許火酒伊打能化

功用 行血頗同加播匿酸

方劑 一方 幾阿蘇一滴 清水一盅 和勻

和勻

凡嘔吐飲服可止 腐瘍或頸癰塗之效 爛牙痛甚以
棉花蘸藥水塞之可止 和炭匿酸或和鴉片少許亦可

一方 治皮膚各症

幾阿蘇一錢 白藥膏八錢 和勻搽之甚妙

一方 聞嗅其氣可治肺內皮新舊炎症並可辟口鼻呼吸

臭穢

幾阿蘇十滴或二十滴 和滾水一盃 乘熱吸其氣入肺

沙泐先酸 — 形色 此藥結珠形如小針嘴 氣味 味淡易服 若試以冷水則藥味全失

溶化

濃酒與伊打酒熱水均可化冷水不能化 鍮燐養三

分和水五十分可化此藥一分 硼養化之甚易硼酸同此質性故用之尤相宜以硼砂八分和水一百分可化此

藥三分

先將硼砂溶化漸加此藥
冷時必有些須未化之滓

功用

內服發表性平無毒瘡瘍則有淨曬去腐殺蟲斂口之

功勝於加播置酸酒內放入少許日久不變免生蟲 牙粉內亦不可少

服法 可服一分七釐至一錢惟用水開則紫紅味重難服

相反 蛤利類

故兼用蛤利類
則失解毒之力

—相佐

加播匿酸 硼砂酸

安息酸

方論

按用此藥不利小便亦無發嘔

管葛服至三分四
羹不至嘔者

惟鉢沙泐仙

鹽

即沙功仙蘇打治風溼
功用與沙泐仙酸合

大服則致悶嘔耳

作鹽類則無解毒之

力論退熱則平人服之如常熱病者晚間服一錢至錢半
汗出能減寒暑表兩三度之熱脈數者亦漸平和藥力可
退熱一日隔日應再服

論治腦病與金雞衲霜同亦能

治困倦頭痛耳鳴等事

論理胃解胃酸嘔有穢味者殺

腸蟲凡大熱症生血蛇

西名衣哩
葛拉士

風溼新症肺本體發炎內

傷瘧疾皆可用以退其身熱喉發炎生假皮可內服亦可

外洗 論減身熱有兩等有血經受病大熱與一處發熱之身熱不同此藥能治血病大熱與割症後發熱最宜論風溼新症以此爲最效之品

一方 沙泐仙酸一分七釐每點鐘一服連服十二次或至三十次照此服法一兩日內痛止病苦亦減

外治 一方 沙泐仙酸 破砂 開水洗身可辟汗臭

凡頭面生水蠍癰擦洗俱效瘡癰流膿水太多可止治疔毒雖不及加播匿酸而加播匿酸味重難聞殺蠍不如此藥之妙療毒癰腐爛肌肉及割後傷口可製散擦之或用此藥水洗之或製膏藥以貼之亦妙

膏藥方 沙泐仙酸

五分至一錢

白蠟

一錢

吧喇叭

二錢

杏

仁油

二錢

等味入鍋攪勻至熔以布開之

又 方 鯨魚油

半錢

茄油

五錢半

沙泐仙酸

五分至一錢

各等入鍋攪勻至溶以布或紙開之

又 方 沙泐仙酸

一錢

生油

八安土量

入鍋攪勻以布或紙

開之

療湯火灼傷立效

癩瘍爛肉割口傷及一切瘡

疥皆可治之

又 方 凡膀胱發炎尿臭用沙泐仙酸或沙泐仙酸蘇打節

射入膀胱可解

硼砂 化學覈出其質乃鉢硼養加水也

顏正華
形色

色白半過光形類珠或作三角珠形或作八面珠形若

夜間將兩珠互擦輒生光亮惟用火烘去所函之水乃變

爲枯硼砂也

氣味

味始則略甜繼則略鹹而苦

溶化

冷水十二倍方能化一煖水兩倍卽能化一大抵用硼

砂五釐而以樹膠水一兩浸之卽能令鎔化爲膏且鋟葡萄酸散徒以水不能化惟將硼砂加入方能化也

功用

內服與鉗養蛤利同

服法

須量孩子之大小用之自五釐至分半沸水調服 大

人服此藥每次一分至五分

主治

婦人臨盆服此藥能令子宮發力 小兒口爛並生白

點宜外搽內服

外治

蘿蔔症

紫生於谷
葉方丸多

用硼砂

二錢

豬油

八錢

和研塗上

金

錢癬用硼砂

一錢

白醋

兩安
土量

和搽

潰爛瘡

宜塗以硼砂

水

小兒口爛

外用硼砂末

及冰花糖

或蜜
糖

各等分研勻

塗之

療口瘡

及皮膚癬症

用硼砂末

八錢

甘油

五安
土量

和化

用水節射

塗

婦人白帶

用硼砂末

二分

清水

三安
土量

和化

用水節射

入陰戶

發癧

用硼砂

四錢

礦強麪

畔一分

清水

八安
土量

勻搽之可止

且糞門發癧

無論男婦

亦宜照此塗之

嬰兒吮乳

而致乳頭爛者

用硼砂末

調水搽之

或和甘油

嬰兒
辨謬
搽之均妙

至本草綱目誇其能消痰止嗽破癥結喉痺生津液去口氣除噎膈消障翳而且反胃積塊結瘀骨哽及口齒諸病均能療治然究無實據亦概屬浮詞耳

硼養酸

製法

用硼砂以滾水化之加入輕綠酸結珠洗淨

焙乾卽硼養酸也

形色 色白返光

氣味

淡帶微辛

溶化

冷水三十分能化一滾水三分能化一火酒能化伊打

酒不能化

功用

去臭殺除微細生物止發霉腐變搽爛瘡止膿與加播

匿酸同

主治

打傷割毒瘤傷口用此藥水洗之解毒

研製器皿

解毒門

硼養酸

三

去微細生物免其發膿

醫國割瘻後所用壓傷之運布保用硝膏
酸液水化至不能化並透溼其布磨軟者

凡瘡水蠍

癩滾水傷皮膚作痒肛門作痒用以或搽或洗均效

又熱症中有喉內生假皮者以新筆蘸藥水搽之能殺假皮

之細蟲小兒亦可用照冷水三十分化藥一分用之便無

損礙喉內矣

汞綠毒藥

製法

汞礦養十六兩

鑄綠十二兩

先將此二物分研細末而

後相和再加入錳養散八錢

同入乳鉢研至極勻方妥由是用

法瓶之將見有升騰於上而結白珠者此卽汞綠毒藥也

功用

作改病藥

服法

每一釐宜分十次服

去花柳疔

毒殺微細蟲及生物

慎用

蓋此藥毒甚服之慎毋過多倘遽服至三釐將見腹胃發炎而輒多損害或服至五釐則將受毒愈深而尤恐傷生彼誤服此藥者卽喫生雞蛋白以解之

藥水方

汞綠毒藥

八釐

輕淡綠

八釐

清水

四十安
土量

調化照此製法則是藥水每五安土卽函有汞綠毒藥一釐也此藥水能療日久疔毒及魚鱗癬蛇皮癬水蠍癩等症每次宜服半安土日服三次但須久服方有功效若偶服之無濟也此藥原與迦路米汞藍九同功而西土

名醫則以爲服此更勝云。此藥甚毒故能殺蟲及生物。然須藥一分，開水一千五百分或二千分之多照計則藥一釐可開水兩安士。

外治 各患處有微細生物以致發膿成毒臭腐痒痛者或搽或溼布敷之均可。新割毒瘤傷口產婦內損喉內起假皮等症用此可代加播匿酸沙泐仙酸硼養酸之功効但宜加意慎用切勿過濃過多可也。

安息酸

安息香出處形色製法氣味功用已詳上文卷化痰第篇內矣茲論安息酸詳列於下。

功用 解毒去臭止腐膿除微細生物洗茲癩與及割症新傷

口用此與沙泐油酸硼養酸功力相同

方劑

一方 治膀胱內皮發炎溺有積滯

安息酸一分 輻炭炭養一分 沸水八錢

和勻服之

去毒藥酒方

安息酸

一兩六錢粗末

鴉囉膏

三錢粗末

士都勒

一兩二錢

到嚙漿

四錢

火酒

二十安士

和勻以火酒浸七日用紙隔淨隔時

要加些火酒以得回二十安士爲度此藥酒外治用多
內服每用三十滴至一錢和稀粥水服之 凡外用開水
每一錢須加水五安士又由漸而加乃可 凡毒瘡腐爛
以布溼透貼之甚效

解毒油類

丁香油

交碘釐油

茴芹油

加枝撥油

以

上四等油，覈其質性，與加播匯酸、沙泐仙酸、安息酸頗相似。

內
丁香

有沙泐仙酸者，有加枝撥油者。

丁香油

功用 能止腦筋痛。凡壞牙處腦筋痛者，以綿花

溼油塞痛處可止。

一方

丁香油一錢

交碘釐油一錢

茴芹油一錢

安

息香酒

土
四安

桂皮酒

土
四安

和勻，以連布溼透，貼痛處。

外用油布蓋住，免其洩氣。止痛為度。（可治腋下狐臭脚

子臭氣甚效。此方若加些火酒和服，可祛腸內風氣。

加枝撥油，功用專殺皮處症，微絲細蟲。

引症外出論

凡症伏臟腑原難拔出然不用藥拔出則該症何以能除此引病外出之法所由特設也顧其法則有三一用藥外塗皮肉而令發紅熱一貼弔膏而令作水泡一用丹打爛皮肉而令發膿瘡此皆使其血毒發外而該症庶易療治其令發紅熱者如用煉椒芥末薄荷油及藥酒等類是也其令發泡者如用斑蝥及輕淡水輕淡水等藥是也其令發膿瘡者如銀丹鍊養錦綠強水及用火炙等法是也口此法能毒燭而能止血流竇打爛患處而西青黃毒退症不一端有宜於此藥者實宜於彼藥者是宜因症而施不可混用也大抵症屬臟腑者固能使隱伏之症而發見而症屬皮膚者亦能使延纏之症而速愈也又況已上各藥尙

有諸多妙用詳見上下文內而非徒能引症外出也如斑蝥銀丹等物並能療治多症是西國以此法療病甚為通行惟當炎症初起未可遽用須先服藥減輕其熱然後用之方妥

黑芥末

此物在西國分黑白二種，黑者有油，白者則否。未研

之前無味，研幼後則色黃而味苦辛，以法燶去其油，而苦

辣乃略減，大抵黑者一種，尤爲辛辣，服至一錢即能作嘔。

功用

救誤服鴉片用以取吐，和牛奶服可調胃，外敷皮肉能

發紅熱而起水泡，功能引炎，西醫用以外敷，誠爲通行之

品也。

用法

芥末粥渣各半和勻敷之。一法

麥糠八兩甘菊花

一錢先以沸水攬勻鋪在布上，隨卽加上芥末

柴杏宣預
以清水開調

然

後外敷約一刻，發痛異常，卽宜撤去洗淨，另用清油塗之

可也。

瘡而反以賸青羞羞婦女膚輕薄者宜慎用

又法用芥末蛋白和勻敷

之此法在小兒亦可用緣有蛋白相調便不患其酷烈也

若小兒則用芥末麪粉各半而以水攪勻敷之

復取芥末須以
薄荷開調製發

附
加上
布蓋

主治

牙痛宜敷頰部、喉症宜敷心口、腦筋作痛骨鈍發
唾及患走風腳症宜敷患處、臟腑內若發炎須按其部
位敷之、肚痛心痛及風溼骨痛用以外敷甚驗、頭上
或作痛或發炎與及顛狂等症宜敷腳心引症下去、傷
風頭刺及患風溼等症卽用芥末調水浸足亦頗見效。

芥末紙

製法

芥末一錢半

樹膠帶化水
足用

與芥末相和成

糊刷勻於紙上曬乾臨用時先以暖水浸而貼之

主治 引炎出外可作弔膏之用

亞匿加膏

製法

亞匿加膏

火酒浸一安半

松香膏

三安土

隔水法炖煖和匀

主治

風溼骨痛跌打用紙或布開貼患處

把根地膏藥方

治風溼骨痛

把根地膏

七十二安土

黃蠟

六安土

熬溶不住手攬勻至稠結爲度

又 方 治風溼骨痛跌打

把根地膏

二十安土

乳香

十二安土

松香

四安土半

黃蠟

四安土半

卷四 松香膏

荳蔻油

一安
土

白欖油

兩安
土

清水

兩安
土

先將上四藥煮溶，次加荳蔻等油與水煎至不稀不稠，前時不住手攪勻，用時以布開勻貼患處。

松香膏 一製法

松香一物，由松脂凝結而成，內面有油，但西國則多經甑煉，業已提去其油，若中土所產，雖未經甑煉，而該油亦每

多洩去。

形色 色略黃，質甚脆。

氣味 頗似松節油。

溶化 用火燶之，即有黑烟上升，若煎熔，則能與油蠟相合。

水不能化伊打與火酒均能化

功用 療治各症多作膏藥用

膏藥方

松香

七十二安士

黃蠟

六安土

煮熔攪勻貼患處

主治 風溼去腐生肌

把根地和斑蝥膏

製法

把根地膏

四十八安士

斑蝥膏

四安土

用隔水法炖斑蝥膏至十五個咪呢之久用布濾隔後加

把根地膏再隔水煮熔攪勻冷凝用布開貼

主治 風溼骨痛內炎腫熱

西華醫林 卷四
又 方 此方英國醫生傳

斑蝥末

四安士粗研

荳蔻油

四安士二十兩

黃蠟

四安士十六兩

松香

四安士

番鹼膏

三十兩

把地根膏

二十兩

滾水

十六兩

先將斑蝥末浸入滾水內六點鐘之久，用布隔並搗盡其水，煎至臘三份。二再將各藥一齊加入煮熔，不住手攪至極勻，冷定攤於布上用之。

主治 風溼骨痛跌撲發炎俱效

又膏藥方 布國醫生傳

松香

五十安士

黃蠟

五十安士

松節油

三十七安士

把根地膏

二十一安士

五安

綿羊油

二十安士

以上各味慢火煮熔加入斑蝥末十八安土攢至極勻開

布攢貼

形色 純黑

氣味 未詳

此膏藥功力峻於把根地松香等膏藥

主治

一切風溼骨痛肺內皮發舊炎均可按患處部位貼之

輕淡水

西名亞
摩尼亞

製法形色氣味功用俱詳上文改病門篇內矣

茲論其引症外出一方而已

方劑

治風溼骨痛甚驗

輕淡水

一安
士量

白欖油

三安士量或
用生油亦可

和勻外搽

樟腦藥酒

製法

樟腦

一安士
搗碎或研
末火酒少許調之

白欖油

四安士或
生油亦可

形色

清如水無色

氣味

香烈

功用

祛風行血

主治

風溼骨銹痛外用擦患處

又樟腦酒方

樟腦

二兩

蜡芬大油

一錢

輕淡水

五安士

火酒

十五安士

以樟腦及蜡芬大油入火酒內溶化漸加輕淡水卽是

功用

同上

番齡藥酒方

番鹼

四安士
切極薄

樟腦

兩安士

玫瑰香油

三十滴

清水

六安士

火酒

三十二安士

先以清水溶化番鹼

次以火酒化樟腦及

香油化後併歸一處

以紙隔之乃可用

形色

淡黃

氣味

芳辣

功用

同上

松節油藥酒方

專治各處腦筋作痛 風溼跌打皆可用

松節油

一安士

醋強酸

一安士

樟腦藥酒

一安士

和勻

松節油製法已詳利小便門第篇內

樟腦藥酒已詳上文

方劑 一方

擦風溼跌打骨痛及腳痠痛均妙

松節油

兩安士量

生油

二安士

樟腦酒

一安士量

輕淡水

一錢

西藥醫譜

卷四

引疾出門

松節油藥酒

三

和勻用搽患處

又 方 治全上並治骨鎗各症如風痰鶴膝等類

松節油一兩

生油一兩

樟腦二錢

醋強酸一兩

和勻擦患處

又治湯火傷膏藥方

松節油

五兩

松香藥膏十二兩

研和紗紙開貼甚驗

辣椒

樹高三尺子極繁中國西國皆有種植

形色

分紅綠二種入藥用尖長者宜用酒及水浸之

氣味

其臭略香其味苦辣

考覈

此椒內函有精西醫所

謂夾西先者卽該精之名也用法取出其辣異常若將半

釐放於座上而凡或其臭者莫不嘔嘔是知辣椒功力全
在此精耳

功用

大抵內服辣椒能令腹暖及能助胃消化塗在皮肉能
發紅熱久則並作水泡外擦風溼骨痛跌打等症甚驗

藥酒方

辣椒六錢

火酒二十安

其製法宜照上文路卑

利酒方每服五滴至三十滴

一方卽用此酒

四錢

玫瑰水八安

和勻喉內發炎嗽

口甚妥

水火之法

西醫治病不僅覈化金石草木以取其精液於用

水用火以升表其病深得自然氣化之妙學者切宜畱心不可

因其淺易而忽略之也。

主治
用法

凡身體四肢作痛或內臟各部痛查明係無身熱及非發炎者則宜用冷水布鋪於各痛處可止。至若內臟或

肢體發炎紅腫作痛則宜用冷水布鋪之乃可。若身弱

寒顫之病或屬幼兒可焙熱絨布裹之。筋作痛用乾

布焙熱鋪之。或背脊惡寒不安亦可用。肚痛用熱水

浸能止。幼兒傷風初起或發熱或抽筋皆用熱水浸之

可止。傷風初起熱水浸腳啜熱茶亦能發表。膀胱內

皮發炎小便澀痛婦人閉經以益盛熱水坐浸日二三次自

愈。論火氣詳於行腦氣及血第 卷十 篇內查閱

便知

巴豆油 此油已詳上瀉藥，若用以引炎，功力亦峻。

驗狀

主治 大抵將油塗在皮肉閱數點鐘，能發熱而起紅粒，且該

粒由漸生大，彼此相連，則將變爲膿瘡，自可引症外出。

用法

凡內傷及久咳等症，宜用此油搽胸前，頭腦積血宜

用此油搽頸後，臟腑患病已久，宜按其部位搽之。已

上各症均宜搽至發出膿瘡爲度。若膿瘡既發，則另塗白藥膏可也。

斑蝥

斑蝥乃草莢飛蟲也，中土甚多，其形與西國有別，而功

用則一，取以研末，作藥殊多功效。

西藥擇

卷之二 引疾出門 巴豆油 斑蝥膏

三

斑蝥弔膏方

斑蝥末

一觔

黃蠟八兩

松香八兩

豬油

八兩

先將黃蠟、松香、豬油煮熔，然後將斑蝥末加入攪至凝結爲度。此膏用布開調，或紙亦可，大約貼三點鐘或五點鐘，俟其略起水泡，隨卽撤去，再用麥糠甘菊敷之，或用爛飯敷之。

功用

其妙有三：一能行氣血，一能引炎外出，一能令

熱消散而免生翳膜。

主治

凡臟腑發炎俟其稍退宜貼此膏令引炎出。頭腦積

用法 血伏熱等症，宜先用藥清熱，次用弔膏貼頸後及小腿裏。

眼內久患熱症，宜貼太陽穴及貼耳後頸後等處，自可

免生翳膜。肺內熱症已退，尙覺痛而未愈，宜貼胸前。

腦筋作痛宜貼患處若骨鋸發腫宜貼數次方能見效

裁酌

貼此膏宜分症之輕重其在輕症則俟水泡起後隨即刺穿另用白藥膏潤之其在重症則刺破水泡之後並宜揭去其皮而復用松香黃膏貼之令膜盡發庶易獲效至小兒貼此弔膏須將白藥膏加入令勿過烈爲妥

斑蝥紙
製法

白蠍

四安士

鯨魚蠍

一安半

白蠻油

兩安士

咖啡

叮松香

半安

斑蝥末

半安土

清水

五安土

和勻

用白鐵罐熬沸

慢火至兩點鐘久不住手攬勻絨布隔之流盡爲度不必搘藥渣之水用一方平器皿傾藥水於中臨過紙時慢火燶燄以手

捻紙兩頭，輕勻拖過，僅溼紙下一邊，取起備用。

功用

略遜斑蝥膏，風溼腦筋痛等，皆可用。且雅潔不污衣。

斑蝥酒

方 凡風溼症，擦之甚效。

斑蝥一錢

芥末四錢

胡椒四錢

樟腦四錢

蒜頭

一顆

白醋四兩

火酒十二安士

和勻

同浸七日

瀘淨

鐵烙之法

功用去腐肉，療痔症亦可引症外出。

用法

將鐵條燒紅，少頃俟轉黑色，以磨患處。如此則腐肉自

去。療痔症先將該痔剪去，次以鐵條燙熱磨之。

鍛養水

製法

銥炭養

十六安士秤

石灰

十二安士秤

清水

一百六十安士量

先以水化鍊炭養入鑄鑄宜先導煎之後將石灰徐徐加入用箸頻攪
再復煎沸少頃俟雜質墜底然後用曲玻管形如酒角令此藥水入鑄
法將該管先繩以水暫冒破其兩頭於是二頭放入鑄內一頭插入鑄內旋即
放開管口如此則該藥自可乘氣而走過鑄中矣○且此鑄用青色者尤佳隨卽封密凡毒瘡不能

收口卽以此淡藥水塗之可治

鍊養丹

製法

卽以鍊養水入銀鍋或鐵烈火煎乾煎至稠如膏油爲度隨以玻璃條挑出少許俟冷凝爲堅實之質方可停火否則再煎可也由是以模子印成藥條其藥條亦宜乘熱入鑄封固

形色 色白體潤而滑露天氣則變爲流質

氣味 無臭味鹹而辛 溶化 清水火酒均能溶化

又法用鍤養二 石灰一

擇其新煅而未過水者佳

先將鍤養煮熔然後

以漸加入石灰隨將玻條攪勻攪至成膏仍用模子印作藥條俟乾後外塗以漆自不至發潮也

功用

此等藥條功力甚烈磨而搽之能將皮肉打爛

一方 用鍤養石灰各半和勻以樽貯密用時則以火酒少許調化可也

慎用

此散久敷皮肉能令瘀黑及覺痛熱異常

大約痛至五
六點鐘左右

越數

日瘀黑退去則變爲膿瘡其酷烈有如此

主治 凡療癰癥鹹疖及被蛇傷等症其應將患處打爛者均

宜用此敷之 但皮肉應打爛多寡須先以隔紙膏剪開

一孔鋪上令其露出此孔或闊或窄然後以藥投入孔裏庶免侵累別處蓋凡屬酷烈之藥無論或塗或敷均宜用斯法也大約敷塗片刻卽宜撤去而再以爛飯鋪之如此則患處之肉未幾卽爛也俟腐肉去清另以藥膏敷上而患口自可愈

鎔養酸 此蓋用銳鎔養調水加入礦養製成者也

形色

凝珠纖小恍似針形色深紅

氣味

味辣澀具有丹

力酷烈異常

辨別

用作藥水亦分濃淡二種淡者可作斂劑濃者直同硝

強能將皮肉打爛而藥力並可深入

西醫最難試以此藥水浸之能令其化掉是其藥力之烈矣

功用 凡冀門患痔及前陰因花柳而發毒粒篤同用此塗之均能打爛 一法 用水調化藥珠少許調至如漿隨將玻璃條塗在患處約片刻卽以溼布抹去旋用乾布蓋護如此則患處之肉自能打爛也迨腐肉脫清亦宜另用藥膏敷之

銀淡瘡

此藥已詳上補劑但內服固有奇效而外塗尤多妙

用也

功用

以藥條蘸水搽上皮肉能令變黑久則並作水泡而皮肉因之而爛 若搽腐肉先變白而後轉黑

主治

凡鹹疳腐瘡等症均宜用此藥條搽之 喉內久患炎

症搽之亦妙 婦人乳頭裂爛削尖藥條搽入其罅須削成如簪頭形

今易或以鹽子宮口生瘡亦宜用法搽之 瘡利用此藥一分半
有蒜亦可

清水一安和化外塗 眼科用此藥二釐或五釐 清水一安土量調

化搽之甚驗 喉症用此藥七分 清水一安土量和化隨以竹
紵海絨蘸而搽之推之俗名飯葛及離眼等處用此藥可拔治惟先
以溼布敷透次以小刀割平然後搽之庶易奏效

方論

凡作丹用以此藥爲最通行緣其功力不甚酷烈也

至若搽藥過多而轉以貽害即用生鹽水洗之可解

淡養酸

即硝
強酸

此藥水用作服劑已詳上補藥篇若作丹用功力

尤峻

主治 下陰因花柳而發毒粒者形同
篤用此水搽之

良
鹹疽乍起塗之亦妙

若療內痔宜用法搽之

法以機器
柄大擦開

瘡跡先行拭淨隨以濃滑強水搽其處去紙初搽二次則痛約兩三點鐘方止若搽至四五則不甚覺痛而漸可愈也但內痔係成塊而厚者宜用此法若作粒而多者則用別法可也

西藥畧

釋

卷四 引瘡外出門

淡養酸 素微養丹

三

汞淡毒丹

卽汞硝強丹 製法

淨汞

三兩
二錢

濃硝強水

五安
半量

清水

一安
半量

先將濃硝強水與清水和勻隨以淨汞加入令其鎔化後煎沸約一刻久俟冷取出貯入玻璃樽

形色

氣味

功力甚烈能爛皮肉

主治

背癰及蠶食桑症宜

用此搽之若患阨尼之症多生小粒者

瘡瘍發癰尼一
瘡見皮膚癰癥編

宜用

玻筆濡此藥水按粒點之瘡若發腫亦用此藥水點在瘡頭凡搽毒瘡宜向患處約搽方寸便可次用布蘸水鋪之大抵搽後卽變白色未幾發炎隨結黃靨不久自愈

錠質

十六安士秤
宜擇其鬆者

鹽強酸

四十四
安士量

雨水

二十安
土量

錠炭養

半安
土秤

綠氣水備足

先將錠質鹽強酸及雨水

和勻倒入磁鍋隨將鍋坐入沙金釜下用慢火燶熟燶至藥水

不見發氣然後加火前沸約歷半點鐘再加雨水熬之熬至該藥之水如初方可停火停火後亦宜隨時攪動俟過廿四點鐘

瀘淨貯入大樽

鑄以能載水一百
半安士者方合

然後將綠氣水徐徐加入樽內而頻

攪之至該藥水亦有綠氣水臭味爲度其餘尚有錠炭養則逐少加入而復攪之攪至內有紅粉墜底爲止由是用紙隔之再復倒入磁鍋煎去該水隨用小玻條探驗俟冷後見有物白而實者附於玻條共形光
若舊鹽如此便可製成是藥矣但此藥煎乾後宜

卽倒入模子印成藥條其藥條亦宜乘熱貯入玻璃。又法或將此煎濃之藥倒在石面俟冷定變作一塊而後打碎入樽亦可。

形色 質軟恍如黃蠟色白或略灰能過光露天氣則發潮氣味辣溶化 清水伊打火酒均能化若用火燬熔並能飛散

功用

此藥具有丹力能打爛皮肉外科用之甚妙第藥性酷毒誤服之輒能壞人

服法

惟加水沖至甚淡方可內服服之亦能補腦及行血氣也

外治 用錠綠丹一分 麵粉二分至五分 但內服者極少

和勻製作藥餅用敷

毒瘡甚驗但藥味欲其濃則用麪粉二三分藥味欲其淡

則用麪粉四五分蓋瘡有大小輕重不同酌用之可也大抵藥餅之大而厚者其功力則能久敷藥餅之小而薄者其功力不能久敷也但用以較瘡其藥餅亦不宜太大太厚誠恐若燭過多及疼痛過甚也要之此藥雖毒而用以外敷亦只能打爛患處皮肉而弗至連累別處卽該毒亦不患其侵入也

白礬

即鐵矾
礬

將此物煅作枯礬研摻潰瘡能去腐肉已詳上斂劑內

銻礬

即膽

此物能作丹用已詳上吐藥篇

銻礬

即膽

可作丹用已詳上吐藥篇

火氣

用火氣之法已詳上文行腦氣及血門篇內矣

名口

三

消炎腫潤皮去毒藥論

夫西藥論攻補表吐之法，行腦氣行血之品，平脈平腦之藥，固詳且備矣。然皮腠之間，臟腑綱膜忽患紅腫作痛，俗所謂無名腫毒，西醫謂之發炎是也。割之不能攻之不可，惟有消其腫痛，或令其成膿而拔之出外，爲妙法也。至臭腐毒瘡，則止痛辟穀爲先，翼其漸愈。此又於刀針之外，別開法門也。另附各土藥可消腫毒火傷跌打之患者，俾村野農民難於購藥尋醫者，隨時隨處皆可就便采用耳。

卷四

四

甘油

此卽用製番蠟所臘之水煉成者也。蓋番蠟係豬膏及

蠟水等物所製。茲則將其所臘之水先行煎乾，後如入火酒，令其食出該油，濾淨而隨將火酒煎去。如此則所臘者卽甘油也。由是再加入生物煉成之炭煎沸，而復濾淨數次，務至無色無臭，方爲純淨。

形色

此物用指探之，恍如清油。

氣味

頗甜。

溶化

清水、伊打火酒，均能溶化。此油亦能化別種藥水。

功用

療症作潤劑用。凡用藥外治而宜加入甘油者，蓋取其

能潤而不至驟乾也。

外治

一方 甘油一安
土量

石灰水四安
土量

玫瑰水三安
土量

和勻 凡被湯火所傷而非屬重症者卽用此搽之甚驗
且酷暑之時其頸下腋下及前後陰鏹隙等處或因汗
積而搔損者亦宜以此搽之

一方 甘油

半安
土量

玫瑰水

七箇半
安土量

硼砂

五分至
一錢

和勻

凡婦人乳頭爛而生鏹者用此塗之甚效 即冬天手生
拆口搽之亦妙 且患耳聾而屬焦乾者其在淺症宜塗
此油或滴入亦可若用綿蘸油塞入耳內則宜早晚換之
花士玲 凡做煤氣所曠之內可製成藥數等有花士玲在內

用法取出製淨用

形色 淡黃如脂

氣味

日久不走變

功用 最潤合和別藥爲膏或獨用以塗損傷處 眼邊爛亦

可擦塗刀劍鐵器不銹

火綿酒 製法

火綿八錢

伊打酒三十六安士量

火酒十二安士量

先將二酒

和勻後以火綿加入則自能熔化而製成是酒也

形色 此酒略稠無色並能透光

氣味 氣息恍如伊打宜用玻璃樽貯密

配合

但此酒每一百分須加入甘油二分蓋取其能潤也

功用

此酒用筆搽在患處數次少頃而酒即飛去能遺下一

塊光薄之皮涵蓋患處醫者觀之自可洞徹見底如此治

法蓋能使天時不正之氣及外水無從侵入而療治庶易奏效

白樹膠末 此樹產亞喇卑亞亞非利加北邊等處宜熟地沙土樹更繁茂有高四五丈者細葉圓長對出花白微黃恍同鬆開絲纓其膠係從樹身流出或用刀剖破樹皮俟其自乾或晒乾用

形色 有黃有白藥肆所售者或大粒小粒不等上品者色白微黃乾潔不相粘連間有微紅微黃色者研末則皆成白色下等黃白不一雜有沙泥樹屑在內不能純淨故而互相粘成一團以此分別優劣

氣味

無臭味略甜淨者口含可以化盡

溶化

不拘冷水沸水皆可化後成樹膠水再復煎乾可得回原重之數並無耗少惟火酒伊打酒各等油類均不能化凡經水化者加入火酒能令凝結

較覈

比水略重水一則此膠粒重一零四投入水內可沉到

底

功用

主滑潤 凡喉痛及胃內皮發炎用以潤之

大熱症可用作食物

爲未可和小丸以免粘連之用又

凡藥散水不能化者用樹膠水和之令此藥散浮上以便

飲服

胡麻子

西國中國各處皆有所植每年栽換一次高二尺餘

西藥畧釋

卷四 消炎腫門

胡麻子

四

外殼圓而小曝乾打脫取子肉用

形色 色黃黑內面有油

氣味

生無氣味燜熟微香

功用 解毒行血

方劑 一方

胡麻子四安杵爲末

生油四錢

沸水半觔

先以沸水將

胡麻末和勻漸逐加入生油加時不住手攪勻

主治 凡皮肉發炎紅腫成瘡未破者及心肺肝胃大小腸發

炎作痛按照各處部位在外敷之勿令勞動可減輕炎痛漸漸消散在外者則或消或熟令其成膿穿破出外不至

釀成大患

附消腫潤皮等方

麥皮

四兩或半斤

甘菊花

四錢

胡麻子

六錢
杵爛

和煮成稀

糊乘熱敷之

其用有三

一取其溫暖

一取其溼潤

一取其軟滑故能引炎腫從外而消也

主治

凡肌膚發炎骨節發炎腫痛外敷患處勿令發炎肢體

轉動冷即換熱者再敷

內腑等處或連綱發炎可按各

部位在外敷之勿勞動甚效

榆樹皮

刨花

以暖水浸之可敷熱腫之處或和以胡麻子

末甘草末連刨花溼敷之亦取其溫軟溼潤以止痛消腫

之效耳

又敷治腐爛毒瘡奸妙之類二方

酵水

六安

灰麪

十四安

清水

六安熱至一百度
方合卽大暖水

先以暖水和勻酵水漸加入灰麪不往手攪勻放近火爐
俟其發起以布開勻敷患處止痛辟臭穢之氣

又 方

堅炭末

研極幼半安量

麵包

兩安土量

胡麻子末

一安半

沸水十安
土量先以沸水浸麵包十咪呢之久攪勻漸加入
胡麻子末以一半堅炭末攪勻用布開調再將一半堅炭
末摻勻上面作一服敷貼患處

上各方係敷紅腫作痛瘡末穿破之處此二方用酵水堅炭末

係敷治毒瘡臭腐之處故藥品不同醫者擇而用之各得其要可也

按外敷消腫山草藥等方各處土人多有識者如山茨姑拔
毒消癰 火殃筋 火炭茂 文樹蘭 瓜子菜 芙蓉花
葉皮 水棉花 忍冬花 甘草 苦參 生地 黃芩
梔子 茴麻子葉 蕉葉 旱蓮草等草藥或杵爛和灰麪
煮糊或熬水洗皆可消腫散熱 至若蒲公英能消婦人乳
瘡 舊茶葉滾南瓜葵花油可消湯火重傷 脂肪花蠟梅
油可治小兒爛痘 絲瓜皮苦瓜皮槐柳桃李枝葉熬水皆
可祛風腫三七王不留行石勒草紅花葱韭沫霸王鞭七星

劍凡對葉方骨之草杵爛以酒麪煮糊敷傷腫瘀痛之處可以見效若跌打刀傷流血不止在西醫則以冷水洗淨創口紮住血脈管而血自止外以瑪膏及縫回外皮是又另有書詳查割症庶可知其梗概也已

論解酸之劑

凡遇胃腸酸澁，則不免腹痛發瀉。此解酸之劑所由設也。大抵能與酸相合而並能敗酸之力者，即謂之解酸藥。蓋該藥有三：一屬蛤利類，一屬似蛤利之土類，一屬蛤利合炭強所作之鹽。醫者宜分晰也。但此藥非具療病功力，惟酸澁能化而使勿爲患耳。服是藥者，宜與補劑及去風劑同服。凡腹痛作瀉，係因酸而致者，服此可止。溺變酸，而將作砂石淋服之，亦驗。此藥宜晨早或飯前空心服。服後，凡一切酸甜肥膩煎燉等物，均宜戒之。至服解酸劑，其蛤利在腸胃間，有與厥酸相合，而作爲瀉藥者，如銛養、鍼養是也。若鉢養則不然。要之，胃經

本須有酸方能消化食物，故此藥亦不宜過服久服，否則令腹不消化，而漸致噎食。由是血弱身虛，及發盜汗，而反難療治，是不可不慎用也。

石灰卽鎂此物冷水難化而熱水尤難化其在新燒成者力能化
已熟植物故或以之糞田乾者內服不免壞人惟浸水瀘淨服
之而後人胃無傷功能解酸及止津液但不可過服久服耳

考覈

大抵新煅石灰具有丹力和以礮石能去腐肉並令髮

脫

方劑 一方

石灰二 清水三 相和再加入輕礮氣至灰水不能食
氣而狀如膏油爲度由是將此水塗於毛際少頃隨用竹
片刮之則毛脫不痛

一方 石灰三兩 汽水六斤 泡化貯人玻璃瓶療病則

西藥畧釋

卷四

解酸門

石灰

四

取極清者用。凡腸胃因酸作瀉及尿變酸者宜服。痢症及作悶吐。用此灰水和牛奶各半同服可治。噎食症用此灰水一牛奶二和服。服時忌食別物。小兒舌生白苔及瀉青服此亦佳。

雜治

除小兒血癥。用新石灰洋鹹等分和研。另以軟皮剪一穴而小於癥而者。隨將皮穴蒙在癥上。而以藥塗所露之癥面。不久自除。耳孔喉際及男婦前後陰出惡瘡。宣以石灰水洗之。金錢癰爛頭痒及惡瘡。用以洗之。亦驗婦人肛門前陰發癢。洗此水亦可止。白帶宜用此水射入。內傷用石灰水化汽吸人肺內。一方。石灰水。

十六安
土量

汞綠毒藥
五分

和作黃水凡不收口毒瘡塗

之卽驗
一方

清石灰水
十六安
土量

迦路米一錢
和

作黑水用搽齷疳疔毒甚效

洗癩一方
石灰十兩

清水
四觔
半

浸濾日洗一次
治湯火傷方
石灰水
濾

淨生油各等分攪至融洽以鶯翎塗患處甚妙

淨火石粉 製法

火石粉一觔下碎加以少水研幼研至稠結如漿再加入多水攪勻少頃俟其粗粉墜底卽將上面白水倒往別盆益內先貯清水其餘粗粉再行研幼加少調勻少頃復將白水倒在別盆俟其幼粉悉墜於底然後將上面清水棄

去俟乾後用樽貯密

形色 灰白

氣味 無臭

服法 每服一分至七八分

功用 解酸調胃

主治 胃不消化發酸腹有酸

痢症宜服

一方

淨火石粉

四錢

樹膠粉

二錢

冰花糖

二錢

桂皮水

四安
土量

清水

四安
土量

先將二粉與冰花糖下研研勻入以少水調洽然後加入餘水及桂皮水以瓶貯之

菖蒲藥水時
蜜酒或橘酒
每

服一酒杯每日數服 痢症服此加些鴉片酒

或橘酒
蜜酒

更妙

珍珠 石決明 牡礪 蛤粉 鍾乳石

石蟹 凝水石 龍骨 龍牙 雲母

已上十種，時珍本草誇其諸多妙用，而究無實據。西醫嘗用法細覈，始知各物均函有石質及炭養氣，故功用祇同火石粉。若用烈火煅之，則炭養氣散去，卽變爲石灰。其妙處不過如此。然則入藥者何必區區珍珠等物，而徒取其貴也？誠知火石粉一物足以代之，則虛糜可省矣。但此物必須研細飛淨，乃堪內服。至若論其功用，亦只解酸而已。

鍊養水 製法詳上引症外出篇

形色 無色

氣味 無臭而味清

西藥考釋

赤河解酸門

鍊養水

鍊雙炭養

鍊養兒

考覈 以草藍變紅紙試之立返藍色 大抵此水能食入皮內若以指蘸而挪之恍如油滑

功用 解酸利小便

服法 每服十滴至三十滴

主治 凡腸胃有酸及溺變酸者宜服

慎用 藥性酷烈須以多水冲和方可內服故應服此藥者或

改服鍊炭養尤佳

鍊雙炭養 製法形性詳上利小便篇 若用以解酸每服三分至七分

鎂養 **製法** 以鎂炭養下瓦罐即鑄鐵煅兩點鐘久俟炭養散盡便可製成鎂養也

功用

取瀉解酸治痢

服法

每服分半至四分，日兩服

主治

因酸溢而胃不消化

砂淋症係由尿酸而致者

腦

作痛係因胃滯而致者

小兒痢症由於胃酸者皆宜服

酒風腳症服之亦驗

鏗炭養

卽澀
蘇打

製法

先以生鹽加入礦強水令其變爲鏗礦

養焙乾再將此物與未經煅灰之石各半研細然後加入堅炭末五分一併研勻隨卽放入曲燄爐內圖見學初階卷二用火射煅煅至熔成一團變作黑色大約此物經煅每百觔內有鏗炭養三十六觔此則宜浸以清水合提出鏗炭養可也提出後卽以火煎乾再約用此散三觔乃加木屑即
照此數種可也一觔和勻入爐煅熔

仍用曲
燄爐

如此則木屑自變爲炭養氣而與鏽質相合也大抵此散復經煅後每百觔則函有鏽炭養五十觔由是以水化之瀘淨再煎煎至上面起有一層薄綿爲度俟冷凝珠傾去餘水再復焙乾方可入樽

形色 珠色白露天氣則水耗散而變爲白粉

氣味 鹹澀

溶化

清水易化若煨煅則本身之水能化已質煅久則枯

功用

解酸

服法

每服宜用分半至五分

主治

凡胃不消化發酸及溺變酸酒風腳癩癰氣癟咳症均宜服 膽淋症服此甚效 乾癩退皮癩宜內服外搽

宜

膽淋症服此甚效

乾癩退皮癩宜內服外搽

慎用 顧此藥不宜多服否則未免壞人

一方 洗癬

鏹炭養

二錢或三錢

清水

十六安土量

冲化外洗癬症甚效

又 方 治癬

鏹炭養

一分至一錢

豬油

八錢

和勻作膏用塗癬症亦妙

者訂 但此藥原具之水能化汽飛散故入藥分兩殊難作準
不若用其枯者尤妙也 枯者每服宜用八釐至二分半
和番蠟甘草末作丸內服

蘇打

即鈉養炭

欲製是藥者宜先置一小木箱在左及用雙口玻
瓶兩箇在右分列甲乙次第其木箱則約離底三四寸加上二

板該板全塊均有小孔板下之旁亦有一竅通氣其居中之乙
瓶則內貯清水且宜將一玻管插入此瓶屬在右便之口由是
將象皮管自甲瓶屬左之口起鑲連至箱旁之竅令其互通
氣佈置停妥先將鉻炭養放在箱內板上隨卽蓋密次將鉻炭
養_置放入甲瓶並加些礦強水如此則鉻炭養自然熔化而令
炭養氣先從本瓶之口透至乙瓶令過清水滌淨然後透入木
箱由板下之孔升上將見鉻炭養能食炭養氣而自變爲鉻養
炭養矣

形色

新製著作塊色白而不能過光且不發潮宜焙乾研未

入樽

氣味 味鹹不澀與錫炭養有別

溶化 冷水一十三倍方能化一惟忌用熱水誠以熱水一冲

卽能敗炭養也

功用 解酸

主治

凡砂淋症係由尿酸而致者宜服

瀉痢係由胃酸而致者宜服 腦氣筋痛係由腹酸而致者宜服且胃不消化發酸服之均驗

方劑

一方 膽淋症

方劑

二錢

水十安

調化分二三次服盡如服

後作吐應行補服或加入鴉片酒數滴再服尤妙

一方 小兒腹瀉

西藥畧釋

卷四 解酸門

蘇打

七

鑄養炭養

七釐

大黃

三釐

依畢格

一釐

以水和化作一服每日二三服

一方 妊婦作嘔

鑄養炭養

二分半至五分

鴉片酒

些少或白
寇酒亦佳

作一服可止

一方 乾咳無痰

鑄養炭養

二分至五分

每日分數次用水沖服外以鹽水浴體

一方 初患風溼

鑄養炭養

二錢

樟腦水

八安
土量

和化每服半茶杯每三

點鐘一服外以鑄養炭養

六兩
一錢

沖水一桶浴體可治

一方 乾癩及癬

鑄養炭二分半 每日分兩三次服歷三日後每日加服一分加至每日共服一錢爲度


滑石

此物質嘗經細覈乃鎂養也而腹具酸者服此則能合

辨正

至時珍本草謂其能療石淋黃疸水腫腳

氣吐血衄血諸瘡腫毒而且去身熱補脾胃能通九竅六腑津液此不過鋪張揚厲之詞誠未必有此大用也



蒙藥論

凡人遇割大症靡不畏懼醫者於此欲其不能妄動及不甚覺痛斷非蒙藥不爲功此西醫割症咸以蒙藥爲極妙之品也

顧蒙藥有數種

一伊打酒

一噶羅方

一淡養氣

一炭

礦一炭

車丁即西名

一炭

輪子即連

一丫薛同

皆能令嗅其氣而

旋卽昏迷也

大抵各藥均面有炭質而輒易飛去人若嗅之

則由肺入血而卽令氣促脈數及在腦處而發其功力迨未幾則身軟神倦而冥然罔覺也若論藥性酷烈則首推噶羅方

其次莫如伊打酒所慮者噶羅方則每易壞人而伊打酒亦能令頭刺痛及身不安耳醫者於此正宜慎用且各藥功用雖

本相同而人喚之則不無少異有喚少頃而卽蒙者有喚頗久而始蒙者未可以一律論也至若因喚而或致氣絕醫者卽宜救醒一以冷水灑面醋強點舌及令喚輕淡水而使之速醒一用法助其復生呼吸之氣西國向有薦助生呼吸覺覺知也一用電氣震動

其身一大闢門牖以納生氣及用扇搧之令生氣透入鼻口一用鉗鉗舌令勿縮入以通呼吸依此救法而自可復甦又況各種蒙藥非徒割症宜用也卽推之腦氣筋痛風溼骨痛等症而用以外治亦可略止不愈見其功用之宏耶

伊打酒 形色氣味功用已詳上文行血及腦氣門篇內矣茲
不再述用作蒙藥功力與下文喝羅方同

用法

凡割大症卽將此酒斟在布或海絨而用以掩其鼻口
離開少許如此則藥氣自可吸入肺裏而割去亦不甚覺
痛也若割小症亦可用斯酒噴于割處者其法用織口
玻管器具納此藥酒但該酒用濃酌方合隨卽鑲連氣喉用以射在割
處此法亦能止痛

嗅驗

在病者乍嗅覺喉熱而咳渾身發煖恍如微醉由是耳
則嗚目則眩而口若不知味鼻若不知臭且當昏蒙未甚
之時間有耳如聞美音目如睹美景甚至身則若飄然而

飛用手撫之則恍惚猶知而用刀割之則不甚覺痛迨嗅略久而迷愈深將見全弗知覺而儼若蠢然一物此皆病者嗅後之徵也 若在醫者當其初嗅而驗之便覺脈略數氣略促皮略發汗面略發紅而瞳子亦從而縮小少頃則見有或舞或歌或呼或泣而且或作悶或發狂由是則身漸軟語漸亂氣漸渙脈漸遲眼蓋垂下睛珠朝上而眸子則散皮膚則冷面色則或黎黑而或青白及觀其昏迷已甚恍如死去一般 醒後則身殊倦神殊疲數日內而口與鼻仍覺有伊打之臭卽溺血汗亦仍有伊打之臭也

慎用 凡用斯酒作蒙藥快則嗅一味呢緩則嗅二十味呢而

自有各徵醫者宜細察也

論列 考西國製此藥酒由來已久惟當時尙未知其大用迨一千八百四十六年有美國醫士麼頓者嘗以此止脫牙之痛而後悟出該酒可作蒙藥由是愈推愈廣用以割症而各國莫不效法莫不稱奇誠爲絕妙之品也

嚙囉方

卽蒙藥

此藥水內有炭輕綠蓋用火酒鉢綠而製成者也然必須用法甑煉數次方得純淨此水無色其清如酒輒易飛去

氣味

畧甜略香畧辣

功用

用以療症其妙有三一能作蒙藥

前西國一千八百三十二年初鑄
藥定一千八百四十七年英國鑄
始用此作蒙藥也

一可內服 一可外塗

西藥醫釋

卷四

蒙藥門

嚙囉方

七

用法

法宜用布一幅連摺數層隨將喝羅方斟在中間外用油布蓋護伊免是藥洩走於是囑病者睡下而令嗅之嗅時宜以布掩其鼻上而鼻下處則略離開令藥氣透入肺內則能令病者不甚知痛及不能妄動也而大人小兒均可用

嗅驗

大抵嗅未幾則或亂言或亂動而此際必須用人扶定迨割症時亦分兩等有略醒人事而不甚知痛者有不醒人事而全不知痛者醫者於此又宜用人佐理頻診其脈若見脈不動及無呼吸之氣卽宜用法救醒是故嗅此藥者惟割大症方合用之若小症則不必嗅誠以該藥若不善用輒易害人也嘗見因嗅此而殞命者多屬小症蓋凡

人遇割雖小症莫不畏痛所以動輒欲嗅是藥而或致傷生其實小症殊不宜嗅也倘至昏迷欲絕醫者卽宜用法使之復甦至救法有數款已詳上蒙藥論內然而噶羅方一物非徒割症宜用也

雜治

小腸疝氣不能縮上亦宜嗅此令筋鬆放 妊婦難產宜以些少嗅之令略止痛爲度若再痛則再嗅勿嫌煩數產婦或遇筋抽不妨嗅此略多 氣喘嗅此間獲功效續骨鉗症亦宜嗅之 至若用以內服亦能平腦寧睡但服此水五滴則能行血氣若略多則昏醉若過服則壞人所以一嗅一服均宜小心也 腦氣筋痛卽用此濃藥

水十五滴，搽患處，日搽三次，而痛可止。牙爛作痛，綿蘸藥水塞入患處，亦可獲效。

一方 呷羅方四安土量 白欖油四安土量或用生油亦可 樟腦八錢
和勻，凡風溼骨痛及腦氣筋痛，用此搽之，甚妙。

淡養氣

卽西士蒙藥

製法

轎淡淡養，入膽瓶內，燶熱以寒暑表熱至四百度爲率。其瓶嘴則鑲連膠管此管用樹膠製成的，而搭入水盆盆宜闊大，盆中清水滿貯，盆內復設一機器，令藥氣過水而升入機器之裏，其製法類多如此。然此猶未淨也，惟製成氣後，復過水三次，庶無雜質。

淨氣 製法

一用清水加入礦強少許，和勻而卽令該氣過

之二用清水並以銖養加入而復令該氣過之三則

祇用清水令其連上過足三次如此則該氣庶得純淨

昇法

用鹽養酸並加些濃稍強水和勻入膽瓶而略煥熱令其發氣爲度餘則照上法而製淨該氣比亦可作蒙藥也

此袋亦用桐膠製成的

長約三尺橫闊二尺

由是卽以機器藏密此氣若取以割症則須用一膠袋入之

此袋亦用桐膠製成的

庶易攜帶

功用

此氣專作蒙藥而其妙有數端一嗅之頓覺昏蒙

大約一嗅

咪呢或三咪呢便迷而不醒

二氣息不甚礙鼻三甦醒亦快四醒後不

致悶吐及無頭痛五嗅此氣甚少壞人凡割症用作

蒙藥大抵宜於小症不甚宜於大症蓋割小症祇需片刻

若割大症則非片刻所能誠以嗅此氣者未久卽醒也

如割小肉瘤刺大膿瘡及脫患牙等症則用此最爲便捷

但此氣用新
製者尤佳

嗅法 卽將藏氣膠袋鑲連膠管而令其嗅之佢見昏迷固覺

也。要之此氣雖甚少貽害醫者亦宜小心不可妄用

高告

此樹產於南美利加樹高三尺餘枝繁茂花黃果紅恍

同欖形大小未詳每果內包一核葉上圓下尖長約二寸寬

七八

分功力卽在於葉乾者用水浸之葉內面有高告咽即高
告精

此類

與酸類相合製成鹽類 **形色** 白 **氣味** 苦 合製成鹽

味更苦澀或用礦強酸鹽強酸製成鹽強高告

功用

安腦止痛

主治

搽應割之處即可止痛最要

緊係割眼球之時先搽此藥則不致痛甚

甘松錕珠 此物作片珠色白而豔臭同甘松味略苦澀 功能平腦補身 凡筋抽頭皆及腦氣筋痛服之甚驗 小兒腹內生蟲而致抽搐服之能止 每服二釐每日二三服此藥功力蓋比甘松而更峻也

麝香 麝如小鹿多產于西藏及中國四川羅蠻山谷若麝香一物蓋由麝臍而取出者也其色棕黑其臭迥香用手撫之如有油膩 彼藥肆所售者未免多僞用藥者宜細辨也
溶化 此物伊打火酒能化而沸水蛋白亦能化

功用 肚腦補神

主治 凡腹痛抽筋作悶作嘔與及乾咳服此能治 婦人週

西藥畧釋

卷四 雜述

甘松錕珠 麝香 西噴

四

身不安氣虛血弱頭昏目眩心跳肚痛胃不消化月經不調等症

服法 每服一分至二分粥水調服日服二三次

辨謬

考時珍本草誇其能除百病通諸竅開經絡透肌骨解酒毒佩之墮胎及能治中風中氣中惡等症誠未必有此

奇效也

西墳 此樹產歐洲之南採葉作藥葉內有油宜用法瓶取之

也

功力卽在此油

形色

氣味 苦辣

功用

調經行子宮之血及可引炎。若用鮮葉外擦皮肉能

令立發紅熱用油亦然惟不至如芥末之烈耳。

主治

婦人氣虛血弱面黃而閉經者服此甚驗

惟壯婦及懷妊時忌服而

且此葉有毒亦不宜過服也

作藥膏方

西墳鮮葉

六兩四錢

黃蠟

二兩四錢

豬油

十二兩八錢

煮熔攪勻

凡風溼骨痛及骨鋸發腫宜用此塗之既

貼弔膏後而欲令膿盡發者宜將此膏再塗

火硝

出處提取功用已於發表門詳述矣茲將通用各方列

右

一方 療風溼每服七分，每日三服。用薏仁湯化，但每日分兩須以漸加多服，至每次一錢，而每日仍宜三服。大抵依此治法，亦須服至二旬方效。患水臌者服之良。

又 方 婦人月經過多，每日先服瀉藥，後用此藥三分半至五分，薏仁湯開服。

一方 療白帶

火硝一分 白礬八釐 水化作一服，每日三服。

鍛錫養

製法

鍛綠養末

三箇半安士秤

錫養

四安士秤

先將此二藥和勻，放入磁鍋，另用鍛養

五安士秤

雨水四安和士量

化亦倒入鍋內隨將該鍋坐入沙盆盆下用火煎乾時
宜頻攪動俾成一團然後取出研末研末後復放入鍋以
焰至紅色而再復焰一點鐘久方可取出俟冷再行研幼
隨用雨水甘四安土_量化之俟其不能化之物悉墜於底
卽倒出上面已化之水再加入沸雨水八安土_量和勻瀝
淨然後將淡礞強水徐徐滴入至無酸力及無蛤利力爲
度由是再將此水倒入磁鍋煎至上面起有薄綿方可停
火俟冷凝珠又倒去上面之水加入雨水六安土_量_煎沸
隔淨俟其再復結珠而後倒清上面之水惟此時該珠尙
溼法宜用碗盛之另以一碗載濃礞強水於是用一玻罩

將此二碗覆蓋如此，則珠之溼氣自飛去，礦強水內，卽獲

乾淨此珠宜用玻瓈貯密

形色 珠恍似鍼色深紅每取一珠鎔以水而水亦變紅

氣味 略甜

溶化 水易化

考覈 此珠內有養氣，若遇白糖甘油火酒及各生物，則養氣將必離開而令生物等項粘合

功用 解毒

方劑

一方

鍛錫養珠

八釐

雨水

一安士量

和化外搽惡

瘡其毒頓消 婦人陰戶積臭，用此藥水射入可辟。且鼻耳口內或有臭氣亦可用此滌去。凡一切污穢及病

人寢室毒氣用此藥水灑之自可辟除

鉛綠散

製法

先以石灰放入磁器蓋密隨用法令綠氣入
石灰裏如此則兩物相合卽成爲鉛綠散

形色

此散頗鬆色灰白

氣味

其臭略帶綠氣味苦竦

溶化

清水可化能漂白衣服

藏貯

若露置綠氣卽洩宜用玻鎔貯密

功用

能解病人寢室諸般臭毒氣息法宜用散調水或灑於
地或灑於牆或用布蘸此藥水懸高自可辟之也至牢獄
茅廁及人多擠擁等處宜用此散撒在地下自能驅除一

卷四
切穢氣 毒瘡發臭用此散調水洗之 口爛及牙肉臭
腐用水調化含之

方劑

漱口用 鈎綠散一清水百倍攪勻用之

一方

治瘡用 鈎綠散

錢

清水八安

和勻搽之此

淡藥水也

一方

鉢綠散四錢

清水八安
土量

和勻搽之此濃藥水也

製濃淡藥膏方

濃者宜將鉢綠散及豬油各半爲之淡者則

將鉢綠散減少可也

汞鉛膏

製法

淨汞

二兩

白欖油

一錢或用生油亦可

硫磺末

四釐一分

鉛養膏

四兩
八錢

先以欖油逐漸調化硫末次將水銀加入須研至
不見水銀星爲度然後將鉛養膏煙熱合共和勻

功用 消腫解毒

主治 肝脾發大骨鋟發腫及頸癰等症宜用布開調以貼患處

黑汞鉛水

製法

迦路米

五分

石灰水

十分
土量

和勻

主治 凡痘疔及日久惡瘡係由花柳而致者用此藥水搽之

甚驗

黃汞鉛水

製法

西藥各等

卷之二

雜述

黑汞鉛水 黃汞鉛水

七

汞綠毒藥

三分

石灰水

十安士量

和勻

此藥水搽疔毒

惡瘡等症亦妙

鋸礦養 此映相所必需之藥也然推其功用並能食別物所
函之養氣而卽壞却是物

通用 彼皮膚之症生於鬚裏而恍若有枝相連者宜用鋸礦

養

七分清

水

一安

土量

和勻搽之日搽數次而該枝自可剪除

婦人陰戶發庠用此搽之其庠自止若搽惡瘡

藥水宜
用淡的

亦可去毒收口

蜜陀僧

卽鉛

製法

先以鉛入鍋煮熔用鏟再燭合與天空養

氣相合變作黃粉

卽黃

丹隨將該粉撥出復用烈火煮透俟冷凝

結卽成爲蜜陀僧

膏者蕕蘆原函有鑄質者用法
提出該類則所製者卽蜜陀僧也

形色 作魚鱗形返光色棕黑而略紅

氣味 無臭無味

溶化 清水難化不入服劑

製膏藥方

蜜陀僧

三斤研至極細

白欖油

一百六十安士量或用生油亦可

清水

七十安士量

先將欖油放入銅鍋次以蜜陀僧末篩入頻頻攪動然後加入
清水用火煎四五點鐘煎時亦宜頻攪若太稠則再加水以煮
至恰可成膏爲度以布開調

通用 可作合口膏用若和入別藥作膏尤爲通行

辨謬 時珍本草謂其能鎮心補五臟治驚癇欬嗽嘔逆吐痰

西藥畧釋

卷四 雜述

蜜陀僧 合口膏

七

而且久痢瘧疾均能療治正未必有此妙用也

合口膏

製法

蜜陀僧膏二十
四兩

松香三兩
二錢

番臘一兩
六錢

先將蜜陀僧膏煆熱另以一鑄將松香番臘煮熔然後加入蜜
陀僧膏和勻此膏宜以布開調凡割症用以合口甚妙

收口膏

卽俗名
埋口膏

製法

蜜陀僧膏廿七
兩

番臘四兩
八錢

松香八錢

宜照上法製之製成後用布開紙開調均可凡瘡科及皮膚
等症不能收口者以此膏貼之

石膏此物嘗經細覈乃鉛養礦養加水也煅之則所函之水

化散而成白粉卽熟石膏也煅煩中度者再和以水則能堅凝
如石故或以作脫胎鑄模此生石膏水化極歟一若全無化動
卽以三五兩煎服入胃者亦止些須且無蛤利酸力亦無發吐
攻瀉之能只合作器不堪入藥

辨謬

時珍本草謂其能治中風及傷寒發狂風熱心燥凡一
切頭痛腹痛牙痛胃熱肺熱身熱均能療治此皆浮泛之
詞也

秋石

此物覈得內函尿酸尿底及鈎養之質間或兼函綠氣
殊無功用服之未免損人

辨謬

時珍本草謂其能治虛勞冷疾小便遺數漏精白濁而

且滋腎水養丹田潤三焦安五臟消痰退蒸清心明目益壽延年實不知何所據而云然也

陽起石

此物內函鎂鈸鐵養玻酸等質別無功用不堪入藥

辨謬

時珍本草謂其能補腎氣而所有精乏腰疼膝冷溼痺月水不定子宮久冷均能調治均非確實之詞也

赤石脂

此物內函鉢炭養別無功用不堪入藥

辨謬

時珍謂其能明目益精補心血生肌肉除水溼收脫肛

誠未必然也

大楓子



大楓子

產印度孟加拉等處。樹身高大，枝細莖繁茂。樹皮灰色光滑。葉長五寸至八寸，葉蒂圓而未尖銳。葉非對生參差。

西藥畧釋

卷四 雜述 大楓子

三七

而出葉面潔澤底有粗紋微凸其花開五瓣有香氣鬚蕊紛
然生於嫩枝近了托處果圓大橫徑約三寸皮色灰粗澀厚
硬果內子核甚多每顆長約一寸子面有油搗爛搘取其油
用功力全在於油也

功用 內服外治均有功效

主治

風溼症以此油擦患處見效

凡風溼症宜於夜間

初次服五滴以次漸加至十滴宜飯後不宜空腹

扭傷

跌打骨絞作痛每日用此油擦之數日見效

此油可助

開胃服後宜吃好物調養爲妙

內傷症每日服兩次初

服五六滴 腦筋痛用此油和樟腦末或和哥羅方擦患

處可止。多年頑惡癬疥以此油搽之效。印度地方有
麻瘋症用此油內服外搽往往見效云。

考訂 查本草綱目能治大風疾。又以仁研極爛。武器封
口入滾湯中密蓋勿令透氣煎至黑色如膏名大風油可
以和藥氣味辛熱有毒主治風癬疥癩楊梅諸瘡攻毒殺
蟲。震亨云此物性熱傷血不可多服有病將愈而先失
明者未知確否然內服當撙節而善用之爲佳也。

名四

卷八



調養製藥總論

人徒知貴重之物爲有用。而不知無用之物更比貴重之物爲有用也。觀用啤酒。先雞喙汁等。以療各症。則知古名醫以牛溲馬勃。皆成良劑。誠不虛也。人徒知藥石刀針以治病。而不知不用藥石刀針之治病爲更神也。觀用牛奶。牛羊肉。雞湯。蛋酒。杏仁。薏米。初高辣等。調和戒口。而起衰羸。則知古賢士以平和爲丹汞。節食當中醫良有以也。人徒知飲食以養身。而不知錯用其物。即可戕身。善用其物。有非藥石之可能。及者古訓有云。人死於刀兵。飢寒者常少。而死於祚席縱慾者常多。如醉飽宣淫。五臟傾覆。遠行勞悴。一頓飽餐。皆死生之禍。亦如大道祇在日用。

倫常之間。而不知自檢。反登山涉水。而訪求於杳渺之際。是舍近圖遠。厭故喜新。如猶太狂且。日對至人。尙求自天奇蹟。噫。好奇至此。離正愈遠。無怪仲尼不述。索隱行怪之事。爲萬世防微。亦深切著明者矣。吾喜西醫論治病。善用飲食一節。有合乎中庸。至平至正之理。可以傳後。而無疑。至煎熬藥膏。一可省運費。一取用精湊。誠爲便捷。何以川滇產藥之區。迢遙萬里。胡不做而行之耶。卽此一節。足覩誠僞之分。遠遜西國。今之藥販。有形可考者。尙且千般作僞。愈出愈奇。致不可窮詰。況熬膏製酒。而可信之乎。吾亦恐西來之藥。日售日多。或將來假手於傭販。射利之徒。倘一旦攏雜亂真。則所關非細。是亦不可不預爲之防。

也。華扁之妙技俟人而傳。亦恐其習之不精。以人命爲戲玩。有
非草木湯劑可比者。更不可不知也。

卷四

四

三

論初高辣 此樹生於南美利加墨哥西等處，高三四丈。菓如梨，長五寸，菓下垂，略凸如乳頭，肉鬆，味甜，藏核甚多。取核晒干，或焙味略苦澀。其新焙者，用箱貯藏地內，兩三日則苦澀味盡去。核形扁類卵，長四五分，色紅櫻或灰櫻，不等。核之邊欄有凸線痕一條，核內有油，每百分中有油五十分，有漿約十四分至十八分，有輝啤連之類十三分，至十八分，餘屬雜質。

一取油之法 將核杵爛，上下鐵板二塊，燒熱壓搾，以取其油，卽名加加阿。

一凡初高辣菓核，杵研爲末，照重加白糖和勻，做成方長條，或員餅，炖熟，牛奶調和食之有益。

一凡不能飲茶葉及咖啡者以此代之

一病人初進飲食時用牛奶和食最爲有益

一油色白略黃凝結恍如猪脂手掌之熱可化味與核同伊打酒或熱火酒皆能化

一以輕重表探之水一油一零九輕於水故浮水面

一功同魚肝油可潤肺補肺

一用製膏藥治瘡科傷損俱效

一可和各等藥散以器具製成條納入肛門最爲通行之用也論碑先此乃由猪肚內皮發出之汁

製取之法

一將豬肚內皮用鹽強水加生鹽少許汁自結珠
一將肚內皮洗淨用象牙刀用力刮之則汁自由肚內之核而
出然後薄放於玻璃片上以熱水燙乾或用熱氣燙乾不可
過寒暑表百度

一方 糖開者可服八釐半至一分七釐甘油開者可服五
分至一錢無有用酒開服者

相反 蛤利類 各等強水 水銀鉛錠銅所製炭匿酸加泐
酸

相畏 火酒 各色酒類皆可敗其功力

相佐 奶酸 鹽強酸 醋強酸 檸酸等 甜肉汁 酒種

功力試驗 以凝結熟蛋白一錢投啤先汁一分七熱至一百度四點鐘至六點鐘自可化之其功用消化有淡氣食物如牛乳餅雞蛋各肉類皆是

論治病用法 凡胃不消化因舒縮功用改常者加鹽強酸內傷或肥膩停滯者加甜肉汁服之 热症將愈服此助胃消化不至弱極也

奸沙毒瘤小便有糖成消渴及心部各病服之皆效 小兒乏乳食乳餅充飢兼服啤先可免停滯不化 作散小兒飲乳或食物後開糖水服十滴至十五滴功效同上 孕婦作嘔服之效 凡食後停滯腹脹或苦痛難忍服之立愈 血薄紅珠減

少與水服，服之能消化生新血。胃癰毒瘤服之止痛。胃癰當有服之而愈者，毒瘤雖不能愈得此以助消化養身亦可延年。能止小兒瀉利，調攝小腸內皮。凡小兒泄嘔多因胃內消化不盡或腸胃之間乳食停滯，泄嘔日久必瘦弱乾枯，每飲食後服啤先少許最爲有益。

論外治用法 割症後或要害處傷重，食不下咽者，宜以牛乳、牛肉汁等和啤先射入糞門以養之。啤先加些鹽強酸以小水節射入瘡瘤之內，若屬脂瘤雖不能拔去患根亦可隨時內消耳。

論雞嗉汁 功用止嘔理胃。凡胃不消化，與腸胃有風，胃內皮

發炎俱效。孕婦作嘔則屢經效驗。性純不至令胃不舒。但助消化者宜飯後服。每服八釐半至三分半。

論猪牛甜肉汁。此汁專助大小腸消化。多食肥膩者尤宜。
相反同婢先。

論燐質所製光藥之法。燐質透光體堅無色。有蠟膏之無味。
聞之又覺氣臭異常。其重數一零八。

製光藥油方

燐質二分

杏仁油一安士

每服五滴至十滴

又 方

燐質 八毫

魚肝油 一安士

燐熱開之每服一錢

製光藥丸方

燐質 一份

羊油 一百份

和合爲丸每粒以五釐爲度

製光藥酒方

燐質 一厘七

淨火酒 五錢

甘油 一安士
量

燒酒 二錢

薄荷酒 五分

先用燐質放火酒內至微熱再以燒酒甘油攪勻熱甚俟冷時

再入薄荷酒每服大半厘至十厘七

製伊打光藥酒方

燐質

伊打酒

以酒開勻每服五滴至十滴或以哥囉方或礦炭開燐質亦可

製錠燐養方 用玫瑰膏製爲丸者佳每一厘分五次服至每服八毫

相反 鎌養 石灰水 炭灰 松節油 凡經久走味之松節油或尋常所售內有阿純多者丸與燐相反
相佐 油類 信石 硫磺 信石大助 硫磺些少 油不可多用
凡造火柴者以小樽載松節油掛於項下可免其毒試燒以松

節油燐光滅熄此物性相制自然之理也

附論解毒換血之法 凡解救服毒人皆知嘔盡爲佳故吐藥
中銅礦養爲最妙然燐銅相合不若專用燐質尤猛凡用銅礦
養大嘔之候卽應以燐養或平常松節油解之血若已經受毒
則宜用法借取別人之好血運入其迴管以換之事雖創而實
妙不可畏難苟安也

藥性功力 平人試之覺眼明角單及氣管內皮皆改常藥玉
暖胃所發內多輕氣腹有輕燐氣蓋入胃則胃不安且令心跳
身畧熱心脈氣力有加血壯少婦月經倍多慾情難禁汗溺皆
多若過服腸胃液多受患故肚痛嘔瀉皆作其性峻烈可見故

少少參以油質服則由胃入血尚無大碍否則大損血內紅輪身體必然虧削是以旣受燐毒必須改換血脈或如上文所云借取別人之血射入迴管乃可得救不然則輕燐氣寓內熾盛壞却血內紅輪臟腑內皮皆發水隨卽胃肝心部與及脈管皆腐變成油久則肌肉亦然有胃服燐質後見流血不止者此必其脈管腐變成油之候也見生黃者乃肝體成油之候○製造燐質各物常受其毒者多有牙床骨朽或骨衣發炎腫痛等患者不可不知○至多服起譏語癱瘓昏迷不醒及抽筋等患則毒竄腦部之故用此可不慎歟

論治病用法 上文已詳其能壯心脈則凡腦部欠血身弱血

薄者服光藥丸酒大有功效較之綠養冰鍊溴服後令人思睡者此則異是惟用得其法亦可令腦之功用得復如常故凡失養症羸衰耄遺忘手足發抖等患服之極有功效○少年心思無力兼腦脈管生粉瘤腦部失養者少少用之極驗老年患此宜加魚肝油曾見用此二味治愈癱瘓者必須按時少少服之日久無間必見功效切勿多用多則無益反致危險倘癱瘓日久腦內白漿已壞則燐質甚妙石燐乳尤佳初起者亦不宜用也○論治腦筋痛或謂多服乃可見效然究竟不可太多蓋一厘分七次服亦無不足卽光藥酒一錢內亦約含燐質如是而已○羊弔頭昏腦筋痛因過用心腦之力者陽痿非因疔毒者

筋痿行動不穩，脊髓變石質等，少少服之甚效。○皮膚酒滓亦可用以代信石酒滓，發小膿瘡尤良。

論燐質及所製之方劑

鉗鉞鐵

燐蟲

和勻糖水開每服可一錢至二錢

石質乳

燐蟲

和勻糖水開 每服一二錢

論石燐蟲藥性功用 人之週身皆有此質，骨骼藉以堅立。若

幼齡骨未長定，此質太少則骨軟，稟受成胎無此，則不能成骨。飼牲畜類少石燐蟲則骨軟，且不但骨內有此，血液冒汁乳溺

皆然洵屬養身之最要而不可少之物也○此藥入胃自可入血少服則可除感霉毒各症外切宜少用多則胃不受納且令腸液生多泄瀉而出每服一厘七至一分七厘

論銻燐蠢藥性功用

清水一錢可化此藥四厘服後自散入

血服至一安土則輕瀉味鹹如鹽於飲湯吃粥時用以代鹽味甚佳功能增血內蛤利類○服多則消化既阻發尿酸而令溺短且瀉後胃腸皆覺不安必稍有碍於消化故宜少少服之如用以治霉毒名症而非瀉者則無關於胃腸且用之合式反能去胃腸內皮之病焉

治病用法 凡頭痛症或因肝膽受病而致或因胃腸內皮發

炎所致以銙燐蟲瀉之極其效驗久服戒口合宜永無再發之理蓋銙燐蟲能解其炎也○黃疸症亦由胃腸內皮受熱以致肝管發炎每服一錢日服三四次奇效若小兒常犯此症者則不宜大服至多不過一分七厘至三分半可也 凡膽淋症因大腸上迴發炎累及肝膽亦炎至肝內膽汁凝結生膽淋者則銙燐蟲極妙其功力可免肝汁發稠及止肝管內皮炎痛每服一錢飯前空腹服數月自可斷根

助小兒膽汁消化凡小兒多病身體失養糞下如米泔水面青白皆膽汁少雖胃尚好飲乳多急用銙燐蟲一分七厘和乳一小盃日服數次自可增其消化之力則膽汁日多糞漸黃體漸

壯矣 健骨生齒 凡身體欠養骨痿骨斷不能復元幼年牙齒離落與及腐骨等事必須用此軟者復堅離者漸合

助乳母生血 凡乳母被兒吸久乏乳血薄身弱 石燐齧加

乳酸極其有益

瘡癬善後 膽瘡背癩日久不愈流膿過多及身弱氣管內皮發炎咳嗽多痰流白帶等類皆宜服上二藥以培養其身病無不愈矣 舊症有益 論內傷舊症如肺生嚦吐呻嘯體及氣管腫大用石鎗銛鐵合燐齧開糖水甚爲有益新症不宜蓋能健胃扶羸以冀延年之助倘於胃不合如服燐齧合各雜質開糖水而見腸痛者又需調劑而用之宜以燐齧酸合各雜質可免此

患

一方

鐵石二質與燐蠢糖水開化半

三安

燐酸半安士
淡者

和勻 每服一錢日三服內傷舊症尤宜加魚肝油

飯前空腹服

一方

石燐蠢糖水
開化四安士

信石水一錢

和勻每服二錢日三服

輕燐輕蠢 製法

以燐入油加養氣淨而乾者良

論炎症熱症應食之物 凡身熱未退病勢遷變異常食物最宜戒慎其腸脂耗却消化無力肌劣面白氣弱聲微納入糧食或停滯或反常或食入不受用或化不淨入血無益血脈亦因而改變紅輪少而血絲多
血絲西名輝婢連不能將應去之雜質隔出小便短少色深內有尿酸尿底惟鹽類則少或無蓋有發炎則全聚於炎處尿所涵之磷雜質甚多是以尿底更盛身內各質體皆漸變漸壞熱愈熾養身各質體因之耗盡故曰瘦而曰衰也凡非飲食經由之路發炎食管胃則可用牛奶奶稀粥按時少少而進度其化盡乃可再食大約每三點鐘一次爲度若欲多食牛奶或食後胃覺不舒則加石灰水或對半或四份之一新鮮牛奶於大熱症最宜

可以此一物爲養命出紅痧熱症亦然蓋牛乳可養身亦可利

小水

紅痧症小便不利則甚危

牛肉湯亦屬可用但畧難消化究不如牛乳之有益嘗見大熱症喫牛肉湯下後仍不轉化者則屬無益更有以牛肉湯俟冷成膏以食者尤屬冒昧無知夫牛肉湯冷則成膠類更難消化何能養身乎

炖牛乳湯之法去淨筋膜油脆骨之精牛肉十二兩切碎以冷水一升浸兩點鐘慢炖三點鐘火候不可熟過寒暑針一百六十度水漸乾漸加冷水炖好仍得湯十二兩牛肉十二兩之數用布濾隔每次飲一茶杯凡症初起者宜

飲一茶杯凡症初起者宜
羊肉湯 淨腰脇肉十二兩去筋骨以水三十六兩慢火炖至
極透加鹽葱至合味倒放碗內至冷撇去上面之油若嫌冷復
煖之良

鷄湯 嫩鷄一隻半大者良宰淨去皮切碎連骨烹煮加八角
一二枚薑一片水二十四兩烹一點鐘湯面油隨卽撇去極清
貯碗瀘淨可飲

以上各肉湯宜加入猪牛肚汁卽呻先或鹽強酸或乳酸可助
其消化自能生血養身誠大益也或以牛肉切碎入白杆燶
去淨肉絲取汁加酒功用與湯同

牛乳酒 鮮牛乳二十四兩入鍋煮至將沸卽加酒再烹一刻

撇去稠汁加酒一小杯復撇去稠汁可飲

麻仁茶

麻仁成個者佳八錢

白糖八錢

甘草

四錢

檸檬汁一兩六錢

滾水廿四兩

熬四點鐘將甘草渣隔

去良

薏米湯 薏米一兩六錢冷水洗淨以清水煲約五味呢之久
將水去盡另以清滾水四十八兩復熬至二十四兩加檸檬皮
糖少許勿去渣臨飲欲隔乃隔不隔尤妙

除以上各湯水之外其餘炎熱客症可用者亦不外牛乳牛

生雞蛋等類之物

甜牛乳酒 牛乳十二兩煲滾加酒三兩二錢瀘淨加糖其味

既甜而不酸亦稍有養身之力

牛乳蛋酒

鮮牛乳搗滾入瓶放在滾水鍋內炖之勿至瓶內

牛乳滾沸

畧久提起俟冷將一蛋打入一大茶杯加糖打勻至白黃混合

如沫再加酒二錢同傾入牛乳瓶內可也此與牛肉湯間換而

飲一次飲此一次飲牛內湯炎熱症飲之均益惟必相間而用不可於三點

鐘內飲之至再○欲將牛乳蛋與各酒和食者可照下文製法

新鮮牛乳入一瓶內酒一盃加糖少許和勻入瓶牛乳不

可袋至滾

蛋酒

以瓶貯濃酒小許

淡酒則可
多些

雞蛋一隻打勻沙糖半

匙清水八錢和勻放入酒瓶內未起油即飲之良

卷四
以上各物炎熱症初起時擇而用之獲益不淺耳

論腸胃症應食之物 胃腸病症不拘新舊皆宜以牛乳去皮爲養生之糧舊症更宜已於胃腸病治法內詳明誠至美之法也然

有時祇胃或腸起病未久者凡易化之物如牛乳加石灰水白粥薏米湯酸子牛奶水加播泐梅糖水與及檸檬水等物皆可食之

薏米湯

薏米四錢
清水洗淨

檸檬皮一塊

白沙糖一匙羹

新檸檬半個
榨汁

沸水二十四兩

沖浸七八點鐘濾而飲之良

加播匿檸糖

檸檬兩個
搗汁

山水十二兩

白糖一大匙

每服一碗加一小酒盃
鑄炭羣和勻飲之益

胃舊病消化功用已失內非真津液凡有淡氣之物則不能化
如飯、藕粉、米粉、馬蹄、麪包、青菜等類多賴小腸助力久之皆不
能化

胃釀酸水或灼熱病原多食漿油之物而起膏梁應行痛絕可
食者惟酸菓、青菜、酸酒而已

小腸不消化暑天泄瀉或小兒嘔瀉所食者皆宜入胃卽化以

令腸得安息勿動也。膏梁之物皆宜戒絕。

原漿油之物在胃不能化盡必待小腸以

化之米麪客粉薯芋等內皆不宜食緣各物內固有

漿油胃既不能化盡其病轉增至患處則極不舒焉每見暑天

小兒多泄瀉者莫不由此之故。

膽管發炎與膽汁入血而成黃疸者凡有漿有油之物皆不可

吃能令肝管發炎增劇

近大腸上迴之肝管

且油類能令膽液精凝結膽

汁實厚也。癥瘕日久者宜食菩提子汁桃子番茄芹菜椰菜等

類嘗有小兒久癥偶食桃子和牛乳而愈者亦一奇事也。大便

常結者則戒口爲尤緊要蓋此必腸內津液枯竭或腸失功用

宜食麪菓青菜每日食杏仁葡萄子乾各六枚或可通潤耳。

大便下血或因腸部大迴管積血或因秘結而致者則菩提子
甚妙而青菓青菜常吃亦佳

論身弱人應食之物 凡有病之幾而病勢未形于外者最宜
預爲調理或曾經受病過用涼削之藥以致元氣虧損胃口不
舒精神困乏寒暑馳勞俱不能耐弱質牽纏跬步食息不同平
人無所顧忌也必須多用淡炭二氣之物以堅其肌骨壯其體
膚夫脂膏在人身與在畜身內無異故猪牛羊內之脂油及
花生生乳等油成八之脂膏居多糖或菓子青菜次之卽米麪
薯芋有漿之物入胃亦能化而爲油酒亦生脂膏之助宜於婦
人畢竟牛乳尤佳乳婦乏乳食粥及牛乳可令乳多油能長脂

肉能壯肌骨皆屬自然之理凡瘰癧症受水銀毒症鉛毒症疔
毒症受濕體弱與及內傷等症則肉食宜之

骨軟症 宜多食內函石燐蟲及各燐蟲雜質之物兼飯麪粉
等○風濕脚腫宜食飯青菜酸菜肉食不合

小便內含糖症即俗名下消症 治不治全在戒口一端凡有糖之物

與生菓青菜及麪食皆不相宜極宜戒絕甚至米亦可化爲糖
少吃乃可凡麪包薯蕷一切生菓青菜中可食者祇番茄芹菜
椰菜而已有油之物如花生油白欖油魚肝油猪油牛奶油等
皆可食牛羊猪肥者尤佳

納物入肛門以度命 夫人不食則死然當胃病至極不能受

物不得不以此以濟醫術之窮而延生命於旦夕所謂別開生面想出非非者歟蓋遇胃生毒瘤則不能化物亦不宜動食管痛胃痛胃受傷等皆同然須明白肛門非消化之府所納入之食物必須自化或已爲人力所化者乃可又須知肛門內潿水皆屬蛤利類所用必酸味乃合此又化學之功也○牛乳照上文煎法四安土加綠酸十滴猪肚汁二錢和勻射入肛門若覺不舒則加鴉片酒十滴至二十滴加酒少許更有功力初雖不覺多次必不能忍此時射之者須小心輕輕而試不可一時脹逼太甚更不可納之過頻每日夜祇可五次而已蓋食物爲火力所化究不如在胃自化者行運之速也

論皮膚症應食之物，益有兩端。一消內積，一清外患。皮膚各患常因多食不化而起，故戒口以牛奶作飯餐，一法多獲奇效。○又或多食漿糖油之物，因而胃內釀酸者亟宜去之。凡虛弱血薄，則非兼淡炭二氣之物不能爲功。而平曰：嗜肥膩者尤非此不能消去也。

西國煎熬藥膏以用一省運費一盡取藥之精液其法詳下

用新鮮藥草或蕊或根或枝或幹或皮或囊或子洗淨搗爛搾取漿汁用火熬滾隔淨其滓煎至藥水成稠汁此法祇可用於雨水多之植物乾實者難以取汁不可一概而

論

西國製藥酒法 用藥研末十二兩八錢

以火酒浸溼一點鐘置漏斗內漏斗有磁器有洋鐵倘藥末屬輕鬆者不必過實屬乾實者加意四圍築實切不可一邊實一邊鬆先用布單住少頃撤去用酒加入至漏斗底流出爲度先後約十六安士上下塞蓋完密俟兩日或四日去下塞再加酒連前要重二十八安士流

出之先用一玻樽貯之以十四安土爲度先將樽量準到樽身某處

足十四安土貼記爲號倘酒耗去

另用一玻樽貯十安土者亦如前法量準貼記爲號倘酒耗去不足十安土要續加淡火酒至將盡時再加些水收足十安土酒入樽後要煎去八安土剩回兩安土可放入前樽十四安土之內共奏十六安土耳再過一二日藥渣澄定將上面清的八落別樽及後有些略濁的用布或用紙隔過方可此法用水或用火酒均可從前用淡火酒近來俱通行用火酒耳

漏斗圖附 凡用藥治病應用某藥重八錢者卽用此藥水一

安土應用藥一錢者亦用藥水二錢可也

伊打酒製藥之法須另用一器具因伊打酒能飛去故器具不

同用藥不過數款不復再詳

又一法照上文製成藥水或藥酒十六安士之後仍可煎熬成膠者用一闊口淺鑄或磁鑄或白鐵鍋載藥酒或藥水於內另用一闊些的鍋貯滾水置藥酒水稠時不住手攪勻水鑄於滾水之上不用蓋以慢火熬之熬至藥水稠時不住手攪勻水鑄於滾水之上去盡成硬體者或爲藥散亦可或煎至略軟可爲丸者但不拘軟硬要留心火候不可粗率煎成藥性氣味仍存斯爲得法用隔水鍋以炖之者可免焦熗之氣息凡煎稠膏者當以此爲穩妙之法也

製顛茄膏方 新鮮顛茄葉及嫩枝一百一十二磅用大石臼搗爛搾取其汁煎至一百三十度之熱係用二十二度表以綿布濾

淨用隔水鍋煎去水汽煎至糖膠之稠將初次青色渣放入再
煎用木片不住手攪勻煎至僅足一百四十度之熱便可不可
過此稠至可以埋九爲度此乃英國通行之法

製甘草水方 用粗甘草末

十二兩

清水八十安士

先用清水

四十安浸甘草末十二點鐘隔搥盡渣內之汁又用清水四十安浸渣六點鐘隔搥盡將兩次甘草水煎沸至二百一十二度之熱絨布漉淨用隔承鍋煎去水汽略稠以探輕重表採之水一甘草水一零一六每甘草水七安士加火酒一安俟十二點鐘再隔以絨布貯樽內此水味甘乃甘草原味咳嗽可用或調和苦藥水亦可

終

CATHARTIOS.

Manna
Sulphur
Magnesium
Magnesium Carboate
Oleum Ricini (Castor Oil)
Magnesium Sulph (Epsom Salts)
Magnesium Citrate
Sodium Sulph (Glauber Salts)
Sodium et Pot Tartrate (Rochelle Salts)
Sodium Phosphate
Potass. Bi-tartrate (Cremor Tartar)
Potass. Boro-tartrate
Potass. Tartras
Hydrarg Chlor Mitis (Calomel)
Pilulae Hydrarg
Hydrarg C. Creta
Rhubarb
Aloes
Aloine
Senna
Jalap
Extract of Jalap

壹卷	論藥瀉
篇四罕	擎嗎
七十四	礦硫
上同	養錢
九十四	養三炭錢
十五	油麻籠
上同	硝朴洋養四礦錢
一十五	水檸錢
三十五	粉明元養四礦鑄
上同	鹽葡萄鍛
五十五	養三燐二鑄
六十五	散酸葡萄鍛
上同	散酸葡萄鍛
七十五	鹽葡萄鍛
上同	米路迦綠汞
八十五	丸藍汞
一十六	粉汞石火
二十六	黃大
三十六	囉鴉
四十六	精囉鴉
六十六	拿新
上同	笠渣
七十六	膏笠渣
上同	膏笠渣

Scammony	篇八空	尼無金士
Extract of Scammony	上同	膏尼無金士
Cologynth	九十六	新囉哥
Podophyllum	十七	連非道布
Gamboge	一十七	黃藤
Oleum Tiglii (Croton oil)	二十七	油荳巴
Slaterium	三十七	爹禮衣
Enema	四十七	法門肛入射水藥用附
EMETICS.				
Apomorphia	二卷	
Pecac	篇一	論藥吐
Lobelia	三	啡麼甫阿
Mustard	四	格畢衣
Tartar Emetic	六	利卑路
Zinc Sulphate	七	末芥
Copper Sulphate	上同	散吐葡萄鍤
Potass et Alumen Sulp. (Alum.)	十	養四礦鍤
DIURETICS.				
Potass. Bi-Tart (Crem Tartar.)	二十	礬胆養四礦銅
Potass. Acetat	三十	礬白養四礦鍤銑
Potass. Carbonate	四十	論便小利
Potass. Bi-Carbonate	五十	散酸葡萄鍤
Potass. Citrate	上同	鹽醋鍤
			六十	養三炭鍤
			八十	養三炭雙鍤
			上同	鹽檸鍤

Ammonia Acetate
Buchu
Colchicum
Turpentine
Copaiba
Spirits Nitrosis Dul
Cubeb
Squill.
Scoparias (Broom)
Uva Ursi
Juniper
Dandelion
Digitalis
DIAPHORETICS.		
Jaborandi	230
Pilocarpin
Potassa Citrate
Ammonia Acetate
Potassa Nitrate
Dover's Powder
Ipecac
Tartar Emetic
Guiacum
Sassafras

上同	水鹽醋淡輕三
九十	咁標
十二	摩枝哥
一十二	油節松
四十二	把拜哥
五十	酒打伊硝甜
六十二	茄澄畢
七十二	釐圭士
八十二	花雀金
九十二	些兒巴要
上同	子柏
十三	英公蒲
二十三	黃地毛
三十三	論表發
三十三	的蠶波乍
上同	偏加魯排
四十三	鹽檸鈎
五十三	水醋淡輕三
六十三	養三淡鈎
八十三	散表片鴉
上同	格畢衣
上同	散吐葡萄鉢
八十三	摩厄圭
十四	法沙沙

Peppermint
Sweet Spirits of Nitre
EXPECTORANTS.				
Seneka
Squill
Assafoetida
Garlic
Cimicifuga
Ammoniac
Benzoin
Myrrh
Balsam of Peru
Balsam of Tolu
Tar
Ipecac
Liquorice
Tartar Emetic
Cepaiba
Ammonia Chloride
ASTRINGENTS.				
Uva Ursi
Gall Nuts
Tannin
Gallie Acid

上同	荷薄
上同	酒打依硝甜
論痰化	
二十四	加衣辛
四十四	釐圭士
五十四	魏阿
七十四	頭蒜
八十四	思米旺
上同	懸麼阿
九十四	香息安
一十五	藥沒
二十五	漿魯秘
上同	漿魯到
三十五	油嗎把
上同	格畢衣
上同	草甘
四十五	散吐葡萄鍤
五十五	把拜哥
上同	綠淡輕四
九十五	論藥歛
十六	些兒巴婆
上同	子石沒
一十六	霜子石沒
三十六	酸泐架

Kino	四十六	奴佳
Catechu	上同	茶兒
Ext. of Logwood.	五十六	水蘇洋
Krameria Rhatany	六十六	喇美架
Oak Bark	上同	皮樹桺
Rubus Fruticosus	七十六	子鈎懸
Pomegranite Rind	上同	皮樹榴石
Acetate of Lead	上同	霜鉛
Liquor Plumbi Diacet	八十六	水醋(養鉛)
Alum	九十六	礬白
Bismuth Sub-nit	十七	養五淡養四鉛
Bismuth Carbonate	一十七	養三炭鉛
Cereum Oxalate	上同	鹽西惡錯
Zinc Acetate	上同	鹽醋錠
Zinc Oxide	二十七	養鋅
Zinc Sulphate	上同	養四礦錠
Copper Sulphate	三十七	礬胆養四礦銅
ANTHELMINTICS.			
Chenopodium	四十七	論蟲殺
Santonin	五十七	褒奴芝
Spigelia	上同	年道山
Pomegranite Rind	六十七	喇士拜士
Aspidium (male fern)	上同	皮樹榴石
Pride of China	上同	安必亞
		七十七	子棟苦

Brayeria Rottlera
 Melos Seeos Pepo
 Kamelia
 Turpentine

TONICS.

Chalybeate Tonics
 Ferrum Oxidum Hydratum
 Ferri Sub-Carbonas
 Ferri Carb Sacch
 Ferri Magnetic Oxide
 Ferri Sulphas
 Ferri Phosphas
 Ferri Pyro Phosphas
 Ferri et Potass Tartras
 Ferri Citras
 Ferri et Quiniaae Citras
 Ferri et Strycnniae Citras
 Ferri Chloridum (Perchloride of Iron)
 Tinc Ferri Chloridi
 Ferri Iodidum
 Ferrum Dialy
 Inchnona Bark
 Inchnona

八十七	蘇哥
上同	核瓜南
上同	喇薇記
九十七	油節松
三卷	
篇一	論藥補
二	劑鐵
上同	散溼養鐵
三	散養三鐵
上同	散糖養三炭鐵
四	粉石鑷淨
上同	礬青養三礦鐵
五	養五燐二鐵
上同	養燐火鐵
六	鹽葡鈸鐵
七	鹽檸鐵
上同	片檸擎桂鐵
上同	鹽檸尼的士鐵
八	水綠鐵
九	酒綠鐵
上同	碘鐵
上同	水養鐵綠鐵
十	皮樹衲雞金
十一	拿高先

Quinita	上同	打呢桂
Cinchonita	二十	打呢高先
Quinia Sulphas	上同	養三磺擎桂
Quinia Bi-Sulphas	六十	養三磺雙擎桂
Quinia Murias	上同	綠輕拿桂
Quinia Acetas	七十	鹽醋拿桂
Quinia Phosphas	上同	養燐拿桂
Quinia Salicylas	上同	先泐沙拿桂
Quinia Arsenias	上同	養信拿桂
Quinidina Sulphas	上同	養三磺打呢桂
Cinchonidinae Sulphas	八十	養三磺打呢高先
Quassia	上同	沙瓜
Bear's Gall	上同	草膽龍
Calumba	九十	簍林加
Chiretta	十二	大利介
Wonglin	上同	連黃
Wild Cherry Bark	上同	皮李郁
Willow Bark	一十二	皮樹柳
Cinnamon	上同	桂玉
Cloves	二十二	香丁
Calamus	三十二	蒲菖水
Orange Peel	上同	皮陳
Ginger (dried)	四十二	薑乾
Zinc Sulphate	上同	養四磺錫

Silver Nitrate	五十二	銀淡三養
Acid Sulphuric	六十二	磺三養酸
Acid Sulphuric Dilute	上同	淡磺強水
Acid Sulphuric Aromatic	上同	磺強香酒
Acid Nitric	七十二	淡五養酸
Acid Nitric Dilute	上同	淡硝強水
Acid Muriatic	八十二	輕綠酸
Acid Nitro-muriatic	九十二	皇強水
STIMULANTS.		
(a) Of Spinal Cord & Sympathetic	十三	行血氣論
Electricity	一十三	甲行脊髓及自和腦筋
Nux Vomica	上同	電氣
Strychnia	二十三	番木鼈
Picrotoxine (Cocculus Indicus)	三十三	士年的
Ergot	四十三	逼路度先
Maize Ergot (Ustilago Maedis)	上同	葛丫
Digitalis	六十三	粟米葛
Belladonna	上同	毛地黃
Atropia	七十三	顛茄
Stramonium	九十三	丫刀邊
Hyoscyamus	一十四	佛羅荳兒
(b) Of Cerebrum	二十四	鬧花羊
Camphor	三十四	乙大行腦氣筋
Assafoetida	上同	樟腦
	五十四	阿魏

Valerian	上同
Serpentaria	六十四
Cannabis Indica	上同
Eucalyptus	七十四
Coffee	十五
Caffeine	上同
(c) Of Circulation and Brain	上同
Alcohol	上同
Wine	二十五
Malt Liquors	三十五
Ethers	上同
Ammoniae Carb	四十五
Preston Salts	五十五
Spirits Ammoniae Arom	六十五
Turpentine	上同
Heat	七十五
Steam	八十五
Steam Bath	上同
ANODYNES.						
Opium	十六
Opium Habit	一十六
Dover's Powder	六十六
Tinc. Opii Camph.	七十六
Vinum Opii	八十六

上同	松甘
六十四	釐班士
上同	備咧加
七十四	沓列加郁
十五	啡咖
上同	烟啡咖
上同	氣腦及血行內
上同	酒火
二十五	酒提菩
三十五	酒啤
上同	酒打伊
四十五	養三炭淡輕四
五十五	法鹽香作
六十五	水香淡輕三
上同	油節松
七十五	氣火
八十五	法薰水熱
上同	法汽水熱
十六	論寧睡痛止
一十六	片鴉
六十六	語評片鴉
七十六	散表片鴉
八十六	酒片鴉腦樟
上同	酒提菩片鴉

酒片鴉臭無	上同
啡麼	九十六
鹽啡麼	十七
養三礦啡麼	上同
綠輕啡麼	一十七
鹽醋啡麼	上同
養三礦亞底高	二十七
碘囉哥	三十七
酒打伊味加	上同
冰養綠	四十七
冰頓奴枯	五十七
溴鈦	上同
論藥病改	七十七
力利哈有內水山	八十七
類鹽有內水山	上同
淡輕四	上同
養二炭淡輕四	上同
鹽松甘淡輕四	上同
養三燐淡輕四	九十七
水淡輕四	上同
水醋淡輕四	一十八
酒香淡輕乙	上同
酸養二礦	上同
礦硫	上同

Tinc. Opii, deodorized
Morphia
Morphia Salts
Morphiae Sulph
Morphiae Murias
Morphiae Acetas
Codiae Sulph
Chlorodyne
Hoffman's Anodyne
Chloral Hydrate
Croton Chloral Hydrate
Potassae Bromide
Alteratives Promoting Waste
Mineral Springs Alkaline
Mineral Springs Saline
Ammonium
Ammoniae Carb
Ammoniae Valerianas
Ammoniae Phosphas
Aqua Ammonia
Liquor Ammoniae Acetas
Spirits Ammoniae Aromatic
Acid Sulphuric
Sulphur

Sulphur Springs
ALTERATIVES.			
Iodine
Iodide of Potassium
Arsenic
Fowler's Solution
Donovan's Solution
Potassa Chlorate
Ammonium Chloride
Cod Liver Oil
Sarsaparilla
Mercury
Pilulae Hydrarg (Blue Mass)
Calomel
Red Iodide of Mercury
Green Iodide of Mercury
White Precipitate
Sulphide of Mercury
Red Precipitate
Ointment of Red Precipitate
Ointment Nitrate of Mercury
Ung. Hydrarg. Mitis
VOLUME 4.			
Sedatives - Arterial and Nervous....			

上同	味礦硫有內水山
十八	藥病改乙
上同	質碘
六十八	碘鋸
七十八	石信
九十八	水石信
上同	水汞石信
十九	養三綠鋸
一十九	綠淡輕四
三十九	油肝魚
五十九	列把沙沙
六十九	銀水
七十九	丸藍汞
八十九	米路迦綠汞
上同	碘汞紅
九十九	碘汞青
上同	綠汞淡輕四
上同	礦汞
百一	散養汞紅
上同	膏養汞紅
零百一	膏蓄汞
上同	膏藍汞
四卷	論平脈平
篇一	論平脈平

Of Motor Functions of Cord and	
Sympathetic	
Conium (Hemlock)
Gelsemium
Arnica
Tremithyamine
Jaborandi
Physostigma (Calabar Bean)
Eserine
Tobacco
Lobelia
Acid Hydrocyanic
Potass. Cyanide
Of Nerves
Amyl Nitrite
Aconite
Veratrum Album (white hellebore)
Veratrum Viride Amer. hellebore)
Ice Water
Cold Water
Acid Citric
ANTISEPTICS.	

二	筋腦和自及隨脊平甲
上同	落謙
上同	咪司遮莉末洋
上同	加匿亞
三	連搭微帶
四	的蘭波乍
上同	壹巴喇加
上同	連司亞
上同	葉菸
六	利卑路
上同	酸淡炭輕
上同	淡炭鋸
七	筋氣腦平乙
上同	養三淡咧味亞
上同	頭烏草
九	稔鱗匪白蘆藜白
十	蘆藜青
十一	水冰
上同	水冷
二十	酸檸
三十	論 生微毒細殺解
四十	氣養
上同	純阿
五十	氣綠

Bromine	六十	質溴
Acid Carbolic	上同	酸匿播加
Creosote	九十	蘇阿幾
Acid Salicylic	十二	酸先泐沙
Soda Boras	十二	養硼鎗砂硼
Acid Boracic.	三十二	酸養硼
Hydrarg-Bichlor (Cor. Sub.)	上同	藥毒綠汞
Benzoic Acid.	四十二	羧息安
Oils Antiseptic	五十二	類油毒解
Ol. Caryophilli	上同	油香丁
Ol. Gaultherii	上同	油釐碘交
Ol. Thymi	上同	油芹茴
Ol. Cajuputi	上同	油撥枝加
COUNTERIRRITANTS.						六十二	論外症引
Sinapis Alba and Nigra	七十二	末芥白黑
Charta Sinapis	上同	紙末芥
Emplastrum Arnica	八十二	膏加匿亞
Emplastrum Picis Burg	上同	膏地根把
Emplastrum Picis Canaden	上同	膏香松
Emplastrum Picis C. Canth	九十二	膏發斑和地根把
Ammonia	十三	水淡輕三
Liniment Camph.	上同	酒藥腦樟
Liniment Saponis	上同	酒藥鹼番
Liniment Terebinth	一十三	酒藥油節松

Capsicum	上同	椒辣
B. Epispastics	二十三	法之火水
Croton Oil	三十三	油荳巴
Ceratum Canth	上同	膏蝥斑
Charta Canth.	四十三	紙蝥斑
Tinc. Canth	上同	酒蝥斑
C. Escharoites	上同	法之烙鐵
Liquor Potassa	上同	水養鍼
Caustic Potassa	五十三	丹養鍼
Chromic Acid	六十三	酸養三鎰
Silver Nitrate	上同	養三淡銀
Acid Nitric	七十三	酸強硝酸養三淡
Acid Nit. of Mercury	上同	丹養三淡汞
Zinc Chloride	上同	丹綠錠
Alum. dried	九十三	礬白
Zinc Sulphate	上同	養四礦錠
Copper Sulphate	上同	養四礦銅
Heat	上同	氣火
EMOLLIENTS.		十四	論去毒皮腫消
Glycerine	一十四	油甘
Vaseline	上同	玲士花
Collodion	二十四	酒綿火
Gum Acacia	上同	末膠樹
Linseed.	三十四	子麻胡

potassa per-manganate.
calcium Chloride
Emplastrum Hydrarg
Black Wash
Yellow Wash
Soda Sulphate
Bitharge
Emplastrum Adhesive
Basilicon Ointment
Plaster of Paris
Irea as medicine (Chi)
Asbestos Tremolite (Hornblende)
Lithomarge
Liquid Amber
DIETETICS.	
Chocolate
Pepsin (Pork)
Pepsin of Chicken
Pancreatic Juice
Hypophosphites
Phosphate of Lime and Soda
Diet in fever and inflammation
Diet in diseases of stomach and bowels
Diet in inflammation of stomach and liver

上同	養八鍊二鉢二
三十六	散綠鉢
上同	膏鉛汞
三十六	水鉢汞黑
上同	水鉢汞黃
上同	養三礦二鉢
上同	僧陀蜜
四十六	膏口合
上同	膏口收
上同	膏石
五十六	石秋
上同	石起陽
上同	脂石赤
四卒又	子楓大
六十六	論 製藥 養調
八十六	辣高初
上同	汁內肚猪先啤
十七	汁嚙雞
上同	汁肉甜牛猪
上同	功用藥光等各製所質燐
三十七	用功燐鑪燐石
六十七	物之食應症熱症炎
八十七	物之食應症腸胃
九十七	忌宜物食炎膽症胃

Index

Diet in Dysentery	十八	物之食應血便	Potassa
Diet in Anaemia and debility	上同	物之食應弱身	Calcium
Diet in Diabetes	上同	忌宜物食症消下	Implas
Nourishment by Injections	一十八	命度以門肚入物納	Black
Diet in Skin Diseases	上同	物之食應症膚皮	Yellow
Preparation of ointments, Tinctures, &c.	二十八	法之水藥酒藥膏藥	Soda
Belladonna Plaster	三十八	膏苪顧	Litharg
Infusion of Liquorice	上同	水草甘	Emplas
			Basilic
			Plaster
			Urea
			Asbest
			Cithom
			Liquid
			Chocolate
			Pepsin
			Pepsin
			Pancre
			Hypop
			Phosp
			Diet i
			Diet i
			and

