


徐氏醫學十六種

[E]

Chinese

Vol. VI

6



風

靈素

素問風論黃帝問曰風之傷人也或為寒熱或為熱中或為寒中或為癘風或為偏極或為風也其病各異其名不同或內至五臟六腑不知其解願聞其說岐伯對曰風氣藏於皮膚之間內不得通外不得泄風者善行而數變腠理開則灑然寒閉則熱而悶其寒也則哀食飲其熱也則消肌肉故使人恍慄而不能食名曰寒熱風氣與陽明入胃循脈而上至目內皆其人肥則風氣不得外泄則為熱中而目黃人瘦則外泄而寒則為寒中而泣出風氣與太陽俱入行諸脉俞散於分肉之間與衛氣相干其道不利故使肌肉憤悶而有瘍衛風有所凝而不行故其肉有不仁也癘者有榮氣熱腑其氣不清故使鼻柱壞而色敗皮膚瘡潰風寒客於脉而不去名曰癟風或名寒熱以春甲子傷於風者為肝風以夏丙子傷於風者為心風以季夏戊子傷於風者為脾風以秋庚辛子傷於風者為肺風以冬壬癸子傷於風者為腎風風中五臟六腑之俞亦為臟腑之風各入其門戶所中則為偏風風氣循風府而上則為腦風風入係頭則為目風眼寒飲酒中風則為漏風入房汗出中風則為內風新沐中風則為首風久風入中則為腸風飧泄外在腠理則為泄風故風者百病之長也至其變化乃為他病也肺風之狀多汗惡風色鮮白時歎短氣晝日則差暮則其診在眉上其色白心風之狀多汗惡風焦絕喜怒喊赤色病甚則言不可快診在口其色赤肝風之狀多汗惡風善悲色微蒼嗌乾善怒時憎女子診目下其色青脾風之狀多汗惡風身體怠惰四肢不欲動舌頭微黃不嗜食診在鼻上其色青督風之狀多汗惡風面龐然浮腫脊痛不能正立其

色照隱曲不利。診在肌上。其色黑。胃風之狀。頸多汗。惡風。食飲不下。膈塞不通。腹善滿。失衣則腹脹。食寒則泄。診形瘦而腹大。首風之狀。頭面多汗。惡風。當先風一日。則病甚。頭漏不可以出納。至其風日。則病少愈。漏風之狀。或多汗。常不可單衣食。則汗出甚。則身汗喘息。惡風。衣常濡。口乾喜渴。不能勞事。身體盡痛。則寒。陽風自汗。凡七情六淫之病。必有現症。能辨症斷不至誤治也。

平人氣象論面腫曰風

風厥勞風 評熱病論岐伯曰。汗出而身熱者。風也。汗出而煩滿不解者。厥也。病名曰風厥。氣逆甚即名風厥帝曰。願卒聞之。岐伯曰。巨陽生氣。故先受邪。少陰與其為表裏也。得熱則上從之。從之則厥也。少陰之氣上乃能厥帝曰。治之奈何。岐伯曰。表裏刺之。飲之服湯。帝曰。勞風為病何如。岐伯曰。勞風法在肺下。其為病也。使人強上。其視唾出若涕。惡風而振寒。此為勞風之病。帝曰。治之奈何。岐伯曰。以救逆。仰巨陽。引精者三日。中年者五日。不精者七日。欬出青黃涕。其狀如膿。大如彈丸。從口中若鼻中出。不出則傷肺。傷肺則死也。此等病最當體認。若認為肺癆。肺癆乃肺癆。則風寒入肺。便成凝結也。

酒風 痘能論帝曰。有病身熱。解墮汗出如浴。惡風少氣。此為何病。岐伯曰。病名曰酒風。

偏枯 生氣通天論汗出偏沮。使人偏枯。

痱 灵樞熱病痱之為病。身無痛者。四肢不收。智亂不甚。宜言微。知可治。甚則不能言。不可治也。

金匱

夫風之為病。當半身不遂。或但臂不遂者。此為渾脈微而數。中風使然。寸口脉浮而緊。緊則為寒。浮則為虛。寒虛相搏。邪在皮膚。浮為血虛。絡脈空虛。賊邪不滲。或左或右。邪氣反緩。正氣即急。病在緩處。故外治療。力塗其發者。正氣引邪。喝辟不遂。邪在於經。即重不勝。邪入於腑。即不識人。邪入於臟。舌即難言。

口吐涎此辨證要訣寸口脉遲而緩遲則為寒緩則為虛榮緩則為亡血衛緩則為中風邪氣中經則身癢而癰疼心氣不足邪氣入中則胸滿而短氣

傷寒論

脉浮而大浮為風虛大為氣強風氣相搏必成癰疼身體為癰癰者名泄風久風為加癰

病源

風癰 風邪之氣若先發於陰病發於五臟者其狀奄忽不知人喉裏噫噫然有聲舌強不能言發汗身軟者可治眼下及眞人中左右上白者可治黑赤吐沫者不可治汗不出體直者七日死
口噤 諸陽經筋皆在於頭三陽之筋并絡入領頰夾於口諸陽為風寒所客則筋急故口噤不開也證其脈遲者生

舌強 脾脉絡胃夾肺連舌本散舌下心之別脉係舌本今心脾二臟受風邪故舌強不得語也

賊風 冬至之日有疾風從南方來名曰虛風其傷人也但痛不可按抑轉動傷風冷則骨解深痛按之乃應骨痛也但覺身內索索冷欲得熱物慰痛處即小竇時有汗久不去重遇冷氣相搏結成癰疼及偏枯遇風熱相搏乃變附骨疽也附骨疽亦由風冷所致

風瘻 口噤不開背強而直如發瘻之狀其重者耳中策策痛卒然身體瘻直者死也由風邪傷於太陽經復遇寒濕則發瘻也此與病後瘻角弓反張

風邪傷人令腰背反折不能俛仰似角弓者由邪入諸陽經故也

柔風 血氣俱虛風邪并入在於陽則皮膚緩在於陰則腹裏急柔風之狀四肢不能收裏急不能仰不仁 由榮氣虛衛氣實風寒入於肌肉使血氣不宣流其狀搔之皮膚如隔衣是也

風驚悸 由心氣不足。心府為風邪所乘。則驚不自安。悸動不定。其狀目精不轉。而不得呼。

刺風 由體虛。膚腠。筋脉為風所侵。如刀錐所刺也。

蠱風 由體虛受風。其風在於皮膚溼淫。躍躍若蟲。若刺一身。盡痛。侵傷氣血。其動作如蠱毒也。
此乃瘧風也

癩眉墮落 皆由風濕冷得之。邪客於經絡。與血氣相干。使榮衛不和。故面色敗。皮膚傷。眞柱壞。癩眉落。

惡風 風病有四百四種。總不出五種。黃風。青風。赤風。白風。黑風。人身有八萬戶蟲。若無八萬戶蟲。人身

不成不立。復有諸惡橫病。諸風害人。所謂五種風生五種蟲。能害於人。

口喝 養生方云。夜臥當耳勿得有孔。風入耳中。喜食口喝。口喝見金匱。此又是一病。

外臺

風猥退 四肢不收。身體痠痛。肌肉虛滿。骨節懈怠。腰脚緩弱。由分肉流於血脉。久成風水之病。

蟬曳 肢體弛緩。不收攝也。人以胃氣養肌肉。經脈。胃氣衰損。則經脈虛而筋肉懈惰。故風邪搏於筋而使蟬曳也。

風毒發 眼疼。脚縱。中指夜連肘邊。牽心裏。悶。肋脹少氣。喘氣欲絕。不能食。

風方

酒風驟 治身熱。憇惰。汙出如浴。惡風少氣。

澤瀉

丸各十麩。每五分合以三指撮為後飯。

平微寒。主治風濕。三指為一撮。約二三錢。飯後服。按澤瀉疑即鹿角草。為後飯。服在飯後非飯前也。凡古方須將神農本草細參。藥性乃能深知其義。

侯氏東散金治大風。四肢煩重。心中惡寒不足者。

菊花四十白朮十分細辛三分茯苓三分牡蠣三分桔梗八分防風十分人參

礬石各三

黃芩五分當歸乾薑芍藥桂枝各三

右十四味杵為散酒服方寸匕日一服初服

二十日溫酒調服禁一切魚肉大蒜當宜冷服六十日止即藥積在腹中不下也熱食即下矣冷食自能助藥力

陽暖空虛則邪易留此境
滿空腹急和氣不能容

風引湯

金匱

除熱癲癇巢氏云脚氣宜風引湯

大黃

乾薑

龍骨各四

桂枝三兩

甘草

牡蠣各二

寒水石

滑石

赤石脂

白石脂

紫石英

石膏各六

右十二味杵粗篩以韋囊盛之取三指撮井花水三升煮三

沸溫服一升

此乃脯膾之熟非草木之品所
能散故以金石重藥清其裏

防己地黃湯

金匱

治病如狂狀妄行獨語不休無寒熱其脉浮

防己一分桂枝

防風各二

甘草一分

右四味以酒一杯浸之一宿絞取汁生地黃二斤㕮咀

蒸之如斗米飯久以銅器盛其汁更絞地黃汁和分再服

此方他藥輕而生地獨重乃治血中之風也
此等法最宜細玩凡風勝則燥又風能發

火故治風藥中無
燥熱之理

頭風摩散

金匱

大附子一枚

泡鹽等分

右二味為散沐了以方寸匕已摩拭上令藥力行

越婢湯

金匱

風水惡風一身悉腫脉浮不渴續自汗出無大汗者主之

麻黃六兩

石膏半斤

生薑三兩甘草二兩

大棗十五枚

右五味以水六升先煮麻黃去上沫納諸藥

煮取三升分溫三服惡風加附子一枚本方加白朮四兩

即越婢加朮湯

越婢寒散之方也
治風熱在表之證

小續命湯針

治卒中風欲死身體緩急口目不正舌強不能言奄奄忽忽精神悶亂諸風服之皆驗

麻黃

防己人參黃芩桂心

芍藥甘草川芎杏仁各一

防風一兩附子一枚生薑五兩

右十二味㕮咀以水一斗二升先煮麻黃三沸去沫納諸藥煮取

三升分三服不瘥更合三四劑隨人風輕重虛實腳弱服之亦瘥恍惚者加茯神遠志骨節皮膚有熱

者去附子倍芍藥外臺加白朮一兩石膏當歸各二兩無妨已

續命為中風之主方因證加減變化由人而總不能舍此以立法後人不知此必實見其有寒象而後可加然尤宜於西北人若東南人則當詳審勿輕試

錄驗續命湯治中風邪身體不能自收口不能言冒昧不知痛處或拘急不得轉側

麻黃桂枝當歸人參石膏乾薑

甘草各三川芎杏仁四十右

九味以水一斗煮取四升溫服一升當小汗薄覆令憑几坐汗出則愈不汗更服無所禁勿當風并治但伏不得臥咳逆上氣面白浮腫虛而感風則成非

此治非證之主方

近效丸附湯

治風虛頭重眩苦極不知食味暖肌補中益精氣

白朮二兩附子一枚半皮甘草一兩

右三味剉每五錢匕薑五片棗一枚水盞半煎七分去滓溫服

此治中風後陽虛之證按古今錄驗近效二種乃唐以前之方書今全本未見外臺中引二書之方極多金匱要略宋人校書者往往以本集中載方太少故亦採取二書并于金匱臺之外臺其精要者附一二方於每病之後而方首亦必不沒其所本之書古人之不苟如此今人見其方載入金匱中即以為仲景所定之方誤矣須知之

地黃煎

金治熱風心煩時及脾胃間熱不下食方

生地黃汁

枸杞根汁各二兩

生薑汁

酥各三

荆瀝

竹瀝各五升

天門冬

人參各八

兩

茯苓六兩大黃

梔子各四兩

右十一味

搗篩五物為散先煎地黃等汁成膏納散攪尋每服一

匕日再漸加至三匕曾利減

風行必躁古人治風必用潤藥乃真訣也今人反以剛燥辛熱之品治之是益其疾也

三黃湯針

治中風手足拘急百節疼痛煩熱心亂惡寒經日不欲飲食

麻黃五分獨活四分細辛

黃耆各二黃芩三分

右五味以水六升煮取二升分溫三服一服

小汗二服。大汗心熱。加大黃二分。腹滿。加枳實一枚。氣逆。加入參三分。悸。加牡蠣三分。渴。加括蒌根三分。先有寒。加附子一枚。

此方專以
驅風為治

風痱方針

治手足不遂。瘧直。伏龍肝五升為末。冷水八升。攬取汁飲之。能盡為善。

治半身不遂方針

蠶沙兩石熟蒸。分作直袋三枚。熱盛一袋。著患處。如冷換熱者數易之。瘥後須羊肚

釀粳米葱白蓮板頭等。

爛煮熟喫。日食一具。十日止。

按此法良
碑證亦良

治風懿方

竹瀝一升

治半身不遂。手足拘急。身冷強直。不語。或狂言角立。反張。或食或不食。或大小

便不利。

治風痱之法與治
風痱之法不相遠

口眼喎僻方

千金翼 治中風面目相引。偏僻牙車急舌不轉。

牡蠣熬

礬石燒

附子泡去皮。伏龍肝等分。

右四味搗節為散。以三歲雄雞血和藥敷上。預候看。

勿令太過。偏右塗左。偏左塗右。正則洗去之。

又方

千金翼 大皂莢五兩去皮子。搗節以三年大醋和塗緩處。

治風著人面。引口偏著耳牙車急舌不得轉。

生地黃汁

竹瀝各一獨活三兩

右三味合煎取一升。頓服之即愈。

輕風舒
經活血

開心肥健方

千金翼

人參五兩

大豬肪八枚

右二味搗人參為散。豬肪煎取凝。每服以人參一分。豬脂十分。以酒半升。

和服之。一百日。骨髓充盈。日記十言。身體潤澤。去熱風冷風心頭等風。月服一升半。即有大效。

此方治老人及

最宜

一切風虛方

千金翼

杏仁九升去尖及

兩仁曝乾

右一味搗為末。以水九升研濾。如作粥法緩火煎。令如麻浮上。匙取和羹粥酒

內一匙服之。每食即服。不限多少。服七日後大汗出。二十日後汗止。慎風冷。諸魚雞蒜大醣。一劑後諸風減差。春夏恐酸。少作服之。秋九月後煎之。此法神妙可深秘之。此即作杏酪之法。服食最宜。

竹瀝湯臺外

治諸中風

竹瀝二升

生葛根一升

按亦當用汁

生薑汁三合

此通經絡之法

卒不得語方外

以苦酒者芥子薄頸一周。以衣包之。一日一夕乃解瘥。

中風不語方寶鑑

取龜尿點石。取龜尿潰置龜於新荷葉上。以猪髮鼻內截之。立出。

地黃飲子宣

治中風舌瘡不能言。足廢不能行。此少陰氣厥不至。名曰風痱。急當溫之。

熟地

宣

山茱萸

宣

五味子

宣

蓀蓉

酒浸

石斛

宣

麥冬

宣

石菖蒲

宣

遠志

宣

茯苓

桂心

附子炮

宣

巴戟去心

宣

薄荷

又葉

右十三味。每服三錢。生薑五片。棗一枚。煎服。

風氣甚而有火多痰

者忌服

此治少陰氣厥之方。所謂類中風也。故全屬補腎之藥。庸醫不察。竟以之治一切中風之證。輕則永無愈期。甚則益其病而致死。醫者病家終身不悟也。

稀涎散局方

治中風牙關緊急。并治單蛾雙蛾。

江子仁六粒

牙皂三錢

明礬一兩

右先化開礬入二味。待礬枯為末。每用三分。吹入喉中。

此急救

喉之法

稀發丸本事

治口眼喎斜。偏風失音。不語。時時吐涎。久服。并眼目清明。鬚髮烏黑。筋骨強健。

稀發

五月申取葉及嫩枝。洗九蒸九曬。微焙為末。煉蜜丸。桐子大。溫酒或米飲下。三四十九丸。

余取稀發漿汁熬膏。打末為丸。尤有力。此緩治之劑。非一時救病之法。

控涎丹三方

因

甘遂

大戟

白芥子等分

右為末。煮糊丸。桐子大。曬乾。臥時淡薑湯。或熱湯下。五七丸至

十九此乃下藥之方人

滌痰散嚴氏 治中風痰迷心竅舌強不能言。

南星

薑半夏各二兩

錢半

松脂

錢二

橘紅五分

石菖蒲

人參錢一

竹茹七分

甘草五分

右九味加薑五片水煎服

此治心經之痰

茯苓

錢各二

橘紅五分

石菖蒲

人參錢一

竹茹七分

甘草五分

勝金丸

本事方

治中風忽然昏倒若醉形體昏悶四肢不收風涎潮於上膈氣閉不通

生薄荷

半兩

猪牙皂角

二兩

趙辟水

一兩

取汁研成膏

瓜蒂末

一兩

黎蘆

二兩

硃砂

五錢

右將硃砂末二

分與二味研小用膏子搗和丸如龍眼大以硃砂一分為衣溫酒化下一丸甚者二丸以吐為度得吐

即醒不醒者不治

見其痰在上膈則可用否

提頭上升反成厥冒等疾

銀液丹

方略

治諸風痰涎蘊結心膈滿悶頭痛目運面熱心忪痰唾稠黏精神昏憒及風涎潮搐並宜服

之

天南星

三分為末硃砂半兩

研飛

鐵粉

水銀

各三兩

結砂子

膾粉

一

黑鉛

煉十遍杵三兩

與水銀結砂為水

右研勻麵糊丸梧桐子大

每服二丸

同薄荷或薑湯下

生薑湯亦可微為度

食後服如治風癇不計時候

服此方鎮之使下逼宣施治全在辨證之確

瘧風方

治眉落鼻壞偏體生瘡

出神仙感遇傳

角刺

一二升燒灰

大黃

九蒸

右為末再煎大黃湯服方寸匕日即愈

青州白圓

局方見通治

瘧風節

靈素

靈周痺論黃帝曰願聞衆痺岐伯對曰此各在其處更發更止重居更起以右應左以左應右非能周也更發更休也帝曰善願聞周痺何如岐伯對曰周痺者在於血脉之中隨脉以上隨脉以下不能左右各當其所帝曰善此痛安在何因而有名岐伯對曰周痺者在於血脉之中隨脉以上隨脉以下不能左右各聚則排分內而分裂也經中無痺字
沫即痺也分裂則痛痛則神歸之神歸之則熱熱則痛解痛解則厥厥則他痺發發則如是此內不在臟而外未發於皮獨居分肉之間真氣不能周故曰周痺

深痺

九鍼十二原篇八風傷人內舍於骨解腰脊節腠理之間為深痺

風痺

喜天剛柔篇病在陽者命曰風病在陰者命曰痺陰陽俱病者命曰風痺

寒痺

壽夭剛柔篇寒痺之為病也留而不去時痛而皮不仁

素問痺論

帝問痺之安生岐伯對曰風寒濕三氣雜至合而為痺也其風氣勝者為行痺寒氣勝者為痛

兩言而定

脾濕氣勝者為著痺也

凡痺之客五臟者客五臟者內而生內症矣肺痺者煩滿喘而嘔心痺者脈不通煩則心下

鼓暴上氣而喘噦乾善嘔厥氣上則恐肝痺者夜卧則驚多飲數小便上為引如懷腎痺者善張尻以代

踵脊以代頭脾痺者四肢解墮發咳嘔汁上為大塞腸痺者數飲而出不得中氣喘爭時發飧泄胞痺者

氣喘息痺聚在肺淫氣毫毫聚在心淫氣遺溺

痺聚在腎淫氣乏竭痺聚在肝淫氣肌絕痺聚在脾諸

其入臟者死其留連筋骨間者久其留皮膚間者易已

帝曰榮衛之氣亦令人痺乎岐伯曰榮者水穀之精氣也和調於五臟灑陳於六腑乃

能入於脉也

故循脉上下貫五臟絡六腑也衛者水穀之悍氣也其氣慄疾滑利不能入於脉也故循皮

膚之中分肉之間。重於肓膜聚於胸腹。逆其氣則病。從其氣則愈。不與風寒濕氣合。故不為瘧。帝曰善。瘡或痛或不痛。或不仁。或寒或熱或燥或濕。其故何也。岐伯曰。痛者。寒氣多也。有寒故痛也。其不痛不仁者。病久入深。榮衛之行。滯經絡。時疎故不通。皮膚不榮。故為不仁。其寒者。陽氣少。陰氣多也。有寒故痛也。其熱者。陽氣多。陰氣少。病氣勝陽。遭陰故為瘧熱。其多汗而濡者。此其逢濕其也。陽氣少。陰氣盛。兩氣相感。故汗出而濡也。帝曰。夫瘡之為病。不痛何也。岐伯曰。瘡在於骨。則重。在於脉。則血凝而不流。在於筋。則屈不伸。在於肉。則不仁。在於皮。則寒。故具此五者。則不痛也。凡瘡之類。逢寒則蟲。逢熱則縱。陰瘡至。真要大論陰瘡者。按之不得。腰脊頭頂痛。時眩。大便難。陰氣不用。饑不欲食。咳唾則有血心如懸。病本於腎。

筋肌骨瘡。長刺節論。病在筋。筋蠻節痛。不可以行。名曰筋瘡。病在肌膚。肌膚甚痛。名曰肌瘡。病在骨。骨重不可舉。骨髓酸痛。寒氣至。名曰骨瘡。

肉苛。逆調論。帝曰。人之內苛者。雖近於衣絮。猶尚苛也。是為何疾。岐伯曰。榮氣虛。衛氣實也。榮氣虛則不仁。衛氣虛則不用。榮衛俱虛。則不仁且不用。肉如故也。人身與志不相有。曰死。

金匱

問曰。血瘡病從何得之。師曰。夫尊榮人。骨弱肌膚盛。重因疲勞汗出。臥不時動。搖加被微風。遂得之。但以脉自微濇。在寸口。關上小緊。宜鍼引陽氣。令脉和緊去。則愈。寸口脉沉而弱。沉即主骨弱。即主筋沉。即為腎弱。即為肝。汗出入水中。如水傷心。歷節。痛黃汗出。故曰歷節。少陰脉浮而弦弱。則血不足。浮則為風。風血相搏。即疼痛如掣。盛人脉濇小短。氣自汗出。歷節疼。不可屈伸。此皆飲酒汗出。當風所致。味酸則傷筋。筋傷則緩。名曰泄。鹹則傷骨。骨傷則痿。名曰枯。泄泄相搏。名曰斷泄。榮氣不通。衛不獨行。榮衛

俱微三焦無所御。四屬斷絕身體羸瘦。獨足腫大。黃汗出。脛冷。假令發熱。便為厯節也。

痺厯節方

痺症方

靈樞

治之以馬膏。膏其急者。以白酒和桂。以塗其緩者。以桑鈎鈎之。即以生桑炭置之坎中。高下

以坐等。以膏熨急頰。且飲美酒。啜美炙肉。不飲酒者。自強也。為之三拊而已。

馬膏馬脂也。其性味甘平。能利關節。除風寒濕痺。故可以膏其急者。白酒殊桂性味辛溫。能通經絡。行血脉。故可以塗其緩者。桑之性平。能利關節。除風寒濕痺。諸痛哉。此桑鈎鈎之者。鉤正其口也。復以生桑炭置之地坎之中。高下以坐等者。欲其淺深適中。便於坐而得其暖也。然後以前膏熨其急頰。且飲之美酒。啜之美炙肉者。皆助血舒筋法也。雖不善飲亦自強之三拊而已。言再三拊摩其患處。則病亦已矣。筋骨之病。總在軀體。古法多用外治。今人不能知矣。

寒痺熨法

靈樞

用醇酒二十升。蜀椒一升。乾薑一斤。桂心一斤。凡四種皆㕮咀。瀆酒中。用綿絮一斤。細白

布四丈。并納酒中。置酒馬矢煴中。馬矢煴中者。燃馬屎而煨之也。蓋封塗勿使泄。五日五夜出布。綿絮曝乾之。乾後復

瀆以盡其汁。每瀆必辟。辟周其日乃出。乾并用淳與綿絮複布為複巾。重布為中。如今之夾袋。所以盛貼。所以藏貼。故名也。長六七

尺。為六七巾。則用生桑炭炙巾。以熨寒痺所刺之處。令熱入。至於病所。

不易入。則法亦當考。明寒復炙巾以熨之。三十遍而止。汗出以巾拭身。亦三十遍而止。

黃耆桂枝五物湯

金匱

治血痺。陰陽俱微。寸口闊上微尺。中小緊。外證身體不仁。如風痺狀。

黃耆

芍藥

桂枝

各

三

生薑

六兩

大棗

十二

右五味。以水六升。煮取二升。溫服七合。日三

服。一方有人參。

此即桂枝湯以黃耆易甘草乃

附子

炮

各

二兩

生薑

兩

血丸

五

知母

四兩

右九味。以水

桂枝

四兩

芍藥

三兩

甘草

二兩

麻黃

附子

炮

各

二兩

生薑

兩

血丸

五

知母

四兩

右九味。以水

七升。煮取二升。溫服七合。日三服。

此為陽虛之症

烏頭湯

金

治厯節皮痛。不可屈伸。

固衛即以護榮

麻黃

芍藥

黃耆

甘草

三兩烏頭三枚咬咀以蜜二升
煮取一升即出烏頭

右五味咬咀四味水三升煮

取一升去滓納蜜煎中更煎之服七合不知更服之節非此不能通達陽氣

獨活

寄生湯針

治風寒濕痺偏枯脚氣

獨活

桑寄生

杜仲

牛膝

人參

細辛

歸身

生地

白芍

川芎

桂心

服治之方

風通

舒筋飲 治臂痛不能舉由氣血凝滯經絡不能行所致非風非濕腰以下食前服腰以上食後服

片薑黃

二錢如無以
義本代之

赤芍

當歸

海桐皮

去粗

白朮各一錢

羌活

炙甘草各一錢

右七

味加薑三片煎服磨沖沉香汁少許

拔瘡膏 用生半夏為末同廣膠等分先用薑汁將膏煎烊調入半夏塗

史國公酒方

聖惠

治中風語言謇澀

手足拘攣

半身不遂瘡瘍不仁

當歸酒洗

虎胫骨

酒浸一日
始能

炙活

龍甲

草薢

防風

秦艽

牛膝

松節

晚蠶沙

二兩

枸杞子

五兩

茄根

八兩

右為粗末絹袋盛

浸無灰酒

一斗十日取飲

半身不遂外治方

大活絡丹

指迷茯苓丸

俱治

瘻

素問

素問瘻論黃帝問曰五臟使人瘻何也岐伯對曰肺主身之皮毛心主身之血脉肝主身之筋膜脾主身之肌肉腎主身之骨髓故肺熱葉焦則皮毛虛弱急溼者則生瘻瘍也心氣熱而下肺厥而上上則下脉

虛虛則生。脉痿樞折。掣脛縱而不任地也。肝氣熱則膽泄口苦。筋膜乾筋膜乾則脻急而掣。發為筋痿。脾氣熱則胃乾而渴。肌肉不仁。發為肉痿。腎氣熱則腰脊不舉。骨枯而髓減。發為骨痿。帝曰：何以得之？岐伯曰：肺者臟之長也。為心之蓋也。有所失亡所求不得。則發肺鳴。鳴則肺熱葉焦。發為痿。此之謂也。人治瘧而用燥熱之藥。俱誤。悲哀太甚。則胞絡絕。胞絡絕則陽氣內動。發則心下崩數溲血也。故本病曰大經空虛。發為肌痿。傳為脉痿。思想無窮。所願不得。意淫於外。入房太甚。宗筋弛縱。發為筋痿。及為白淫。故下經曰：筋痿者。生於肝。使內也有漸於濕。以水為事。若有所留。居處相濕。肌肉濡漬。瘦而不仁。發為肉痿。故下經曰：肉痿者。得之濕地也。有所遠行勞倦。逢大熱而渴渴。則陽氣內伐。則熱合於腎。腎者水臟也。今水不勝火。則骨枯而髓虛。故足不任身。發為骨痿。故下經曰：骨痿者。生於大熱也。黃帝曰：何以別之？岐伯曰：肺熱者。色白而毛散。心熱者。色赤而絡溢。肝熱者。色蒼而爪枯。脾熱者。色黃而肉蠕動。腎熱者。色黑而齒槁。帝曰：如夫子言可矣。論言治痿者。獨取陽明何也？岐伯曰：陽明者。五臟六腑之海。主潤宗筋。宗筋主束骨而利機關也。衝脈者。經脈之海也。主滲灌谿谷。與陽明合於宗筋。陰陽總宗筋之會。會於氣街。氣街一名氣衝。足陽明經穴在足際旁。旁開一寸。動脉處。而陽明為之長。皆屬於帶脈。而絡於督脈。故陽明虛則宗筋繼帶脉不引。故足痿不用也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：各補其榮。諸經所生之榮。謂之榮。而通其俞。諸經所注為俞。調其虛實。和其順逆。筋脈骨肉各以其時受月。則病已矣。時受月王冰注。謂病所受之時月。未知是否。生氣通天論。濕熱不攘。大筋緩短。小筋弛長。緩短為拘。弛長為痿。

難經

五損損於骨。骨痿不能起於牀。

痿方

金剛九釗 治腎損骨痿不能起於牀。

萆薢 杜仲炒去絲 茼菪酒浸等分

右為末酒煮腰子搗丸如桐子大每服五七十九溫酒下。

虎骨四釗丸

治腳痙

宣木瓜

天麻

萆薢

牛膝各焙乾

附子一斤

虎骨各一兩

右以上各如法修製先將

前四味用無灰酒浸春秋各五日夏三冬十日取出焙乾入附子虎骨共研為末用浸藥酒打麵糊丸梧子大每服五十九食前鹽湯下。

加減四釗丸

治腎肝虛熱淫於內致筋骨痿弱足不任地驚恐戰慄潮熱時作飲食無味不生氣力。

肉蓯蓉

酒浸牛膝酒浸

木瓜乾

鹿茸酥炙熟地

五味子

酒浸免絲子酒浸各等分

右為末煉蜜

九桐子大每服五十九溫酒米飲下一方不用五味有杜仲

煨腎丸

治腎肝虛及脾損穀不化

牛膝

萆薢

杜仲炒去絲

白蒺藜

防風

免絲子

酒浸萆薢酒浸

葫蘆巴

破故紙等分

桂枝減半

右為末將猪腰子製如食法搗爛蜜丸如桐子大每服五七十九溫酒送

下又治腰痛不起

亦治腎瘻

續骨丹

本

治兩脚軟弱虛羸無力及小兒不能行

天麻酒浸

白附子

牛膝

木龍子各半兩

羌活半兩

烏頭一錢

地龍去土

乳香

沒藥各二

硃砂一錢

右以生南星末一兩無灰酒炙糊丸雞頭大硃砂為衣

此加味活絡丹也舒筋最宜

思仙續斷圓

事本

治肝腎風虛氣弱脚不可踰地腰脊疼痛風毒流注下經行止艱難小便餘瀝此補五

臟內傷調中益精涼血堅強筋骨益智輕身耐老

思仙丸

生地各五兩

五加皮 防風 米仁 羌活

川斷 牛膝各三兩

草薢四兩

右為細末。好酒三升。化青鹽三兩。用大木瓜半斤去皮子。以鹽酒煮木瓜成膏。杵丸如桐子大。每服三

四十丸。空心食前溫酒鹽湯下。膏少和酒可也。

此方治下焦風濕脚氣。亦效。明以陽明為諸筋絡會也。而用藥則補腎為多。以腎為

筋骨之總司也。養其精血而逐其風疾。則大略無誤矣。

虎潛丸

丹溪以上二方見通治

厥

靈素

靈癩狂篇。厥逆為病也。足暴清胸。若將裂腸。若將以刀切之。煩而不能食。脈大小皆濶。厥之象如此甚。則不知人矣。素厥論。黃帝問曰。厥之寒熱者何也。岐伯對曰。陽氣衰於下。則為寒厥。陰氣衰於下。則為熱厥。帝曰。熱厥。之為熱也。必起於足下者何也。歧伯曰。陽氣起於足五指之表陰脉者。集於足下。而聚於足心。故陽氣勝。則足下熱也。帝曰。寒厥之為寒也。必從五指而上於膝者何也。岐伯曰。陰氣起於五指之裏。集於膝下。而聚於膝上。故陰氣勝。則從五指至膝上寒。其寒也不從外。皆從內也。解精微論。厥則目無所見。夫人厥。則陽氣并於上。陰氣并於下。陽並於上。則火獨光也。陰並於下。則足寒。足寒則脹也。厥則無不因陽氣在上。若不能通陰納陽。而用辛熱滋潤之藥。貽害無窮。調經論。血之與氣。并走於上。則為大厥。厥則暴死。氣復反則生。不反則死。陽明脉解論。厥逆連藏。則死。連經則生。

瘡能煎厥。素脉解篇。內奪而厥。則為瘡能。此腎虛也。少陰不至者。厥也。肝氣當治而未得。故善怒。善怒者。名曰煎厥。劉河間地黃子專治瘡脉。

生氣通天論。陽氣者。煩勞則張。精絕歸積於夏。使人煎厥。此當治肝脾之逆。

薄厥。素生氣通天論。陽氣者。大怒則形氣絕。而血菀於上。使人薄厥。此當治血逆。

陽明厥 素陽明脈解論。陽明厥則喘而惋惋則惡人。

少陰厥 素脉要精微論。脈俱沉細數者。少陰厥也。

風厥 素評熱論。汗出而身熱者。風也。汗出而煩滿不解者。厥也。病名曰風厥。此當風

尸厥 素繆刺論。五絡俱竭。令人身脈皆動。而形無知也。其狀若尸。名曰尸厥。

難經

督之為病。脊強而厥。

金匱

問曰。寸脉沉大而滑。沉則為實。滑則為氣。實氣相搏。血氣入臟。即死入腑。即愈。此為卒厥。何謂也。師曰。唇口青。身冷。為入臟。即死。如身和。汗自出。為入腑。即愈。卒厥之症類似中風。或誤治死不旋踵。

傷寒論

寸口諸微亡陽。諸濡亡血。諸弱發熱。諸堅為寒。諸乘寒者。則為厥。臂掌不仁。以胃無穀氣。脾濇不通。口急不能言。戰而慄也。少陰脈不至。腎氣微少。精血奔氣促迫。上入胸膈。定氣反聚。血結心下。陽氣退下。熱歸陰股。與陰相動。令身不仁。此為尸厥。少陽厥陰俱病。耳聾囊縮而厥。水漿不入。不知人者。六日死。此厥寒

諸四逆厥者。不可下之。虛家亦然。以下所論諸條皆指傷寒症手足逆冷而言。非氣逆不知人之厥也。傷寒始發。熱六日厥。反九日而利。凡厥利者。當不能食。今反能食者。恐為除中。食以素餅。不發熱者。知胃氣尚勝。必愈。傷寒一二日至四五日而厥者。必發熱。前熱者。後必厥。厥深者。熱亦深。厥微者。熱亦微。厥應下之。而反發汗者。必口傷爛赤。此厥熱。凡厥者。陰陽氣不相順接。便為厥。此致厥之由。厥者。手足逆冷是也。此厥之象。傷寒脉微而厥。至七八日。膚冷。

人躁無暫安時者此為厥厥。傷寒熱少厥微。指頭寒默默不欲食煩躁數小便利。色白者此熱除也。欲得食其病為愈。若厥而嘔胸脅煩滿。其後必便血。熱入病者手足厥冷。言我不結胸。小腹滿按之痛者。此冷結在膀胱關元也。傷寒發熱下利厥逆。躁不寐者死。病裏傷寒發熱下利至甚。厥不止者死。傷寒五六日不結胸。腹瀉脉虛復厥者不可下。此為亡血下之死。傷寒脉促。手足厥逆者可灸之。下利手足厥冷無脉者。灸之不溫。若脉不還。反微喘者死。虛寒之厥下利後脉絕。手足厥冷。眸時脉還手足溫者生。脉不諸條有寒有熱有虛有實有寒熱互乘其變。不一證。病異形。非厥之正病也。尤不可不慎。心體察凡一病其變態不同。如此何可執一說以人命為兒戲耶。

厥方

尸厥方素 以竹管吹其兩耳鼻刺。其左角之髮方一寸。燔治飲以姜酒。燔治燒同

赤圓

金匱

寒氣厥逆主之。

先食酒飲下三丸。日再夜一服。不知稍增之。以知為度。真朱即殊砂

茯苓 半夏各四兩洗烏頭泡二兩細辛一兩半金作人參右六味末之。內真朱為色。煉蜜丸如麻子大。

先食酒飲下三丸。日再夜一服。不知稍增之。以知為度。真朱即殊砂

茯苓甘草湯傷寒

傷寒厥而心下悸者宜先治水。當服此湯。却治其厥。不爾。水瀆入胃。必作利也。

茯苓

二兩

桂枝二兩生草一兩生薑二兩右四味水四升。煮取二升。分溫三服。

尸厥方金匱

治尸厥脉動而無氣。氣閉不通。故靜而死也。草蒲屑內鼻兩孔中吹之。令人以桂屑著舌下。

白薇湯本草 人平居無苦疾。忽如死人。身不動搖。默默不知人。目閉不能開。口瘡不能言。或微知人。或惡聞人聲。但如眩冒。移時方寤。此由出汗過多。血少氣併於陽。獨上而不下。氣壅塞而不行。故身如死氣過血。還陰陽復通。移時方寤。名曰鬱冒。亦名血厥。婦人多有之。宜服。

白薇

當歸各一
人參

甘草各一
錢

右為粗末每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服

此病多

而婦科皆不誤治

四逆湯

傷寒

論

下利厥逆而惡寒者主之大汗若大下利而冷厥者亦主之

方見傷寒

通脈四逆湯

傷寒

論

下利清穀裏寒外熱汗出而厥者主之

方見通治

附加減法如面色赤者加葱九莖

腹中痛者去葱加芍藥二兩

嘔者加生薑二兩

咽痛者去芍藥加桔梗一兩

利止脉不出者去

桔梗加人參一兩

當歸四逆湯

傷寒

論

手足厥冷脉細欲絕者主之

方見傷寒

以上三方皆治寒

極之厥與熱厥正相反須辨之

瓜蒂散 白虎湯

此治熱厥

二烏梅丸

此治蟲厥

蘇合香丸

此治氣厥

四磨飲

以上三方

至寶丹

以上三方

俱見通治

虛勞

金匱

夫男子平人脉大為勞極虛亦為勞 男子面色薄者主渴及亡血卒喘悸脉浮者裏虛也 男子脉虛沉弦無寒熱短氣裏急小便不利面赤白時日暝兼効少腹滿此為勞使之然 勞之為病其脉浮大手足煩春夏處秋冬瘡陰寒精自出酸削不能行 男子脉浮弱而濶為無子精氣清冷 男子平人脉虛弱細微者喜溢汗也 人年五六十其病脉大者瘦挾背行若腸鳴馬刀挾癰者皆為勞得之 脉沉小遲名脫氣其人疾行則喘渴手足逆寒腹滿甚則溏泄食不消化也 脉弦而大弦則為芤減芤則為寒芤則為虛虛寒相搏此名為革婦人則半產漏下男子則亡血失精 古人所謂虛勞皆是純虛無吐血咳嗽者正相反誤治必斃近日吐血咳嗽之病乃是血症有似虛勞其實非虛勞也

夫虛勞者。五勞六極七傷是也。五勞者一曰志勞。二曰思勞。三曰心勞。四曰憂勞。五曰瘦勞。六極者一曰氣極。二曰血極。三曰筋極。四曰骨極。五曰肌極。六曰精極。七傷者一曰陰寒。二曰陰萎。三曰陰急。四曰精連連。五曰精少。陰下濕。六曰精清。七曰小便苦。數臨事不卒。

五蒸一骨蒸根在腎。二脉蒸根在心。三皮蒸根在肺。四肉蒸根在脾。五內蒸亦名血蒸。必外寒而內熱。把手附骨而內熱甚。根在五臟六腑。又有二十三蒸各有證名。

肺勞者。短氣面腫。鼻不聞香臭。肝勞者。面目乾黑。口苦。精神不守。恐畏不能獨臥。目視不明。心勞者。忽忽喜忘。大便苦難。或時鴨渴口內生瘡。脾勞者。舌苦直不能咽唾。腎勞者。背難以俛仰。小便不利。色赤黃而有餘瀉。莖內痛。陰濕囊生瘡。小腹滿急。此乃五勞之勞

虛勞方

桂枝加龍骨牡蠣湯金匱 失精家。少腹弦急。陰頭寒。目眩。脈極虛芤澤。爲清穀亡血失精。脉得諸芤動微緊。男子失精。女子夢交。此湯主之。

桂枝二兩芍藥

生薑各二兩

甘草二兩

大棗十二枚

龍骨

牡蠣各三

右七味以水七升煮取

三升分溫三服

脉極虛芤澤乃爲虛寒之症。故用桂枝及建中等湯。若微熱而脉數者。乃陰虛之症。與此相反誤用必驚。

薯蕷丸金匱 虛勞諸不足。風氣百疾。主之。

薯蕷分三十當歸

桂枝

麥門冬各二兩

柴胡

桔梗

茯苓各五

阿膠七分

杏仁六分

乾薑三分

甘草八分

人參十分

芎藭

芍藥

白朮

百枝分

大棗

百枝分

防風

六分

大棗

百枝分

右二十一味末之。煉蜜和丸如彈子大。空腹酒服一丸一百丸為劑。

大黃蘆蟲丸金匱 五勞虛極羸瘦。腹滿不能飲食。食傷。憂傷。飲傷。房室傷。飢傷。勞傷。經絡榮衛氣傷。內有乾

血肌膚甲錯兩目暗黑。此丸主之。

大黃十分蒸黃芩二兩甘草三兩桃仁一升芍藥四兩乾地黃十兩蠟燭一升乾漆一兩

蟲蟲一升水蛭百枚鱗蟲半升右十二味為末煉蜜為丸小豆大酒飲服五九日三服血朝則病草木之品所能下必用食血之蟲以化之此方專治瘀血成勞之症不降則正氣永無復理故去病即所以補虛也

治夢洩精方金

韭子一升右為末酒服方寸匕日三服立效。

羌活補髓丸

羌活九針療髓虛腦痛不安膽腑中寒

羌活川芎

當歸各三桂心二兩人參四兩酥一升大麻仁二升

研脂

棗肉一斤

研脂牛髓

羊髓各一升

右十味先飴前五味為散後用棗肉麻仁打匀再下二髓及酥重湯煮之為丸桐子大

酒服三十九日再服

肘後癲肝散

金匱附方一具多治冷勞又主鬼疰一門相染

懶肝乾木之右水服方寸匕日三服

骨蒸方

金療虛熱骨蒸羸瘦煩悶短氣喘息兩鼻孔張日西即發

龍膽

黃連

桔梗各一梔子二七芒硝半兩青葙子

苦參

大黃

黃芩

救急療瘻疾方

外臺右十一味搗節為末煉蜜和丸如梧子大飲服十九日二服以知為度此為純寒之劑實熱者宜之

炙甘草

三兩

右一味

小便煮服用小便奇此

口乾方

外臺

療脾熱腸痛熱滿不歇目赤不止口唇乾裂

石膏
碎絲
裏 生地汁

赤蜜各一升 淡竹葉五升

右四味水一斗五升先煮竹葉取七升去滓煮石

膏取一升五合去滓納地黃汁煮二三沸下蜜煎三升細服

傳屍勞方

臺

獺肝

一具破

鱉甲

一枚炙

野狸頭

一枚炙

紫苑

四分

漢防己

一兩半

蜀漆洗

麥冬

甘草一兩

右藥

搗節已成煉烊至腎脂二分合蜜一分烊令和丸桐子大每服十九丸加至十五丸日再其藥合和分一分懸門額上一分著頭邊一分繫脣上先服頭邊次服脣上次服門上大驗

秦艽蠶甲散

蜜

治骨蒸壯熱肌肉消瘦舌紅頰赤氣粗困倦盜汗

鱉甲

柴胡

地骨皮

各一兩

秦艽

知母

當歸

各五錢

右為末每半兩入烏梅一枚青

蒿五葉同煎臨臥空心溫服

秦艽扶羸湯

直

治肺痿骨蒸勞嗽聲嘎自汗體倦

鱉甲

秦艽

當歸

人參

各半錢

柴胡

二錢

地骨皮

紫苑

半夏

甘草

一錢

右九味加薑棗煎服

十味煎

臺

治凡病在胸膈上者宜飽服而在傍肺既居上則病在上晝宜服丸夜宜合桑白皮汁等服

桑白皮

一升

地骨皮

三升

二味以水七升煮取三升去渣澄清

生地汁

五升

蜜炙

二升

生薑汁

一升

竹懸

生葛根汁

各三升

白蜜

一升

牛酥

三合

大棗

一升

右十味先煮生地以下葛

根以上和煎減半則內桑皮等和煎之三分減一則內酥蜜等藥攪之勿停手如稠飴狀每服胡桃

滋潤肺經此為第

大一枚哈之

蜜潤肺經此為第

薑汁

宜用少許

百合煎

類方

治吐血咳嗽補肺

生地汁

葛根

黃牛乳各一
胡桃研細

黃明膠炙燥末半兩
阿膠尤佳

生薑汁半斤

乾柿五枚

大棗二十一枚

去皮核研爛清酒一升秦艽半兩末

秦艽味

人苦

杏仁三兩

右藥煎減半入好蜜四兩漫火

養成入磁器服一匙米飲調下日三

方內

薑汁太多

宜減去大半

人參蛤蚧散

蜜

治二三年間肺逆喘嗽咯吐膿血滿面生瘡遍身黃腫

蛤蚧一對

全者河水浸五宿逐日換水洗去腥氣

鱉多黃

杏仁五兩

甘草兩

人參

茯苓

貝母

知母

桑白皮

兩各二

右為細末磁器內盛每日如茶點服神效

金鎖固精丸

治夢遺滑精

芡實

蓮鬚

蒺藜各二

龍骨

牡蠣

煅

右以蓮子粉糊丸服鹽湯送下

金鎖丹

本事

治夢泄遺精關鎖不固

茴香

葫蘆巴

破故紙炒

白龍骨

各一

木香

一兩

胡桃

三十個

羊腎

三對切開用鹽

右

為末和二膏研細酒浸熟九桐子大

每服三十五九

鹽湯下

金鎖正元丹

治真氣不足元臟虛弱四肢倦怠百節酸疼精神昏困手足多冷心忪盜汗飲食減少

小便滑數遺精白濁

五倍子

茯苓各八

補骨脂十兩

紫朶去

心

葫蘆巴

炒

蕤英

洗淨各

硃砂

別研

龍骨各三

右

右為細末入研令勻酒糊為丸如桐子大

每服十五丸至二十丸

空心食前溫酒或鹽湯下

犀角紫河車

九錢

治傳尸勞三月必平復其餘勞症即消數服神效

紫河車

一具米泔浸宿洗淨焙乾

一蟹甲酥炙桔梗

胡黃連

白芍

敗鼓皮

心

大黃

貝母

龍膽草

黃藥子

知母各二

錢半芒硝

犀角

錢

硃砂

錢研

右為末蜜丸桐子大

硃砂為

衣空心溫酒服二十九如膈熱食後服重病不過一料

小建中湯

匱

黃耆建中湯

匱

火

甘草湯

匱方

大建中湯

匱

八味地黃丸

匱

人參養榮湯

匱方

瓊玉膏

生地黃

煎外

四物湯

匱

二連湯

元戎

方俱見通治

九

消證附

張

靈素

靈師傳篇胃中熱則消穀令人懸心善饑 素氣厥論心移寒於肺肺消肺消者飲一溲二死不治 陽陰別論二陽之病發心脾有不得隱曲女子不月其傳為風消其傳為食黃死不治 氣厥論心移熱于肺傳為膈消

金匱

厥陰之為病消渴氣上衝心心中疼熱飢而不欲食食即吐或下之不肯止

此症不可誤認或厥也

病源

夫消渴者渴不止少便多是也其病變多發癰瘍此坐熱氣留於經絡血氣壅澀故成癰瘍 內消病者不渴而小便多是也利多不得潤養五臟臟衰則生諸病由腎盛之時恣意快情致使虛耗故不渴而小便多也 強中病者莖長興盛不痿精液自出由少服五石熱住於腎中下焦虛少壯之時血氣尚豐能制於五石及至年衰血氣減少腎虛不復能制津液若精液竭則諸病生矣

消證方

文蛤散

匱

渴欲飲水不止者主之

傷寒論治心煩內上粟起意欲飲水反不渴者

文蛤五兩

上一味杵為散以沸湯五合和服方寸匕

欲飲而不渴乃脾也

中

有水而口

渴也

消渴方針

括蔞根

生薑
麥冬

蘆根切各二升
茅根切各三升

右五味㕮咀以水一斗煮取三升分三服

之主方也

淡神湯

金 沔熱止渴治胃腑實熱引飲常渴者。

淡神

二兩

括蔞根

五兩

生麥冬

五兩

萎蕤

四兩

知母

四兩

生地黃

六兩

小麥

二升

大棗

二十枚

淡竹葉

切三升

右九味以水三斗煮小麥竹葉取九升去渣下藥煮取四升分四服不問早晚但渴即進通治渴患熱者。

黃連圓滻渴方針

黃連一斤生地黃一斤

右二味絞地黃汁浸黃連出曝燥復內汁中令汁盡乾搗末蜜丸桐子大

服二十九日三食前後無拘亦可為散酒服方寸匕

此治胃中有伏火之方製法神妙本事方用冬瓜汁收入黃連內為丸即以冬瓜汁煎大麥仁湯

下亦防此義則知多吃了冬瓜亦妙也

桑根湯

金翼

主日飲一石水方

桑根白皮

切五升入地黃三尺者良久令齒黑

右一味水煮以味濃為度適寒溫任性飲戒食鹽。

神效散

本事方治渴疾飲水不止

白浮石

蛤粉 蟬蛻各等

右細末用鯽魚膽七個調三錢服不拘時候神效

猪腎

鹿角湯

金

強中之病莖長與盛不交精液自出消渴之後即作癰疽皆由石熱凡如此等宜服

猪腎

一具大豆一升

薺莞三兩人參

石膏

各三兩

茯神

磁石

綿裹

知母

葛根

黃芩

甘草

括蔞根

各二兩

以水三升原

合一劑病勢漸歇即止

腎氣丸

見通治

白虎人參湯

乾烈方

見勞虛

蘭臺軌範卷三

吳江徐靈胎洞溪著

傷寒

素問

素熱論篇。帝曰：今夫熱病者，皆傷寒之類也。或愈或死，皆以六七日之間其愈皆以十日以上者何也？岐伯對曰：巨陽者，諸陽之屬也。其脈連於風府，故為諸陽主氣也。人之傷於寒也，則為病熱。熱雖盛，不死。其兩感於寒而病者，必不免於死。帝曰：願聞其故。岐伯曰：傷寒一日，巨陽受之，故頭項痛，腰脊強。二日，陽明受之，陽明主肉，其脈逕鼻絡於目，故身熱，目疼，而鼻乾不得卧也。三日少陽受之，少陽主膽，其脈循腸絡於耳，故胸脇痛，而耳聾。三陽經，皆受其病，而未入於臟者，故可汗而已。四日太陰受之，太陰脈布胃中，絡於嗌，故腹滿而嗌乾。五日少陰受之，少陰脈貫腎，絡於肺，繫舌本，故口燥舌乾而渴。六日厥陰受之，厥陰脈循陰器而絡於肝，故煩滿而囊縮。三陰三陽，五臟六腑，皆受病，榮衛不行，五臟不通，則死矣。陰皆連五臟，故曰入臟中也。其不兩感於寒者，七日巨陽病衰，頭痛少愈。八日陽明病衰，身熱少愈。九日少陽病衰，耳聾微聞。十日太陰病衰，腹減如故，則思飲食。十一日少陰病衰，渴止不滿，舌乾已而嘯。十二日厥陰病衰，囊縮少腹微下，大氣皆去。病日已矣。帝曰：治之奈何？岐伯曰：治之各通其臟脈。病日衰已矣，其未滿三日者，可汗而已；其滿三日者，可泄而已。水熱穴論。帝曰：人傷於寒，而傳為熱，何也？岐伯曰：夫寒甚則生熱也。

兩感 素熱論。帝曰：其病兩感於寒者，其脈應與其病形何如？岐伯曰：兩感於寒者，病一日，則巨陽與少陰俱病，則頭痛口乾而煩滿。二日，則陽明與太陰俱病，則腹滿身熱，不欲食，譴言。三日，則少陽與厥陰俱

病則耳聾囊縮而厥陰水漿不入。不知人六日死。帝曰五臟已傷，六腑不通，榮衛不行。如是之後三日乃死。何也？岐伯曰：陽明者十二經脈之長也。其血氣盛故不知人。三日其氣盡故死。兩感則表

溫病暑病 素熱論。凡病傷寒而成溫者先夏至日者為病溫後夏至日者為病暑。暑當與汗皆出勿止。陰陽交 素評熱病論。帝問曰有病溫者汗出輒復熱而脈躁疾不為汗衰狂言不能食。病為何？岐伯曰病名陰陽交者死也。帝曰願聞其說。岐伯曰人所以汗出者皆生於穀穀生於精今邪氣交爭於骨肉而得汗者是邪却而精勝也。精勝則當能食而不復熱復熱者邪氣也。汗出者精氣也。今汗出而輒復熱者是邪勝也。不能食者精無俾也。病而留者其毒可立而傾也。且夫熱論曰汗出而脈尚躁盛者死。今脈不與汗相應此不勝其病也。其死明矣。狂言者是失志失志者死。今見三死不見一生雖愈必死也。

難經

傷寒有幾其脈有變不然傷寒有五有中風。有傷寒有濕溫有熱病有溫病其所苦各不同。中風之脈陽浮而滑陰濡而弱。濕溫之脈陽濡而弱陰小而急。傷寒之脈陰陽俱盛而緊濶。熱病之脈陰陽俱浮。浮之而滑沉之散濶。溫病之脈行在諸經不知何經之動也。各隨其經所在而取之。傷寒有汗出而愈下之而死者有汗出而死下之而愈者何也？然陽虛陰盛汗出而愈下之即死。陽盛陰虛汗出而死下之而愈者陰盛者風傷衛而汗自洩寒氣在內而未出也。陽盛陰虛者身熱汗閉。燥火內結津液乾枯陰氣欲竭也。此以有邪處為虛無邪處為盛。

傷寒論六經脈證

太陽病脈浮頭項強痛而惡寒。尺寸俱浮者太陽受病也。其脈上連風府故頭項痛腰脊強發熱汗出惡風脈緩者名曰中風。惡寒體痛嘔逆脈陰陽俱緊者名曰傷寒。發熱惡寒者發於陽也無熱惡寒者發於陰也發於陽者七日愈發於陰者六日愈以陽數七陰數六也。

陽明中風口苦咽乾腹滿微喘發熱惡寒脈浮而緊。太陽陽明病若能食名中風不能食名中寒尺寸俱長者陽明受病也其脈循鼻絡於目故身熱目疼鼻乾不能卧陽明外證身熱汗自出不惡寒反惡熱也。肺氣已離太陽故不惡寒陽明脉大以上皆陽明之經病有太陽陽明有少陽陽明傳腑之證太陽陽明者脾約是也少陽陽明者發汗利小便已胃中燥煩實大便難是也陽明之為病胃家實也。比正陽陽明居中土也萬物所歸無所復傳始雖惡寒二日自止此為陽明病也

少陽之為病口苦舌乾目眩也尺寸俱弦者少陽受病也其脈循脇絡於耳故胸脇痛而耳聾少陽中風兩耳無所聞目赤胸中滿而煩者不可吐下吐下則悸而驚傷寒脈弦細頭痛發熱者屬少陽。頭痛發熱與太陽同而脉之弦細獨異三陽合病脈浮大上關上但欲眠睡目合則汗已極傷寒六七日無大熱外熱輕則其人躁煩者此為陽去入陰也躁則病欲退矣傷寒三日三陽為盡三陰當受邪其人反能食而不嘔此為三陰不受邪也。

太陰之為病腹滿而嘔食不下自利益甚時腹自痛尺寸俱沉細者太陰受病也其脈布胃中絡於嗌故腹滿而嗌乾傷寒脈浮而緩手足自溫者繫在太陰同一大陰病而有沉細浮緩之殊蓋沉細乃太陰本脉也自利不渴者屬太陰以臟有寒故也當溫之宜服四逆輩少陰自利而渴熱入中焦也此自利而不渴寒入中焦也少陰之為病脈浮細但欲寐也衛氣行於陽則寤行於陰則寐少陰病欲吐不吐心煩但欲寐五六日自利而渴者屬少陰也尺寸俱沉者少陰受病也以其脈貫腎絡於肺繫舌本故口燥舌乾而渴。

厥陰之為病。消渴氣上撞心心中皮熱飢而不欲食。則吐衄下之利不止。尺寸俱微緩者厥陰受病也。以其脈循陰器絡於肝故煩滿而囊縮厥陰中風脈微浮為欲愈不浮為未愈。

傷寒傳足不傳手經脈

此本陶節庵最為明晰

足太陽脈起於目內眥從頸下後項連風府行身之後終於足其外證頭疼項強腰脊痛骨節痛惡心發熱惡寒標病宜發汗但太多則亡陽筋惕肉瞤小便不利者當利自利者不可利利之引熱入膀胱其人如狂不可下下之為結胸

足陽明脈起於鼻頰絡於目循面下人迎入缺盆下膈屬胃行身之前終於足之屬兌穴故其證目痛鼻乾不得眠頭頰痛身熱微惡寒無汗者屬標病宜解肌身熱發渴汗出屬本病宜清熱解肌若惡熱自汗發渴去衣被發斑發黃發狂大便祕腹滿此正陽明胃腑病也宜下之

足少陽脈起於目鏡眥上抵頭循角絡耳中循胸脇行身之側終於足故頭角痛目眩耳聾脇疼心下痞寒熱往來嘔而口苦膽熱也此經無標本只有小柴胡一湯和解隨證加減有三禁汗之犯太陽下之犯陽明利之犯少陰脈弦數者是本經證

足太陰為三陰經首其脈始於足大指上行至腹絡於喉連舌本行身之前也故腹滿自利咽乾嘔吐腹滿邪入脾也嘔吐脾氣不和也自利挾熱下利也咽乾脾脈連喉也頭不疼陰脈至頭而還也身微熱手足溫表邪解而傳入裏也身目俱黃標病宜平熱腹滿硬痛渴而喉乾小便赤大便難本病雖宜下然當分寒熱施治足少陰脈始於足心上行貫脊循喉絡舌本下注心胸行身之後也其病手足乍冷乍溫身不熱者標病二便不通舌乾口燥者本病此經本熱而標寒也宜急下以存腎水雖自利此是飲湯水所致不可疑為寒也初病大熱主此變為厥冷者是熱深厥亦深也急下之至陰又難拘定法因分真中者

寒證傳經者熱證。大抵六經中惟此難辨。有直中真陰者。有夾陰中寒者。有夾陰傷寒者。有虛陽伏陰者。

有陰極發躁者。有漏底傷寒者。前二證身不熱。厥冷全似少陰傳經而令者。後四證身熱面赤又全似陽

大要口燥舌乾渴而譖語。大使實者傳經熱證也。足冷嘔吐瀉利不渴或泄寒腹痛者直中真寒證也。

足厥陰脈始於足大指上循陰器抵小腹循脇上口唇與督脈會於顛頂行身之側也。其證煩濁囊拳消渴舌捲譖語大便不通而頭疼手足乍冷乍溫者此是陽經傳來熱邪。本病宜急下若發熱是寒狀如瘧

疾此是熱邪在經標病宜和解若不嘔便清當有大汗至而自愈頭疼者以督脈會於顛頂故也。大抵熱深厥亦深則舌捲囊縮筋脈陰寒冷極亦捲縮須以口渴不渴足冷不冷脈沉實沉細別之

熱者甚

後人皆指為極寒概用溫熱誤人無算熟讀傷寒論自知

傷寒六經治法方

諸方備義俱詳余所著
傷寒類方中不更贅

桂枝湯

見本傷寒論

治太陽中風頭疼發熱汗出惡風

桂枝

去皮芍藥

三兩

甘草

二兩

生薑

三兩

大棗

十二枚擘

右五味㕮咀以水七升微火煮取三升去滓

適寒溫服一升服已須臾數熱稀粥一升餘以助藥力溫覆令一時許通身熱散微似有汗者益佳不

可令如水流漓病必不除若一服汗出病差停後服不必盡劑若不汗更服依前法又不汗後服當小

促其間半日許令三服盡若病重者一日一夜服周時觀之服一劑盡病證猶在者更作服若汗不出

麻黃湯治太陽中寒頭身俱痛發熱無汗惡風而喘

麻黃

三兩去節

桂枝

去皮

甘草

一兩

杏仁

七十個湯泡去皮尖

藥煮取二升半去滓溫服八合覆取微似汗不須啜粥餘如桂枝法將息

桂枝麻黃各半湯 治傷寒向愈脈微緩惡寒自癢

桂枝一兩去皮 芍藥酒洗生薑切 甘草炙 麻黃去節各一兩 大棗擘杏仁二十個湯浸去
七味以水五升先煮麻黃一二沸去上沫納諸藥煮取一升八合去滓溫服六合令微汗則愈

桂枝加葛根湯 治太陽病項背強七八反汗出惡風

葛根四兩芍藥二兩甘草二兩生薑三兩大棗十二擘桂枝三兩去皮 右六味以水一斗生者葛根減二升去上沫納諸藥取三升去滓溫服一升覆取微似汗不須啜粥餘如桂枝法本方無葛根若加葛根則為葛根湯矣陳氏

無已本誤加

葛根湯 治太陽病項背強無汗惡風者又治太陽陽明合病自下利者

葛根四兩麻黃三兩甘草炙桂枝去皮芍藥二兩甘草二兩生薑三兩大棗十二擘桂枝三兩去皮 右七味㕮咀以水一斗先煮麻黃葛根減二升去沫納諸藥煮取三升去滓溫服一升覆取微似汗不須啜粥餘如桂枝法將息及禁忌

葛根芩連湯 治太陽證誤下利遂不止喘而汗出者此主之

葛根半斤甘草炙 黃芩一兩 黃連三兩 右四味以水八升先煮葛根減二升入諸藥煮取二升去滓分溫再服

桂枝加芍藥湯 治太陽誤下腹滿時痛屬太陰也此主之大實痛者加大黃一兩即桂枝加大黃湯

桂枝三兩芍藥六兩甘草炙酒洗生薑三兩大棗十二擘右五味㕮咀以水七升微火煮取三升去滓適寒溫服一升此即桂枝湯加芍藥倍即另成一方而以之治太陰證分而輕重之所關如此 太陰病必腹滿

大青龍湯 治太陽中風脈浮緊惡寒發熱更甚不汗出而煩躁者

麻黃

去節

桂枝

去皮

甘草

二兩

杏仁

四十粒

生薑

三兩

大棗

十二枚

石膏

如雞子

右七味以水九升

燒石膏

大半升

加雞子

右七味以水九升

先煮麻黃減二升去上沫納諸藥煮取三升去滓溫服一升取微似汗汗出多者溫粉撲之一服汗者

停後服汗多亡陽遂虛惡風煩躁不得眠也

此風寒兩傷之方

按載大青龍何以不載小青龍蓋

桂枝加桂湯

治燒針令其汗

針處破寒核起微赤

冷發奔豚灸其核上各一壯與此湯

即桂枝湯加

桂二兩

小柴胡湯 治少陽中風往來寒熱胸脇苦滿心煩喜嘔腹痛心悸頭汗出舌上胎白及婦人熱入血室等證

柴胡 半斤

黃芩

人參

甘草

三兩

半夏

半升

生薑

三兩

大棗

十二枚

右七味水一斗二升煮

大棗

十二枚

生薑

三兩

右七味水一斗二升煮

取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服

若胸中煩而不嘔去半夏人參加括薑根一枚

若渴者去半夏加人參合煎成四兩半括薑根四兩

若腹中痛者去黃芩加芍藥三兩

若腸下痞去大棗加牡蠣四兩

若心下悸小便不利者去黃芩加茯苓四兩

若不渴外有微熱者去人參加桂枝

三兩溫覆取微汗愈

若欬者去人參太棗生薑加五味子半升乾薑二兩

此方加減細審

大柴胡湯

治傷寒十餘日

柴胡證仍在

嘔而心下急

心中痞鞕而癆熱結在裏

往來寒熱等證

柴胡 半斤

黃芩

三兩

芍藥

三兩

半夏

半升

生薑

五兩

枳實

四枚

大棗

十二枚

大黃

二兩

右八味以水

一斗二升煮取六升去滓再煎

溫服一升日三服

大承氣湯

治傷寒十餘日

吐下後不解

時發潮熱獨語如見鬼狀尋衣摸牀

胃中有燥屎也

此下之

大黃

四兩

厚朴

半斤

枳實

五枚

芒硝

三合

右四味以水

一斗先煮二物取五升去滓納大黃者取

二升去滓納芒硝更上微火一兩沸分溫再服得下

餘勿服

謂中非存燥屎之所

此言胃中者指足陽

明言即所謂胃中是也乃腸胃之總名

小承氣湯 治汗多微發熱不惡寒或小便數而大便難下者與此湯微和胃氣

大黃四兩去皮尖厚朴二兩去皮尖枳實三枚去皮尖右三味以水四升煮取一升二合去滓分溫二服初服湯當更

衣不爾者盡飲之若更衣者勿服之

調胃承氣湯

治胃氣不和不惡寒但熱腹微滿而煩與此湯

大黃四兩去皮尖甘草二兩去皮尖芒硝半斤

右三味㕮咀以水三升先煮大黃甘草取一升去滓納芒硝

更上大微沸令沸少少溫服不惡寒乃外邪已盡方

可下此仲景之要法

桃核承氣湯 治太陽病不解熱結膀胱其人如狂血自下者愈其外不解者尚未可攻宜先與桂枝解外外解已但小腹急結此主之

桃仁五十個去皮尖桂枝二兩去皮尖大黃四兩去皮尖芒硝

甘草二兩去皮尖右五味以水七升煮取二升半去滓納芒硝

確更上火微沸下火先令溫服五合日三服當微利

抵當湯

治傷寒六七日少腹鞭小便自利其人如狂喜忘大便黑此有蓄血

水蛭熬蟲各三十個去足尖桃仁三十個去皮尖大黃三兩酒浸

右四味為末以水五升煮取三升去滓溫服一升不下再服

抵當丸 治傷寒有熱少腹滿應小便不利今反利者為有血也當下之不可餘藥

水蛭二十個去足尖蟲二十個去足尖桃仁二十個去皮尖大黃三兩

右四味杵分為四丸以水一升煮一丸取七合服之

醉時當下血若不下者更服

大陷胸湯 治表未解而醫反下之胃虛而陽氣內陷心下有鞶舌上燥渴小有潮熱心上至少腹痛不

可逆

大黃六兩 芒硝一升 甘遂一錢 右三味以水六升先煮大黃取二升去滓納芒硝煮一兩沸納甘遂末溫服一升得快利止後服結胸乃水飲為患傷寒論云此為水結故用甘遂

大陷胸丸 治病發於陽而反下之熱入因作結胸病發於陰而反下之因作痞所以成結胸者以下之太早故也

大黃半斤 茅蘚子熬 芒硝

杏仁去皮尖熬

黑各半升

右四味搗篩二味納杏仁芒硝合研如脂和散

取如彈丸一枚別搗甘遂末一錢

白蜜二合

水二升煮取一升溫頓服之一宿乃下如不下更服取

下為效

小陷胸湯 治病在心下按之則痛脈浮滑者

黃連一兩 半夏半升洗 括裏實大者

右三味以水六升先煮括裏取三升去滓納諸藥煮取二升去

滓分溫三服

白虎湯 治脈滑而厥裏有熱也 又治三陽合病腹滿身重譫語遺尿自汗出者

知母六兩 石膏碎一斤

甘草二兩

梗米六合

右四味以水一斗煮米熟湯成去滓溫服一升日三服

陽極於內發散則路
遠故從小便去之

麻黃附子細辛湯 治少陰始得病反發熱脈沉者

麻黃去節細辛各二兩

附子一枚泡去皮破八片

右三味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫納藥煮取三升

去滓溫服一升日三服

四逆散 治少陰傳經熱邪四逆或欬或悸或小便不利或腹中痛或泄利下重者

甘草炙

枳實火乾破水漬 柴胡

芍藥各十

右四味搗篩曰飲和服方寸匕日三服

欬者加五

味子乾薑各五分并主下痢 悸者加桂枝五分 小便不利者加茯苓五分 腹中痛者加附子一枚炮令拆 泄痢下重者先以五升煮薤白三升煮取三升去滓以散三方寸匕納湯中煮取一升半 分溫再服熱邪入深乃見四逆誤認為寒胎害匪細
薤白能治下重以能潤大腸之氣也

四逆湯

治脈沉體痛溫欲吐下利清穀手足厥冷內寒外熱脈微欲絕等證

甘草炙二兩 乾薑半兩 附子一枚生用去皮破入片 右三味㕮咀以水三升煮取一升二合去滓分溫再服強人可大附子一枚乾薑三兩四逆湯不可輕用一症不具即當細審必諸症皆全方可決用無疑

四逆加人參湯

治痢後亡血 本方加人參

通脈四逆湯

治下痢清穀脈絕汗出而厥 本方加乾薑一倍

通脈四逆加豬膽汁湯

治汗出而厥脈絕拘急 本方加豬膽汁

當歸四逆湯

治手足厥冷脈細欲絕脈浮革因而腸鳴者

當歸

桂枝 芍藥各三兩

細辛二兩 大棗二十枚

甘草

通草各二

右七味以水八升煮取

三升去滓溫服一升日三服

此四逆症乃從太陽誤下所致非厥陰少陰之四逆也故仍以桂枝湯為主

理中丸及湯

治霍亂頭暉發熱身疼痛寒多不用水者理中湯若大病瘥後喜唾久不了了胃上有寒

者用理中丸

人參

甘草炙

白朮

乾薑各三兩

右四味搗篩為末蜜丸如雞子黃大以沸湯數合和一

丸研碎溫服之日三服夜二服腹中未熱益至三四丸然不及湯湯法以四物依兩數切用水八升煮

取三升去滓溫服一升日三服

四逆乃溫下焦中焦之法理中為

溫上焦中焦之法各有部位也

附子瀉心湯

治心下痞而復惡寒汗出

大黃二兩黃連

黃芩各一兩附子一枚泡去皮

右四味切三味以麻沸湯二升瀆之須臾絞去

滓納附子汁分溫再服

治

上焦

附子能回陽止汗

梔子豉湯治汗吐下後虛煩不得眠及大下之後身熱未去心中結痛或微煩者

梔子一枚擘香豉四合

治

上焦

附子能回陽止汗

梔子一枚擘香豉四合

治

上焦

附子能回陽止汗

進一服得吐者止後服

治

上焦

附子能回陽止汗

真武湯治太陽汗出不解仍發熱心悸頭眩身瞶動振振欲倒地者

治

上焦

附子能回陽止汗

四肢沉重疼痛自下痢此為有水氣

茯苓芍藥

生薑

附子

白朮

二兩

附子一枚泡去

皮破八片

右五味以水八升煮取三升去滓溫服

七合日三服

此治水逆

若欬者加五味半升

細辛乾薑各一兩

若小便利者去茯苓

若下痢者

去芍藥加乾薑二兩

若嘔者去附子加生薑足前成半斤

去芍藥加乾薑二兩

若嘔者去附子加生薑足前成半斤

大黃連瀉心湯治傷寒脈浮緊而復下之緊反入裏則作痞按之自濡但氣痞耳此主之

大黃二兩黃連一兩

此治水逆

若嘔者加五味半升

細辛乾薑各一兩

若小便利者去大黃

若下痢者

去芍藥加乾薑二兩

若嘔者去附子加生薑足前成半斤

寫附子不煎以生用去

附子亦用生藥

此亦

白通湯治少陰下痢

葱白四莖乾薑一兩附子一枚生用去

皮破八片

右三味以水三升煮取一升去滓分溫再服

此治

寒痢

附子能回陽止汗

白通加豬膽汁方治服白通湯利不止汗出而厥逆無脈乾嘔而煩服湯後脈暴出者死微續者生

即白通湯煎成納人尿五合豬膽汁一合分溫再服

治

上焦

附子能回陽止汗

豬膾湯少陰病下痢咽痛胸滿心煩者此主之

豬膚一斤 右一味以水一斗煮取五升去滓加白蜜一升白粉五合熬膏和令相得溫分六服引

陰之虛
火下達

甘草湯桔梗湯 治少陰咽痛先與甘草湯不瘥與桔梗湯

甘草二兩

右一味以水二升煮減半去滓溫服七合日二服 桔梗湯加桔梗一兩煎法同此方制少

陰在上
之大

瓜蒂散 治太陽病胸中痞鞶氣上冲脚不得息此胸中有寒也又或手足厥冷脈乍緊心中煩滿不能食病在胸中並當吐之

瓜蒂熬 赤小豆一分 大蒜一錢 川椒一錢 甘草一錢 附子一枚 防風一錢 用熱湯七合煮作稀糜去滓取汁和散溫頓服之不吐者少少加得快吐乃止諸亡血虛家不可與之

麻黃升麻湯 治傷寒六七日大下後厥逆寸脈沉遲下部脈不至咽喉不补吐濃血泄利為難治主之

麻黃二兩半

升麻半錢

當歸各一兩

知母

黃芩

姜桂各八錢

石膏碎綿

白朮

乾薑

芍藥

天冬去心 桂枝

茯苓

甘草炙

大蒜

右十四味以水一斗先煮麻黃一兩沸去上沫約諸藥者取三升去滓分溫三服令汗出愈

旋覆代赭湯 治傷寒汗出吐下後心下痞鞶噫氣不除此主之

旋覆花

三兩 人參二兩 生薑五兩

半夏半升

代赭石一兩

大棗十二枚

甘草三兩

右七味以水一斗

煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服

苦酒湯 治少陰病咽中生瘡聲不出者

半夏洗破十枚

雞子去黃 苦酒著殼中

右二味納半夏著苦酒中以雞子殼置刀環中安火上令三沸去

滓少少含嚥之不差更作三劑服之

製法奇

枳實梔子散湯 治大病瘥後勞復

枳實三枚梔子十四枚擘散絲裹

右三味以清漿水七升空煮取四升納枳實梔子煮取二升下散更

煮五六沸去滓溫分再服覆令微似汗若有宿食者加大黃如博碁子大五六枚

大病後勞復庸醫必作虛治乃絕用降氣

清火之品當細參之

竹葉石膏湯

治傷寒解後虛羸少氣氣逆欲吐者

方見通治壯大食氣少氣者多屬大症

燒棍散

治陰陽易病其人身重少氣少腹裏急陰中拘攣熱上衝胸頭重不舉眼中生花膝脰拘急

右取婦人中棍近陰處剪燒灰以水和服方寸匕日三服小便即利陰頭微腫則愈婦人病取男子棍當燒灰

豬膽導法 以豬膽汁加醋納穀道中

蜜煎導法 以蜜煎老捏作指大一條納穀道中以手按之

右二方俱治傷寒大發汎小便利津液內竭大便雖軟不可攻之用此法

治男子新病起房內復者方針 取女人月經赤帛燒服方寸匕亦治陰卵腫縮入腹絞痛欲死

治交接勞復陰卵腫縮腹中絞痛便欲死方針 取所交接婦人衣服以覆男子立愈

竹皮湯外 治交接勞復卵腫腹痛便絕欲死

青竹皮一升 右一味水二升煮五六沸絞汁頓服立愈此方范汪亦治大便後勞復

療食勞方外 杏仁五十枚 右一味以酢二升煎取服之取汗則差

治結胸爻法本事

巴豆

十四 黃連七時連 皮肉

右搗細末用津唾和成膏填入臍心以艾灸其上腹中有聲其病去矣不拘壯數以病退為度經多便以溫湯浸手帕拭之恐生瘡也此法最穩又胸中病俱可依此法外治

鵝石散

林事 治傷寒發狂棄衣袴走踰牆上屋

黃連

活人

寒水石硝等 右為細末每服二錢濃煎甘草汁調服

鱉甲散

書人

治傷寒八九日不瘥名曰壞證傷寒不能治者宜此療之

升麻

黃杵碎半兩

前胡去蘆烏梅去核枳實熟炒犀角鋸右剉如麻豆大每服抄五錢以水一盞半煎至八分去滓溫服

升麻鱉甲湯

金匱

陽毒之為病面赤斑斑如錦文咽喉痛吐膿血五日可治七日不可治此湯主之

升麻

二兩

當歸一兩蜀椒炒去汗甘草二兩鱉甲手指大雄黃一片炙熟黃半兩

右六味以水四升煮取一升頓服之老小再服取汗

升麻鱉甲去雄黃蜀椒方

陰毒之為病面目青身痛如被杖咽喉痛五日可治七日不可治升麻鱉甲湯去雄黃蜀椒主之

肘後千金方陽毒用升麻湯無鱉甲有桂陰毒用甘草湯即本方無雄黃活人陽毒升麻湯用犀角射干黃芩人參無當歸蜀椒鱉甲雄黃蜀椒辛熱之品陽毒用而陰毒反去之

梔子仁湯

活人書

治陽毒傷寒壯熱百節疼痛

梔子仁一兩

柴胡半兩

升麻

黃芩

芍藥

二兩

大青

一兩

石膏

二兩

知母

一兩

甘草

半兩

梔子仁

一兩

升麻

黃芩

芍藥

二兩

杏仁

二兩

湯浸去皮尖及雙仁者炒微黃

右件

搗為粗末

每服抄四錢

以水一盞

入生薑半分

豆一百粒

煎至六

分去滓不計時候溫服

還陽湯

本事

治陰毒面色青四肢逆冷心燥腹痛用硫黃末新汲水調下良久或寒一起或熱一起

更看緊慢再服一二錢則為汗出差

姜桂湯活人書

治風溫兼癥冬溫及春月中風傷寒發熱頭眩痛喉乾舌強胸內疼瘡滿腰背強

姜桂

三分石膏一兩

杵碎白薇

麻黃一兩

乾秤川芎

葛根二兩

尤妙大羌活去蘆甘草矣

杏仁

去皮尖雙仁半兩

青木香一分冬一兩炒

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎一盞日三四服

此清散之劑
可治時疫

白虎加蒼朮湯活人方

本事治濕溫多汗

知母

五兩甘草

二兩石膏

一斤蒼朮

粳米各三兩

右為末每服四錢水一盞半煎至七分去滓

取汁溫服

黑膏活人書

治溫毒發斑

好致

一升生地黃切片

右二味以豬膏二斤合露之煎令三分減一絞去滓用雄黃麝香如意豆

者內中絞和盡服之

之毒便從皮中出則愈之不得其法所以或傳經或變病種種現症不可窮極以致

治法千端聚

云不息故仲景傷寒論治傷寒之正方不過數首餘皆誤治之變症故取治雜病之方隨

症辨療也

按傷寒為外感之總名傳變出入千頭萬緒仲景傷寒論一字不可遺漏今止舉六經本

精通之則

凡為外感之病游刃有餘矣故此集外感之方選錄甚少意有在也

百合病

金匱

論曰百合病者百脈一宗悉致其病也。意欲食復不能食常默然欲卧不能卧欲行不能行飲食或有美時或有不用聞食臭時如寒無寒如熱無熱口苦小便赤諸藥不能治得藥則劇吐利如有神靈者身形如和其脈微數每渴時頭痛者六十日乃愈若渴時頭不痛漸然者四十日愈若渴快然但頭眩者二十

日愈其證或未病而預見或病四五日而出或病二十日或一月微見者各隨證治之

百合病見於陰者以陽法救之見於陽者以陰法救之見陽攻陰復發其汗此為逆見陰攻陽乃復下之

此亦為逆

此等症病後得之者甚多醫者不知多方誤治以致病氣日深不可救療始終無一
人能識之者遍地皆然也

百脉一宗悉病蓋肺朝百脉故以百合治肺為主藥

百合病方

百合知母湯金匱

金匱

三兩

七枚

百合知母切

右先以水洗百合瀆一宿當白沫出去其水更以泉水二升煎取一升去滓

別以泉水二升煎取一升去滓後合和煎取

滑石代赭湯金匱

金匱

百合病下之後者主之

百合掌七枚滑石三兩碎代赭石如彈丸大一右先以水洗百合瀆一宿當白沫出去其水更以泉水二升煎取一升去滓別以泉水二升煎滑石代赭取一升去滓後合和煎取一升五合分溫服

百合雞子湯金匱

金匱

百合雞子湯後之者主之

百合掌七枚雞子黃一枚右先以水洗百合瀆一宿當白沫出去其水更以泉水二升煎取一升去滓內雞子黃搗碎煎五分溫服

百合地黃湯金匱

金匱

百合病不經吐下發汗形如初者主之

百合掌七枚生地黃汁一升

生地黃汁一升

右先以水洗百合瀆一宿當白沫出去其水更以泉水二升煎取一升去

去滓內地黃汁煎取一升五合分溫再服中病勿更服大便當如漆

百合洗方金匱

百合病一月不解寧成渴者主之

百合一升以水一斗瀆之一宿以洗身洗已食者餅勿以鹽敗也

桔萎牡蠣散金匱 百合病渴不差者主之。

桔萎根

牡蠣殼等

右為細末飲服方寸匕日三服。

百合滑石散匱 百合病變發熱者

一作發主之。寒熱

百合

一兩 滑石 三兩

右為散飲服方寸匕日三服當微利者止服熱則除

感冒方

附

九味羌活湯張元素方 四時發散

羌活

防風

川芎

白芷

細辛

蒼朮

黃芩

甘草

生地

右加生

薑三片

葱白三莖

水煎服

此方總之經方准生地不若易當歸為佳此方當因病之輕重加減故不為一定之數

敗毒散書人

治傷寒瘟疫風濕風眩拘踐風瘻頭痛目眩四肢痛憎寒壯熱項強睛疼

羌活

獨活

前胡

柴胡

川芎

枳殼

白茯苓

桔梗

人參

兩

甘草

五錢 炒爲細末

每服二錢水一盞入生薑三片煎七分溫服或沸湯點服

煩熱口渴加黃芩

參蘇飲湯

治感冒風寒頭痛發熱憎寒欬嗽涕唾稠黏胸膈滿悶脈弱無汗

人參

蘇葉

乾葛

前胡

陳皮

枳殼

茯苓

半夏

各八錢

桔梗

木香

甘草

各五錢

生薑五片大棗一枚右十三味水煎熱服取汗

以上三方乃感冒風寒之總法其病在皮毛肌肉之中未入經絡故不能傳變大設福散太陽陽明之風寒足矣其有食者則兼用消食之品可也此等症四時皆有南方最多

寒熱

靈素

靈口問篇帝曰人之振寒者何氣使然岐伯曰寒氣客於皮膚陰氣盛陽氣虛故為振寒寒慄

素逆調論黃帝問曰人身非常溫也。非常熱也。為之熱而煩滿者何也。岐伯對曰陰氣少而陽氣勝故熱。而煩滿也。帝曰人身非衣寒也。中非有寒氣也。寒從中生者何也。岐伯曰是人多脾氣也。陽氣少陰氣多故身寒如從水中出。帝曰人有四肢。熱逢風寒如火如大者何也。岐伯曰是人者陰氣虛陽氣盛。四肢者陽也。兩陽相得而陰氣虛少。少水不能滅盛火。而陽獨治獨治者不能生長也。獨勝而止耳。逢風寒如火如火者是人當肉燥也。帝曰人有身寒湯火不能熱厚衣不能溫然不凍慄是為何病。岐伯曰是人者素腎氣勝以水為事。太陽氣衰。腎脂枯不長。一水不能勝兩火。腎者水也。而生於骨。腎不生則髓不能滿。故寒甚至骨也。所以不能凍慄者。肝一陽也。心二陽也。腎孤臟也。一水不能勝二火。故不能凍慄。病名曰骨痺。是人當蠻節也。帝曰人之肉苛者。雖近於衣絮。猶尚苛也。是為何疾。岐伯曰榮氣虛衛氣實也。榮氣虛則不仁。衛氣虛則不用。榮衛俱虛則不仁且不用。內如故也。人身與志不相有曰死。

移熱移寒 素氣厥論黃帝問曰五臟六腑寒熱相移者何。岐伯曰。腎移寒於脾。癰腫少氣。脾移寒於肝。癰腫筋攣。肝移寒於心。狂隔中心移寒於肺。肺消飲一溲二死。不治。肺移寒於腎。為涌水。涌水者。按腹不堅水氣客於大腸。疾行則鳴。濯濯如囊裹漿水之病也。脾移熱於肝。則為驚。劙。肝移熱於心。則死。心移熱於肺。傳為鬲。消。肺移熱於腎。傳為柔瘻。腎移熱於脾。傳為虛。腸澼死不可治。胞移熱於膀胱。則癃溺血。膀胱移熱於小腸。鬲腸不便。上為口糜。小腸移熱於大腸。為虛瘕。為沉。大腸移熱於胃。善食而瘦。又謂之食。亦胃移熱於膽。亦曰食。亦膽移熱於腦。則卒頰鼻淵。鼻淵者。濁涕下不止也。傳為劗。瞤。瞑目。故得之氣厥也。

難經

寒熱之病候之如何也。然皮寒熱者。皮不可近席。毛髮焦。鼻臺不復汗。肌寒熱者。皮膚漏。唇口鼻淵無汗。骨

寒熱者病無所安。汗注不休。齒羣痛。陽維為病。苦寒熱。

傷寒論

病人身大熱反欲近衣者。熱在皮膚。寒在骨髓也。身大寒反不欲近衣者。寒在皮膚。熱在骨髓也。

此種寒熱既非感冒亦非傷寒。其淺深有皮膚骨髓之殊。其久暫有歲月之異。輕者有似感冒重者即變暑蒸。所以內經以後諸書寒熱自有方論。不入傷寒等法。大段以清營中之熱為主。其或有風有痰。有積有癥者。則隨症消息之可也。

寒熱方

四時加減柴胡湯

金匱

治五臟寒熱

柴胡

白朮各八分。大腹檳榔四枚。并陳皮五分。生薑五分。桔梗七分以上。冬三月。柴胡稍多。春三

月減白朮。增枳實。夏三月又增甘草。仍用枳實白朮。秋三月同冬三月。惟陳皮稍多。右各㕮咀。分為三貼。一貼以水三升。煮取二升。分溫三服。如人行四五里。進一服。渣再合煎一服。胡

寒熱變不能外柴胡。寒熱久者必有

積滯。半分錢。去聲。

二錢半為一分。

天行熱病

外臺

療天行三日外。至七日不歇。內薰令人更相染着。主大青消毒湯。

大青

四兩

香豉八合。熬乾葛

綿裹

梔子

略

生地

一升

芒硝

三兩

右六味切。以水五升。煮取二升。

半去滓。下芒硝分三服。

一方有石膏八兩。忌蕪荑熱麪酒蒜等物。

此方專清陽明之熱。

苦參湯

鉢

療天行熱病。五六日以上宜服。

苦參

三兩

黃芩二兩。生地黃八兩

右三味切。以水八升。煮取二升。去滓温服半升。日再服。忌蕪荑。

凝雪湯

鉢

療天行毒病。七八日熱積胸中。煩亂欲死。

芫花一升

右一味以水三升煮取一升半瀆故布薄胸上不過再三薄熱則除當溫四肢護厥逆

迦

按本草芫花能治
蠱毒消胸中痰水

大黃湯外臺

療天行五六日不解頭痛壯熱四肢煩渴不得飲食

大黃

胃黃連心肝黃柏腎梔子肺各半

右四味以水八升煮六七沸內煎一升葱白七莖煮取三

升

此二黃湯之變

能除六經之熱

升去滓分三服此許推然方神良又療傷寒已五天日頭痛壯熱四肢煩渴取汗並宜老小忌猪肉冷

水

此二黃湯之變
附轉筋

升去滓分三服此許推然方神良又療傷寒已五天日頭痛壯熱四肢煩渴取汗並宜老小忌猪肉冷

桃葉東身法外臺

水一石煮桃葉取七斗以薦席自圍衣被益上安桃湯於牀竇下取熱自重停少時當

雨汗

汗遍去湯待歇速粉之并灸大椎則愈

按寒熱之因千變萬殊有屬外感有屬內傷而外感內

有屬敗症不可勝舉其治法各詳於本病條

下當細審之此只錄時行熱病之數方耳

霍亂

附轉筋

傷寒論

問曰病有霍亂者何答曰嘔吐而利名曰霍亂問曰病發熱頭痛身疼寒吐利者此屬何病答曰此名霍亂自吐下又利止復更發熱也傷寒其脈微澀者本是霍亂今是傷寒卻四五日至陰經上轉入陰必利本嘔下利者不可治也欲似大便而反失氣仍不利者屬陽明也便必難十三日愈所以然者經盡故也下利後當便難則能食者愈今反不能食到後經中煩能食復過一經能食過之一日當愈不愈者不屬陽明也吐利發汗脈平小煩者以新虛不勝穀氣也

此霍亂是傷寒變症
附霍亂本症微別

病源

霍亂者由人溫涼不調陰陽清濁二氣有相干亂之時其亂在於腸胃之間者因遇飲食而變發則心腹

絞痛其有先心痛者則先吐先腹痛者則先利心腹並痛者則吐利俱發挾風而實者身發熱頭痛體疼而復吐利虛者但吐利心腹刺痛而已亦有飲酒食肉腥膾生冷過度因居處不節或露卧濕地或當風取涼而風冷之氣歸於三焦傳於脾胃脾胃得冷則不磨不磨則水穀不消化亦令清濁二氣相干脾胃虛弱便則吐利水穀不消則心腹脹滿皆成霍亂霍亂脈大可治微細不可治霍亂吐下脈微遲氣息劣口不欲言者不可治此霍亂之正病言之最詳乾霍亂者是太氣搏於腸胃致飲食不消但腹滿煩亂絞痛短氣也

霍亂轉筋方

按轉筋之病全屬有難屎白散一方附脚氣條下而轉筋之症不一有平時常轉筋者有

霍亂而轉筋者并有轉筋入腹者當用木瓜吳茱萸等藥及外治湯熨之法以備選擇

五苓散 霍亂頭痛發數多欲飲水者主之寒多不用水者理中丸主之

二方俱傷寒論見通治

理中丸

此是寒霍亂之方百不得一者也誤用者害不旋踵

加減法

若臍上築者腎氣動也去木加桂四兩

吐多去木加生薑三兩

下多者還用木

悸者

加茯苓二兩

渴欲得水者加木足前成四兩半

腹中痛者加人參足前成四兩半寒者加薑成四

兩半

腹滿者去木加附子一枚

服湯後如食噴

飲熱粥一升許

微自溫勿發揭衣服

霍亂轉筋入腹作極鹹鹽湯於糟中煖漬之則差

千金又方一升許

治霍亂轉筋兩臂及腳胸腸諸轉筋並主之

香薷一把水煮令極濃服二三升即差青木香亦佳

廣濟高良薑湯外

治霍亂轉筋入腹

高良薑四兩桂心四兩

右二味以水七升煮取二升去滓分三服

此亦治寒
霍亂之方

霍亂轉筋入腹方

外臺

木瓜子根皮合煎湯服之

茱萸湯

外臺

療霍亂轉筋止

吳茱萸一升

甘草一兩

乾薑略二

泡蓼子一把

亂髮燒兩桂心二兩

右六味以水七升煮取二升三

合去滓分溫三服

火法

外臺

以手拘所患脚大母指當脚心急筋上七壯 又灸當足大母指聚筋上七壯 又灸足大母

指下約中一壯 又灸湧泉入腹者灸脣左二寸十四壯

又灸股中大筋上陰一寸 轉筋四逆著

灸兩乳根黑際各一壯

轉筋欲死者灸脣上一寸十四壯

藿香正氣散

一元散

河間蘇合香丸

香薷飲

局方俱見通治

瘡

金匱

太陽病發熱無汗反惡寒者

名曰剛瘡

餘同一作瘡 太陽病發熱汗出而不惡寒名曰柔瘡

太陽病發熱汗出而不惡寒名曰柔瘡

太陽病發熱汗出而不惡寒名曰柔瘡

沉而細者名曰瘡為難治

太陽病發汗太多因致瘡

夫風病下之則瘡復發汗必拘急 瘡家雖身

疼不可發汗汗出則瘡

病者身熱足寒頭項強急惡寒時頭熱面赤目赤獨頭動搖卒口噤背反張者瘡也若發其汗者寒濕相得其表益虛即惡寒甚發其汗已其脈如蛇

暴腹脹大甚為欲解服如故反伏弦者瘡

夫瘡脈按之緊如弦直上下行

瘡病有矢瘡難治

太陽病甚瘡備身體強八八然

脈反沉遲止為瘡

太陽病無汗而小便反多氣上衝胸口噤不得語欲作剛瘡

瘡為病胸滿口噤臥不著席腳掣急少介齒

痘方

括薑桂枝湯

金匱

太陽病其症備身體強入然脈反沉遲此湯主之

括薑根

二兩

桂枝

一斤

芍藥

三兩

甘草

二兩

生薑

三兩

大棗

十二

右六味以水九升煮取三分

溫三服取微汗汗不出食頃啜熱粥法

麻黃加獨活防風湯

金匱

治癰瘡

麻黃

一斤

桂枝

四兩

芍藥

三兩

甘草

半兩

獨活

一兩

防風

一兩

右六味每服一兩水煎

靈素

病乃傷寒壞症小兒得之猶有愈者其餘則百難瘳其

實者或有因下而得生虛者竟無治法

金匱諸方見故絕少

葛根湯

金匱

大承氣湯

金匱

桂枝加葛湯

傷寒門

有干附見

小續命湯

見中風門

瘡閉利淋

靈素

靈本輸篇三焦手少陽之脈入絡膀胱約丁焦實則閉瘡虛則遺溺五味篇酸走筋多食之令人瘡

素宣明五氣論膀胱不利為癃不約為遺溺氣厥論胞移熱於膀胱則癃溺血骨空論督脈為病癃

痔遺溺

金匱

淋之為病小便如粟狀小腹急痛引脇中淋家不可發汗發汗則必便血熱在下焦者則尿血亦令淋祕不通小便不利者有水氣其人若渴

病源

石淋 淋而出石也腎主水水結則化為石

蘭臺軌範

卷三 痘 瘡閉利淋

氣淋 腎虛膀胱熱氣脹所為也

膏淋

淋而有肥狀似膏故謂之膏淋亦曰肉淋此腎虛不能制於肥液故與小便俱出也

勞淋

熱淋之其暑則尿血心主血血之行身遍經絡循環腑臟勞甚則散失其常經溢滲入胞而成血淋也

胞轉

其病狀態下急痛小便不通是也或因小便應下而強忍之或為寒熱所迫此二者俱合水氣還上氣於胞使胞屈別不得充張外水應入不得入內溲應出不得出外內相雍塞故令不通病至四五日乃有致死者飽食訖應小便而忍之或飽食訖而走馬或小便急疾走或忍水入房皆令胞轉或胞滯並致死數便為產絕便為胞轉

尿床 小便乃水液之餘從膀胱入於胞夜卧則陽氣衰伏不能制於陰所以陰氣獨發於眼睡不覺尿出也

癃閉利淋方

括囊瞿麥圓金匱 小便不利者有水氣其人苦渴此主之

括囊根

二兩 旋覆子三兩 薯蕷三兩 附子一枚 瞿麥一兩

右五味末之煉蜜丸梧子大飲服三丸日

三服不知增至七八丸以小便利腹中溫為知

滑石白魚散

金匱

主小便不利

滑石

二分 亂髮燒

二分 白魚

二分

右三味杵為散飲服半錢日三服

茯苓戎鹽湯

金匱

小便不利主之

茯苓半斤

白朮

二兩 戎鹽

九分 潶

右三味以水五升煮取三升溫三服

豬苓湯金匱

服浮發熱渴欲飲水小便不利者主之。

豬苓去皮

阿膠

滑石

澤瀉

右五味以水四升先煮四味取二升去滓內

膠烊溫服七合日三服

此蓄飲之症

治諸種淋方金匱

葵根八兩

茅根

石首魚頭口各三兩

宜用頭中骨甘草一兩通草二兩貝子五合天麻根五兩

右七味

㕮咀以水一斗二升煮取五升分五服日三夜二亦主石淋

治石淋尤切

石葦散針金匱

治血淋

石葦

當歸

蒲黃

芍藥

右四味各等分治下篩酒服方寸匕日三

胞轉方金匱

治丈夫女人胞轉不得小便八九日者

滑石一斤

寒冰石碎

葵子

一升

右三味以水一斗煮取五升盡服即利

療小便難方本事

治便難小腹脹不急治殺人

用葱白三斤細剉炒令熟以帕子裹分作二處更替運臍下即通

石葦散局方

治膀胱有熱淋湛不宣或尿如豆汁或便出砂石並治之

木通兩

石葦二兩

去毛滑石

白朮

瞿麥

芍藥

葵子各三兩

當歸

甘草

王不留行

右為細末每服二錢小麥湯調下食前日二三服

藕蜜煎書

治老人淋病小便不利痛閼之極

藕汁五合

白蜜五合

生地黃汁一升

右相和微火煎之令如餳空心含半匙漸漸下飲食忌熱食

炙肉此方亦治血淋

治石淋方千金翼

車前子二升。絹袋貼以水八升煮取三升。空腹頓服之。須臾當下石子。宿勿食。服之良。

治熱淋方千金翼

白茅根四斤以水一斗五升煮取五升。每服一升。日三夜一。

四汁飲 治熱淋小便赤澀疼痛。

葡萄取自生鷄取汁生地取汁白蜜各五合

右和勻先把一盞銀器石器內慢大熬沸不拘時溫服。

牛膝膏 治死血作淋

桃仁去皮尖歸尾各一牛膝四兩酒浸一兩赤芍

生地各兩半水十鐘微火煎至二碗入麝香少許分四

次空心服如夏月用涼水換此膏不壞。

八正散寶鑑 治諸淋

瞿麥 梔子 篓苗 大黃 滑石 木通 車前子 甘草各一錢 加燈心一

治小便失禁方千金

以水三升煮雞腸取一升分三服

家韭子丸

治遺溺及陽氣衰敗白濁遺精

家韭子炒大鹿茸四兩肉蓯蓉酒浸牛膝酒浸熟地

當歸各二錢巴戟兩半杜仲

石斛

桂心

乾薑兩一右為末酒糊丸桐子大每服五十丸加至百丸食前鹽湯溫酒任

下小兒遺尿者多因胞寒亦陽氣不足也別作小丸服夜多小便方千金翼 治膀胱冷故小便至夜獨多。

雞腸如食法

羊腎一具去脂並令乾

赤石脂六兩

龍骨三兩

肉蓯蓉四兩川蓮五兩

桂心二兩 右七味為

末。每服方寸匕。日二服。五日中作羊腎矣。一劑十日外作羊腎。香味如常食飽與之。

豬肚丸 治小腹頻數。

豬肚

一個蓮子去皮心焙乾為末。一升同煮一船。上茴香五錢破故紙水炒川棟子酒炒去核。一兩母丁香三兩加桑螵蛸。

一兩尤效。蜜丸梧子大。每服五十丸。空心溫酒送下。

縮泉丸 治脬氣不足。小便頻多。

烏藥

益智仁。砂等右二味為末。酒煮山藥糊丸如梧子大。每服五十丸。空心鹽湯送下。一方有

治尿床針

取雞肚腔一具。并腸燒末酒服。男雌女雄。


威喜丸

見通水腫。一升同煮一船。上茴香五錢破故紙水炒川棟子酒炒去核。一兩母丁香三兩加桑螵蛸。

龍腦雞蘇丸

合五林。治

蘭臺軌範卷二終



487378A
1907
V.6