

徐氏醫學十六種


7

正

Chinese

Vol. VII.

7



蘭臺軌範卷四

吳江徐靈胎洞溪著

濕

金匱

太陽病關節皮痛而煩。服沈而細者。此名濕痺。濕痺之候。小便不利。大便反快。但當利其小便。濕家之為病。一身盡疼。發熱。身色如董黃也。此黃與黃。痘各別。濕家其人。但頭汗出。背強。欲得被覆向大。若下之早。則噦或胸滿。小便不利。舌上如胎者。以丹田有熱。胸上有寒。渴欲得飲而不能飲。則口燥煩也。濕家下之後。頭上汗出。微喘。小便利者死。若下利不止者亦死。風濕相搏。一身盡疼。痛法當汗出而解。值天陰雨不止。醫云。此可發汗。汗之病不愈者何也。蓋發其汗。汗大出者。但風氣去。濕氣在。是故不愈也。若治風濕者。發其汗。但微微欲出汗者。風濕俱去也。濕家病日久。發熱。面黃而喘。頭痛。鼻塞而煩。其脈大。自能飲食。腹中和無病。病在頭中寒濕。故鼻塞。納藥鼻中則愈。納鼻之藥。金匱未載。俟廣求其法。以補之。亦不過牙皂灰蒂之類。

濕方

麻黃加木湯金匱

濕家身煩疼。可與麻黃加木湯發其汗。為宜慎。不可以大攻之。

麻黃三兩

去節桂枝

二兩去皮甘草

一兩杏仁

七十個去皮尖

白朮四兩

右五味以水九升先煮麻黃減二升去上

沫。納諸藥者。取二升半去滓。溫服八合。覆取微似汗。

此濕家發汗之主方。

防己苗蕎湯金匱

風濕脈浮身重。汗出惡風者。此湯主之。

防己一兩

甘草炒半兩

白朮七錢

蕎蕎一兩一分去蘆

葛根去風蕎蕎主之

右剉麻豆大。每抄五錢。生薑四片。大棗一

枚。水盞半煎八分。去滓溫服。良久再服。

喘者加麻黃半兩。胃中不和者。加芍藥三分。氣上衝者。

加桂枝三分。下有陳寒者加細辛三分。服後當如蟲行皮中從腰下如冰後坐被上又以一被繞腰下溫令微汗差。

麻黃杏仁薏苡甘草湯金匱 病者一身盡疼發熱日晡所劇者名風濕此病傷於汗出當風或久傷取冷所致也。

麻黃半兩去節泡湯甘草一兩去節杏仁半兩去皮尖炒右剉麻豆大每服四錢水一盞半煮八分去滓溫服有微汗避風。

桂枝附子湯金匱 傷寒八九日風濕相搏身體疼痛不能自轉側不嘔不渴脈浮虛而濶者桂枝附子湯主之若大便堅小便自利者去桂加白朮湯主之。

桂枝四兩去皮生薑切附子三兩皮破八片甘草二兩去節泡湯大棗十二枚擘右五味以水六升煮取二升去滓分溫三服

白朮附子湯金匱

白朮二兩附子一枚半去皮泡湯甘草一兩生薑半切大棗六枚右五味以水三升煮取一升去滓分溫三服。一服覺身瘦半日許再服三服多盡其人如冒狀勿怪即是朮附並走皮中逐水氣未得除故耳。甘草附子湯金匱 風濕相搏骨節疼痛掣痛不得屈伸近之則痛劇汗出短氣小便不利惡風不欲去衣或身微腫者此湯主之。

甘草二兩附子一枚去皮泡湯白朮二兩桂枝四兩去皮右四味以水六升煮取三升去滓溫服一升日三服初服得微汗則解能食汗出復煩者服五合恐一升多者服六七合為妙此風濕而兼寒者二妙散治筋骨疼痛因濕熱者如有氣加氣藥如血虛加血藥如痛甚以薑汁熱辣服之

黃柏炒 蒼朮炒去皮

右為末生薑研沸湯調服。如表實氣實者少酒佐之。在表之濕當燥之。在裏

不外乎此

黑地黃丸渺湖

喝

金匱

太陽中暍發熱惡寒身重而疼痛其脈弦細芤遲小便已灑灑然毛聳手足逆冷小有勞身即熱口開前板齒燥若發其汗則惡寒甚加溫針則發熱甚若下之則淋甚此中暑病象如霍亂者不同當別之

喝方

白虎人參湯

太陽中熱者暍是也汗出惡寒身熱而渴此湯主之。

知母六兩石膏一斤甘草二兩粳米六合人參三兩

右五味以水一斗煮米熟湯成大滓溫服一

升日三服

熱入裏則外遇寒清裏熱則惡寒自解然亦須詳審有表無表方為精密况凡屬汗出多之病無不遇寒者以其遇寒汗出而誤認為寒用大順散等熱劑則立危矣

一物瓜蒂散

金匱太陽中暍身熱疼痛而脈微弱此以夏月傷冷水水行皮中所致也。

瓜蒂二十個

右剉以水一升煮取五合去滓頓服

此方服之當吐

香薷飲

治暑熱乘涼飲冷陽氣為陰邪所遏頭痛發熱惡寒煩躁口渴腹滿吐瀉者。

香薷一斤厚朴

薑汁炒各半斤

右水煎浸冷服

此治時行暑病之主方

其

分兩則五錢至一兩止

十味香薷飲

即前方加人參甘草黃耆木瓜陳皮白朮茯苓

黃連香薷飲

即香薷飲加黃連

四兩薑汁同炒黃色

枇杷散

局治中暑伏熱煩渴引飲嘔逆惡心頭目眩暈。

蘭臺軌範

卷四 濕暬 痘瘍

枇杷葉

陳皮

丁香

厚朴各五錢

白茅根

麥冬

木瓜

甘草

炙各一兩

香茹七錢

一兩半

右為末。每二錢薑三片。煎湯調服。溫服亦可。如煩躁。井水調下。小兒三歲以下。服五分量。大小加減。

蟾酥九分

茅术

雄黃

辰砂

五錢

鹿角香

一錢

丁香

牙兒各三錢

蟾酥

五錢

右用大酒化

蟾酥打九

如鳳仙子

大辰砂

為衣

故吉底化下

重者二三丸

千金丹

祕方即人

平安散

麝香

冰片

各二錢

硃砂

五錢

雄黃

硼砂

硝各一錢

金箔

一百張或

牛黃

右七味為末

或水服

又刮痧法

用薄錢釀香油。刮胸背及臂股灣。令色紫疼起為度。或用婦人縛髮油。繩醣油刮亦可。

紫金錠

蘇合丸

橘香

正氣散

劫

生脈飲

六一散

以上俱見通治

瘧瘧

素問

瘧論黃帝問曰。夫瘧瘧皆生於風。其發作有時者。何也。岐伯曰。瘧之始發也。先起於毫毛。伸久乃作寒慄。鼓頭。腰脊俱痛。寒去則內外皆熱。頭痛如破。渴欲冷飲。帝曰。何氣使然。岐伯曰。陰陽上下交爭。虛實更作。陰陽相移也。陽井於陰。則陰實而陽虛。陽明虛。則寒慄鼓頭也。巨陽虛。則腰背頭項痛。三陽俱虛。則陰氣勝。陰氣勝。則骨寒而痛。寒生於內。故中外皆寒。陽盛。則外熱。陰虛。則內熱。外內皆熱。則喘而渴。故欲冷飲也。此皆得之。夏傷於暑。熱氣盛。藏於皮膚之內。腸胃之外。此榮氣之所舍也。此令人汗孔疎。腠理開。因得秋氣汗出遇風。及得之以浴。水氣含於皮膚之內。與衛氣并居。衛氣者。晝日行於陽。夜行於陰。此氣得陽。

而外出得陰而內薄。內外相薄是以日作。帝曰其間日作者何也。岐伯曰其氣之舍深內薄於陰陽氣獨發。陰邪內著。陰與陽爭不得出。是以間日而作也。帝曰其作日晏與日早者何氣使然。岐伯曰邪氣客於風府。循督而下。衛氣一日一夜大會於風府。其明日日下一節。故其作也晏。此先客於脊背也。每至於風府。則腠理開。腠理開則邪氣入。邪氣入則病作。以此日作。稍稍益晏。其出於風府日下一節。二十五日。下至脈骨。二十六日。入於脊內。注於伏督之內。其氣上行。九日出於缺盆之中。其氣日高。故作日益早。其間日發者。由邪氣內薄於五臟。橫連募原。其道遠。其氣深。其行遲。不能與衛氣俱行。不得皆出。故間日乃作也。帝曰夫子言衛氣每至於風府。腠理乃發。發則邪氣入。入則病作。今衛氣日下一節。其氣之發也不當風府。其日作者奈何。岐伯曰此邪氣客於頭項。循督而下者也。故虛實不同。邪中異所。則不得當其風府也。故邪中於頭項氣至頭項。而病中於背。氣至背。而病中於腰脊。氣至腰脊。而病中於手足。氣至手足。而病衛氣之所在。與邪氣相合。則病作。故風無常府。衛氣之所發必開其腠理。邪氣之所合。則其府也。帝曰善。夫風之與瘧也相似同類。而風獨常在瘧得有時而休者。何也。岐伯曰風氣留其處。故常在。瘧氣隨經絡沈以內薄。故衛氣應乃作。帝曰瘧先寒而後熱者何也。岐伯曰夏傷於大暑。其汗大出。腠理開發。因遇夏氣。淒滄之水。寒藏於腠理皮膚之中。秋傷於風。則病成寒夾寒者。陰氣也。風者陽氣也。先傷於寒而後傷於風。故先寒而後熱。病以時作。名曰寒瘞。帝曰先熱而後寒者何也。岐伯曰此先傷於風而後傷於寒。故先熱而後寒。亦以時作。名曰溫瘞。其但熱而不寒者。陰氣先絕。陽氣獨發。則少氣煩冤。手足熱而欲嘔。名曰瘧瘈。內經之文亦論其理。如此其實病變不同。不可執一而論。此等極多不獨論。瘧為然。故學者當以意會也。岐伯曰瘧之且發也。陰陽之且移也。必從四末始也。陽已傷陰從之。故先其時堅束其處。令邪氣不得入。陰氣不得出。審候見之在孫絡盛堅而血者。皆取之。此真往而未得井者也。帝曰時有間二日。或至數日發。或渴或不渴。其故何也。岐伯曰其間日

者邪氣與衛氣客於六腑而有時相失不能相得故休數日乃作也。其以秋病者寒甚以冬病者寒不甚以春病者惡風以夏病者多汗瘧脈緩大虛便宜用藥不宜用鍼凡治瘧先發如食頃乃可以治過之則失時也諸瘧而脈不見刺十指間出血血去必已先視身之赤如小豆者盡取之。瘧疾藥當在未來  
簡易可學不必習針法皆能之亦治瘧之要訣也

風瘧瘧瘧同素生氣通天論魄汗未盡形弱而氣燦穴輸以閉發為風瘧又云夏傷於暑秋為瘧瘧二日一發者為非瘧可知

似瘧素生真要大論帝曰火熱復惡寒發熱如有瘧狀或一日發或間數日發其故何也岐伯曰勝復之氣會合之時有多少也陰氣多而陽氣少則其發日遠陽氣多而陰氣少則其發日近此勝復相搏盛衰之節瘧亦同法瘧亦同法則

### 金匱

師曰瘧脈自弦弦數者多熱弦遲者多寒弦緊者下之差弦遲者可溫之弦緊者可發汗針灸也浮大者可吐之弦數者風發也以飲食消其止之但熱不寒者邪氣內藏於心外舍分肉之間令人消爛肌肉  
牡瘧瘧多寒者名曰牡瘧似當作牝字諸本皆作牡存考

### 瘧方

鼈甲煎丸金匱病瘧以月一日發當以十五日愈設不差當月盡解若其不差當云何師曰此結為癥瘕名曰瘧母急治之宜此方

鼈甲分火烏扇三分黃芩三分柴胡六分鼠婦一分乾薑三分大黃三分芍藥五分桂枝

草薢八分石韋三分厚朴三分牡丹皮五分瞿麥二分紫葳三分半夏一分人參一分蠻蟲五分

阿膠三分 蜂巢四分 赤消分三錢 蝙蝠六分 桃仁二分 右二十三味為末取煅蜜下灰一斗 清酒一斛五斗 浸灰候酒盡一半 著鼈甲於中 煮令泛爛如膠漆 紹取汁納諸藥煎為丸如梧子大 空心服七丸日三服

白虎加桂枝湯

金匱

溫瘧者 其脈如平 身無寒但熱骨節皮膚時吐此湯主之

知母六兩

甘草二兩

芍藥一斤

石膏二兩

粳米一斤

桂枝三兩

去皮右剉

每五錢水一盞半煮至八分去滓溫服

汗出則

瘧久先熱後寒為溫瘧但熱不寒為寒瘧

金匱

瘧久則熱不寒為寒瘧

蜀漆散

金匱

瘧多寒者名曰牡瘧此湯主之

作牡宜

蜀漆洗去雲母

燒二分日夜龍骨等分

右三味杵為散未發前以漿水服半錢

七

溫瘧加蜀漆半分臨

發時服一錢七

柴胡去半夏加栝蔞湯

金匱

治瘧病發渴者亦治勞瘧

柴胡八兩

人參

黃芩

甘草略

三兩

栝蔞根四兩

生薑二兩

大棗十二枚

右七味以水一斗二

升煮取六升去滓煎取三升溫服一升日二服

柴胡桂薑湯

金匱

治瘧寒多微有熱或但寒不熱

柴胡半斤

桂枝三兩

去皮乾薑二兩

括蔞根四兩

黃芩三兩

牡蠣二兩

石膏二兩

甘草二兩

右七味以水一斗二

升煮取六升去滓再煎取三升日三服初服微煩復服汗出便愈

蜀漆九針

主瘧瘧連年不差服三七日定差方

蜀漆

知母

白薇

地骨皮

麥門冬去心

升麻各五分

恒山一兩

石膏二兩

香附一合

姜蕤

烏梅肉

鼈甲

甘草各一兩

右十三味搗篩為末

煉蜜和丸如桐子大空腹飲服

十九日再加至二三十九日此方治三瘡為宜

陵鯉湯金 主瘡疾江南瘡瘍方

陵鯉甲一枚去烏賊魚骨

附子一枚泡各一兩

恒山三兩 右五味㕮咀以酒三升漬一宿未發前稍稍

啜之勿絕吐之并塗五心一日斷食過時久乃食

用生藥探吐法

瘡瘍病醫不能救者方千金翼 外治截瘍法以繩量病人脚圍繞足跟及五指一匝詎截斷繩取所量繩置項上著反向背上當繩頭處中脊骨上灸三十壯則定候看復惡寒急灸三十壯則定候主遍發一吹久候之雖飢勿與食盡日此神驗男左足女右足

瘡瘍常山湯外吐法

常山三兩

右一味切以漿水三升浸經一宿煎取一升欲發前頓服之後微吐差止忌生葱生菜

牡蠣湯外治牡瘍

牡蠣四兩

麻黃四兩去節甘草

二兩蜀漆二兩

右四味以水八升先煮蜀漆麻黃去上沫得六升納諸

藥煮取二升溫服一升若吐則勿更服

清脾湯生齊 治熱多陽瘍

青皮 厚朴

柴胡 黃芩 半夏 甘草 茶芩 白朮 草果 煙

味加薑三片水煎服

常山飲局方 治瘧瘍

常山大酒

知母 貝母 草果 檳榔

烏梅三個 右六味加薑夏苓瘧未發時面東

溫服

烏梅引子

療溫瘧勞瘧

烏梅

七個 桃柳心

各七莖

葱白

七莖

豆豉

一合

甘草

四分

知母

四分

大黃

三分

右八味各

細剉

以童子小便兩茶杯宿浸明日早煎三二沸去滓頓服

差未差更作服

三服永差忌海藻菘菜

集驗瘧必從四肢始療方先其時一日噴用細左索繩緊束其手足十指過發時乃解之

此即內經之法

四獸湯

治食瘧諸瘧和胃消痰

半夏

人參

茯苓

白朮

橘紅

草果

生薑

烏梅

大棗

甘草

各等分

右以鹽少許淹食項濕紙厚裏

慢火煨香熱每服四錢溫服

小柴胡湯

見傷寒

治瘧之法不外諸方惟三日瘧則煎劑不能取效宜病日用煎方以驅邪餘兩日用溫

補以扶元氣又加避風靜養則庶幾矣

痢

素問

通評虛實論帝曰腸澼便血何如岐伯曰身熱則死寒則生帝曰腸澼下白沫何如岐伯曰脈沈則生脈浮則死帝曰腸澼下膿何如岐伯曰脈懸絕則死滑大則生帝曰腸澼之屬身不熱脈不懸絕何如岐伯曰滑大者曰生懸濶者曰死以臟期之氣厥論腎移熱於脾傳為虛腸澼死不可治大奇論腎脈小搏沈為腸澼下血溫身熱者死心肝澼亦下血二臟同病者可治其脈小沈濶為腸澼其身熱者死太陰陽明論犯賊風虛邪陽受之飲食不節起居不時者陰受之陽受之則入大腑陰受之則入五臟六腑則身熱不時卧上為喘呼入五臟則填滿閉塞下為飧泄久為腸澼比俗所謂腸紅病也

金匱

六腑氣絕於外者手足寒上氣脚縮五臟氣絕於內者痢不築下甚者手足不仁。下痢脈沈弦者下重脈大者為未止脈微弱數者為欲自止雖發熱不死。下痢手足厥冷無脈者灸之不溫若脈不還反微喘者死少陰負趺陽者為順也。下痢有微熱而渴脈弱者令自愈下痢渴者自愈以陽氣復而寒邪去也。下痢脈數有微熱汗出令自愈設脈緊為未解。下痢脈數而渴者令自愈設不差必清膿血以有熱故也。下痢氣者當利其小便。下痢清穀不可攻其表汗出必脹滿。下痢脈沈而遲其人面少赤身有微熱下痢清穀者必鬱冒汗出而解病人必微厥所以然者其面帶陽下虛故也。下痢後脈絕手足厥冷時脈還手足溫者生不還者死。下痢腹脹滿身體疼痛者先溫其裏乃攻其表以上諸證皆屬陰寒之痢也治法大相懸殊

病源

痢而赤白者是熱乘於皿皿於腸內則赤也冷氣入腸搏腸間津液凝滯則白也冷熱相交故亦白相雜重者狀如膿涕而血雜之輕者白膿上有赤脈薄血狀如魚脂腦世謂魚腦痢也。血痢者熱毒折於血入大腸故也。休息痢者胃腑有停飲因痢積久或冷氣或熱氣乘之氣動於飲則飲動而腸虛受之故為痢也。痢如膏由臟腑虛冷氣入於大腸成痢冷氣積腸又虛滑脂凝如膏也。蠭蛭痢毒氣侵於臟腑如病蠭蛭之家痢血雜膿瘀黑有片如雞肝與血俱下是也。雜痢謂痢色無定或水穀或膿血或青或黃或赤或白變雜無常或雜色相兼而痢也挾熱則黃亦熱甚則變膿血也冷則白冷甚則青黑皆由飲食不節冷熱不調胃氣虛故變易。

痢方

桃花湯

金匱下痢便膿血者此湯主之

赤石脂

一斤半 砂末

乾糞

一兩 穗米

一升

右三味以水七升煮米令熟去滓溫服七合納赤石脂

末方寸匕日三服。若一服愈，餘勿服。此滑胎下焦

白頭翁湯金匱 熬剝下重者。此湯主之。

白頭翁

黃連

黃柏

秦皮

各三錢。右四味以水七升煮取二升去滓溫服一升。不愈再服。

紫參湯金匱

下痢肺痛此湯主之。

紫參半斤

甘草三兩

右二味以水五升先煮紫參納甘草煮取一升半分溫三服。

紫參凝即燭上染紅色者

訶梨勒散金匱 治氣痢

訶梨勒火根 右一味為散粥飲和頓服。

甘草瀉心湯傷寒論

傷寒中風醫反下之其人下痢日數行穀不化腹中雷鳴心下痞鞭而滿乾嘔心煩

不得安此湯主之。

甘草四兩

黃芩

乾薑各三錢半夏半升黃連一兩

大棗十二枚

右六味以水一斗煮取六升去滓

再煎取三升溫服一升日三服。

此治上焦不和之痢

黃芩湯傷寒論

太陽與少陽合病自下痢者與黃芩湯若嘔者黃芩加半夏生薑湯若傷寒本自寒下

醫復吐下之寒格更逆吐下若食入口即吐乾薑黃連黃芩人參湯主之。

黃芩三兩

甘草

芍藥各二兩

大棗十二枚

右四味以水一斗煮取三升去滓溫服一升日再夜一

服此熱痢

之主方

黃芩加半夏生薑湯傷寒論

即前方加半夏半升生薑三兩

煎服法同

乾薑黃連黃芩人參湯傷寒論

即前方加半夏半升生薑三兩

煎服法同

乾薑

黃連

黃芩

人參各三錢

右四味以水六升煮取二升分溫再服。

寫公湯以下四方皆以黃芩為

主而因證加減此  
病疾之正方也

赤石脂禹餘糧湯傷寒論 傷寒服湯藥下痢不止心下痞硬服瀉心湯已復以他藥下之。痢不止醫以理中湯與之。痢益甚理中者理中焦此痢在下焦此湯主之。

赤石脂碎禹餘糧碎各一斤以上二味以水六升煮取二升去滓三服下焦乃大腸之底也

雄黃丸 夷堅甲志云昔虞丞相自渠州被召途中冒暑得疾泄瀉連月夢壁間有韻語方一紙讀之數遍其詞曰毒暑在脾濕氣連脚不泄則痢不痢則瘡獨煉雄黃蒸餅和藥甘草作湯服之安樂別作治瘡醫家大鑑如方製藥服之遂愈此方治暑毒痢

柴胡加芒硝湯傷寒論 治傷寒胸滿而嘔日晡所發潮熱已而微寒先以小柴胡解外後以此主之 即柴胡湯方加芒硝二兩右先煮柴胡湯去滓納芒硝分溫再服不解更作

瓜薑散 治五色痢久不愈者

瓜薑一個以炭火煨存性蓋地上出火毒 右研細溫酒服盡

療熱毒痢血片臍下絞刺痛方臺

升麻 地榆 苗草 黃連各六分犀角四分生地八分梔子 雜白 香豉各二 右

九味水六升煮取一升五合分溫三服日再此血痢之主方

主赤白痢方外臺

黃連二兩阿膠四片右二味以酒二升合黃連煎十五沸去滓然後納阿膠令烊溫服三升此治血痢

療五疳蒸下痢方臺外

苦參 青葙 甘草各三兩右三味以水四升煮取二升半分三灌即愈凡蒸但服地汁即差。

此兼治蟲

薤白湯

書人

傷寒下痢如爛肉汁。赤白帶下。伏氣腹痛諸熱毒並皆治之。

政綿裹薤白一把。梔子者破之。右剉如麻豆大。以水二升半先煮梔子十沸。下薤白煎至二升許。下政煎取一升二合。去滓每服一湯盞。

訶梨勒丸

局方 治腸胃積寒久痢純白或有青黑日夜無度。

肉豆蔻

去皮 木香 乾薑

泡各二兩

縮砂仁

訶梨勒皮 川烏頭

泡去皮

白礬

煅各二分

龍骨

洗

赤石脂

各八兩

右為末用粟米飯為丸如梧子大每服二十九丸至三十九溫粟米飲下食前服甚者

可倍加丸數

此溫清之藥

葛根湯

葛根黃芩黃連湯

當歸四逆湯 大承氣湯 小承氣湯 四逆散

四逆湯

白通加猪膽汁湯 白通湯 四逆加人參湯 通脈四逆湯

豬膚湯

陽毒升麻湯

以上十三方見傷寒門 生薑瀉心湯

見溫清門

烏梅丸

方見通治

威喜丸

方見溫清門

感應丸

癲狂癇

靈素

靈癲狂篇。狂始生先自悲也。喜忘苦怒善恐者得之憂飢。狂始發少卧不飢自高賢也。自辯智也。自尊貴也。善罵詈日夜不休。狂言驚喜笑好歌舞忘行不休者得之大恐。狂目妄見耳妄聞善呼者少氣之。所生也。狂者多食。喜見鬼神。善笑而不發於外者得之有口大喜。

骨癲

靈癲狂篇。骨癲疾者頤齒諸脣分肉皆滿而骨居汗出煩澀嘔多沫沫氣下泄不治。

筋癲疾

靈癲狂篇。筋癲疾者身倦懶急嘔多沫沫氣下泄不治。

脈癲疾 灵癲狂篇脈癲疾者暴作四肢之脈皆脹而縱脈滿盡刺之出血嘔多沃沫氣下泄不治

素生氣通天論陰不勝其陽則脈流薄疾升乃狂 宣明五氣論五邪所亂邪入於陽則狂 調經論血升於陰氣升於陽故為驚狂 至真要大論諸躁狂越皆屬於火 通評虛實論帝曰癲疾何如岐伯曰脈搏大滑久自己脈小堅急死不治帝曰癲疾之脈虛實何如岐伯曰虛則可治實則死 陽明脈解篇岐伯曰四肢者諸陽之本陽盛則四支實實則能登高也帝曰其棄衣而走者何也岐伯曰熱盛於身故棄衣欲走也帝曰甚妄言罵詈不避親疎而歌者何也岐伯曰陽盛則使人妄言罵詈不避親疎而不欲食不欲食故妄走也

陽厥怒狂 素病能論帝曰有病怒狂者此病安生岐伯曰陽氣者因暴折而難決故善怒也病名曰陽厥帝曰治之奈何岐伯曰奪其食即止使之服以生鐵洛為飲夫生鐵洛飲者下氣疾也

胎病 素奇病論帝曰人生而有病癲疾者病名曰何安所得之岐伯曰病名為胎病此得之在母腹中時其母有所大驚氣上而不下精氣并居故令子發為癲疾也

難經

癲疾始發意不樂僵仆直視其脈三部陰陽俱盛是也 重陽者狂重陰者癲

病源

風癲 風癲者由氣血虛邪入於陰經故也又人在胎其母卒大驚精氣并居令子發癲其發則仆地吐涎沫無所覺是也此俗名羊癲瘋

五癲 五癲者一曰陽癲發如死人遺尿食頃乃解二曰陰癲初生小時脣瘡未愈數洗浴因此得之三曰風癲發時眼目相引牽縱反強羊鳴食頃方解四曰濕癲眉頭痛身重坐熱沐頭濕結腦肺未止得之

五曰馬癲發作時時反目口噤手足相引身體皆然

鬼魅 凡人有為鬼物所魅則好悲而心自動或心亂如醉狂言驚怖向壁悲啼夢寤喜驚或與鬼神交通病苦乍寒乍熱心腹滿短氣不能飲食此魅之所持也 十歲以上為癲十歲以下為癪大體不外三種風驚食是也

千金

驚癪 痘分心肝脾肺腎膈腸之病及馬牛羊猪犬雞之別

其象各有所似

癲狂方

生鐵洛為飲

素問

生鐵洛即爐冶間錠落之鐵屑用水研浸可以為飲其屬金其氣寒而重最能墜熱開結平水火之邪故可以下氣疾除狂怒也 凡藥中用鐵精鐵華粉鐵砂鐵锈水之類皆同此意此治怒狂之方

桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯

傷寒論

治傷寒脈浮醫以大追劫之亡陽必驚狂起卧不安者

即桂枝湯去芍藥加蜀漆

三兩洗去腥

牡蠣

五兩

龍骨

四兩

右七味以水一斗煮取二升先煮蜀漆納

諸藥煮取二升去渣溫服一升

柴胡加龍骨牡蠣湯

傷寒論

治傷寒下之驚煩小便不利譛語身重不能轉側此湯主之

柴胡

龍骨

人參

茯苓

鉛丹

黃芩

桂枝

酸半夏

二合

大黃

二兩

牡蠣

一兩

生薑

半兩

大棗

六枚

右十二味以水八升煮取四升納大黃更煮去滓溫服一升

治癲狂百病

千金翼

大麻子

四升上好者

以水六升煮令芽生去滓煎取二升空腹頓服或多言語勿怪但使人摩手足

奇效法

良岩子散

臺

猪卵

一百日具陰乾良岩子三斤牛黃八分鯉魚膽五分桂心一兩

右五味以清酒一升清良岩子暴

令乾盡酒止搗合下飾酒服五分日再當醉不知稍增

抱膽丸

機治一切癲癇風狂或因驚恐怖畏所致及婦人產後血虛驚氣入心并室女經脈通行驚邪

蘊結

水銀

硃砂

細研各黑鉛二兩

乳香一兩

右將黑鉛入銚子內下水銀結成砂子次下硃砂乳香。

乘熱用柳木搘研勻丸雞豆大每服一丸井花水吞下病者得卧切莫驚動覺來即安再服一丸除根。琥珀壽星丸

局方

治心膽被驚神不守舍或痰迷心竅恍惚健忘妄言妄見。

天南星

半斤

燒將南星趁熱

下坑深二尺用炭火五升於坑內燒紅取出炭

掃淨用好酒一斤

琥珀四兩

另研硃砂研飛

右和猪心血三個生薑汁打麪糊攬令稠粘

將心血和入藥末丸如桐子大每服五十丸煎

人參湯下日三

控涎丹

方

治諸癇久不愈頑涎聚散無時變生諸證。

川烏

用生半夏湯洗白殼

蠶炒各半兩

薑汁浸一宿

鐵粉研三錢

全蟬

甘遂各二錢

半錢

右為細末

生薑自

然汁為丸如棗豆大硃砂為衣每服十五丸食後生薑湯下忌食甘草。

獨效苦丁香散

治忽患心疾癲狂不止得之驚憂

痰氣上犯心包

當治其源

以苦丁香即公蒂半兩為末每服一錢

井花水調滿盞投之得大吐熟睡勿令人驚起。

甘遂散

方

治癲狂及婦女心風血邪。

甘遂末一錢用猪心取三管血三條和甘遂多少和之

將心批作二片入藥在內合之

綿繩外用皮紙

裏濕慢大煨熟勿令焦。取藥細研，研入辰砂末一錢和勻。令作四丸。每服一丸，將所煨猪心煎湯化下。

再服用別猪心。過半日，大便下惡物。後服調和胃氣丸。此病乍作乍醒者，甦不食迷癡者，不治。

苦參丸

外臺

治狂邪發惡或披頭大叫欲殺人。不避水火。以苦參為末，蜜丸桐子大。每服十九薄荷湯下。

礞石滾痰丸

養生蘇合香丸局方主論

至寶丹

以上三方俱見通治

按礞石一證其輕者不拘何方可愈重者必用

煅礞石方僅能有效

痰飲

金匱

問夫飲有四。何謂也？師曰：有痰飲、有懸飲、有溢飲、有支飲。問曰：何以異？師曰：其人素盛今瘦。水走腸間，滙瀝有聲。謂之痰飲。飲後水流在腸下，欬唾引痛。謂之懸飲。飲水流行，歸於四肢。當汗出而不汗出，身體疼重。謂之溢飲。欬逆倚息，氣短不得卧。其形如腫。謂之支飲。水在肝、腸下，支滿而痛。水在心、心下，堅築，短氣惡水，不得飲。水在肺，吐涎沫，欲飲水。水在脾，少氣易重。水在肝，脇下支滿，嘔而痛。其人背寒冷如水火。留飲者，脇下痛引缺盆。欬嗽則輒已。胸中有留飲。其人短氣而渴，四肢歷節痛。脈沈者，有留飲。膈上病，痰滿，喘欬。吐發則寒熱，背痛，腰痠，自汗。其人振振身瞶劇，必有伏飲。夫人飲水多，必暴喘滿。凡食少，飲多，水停心下。其著則悸。微者，短氣，脈雙弦者，寒也。皆大下後，喜虛脈，偏弦者，飲也。病痰飲者，當以溫藥和之。溫藥和之治飲總訣夫有支飲家，久欬數歲。其脈弱者，可治，實大數者，死。其脈虛者，必苦冒。其人本有支飲在胸中故也。治屬飲家。夫短氣有微飲，當從小便去之。病溢飲者，當發其汗。水在中當利小便水在四肢當發汗此亦總訣此亦總訣。夫有支飲家，久欬數歲。其脈弱者，可治，實大數者，死。悸吐涎沫而癲眩。此水也。先渴後嘔，為水停心下。此屬飲家。全部內經無一疾字然世間痰飲之病最多。惟仲景大創厥論，而後萬世治痰之法。

備始

病源

癖飲 由飲水多。水停聚兩脇之間。遇寒氣相搏。則結聚成塊。在脇下弦亘起。按之作水聲。飲成形者為癖 酒癖 因大飲酒後渴而引飲無度。酒與飲停滯在脇肋下。結聚成癖。時時作痛。其狀脇下氣急而痛。膈疾 謂痰水結於胸膈之上。又犯大寒。使陽氣不行。令痰水結聚不散。而陰氣逆上。上與風疾相結。衝於頭。即令頭痛。或數歲不已。久之腦痛。故云膈疾頭痛。若手足寒至節。即死。

痰飲方

苓桂甘朮湯匱金 心下有痰飲。胸脇支滿。目眩。此方主之。短氣有微飲。當從小便去之。此主之。腎氣丸亦主之。

茯苓

四兩

桂枝

各三兩

朮

各一兩

甘草

一兩

右四味以水六升。煮取三升。分溫三服。小便則利。

甘遂半夏湯匱金

匱

病者脈伏。其人欲自利。利反快。雖利心下續堅滿。此為留飲欲去故也。此湯主之。

甘遂

大者三枚。半夏十二枚。芍藥五枚。甘草炙一本。無根者同。

甘草

如指大一枚。同

芍藥

五枚。同

右四味以水二升。煮取半升。去滓。以蜜半升和

藥汁煎取八合。頓服之。

甘遂甘草同用下飲尤速

十全湯匱金 脈沈而弦者。懸飲內痛。此方主之。效家其脈弦為有水。此主之。又支飲家效煩。胸中痛者。不卒死。主一百日。或一歲。亦宜此湯。

芫花

煮

甘遂

大戟

各等

右三味搗篩。以水一升五合。先煮肥大棗十枚。取八合。去滓。納藥

末。強人服一錢。久羸人服半錢。平旦溫服之。不下者。明日更加半錢。得快之後。糜粥自養。此以橘

小青龍湯匱 治心下有水氣。乾嘔發熱。或欬或嗽。少腹滿而喘。

治湯橘

麻黃

去節

芍藥

各三兩

五味子

半升

乾薑

一兩

甘草

炙

細辛

半升

桂枝

去皮

各半升

半夏

半升

右八味。

以水一斗先煮麻黃減二升去上沫納諸藥煮取三升去滓溫服一升若微痢者去麻黃加芫花如雞子大熬令赤色渴者去半夏加括蒌根三兩噎者去麻黃加附子一枚泡小便不利少腹滿去麻黃加茯苓四兩喘者去麻黃加杏仁半升去皮尖

木防己湯金匱膈間支飲其人喘滿心下痞堅面色黧黑其脈沉緊得之數十日醫吐下之不愈此湯主之虛者即愈實者三日復發復服不愈者宜此湯去石膏加茯苓芒硝湯主之

木防己三兩石膏十二枚桂枝二兩人參四兩

右四味以水六升煮取二升分溫再服

木防己去石膏加茯苓芒硝湯金匱即前方去石膏加茯苓芒硝三合右五味以水六升先煮四味取二升去滓納芒硝再微煎分溫再服微痢則愈

澤瀉湯金匱治心下有支飲其人苦冒眩

澤瀉五兩白朮二兩

右二味以水二升煮取一升分溫再服此亦從太之法也

小半夏湯金匱

嘔家本渴渴者為欲解今反不渴心下有支飲故也此湯主之

半夏半升生薑半斤

右二味以水七升煮取一升半分溫再服此專治太之法也

小半夏加茯苓湯

治卒嘔吐心下痞膈間有水眩悸者此湯主之即前方加茯苓三兩一法煎法同

加茯苓而眩悸愈知淡芩治水之力大矣

葶苈大棗湯肺湯金匱治支飲不得息

葶苈如黃色搗大棗十二枚

右先以水三升煮棗取二升去棗納葶苈煮取一升頓服所以專治肺病

桂苓五味甘草湯金匱

欬逆倚息不得卧服小青龍已多唾口燥寸脈沉尺脈微手足厥逆氣從小腹上

衝胸咽手足痺其面翕翕如醉狀因復下流陰股小便難時復冒者與此湯治其氣衝

茯苓

四兩桂枝去皮甘草半升

水三五味子半升

右四味以水八升煮取三升去滓分溫三服此方五

與乾薑同服因服小青龍之後發洩已甚而氣衝故專於厥肺也

苓甘五味

薑辛湯金匱

衝氣即低而反更欬胸滿者用桂苓五味甘草湯去桂加薑辛以治其欬滿

茯苓

四兩甘草

乾薑

細辛

各三兩

五味子半升

右五味以水八升煮取三升去滓分溫半升呈

苓甘五味

薑辛半夏湯金匱

欬滿即止而更復渴衝氣復發者以細辛乾薑為煎藥以服之當遂渴而渴

反止者

為飲也支飲者法當宣宣者必嘔嘔者

復納半夏以去其水

茯苓

四兩甘草

細辛

乾薑各二兩

五味子半升

右六味以水八升煮取三升去滓

溫服半升日三

苓甘五味

加薑辛半夏杏仁湯金匱

水去嘔止其人形腫者加杏仁主之其證應納麻黃以其人遂痺故

不納之若逆而納之者必厥所以然者以其人血虛麻黃發其陽故也

即前方加杏仁半升去皮去核煎服

法同

苓甘五味

加薑辛半夏杏仁大黃湯金匱

若面熱如醉此為胃熱上衝薑辛面加大黃以利之即前方

再加大黃

三兩煎服法同以上五方因證加減精義當細參

厚朴大黃湯

金匱

支飲胸滿者主之

厚朴

一尺大黃六兩枳實四枚

右三味以水五升煮取二升分溫再服

疾飲頭痛往來寒熱

方千金翼

常山

一兩雲母粉二兩

右二味搗篩為散熱湯服方寸匕吐之止吐不盡更服

赤石脂散

金翼

疾飲吐水無時其源為冷飲過度脾胃寒飲食入胃變冷水反吐不停

赤石脂三升 右一味為散服方寸匕酒飲並可下漸加三匕盡三斤終身不吐水又不下利補五

臟令人肥健有人患飲諸藥不瘥服此一斤即愈本事方云此方試之神效

前胡丸 治心頭痰積宿水嘔逆不下食

前胡

白朮

甘草各五分  
麥冬去心旋覆花

豆蔻各三分

人參六分枳實吳

大黃各四分

右九味為末蜜丸桐子大空腹酒下二十丸漸加至三十九忌李魚蒜等物

范汪大甘遂丸外臺 治留水久澼

芫花熬

甘遂

葶苈熬

大黃

苦參

大戟

芒硝

貝母

桂心各一兩

杏仁三十粒巴豆三十粒去皮心研去烏喙三分泡令拆泡右十二味為末其巴豆杏仁搗如膏蜜丸如豆大服二丸日三不知稍加以意將息之忌蘆筍豬肉生葱

礬石湯外臺 治胸中痰澼頭痛不欲食及飲酒則阻疾

礬石一兩

以水二升煮取一升納蜜半升頓服之須臾水吐飲少熱湯

金珠化痰丸局方

治胸膈煩悶涕唾稠黏痰實欬嗽咽溢不利

辰砂研飛

二兩生白龍腦細研

半兩兒茶子炒黃

白礬光明者於鐵石器

內煮汁盡冷研

鈆白花細研

天竺黃研各金箔片為

二十

衣半夏湯先七次用生薑一兩去皮同搗細作餅尖微黃色四兩

右以半夏自莢子為末與諸藥研

生薑汁煮糊丸如桐

子大每服十九至十五丸生薑湯下食後臨卧服

此方製半夏之法

葛花解醒湯東垣 治酒傷而成飲癖

蓮花青皮三分

木香五分

橘皮去白

白茯苓

人參

猪苓各一錢

神曲炒

澤瀉

乾薑

白朮各二分

白豆蔻仁

葛花

砂仁各五錢

右為細末和勻

每服三錢

白湯調下但得微汗

病去矣不可恃此過飲頻服取汗以損天年。

大青龍湯

金匱見傷寒

防己椒目葶苈大黃丸

金匱見水腫

五苓散

金匱見腎水腫

二陳湯

和

腎氣丸

青州白丸

六君子湯

二賢散

以上六方俱見通治

小青龍加石膏湯

見放載逆乃普天下醫家無人能知之者人立一說治無一

病

飲之證十居三四患之者無不胃寒咽

嗽

肺附然

喉嚨

故言之

慨然

附肺

靈素

靈樞玉版篇咳脫形身熱脈小以疾是逆也不過十五日而死矣。

脉小以疾訣死之法盡此四字

素問咳論帝曰肺之令人歟何也岐伯曰五臟六腑皆令人咳非獨肺也皮毛者肺之合也皮毛先受邪氣邪氣以從其合也其寒飲食入胃從肺脈上至於肺則肺寒肺寒則外內合邪因而客之則為肺咳五臟各以其時受病非其時各傳以與之肺歟之狀歟而喘息有音甚則唾血心歟之狀歟則心痛喉中介如梗狀甚則咽痛喉痺肝歟之狀歟則兩脇下痛甚則不可以轉轉則兩胠下滿脾歟之狀歟則右胠下痛陰陰引肩背甚則不可以動動則歟劇腎歟之狀歟則腰背相引而痛甚則歟延五氣之久歟乃移於六腑脾歟不已則胃受之胃歟之狀歟而嘔嘔甚則長蟲出肝歟不已則膽受之膽歟之狀歟嘔膽肺歟不已則大腸受之大腸歟狀歟而遺矢心歟不已則小腸受之小腸歟狀歟而失氣氣與歟俱失腎歟不已則膀胱受之膀胱歟狀歟而遺溺久歟不已則三焦受之三焦歟狀歟而腹滿不欲食飲此皆聚於胃關於肺使人多涕唾而面浮腫氣逆也生氣通天論秋傷於濕上逆而歟臘氣法時論腎病者腹大脛腫喘歟身重示從容論喘歟者是水氣并陽明也

金匱

久欬數歲其脈弱者可治。其脈虛者必苦冒。其人本有支飲在胸中故也。治屬飲家。上氣喘而躁者屬肺張。欲作風水發汗則愈。

外臺

十欬。一曰風欬。欲語因欬言不得終也。二曰寒欬。飲冷食寒因之而欬也。三曰支飲。心下堅滿。欬引四肢痛。脈反進也。四曰肝欬。欬而引脇下痛也。五曰心欬。欬而吐血。引手少陰也。六曰脾欬。欬而涎出續續不止。下引少腹也。七曰肺欬。欬引頸項吐涎沫也。八曰腎欬。耳聾無所聞。引腰背臍中也。九曰膽欬。欬引頭痛口苦也。十曰厥陰欬。欬引舌本也。

欬嗽方

射干麻黃湯金匱 欠而上氣喉中作水雞聲。此湯主之。

射干十三枚 法三兩

一  
大  
棗七枚

生薑各四兩

細辛半升

半夏三兩

細辛半升

半夏八枚

細辛半升

法半升

右九味以水一斗二升先煮麻黃兩沸去上沫納諸藥煮取三升分溫三服。

兒茶丸金匱

欬逆上氣時時唾濁但坐不得眠此方主之。

兒茶八兩

利去

酥炙

右一味末之蜜丸梧子大以棗膏和湯服三丸日三夜一服。

細辛半升

細辛半升

細辛半升

細辛半升

細辛半升

細辛半升

厚朴麻黃湯金匱 欠而脈浮者此主之。

厚朴五兩

麻黃四兩

石膏如雞子大

杏仁半升

乾薑半升

細辛各二兩

小麥一升

五味子半升

右九味以水一斗二升先煮小麥熟去滓納諸藥煮取三升溫服一升日三

脉浮風

澤漆湯金匱

欬而脈沈者此主之。

半夏半升

紫參五兩

澤漆三斤以東流水五斗煮取一斗五升

生薑半升

白前各五兩

甘草半升

黃芩半升

人參半升

桂枝各三

右九味㕮咀納澤漆汁中煮取五升溫服五合至夜盡

脉沈伏飲在裏

越婢加半夏湯金匱

置

效而上氣此為肺脹其人喘目如脫狀脈浮大者主之。

麻黃六兩石膏半斤生薑三兩

大棗十五枚

甘草二兩半夏半升

右六味以水六升先煮麻黃去上

沫納諸藥者取三升分溫三服

肺脹之喘最知者絕少

小青龍加石膏湯金匱

置

肺脹效而上氣煩躁而喘脈浮者心下有水此主之

即小青龍加石膏二兩煎

法同小青龍湯方見痰飲

杏仁煎外主氣嗽

杏仁皮尖去糖

是飴糖

酥一合蜜五合研末另蘇子一升水研

升水研

升七合

右七味先搗杏

仁如泥納後六味合煎如飴糖取如棗大含嚥之日三但嗽發細細含之

蘇子綻汁始有力

十味丸外

治久嗽有聲成肺癰者

麻黃去節白前各二兩桑皮六兩

射干四兩

白薇三兩百部五兩

地黃六兩

地骨皮五兩橘皮三兩

右為末蜜丸桐子大桑皮湯下十九丸日再服稍加至十五丸

療上氣方外

葛根色為紅紫桑白皮

大棗四十

右三味以水四升煮取一升去滓納葛根子泥如棗大煮

三分減一以快利為度

鯉魚湯外

治上氣

杏仁煮

貝母

桂枝各三橘皮

人參

甘草炙

厚朴炙

麻黃去節茯苓

胡麻

白前各二

生薑六兩

半夏五兩

鯉魚五斤

右以水二斗煮得一斗二升去魚納葛根

煮

取三升二合分四服

按此方治欬嗽有水聲身浮腫最妙

觀音應夢散

青堅志

治老人虛嗽

人參一寸

胡桃去皮二枚不

右一味以棗二枚薑五片水煎服

補肺阿膠散

錢止嗽生津

阿膠一兩

馬兜鈴焙

惡實炒

甘草一兩

杏仁七錢右加糯米一合水煎服

按此方治小兒寒嗽最妙

清音丸

桔梗

訶子略一

甘草五分

硼砂三錢青黛三錢冰片三分

右為末蜜丸

龍眼大噙化一丸

葶苈丸

治肺氣欬嗽面白浮腫喘促不安小便赤色

甜葶苈

炒無貝母炮黃

木通略一杏仁

防己各二

右為末蜜肉為丸桐子大桑白皮煎湯下

五十九

蘇子煎

治上氣欬嗽

蘇子

生薑汁

生地汁

白蜜

杏仁略一

右搗蘇子以加黃汁薑汁淹之以絹綃

取汁更搗以汁澆之絞令味盡去滓熬令杏仁微黃黑如臘又以汁澆之絹綃往來七八度令味盡去。

滓納蜜合置瓦器中於湯上煎之令如餳每服方寸匕日三夜一久效

蘇子降氣湯

局方

治虛陽上攻氣不升降上盛下虛痰涎壅盛胸膈噎塞并久年肺氣至效

蘇子

半夏略二前胡

甘草炙

厚朴

陳皮略八

當歸二錢沈香七分薑三片

右水

煎不拘時服若虛冷人加肉桂五分黃耆一錢

治久嗽上氣心胸煩熱吐膿血方

蘇子

鹿角膠炒

杏仁炒各三兩  
薑汁一合  
白蜜一盞  
生地汁一合

右將前三味搗令熟入薑汁

地黃汁蜜相和慢火熬成膏。磁器中蜜封之。每服半匙許。溫粥飲調下。日三四服。

此治寒嗽諸病之  
中惟咳嗽之病因各

殊而最難愈治之梢誤即貽害無窮。余以此證考本四十餘年而後能指手故所載之方至詳至悉學者當於此潛心參究勿輕視也。

麥冬湯

金匱  
喉端見

小青龍湯

葶苈大棗瀉肺湯

桂苓五味甘草湯

桂苓五味去桂加薑辛湯

又去桂加薑辛夏湯

又去桂加薑辛杏仁湯

又去桂加薑辛大黃湯

七方皆金匱治痰飲門

麻黃附子細辛湯

仲景方見傷寒烏梅丸

金珠化痰丸

見痰人參蛤蚧散  
寶鑑見蟲門

疝

靈素

靈經脈篇。肝所生病為狐疝。足厥陰病。丈夫膚疝。婦人少腹腫。素骨空論。任脈為病。男子內結七疝。督脈為病。從少腹上衝心而痛。不得前後為衝疝。陰陽別論。三陽為病。發熱寒。其傳為癲疝。脈要精微論。診得心脈而急病名心疝。少腹當有形也。

病源

七疝 七疝者厥疝。瘕疝。寒疝。氣疝。盤疝。附疝。狼疝。此名七疝也。厥逆心痛。足寒諸飲食吐不下。名曰厥疝也。腹中氣乍滿心下盡痛。氣積如臂。名曰瘕疝也。寒飲食。即肠下腹中盡痛。名曰寒疝也。腹中乍滿乍減而痛。名曰氣疝也。腹中痛在臍旁。名曰盤疝也。腹中臍下有積聚。名曰附疝也。小腹與陰相引而痛大便難。名曰狼疝也。凡七疝皆由血氣虛弱。飲食寒濕不調理之所生。

飢疝 陰氣在內。寒氣客於足陽明。手少陽之絡。令食竟必飢。心為之痛。名曰飢疝。

外臺

平風

痛達背膂名尸疰 心下堅痛不可手迫名石疝 脣下結痛女子月事不時名血疝 少腹脹滿引膀胱急痛名脈疝 寒氣積於內上衝心如刀錐所刺四肢逆冷或脣口變青名心疝 癰疝堅大如斗諸惟癩疝最大而堅冷起犯心即能殺人非疏黃不治

疝方

烏頭桂枝湯

金匱

治寒疝腹中痛逆冷手足不仁若身疼痛灸刺諸藥不能治者

烏頭

大者五枚去皮不必去核

以水二升煎減半去滓以桂枝湯五合解之又煎法令得一升後初服二合不知

即服三合又不知復加至五合其知者如醉狀得吐者為中病

蜘蛛散

金匱

陰狐疝氣者偏有小大時時上下此方主之

蜘蛛

十四枚蒸焦研

桂枝

半兩

右為散取八分一丸飲和服日再服蜜丸亦可俗名偏摩

大烏頭煎方

金匱

腹滿脈弦而緊弦則衛氣不行即惡寒緊則不欲食邪正相搏即為寒疝遠脣痛苦發

則白津出手足厥冷其脈沈緊者此主之

烏頭

大者五枚去皮不必咀

桂枝

半兩

水二升煮取一升去渣納蜜二升煎令水氣盡又煎法取二升強人服七合弱人

服五合不知明日更服不可一日再服沉寒入裏非大熱之藥不治

洗陰腫核痛

千金翼

治丈夫陰腫大如斗核中痛者

雄黃

一兩末

礬石

研

甘草

一尺生

右以水一斗煮二升洗之神良

麝香大戟丸

大

治陰癩腫脹或小腸氣痛

葫蘆巴

四兩

麝香

一錢

大戟

半兩炒黃

茴香

川楝子各二兩

川楝子各二兩以好酒二升葱白七根長木香

訶子

一兩

附子

泡

檳榔

各一兩

右九味為丸如桐子大或酒或薑湯下五十丸此方通治疝氣如荔枝核青

鹽牽牛等俱可加入不必  
因一二味之殊另名一方

濟生橘核丸 治四種癩病。明核腫脹偏有大小。或堅硬如石。痛引臍腹甚。則膚囊腫脹成瘡。時出黃水。  
或癰腫潰爛。

橘核炒 海藻 昆布 海帶各泡川棟肉炒 桃仁一兩製厚朴 木通

枳實炒 延胡索炒 桂心 木香各一右為細末酒丸桐子大每服七十九丸酒鹽湯下。

此軟堅  
之藥

川棟子丸 治疝氣及一切下部之疾。腫痛縮小。雖多年服此藥永去病根。

川棟子淨肉一斤分四處四兩用麪一合班貓四十九個同麸炒黃色去麸巴豆不用四兩用麪一合巴戟一兩同麸炒黃色去麸  
巴戟不用四兩用鹽一兩茴香一兩炒黃色去鹽及茴香不用 本香一兩不破故紙一兩炒見大如梧桐子大每五十丸鹽湯下。甚者日進三兩服空心食前服。

硇砂圓本方 有人貨疝氣藥日數千文。有一國醫多金得之用之良驗。

木香 沈香 巴豆肉各一兩青皮二兩銅青半兩研硇砂一分右上二香青皮三味細剉同巴

豆慢火炒令紫色為度。去巴豆為末。入青砂二味研勻蒸餅和丸如桐子大每服七丸至九丸鹽湯吞下二三服空心食前服。按此方法既有利而用銅青更奇此等所謂海上方也。

蟬脫散 治脣囊腫小兒坐地為蟬或蟻咬者

蟬脫半兩水一椀煎湯洗再溫再洗。仍與五苓散加燈心煎服。或用石

當歸生薑羊肉湯見通鑑氣阿魏丸治氣喘

蘭臺軌範卷五

吳江徐靈胎洞溪著

喘

素問

經脈別論夜行則喘。出於腎。淫氣病肺有所墮恐。喘出於肝。淫氣害脾。有所驚恐。喘出於肺。淫氣傷心。度水跌仆。喘出於腎與骨。當是之時。勇者氣行則已。怯者則著而為病也。陽明脈解篇。陽明厥則喘而惋。惋則惡人。帝曰。或喘而死。或喘而生者何也。岐伯曰。厥逆連臟則死。連經則生。脈要精微論。肝脈搏堅而長。因血在脇下。令人喘逆。逆調論。腎者水臟。主津液。主卧與喘也。此句又為喘之總訣。生氣通天論。因於暑汗。煩則喘喝。靜則多言。陰陽別論。陰爭於內。陽擾於外。魄汗未藏。四逆而起。起則熏肺。使人喘鳴。水熱穴論。水病者。下為附腫。大腹上為喘呼。不得卧者。標本俱病。故肺為喘呼。腎為水腫。肺為逆不得卧。

金匱

上氣面浮腫肩息。其脈浮大不治。又加刺尤甚。

喘方

麥冬湯

火逆上氣咽喉不利。止逆下氣。此主之。

麥冬七升半夏一升人參甘草各二錢米三合大棗十二枚右六味以水一斗二升煮取

溫服

一升

日三夜

一股

此即竹葉石膏湯去竹葉石膏加大棗也。

桂枝加厚朴杏子湯

傷寒論

喘家主之

於桂枝湯方內加厚朴二兩

杏仁五十個去皮尖

餘依前法

麻黃杏仁甘草石膏湯

傷寒論

發汗後不可更行桂枝湯。汗出而喘無大熱者。此湯主之。

麻黃去節四兩

杏仁五十個去皮尖

甘草二兩去叉

石膏

半斤碎綿裹

右四味以水七升先煮麻黃減二升去上沫納諸

藥煮取二升去滓溫服一升即越婢湯加

杏仁去薑囊

定喘湯方振生

治肺寒膈熱哮喘

麻黃方

欵冬花 半夏

桑皮各三錢

蘇子二錢 杏仁一錢

分炒碎

黃芩

甘草各一錢

右以水煎徐徐服

皺肺丸治喘

欵冬花

知母 秦艽

百部去心 紫苑

貝母

阿膠

糯米炒各兩

杏仁四兩炒研

右為末將羊肺一具先以水灌洗看容得水多少即更添些煮杏仁令沸濾過灌入肺中繫定以糯米

泔煮熟研爛成膏搜和前藥末杵數千下丸梧子大每服五十九食前桑白皮煎湯下

清燥救肺湯治臘鬱喘

桑葉三錢經霜者

石膏二錢半炒

甘草一錢 胡麻仁一錢

炒研阿膠八分 人參七分 麥冬一錢

杏仁七分去皮

枇杷葉一片去毛蜜炙

右九味以水一椀煎六分頻頻一三次滾熱服

小青龍加石膏湯

越婢加半夏湯俱見

按此二方為喘之主方其餘眾方意不能外此即有他法必有別因當隨症增減也

麻黃湯寒傷

資生腎氣丸

瀉白散錢乙 黑錫丸通治

按黑錫丸鎮納元氣為治喘必備之藥當蓄在平時非一時所能驟合也

臌脹水腫

靈素

靈脈論董帝問曰願聞脈之舍岐伯曰夫脈者皆在於臟腑之外四字總括明透排臟腑而郭胸脇脹皮膚故命曰脈帝曰木解其意岐伯曰夫胸腹臟腑之郭也膻中者心主之宮城也胃者太倉也咽喉小腸者傳送

心胃之五竅者。閭里門戶也。廉泉玉英。春津液之道也。故五臟六腑者各有畔界。其病各有形狀。榮氣循脈衛氣逆為脈脹。衛氣並脈循分為膚脹。水脹篇黃帝問於岐伯曰。水與膚脹。臍脹。腸覃石瘕。石水何以別之。岐伯答曰。水始起也。目窠上微腫如新卧起之狀。其頸脈動時歛。陰股間寒足胫腫。腹乃大。其水已成矣。以手按其腹。隨手而起。如裹水之狀。此其候也。黃帝曰。膚脹何以候之。岐伯曰。膚脹者。寒氣客於皮膚之間。整整然不堅。腹大。身盡腫。皮厚。按其腹。窅而不起。腹色不變。此其候也。臍脹何如。岐伯曰。腹脹身皆大。大與膚脹等也。色蒼黃。腹筋起。此其候也。腸覃何如。岐伯曰。寒氣客於腸外。與衛氣相搏。氣不得榮。因有所繫。癖而內着。惡氣乃起。瘻肉內生。其始生也。大如雞卵。稍以益大。至其成。如懷子之狀。久者離歲。按之則堅。推之則移。月事以時下。此其候也。石瘕何如。岐伯曰。石瘕生於胞中。寒氣客於子門。子門閉塞。氣不得通。惡血當瀉。不瀉。則留止。日以益大。狀如懷子。月事不以時下。皆生於女子。可導而下。陰陽別論云。陰陽結邪。多陰少陽。曰石水。少腹腫。邪氣臟腑病形篇。督脈微大為石水。起臍已下至小腹垂垂然上至胃脘。死不治。水為有形之物。故接之即起膚脹。為無形之氣。故接之不起。腸覃乃腸外惡氣。在少腹之中。水結不散之症。若臍脹則非氣。非水。臍腑皮肉俱堅。臍正袁難為治矣。

素腹中論黃帝問曰。有病心腹滿。旦食則不暮食。此為何病。岐伯對曰。名為臍脹。帝曰。治之奈何。岐伯曰。治之以雞矢醴一劑知。一劑已。水熱穴論黃帝問曰。少陰何以主腎。腎何以主水。岐伯對曰。腎者至陰也。至陰者盛水也。肺者太陰也。少陰者。又脈也。故其本在腎。其末在肺。皆聚水也。腎者。胃之關也。關門不利。故聚水而從其類也。故凡水病。下為跗腫。大腹上為喘呼。不得卧者。標本俱病。氣厥論。肺移寒於腎。為涌水。涌水者。按腹不堅。水氣客於大腸。疾行則鳴。灌濯如囊裹漿水之病也。陰陽應象大論。濁氣在上。則生腹脹。在上。則生腹脹。

金匱

師曰。病有風水。有皮水。有正水。有石水。有黃汗。風水其脈自浮。外證骨節疼痛。惡風。皮水其脈亦浮。外證跗腫。按之沒指。不惡風。其腹如鼓。不渴。當發其汗。正水其脈沉遲。外證自喘。石水其脈自沉。外證腹滿。不渴。黃汗其脈沉遲。身發熱。胸滿。四肢頭面腫。久不愈。必致癰膿。脈浮而洪。浮則為風。洪則為氣。風氣相搏。風強為隱疹。身體為痒。痒為泄。風久為癥癩。氣強則為水。難以挽仰。風氣相擊。身體洪腫。汗出乃愈。惡風則虛。此為風水。不惡風者。小便通利。上焦有寒。其口多涎。此為黃汗。寸口脈沉滑者。中有水氣。面目腫大。有熱名曰風水。視人之目裏上微擁如蠶。新卧起狀。其頸脈動時時咳。按其手足上陷而不起者風水。太陽病脈浮而緊。法當骨節疼痛。反不疼。身體反重而酸。其人不渴。汗出即愈。此為風水。惡寒者。此為極虛。發汗得之。渴而不惡寒者。此為皮水。身腫而冷。狀如周痹。胸中窒。不能食。反聚痛暮。踴不得眠。此為黃汗。痛在骨節。欬而喘不渴者。此為肺脹。其狀如腫。發汗即愈。然諸病此者。渴而下利。小便數者。皆不可發汗。裏水者。一身面目黃腫。其脈沉。小便不利。故令病水。假如小便自利。此亡津液。故令渴也。越婢加白朮湯主之。少陰脈緊而沉緊則為痛。沉則為水。小便即難。脈得諸沉。當責有水。身體腫重。水病脈出者死。夫水病人。目下有卧蠶。面目鮮澤。脈伏。其人消渴。病水腹大小便不利。其脈沉絕者。有水可下之。問曰。病下痢後渴飲水。小便不利。腹滿因腫者何也。答曰。此法當病水。若小便自利及汗出者。自當愈。心水者。其身重而少氣。不得卧。煩而躁。其人陰腫。肝水者。其腹大。不能自轉側。脇下腹痛。時時津液微生。小便續通。肺水者。其身腫小便難。時時鴨溏。脾水者。其腹大。四肢苦重。津液不生。但苦少氣。小便難。腎水者。其腹大。臍腫。腰痛。不得溺。陰下濕。如牛鼻上汗。其足逆冷。面反瘦。師曰。諸有水者。腰以下腫。當利小便。腰以上腫。當發汗。乃愈。師曰。寸口脈沉而遲。沉則為水。遲則為寒。寒水相搏。趺陽脈伏。

水穀不化脾氣衰則驚。瘂。胃氣衰則身腫。少陽脈卑。少陰脈細。男子則小便不利。婦人則經水不通。經為血血不利則為水。名血分。師曰。寸口脈遲而濶遲則為寒。濶為血不足。趺陽脈微而遲微則為氣遲。則為寒。氣不足則手足逆冷。手足逆冷則榮衛不利。榮衛不利則腹滿。腸鳴相逐。氣轉膀胱。榮衛俱勞。陽氣不通即身冷。陰氣不通即骨疼。陽前通則惡寒。陰前通則痺不仁。陰陽相得其氣乃行。大氣一轉其氣乃散。實則失氣。虛則遺溺。名曰氣分。氣分非水病。但此病無所附因。血分而類及之也。然金匱云。

### 病源

水分候 水分者言腎氣虛弱不能制水。令水氣分散流布四肢。故云水分但四肢皮膚虛腫。聾聾而動者。名水分也。

燥水候 燥水謂水氣溢於皮膚。因令腫滿。以指畫肉上。則隱隱成文字者。名曰燥水也。水腫之病。千頭萬緒。雖在形體而實內連臟腑。不但難愈。即愈最易復病。復即更難再愈。所以內經針水病之穴。多至百外。而調養亦須百日。反若臟腑之證一愈。可以不發治。此證者非醫者能審定。病症神而明之病者能隨時省察。有獲全者。

### 臌張水腫方

此卷載水腫之方。最備。但病不同。各有所宜。當細辨之。

雞矢醴方

鷄矢。研無灰酒三碗。右共煎至一半許。用布濾取汁。五更熱飲。則腹鳴。辰巳時行二三

次。皆黑水也。次日覺足面漸有繩紋。又飲一次。則漸縮至膝上。而病愈矣。

防己茯苓湯

金。皮水為病。四肢腫水氣在皮膚中。四肢聾聾動者。主之。

防己 黃耆 桂枝各三 甘草二兩 茯苓六兩 右五味以水六升煮取二升。分溫三服。

甘草麻黃湯

匱。裏水主之。

甘草二兩 麻黃四兩 右二味以水五升先煮麻黃去上沫納甘草煮取三升溫服一升重覆汗出不汗再服慎風寒。

麻黃附子湯

金匱水之為病其脈沉小屬少陰浮者為風無水虛脹者為氣水發其汗即已脈沉者宜麻

黃附子湯浮者宜杏子湯

金匱注云杏子湯未見恐是麻黃杏仁甘草石膏湯

麻黃三兩

甘草二兩 附子一枚

右三味以水七升先煮麻黃去上沫納諸藥煮取二升半溫服八

分日三服

乃發汗為治水要訣此水之汗也

桂枝去芍藥加麻黃細辛附子湯

金匱

氣分心下堅大如盤邊如旋杯水飲所作此方主之

桂枝

生薑各三兩 甘草二兩 太子參二兩

附子一枚 麻黃

細辛各二兩 附子一枚

右七味以水七升先煮

麻黃去上沫

納諸藥煮取二升分溫三服當汗出如蟲行皮中即愈

枳朮湯

金匱心下堅大如盤邊如旋盤水飲所作此方主之

枳實

七枚 白朮二兩

右二味以水五升煮取三升分溫三服腹中軟即散

蒲灰散

金匱治小便不利

蒲灰

七分滑石三分右一味杵為散飲服方匕日三服

巴椒薑圓

金匱腹滿口舌乾燥此腸間有水氣此方主之

防己

椒目

草薑

熬大黃各一

右四味末之蜜丸如桐子大先食飲服一丸日三服稍

增口中有津液渴者加芒硝半兩

此治腸間之水外症不必有水象也

牡蠣澤瀉散

牡蠣熬

澤瀉

桔梗根

蜀漆腥

去草薑熬

商陸根熬

海藻各等分

右七味異搗下

篩為散。更入臼中治之。白飲和服方寸匕。小便利。止後服日三。

大腹水腫方十全 治氣息不通。命在旦夕者。

牛黃二分 椒目三分 兔布

海藻

牽牛子

桂心

芍藥六分

右七味為末。別搗草

慈如膏。合和丸如桐子。飲服十九日。二稍加小便利為度。正觀九年。漢陽王患水醫所不治。余處此方。

日夜尿一二斗。五六日即瘥。

麻豆湯十全

治遍身腫小便澀。

麻黃二升 烘研烏豆一斗 以水四斗煮取汁一斗 桑根白皮切五

右三味以豆汁納藥。煮取六升。一服一升。日二服。

三日全盡豆不多不  
能取效

十水丸千金

第一之水先從面目腫遍一身。名曰青水。其根在肝。太穀主之。第二之水先從心腫。名曰赤水。其根在心。草薙主之。第三之水先從腹腫。名曰黃水。其根在脾。甘遂主之。第四之水先從脚腫。上氣而欬。名曰白水。其根在肺。藁本主之。第五之水先從足趺腫。名曰黑水。其根在腎。連翹主之。第六之水先從面至足腫。名曰元水。其根在胆。羌花主之。第七之水先從四肢起腹滿。身盡腫。名曰風水。其根在胃。澤漆主之。第八之水先四肢小腫。其腹獨大。名曰石水。其根在膀胱。桑根白皮主之。第九之水先從小腸滿。名曰暴水。其根在小腸。巴豆主之。第十之水乍盛乍虛。乍來乍去。名曰氣水。其根在大腸。赤小豆主之。右十病藥皆等分。與病狀同者。則倍之。白蜜和先食服一丸。如小豆。日三。欲下病者。服三丸。弱者當以意節之。十方想當時本有此分別也。姑存之。

舟車神祐方河

治水腫水脹形氣俱實者。

黑牽牛四兩 大黃二兩 酒浸甘遂一兩  
裏煨麴橘紅 大戟麴裹芫花醋炒青皮炒各五錢  
木香五錢 檳榔五錢

輕粉一錢 右為末水丸。每服五分。五更滾水下。大便利三次為度。若一二次不通。利次日漸加至一錢。若服後大便利四五次。或形氣不支。則減其服三分二分俱可。或隔一二三日服一次。以愈為度。甚者忌鹽醬百日。

大聖濟川丸類

方

大黃 牽牛 郁李仁各一 木香 芒硝各三  
半錢甘遂半錢 右為末蜜丸桐子大。諒人虛實  
服之。此下水峻劑

木香散類  
方 治單腹脹

木香 青皮 白朮 薑黃 豆蔻各半  
阿魏 畢澄茄各一 右為末醋丸如豆大。

每服二十九薑湯送下。

葶藶丸外臺 治水腫及脚井虛腫

葶藶子半兩 牽牛子半兩生澤漆葉  
熟各半 海藻洗去鹽火昆布如上桑根白皮火 甘遂  
熬 椒目

郁李仁各三桂心一分 右為末蜜丸桐子大。一服十五丸。日再加至二十九丸。

療水病洪腫氣脹不消食方臺

香薷納金中。以水淹之。出香薷上數寸。煮濃汁去滓。煎令可。丸桐子大。服五丸。日三小便多為度。又一法

療患氣兼水身面腫垂死方臺

桑白皮 茯苓 郁李仁各四 橘皮二兩海藻三兩 赤小豆一升 右六味以水八升煮二升半。分三服。

五香散局 升降諸氣宣利三焦。疏導壅滯發散邪熱。治陰陽之氣鬱結不消。諸熱。瘟毒。腫痛。結核。中脘不快。心腹脹滿。

木香

丁香

沉香

乳香

藿香等分

右為粗末。每服三錢水一盞半。煎八分去滓

食後溫服

此方治氣分亦宜

五皮散局

治風濕客於脾經。氣血凝滯以致面目虛浮。四肢腫滿。心腹膨脹。上氣促急。兼治皮水。妊娠胎水。

五加皮

地骨皮

生薑皮

大腹皮

茯苓等分

右五味每三錢水煎熱服。一方加

白朮。曆沉香木香。

敷藥

類方

治腹滿堅硬如石。陰囊腫大。先用甘草蠅頭後用此。

大戟

芫花

甘遂

海藻等

右為末。用醋調麵和覆貼腫處。仍以軟綿裹住。

沉香琥珀丸

治水腫一切急難症。小便不通。

琥珀

杏仁

紫蘇

赤茯苓

澤瀉等

葛根

葶苈

郁李仁

去皮沉香

各一錢半陳皮

防己

各七錢半

右為末。蜜丸如梧子大。以麝香為衣。每服二十五丸。加至五十丸。空心參湯送下。量

虛實加減之。

調榮飲 治瘀血流滯。血化為水。四肢浮腫。皮血赤紋。名血分。

蓬朮

川芎

當歸

元胡索

檳榔

陳皮

赤芍

桑皮

炒大腹皮

赤茯苓

葶苈

瞿麥

各一錢半

大黃

五分

細辛

官桂

甘草

五分

右以薑棗水煎服。血分

之病金匱有病  
無方此為至當

烏鯉魚湯類

治水氣四肢浮腫

烏鯉魚

赤小豆

桑皮

白朮

陳皮各三錢  
葱白五根

右以水三碗同煮不可入鹽

先喫魚後服藥不拘時

小菖丹

溪

芫花

醋炒過一宿瓦器內不住手  
攪炒令黑不可焦一兩半

甘遂

麵裹長流水浸半  
月煮晒乾一兩半

大黃

紙裹煨勿令焦燒乾

切以

大戟

長流水煮

洗晒乾五錢黃柏三兩  
右為末以白朮膏丸如蘿蔔子大臨卧津液吞下或白湯下取膈上濕痰

熱積以意消息之欲痢空心服一方加木香檳榔各半兩

此即十全大黃湯

煨腎散 治腎家水腫

甘遂三錢

積

豬腰子一個

右細披破少鹽椒淹透摻藥末上荷葉包裹煨燒乾溫酒嚼服之

禹餘糧丸 治十種水氣脚膝腫上氣喘滿小便不利但是水氣悉皆治之

許學士及丹溪皆云此治膨

脹之要藥

即針砂丸又名蛇含石丸

蛇含石 大者三兩以新鐵鉗盛入炭火中燒石與鉗子一  
般紅用鉗取蛇黃頭入醋中候冷研極細末聽用禹餘糧三兩  
二升就鉗內煮醋乾為度後用鉗并藥入炭以二物為主其次量人虛實入下項治水多是取轉推  
火中燒紅鉗出傾藥淨磚地上候冷研細甘遂芫花之比又有下項藥

羌活 柴胡故虛人老人亦可用

大茴香 蓬朮 附子 乾薑 青皮 三稜 白蒺藜

當歸浸一宿酒

右

為末入前藥拌勻以湯浸蒸餅挾去水和藥再杵為丸梧子大食前溫酒白湯任下三十九至五十九  
最忌鹽一毫不可入口否則發疾愈甚但試服藥即於小便內旋去不動臟腑病日三服兼以溫和調

補氣血藥助之。真神方也。此方兼治形之積塊有

越婢湯

越婢加朮湯

風門

見通

甘草乾薑茯苓白朮湯

金匱即腎著腰痛見飲

十棗湯

金匱見

溫門

肺痿附肺癰

### 金匱

問曰。熱在上焦者。因欬為肺痿。肺痿之病。從何得之。師曰。或從汗出。或從嘔吐。或從消渴。小便利數。或從便難。又被快藥下痢。重亡津液。故得之。曰寸口脈數。其人嗽口中反有濁唾涎沫者。何。師曰。為肺痿之病。若口中辟辟燥欬。即胸中隱隱痛脈反滑數。此為肺癰。欬唾膿血。脈數虛者為肺痿。數實者為肺癰。問曰。病欬逆脈之。何以知此為肺癰。當有膿血。吐之則死。其脈何類。師曰。寸口脈微而數。微則為風。數則為熱。微則汗出。數則惡寒。風中於衛。呼氣不入。熱過於榮吸而不出。風傷皮毛。熱傷血脉。風舍於肝。其人則欬口乾喘滿。咽燥不渴。多唾濁沫。時時振寒。熱之所過。血為之凝滯。蓄結癰。膿吐如米粥。始明可救。膿成則死。肺癰之疾。成壞亦有愈者。全在上氣面浮腫肩息。其脈浮大。不治又加利尤甚。上氣喘而躁者。屬肺脹。欲作風水。發汗則愈。

### 肺痿方

甘草乾薑湯

金匱

肺痿吐涎沫而不欬者。其人不渴。必遺尿。小便數。所以然者。以上虛不能制下故也。此為肺中冷。必眩多涎唾。甘草乾薑湯以溫之。若服湯已渴者。屬消渴。

甘草四兩  
炙乾薑泡二兩

右二味以水三升。煮取一升五合。去滓。分溫再服。

此乃治肺冷之方。非肺痿通用之方也。不得誤用。

桂枝去芍藥加皂莢湯

金匱

治肺痿吐涎沫。

桂枝

生薑兩

甘草二兩

棗子十五枚

皂莢子一枚去皮

右五味以水七升煮取三升分三服肺癆

不可輕用

韋莖湯

金

治欬有微熱煩滿胸中甲錯是為肺癆

韋莖

二升

薏苡仁半升

桃仁一枚

瓜瓣半升

右四味以水一升煮韋莖得五升去滓納諸藥煮取

二升服一升再服當吐如膿

此方

最穩

桔梗白散

外

治欬而胸滿振寒脈數咽乾不渴時出濁唾腥臭久吐膿如米粥者為肺癆

桔梗

貝母各三

巴豆一分去皮

熬令如脂

右三味為散強人飲

血膈下者

渴出若下多不止

飲冷水一杯則定

肺癆全屬內症肺癆乃係外科輕者煎藥可愈重者膿

不治所以金匱

萌可救膿成則死也

甘草湯

見傷寒

炙甘草湯治通

芩薑大棗湯

瀉肺湯方見十味九味丸

諸血

靈素

靈王版篇嘔血胸滿引背脈小而疾是逆也

衄而不止脈大是逆也

熱病篇欬而衄汗不出出不至足者死

血枯

素腹中論帝曰有病胸脇支滿者妨於食病至則先聞腥臊臭出清液先吐血四肢清目眩時時

前後病名為何何以得之岐伯曰病名血枯此得之年少時有所大脫血若醉入房中氣竭肝傷故月

事少不來也

消血

素氣厥論胞移熱於膀胱則癃溺血痿論悲哀太甚則胞絡絕胞絡絕則陽氣內動發則心下

崩數洩血

金匱

夫吐血欬逆上氣。其脈數而有熱。不得卧者死。夫酒客欬者必至吐血。此因極飲過度所致也。師曰。尺脈浮。目睛黃。衄未止。量竟去。目睛慧了。知衄今止。又曰。從春至夏。衄者。太陽從秋至冬。衄者。陽明。衄家不可汗。汗出必額上陷。脈緊急。直視不能眴。不得眠。病人面無血色。無寒熱。脈沉弦者。衄浮弱。手按之絕者。下血煩欬者。必吐血。亡血不可發其表。汗出即寒慄而振。

瘀血 病人胸滿脣癟。舌青口燥。但欲嗽水不欲咽。無寒熱。脈微大來遲。腹不滿。其人言我滿。為有瘀血。病者如熱狀。煩滿口乾燥而渴。其脈反無熱。此為陰伏。是瘀血也。當下之。

病源

吐血有三種。一曰內衄。二曰肺疽。三曰傷胃。內衄者。出血如鼻衄。但不從鼻孔出。是近心肺間津液還流。入胃。內出如豆汁。或如衄血。凝停胃裏。因即滿悶。便吐。或去數升。乃至一斛。是也。肺疽者。言飲酒之後。毒滿便吐。吐已後。有一合二合。或半升一升。是也。傷胃者。是飲食大飽之後。胃內冷。不能消化。則便煩悶。強嘔吐。之所食之物。與氣共上衝。因傷損胃口。便吐血。色鮮正赤。是也。此三種皆是吐血。與咳血迥別。凡吐血之後。體恒憊憊。然心裏煩燥悶亂。紛紛顛倒不安。寸口脈微而弱。血氣俱虛。則吐血關上脈微而芤。亦吐血脈細沉者生。喘欬上氣浮大者死。久不瘥。面色黃黑。無復血氣。時寒時熱。此三者乃吐血症。若欬血。

舌血 心臟有熱。則舌上出血。

九竅出血 禁衛大虛。腑臟傷損。血脈流散。脈數不得卧者死。

汗血 肝臟血。心之液為汗。肝心俱傷於邪。則汗血。

蘭臺軌範

卷五 諸血

七

便血 先血後便為遠血。先便後血為近血。

諸血方

血枯方臻 以四烏鵲骨一隻，如二物并合之丸。以小豆以五丸為後飯。飲以鮑魚汁。利腸中

及傷肝也。

後飯先藥後飯也。烏鵲即烏賊治女子赤白漏下令人有子。薏苡即薏草能益精通經。雀卵即麻雀卵補精血治陰痿。鮑魚即淡乾魚石首為勝能通血脉益陰氣。

柏葉湯金匱 治吐血不止。

柏葉

乾薑各三  
父三把

右三味以水五升取馬通汁一升合煮取一升分溫再服。

瀉心湯金匱 治心氣不足吐血衄血此湯主之。

大黃

二兩

黃連

黃芩各一

右三味以水三升煮取一升頓服之。

瀉血潤腸湯統旨

治血枯及死血在腸飲食不下大便燥。

當歸

三錢

白芍根

生地錢半紅花

桃仁炒

大黃酒燬

枳殼錢一

韭汁

酒半盞

右八味以水一鍾半煎七分食前服。

治吐血百治不瘥療十瘡神驗不傳方針

地黃汁半升大黃生末一升

右一味煎地黃汁三沸納

大黃末調和空腹服之日三即癒。

用大黃極少不過引生地一下達耳。

犀角地黃湯針

治傷寒及溫病應發汗而不汗之內蓄血者及鼻衄吐血不盡內餘瘀血大便黑面黃消瘀血。

犀角一兩

生地黃八兩

芍藥三兩

丹皮二兩

右四味㕮咀以水九升煮取三升分三服喜妄如狂

者加大黃二兩黃芩三兩其人脈大來遲腹不滿自言滿者為無熱但依方二味不必加。

屏角地黃湯 主脈浮客脈乳相合。血積胸中熱之甚。血在上焦。此湯主之。

屏角

大黃絡一黃芩三錢黃連二錢生地四錢

右五味水煎食後服

四生丸

類方

治吐血衄血。血熱妄行。

煎湯亦

生荷葉

生艾葉

側柏葉

生地等分

右搗爛丸如雞子大。每服一丸水煎去滓服。以

一法

白芨

戴氏

治咯血。

白芨一兩

枇杷葉

去毛。蜜炙。鷄節錢各五

右為細末。另以阿膠五錢蛤粉炒用。生地汁調之。火上頓化入

前藥為丸。如龍眼大。每服一丸。

此治肺血之方。枇杷葉只宜作湯。非此法。

皮膚血汗方

禡

郁李仁

去皮研一錢

以鵝梨搗汁調下。

汗血方

經驗方

用人中白。新瓦焙乾。人麝香少許。溫酒調服立效。

諸竅出血方

聖惠方

頭髮

敗櫟

陳連蓬

並燒灰等分

右三味。每服三錢。木香湯下。

療舌上出血如孔鑽者

千金

煎香薷飲汁服。

療舌血不止針

用槐花炒為末。摻上。

蒲黃灰亦可摻

紫霜丸

治舌上出血竅如針孔。

紫金砂

即露蜂房項上實處研一兩

蘆薈三兩。貝母四錢。

右為細末。蜜丸。櫻桃大。每服一丸。煎化服。吐血衄血。

用溫酒化服。

療齒斷血出外

竹茹四兩。醋浸一宿。含之。

療酒醉牙齒涌血

外臺

燒釘赤炷血孔中。即止。

此法也

雄苗麝香散 治牙斷腫爛出血

雄黃 血竭

白礬枯各一錢半

輕粉 黃連

黃丹炒各一錢

右共為末

研勻敷患處

治牙縫出血方 以紙維子蘸乾蟾酥少許於血處按之立止。

黃連散 治齒縫間出血吃食不得。

黃連

白龍骨

牙硝各一兩 白礬一分 龍腦一錢

右為細末每用少許敷牙根上。

療滿口齒血出 枸杞子為末煎湯漱之然後吞下立止根亦可。

一方用子汁含滿口更後吃。

治牙宣方 用棉花核燒灰擦

療鼻衄血三升氣欲絕方金

龍骨末一囊核許微以氣吹入鼻中即斷更出者更吹之。

茅花湯活人書

治鼻衄 茅花每服三錢煎服不拘時。

地黃散元成方

治鼻衄久不愈

生地

熟地

地骨皮

枸杞子 右等分焙乾為末蜜湯調下。

療淋血方外臺

苧麻根十枚水五升煮取二升服神驗。

療小便出血方外臺

龍骨末二方寸匕酒一升服之日三。

瞿麥散奇效方

治血淋尿血

瞿麥穗

赤芍

車前子

白茅根

赤茯苓

桑白皮

石韋去毛生乾地黃

阿膠炒

滑石

黃芩

甘草炙各二錢

右為細末每服二錢入血餘燒灰一錢調服。

神效方 治血淋

海螵蛸

生乾地黃

赤伏令等分

右為細末。每服一錢。用柏葉車前子煎湯下。

髮灰散 治血淋小便出血如尿。用亂髮燒灰。入麝香少許。每服一錢。用米醋溫湯調下。

玉屑散 治尿血并五淋砂石疼痛不可忍。受者。

黃耆

人參等分

右為末。用蘿蔔大者切一指厚。二指大四五片。蜜奄少時。離蜜炙乾復離復。

炙盡蜜二兩為度。勿令焦至熟。離黃耆入參末吃。不拘時。仍以鹽湯送下。製法奇

鹿角膠丸濟 治房勞傷小便尿血。

鹿角膠

半兩 没藥另研油頭髮繩絡三

右為末。茅根汁打麵糊丸桐子大。每服五十九。鹽湯下。

黃土湯匱金 治下血先便後血。此遠血也。

甘草

乾地黃

白朮

附子泡

阿膠

黃芩

各三 灶中黃土半斤

右七味以水八升煮取三升。分溫三服。

赤小豆當歸散匱金 治下血先血後便。此近血也。

赤小豆

三升浸令 茅出晒乾當歸

三兩

右一味杵散。菜水服方寸匕。日三服。

牛角鰓灰散臺外

治卒下血。黃牛角鰓一具燒赤色為細末。煮豉汁和一錢服。

重者日三服。

豬臘丸

治大人小兒大便下血。日久多食易飢。腹不痛。裏不急。先用海螵蛸炙黃去皮。白者為末。木

賊草煎湯調下。三日後效。後用黃連二兩。嫩豬臘二尺去肥。

右以黃連塞滿豬臘。禁兩頭煮十分爛。

研細添糕糊丸梧子大。每服三五十丸。食前米飲送下。此方治婦人血崩亦良

又豬臘丸 治痔漏下血。

又

豬臘

一條洗淨。捏乾。槐花炒為末。填入臘內兩頭

米醋煮爛。

右搗和丸如梧子大。每服五十九。食前當歸湯下。

豬臘

一條洗淨。捏乾。槐花炒為末。填入臘內兩頭

米醋煮爛。

右搗和丸如梧子大。每服五十九。食前當歸湯下。

抵當湯

抵當丸

俱見瘀血

桃核承氣湯

治熱結膀胱小腸急結者以上三方俱見傷寒

大黃䗪蟲丸

百花煎

人參蛤蚧散

以上三方俱見通治

俱見虛勞

瓊玉膏

龍腦雞蘇丸

千金地黃湯

治亡血脫血

暮昏色白無力者方

俱見通治

噎嗝嘔吐附關格

### 靈素

靈結根篇。太陰為開。厥陰為闔。少陰為樞。故開折則食廩無所輸。膈洞。膈洞者。取之太陰。視有餘不足。

上膈篇

黃帝曰。氣為上膈者。食飲入而還出。余已知之矣。盡為下膈。

當以治蟲之法治之

下膈者。食

眸時乃出。余未得其意。願卒聞之。

岐伯曰。喜怒不適。食飲不節。寒溫不時。則寒汁流於腸中。流於腸中。則

蟲寒。蟲寒。則積聚守於下管。

則腸胃充郭。衛氣不禁。邪氣居之。人食則蟲上食。蟲上食。則下管虛。

則邪氣勝之。積聚已留。留則癰成。癰成。則下管約其癰在管內者。即而痛深。其癰在外者。則癰外而痛浮。

癰上皮熱。

五味篇。苦走骨。多食之。變嘔。苦入於胃。令人五穀之氣。皆不能勝苦。苦入下脘三焦之道。皆

閉而不通。故變嘔。

四時氣篇。善嘔。嘔有苦長太息。心中憺憺。恐人將捕之。邪在胆。逆在胃。胆液泄則口

苦。胃氣逆。則嘔苦。故曰嘔。

經脈篇。足太陰病。舌本強。食則嘔。胃脘痛。腹脹。善噫。足厥陰所生病者。胸滿

嘔逆。

素陰陽別論。

一陽發病。少氣善欬。善泄。其傳為肺。三陽結謂之肺。至真要大論。諸嘔吐皆屬於熱。

關格。六節臟象論。人迎一盛。病在少陽。二盛。病在太陽。三盛。病在陽明。四盛以上。為格陽。寸口一盛。病

在厥陰。二盛。病在少陰。三盛。病在太陰。四盛以上。為格陰。人迎與寸口俱盛。四格以上。為關格。關格之脈

羸。不能極於天地之精氣。則死矣。

此指關格之脉非病名也

### 金匱

嘔家有癰膿不可治。嘔膿盡自愈。先嘔却渴者此為欲解先渴却嘔者為水停心下。此屬飲家嘔家本渴。今反不渴者以心下有支飲故也。問曰病人脈數數為熱當消穀引食而反渴者何也。師曰以發其汗令陽微膈氣虛脈乃數數為客熱不能消穀胃中虛故也。趺陽脈浮而濶浮則為虛虛則傷脾胃傷則不磨。朝食暮吐暮食朝吐宿穀不化名曰胃反脈緊而濶其病難治。病人欲吐者不可下之。嘔而脈弱小便復利身有微熱見厥者難治。

傷寒論

脈上微頭小者則汗出下微本大者則為關格不通不得尿頭無汗可治有汗者死。寸口脈浮而大浮則虛大為實在尺為關在下為格關則不得小便格則吐逆。趺陽脈伏而濶伏則吐逆水穀不化濶則食不得入名曰關格此乃關格之證內經傷寒論所指不同內經所云是不治之論傷寒論所云則卒暴之疾當於通便止嘔方法隨宜施治可也

千金

走哺下焦熱氣逆不續嘔吐不禁

外臺

五噎夫五噎謂一曰氣噎二曰憂噎三曰食噎四曰勞噎五曰思噎雖有五名皆由陰陽不和三焦隔絕津液不行憂恚嗔怒所生謂之五噎噎者噎塞不通也。

氣噎陰陽不和寒氣填於胸膈故氣噎不通令人喘胸背痛也。

卒食噎由臟冷而不理津液少而不能傳行飲食也。

噎膈嘔吐方

茱萸湯金匱嘔而胸滿者此湯主之乾嘔吐涎沫頭痛此亦主之。

茱萸一升人參三兩生薑六兩大棗枚十二右四味以水五升煮取三升溫服七合日三服

生薑瀉心湯傷寒論治胃中不和心下痞鞭乾噫食臭脇下有水氣腹中雷鳴下利

生薑四兩甘草炙

人參

黃芩錢三半夏

乾薑兩

大棗枚十二

右七味以水一斗煮取

半夏瀉心湯金匱嘔而腸鳴心下痞者此湯主之

半夏半斤黃芩

乾薑

人參

芍藥三兩

黃連一兩

大棗枚十二

甘草炙

三兩

右七味以水一斗煮取

六升去滓煎取三升溫服一升日三服

黃芩加半夏生薑湯金匱

乾嘔而痢者此湯主之

黃芩三兩甘草炙

芍藥兩

半夏半斤生薑

三兩大棗枚十二

右六味以水一斗煮取三升去渣

溫服一升日再夜一

猪苓散金匱嘔吐而病在膈上後思水者解急與之思水者此湯主之

豬苓

茯苓白朮各等

右三味杵為散飲服方寸匕日三服

傷飲惡飲此乃常理若胸中  
有水則津液下流反口乾思  
水但不能多飲耳

大半夏湯金匱反胃嘔吐者此湯主之

半夏三升洗

人參三兩

白蜜一升

右三味以水一斗二升和蜜搗之二百四十遍煮藥取一升半

溫服一升餘分再服

其妙在用甘瀉水

大黃甘草湯金匱食已即吐者此湯主之

大黃四兩甘草一兩

右二味以水三升煮取一升分溫再服

此治上吐

茯苓澤瀉湯金匱 胃反吐而渴欲飲水者此湯主之。

茯苓半斤澤瀉四兩甘草三兩桂枝二兩白朮三兩生薑四兩右六味以水一斗煮取三升納澤

瀉再煮取二升半溫服八合日三服此治蓄飲之吐納澤瀉兩月煮似先煮五味後煮澤瀉

文蛤湯金匱

吐後渴飲得水而貪飲者此湯主之兼主微風脈緊頭痛

文蛤五兩麻黃

甘草

生薑各三

石膏五兩

杏仁個

大棗枚十二

右七味以水六升煮取

二升溫服一升汗出愈入煎劑文蛤亦

生薑半夏湯金匱

病人胸中似喘不喘似嘔不嘔似噦不噦心中憤憤然無奈者此湯主之

半夏半斤

生薑汁一斤

右二味以水七升煮取二升納生薑汁煮取一升半小冷分四服日三夜

一服止停後服此治寒飲之症納汁再煮似先煮半夏

半夏乾薑散金匱

乾嘔吐逆吐涎沫此主之

半夏

乾薑各等

右二味杵為散取方寸匕漿水一升半煎取七合頓服之此治胃寒之吐

葛根加半夏湯論衡寒

太陽陽明合病不下痢但嘔者主之

葛根四兩

麻黃三兩去節湯泡

生薑三兩

甘草炙二兩

芍藥二兩桂枝去皮大棗枚十二半夏泡半斤

右

八味以水一斗先煮葛根麻黃減二升去白沫納諸藥煮取三升去渣溫服一升覆取微似汗

橘皮湯金匱

乾嘔噦若手足厥者此湯主之

橘皮四兩

生薑半斤右二味以水七升煮取三升溫服一升下咽即愈此通胃氣之吐

橘皮竹茹湯金匱

噦逆者此湯主之

橘皮二升

竹茹二升太棗三十

生薑半斤

甘草五兩

人參一兩右六味以水一斗煮取三升溫服

一升。日三服。

黃連丸傷寒 傷寒胸中有熱胃中有邪氣腹中痛欲嘔吐者主之。

黃連

甘草炙  
乾薑

桂枝去皮各三兩  
人參二兩半夏半斤

大棗故十二

右七味以水一斗煮

取六升去渣溫服一升。日三夜一服。

邪氣寒氣也。故寒熱並用。

昆布丸 治五噎咽塞食飲不下。

昆布洗

麥冬  
天冬

阿梨勒

木通

大黃

朴硝各五錢

郁李仁

桂心

百合各二兩

羚羊角

杏仁

蘇子

射干各半兩

柴胡

陳皮

檳榔各二錢

右藥蜜

丸桐子大熱酒下。每服三十丸不拘時。

關格不通方千金翼

芒硝

芍藥

杏仁各四兩

枳實炙一兩

大黃半斤地黃二兩

右藥以水七升煮取三升分三服。

千金理諸噎方

常食乾粳米飯即不噎。

又方奇

炭末細羅九如彈子大含少許細細咽津即下。

中風客熱

嚦方千金翼

竹茹四兩生米五合

右一味

以水六升煮米熟服之。

嘔噦方千金翼

蘆根五兩

以水五升煮取三升分三服兼服小兒尿一二合良。

消穀丸千金翼

主數年不能飲食。

小麥蘖

七月七日麴搗一乾薑

烏梅各四兩

右四味搗篩為末。煉蜜丸如桐子大空腹酒

服十五丸日再稍加至三十丸其寒在胸中及反胃翻心皆差。

卒噦千金翼

男噦女人丁壯氣盛者噦其肺俞女子男子虛之。

廣濟檳榔散

外臺

療吐酸水。每食則變作醋水吐出。

檳榔分十六人參六分茯苓八分橘皮六分草撥六分

右五味搗篩為散。平晨空腹生薑五六兩合

皮搗絞取汁溫納散方寸匕攪調頓服之。日一服漸加至一七半。

純薑汁服未藥斷難入口祇宜取薑汁一滴拌藥別飲送下為妥

崔氏方

外臺

療食則吐或朝食夜吐名曰胃反。或氣噎不飲食數年羸削惟飲水亦同此方。

半夏六兩人參六兩生薑一兩橘皮二兩牛涎一升春杵頭糠綿裹厚朴二兩

生薑三兩

右以

水八升煮取三升分溫三服頻服

深師治噎方

外臺

羚羊角

前胡

甘草人參

橘皮

各二兩以水六升煮取三升分四服

反胃方

本事

驢

水即驢小便

日服二合後食微吐一半晡時又服二合人定時食粥吐出便定

丁香柿蒂湯

嚴氏

治寒呃

丁香

柿蒂

錢二分存火

人參一錢生薑五片煎服

治冷呃方

刀豆子

火存

酒服錢許

撞氣阿魏丸

局方

治五種噎病九般心痛痘癬氣塊冷氣攻刺及脾胃停寒胸滿膨脹嘔吐酸水丈夫小

腸氣痛婦人氣血等疾

茴香炒香陳皮去白青皮

川芎

丁香皮

蓬莪朢

泡各一兩

甘草

一兩縮砂仁

肉桂

皮各粗

醉生蠱

四兩鹽醡黑炒半兩

白芷

泡半兩

胡椒

二錢

阿魏宿

以麩為丸一錢半

蓬莪朢

泡各一錢半

甘草

一兩縮砂仁

肉桂

皮各粗

殊少

七錢為衣

丈夫氣痛炒鹽湯下一粒至二粒

婦人血氣醋湯下常服一粒爛嚼茶酒任下

此方純用通氣溫熱之藥有火者不宜服此卷所載方論種種各殊然皆係嘔吐反胃水飲蟲積等症非真膈病也膈病乃胃口枯槁之症百無一治論中雖有絡脈格症而其形象俱未詳載必臨症多乃能識其真耳

旋覆代赭湯

四逆湯

小柴胡湯

以上諸方俱見傷寒

小半夏湯方見痰飲

竹葉石膏湯加生薑見通治

泄瀉

靈素

靈論疾診尺篇。飧泄脈小者手足寒。難已。飧泄脈小者手足溫。易已。玉版篇其腹大脹。四末清脫。形泄甚逆也。諸病暴注下迫皆屬於熱。素陰陽應象大論。清氣在下。則生飧泄。春傷於風。夏生飧泄。濕勝則濡泄。脈要精微論。久風為飧泄。平人氣象論。泄而脫血難治。玉機真臟論。泄而脈大難治。難經。

泄凡有五。其名不同。有胃泄。有脾泄。有大腸泄。有小腸泄。有大瘕泄。名曰後重。胃泄者飲食不化。色黃。脾泄者腹脹滿。泄注食即嘔吐。大腸泄者食已窘迫。大便色白。腸鳴切痛。小腸泄者洩而便膿血。少腹痛逆。大瘕泄者裏急後重。數至圊而不能便。莖中痛此五泄之要法也。

泄瀉方

溫脾湯

本事

主治錮冷在腸胃間。泄瀉腹痛。宜先取去。然後調治。不可謂虛以養病也。

分頓服

不可謂虛以養病此十  
古之要訣後人反是

厚朴 乾薑 甘草 桂心 附子 酒

二

大黃 四錢

右六味㕮咀取一兩水二鍾煎六

詞梨勒丸

生

治大腸虛冷。泄瀉不止。腹脹引痛。飲食不化。

詞梨勒丸

生

附子 泡

肉豆蔻

炮

木香 吳茱萸 炒

龍骨

生用

白茯苓 草薢等分

右為末。生薑汁煮麵糊丸如梧子大。每服七十丸。空心米飲下。

香草丸 治飲酒多。遂成酒泄。骨立不能食。但再飲一二盞。泄作幾年矣。

嫩鹿茸

黃酥炙

肉豆蔻

煨各一兩

生麝香

另研

右為末陳米飯為丸如梧子大每服五十九空心米飲下。

固腸丸

得效

治臟腑滑泄晝夜無度。

吳茱萸

御粟殼

黃連

各等

右為末醋糊丸如桐子大每服三十九空心米飲下。

附子理中丸

局方

治脾胃冷弱心腹疼痛嘔吐瀉痢霍亂轉筋體冷微汗手足厥冷心下逆冷滿悶腹中

雷鳴飲食不進及一切沉寒錮冷並皆治之。

人參

一兩

附子

泡一

乾薑

泡

甘草

炙各一兩

白朮

土炒二兩

右為末蜜丸每藥一兩作十九每服一丸以水一盞化開煎至七分稍熱食前服。

四君子湯

局方

六君子湯

歸脾湯

平胃散

補中益氣湯

枳實丸

消痞積滯

瀉黃散

五苓散

四神丸

霍香正氣散

局方見通治

四逆散

治少陰

泄渴

大承氣湯

小承氣湯

調胃承氣湯

敗毒

葛根湯

葛根芩

黃芩湯

以上七方見傷寒厚朴七物湯方見腹痛門

按泄渴乃一時寒暖不調水穀不化或冒暑傷濕等症當擇清淡消

散

葛根芩


黃芩湯

以上七方見傷寒厚朴七物湯方見腹痛門

按泄渴乃一時寒暖不調水穀不化或冒暑傷濕等症當擇清淡消

脾虛久病之方隨症酌用可也





H87378A  
1907  
V.7