

徐氏醫學十六種


E

Chinese

Vol IX

9

9



蘭臺軌範卷八

吳江徐靈胎泗溪著

婦人

素問

六元正紀大論黃帝問曰婦人身重毒之何如岐伯曰有故無殞亦無殞也。帝曰願聞其故岐伯曰大積大聚其可犯也衰其大半而止過者死。腹中論帝曰何以知懷子之且生也岐伯曰身有病而無邪脈也。奇病論黃帝問曰人有重身九月而瘡此何為也岐伯曰胞之絡脈絕也。帝曰何以言之岐伯曰胞絡者繫於腎少陰之脈貫腎繫舌本故不能言。帝曰治之奈何岐伯曰無治也當十月復平人氣象論婦人手少陰脈動甚者妊子也。

難經

妊之為病其內苦結女子為瘕聚左者為腎右者為命門命門者諸精神之所舍原氣之所繫也男子以藏精女子以繫胞

金匱

問曰新產婦人有三病一者病瘻二者病鬱嘔三者大便難何謂也。曰新產血虛多汗出喜中風故令病瘻亡血復汗寒多故多鬱嘔亡津液胃燥故大便難產婦鬱嘔其脈微弱嘔不能食大便反堅但頭汗出所以然者血虛而厥厥而必嘔冒家欲解必大汗出以血虛下厥孤陽上出故頭汗出所以產婦喜汗出者亡陰血虛陽氣獨盛故當汗出陰陽乃復大便堅嘔不能食小柴胡湯主之。雖當汗出不宜大過師曰產婦腹痛法當以枳實芍藥散假令不愈者此為腹中有瘀血著臍下宜下瘀血湯主之亦主經水不利產後七

八日無太陽證少腹堅痛此惡露不盡不大便煩燥發熱切脈微實再倍發熱日晡時煩燥者不食食則讝語至夜即愈宜大承氣湯主之熱在裏結在膀胱也婦人傷寒發熱經水適來晝日明了暮則讝語如見鬼狀者此為熱入血室治之無犯胃氣及上二焦必自愈婦人中風發熱惡寒經水適來得七八日熱除脈遲身涼和胸脇滿如結胸狀讝語者此為熱入血室也當利期門隨其實而取之刺法最易學也

寸第二肋端此等

期門二穴在乳頭直下四

急痛

寒傷經絡

堅在

上嘔吐涎唾久成肺癰形體損分在中盤結縫臍寒疝或兩脇疼痛與臟相連或結熱中痛在關元脈數無瘡肌若魚鱗時著男子非止女身在下未多經候不勾令陰掣痛少腹惡寒或引腰脊下根氣街氣街急痛膝腔疼煩奄忽眩冒狀如厥癱或有憂慘悲傷多嗔此皆帶下非有鬼神久則羸瘦脈虛多寒三十六病千變萬端審脈陰陽虛實緊緩行其針藥治危得安其雖同病脈各異源子當辨記勿謂不然問曰婦人年五十所病下痢數十日不止暮即發熱小便裏急腹滿手掌煩熱唇口乾燥何也師曰此病屬帶下何以故曾經半產瘀血在少腹不去何以知之其證唇口乾燥故知之當以溫經湯主之婦人陷經漏下黑不解膜薑湯主之方無考按本云宣是膠艾湯

考無

膠艾湯

方無

考無

妊娠數墮胎候血氣虛損手臟為風冷所居則血氣不足故不能養胎所以致胎數墮候妊娠而恆腰痛者喜墮胎也按墮胎皆由於血熱兩胎一死一生候陽施陰化精盛有餘者則成兩胎其兩胎而一死者候其胎上冷是胎已死也

病源

妊娠過年不產。由挾寒冷宿血在胞而有胎則冷血相搏令胎不長產不以時。若其胎在胞日月雖多。其胎緊小轉動勞羸是挾於病必過時乃產。

胞轉 脣下急痛小便不通是也。其病由不同胞轉及胞落並致死。

帶下三十六疾 諸方說三十六疾者。是十二癥九痛七害五傷三固是也。十二癥者。是所下之物。一如膏。二如青血。三如紫汁。四如赤皮。五如膿漿。六如豆汁。七如葵根羹。八如凝血。九如青血。血似水。十如米汁。十一如月漬。十二經度不應期也。九痛者。一陰中傷痛。二陰中淋痛。三小便即痛。四寒冷痛。五月水來腹痛。六氣滿並痛。七汁出陰中如蟲齶痛。八腸下皮痛。九腰痛。七害者。一害食。二害氣。三害冷。四害勞。五害房。六害姪。七害睡。五傷者。一窮孔痛。二中寒熱痛。三小腹急牢痛。四臟不仁。五子門不正。引腎痛三固者。一月水閉塞不通。其餘二固文缺不載。

與鬼交 腸腑虛神守弱。鬼氣得病之也。其狀不欲見人。獨言笑悲泣脈來遲伏或如鳥啄。

惡阻 心中滑悶。頭眩四肢煩痺。憐惰不欲執作。惡聞食氣。欲取食酸酸果食。多睡少起。乃至三四月以上大劇者。不能自勝舉也。此由婦人元本虛羸。血氣不足。腎氣又弱。兼當風食冷太過。心下有痰氣挾之而有妊也。

子滿 此由脾胃虛弱。有停水而挾以妊娠也。水漬於胞。則令胎壞。惟將產之月。而脚微腫。則其產易蓋。

胞藏水血多也。初妊娠者。則反壞胎。

胎漏 此由衝任脈虛。不能約制太陽少陰之經血也。亦名胞阻漏血。盡則人斃也。

鬼胎 正虛則妖魅精入臟。狀如懷娠。

胎痘 其母臟氣熱壅甚於胎。

血分 是經血先斷而後成水病。以其月水壅塞不通經血分而為水故曰血分

胞絡傷損 子臟虛冷。氣下衝則陰挺出。謂之下胞亦有因產用力傷氣而陰脫者

陰臭 由子臟有寒。寒搏於津液。蘊積氣衝於陰。故變臭也。此亦由內所致

子臟開 由子臟宿虛。因產冷氣來之。血氣得冷不得相榮。故令開也。

婦人方

桂枝茯苓圓金匱

醫

治婦人宿有癥病。經斷未及三月。而得漏下不止。胎動在臍上者為癥瘕害妊娠。六月

動者。前三月經水利時胎也。下血者。後斷三月衃也。所以血不止者。其癥不去故也。當下其癥。此主之。

桂枝 丹皮 茯苓 桃仁

去皮 失熟 芍藥各等分

右五味末之。煉蜜丸如兔屎大。每日食前服

一丸。不知加至三丸。

當歸芍藥散金匱

醫

治婦人懷娠腹中疼痛

當歸三兩

醫

芍藥一斤

醫

茯苓四兩

醫

白朮四兩

醫

澤瀉半斤

醫

芎藭三兩

醫

杵為散。取方寸。酒和日三服。

乾薑人參半夏丸金匱

醫

治妊娠嘔吐不止。

乾薑

醫

人參各二兩

醫

半夏二兩

醫

右三味末之。生薑汁糊丸如梧子大。飲服十九日三。

葵子茯苓散金匱

醫

治妊娠有水氣。身重小便不利。瀝瘀亞寒。起即頭眩。

葵子一斤

醫

茯苓三兩

醫

右二味杵為散。飲服方寸。日三服。小便利則愈。

當歸貝母苦參丸金匱

醫

治妊娠小便難。飲食如故。

當歸

醫

貝母 苦參各等分

醫

右三味末之。蜜丸如小豆大。飲服三丸。加至十九丸。

當歸散金匱

婦人妊娠宜常服

當歸 黃芩 芍藥 茜草 各一斤 白朮半斤 右五味杵為散酒服方寸匕日再服妊娠常服即易產胎無苦疾產後百病悉主之。

白朮散金匱 妊娠養胎

白朮 兰、葛 蜀椒三分去汗 杜鵑 右四味杵為散酒服一錢匕日三服夜一服但苦痛加芍藥心下毒痛倍加芍藥心煩吐痛不能飲食加細辛一兩半夏大者二十枚服之後更以酸漿水服之若嘔以醋醬水服復不解者小麥汁服之以後渴者大麥粥服之病雖愈服之勿置原本無分兩

枳實芍藥散金匱 治產後腹痛煩滿不得臥

枳實燒令黑勿太過 芍藥等分 右二味杵為散服方寸匕日三服并主癰腫以麥粥下之假令腹痛不愈此為腹中有瘀血著臍下宜下瘀血湯主之亦主經水不調

下瘀血湯金匱

大黃三兩 桃仁二十枚 麋蟲二十枚 去足熱 肝以丸作煎又一法 末之蜜和為四丸以酒一升煎一丸取八合頓服之新血下如豚肝接新字當作瘀字

竹葉湯金匱 治產後中風發熱面正赤喘而頭痛

竹葉 一把葛根三兩 防風 桂枝 桔梗 人參 甘草各一兩 附子一枚 大棗十五枚

生薑五兩 右十味水一斗煮取二升半分溫三服溫覆取汗出頸項強用大附子一枚破之如豆入前藥搗去沫嘔者加半夏半升洗

竹皮大丸金匱 治婦人乳中虛煩亂嘔逆安中益氣

生竹茹二分 石膏二分 桂枝一分 甘草七分 白薇一分 右五味末之棗肉丸如彈子大飲服一丸

日三夜二。有熱倍白薇。煩喘者加柏實一分。

白頭翁加甘草阿膠湯金匱 治產後下痢虛極。

白頭翁

甘草

阿膠各二兩

秦皮三兩

黃連二兩

柏皮三兩

右六味水七升。煮二升半納膠

令消分溫三服

匱

治婦人咽中如有火鬱。

半夏厚朴湯金匱

半夏一升

厚朴三兩

茯苓四兩

生薑五兩

乾蘇葉二兩

右五味水七升。煮取四升。分溫四服。日三夜一。

甘麥大棗湯金匱

治婦人臘燭悲傷欲哭。象如神靈所作。數欠伸。此主之。

甘草三兩

小麥一升

大棗十枚

右三味水六升。煮取三升。分溫三服。亦補脾氣。

溫經湯金匱

主婦人曾經半產瘀血在少腹不去。其證辱口乾燥。

吳茱萸三兩

當歸二兩

芍藥二兩

人參二兩

桂枝二兩

阿膠二兩

丹皮二兩

生薑三兩

甘草二兩

半夏一升

麥冬一升

去心

水一斗。煮取三升。分溫三服。

周易

亦主婦人少腹寒久不受胎。兼治

崩中去血。或月水來過多。及至期不來。

周易方

土瓜根散金匱

治帶下經水不利。少腹滿痛。經一月再見。

土瓜根

芍藥桂枝
桂枝
廣蟲各三

右三味杵為散。酒服方寸匕。日二服。

此治寒血伏留
在衝脈之方

旋復花湯金匱

寸口脈弦而大。弦則為芤。大則為芤。減則為寒。芤則為虛。寒虛相搏。此名曰革。婦人則半

產漏下。此湯主之。

旋復花三兩
葱莖十四
新絳少許
水三升。煮取一升頓服。

大黃甘遂湯置金 治婦人少腹滿如敦狀小便微難而不渴此為水與血俱結在血室也此主之

大黃四兩 甘遂二兩 阿膠二兩 右三味以水三升煮取一升頓服其血當下

礬石丸置金 治經水閉不利臟堅癖不止中有乾血下白物

礬石三分 杏仁一分 右二味末之煉蜜丸棗核大納臟中劇者再納之

紅藍花酒置金 治婦人六十二種風腹中血氣刺痛

紅藍花兩 酒升 大煎減半頓服一半未止再服

蛇床子散置金 治婦人陰寒溫陰中坐藥

蛇床子一味末之以白粉少許和合相得如裹大綿裏納之自然溫

狼牙湯置金 治婦人陰中生瘡蝕爛者

狼牙三兩 水四升 煮取半升以綿繩筋如繭絞湯瀝陰中日四遍

三物黃芩湯置金 治婦人在草蓐自發露得風四肢苦煩熱頭痛者與小柴胡湯頭不痛但煩者此湯主之

黃芩一兩 苦參二兩 地黃四兩 右三味水六升煮取二升溫服一升多吐下蟲

當歸建中湯千 治產後虛羸不足腹中刺痛不止吸收少氣或苦少腹中急摩痛引腰背不能食飲產後一日得服四五劑為善令人強壯宜

當歸四兩 桂枝三兩 芍藥六兩 生薑三兩 甘草二兩 大棗十二枚 右六味水一斗煮取三升分溫三

服一日令盡若大虛者加飴糖六兩湯成納之火上煖令飴消若去血過多崩傷內創不止加地黃六兩阿膠二兩

佛手散本草方文 調經

交加散

本事方

治婦人榮衛不通經脈不調腹中撮痛氣多血少結聚為瘕產後中風

生地黃

五兩研取汁

生薑

五兩研取汁

右交互用汁浸一夕各炒苗漬汁盡為度末之常常腹痛酒調下三

錢尤不可缺

護胎方

本事方

治妊娠時氣身熱令子不落

伏龍肝為末水調塗臍下二寸乾則易差即止

又取井中泥塗心下乾則易

海蛤散

本事方

治婦人傷寒血結胸膈揉而痛不可撫近

海蛤

滑石

甘草各一
兩半
甘硝半兩

右為末每服二錢雞子清調下

小柴胡加地黃湯

本事方

治婦人室女傷寒發熱或發寒熱經水適來或適斷晝則明了夜則譏語如見

鬼狀亦治產後惡露方來勿爾斷絕

柴胡

一兩分人參

黃芩

甘草

生地黃

各半兩

右為末每用五錢水二盞生薑五片棗二枚煎至八分去渣服

此即熱入血室

烏雞煎圓局

方

治婦人胎前產後諸般疾患並昏治之

烏雄雞

一隻

人參

白朮

石牀

丹皮

黃耆

烏藥

草菓

延胡索

地黃

熟者洗焙

木香

琥珀

肉豆蔻

各半兩

陳皮

紅花

川烏泡

海桐皮

芍藥

白者

附子

皮膚去皮

肉桂

去粗皮

蓬莪朢

各半兩

蒼朢

米泔浸切培

右細剉

用烏雄雞一隻湯擣去毛及腸肚將上

藥安放雞腹中用新瓦瓶好酒一斗同煮令乾去雞骨以油單紙盛培乾為細末煉蜜丸如梧子大每服三十九

猪蹄湯

方

治乳婦氣少血衰脈澀不行絕無乳汁

蘭臺軌範

卷八 婦人

猪蹄一隻木通五兩

右將猪蹄淨洗依食法事治次用水一斗同木通浸煮得四五升取汁飲如

乳不下再服為妙

紫石英丸局

治婦人久冷無子及數經墮胎經水不調崩漏帶下三十六病積聚癰瘕少腹急重小便

白濁

烏賊魚骨燒灰

甘草炙

柏子仁微炒

山蕷各半

辛夷仁

肉桂去粗皮

卷柏

石斛

乾熟地黃

芎藭

杜蒙

禹餘糧

醋淬七次研各二兩

人參

續斷後

細辛

桑寄生

牛膝

厚朴薑汁食茱萸

當歸炒

川烏泡去皮臍乾薑泡

丹皮各一兩

天門冬去心

母丁香末一錢

麝香一錢

研各五分

右拌勻以兔腦和圓如雞豆大陰乾用油

催生丹局

治產婦產育艱難或逆或橫並宜服之

紫石英

細研飛各三兩

右為細末煉蜜丸如梧子大每服三十丸溫酒或米飯下空心食前日二服

小調經散局

治產後敗血循經流入四肢腐爛如水服此血行腫消則愈

沒藥

琥珀

桂心

白芍

當歸各一兩

細辛

麝香各五分

為末薑汁酒各少許調

二味參蘇飲

治產後瘀血入肺咳嗽喘急

分病最良

人參一兩

紫蘇二兩

是蘇木疑作一劑水煎服若既愈當用六君子湯以補脾胃若口鼻黑氣起急用

此藥加附子五錢亦有得生者

紫蘇飲

治子懸腹痛或臨產驚恐氣結連日不安或大小便不利

當歸

甘草

大腹皮黑豆泡浸人參

厚朴

橘皮各七分

白芍炒五分

紫蘇一錢

薑葱引

水煎服

紫散

元和經紀

止血崩

香附子

炒黑存性

為末熟酒調方寸匕再服立定生末安胎

秦桂丸

雜炒方

治婦人無子。

秦艽

桂心

杜仲

防風

厚朴

各三錢生用

茯苓

各一兩

白薇

乾薑

沙參

牛膝

半夏

各五錢

人參

一兩

細辛

一錢

右十四味

為末煉蜜丸如米豆大

每服三十

丸空心米飲徑下未效再加數丸已覺有孕便不可服

求嗣方

雜炒

壬子日合藥別日不用名助陽丹

細辛

五錢

牛膝

二兩

茯苓

一兩

沒藥

四錢

吳茱萸

白芨

秦艽

乳香

防風

當歸

去蘆各三錢

肉桂

厚朴

石菖蒲

附子

各二錢

人參

一錢無子者陰虛血少者非宜

黃龍湯

活人書

妊娠寒熱頭疼嘔吐不欲飲食腸下痛嘔逆寒氣及產後傷風熱入胞宮寒熱如瘡并經

水過篩病後勞復餘熱不解

柴胡

一兩

黃芩

人參

各一分半炙

右四味

每服五錢水一盞半煎一盞去渣溫服

桂枝湯

金匱

婦人得平脈陰脈小弱其人渴不能食血寒熱名妊娠桂枝湯主之於法六十日當有此證

設有醫治逆毒却一月加吐下者則絕之

見寒傷

小柴胡湯

金匱

婦人中風七八日續來寒熱發作有時經水適斷此為熱入血室其血必結故使如瘡狀

見傷寒

蘭臺軌範

卷八 婦人 小兒

大承氣湯

金匱

產後七八日無太陽症少腹堅痛惡露不盡不大便煩躁發熱切脈微實再倍發熱日晡

時煩躁者不食即讞語至夜即愈熱在裏結在膀胱也

見傷寒

小青龍湯

金匱

婦人吐涎沫醫反下之心下即痞當先治其吐涎沫此主之

見痰

涎沫止乃治痞瀉心湯

主之

見血門

芒歸脾艾湯

金匱

治陷經漏下黑不解

見治通

猪髮膏

金匱

胃氣下泄陰吹而正喧此穀氣之實也

見痘門

腎氣丸

金匱

治婦人飲食如故煩熱不得臥而反倚息者此名轉胞不得溺也以胞系了戾故致此病但

利小便則愈

九郎崔氏八味

見通治

當歸生薑羊肉湯

金匱

治產後腹中疼痛并治腹中寒症虛勞不足

見治通

按婦人一切外感內傷等症與男子同無庸另立治法惟經帶胎產癥等疾病變多端必從調經種子等法探本溯源而後可施用今因金匱要略有治婦人方論一卷故亦略載婦人常用之方數十首至其全體仍當取唐宋以來專門之書詳考之

此卷方論俱從錢氏直訣選出其外有小兒常患之症而方未備者更將他卷查閱以便業幼科者專取此書誦習可也

脈法

脈弦急

氣不和

脈沉緩傷食脈促結虛驚脈浮為風脈沉細為寒脈亂不治

全幼心鑑云小兒一歲以前

看虎口食指寅卯辰三關以驗其病

寅卯辰即風氣

命三關也脈紋從寅關起不至卯關者易治若連卯關者難治

若寅侵卯卯侵過辰者十不救其脈紋具有五色如因驚必青瀉痢必紫當以類而推之一歲後則

可用一指轉側辨其三部脈弦急浮沉四五歲後脈七八至而細數者為平九至者傷十至者困六至

五至者為虛為寒弦緊為風痺弦急為客忤

面部症

左腮為肝。右腮為肺。額上為心。鼻為脾。頰為腎。若色赤者。熱也。宜隨症治之。

目部症

目內色赤者。實熱。淡紅者。心虛熱。青者。肝實熱。淡青者。肝虛熱。黃者。脾實熱。微黃者。脾虛熱。白而淡者。肺實熱。目無睛光者。腎虛也。

五臟虛實寒熱

心主驚。實則叫哭發熱。飲水而搐。虛則臥而悸動不安。視其睡口中氣溫或合面睡及上竄咬牙。皆心熱也。心氣實。則喜仰臥。

肝主風。實則目直大叫。呵欠項急。墮悶。虛則咬牙多歟。肝熱則手尋衣領及亂捻物。壯熱飲水。喘悶目赤發揚。肝有風則目連劄得。心熱則發搐。或筋脈牽擊而直視。風甚則身反張。強直不搐。心不受熱也。當補腎治肝。

脾主困。實則困睡。身熱飲水虛則吐瀉生風。面白腹痛。口中氣冷。不思飲食。或吐清水。呵欠多睡者。脾氣虛而欲發驚也。

肺主喘。實則悶亂。喘促有飲水者。有不飲水者。虛則悶氣長出氣。肺熱則手掐眉目鼻面。肺盛復感風寒。則胸滿氣急。喘嗽上氣。肺臟怯。則唇白。悶亂。氣粗。喘促。悶氣者。難治。肺虛甚也。腎主虛。無實也。惟瘡疹腎實。則變黑陷。若胎稟虛怯。神氣不足。目無睛光。面白癱縮。此奇難育。雖育不壽。或更加色欲。變症百出。愈難救療。或目畏明下竄者。蓋骨重而身縮也。咬牙者。腎水虛而不能制心火也。

變蒸

小兒在母腹中乃生骨氣五臟六腑成而未全。自生之後即長骨脈五臟六腑之神智也變者易也。自內而長自下而上又身熱故已生之日後三十二日一變。變每畢即情性有異於前何者長生腑臟智意故也。何為三十二日長骨添精神人有三百六十五骨除手足中四十五碎骨外有二百二十自生下骨一日十段而上之十日百段三十二日計三百二十段為一遍亦曰一蒸骨之餘氣自腦分入臟中作三十二齒。而齒牙有不及三十二數者由變不足其常也或二十八日即至長二十八齒以下倣此但不過三十二之數也。凡一周遍乃發虛熱諸病如是十周則小蒸畢也計三百二十日生骨氣乃全而未壯也。

急驚風症治

小兒急驚因聞大聲或驚而發搐搐正如故此熱生於心身熱面赤引飲口中氣熱一便黃赤其則發搐蓋熱甚生風陽盛而陰虛也宜利驚丸除其痰熱不可用巴豆之藥。

慢驚風症治

小兒慢驚因病後或吐瀉或藥餌傷損脾胃而肢體遂冷口鼻氣微手足癰瘍晝睡露睛此脾虛生風無陽之症也。小兒初生壯熱吐噃身體強直手足抽掣自反直視是胎驚風症也。

發搐症治

驚癇發搐男則目左視無聲右視有聲女則右視無聲左視有聲相勝故也。欲驗逆順男則握拳拇指又入食指中為順於外為逆女則又入食指為逆於外為順仍矣吮乳不能類以治其母後倣此若傷風發搐口中氣熱呵及頓悶手足動搖若傷食發搐身溫多睡或吐不思食百日內發搐真者不過二三次必死假者頻發不死直者內生驚癇假者外傷風冷血氣未實不能勝伍故發搐。

癲癇症治

凡治五癥皆隨臟治之。每臟各有一獸之形並用五色丸治之。發而重者死。病甚者亦死。若反折上竄其聲如犬。症屬肝也。若目瞪吐舌。其聲如羊。症屬心也。若目直腹痛。其聲如牛。症屬脾也。若驚蹶反折手縱其聲如雞。症屬肺也。若肢體如戶口吐涎沫。其聲如猪。症屬腎也。

附面部三指診症圖



小兒半歲之間有病以名中食。三指曲按額前眉上髮際之下。若三指俱熱。感受風邪。鼻塞氣粗。三指俱冷。感受風寒。臟冷吐瀉。若食中二指熱。上熱下冷。名中二指熱。夾驚之候。食指熱。胸膈氣滿。乳食不消。

附虎口三關脈症圖



水鏡訣云陰陽運合。男女成形已分九竅四肢乃生五臟六腑部位各分逆順難明。若憑口舌之浮沈必至橫亡。於孩子須明虎口。辨別三關消詳用藥必無差誤。未至三歲看虎口三關。若脈見風關尚易治。交氣關則難治。交命關為死症。又當辨其色。如獸驚三關心青。水驚三關心赤。人驚三關心黑。若紫色主瀉痢黃色。是雷驚三關脈通度乃極驚之症必死。有紋或青或紅如線直者。是母食傷脾。左右一樣者。是驚積齊發。紋有三條。白主肺傷風痰。或齁齁聲。青主傷寒。及散紅主泄濶。有黑相兼主下利。紅多白痢。黑多赤痢。有紫相兼虎口脈亂。乃氣不和也。蓋脈紋見有五色。由其病甚。其色能加變。即至純黑者不可得而治矣。

五臟瘡疹證治

小兒在胎食五臟血穢伏於命門。若遇天行時熱。或乳食所傷。或驚火所觸。則其毒當出。初起之候。面燥腮赤。目胞亦赤。呵欠頻悶。下涼下熱。咳嗽嚏噴。手足稍冷。驚悸多睡。宜究其何臟所發。察其何因所起。令乳母亦須節飲食。慎風寒。五臟各有一症。肝臟水瘤。青色而小。肺臟膿泡。白色而大。心臟癰色亦而小。脾臟疼。小次癰。故色亦黃淺也。先發膿痘後發疹子者。順先疹子後癰者。順反此為逆。惟腎無候。但見歇

冷且冷是也。若寒水來侮。故黑陷而耳聧反熱為逆也。急用百詳丸。牛李膏。各三服。不愈者死。如發朝熱三日以上。出不甚多。而熱不止者。未盡也。潮熱隨出。如早食潮熱不已。為水泡之類也。一發便出盡者重。瘡夾疼者。半輕半重也。出稀者輕。裏外微紅者輕。外黑裏赤者微重。外白裏黑者大重也。瘡端裏黑點如針孔者。勢最劇也。青乾紫陷。昏睡汙出。煩躁熱渴。腹脹喘。二便不通者。困也。有大熱利小便解熱毒。若紫黑乾陷。或寒戰咬牙。或身黃腫榮者。急以百詳丸下之。復惡寒不已。身冷出汙。耳聧反熱者死症也。此腎氣大旺。脾虛不能制。故耳。下後身熱氣溫。飲水者可治。以脾土勝。腎寒去而溫熱也。不黑者不可下。下則內虛歸腎。大抵瘡疾屬陽。在春夏為順。秋冬為逆。冬月腎旺。盛寒病多。歸腎變黑。又當辨春膿疮。夏黑陷。秋癰子。冬疼子者。十活四五。黑者十難救也。身熱煩渴。腹滿而喘。便澀面赤。悶亂大吐。此當利小便。不瘥者。宣風散下之。若能食而加頭焦起。或未佳而喘實。亦可下之。若五七日痴不集。是內熱也。宣風散導之。生犀汁解之。癰疼作搐。為脾虛。而肝則乘心火。妄動。風熱相搏也。當瀉心肝。補脾土。瘡黑而忽便膿血。并痂皮者。乃脾氣實。腎邪退而病安也。及瀉而乳食不化者。脾虛不能制腎。故為難治。此即近世痘瘡之症。其病與癰疼同列。並無起脹成漿收監等說。大抵宋時之瘡形治法。不過如此。近日愈變愈重。與癰疼絕不相類。治亦迥別。因知天下之病。隨時隨地。變化無窮。所以內經有五運六氣異法方。宜等論。為醫者。苟不能知天運之轉移。及五方之體性。終有偏執之處。不可以稱上工也。痘瘡無人可免。自種痘之法起。而小兒方有避險之路。此天意好生。有神人出焉。造良法以救人也。然人往往以種痘仍有死者。疑而不敢種。不知乃苗之不善。非法之不善也。況即有死者。不過百中之一。較之天行惡痘。十死八九者。其安危相去何如也。至於治痘之書。自宋至今。不下數十種。莫不和平切近。孰意邇年以來。崇奉怪書。不論小兒之強弱。痘症之虛實。概以大黃數兩。石膏數斤為一劑。使兒真火消盡。

元氣大傷。絕其起脹成漿之路。因向其父母云。此症或不能起脹。或不能成漿而死。至期果死。其父母以為神目。不知此實醫者致之死地也。或幸不死。則信為大黃石膏之功。而此二味。遂為不祧之藥矣。又方中多用蜂房。蝎子。蛴螬。蚯蚓。蚌汁等惡物。成升成盃。灌入兒腹。以增其毒。而爛其胃。宛轉就死。尤可痛心。夫近日時醫。治精壯男婦之病。見用清火之藥一二錢。羣以為此寒涼之品。斷不可服。必當用附桂參。獨於數月之小兒。反用大寒大毒之藥。成兩成斤。俾死者接踵而不悔。何耶。醫者不足責。為父母而目覩其子之服此毒藥。以致慘死。毫無疑怨。則何心也。

丹瘤

丹瘤之症。因熱毒客於腠理。搏於血氣。發於皮膚。當以白玉散塗之。

傷風策變症治二

傷風兼肝。則發搐。頓悶。兼心。則驚不安。兼肺。則喘嗽。哽氣。兼脾。則困睡。兼腎。則目畏明。各隨補其母。

諸經發熱症治三

潮熱者。時間發熱。過時即退。來日依時而發。此欲發驚也。壯熱者。常熱不已。甚則發驚癇也。風熱者。身熱而口中氣熱。乃風邪所感也。溫熱者。肢體微熱也。發熱而不欲飲水者。胃氣虛熱也。發熱而飲水作渴。喜冷飲食者。胃氣實熱也。

吐瀉症治

若吐乳濁黃。傷熱乳也。吐乳濁青。傷冷乳也。皆當下之。吐瀉昏倦。睡不露睛者。胃實熱也。吐痰涎及綠水者。胃虛冷也。初生下吐。因穢惡下咽故也。凡初生急須拭淨口中。否則啼聲一發。穢物咽下。致生諸病。拭去穢物

五臟內外疳症主治

凡小兒疳在內。目腫腹脹。瀉痢青白。體瘦羸弱。疳在外。鼻下赤爛。頻搔鼻。且或肢體生瘡。鼻瘡用蘭香散。諸瘡用白粉散。肝疳一名筋疳。白膜遮睛。或瀉血而瘦。心疳面黃。煩赤。身體壯熱。脾疳一名肥疳。體黃瘦削。皮膚乾澀。而有瘡疥。腹大嗜上。腎疳一名骨疳。肢體瘦削。遍生瘡疥。喜卧濕地。肺疳一名氣疳。喘噦氣促。口鼻生瘡。若患潮熱。當先補肝後瀉心。若妄以硝黃諸藥利之。若患癬。當消磨。若誤以巴豆硼砂下之。及傷寒誤下。皆能成疳。其初病者為熱疳。久病者為冷疳。冷熱相兼者。津液短少者。皆因大病脾胃虧損。內土津液所致。當固脾胃為主。早為施治。則不變敗症也。

腹痛腫脹諸症

小兒腹痛體瘦。面色㿠白。目無睛光。口中氣冷。不思飲食。或嘔利撮口。此脾土虛而寒水所侮也。若口中氣溫。面色黃白。目無睛光。或多睡惡食。或大便酸臭。此積病也。若腹脹而悶亂。喘滿者。實也。若不悶亂。喘滿者。脾虛也。誤下之。以致目眍。腮面四肢浮腫。肚腹愈脹。因下而喘。脾氣益虛也。脾虛不能勝腎水。隨肺氣行於四肢。如水狀。若侵浮於肺。即大喘也。若腎熱傳於膀胱。熱甚逆於脾肺。脾胃虛而不能制腎水。流走四肢。而身面皆腫。若土勝。則刑於肺。故今喘也。若口吐涎沫。或吐清水而㿠白。心腹痛有時者。蟲痛也。與痛相似。但目不斜。手不搐也。安蟲散主之。若腹中有癖。不食。但餌乳是也。蓋小兒病此。良由乳食不消。伏於腹中。乍冷乍熱。飲水過多。即蕩滌腸胃。亡失津液。脾胃虛弱。不能傳化水穀。以致四肢羸瘦。肚腹漸大而成疳矣。

五臟雜症主治

喜汗者。厚衣臥而額汗出也。盜汗者。肌肉虛而睡中汗出也。胃虛汗者。上至項。下至臍也。六陽虛汗者。

上至頭下至項難治。夜啼者。小兒筋骨血脉未成而多哭。脾臟冷而痛也。當與溫中藥或花火膏主之。
若虛怯為冷所乘。則唇青。驚啼者。邪氣乘心也。當以安神丸主之。若浴後拭臍不乾。風入作瘡。令
兒撮口甚者。是脾虛也。若頻撮口。是氣不和也。弄舌熱者。脾臟微熱。令舌絡牽緊。時時舒熱。或飲水者。
脾胃虛而津液少也。兼面黃肌瘦。五心煩熱者。疳積也。大病未已而弄舌者。凶。解顧者。生下顎門不合。
也長必多愁少笑。目面精多。面色㿠白。或體消瘦。昏腎虛也。胎肥者。生下豐厚。目睛粉紅。大便乾難。時
出涎水。胎熱者。生下有血色。時叫哭。身熱淡黃。目睛多赤。大便色黃。急欲食乳。並用浴體法主之。胎
怯者。生下面白。肌肉瘦弱。大便白水。身無血色。哽氣多噦。亦用浴體法。急欲乳不能食者。此風邪由腑
而蘊熱心脾。致舌厚唇燥。不能吮乳也。龜胸龜背者。由兒生下風客於脊。入於骨髓。致成龜背。若肺熱
脹滿。攻於胸膈。即成龜胸。並用龜屎點其骨節自愈。取尿法用青蓮葉安龜在上用鏡照之其尿自由而出
有聲而不能言。又能咽物者。非失音。此腎怯不能上接於陽也。凡口噤不止。則失音語遲。若大病後身
目皆黃者。黃病也。身病背強。大小便澀。一身盡黃。小便黃赤。此黃疸也。瀉者難治。若百日。或半年。不
因病而身黃者。胃熱胎疸也。若淡黃兼白者。胃怯也。長大不行。行則脚軟。齒久不生。生則不固。
髮久不生。生則不黑。皆胎弱。

小兒方

瀉青丸 治肝經實熱驚癇撮口

羌活壬乙同歸一大黃瀉諸大黃。苦寒入手足太陰。除熱。甘芻辛以緩肝。山楂仁瀉心火實則瀉其子。龍膽草炒益肝胆。當歸以足厥陰血。防風等。右為末。煉蜜丸。大實。每服半丸。竹葉湯入砂糖化下。

導赤散 治小腸實熱小便祕赤

生地黃

心與小腸之熱故
水通利小腸之熱故
錢氏用以導赤

甘草

生火
等分
經水煎

生犀散 治心經虛熱

地骨皮

赤芍藥

柴胡

乾葛各一

甘草五錢

犀角二錢

丹溪云犀角痘後用以散餘毒無毒

而血虛者非宜

右為末每服一二錢水煎

鴉黃散

治脾胃虛熱

藿香葉

入手足太陰經
助脾胃止嘔

甘草各七錢

石膏五錢

瀉胃火
一兩治胃火

山梔仁一兩

治風三兩

右用蜜酒微炒為

末每服一二錢水煎

五味異功散 治脾胃虛弱吐瀉不食

人參

茯苓

白朮

甘草炒

陳皮各等

右為末每服三錢薑棗水煎

益黃散 治脾土虛寒嘔吐泄瀉

陳皮

青皮

下食入大陰之倉

丁香各二錢

去寒去口氣
脾胃中寒

诃子肉五錢能開胃

甘草錢消食止痢

三錢

右為末每服一二錢水煎

瀉白散 治肺經實熱咳嗽痰喘

桑根白皮

炒瀉肺氣之有餘者
有餘者邪有餘也

地骨皮各兩

一甘草錢

右為末每服一二錢水煎

阿膠散 治肺虛咳嗽口乾作渴

明阿膠

一兩炒能補氣不足

甘草錢

一馬兜鈴五錢主肺熱

咳清肺補肺

糯米一兩

杏仁七粒去皮尖

下用治氣也

鼠粘子二錢

右為末每服二錢水煎

地黃丸 治腎虛解癰或行遲語遲等症

熟地黃

八錢酒洗益腎
水真陰補血虛

山茱萸肉

添精乾山藥涼腎
陰中之火治

足少陰無汗之骨蒸

白茯苓入土炒

牡丹皮

右地黃杵膏。餘為末。加煉蜜丸如桐子大。每服二三十丸。空心白湯送下。

四君子湯 治脾氣虛弱。飲食不化。腸鳴泄瀉。或嘔吐逆。

人參

白茯苓

甘草
炙各一錢

水煎服。

四物湯 治肝經血虛發熱。日晡益甚。或煩躁不寐。

當歸

熟地黃
兩

白芍藥
一錢

芎藭
五分

右作二劑水煎服。

八珍湯 治氣血俱虛。或因失血過多。或因耗伐元氣。以致內熱發熱。肢體瘦痺。即四物四君子二湯合服。

十全大補湯 治氣血虛熱。或因病後惡寒發熱。或自汗盜汗。食少體倦。或發熱作渴。頭痛眩暈等症。即八珍湯加黃耆肉桂。

六君子湯 治脾胃虛弱。體瘦面黃。或久患瘧疾。不思乳食。或嘔吐泄瀉。飲食不化。或時患飲食停滿。或母有前症。致兒為患。

人參

白朮

茯苓
錢二

陳皮

半夏

甘草
炙各一錢

右每服二三錢。薑棗水煎。

補中益氣湯

治中氣不足。困倦發熱。或元氣虛弱。感冒風寒諸症。或乳母勞役發熱。致兒為患。

黃耆
炙

人參

白朮
炒

甘草
炙

當歸

陳皮
各五分

升麻

柴胡
各二分

右七味加薑棗水煎。

香砂助胃膏 治胃寒吐瀉。乳食不化。

人參

白朮
炒

白茯苓
錢五

甘草

炙

丁香
各一錢

去砂仁
四十粒下

白豆蔻

十四粒寬胃緩脾。胃進食

肉

豆蔻
四個煨溫中補脾。下氣運化。乾山藥一兩

右為末。煉蜜丸如實大。每服二三丸。米飲磨化。

肥兒丸 治食積五疳項結核。髮稀成穗發熱作渴等症

黃連炒

神曲炒

木香各一兩

五錢

柏子仁二十個

肉豆蔻二兩

史君子酒浸

麥芽炒各四兩

右為末麵糊

白粉散

右為末

丸如麻子大。每服三五十丸。米飲下。良久用五味異功散一服。以助胃氣。

九味蘆薈丸 治肝脾疳積體瘦熱渴。大便不利。或瘰疬結核。耳內生瘡等症

蘆薈

胡黃連

黃連

木香

蕪荑炒

青皮

白雷丸

鶴虱草各一兩

麝香三錢

右為末

右為末。蒸餅糊丸如麻子大。每服一二錢。空心白湯下。

木香丸 治冷疳

木香

青黛

柏子仁

肉豆蔻

麝香各一錢半

續隨子一兩

去油

蝦蟆三個燒存性

右為末蜜

丸如菉豆大。每服三五丸。煎薄荷湯下。

胡黃連丸 治熱疳

胡黃連

黃連各五錢

砂石研

另研

右為末填入豬膽內。以線繫懸挂鍊中。淡漿水煮。數沸取出研

入蘆薈麝香各二錢。飯和丸如麻子大。每服一二十丸。米飲下。

如聖丸 治冷熱疳

史君子取肉

胡黃連

川黃連

白蕪荑各二錢

麝香五分

另研

乾蝦蟆一個酒

膏杵丸 麻子大。每服一二十丸。煎人參湯下。

蘭香散 治鼻疳赤爛

蘭香葉二錢

燒灰

銅青

分

為末乾貼

白粉散 治諸疳瘡

海螵蛸三分 白芨二分 輕粉一分 右為末先用漿水洗拭乾貼

蟾蜍丸

治無辜疳症一服虛熱退二服煩渴止三服瀉利愈

蟾蜍

一枚夏月溝渠中取腹大不跳不鳴身多癟者

右取糞蛆一杓置桶中以尿浸之却將蟾蜍跌死投與蛆食一晝夜

用布袋盛蛆置急流中一宿取出瓦上焙乾為末入麝香一字粳米飯丸麻子大每服二三十丸米飲下其效如神

蕪荑散 治蟲動口內流涎

白蕪荑

乾漆炒黃各等分右為末每服五六分米飲下

安蟲散 治蟲動心痛

胡粉炒黃各等分

檳榔 川練子 鶴虱各二錢

枯白礬各二錢右為末每服五六分痛時米飲調下

白玉散

五分治丹癰

柳華散

治熱毒口瘡

白土二錢

寒水石五錢為末用米醋或新水調塗

黃柏炒

蒲黃

青黛

人中白研各等分

為末敷

仙方活命散

治一切瘡毒未成內清已成即潰此消毒排膿止痛之聖藥也若膿出而腫痛不止者元

氣虛當補之

穿山甲

白芷

防風

沒藥

甘草

赤芍藥

歸尾

乳香

花粉

貝母各一錢

金銀花

陳皮各三錢

皂角刺二錢

右每服二三錢酒水各半煎

消積丸 治食積大便酸臭發熱

丁香九粒 縮砂十二粒 巴豆二粒去皮心膜 烏梅肉三個 右為末麵糊丸黍米大。每服五七丸溫水下。

保和丸 治食積

山楂二兩 神曲二兩 半夏

茯苓各二兩 陳皮

連翹

蘿蔔子各五錢

右為末粥糊丸如桐

子如每服二十丸白湯下。

四神丸 治脾腎稟虛泄瀉不食。或乳母患此致兒為患。

肉豆蔻二兩

補骨脂四兩

五味子二兩

吳茱萸一兩

右為末用水二盞生薑八兩紅棗一百枚煮

熟用爾肉和末丸如麻子大。每服二三十丸空心食前白湯下。子母並服。

五苓散 治霍亂吐瀉煩渴飲水小便不利。

澤瀉五錢

豬苓

官桂

赤茯苓

白朮各三錢

右為末每服一二錢白湯調下。

白虎湯 治傷暑煩燥身熱痰盛頭痛口燥大渴。

知母一兩

石膏四兩

白梗米八錢

甘草炙五錢

右為末每服一二錢水煎。

地黃清肺飲 治肺疳咳嗽痰唾稠粘。

阿膠一錢

麯炒鼠粘子二分

馬兜鈴

甘草各五錢

杏仁皮尖七枝去

糯米十粒

右每服一錢水煎此方似脫地黃

參蘇飲 治感冒風寒或腹脹少食泄瀉嘔吐或手足並冷喘促痰涎。

阿膠一兩否則即前

阿膠散方矣

人參

紫蘇

陳皮

半夏

茯苓

枳殼麸炒

桔梗炒

前胡

乾葛

甘草

炒谷

木香三分

為末每服一二錢水煎。

小柴胡湯 治傷寒溫熱。患身熱惡風頭痛項強四肢煩疼。寒熱往來嘔吐痰實。及治中暑病瘧。

柴胡八錢半夏湯泡黃芩

人參各三錢甘草二錢

右每服一二錢薑棗水煎

加味道遙散治乳母肝脾氣血虛弱發熱致兒爲患

當歸

白朮

茯苓

芍藥炒黃各一錢

柴胡

牡丹皮

山楂炒

甘草

水煎服

龍膽瀉肝湯

酒炒龍膽草五分

車前子炒木通

歸尾

澤瀉

甘草

龍膽瀉肝湯

酒炒龍膽草五分

車前子炒木通

歸尾

澤瀉

甘草

水煎服

苗陳湯

治身熱鼻乾汁出二便赤澀濕熱發黃

苗陳六錢

梔子二個

大黃二錢每服一錢水煎

黃連香薷飲

香薷四兩

厚朴二兩黃連

右每服一二錢將朴連同生薑炒令紫色入香薷水酒各一盞煎冷服

金匱加減腎氣丸治脾胃虛腰重腳輕小便不利或肚腹脹脹四肢浮腫喘急痰盛已成蠱者此症多因脾胃虛弱治失其宜元氣復傷而變者非此藥不救

白茯苓三兩

附子炮五錢各一兩

川牛膝肉桂澤瀉車前子山萸肉山藥牡丹

皮各一熟地黃四兩酒拌杵膏

右為末和地黃膏加煉蜜杵丸如桐子大每服二十丸空心米湯下

五色丸治五癆

硃砂

真珠各五錢

水銀雄黃各一錢黑鉛銀結成砂

三兩同水

右為末煉蜜丸麻子大每服三四丸煎

銀花薄荷湯下

斷癰丹治癰差後變症不止

黃耆蜜炙
鈎藤鈎

細辛

甘草

炙各五錢
五錢
炙退酒炙
四個牛黃一字
右研

右為末煮棗肉為丸。

麻子丸 每服五七丸人參煎湯下
福銀丸 治風涎膈熱及乳食不消腹脹喘促

巴豆

水銀

各五錢

京墨

火燒黑鉛

二錢半

麝香

五分另研

右為末陳米粥丸如菉豆大

每服二

三丸煎薄荷湯下

利驚丸 治急驚

天竺黃二錢輕粉

青黛

各一錢

黑牽牛

炒五錢

右為末蜜丸豌豆大

每歲服一丸薄荷湯化下

小續命湯 治中風不省人事涎鳴失音肢體張或時厥冷

麻黃去節人參

黃芩

苦翁

芍藥

甘草

杏仁去皮

漢防己

官桂

尖研

漢防己

甘草

錢五錢

甘草炙

防風七錢附子

泡去皮

二錢

右各另為末和勻

每服一錢

薑棗水煎

有熱減桂附

鈎藤鈎飲 治吐利脾胃虧損虛風慢驚

鈎藤鈎三分蟬蛻

防風炒

人參

麻黃

白僵蠶炒

天麻

蝎尾

去毒炒

甘草

炙

芎藭各二錢麝香

一錢另研

為末

每服一二錢

水煎

大青膏 治傷風吐瀉身溫氣熱驚搐

天麻一白附子

乾竭去毒烏梢蛇

肉酒殊砂

天竺黃二錢

麝香二分

右為

末生蜜和膏每服一豆粒許月中兒用半粒薄荷湯化下

百祥丸 治痘瘡黑陷及噦而吐青綠水

紅芽大戟

陰乾漿水煮軟去
骨復入原汁中煮

右培乾為末水丸粟米大

每服十九赤芝麻湯送下

牛李膏 治痘瘡黑陷

牛李子一味杵汁石器內熬膏每服皂子大煎告膠湯化下

雄黃散 治痘後牙齦生瘡蝕瘍

雄黃一錢 銅綠二錢 同研細量瘡大小乾擦其上

歸脾湯 治乳母脾經氣鬱致兒夜患

人參 白朮 茯苓 黃耆

龍眼肉各二錢 遠志一錢 酸棗仁

木香

甘草三分

右薑棗水煎服加柴胡山楂名加味歸脾湯

越鞠丸 治乳母六鬱傳兒為患或胸滿吐酸澀痛瘡疥等症

蒼朮 神曲炒 香附子

山楂炒 茯苓

麥芽炒各

右為末水調神曲糊

丸桐子大每服二三十丸白滾湯下子母並服

安神丸 治邪熱驚啼心肝壯熱面黃煩赤

麥門冬去心 牙硝

白茯苓 乾山藥

寒水石

甘草各五錢

硃砂

一兩

龍腦二分

右

為末煉蜜丸芡實大每服半丸砂糖水化下

花火膏 治夜啼

燈花一顆塗乳上令兒吮之

蟬蛻鈎藤散 治肚疼驚啼

鉤藤

天麻 茯苓 菖蒲

白芍藥各二錢

甘草

蟬蛻一錢

燈心湯下

羚羊角丸 治行遲

羚羊角 鎏 虎脰骨 醋炙 生地黃 培 酸棗仁 白茯苓 鎏 五肉桂 防風 當歸

黃耆各二錢 右為末。煉蜜丸。每服一皂子大。白湯化下。

止汗散 治睡而自汗。

故蒲扇一把燒存性研為末。每服三錢。溫酒調下。

當歸六黃湯 治血虛不足。虛火內動。盜汗不止。

當歸 熟地黃 黃耆炒 黃柏炒黑 俱黃芩 黃連 生地黃各等 每服二錢。水煎服。

團參湯 治心血虛熱。自汗盜汗。

人參 當歸各等 右用猪心一片。每服三錢。水煎服。

參附湯 治稟賦不足。上氣喘急。自汗盜汗。或病久陽氣脫陷。急宜服之。

人參五錢 附子泡一兩 每服一錢。薑水煎。

人參養榮湯 治肺脾俱虛。發熱惡寒。肢體瘦倦。食少。作瀉。或久病虛損。口乾食少。效而下痢。驚熱。自汗。

白芍藥 一錢

人參

陳皮

黃耆蜜炙

桂心

當歸

白朮炒

甘草一錢

熟地黃

五味子

杵炒各七分

遠志

五分

每服二三錢

薑棗水煎。

浴體法 治胎肥胎熱胎怯。

烏蛇肉酒浸培

白礬

青黛各三錢

天麻二錢

蝎尾去毒。硃砂各五錢。香半分

右為末。桃枝一握水

煎浴之。勿浴背。

神效當歸膏 治跌撲湯火等瘡。不問已潰未潰。

當歸

黃蠅

生地黃各一兩

麻油六兩

右先將當歸地黃入油煎黑去渣。入蠅頭化候冷擣。

丸即成膏矣。以上皆直訣所載之方。以下諸方皆取別本附入者。

保命散祕方 治一切急驚慢驚。痰涎湧塞。手足抽搐。目直神昏。夜啼晝倦。吐乳瀉白。種種惡症。

珍珠

牛黃各三錢

琥珀五分

膽星

白附子

蟬蛻炙

天蠅

茯苓

皂角

礞石三錢水片

麝香各三錢

右為末和勻。

每服一二分。

或用神龜糊丸。

麻子大。

每服一二十丸。

天麻三錢

全蝎十個

酒焙

量兎大小加減。

鈎藤一錢薄荷三分

泡湯下。凡小兒有病。即宜少與乳食。若似驚風。即宜斷乳。如欲食。

與米飲一勺。必欲食乳。須先將乳擠空。然後以空乳令吮。否則乳下喉中。即成頑痰。雖神丹無效。俟少安漸與乳可也。

治疳積方 不落水雞肝酒洗同黃蠟一錢頓熟去蠟吃。

治赤痢方

寒水石

黃柏

黃連

大黃

鉛粉

枯礬

白芨粉

冰片

青黛

藥隨舉幾味研麻油調塗

治癩出眼中方

取田雞膽點之愈。

治癩方 不拘頭面遍身痛癢。黃水出。俱效。

黃連一兩

蛇牀子五錢

五倍子一兩

輕粉三錢

黃柏五錢

枯礬五錢

川椒二錢

冰片一錢

同研麻

油調塗

治骨蒸方

銀柴胡八分

鮮骨皮一錢

酒澆真青蒿八分

川連五分

犀角五分

丹皮五分

甘草三分

元參一錢

竹葉廿片

蘆根一兩水煎服

治遺尿方新書幼幼

雞胫骨一具炙桑螵蛸三枝炒甘草三分炙黃耆一分壯蠅各五錢煨為粗末每用一錢水一盞煎去渣服

治牙疳方

人中白一錢枯礬三分紅褐色燒一錢雞肫皮二錢煨霜梅八分雄黃五分硼砂五分銅青三分右為末煎濃茶調搽吐出涎

治吐乳方

新書幼幼

蓮子心七枚培丁香三粒人參三分右同研乳汁浸令兒吮食


治螳螂子方


即妬乳也

青黛一錢元明粉三錢硼砂一錢薄荷五分冰片一分右同研細擦口內兩頤吐出涎一日用四

五次自古無螳螂子之病凡小兒變蒸之候每有口內微腫惡乳之時名曰妬乳不治自愈其或不能坐視則用此方塗口亦易愈近日海濱妓婦造割螳螂子之法以騙人取利強者幸愈弱者俱死惟松江蘇州最甚其害蓋小兒兩頤內外皮有兩層中空處有指膜一塊人人皆然割去復生妓婦以此惑人見果有如螳螂子者遂相信不疑死而不悔深可憐除蘇松之外天下並無有生螳螂子而死者斷不可為其所愚而受害也

損小兒股內無力因跌而起一足不伸臂左右大小不同腰脊歪斜脊骨高起俱屬不治或久而成毒亦為廢人





H87378h
1907
v.9