

M Chinese

Vol. VI.

v. b

66

6



醫學正傳卷之六目錄

便濁遺精門

五十六

論

治便濁丸藥方

二陳加升提藥方

丹溪方法凡十九條

半苓丸

虛癆便濁方

珍珠粉丸

燥濕痰白濁方

妙香散

秘真丸

草薢分清散

治濁固本丸

九龍丹

水陸二仙丹

定志珍珠粉丸

丹溪活套

祖傳經驗秘真丹

已試醫驗一條

淋閉門

附關格

論

脉法

丹溪方法凡九條

參苓琥珀湯

琥珀散

傷寒後脫陽方

老人氣虛淋閉方

小便黃澁方

下焦無血小便澁方

通關丸即滋腎丸

清肺飲子

導氣除燥湯

腎疽湯

小薊湯

八正散

牛膝膏

伏苓湯

倒換散

葵子散

濟生葵子散

琥珀散

鐵服丸

廣濟雞蘇飲子

又方治小便不通

集驗治小便淋瀝方

石葦散

祖傳經驗方

治小便溺血方

又治溺血方

治沙淋莖痛方

孕婦轉胞方

又治血淋方

附關格証

難經法語

已試醫驗一條

附丹溪關格方法凡三條

祖傳經驗方

秘結門五十八

論

脉法

丹溪方法凡二條

脾約丸

通幽湯

潤燥湯

潤腸丸

麻黃白朮湯

升陽瀉熱湯

活血潤燥丸

潤腸湯

潤體丸

備急大黃丸

枳殼丸

枳實導滯丸

已試醫驗

二條

黃疸門 五十九

論

治黃疸方

大溫中丸

大黃柏梔芒硝湯

治酒疸方

胃苓湯

茵陳茯苓湯

茵陳蒿湯

茯苓滲濕湯

葶苈苦參散

針砂丸

祖傳經驗褪金丸

瘡瘍門 六十

論

脈法

丹溪方法二十二條

脈法

丹溪方法五條

又治氣實黃疸方

調胃承氣湯

小溫中丸

又治痘法語凡四條

硝石礬石散

茯苓湯

腎痘湯

梔子大黃湯

茵陳大黃湯

小茵陳湯

當歸白朮湯

綠礬丸

已試醫驗一條

瘡瘍門 六十

取剩骨法

升陽益胃散治背疽

當歸羌活湯治腦疽

檳榔散飲瘡口

千金托裏散治背疽

丹溪治背疽方

丹溪治附骨疽法

羌活防己湯治附骨疽

丹溪治背疽方

內托黃芪酒煎湯

黃連消毒飲治附骨疽

內托黃芪柴胡湯治附骨疽

丹溪治臂癰方法

內托羌活湯治臂癰

丹溪治內疽方法

丹溪治肺癰方法

又治肺癰方法

黃昏湯治肺癰

葶苈大棗湯治肺癰

葶葉湯治肺癰

桔梗湯治肺癰

又治肺癰方法

又治肺癰方法一條

吐膿血如肺癰方

祖傳經驗治肺癰方

丹溪治腸癰方法

千金論腸癰法語

要畧治腸癰方

腸癰灸法

薏苡附子敗醬散

大黃牡丹湯

已試醫驗一條

丹溪治乳癰方法

治乳癰方

又治乳癰方法

升麻托裏湯

程石香治妳岩法

十六味流氣飲

單煮青皮湯

橘葉散

丁香散治妳頭破裂

丹溪治囊癰方法

癰疽入囊方

野紫蘇治囊癰方

丹溪治便毒方法

又治便毒方

又便毒成膿方

石香程氏便毒方法

蘇方木散治便毒

王燭散治便毒

牡蠣大黃湯治便毒

丹溪治療瘻方法三條

治血少馬刀瘻方

程石香論治瘻方法

蟾酥膏治瘻

綠雲膏治瘻

金寶膏治瘻

龍珠膏治瘻

救苦化堅湯

柴胡連翹湯

消腫湯

柴胡通經湯

散腫潰堅湯

升陽調經湯

連翹散堅湯

龍泉散

三聖丸

立驗大聖散

玉屑妙靈散

六丁神散以上二十一俱治瘻

濟生破結散治瘻瘡

南星散治瘻

又治瘻方法

龍珠膏見前條

流氣飲見前條

丹溪治瘻氣方法

丹溪治結核方法

又治臂核方

耳後頸門有核方法

程石香論疔腫方法

返魂丹

拔疗法

奪命丹

雄黃丸

化毒丸

獨蟾丸

雄麝湯

賀藍先生解毒丸

萬病解毒丸

千金漏蘆湯

取疔腫方

破毒散

灸疔腫法

祖傳經驗秘方

活魂丹治惡瘡

治諸惡瘡方

又治諸惡瘡方

又治惡瘡方

天泡瘡方凡二條

脚上沙瘡方

裏外臙瘡方凡四條

桃花散生肌長肉

火燒湯泡瘡方

又治火燒湯泡瘡方

下疳瘡方凡三條

頭瘡方

金絲瘡方

手癰瘡方

沙瘡方

瘡痛不可忍方

疥瘡方

白癩風癬方

風癬疣瘡方

癬瘡方

身虛痒方

又通身虛痒方

秘傳一擦光方

又治疥瘡及癩頭方

五香連翹湯

內托復煎散

白芷升麻湯

托裏散

又托裏散

烏金散

黃芪六一湯

治一切瘡癥方

內托護心散

小五香湯

復元通氣散

金銀白芷散

正鐵箍散

大鐵箍散

三消散

雲母膏

太乙膏

神異膏

祖傳萬能青雲膏

又經驗治癰腫方

豨莶散

又治諸般癰腫神妙方

癩風門六十一

論

脉法

丹溪方法凡五條

換肌散

醉仙散

通天再造散

愈風丹

一家治癩疾方

又一家治癩疾法

又治手指挛曲法

加減通聖散

神仙紫花丸

治跌撲傷損方

治骨損方

元戎接骨丹

論損傷宜補氣血

治金瘡方

又治金瘡方

治損傷腹痛方

當歸導滯湯

雞鳴散

沒藥乳香散

枝丹膏藥方

河間沒藥散

破傷風門六十二

論

脉法

丹溪方法一條

羌活防風湯

白朮防風湯

小芎黃湯

太芩黃湯

發表雄黃散

大蠍蛇散

大羌活湯

防風湯治破傷風

小蠍蛇散

左龍丸

小羌活湯

養血當歸地黃湯

雄黃散發表藥

地榆防風散

白朮湯

江鯨丸

祖傳經驗秘方

已試醫驗一條

附翻花瘡

醫學正傳卷之六

花溪恒德老人虞搏天民編集

便濁遺精

五十六

論

內經曰諸轉反戾水液渾濁皆屬於熱夫便濁之証因脾胃之濕熱下流滲入膀胱故使便濁或白或赤而渾濁不清也原病式曰如夏月天氣熱甚則水液渾濁淋木流津是也血虛而熱甚者則為赤濁此心與小腸主病屬火故也氣虛而熱微者則為白濁肺與大腸主病屬金故也丹溪曰大率多是濕痰流注宜燥中宮之濕又曰治宜燥濕降火兼升舉之法此皆至要之語也外有遺精滑泄之候與濁相類不可一例而推夫遺精者多夢與鬼交而泄名曰夢遺或隨溲溺而出謂之精滑亦有思想無窮所願不遂而得之者治宜安心神以降火又有因好色太過房勞致虛而得之者治法宜滋水臟以復真陰是皆千古不易之定論也學者詳之

脉法

兩尺脉洪數必便濁失精

女人尺脉濁而弱者或洪數而促者皆為便濁白帶

心脉短小因心虛所致必遺精便濁

方法丹溪方法

凡十九條

丹溪曰便濁屬濕熱有痰有虛亦屬血由小腸屬火故也

白屬氣由大腸屬金故也

大率皆是濕痰流注宜燥中宮之濕亦者乃是濕傷血

胃中濁氣下流滲入膀胱

肥白人多痰治宜燥濕降火兼升提之大法二陳湯加二木升柴赤者加白芍藥煎服一人便濁嘗有半年或時夢遺形瘦作心虛主治以珍珠粉丸和定志丸服效

方見性

仲門

夢遺主熱精滑主濕熱熱則流通故也

內傷氣血虛不能固守當補以八物湯加減吞樗木根丸

大法用青黛海石黃柏

精滑用知母黃柏降火牡蠣蛤粉燥濕白濁同法治

一方用良薑三錢芍藥黃柏炒焦各二錢樗根白皮一兩五錢為末糊丸每服三十九思想而得病在心治當安心神以帶補一法用溫膽湯去竹茹加人參遠志蓮肉酸棗

仁荻神煎服

一方治便濁丸藥

樗白皮

黃柏炒

青黛

乾薑炒

滑石

蛤粉炒各等分

神麵糊為丸服之

藏氏曰黃柏治濕熱青黛解熱蛤粉鹹寒入腎滑石利竅炒乾薑味苦斂肺氣下降使陰血生且能監制

二陳湯治濁加升提之藥使大便潤而小便長

珍珠粉丸治精滑白濁等証

黃柏

真蛤粉各一斤

珍珠三兩一方無此味而有青黛等分

右為末水和丸如梧桐子大每服一百丸空心溫酒下或加樗根白皮滑石青黛等藥

半芩丸治白濁

神麵

半夏燥濕

猪苓分水等分

麵糊丸服

虛勞者用補陰藥胃弱者兼用人參及升麻柴胡升胃中之清氣

張子元氣血兩虛有痰便濁陰火痛風

人參一兩 白术五錢

熟地黃

黃柏炒黑色各二兩

山藥 海石

瑣陽各五錢

乾薑五錢存性燒

南星研裂一兩 龜板酥炙二兩

熟地黃

黃柏炒黑色各二兩

右為細末酒麴糊為丸如梧桐子大每服一百丸薑鹽湯下

燥濕痰治白濁方如肝脉弦者須以青黛瀉肝大概不可純用涼藥盧氏曰病因濕熱

專用寒涼藥故用炒柏之類又以乾薑之溫而佐之也

妙香散治心虛遺精白濁

麝香一錢另研 人參五分

木香二錢五分研

茯苓

茯神

黃芪

遠志去心炒各一兩

桔梗

甘草各五錢

辰砂二錢另研

山藥二兩薑汁研

右為細末每服二錢溫酒調服不拘時

祕真凡治思想無窮所願不遂意淫於外入房太甚宗筋弛縱發為筋痿及為白淫及白物隨溲而下或夢與陰人通泄耳

白龍骨一兩另研

訶子皮大者五枚

縮砂仁五錢去殼

硃砂一兩另研以一分為衣

右為細末麪糊為丸如黍豆大每服一丸空心溫酒下冷水亦可不可多服太秘或用葱白茶湯下

萆薢分清飲治真元不足下焦虛寒小便白濁頻數無度旋面如油光彩不定旋脚澄下凝結如膏糊之狀

石菖蒲

烏藥

益智仁

川萆薢

白茯苓各一錢

甘草梢五分

右細切作一服水一盞半入鹽一錢煎至一盞空心服

治濁固本丸

蓮花鬚

黃連炒各二兩

白茯苓

砂仁

益智

半夏湯泡七次去皮臍

黃柏炒各二兩

甘草炙三兩

猪苓二兩五錢

為末蒸餅為丸空心溫酒下五十丸

九龍丹治精滑

枸杞子

金櫻子

山果子又名

蓮肉

佛座鬚蓮花心也

熟地黃

芡實

白茯苓

川歸各等分

右為末酒麯糊為丸如梧桐子大每服五十丸或酒或鹽湯送下如精滑便濁者服二三日溺清如水飲食倍常行步輕健婦人厭產者二三服便住孕如仍欲產服有利之藥

水陸二仙丹治遺精白濁夢泄脫精等証

金櫻子一斗

芡實二斤

右以芡實去殼杵為細末取金櫻子黃熟者用籃盛於水中杵去刺又於石臼中杵碎去核淨再杵細絞取自然汁煎熬成飴糖和芡實末為丸如梧桐子大每服五七十九空心薑鹽湯送下

定志珍珠粉丸治心虛夢泄

人參

白茯苓各三兩

遠志去心

石菖蒲各二兩

海蛤粉

黃柏炒焦色各三兩

樗根皮二兩

青黛二兩

右為細末麯糊為丸青黛為衣如梧桐子大每服五十九空心薑鹽湯下  
丹溪活套云赤白濁乃胃中痰積下流滲入膀胱宜用二陳湯加升麻柴胡防風之類以提之肥白人屬濕熱加蒼朮白朮炒黃柏黃荆子之類或有挾寒者本方加炒乾薑肉桂

甚者加附子 有心虛不能固守及平素虛寒之人本方加草薢石菖蒲益智炒乾薑  
牡蠣龍骨之類 氣虛者本方加黃芪白朮人參或加附子之類 赤者多有血虛瘦  
弱之人得之宜四物湯加酒知母酒炒黃柏煎湯送下珍珠粉丸 赤白濁小腹疼痛  
不可忍者宜作寒治東垣酒煮當歸丸最妙方見婦人門

祖傳經驗秘真丹治好色腎虛遺精夢泄白淫白濁等証

兔羔子酒浸炒

韭子炒

柏子仁各一兩

龍骨煅

牡蠣煅醋淬

山茱萸去核取肉

赤石脂各五錢煅

補骨脂一兩炒

遠志去心

巴戟去心

覆盆子

枸杞子

黃柏黑色鹽酒炒

山藥各七錢

芡實去殼

杜仲鹽汁炒熟各一兩

金櫻子半青黃者去刺核取肉焙乾二兩

乾薑一兩

炒黑色

鹿角膠一兩五錢炒成珠

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服一百丸空心薑鹽湯下

蓮塘朱顯二里病遺精潮熱不起牀三月矣召予治脉之左右寸關皆浮虛無力兩尺洪  
大而軟與補中益氣湯加熟地黃知母苗柏地骨皮煎吞下珍珠粉丸外做小箋籠一  
箇以籠陰莖勿使搭肉服藥三十餘貼一月平安

淋閉門

五十七附闕格

論

內經曰飲食入胃游溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺通調水道下輸膀胱夫膀胱者主足太陽寒水之化其體有下口而無上口者也長生在申是故西方肺金以為之母而資其化也肺金清肅則水道通調而滲營於下耳然肺金又藉脾土健旺以資化原而清氣得以上升而歸於肺以運行也故經又曰清陽出上竅濁陰出下竅故清陽不升則濁陰不降而成淋閉之患矣先哲以滴水之器譬之上竅閉則下竅不出此理甚明故東垣使父百會穴丹溪使吐以提其氣之橫格是皆開上竅之法也原其為病之由皆膏粱之味濕熱之物或燒酒炙肉之類鬱遏成痰以致脾土受害之力不能運化精微清濁相混故使肺金無助而水道不清漸成淋閉之候或謂用心太過房勞無節以致心腎不交水火無制清陽不升濁陰不降而成天地不交之否皆先哲之法言也古方有五淋之別氣砂血膏勞是也若夫氣淋為病小便澁滯常有餘瀝不盡砂淋為病陰莖中有砂石而痛溺不得卒出砂出痛止膏淋為病溺濁如膏勞淋為病遇房勞即發痛引氣衝血淋為病遇熱則發甚則溺血候其鼻準色黃者知其為小便難也東垣分在氣在血而治之以渴與不渴而辨之耳如渴而小便不利者熱在上焦氣分肺金主之宜用淡滲之藥茯苓澤鴻琥珀燈心通草車前子瞿麥篇蓄之類以清肺金之氣濁其火以滋水之上源也不渴

而小便不利者熱在下焦血分腎與膀胱主之宜用氣味俱陰之藥知母黃柏之類滋腎丸是也除其熱泄其閑塞以滋膀胱腎水之下元也治淋之法無越於此學者不可不知

脉法

脉經曰少陰脉數婦人則陰中生瘡男子則為氣淋脉細而數 脉盛大而實者生虛細而澁者死

方法丹溪方法

凡九條

丹溪曰淋雖有五皆屬於熱宜解熱利小水山梔子之類不可發汗汗之必便血

老人氣虛淋閉參水中帶木通梔子之屬

有腎虛極而淋者當補腎精而利小便不可獨用利水藥

有死血作淋者用牛膝膏一云牛膝膏能損胃不食宜斟酌用之

一方治淋用益元散加梔子仁木通或用梔子一合炒為末白湯調下夏月以茴香煎湯調益元散服效

痰熱隔滯中焦淋澁不通二陳湯煎大碗頓服探吐之以提其氣

淋澁有血因火燥下焦無血氣不得降而滲泄之令不行也宜補陰降火以四物湯加

知母黃柏或用四物湯煎下滋腎丸

陰莖痛乃厥陰氣滯兼熱用甘草梢益緩其氣耳

小便因熱鬱成淋不通用赤茯苓黃芩澤瀉車前子麥門冬肉桂滑石木通甘草梢氣虛者加黃芪木香淋痛加黃柏生地黃夏月煎調益元散

參苓琥珀湯治小便淋澁莖中痛相引脇下痛不可忍者

人參

茯苓各五分

川棟子去核

生甘草梢

玄胡索各七分

琥珀

柴胡

川歸尾

澤鴻各三分

右細切作一服水一盞半加燈心十數莖煎至一盞服

琥珀散治五種淋澁疼痛小便有膿血出証

琥珀

沒藥

海金沙

蒲黃各一兩

右為細末每服三錢空心煎薑草湯調下

傷寒後脫陽小便不通用生薑自然汁調茴香末敷貼小腹上又服益智茴香丸調益元散送下

老人氣虛而小便不通四物湯加黃芪人參杏仁滋腎九下焦血氣乾者死  
小便黃用黃柏如滌數加澤鴻若濕熱流注下焦而小便黃亦滌數用梔子澤瀉切當

濕多者宜用滑石利之

下焦無血小便澁數而黃者用四物湯加黃柏知母牛膝甘草梢  
通關丸即滋腎丸治不渴而小便閉熱在下焦血分

黃柏

酒洗  
焙乾

知母

酒洗  
焙乾  
各一兩

肉桂

五分

右為細末熟水丸如梧桐子大每服一百丸空心白湯下服後須頓兩足令藥易下行也如小便已利莖中如刀刺痛當有惡物下為驗  
清肺飲子治渴而小便閉澁不利邪熱在上焦氣分

燈心

一分

通草

二分

澤瀉

瞿麥

琥珀

各五分

萹蓄

去皮  
一錢

木通

各七分

車前子

炒另研

茯苓

去皮

猪苓

去皮  
一錢

右細切作一服水一盞半煎至一盞空心稍熱服

導氣除燥湯治小便閉塞不通乃血澁致氣不運而竅滯也

茯苓

去皮

滑石

各一錢  
浸炒

知母

去毛  
酒

澤瀉

各一錢

黃柏

酒二錢  
炒

右細切作一服水二盞煎至一盞空心稍熱服

腎瘡湯治腎瘡目黃甚至渾身黃小便赤

羌活

防風

藁本

獨活

柴胡各五分

升麻一錢以上治

目黃渾身黃

白茯苓二分

小便已上治

澤瀉三分

豬苓四分

白术五分

目黃渾身黃

蒼朮一錢已上治

小便已上治

黃柏二分

人參三分

葛根五分

神曲六分

甘草五分

右細切作一服水二盞煎至一盞食前稍熱服

小薊湯治下焦熱結血淋

生地黃

小薊根

通草

滑石

梔子仁

蒲黃炒

淡竹葉

當歸梢

生鷄節

甘草梢各五分

右細切作一服水煎空心服

八正散治大小便俱閉

大黃

瞿麥

木通

滑石

篇蓄

車前子

梔子仁

甘草各等分

右細切每服五錢重入燈心七莖水煎服

牛膝膏用川牛膝一合細切以新汲水五大盞煎耗其四入麝香少許空心服或單以酒煮亦可

茯苓湯治胃痘陽明積熱食已輒飢面色黃瘦胸滿脹小便閉澁

赤茯苓

陳皮去白

澤鴻

桑白皮各三分

赤芍藥

白术

人參

官桂各二分

石膏八分

病甚者加大黃朴硝各一錢

右細切作一服加生薑五斤水一盞半煎至一盞溫服

倒挾散治無問久新癰瘍大小便不通小腹急痛肛門腫痛

大黃小便不通減半

荆芥穗大便不通減半各等分

右各別研為細末每服二錢溫水調下臨時加減服

葵子散治小便不通

黃蜀葵子研細

赤茯苓各二錢

右作一服水一盞煎二三沸食前服

濟生葵子散治膀胱實熱小便不通

方見疝氣門

琥珀散治五淋

滑石二錢

木通

當歸

木香

蔚金

篇蓄各一錢

琥珀研分

右作一服為末用蘆葦葉同煎水一盞半煎數沸食前溫服

鐵服丸治大小便不通神效

大皂角燒存性

右一味不拘多少細研煉蜜為丸如梧桐子大每服七十九白湯下

廣濟雞蘇飲子治小便不通

雞蘇二握

生地黃

通草各四兩

滑石

杏仁去皮狀各二兩

冬葵子一兩五錢

石葦炙去毛一兩

右七味細切以水六升煎至二升半去粗分三服空心進一服如人行四五里又進一服必通

又方治小便不通

冬葵子

滑石各三兩

通草

赤茯苓各一兩

茅根二兩

芒硝一兩五錢

右細切以水六升煎取二升去粗納芒硝分作三服連進即通

集驗方治小便淋澀不通

滑石半斤

石葦三兩

通草四兩

榆英

冬葵子各一斤一方加黃芩三兩

右細切以水一斗煎取三升分作三服頓飲

石葦散治小便不利薑中作痛

石葦去毛二兩

滑石五兩

車前子三兩

冬葵子二兩

瞿麥一兩

右為細末每服方寸匕日三服

祖傳經驗秘方治小便淋閉薑中作痛神效

石葦去毛

滑石

瞿麥

萹蓄

冬葵子

木通

王不留行

地膚草各等分

右為細末每服三錢白湯調下

又經驗治小便溺血立效

金陵草

一名旱蓮草  
名墨斗草

車前草

俗云  
葛衣

右二物各等分杵自然汁每服半茶盞空腹服

又方治前証用壯年無病人頭髮不拘多少燒灰存性以側柏葉搗汁入糯米糊為丸  
如梧桐子大每服一百丸白湯下或四物湯下尤妙

又方治沙淋乃藥中有砂作痛

石首魚腦骨

五對火煅出火毒  
即白煮腦中骨也

滑石

五錢

右共研為細末分作二服煎木通湯調下未愈再服數劑必待砂出盡乃安

又方治孕婦轉胞小便不通及男子小便不通皆效

冬葵子

五錢

山梔子

五錢  
炒研

木通

三錢

滑石

五錢  
研

右作一服水一盞半煎八分溫服外以冬葵子滑石梔子為末田螺肉搗膏或生葱  
汁調膏貼臍中立通

又方治血淋

側柏葉

鷄節

車前草各等分

右三味同搗取真汁調益元散神效

附闕格証

難經曰闕則不得小便格則吐逆 脉兩寸俱盛曰闕格其証嘔逆而小便不通者是也

按素問謂人迎大四倍於氣口名曰格氣口大四倍於人迎名曰關乃二証也蓋有格而不關者亦有關而不格者又或有人迎氣口俱盛而吐逆不便者故丹溪總而言之曰關格者是也

丹溪曰寒在上而熱在下故多死法當吐以提其氣之橫格不必在出痰也用二陳湯探而吐之吐中便有降

有氣虛不運者補氣藥中升降用補中益氣湯加檳榔使清氣升而濁氣降也

治關格証吐逆而小便不利急宜先灸氣海天樞等穴各三七壯其吐必止然後以益元散等藥以利小便

祖傳經驗秘方治關格吐逆小便不通用藿香平胃散合五苓散加薑棗煎服立效

予長兄脩德翁年七十秋間患小便不通二十餘日百方不效後得一方取地膚草搗自然汁服之遂通雖至微之物而有回生起死之功故錄於此以為濟利之一助云地膚草一

云白地  
苔是也

### 秘結五十八

論

內經曰北方黑色入通於腎開竅於二陰藏精於腎夫腎主五液故腎實則津液足而大

便滋潤腎虛則津液竭而大便結燥原其所由皆房勞過度飲食失節或恣飲酒漿過食辛熱飲食之火起於脾胃淫慾之火起於命門以致火盛水虧津液不生故傳道失常漸成結燥之証是故有風燥有熱燥有陽結有陰結有氣滯結又有年高血少津液枯涸或因有所脫血津液暴竭種種不同固難一例而推焉經云腎惡燥急食辛以潤之以苦泄之陽結者散之陰結者溫之大法治燥者潤之以大黃當歸桃仁麻子仁郁李仁之類風燥者加以防風羌活秦艽皂莢之類為丸以煉蜜取其潤燥以助傳道之勢故結散而疎通矣仍多服補血生津之劑助其真陰固其根本庶無再結之患切弗以巴豆牽牛等峻劑攻下雖暫得通快必致再結愈甚反釀成病根膠固卒難調治或有血虛脉大如葱管發熱而大便結燥者慎不可發汗汗之則重亡津液閉結而死此醫殺之耳活人書有脾約証謂胃強脾弱約束津液不得四布但輸膀胱故小便數而大便難制脾約丸以下脾之結燥使腸潤結化津流入胃而愈丹溪曰然既曰脾約必陰血枯槁內火燔灼熱傷元氣故肺受火邪而津竭必竊母氣以自救夫金耗則土受木傷脾失轉輸肺失傳化宜其大便閉而難小便數而無藏蓄也理宜滋養陰血使陽火不熾金行清化脾土健旺津液入胃大小腸潤而通矣今以此丸用之於熱甚而氣實與西北人稟賦壯實者無有不安若用之於東南方人與熱雖盛而氣與不實者雖得暫通將見脾愈弱而腸愈燥矣須知在

西北以開結為主在東南以潤燥為要學者其可不知此乎

脉法

脉多沉伏而結 陽結脉沉實而數 陰結脉伏而遲或結老人虛人便結脉雀啄者

不治

方法

丹溪方法  
凡二條

丹溪曰有虛有風有濕有火有津液不足者有寒者有氣結者切不可例用芒硝大黃及

巴豆牽牛等利藥

久病腹中有實熱大便不通宜用潤腸丸微利之不宜用峻利之劑

脾約丸

麻仁一兩半用生絹袋盛百沸湯連袋泡浸湯冷出之垂井中與水面差一指許不著水次日晒乾篩之粒粒皆完

枳實炒黃色

厚朴薑製炒

芍藥各三兩

大黃四兩酒蒸

杏仁去皮尖炒易研一兩二錢

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十九溫水下

通幽湯治大便難幽門不通上衝吸門不開噎塞不便燥閉氣不得下治在幽門以辛潤之

炙甘草

紅花各一分

生地黃

熟地黃各五分

升麻

桃仁泥

當歸身

各一錢

右細切作一服水一盞半煎至一盞去粗調檳榔細末五分食前稍熱服

潤燥湯

升麻二分

生地黃二分

熟地黃

當歸梢

大黃酒濕煨

生甘草

桃仁泥

麻仁各一錢

紅花五分

右除桃仁麻仁另研細外餘細切作一服水一盞半入桃仁麻仁煎至一盞去粗空心稍熱服

潤腸丸治脾胃中伏火大便閉滯或乾燥閉塞不通全不思食及風結血閉皆能治之

桃仁湯泡去殼炒

麻仁去殼各一兩

當歸梢

大黃酒濕煨

羌活各五錢

右除桃仁麻仁另研如泥外其餘杵為極細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十五十九空心白湯下如風濕而大便不行加煨皂角仁大黃秦艽以利之如脉澀覺

身有氣滯而大便結者加郁李仁大黃以除氣滯燥

麻黃白朮湯治大便不通五日一次小便黃赤渾身腫面上及腹尤甚其色黃麻朮身重如山沉困無力四肢痿軟不能舉動喘促不安

青皮去穰

酒黃連各二分

黃芪

人參

桂枝

白朮

厚朴薑製

柴胡

蒼朮

豬苓各四分

酒黃柏

陳皮去白

甘草半生火

升麻各三分

吳茱萸去核

麻黃去節不

澤瀉各五分

白豆蔻

炒神曲各六分

白茯苓

杏仁四箇

升麻各三分

吳茱萸去核

白茯苓

右細切分作二服每服水二盞先煎麻黃令沸掠去沫入諸藥同煎至一盞去粗稍熟服

升陽瀉熱湯治膈噎不通逆氣裏急大便不行

青皮

槐子各二分

生地黃

熟地黃

黃柏各三分

當歸身

甘草梢各四分

蒼朮五分

升麻七分

黃芪一錢

桃仁十箇去皮  
尖另研

右細切作一服入桃仁泥水二盞煎至一盞食前熟服

活血潤燥丸治大便風秘血秘常常燥結

當歸梢五錢

防風三錢

大黃酒煨

羌活各一兩

皂角仁燒存性一兩五錢

桃仁二兩去皮另研

麻仁二兩半去殼另研

右除桃仁麻仁另研外共為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服五十丸白湯下三兩  
服後須以麻子仁煮粥每日早晚食之大便雖日久再不結燥也此九藥以磁罐盛  
之紙包封毋令見風

潤腸湯治大便結燥不通

生地黃

生甘草各三分

大黃煨

熟地黃

當歸梢各五分

升麻

桃仁

麻子仁各一錢

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗空心服

潤體丸能潤血燥治大便不通

麻仁

當歸梢

生地黃

桃仁

潤體丸能潤血燥治大便不通

枳殼各等分

右為細末煉蜜為丸服

備急大黃丸治胃中停滯寒涼之物大便不通腹痛方見內傷門  
河間枳殼丸治三焦約大小便不通殼氣不得下行

枳殼二兩

陳皮一兩

檳榔五錢

木香二錢五分

黑丑

四兩一半  
桔梗木一兩半  
生用一半  
炒熟餘不用

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服五十九薑湯下

枳實導滯丸治傷熱物大使不行氣滯胸腹作痛

方見內傷門

本邑趙德秀才之母年五十餘身材瘦小得大使燥急不通飲食少進小腹作痛召予診治六脉皆沉伏而結澁予作血虛治用四物湯加桃仁麻仁煨大黃等藥數服不通反加滿悶與東垣枳實導滯丸及備急大黃丸等藥下咽片時即吐出蓋胃氣虛而不能久留性速之藥耳遂以備急大黃丸外以黃蠟包之又以細針穿一竅令服三丸蓋以蠟塞者利其不犯胃氣故得出幽門達大小腸取效也明日下燥屎一升許繼以四物湯加減作湯使吞潤腸丸如此調理月餘得大使如常飲食進而平安

予族姪百一通判之子因出痘大使閉結不通兒醫云便實為佳兆自病至痘瘡愈後不入廁者凡二十五日肛門連大腸不勝其痛呻吟聲達四鄰外醫及予二三人議藥調治用皂角末及蜜煎導法服以大小承氣湯及枳實導滯丸備急丸皆不效計無所出予曰此痘瘡餘毒鬱熱結滯於大小腸之間而然以香油一大盞令飲自朝至暮亦不效予盡一計令侍婢口含香油以小竹筒一箇套入肛門以油吹入肛內過半時許病

者自云其油入腸內如蚯蚓漸漸上行再過片時許下黑糞一二升止因睡而安

黃疸五十九

論

內經曰中央黃色入通於脾又曰諸濕腫滿皆屬脾土夫黃疸為病肌肉必虛腫而色黃蓋濕熱鬱積於脾胃之中久而不散故其色形於面與肌膚也蓋脾主肌肉肺主皮毛母能令子虛母病子亦病矣是故有諸中者必形諸外耳其証有五曰黃汗曰黃疸曰酒疸曰穀疸曰女勞疸雖有五者之分終無寒熱之異丹溪曰不必分五種同是濕熱如盦麵相似正經所謂知其要者一言而終是也外有傷寒熱病陽明內實當下而不得下當汗而不得汗當分利而不得分利故使濕熱怫鬱內甚皆能令人發黃病也先哲制茵陳五苓散茵陳湯茯苓滲濕湯之類無不應手獲效故曰治濕不利小便非其治也又曰濕在上宜發汗濕在下宜利小便或二法並用使上下分消其濕則病無有不安者也學者詳之

脉法

脉經曰凡黃候寸口脉近掌無脉口鼻黑色並不可治  
脉沉渴欲飲水小便不利者必發黃也

酒疸者或無熱清言了了腹滿欲吐鼻燥其脉浮者先吐之沉弦者先下之  
酒疸下之久火為黑疸目青面黑心頭如噉蒜韭之狀大便正黑皮膚四肢不仁其脉  
浮弱顏黑微黃故知難治

穀疸寸口脉微而弱微則惡寒弱則發熱當發不發骨節疼痛當煩不煩而黃汗出趺  
陽脉緩而遲胃氣反強飽則煩滿滿則發熱客熱消穀食已則饑穀強肌瘦名曰穀  
疸

陽明病脉遲者食難用飽飽則發寒熱頭眩者必小便難此欲作穀疸雖下之腹滿如  
故

趺陽脉緊而數數則為熱熱則消穀緊則為寒食則滿也

尺脉浮為傷腎趺陽脉緊為傷脾風寒相搏食已則眩穀氣不消胃中苦濁濁氣下流  
小便不通陰被其寒熱流膀胱身體盡黃名曰穀疸

方法丹溪  
五條

多者茵陳五苓散加食積藥

戴氏曰食積者量其虛實下之其餘但利小便小便清利則黃自退或曰  
疸宜用倒倉法又曰黃疸倦怠脾胃不和食少胃苓湯小便赤加滑石

一方治黃疸

黃芩

黃連

梔子

茵陳

豬苓

澤瀉

蒼朮

青皮

草龍胆各五分

穀疸加三稜莪术縮砂陳皮神麃

右細切作一服水煎服之

又方治氣實傷濕渾身發黃宜吐法

撫芎

梔子

桔梗各二錢

右細切作一服加薑煎入韭汁服探吐之

小溫中丸治黃疸與食積又可制肝燥脾虛者須以白朮作湯使下

針砂十兩  
令通紅另研醋炒七次苦參夏加冬減

山查各二兩

吳茱萸一兩  
加夏減冬

蒼朮半斤

白朮五兩

川芎夏減

神麃各半斤

香附米一斤  
浸一宿童便

右為細末醋糊為丸如梧桐子大每服七八十九食前鹽湯下一方無白朮山查  
苦參吳茱萸有施子

大溫中丸

針砂十兩如前製

陳皮

蒼朮

青皮

厚朴薑汁製

三棱

莪朮同上製

黃連

苦參

白朮各五兩

生甘草二兩

香附一斤童便浸一宿

右為細末醋糊為丸

一方無黃連苦參白朮一  
方又無甘草名溫中丸

調胃承氣湯方見傷寒門

王叔和曰腹滿古瘧煩燥不得睡屬黃家又曰病黃疸發熱煩喘胸滿口燥者以發病時火劫其汁兩熱相搏然黃家所得從濕故一身盡發熱而黃如壯熱者熱在裏也當下之安用調胃承氣湯

又曰黃疸之病當以十八日為期治之十日以上為差又劇者為難治又曰病疸而渴者其病難治疸而不渴者其病易治發於陰部其人必嘔發於陽部其人振寒而發熱也師曰諸黃家病但宜利小便假令脉浮當以汗解之宜桂枝加芪湯又名黃芪建中湯方見傷寒門

又曰男子黃小便利自當與小建中湯又曰黃疸腹滿小便不利而赤自汗出此為表和裏實當下之用大黃黃柏梔子芒硝湯

大黃黃柏梔子芒硝湯

黃柏

芒硝

大黃各四錢

梔子三枚

右細切作一服水一盞半煎至一盞溫服

又曰黃疸病小便色不變欲自利腹滿而喘不可除熱熱除必囁囁者宜服小半夏湯

方見傷寒門

又曰夫病酒發黃疸必小便不利其候心中熱足下熱是其証也又心中懊惓而熱不能食時欲吐名曰酒疸又曰酒疸心中熱欲嘔者吐之即愈又曰酒疸黃色心中實熱而煩

又曰額上黑微汗出手足心熱薄暮則發膀胱急小便自利名曰女勞疸腹如水狀不治又曰黃家日晡所當發熱而反惡寒此為女勞得之膀胱急小腹滿一身盡黃額上黑足下熱因作黑疸其腹脹如水狀大便必黑時溏此女勞之病非水也腹滿者難治

硝石礬石散主之

硝石礬石散

右以二石各等分燒灰為末每服二錢以大麥粥湯和服日三服取汗愈若小腸滿急小便不利用滑石石膏各二錢入粳米一撮同煎服之

治酒疸用小柴胡湯加茵陳豆豉大黃黃連葛根煎服效

伏苓湯治胃疸消穀善饑面色痿黃心中煩熱胸脇脹滿小便亦澁方見淋秘門

一方治穀疸以柴胡穀芽枳實厚朴梔子大黃等分水煎服效

胃苓湯治脾胃不和黃腫如小便赤澁加滑石五苓散合平胃散是也

腎瘡湯治腎瘡目黃或渾身黃小便赤澁

升麻

羌活

防風

藁本

獨活

柴胡各五分

蒼朮一錢

豬苓四分

葛根

五分

澤瀉三分

黃芩二分

甘草三分

神曲

炒三分

黃柏二分

白朮五分

人參三分

右細切作一服水一盞半前空一盞去粗溫服

茵陳五苓散治傷寒或伏暑發黃小便不利煩渴等証 本方倍加茵陳入薑棗煎服之  
茵陳茯苓湯治發黃脉沉細數四肢冷小便澁煩燥而渴

茯苓

桂枝

猪苓各一錢

滑石一錢五分

右細切作一服水一盞半煎至一盞服如脉未出加當歸一錢五分

茵陳二錢

梔子大黃湯治酒瘧心中懊惱或熱而痛

梔子十四枚

大黃一兩

枳實五枚

荳豉一升

右作一服用水五升煎至二升分三服

半溫半熱湯治酒瘧身黃無熱靖言了了腹滿欲嘔心煩足熱或有癥瘕心中懊惱其脉

沉弦緊細

半夏

茯苓

白朮各七分

前胡

枳殼炒黃色

甘草炙

大戟各五分

黃芩

茵陳

當歸各三分

右細切作一服入生薑三片水二盞煎至一盞溫服

茵陳蒿湯治身熱鼻乾汗出陽氣上奔小便赤澁不利濕熱發黃

茵陳蒿一兩

大梔子三枚

大黃三錢五分

右細切作一服水三盞煎半溫服

茵陳大黃湯治傷寒大熱發黃面目俱黃小便亦澁

茵陳蒿

梔子

柴胡

黃柏

黃芩

升麻

大黃各七分

草龍膽三分半

右細切作一服水一盞半煎至一盞溫服

梔子柏皮湯治身熱不去大便利而煩熱身黃

梔子

黃柏

黃連各三錢  
五分

右細切作一服水一盞半煎至一盞溫服

茯苓滲濕湯治黃疸寒熱嘔吐而渴欲飲冷水身目俱黃小便不利不思飲食方見濕証門

小茵陳湯治發黃脉沉細而遲遍身冷

附子八

枝作  
片炮

甘草一兩

茵陳二兩

右細切作三服每服用水一盞煎至一盞溫服

茵陳四逆湯治發黃脉沉細而遲肢體逆冷腰以上自汗

甘草

炙一兩

乾薑炮一兩

五錢

附子八

枝作  
片炮

茵陳二兩

右細切分作四服水煎服

葶苈苦參散治濕熱內甚小便赤澁大便時秘飲食少進諸藥不效因為久黃

苦參

黃連

附子

黃柏

大黃各一兩

葶苈子二兩

右為細末每服一錢匕清米飲調下以吐利為度隨時看虛實消息加減

當歸白朮湯治酒疸發黃心下有痃癖堅滿身體沉重妨害飲食小便赤黃此因內虛飲食生冷脾胃痰結所致

白朮

茯苓各一錢

當歸

黃芩

茵陳各三  
分半

前胡

枳實

甘草炙

杏仁各六分

半夏八分泡透

右細切作一服加薑三片水一盞半煎至一盞溫服

抵當湯治傷寒熱鬱瘀血內結身黃脉沉細狂言譫語小便自利大便黑方見傷寒門

針砂丸治穀疸酒疸濕熱發黃等証

針砂半斤  
炒紅醋

蒼朮四兩  
泔浸

香附四兩童  
便浸

神曲炒微黃

茵陳薑汁炒

麥蘖二兩  
炒各

芍藥

當歸酒洗去頭

生地黃

川芎

青皮去穰炒各

陳皮去白

莪朶  
醋煮

三棱二兩  
醋煮各

梔子去殼炒

薑黃

升麻

乾漆五錢  
炮烟盡

右為細末醋糊為丸如梧桐子大每服六七十九薑湯送下  
綠礬丸治黃腫病最捷

五倍子

半斤炒黑

綠礬

四兩薑汁炒白

針砂

四兩醋炒紅色

神麴

半斤炒微黃色

右為細末生薑汁煮紅棗肉為丸如梧桐子大每服六七十丸溫酒下不能飲酒米湯亦可終身忌食蕎麥麪犯之再發難治

棗礬丸治食勞身目俱黃者

綠礬

半斤火煅通紅

右研細紅棗肉為丸如梧桐子大每服五十丸或酒或薑湯下祖傳經驗褪金丸治黃腫絕妙

蒼术米泔浸

白朮

各二兩五錢

甘草

炙五錢

厚朴

薑汁拌炒一兩

陳皮

去白一兩五錢

針砂

醋炒紅色

香附

童便浸各六兩

神麴

醋煮各一兩半炒黃色

麥蘖

炒微黃各一兩半

有塊加三棱

醋煮

莪朶

醋煮各一兩半

右為細末麪糊為丸服忌魚腥濕麪生冷水菜等物

一男子年三十餘得穀疸症求予治以胃苓湯去桂加茵陳數十貼黃退自以為安不服藥十數日後至晚目盲不見物予曰此名雀目蓋濕痰盛而肝火有餘也用獐猪肝煮熟和夜明砂作丸服之目遂明如故來謝予曰未也不早服制肝補脾消痰之劑必成虛脹伊不信半月後腹漸脹痞滿後來治予仍以胃苓湯倍二味加木通麥門冬煎湯

下褪金丸一月平安

瘡瘍 六十

論

內經曰諸痛痒瘡瘍皆屬心火又曰膏梁之變足生大丁榮氣不從逆於肉理乃生癰腫東垣謂榮氣即胃氣也蓋胃氣調和則榮衛之氣皆順流而無逆於肉理耳若夫飲食失節肥甘過傷以致濕熱蘊積于腸胃之間燒燙腑臟煎熬真陰此經之所謂陰之五宮傷在五味味傷發熱久而增氣故濕熱之氣聚於下焦陰火熾盛蓄於八脉八脉沸騰逆於經隧氣凝血滯故其滋養精微之氣不能如常榮於肉理是以結聚而成癰腫矣經曰熱勝則肉腐是也法當視其所發之地各從其經而處治焉夫發於身之表者其名十有七曰腦發督脉足太陽經曰背發中屬督脈餘皆足太陽經曰鬟發手足陽明經曰髮發手足太陽經曰眉發手足少陽經曰頤發手足陽明經曰顎頸發手陽明經曰長發手足陽明經曰腋發手太陽經曰穿襠發督衝三脈曰腿發表足三陽經曰肝癰足厥陰明經曰喉癰任脉陽明經曰脣癰任脉陽明經曰乳癰內陽明經曰乳頭足厥陰經曰馬癰足太陽經曰騎馬癰厥陰經曰囊癰足厥陰明經發於腔子之內者其名有四曰內疽曰肺癰手太陽經曰腸癰手陽明經曰胃脘癰足陽明經夫十二經有氣血多少之不同癰疽淺深之有異是故為治之法或疏散或消毒或針烙或內托或外消或瀉利或補益是故腫瘍為實宜瀉利潰瘍為虛宜補益浮露而

淺者為癰宜外消藏伏而深者為疽宜內托此千古不易之定議也雖然其証有善而易治者為順惡而難消者為逆其為眼白睛黑目緊小者一逆也不能飲食納藥而嘔食不知味二逆也傷痛渴甚三逆也膊項轉動不便四肢沉重四逆也聲嘶色脫唇口青黑面目四肢浮腫五逆也煩燥時欬腹痛甚泄利無度小便如淋六逆也膿血大洩焮腫尤甚膿水臭敗莫近七逆也喘促氣短恍惚嗜卧八逆也未潰先黑陷面青唇黑便汚九逆也又如噫氣痞塞喘咳身冷自汗目瞪耳聾恍惚驚悸語言錯亂皆是惡証若夫動息自寧飲食知味一順也便利調勻二順也神彩精明語聲清朗三順也膿潰腫消色鮮不臭四順也體氣和平五順也凡五順見三則吉九逆見六則危矣先哲垂訓班班可啟學者其可不詳察乎

### 脉法

脉經曰脉數身無熱內有癰也一云腹無積聚身無熱脉數此為腸中有膿薏苡附子敗

醫湯主之

諸浮數脉應當發熱而反洒淅惡寒苦有痛處當發癰膿脉微而遲反發熱弱而數反振寒當發癰腫

脉浮而數身體無熱形嘿嘿胸中微燥不知痛之所在此人當發癰腫

脉滑而數數則為熱滑則為實滑則主榮數則主衛榮衛相逢則結為癰熱之所過則為膿也

羽林婦病醫者脉之知婦人腸中有膿為下之即愈蓋寸口脉滑而數滑則為實數則為熱滑則為榮數則為衛衛數下降榮滑上升榮衛相干血為濁敗小腹痞堅小便或澁或時汗出或復惡寒膿為已成設脉遲緊聚為瘀血下之即愈

腸癰之為病其身體甲錯腹皮急按之軟如腫狀

夫腸癰者小腹腫按之則痛小便數如淋時時發熱自汗出復惡寒其脉遲緊者膿未成可下之當有血脉洪數者膿已成不可下也大黃牡丹湯主之

方法丹溪方法凡二十二條

丹溪曰癰疽因陰陽相滯而生蓋氣陽也血陰也血行脈內氣行脈外相並周流寒與濕搏之則凝泣而行遲為不及熱與火搏之則沸騰而行速為太過氣得邪而鬱津液稠粘為痰為飲積久滲入脉中血為之濁此陰滯於陽也血得邪而鬱隧道阻隔或溢或癰疽因積毒在臟腑當先助胃壯氣使根本堅固而以行經活血藥為佐參以經絡時令使毒氣外發施治之早可以內消此內托之意也

或問內托之法予曰河間治腫瘍于外根盤不深形証在表其脉多浮病在皮肉非氣盛則必侵于內急須內托宜復煎散除濕散鬱使胃氣和平如或未已再煎半料飲之如大便閉及煩熱少服黃連湯如微利及煩熱已退却與復煎散如此使榮衛俱行邪氣不能內傷也

外科精要謂排膿內補十宣散治未成者速散已成者速潰誠哉是言也若用之於小瘡癧與冬月亦可轉重就輕移深居淺若潰瘍與夏月用之其桂朴之溫散佐以防風白芷恐雖有參芪難為倚仗比見世人用此不分輕重時令經絡前後正若盲人騎瞎馬半夜臨深池危哉

諸經惟少陽厥陰二經生瘻疽宜預防之以其多氣少血也血少而肌肉難長瘡久不合必成死証苟不知此遂用驅逐利藥以伐其陰分之血禍不旋踵

腫瘍内外皆壅宜以托裏表散為主如欲用大黃者宜戒猛浪之非

潰瘍內外皆虛宜以補接為主如欲用香散者宜戒虛虛之失

外科精要一書惟務紀錄舊方應酬輕小証候耳

癰疽始發即以艾多灸之可使輕淺騎竹馬灸法最妙蓋艾火暢達拔引鬱毒此從治

之意惟頭為諸陽所聚灸炷宜小而少若身上必痛灸至不痛不痛灸至痛亦有因

死而死者蓋虛甚孤陰將絕其脉必浮數而大且不鼓精神必短而昏無以抵當火氣宜其危也按河間父刺法曰凡瘡瘍須分經絡部分血氣多少腧穴遠近從

背出者當從太陽經五穴選用至陰通谷束骨崑崙委中是也從鼻出者當從少陽經五穴選用竅陰夾谿臨泣陽輔陽陵泉是也從髮出者當從陽明經五穴選用厲

兌內庭陷谷衝陽解谿是也從腦出者則以絕骨一穴治之各穴點法俱見銅人針灸經苑不再具

蜞針之法可施於輕小証候吹出惡血若積毒在臟腑者徒竭其血於外無益也

外施貼藥亦發表之意精要謂貼冷藥有神效夫氣得熱則散得冷則斂何謂神效經

曰發表不遠熱是也

貼冷藥惟輕小癟毒可也

外科用針烙得膿後服神仙追毒丸此藥能下積取毒無取膿之功若血氣壯實則膿自出當以和氣活血藥佐參芪補劑服之

腫瘍用手按之熱則有膿不熱則無膿

膿出而反痛者此為虛也宜補之亦有穢氣所觸而作痛者宜和解之風冷所逼者宜溫養之

疽發深不痛者胃氣大虛必死肉多而不知痛也

腫瘍時嘔者當作毒氣上攻治之潰後當作陰虛補之若年老潰後發嘔不食又宜參

芪白朮膏峻補隨証加佐使藥河間謂瘡瘍嘔者濕氣侵于胃也宜倍白朮

癰疽發渴乃血氣兩虛用參芪以補氣當歸地黃以養血或忍冬丸黃芪六一湯皆效  
加味十全大補湯治癰疽潰後補氣血進飲食實為切要凡膿血出多陰陽兩虛此藥  
有迴生起死之功但不分經絡不載時令醫者觸類而長之可也或見腫平痛寬遂  
以為安慢不知省無補接調養之功愈後虛証復見因而轉為他病而危劇者多矣  
蒲公英化熱毒消惡腫散結核有奇功田間路側皆有之三四月開黃花似菊花味甘  
衍義補遺云四時常花花罷飛絮節葉間折之有白汁出者是能解食毒散滯氣可  
入陽明太陰二經同忍冬藤煎以少酒佐而服之搗爛盦之亦妙

白蠟屬金稟收斂堅凝之氣外科之要藥也生肌止血定痛接骨續筋補虛常與合歡  
皮同入長肉膏藥用之有神効但未試其可服否若合歡皮常服之驗矣  
草麻子性善收能追膿取毒亦要藥也

癰疽已破未破用皂角刺能鑽引至痛處

取刺骨法

取久疽久痔漏中朽骨俗名刺骨用烏骨雞胫骨以信砒實之鹽泥固濟火煅通紅地上出  
火毒用骨研細飯丸如粟米大以皮紙燃送入竅內外以拔毒膏藥封之其骨自出

惡瘡發背腦疽等証方法

升陽益胃散治一切惡瘡發背腦疽等証

羌活

一錢  
五分

獨活

五分

防風

五分

藁本

一錢  
五分

知母

一錢

生地黃

一錢

黃芩

三錢

黃連

五分

黃柏

五分

當歸

三錢

防風梢

五分

連翹

二錢

人參

五分

黃芪

一錢五分

生甘草

一錢

陳皮

五分

當歸梢

五分

蘇木

五分

炙甘草

一錢  
五分

酒防已

五分

澤鴻

七分

桔梗

一錢

右細切分作二服每服用水二大盞浸半日煎至一盞滴酒數十點去粗臨卧溫服忌飲水再作膿勁遲初患二三日者服之立消作膿者立潰隨病上下食前後服一人患腦疽第八日腫硬如拳即日晚服此藥一劑次日便平復腫勢消更不疼痛又服半劑七日全愈如常明之言凡瘡皆陰中之陽陽中之陰二証而已我治此瘡陽藥七分陰藥三分名曰升陽益胃散勝十宣也老人宜之亦名復煎散或加乳香沒藥各一錢尤妙

當歸羌活湯治腦疽証

黃芩酒炒

黃連酒炒各

黃柏酒炒

澤鴻五分

連翹一錢

當歸身二錢

防風

羌活各一錢

甘草炙一錢

山梔子一錢

獨活七分

藁本七分

右細切作一服水三盞先浸一時許入酒一匙煎至八分去粗食後稍熱服日進二服三日盡六服俱將藥清汁調下後項檳榔散

檳榔散大欬瘡口

檳榔

木香各三錢

右為細末用前湯調下或欬瘡口用之決無疼痛以蠟油調塗瘡口生肌斂肉甚速別無惡肉瘡口易合平復膏梁熱瘡所宜用也貧人寒地及寒濕外來之寒瘡禁不可多用

背疽方法

千金托裏散治背疽併諸惡瘡如三日以裏未針灸及利大便者則可消矣

羌活一錢

防風酒洗五分

防風梢五分

藁本一錢

當歸身三錢

當歸梢五分

連翹三錢

黃芩酒洗

黃芪一錢

人參一錢

炙甘草一錢

生甘草五分

陳皮

五分

蘇木

五味子

酒黃柏

酒防己

各五分

桔梗

梔子

生地黃

酒洗各一錢

酒大黃

三錢

酒黃連

一錢

木猪苓

五分一錢

麥門冬

二錢

丹溪治背疽方用大黃防風羌活甘草節生地黃當歸身貝母白芷赤芍藥皂角刺黃芩作大劑煎服氣虛加人參黃芪瘡潰後亦宜加之

附骨疽方法

丹溪曰附骨疽者皆因久得厚味及勞役與酒後涉水得此陽滯於陰之証也又曰環跳穴痛不止防生附骨疽以蒼朮為君佐以黃柏之辛行以青皮冬加桂枝夏加條芩體虛者加杜仲牛膝以生甘草為使作大料煎入薑汁食前飲之痛甚者恐前藥十數貼發不動少加麻黃一二貼又不動者恐疽將成急掘地坑以火煅坑通紅沃以小便令患者赤體坐於坑中以席或綿衣圍抱下體使熱氣薰蒸腠理開氣血通暢而愈

羌活防己湯治附骨疽初發於太陽厥陰太陰分者

羌活

川芎

蒼朮

防己

木香

連翹

射干

甘草

白芍藥

木通

當歸尾

蘇木各七分

右細切水酒各一大盞煎至七分食前服美膳壓之  
托裏黃芪湯治滑骨疽初發於足少陽陽明分者

柴胡一錢

連翹八分

肉桂八分

鼠粘子八分

黃芪八分

當歸尾一錢

黃柏四分

升麻四分

甘草炙四分

白芷一錢

右細切作一服酒一盞水一盞半煎至一大盞空心服美膳壓之  
內托黃芪酒煎湯治瘡生腿外側或因寒濕得附骨疽於足少陽經分微侵足陽明經堅  
硬漫腫行步作痛或不能行

柴胡六錢

連翹八分

肉桂八分

大力子炒

黃芪各四錢一  
作四分

當歸尾八錢

黃柏五分

升麻七分

甘草炙五分

白芷二錢

右細切水酒各一盞煎至一盞食前溫服

黃連消毒飲治附骨疽

黃連一錢

黃芩

黃柏各五分

生地黃四分

知母四分

羌活一錢

獨活四分

防風四分

藁本五分

當歸尾四分

桔梗五分

黃芪二分

人參二分

甘草三分

連翹四分

蘇木二分

防己五分

澤瀉二分

陳皮三分

右細切作一服水煎服一老人年七十因寒濕地氣得附骨疽於左腿外側少陽膀  
經之分微侵足陽明經分濶六七寸長一小尺堅硬漫腫不辨肉色皮澤但行步作  
痛以指按至骨大痛與此藥一服即此次日堅軟腫消而愈

內托黃芪柴胡湯治附骨疽

生地黃五分

黃柏三分

肉桂二分

羌活五分

當歸梢七分半

土瓜根酒洗

柴胡梢各一錢

連翹一錢三分

黃芪二錢

右細切作一服酒一盞水二盞煎至一盞去粗心熱服賈德茂小男於左大腿近膝  
股內出附骨疽不辨肉色漫腫光澤木硬瘡勢甚又且左脚乃肝之脾上也更在足

厥陰肝經之分少侵足太陰脾經之分其脉左二部細而弦按之洪緩微有力與此

藥而安

臂癰方法

丹溪曰臂癰者臂居小腹之後在下此陰中之陰道遠位僻雖曰太陽多血然氣運不到血亦罕來中年後尤慮患此繞有腫痛參之脉証但見虛弱便與滋補血氣可保終吉若無積補之功其禍多在結痂之後或半年已來乃病多致失手慎之慎之內托羌活湯治足太陽經中左右尺脉俱緊按之無力尻臂生癰堅硬腫痛大作

羌活

黃柏

酒炒各二錢

防風

藁本

當歸尾各一錢

肉桂三分

連翹

甘草炙

蒼朮

陳皮各五分

黃芪一錢五分

右細切作一服水二盞酒一盞煎至一盞去粗稍熱空心服以衣覆益癰上使藥力行去衣

內疽方法

丹溪曰內疽者皆因飲食之火挾七情之火相鬱而發飲食者陰受之七情者臟腑受之宜其發在腔子而頭向外非干腸胃肓膜也宜以內托之藥托出于外以針開之而愈

先用四物湯加桔梗香附生薑煎服。膿出後亦用四物湯調理而安。

肺癰方法

丹溪肺癰先須發表。千金方曰：病咳唾膿血，其脉數實或口中咳胸中隱隱痛，脉反滑數者為肺癰。其脉緊數為膿未成，緊去而但數者，膿已成也。

要畧治肺癰先以小青龍湯一貼，以解表之風寒邪氣。然後以葶藶大棗瀉肺湯，桔梗湯，葦葉湯隨証用之。以取膿血，此治腫瘍之例也。終以葦由獨行方（名黃昏湯）以補裏之。

陰氣此治潰瘍之例也。

黃昏湯治胸中甲錯隱痛，知為肺癰。

合歡木皮一掌大。

右以水三盞煮取一盞半分二服。

葶藶大棗瀉肺湯治肺癰或肺脹喘促不得卧。

葶藶一兩炒黃研為細末，煉蜜為丸如彈子大。

大棗十枚

右以水三盞煎大棗至二盞去棗入葶藶一丸再煎至一盞攬勻服之。

葦葉湯治欬有微熱，煩燥胸心甲錯，出千金方。

葦葉二斤

薏苡仁半斤

桃仁五十個

瓜瓣半斤

右以水一斗先煮葷葉至五升去粗入諸藥煮取二升分溫再服當吐痰如粥而愈  
桔梗湯治肺癰心胸氣壅咳嗽膿血心神煩悶咽乾多渴兩脚腫滿小便赤黃大便多澁

桔梗

貝母各一錢

當歸

瓜萎子各八分

枳殼炒五分

薏苡仁八分

桑白皮五分

防己五分

甘草節三分

黃芪五分

杏仁去皮炒另研

百合各三分

右細切作一服水一盞半加生薑五片煎至八分去粗溫服不拘時若大便秘者加大黃小便澁者加木通

又方治前証

瓜萎仁

當歸

桔梗

貝母

白芷

甘草各一錢

右細切作一服水一盞煎食後服一方無貝母白芷有葶苈子  
肺癰已破入風者不治或用太乙膏丸服以搜風湯吐之

有吐膿血如肺癰狀口臭他方不應者宜消風散入無病男子髮灰清米飲調下可二  
服而愈

祖傳經驗秘方治肺癰未成膿者立消已成膿者立潰其効如神用樟漆樹葉一名接骨

木又名繼骨樹又名野黃楊田畔路側皆有之右一味細研畧入濾過以酒調服不飲  
酒入人生薑研服

腸癰方法

丹溪曰腸癰當作濕熱積治入風難治

千金謂腸癰妄治必殺人其病小腹腫強按之則痛小便數淋時汗出復惡寒身皮  
甲錯腹皮急如腫狀脉數者微有膿也巢云洪數已有膿脉若遲緊者未有膿甚者  
腹脹大轉側有水聲或遶脅生瘡或膿自脅出或大便膿血

羽林婦証具前脉法下

腸癰治法要畧以薏苡附子敗醬散千金以大黃牡丹湯

灸法屈兩肘正肘頭銳骨端灸一百壯下膿血而安

薏苡附子敗醬散

薏苡仁

一錢

炮附子

一分

敗醬

三分

右為細末每服方寸匕水二盞煎至一盞連頓服之小便當下膿血而愈

大黃牡丹湯

太黃

四分

牡丹皮

一兩

桃仁

五十枚去皮尖另研

芒硝

三合

瓜蒌子

半升

右細切用水六升煎取一升去粗入芒硝再煎一沸分三服頓服之有膿即下膿無  
膿即下血

東陽呂俊文得潮熱微似瘡狀小腹右邊有一塊大如雞卵作痛右脚不能伸縮一醫  
作奔豚氣治十餘日不驗召予診候其脉左寸芤而帶濶右寸芤而洪實兩尺兩關  
俱洪數子曰此大小腸之間欲作癰耳幸膿未成猶可治療與五香連翹湯加減與  
之間以蜈蚣灸黃酒調服之三日內平安

### 乳梗方法

丹溪曰乳梗多因乳母不知調養所致蓋乳房陽明所經乳頭厥陰所屬忿怒所逆鬱悶  
所遏厚味所釀以致厥陰之氣不行故竅閉而汁不通陽明之血沸騰故熱甚而化為  
膿或因所乳之子膈有滯痰含乳而睡口氣熾熱所吹而成結核初梗忍疼揉令核軟  
吮令汁透可散否則結成矣治法以青皮疎厥陰之滯石膏清陽明之熱生甘草節行  
污濁之血瓜蔓子消導腫毒或加沒藥青橘葉皂角刺金銀花當歸身或湯或散須以  
少酒佐之若加艾火二三壯於痛處灸之尤妙彼粗工使用針刀必成拙病  
乳癰用蒲公英同忍冬藤入少酒煎服即欲睡是其効也

乳癰未潰以青皮瓜蔓仁桃仁連翹川芎橘葉皂角刺甘草節隨証加減煎服已潰以

人參黃芪川芎當歸白芍藥青皮連翹水蓼甘草節煎服

東垣升麻托裏湯治婦人兩乳間出黑頭瘡瘍頂陷下作黑眼子其脉弦洪按之細小

黃柏二分

肉桂三分

鼠粘子五分

黃芪

炙甘草節

當歸身各一錢

連翹

升麻

葛根各五分

右細切作一服水一盞酒半盞同煎至一盞食後熱服

妳岩方法

石香程氏曰妳岩始有核腫結如鰲棋子大不痛不痒五七年方成瘡初便宜多服疎氣行血之藥須情思如意則可愈如成瘡之後則如岩穴之凹或如人口有唇赤汁膿水浸淫胸膈氣攻疼痛用五灰膏金寶膏去其蠱肉生新肉漸漸收斂此疾多生於憂鬱積忿中年婦人未破者尚可治成瘡者終不可治

十六味流氣飲治妳岩

人參

黃芪

川歸各一錢

川芎

肉桂

厚朴

白芷

甘草各五分

桔梗

三分

防風

烏藥

檳榔

芍藥

枳殼

木香各五分

紫蘇一錢  
五分

右細切作一服或加青皮一錢水二大盞煎至一盞服

單煮青皮湯治婦人百不如意久積憂鬱乳房內有核如蟹蕕孚

每服用青皮四錢細切以水一盞半煎至一盞日二服已上二方間服至核消住樂  
橘葉散治証如前

青皮

石膏殼

沒藥

甘草節

當歸頭

金銀花

蒲公英各五分

瓜蒌子一錢

皂角刺

一錢  
大者炒出汗

右細切作一服加青橘葉一小握以酒一盞半煎至一盞食後或卧時服  
丁香散治乳頭破裂或因小兒吹乳血乾自裂開多痛

丁香

不拘多少

右一味為末乾敷裂處如燥唾津調敷

囊癰方法

丹溪曰囊癰者濕熱下注也有作膿者此濁氣順下將流入滲道因陰道或虧水道不利  
而然膿盡自安勿藥可也惟在善於調攝耳又有因腹腫漸流入囊腫甚而囊自裂開

署丸懸掛水出以輔炭末數之外以紫蘇葉包裹仰卧養之

癰疽入囊者曾治數人悉由濕熱入肝經處治而用補陰藥佐之雖膿潰皮脫署丸懸掛者皆不死

一方用野紫蘇葉面青背紅者是也焙乾為細末敷之如燥以香油調敷囊脫無皮者外以青荷葉包之其皮自生

### 丹溪便毒方法

便毒是厥陰經濕熱因勞倦而發用射干三寸同生薑煎食前服得利二三行効射干開紫花者是紅花者勿用

一方用破故紙鼠粘子微炒黑牽牛炒大黃酒蒸焙乾各等分為末每服一兩酒調下又方已結成膿者用大黃酒蒸

連翹各五錢

枳實

三錢

厚朴

甘草節

各三錢

桃仁

二十一箇

生薑三片分三服水煎服之

石香程氏曰便毒一名騎馬癰此奇經衝任為病而癰見於厥陰經之分野其經多血又名血癰或先有疳瘡而發或卒然起核疼痛而發皆熱鬱血聚而成也初發宜疎利之即散變膿後如常用托裏內補之藥

蘇方木散治便毒

木蠶子

去殼

當歸尾

酒浸

芍藥

白芷

粉甘草

川芎

射干

忍冬藤

即金銀花

大黃

剉碎酒浸

川山甲

糠火煨

沒藥

另研

蘇方木

各六錢一作六分

右細切作一服水酒各一盞煎至一盞食前服

玉燭散治便毒

川芎

當歸

生地黃

赤芍藥

朴硝

大黃

依前製

甘草

炙各八分

右細切作一服水煎食前服

牡蠣大黃湯治同前証

大黃

依前製

牡蠣

各二錢五分火煅五

甘草

一錢

瓜萎

一箇去皮

右細切作一服水二盞煎至一盞溫服

瘰癧方法

丹溪曰瘰癧必起於少陽一經不守禁忘延及陽明大抵食味之厚鬱氣之積曰風曰熱皆此二端拓引變換須分虛實實者易治虛者可慮以其屬膽經主決斷有相火且氣

多血少婦人見此若月經不作寒熱便生稍久轉為潮熱危矣自非斷然食淡神仙不治也

治療癰用立效散與水蔓散相間服神効

本草云夏枯草大治瘰癧散結氣有補養厥陰血脉之功而經不言觀其能退寒熱虛者可仗若實者以行散之藥佐之外以艾灸亦漸取効

治血少馬刀瘰癧肚泄以四物湯倍酒炒芍藥牡蠣粉陳皮柴胡甘草黃連玄參炒神麴桑椹膏

石香程氏曰瘰癧之症內經謂之結核者是也結核有大小如大豆銀杏連串而生者形大如馬刀者謂之馬刀瘡經別為火類夫火亢之甚必兼水化制之其核故堅也凡瘰癧之起始生於耳後足陽明少陽二經浸淫於太陽之經漸隨經流注于肢脇手足皆有也治法以火針刺入核中不可透底納蟾酥膏於中外用綠雲膏貼之三日後取去核中稠膿盡取去核外薄膜先破初起之核一枚以絕其源服藥後出者皆愈或不肯收如銀杏者盡皆開了用藥取之其自潰者猶如木果之腐熟肉雖潰而核猶存故膿水淋漓久難得愈治者用鉄焰燒赤烙去其破核猶存者併肉潰處次用金寶膏龍珠膏等藥追去蠭惡之根遂能長肉而愈隨經絡証候服除風熱兼引經之藥以除根

本可獲全功也

蟾酥膏

蟾酥如大豆許

白丁香十五枚

寒水石些少煅

巴豆五粒

寒食麪些少

右各另研和作一處再研煉蜜為丸如菉豆大每用一丸或二三丸納入針竅中如脹未盡再用數丸以脹盡為度

綠雲膏

黃連

大黃

黃芩

玄參

黃柏

木蠶子去殼各

錢各

右細切用香油一兩同煎焦色去藥入淨松香五兩再煎成膏濾入水中扯拔令金色入跳再熬放溫入後藥

猪膽汁三箇

銅線三錢醋浸一宿綿去粗

右用竹笪帶溫攪勻然後如常攤貼兼治瘡口不乾加乳香沒藥輕粉尤妙

金寶膏去腐肉朽肉不傷良肉新肉

桑柴灰

五碗用沸湯十碗淋汁用草紙一層皮紙二層故羅底次置灰於上淋之

穿山甲二兩

煨胖

信砒二錢另研

杏仁七枚去皮同信砒穿山甲研細

生地黃二兩另研

粉霜另研

麝香各五分

右將灰汁濾澄清下鍋煎濃下甲末候焦乾一半下麝香次下粉霜乾及九分下辰砂候成膏下炒石灰末以成塊子即收入小罐子內勿見風

### 龍珠膏

龍芽草五兩

棘棗根五錢

海藻二錢五分

蘇木五錢

右細切量水二十碗煎至十二三碗濾去粗又用

桑柴灰二碗半

石灰二碗半

蒼耳草灰二碗半

以草紙二層皮紙二層

放羅底次置灰於上用煎湯熱淋取灰汁十碗許澄清入鍋內前成膏用巴豆霜白丁香石膏麝香輕粉磁罐子收貯每用取敷核上再敷即去舊藥併膿再上新藥其核即潰而愈根小者但只塗藥於根上其核自潰

救苦化堅湯治瘰癧馬刀抉瘻在耳下或耳後下頸至肩上或入缺盆中乃手足少陽之經分其瘰癧在頸下或至煩車乃陽明之經分受心脾之邪而作也今將二証合而治之

黃芪

一錢護皮毛間補肺理虛及活血氣為家之聖藥又實表補元氣之妙劑也

人參

三分藥也如氣短不

調及喘者  
宜加之

炙甘草 五分能調中和諸藥瀉火  
益胃氣亦能去瘡中之邪

真漏蘆

升麻 各一錢

葛根 五分此三味俱足  
陽明本經藥也

連翹 一錢此一味乃  
十二經瘡中之

藥不可無也能散諸血結  
氣聚此瘡家之神藥也

牡丹皮 三分去腸胃  
中留滯宿血當歸身

白芍藥 三分如夏月  
倍之其味酸

生地黃 三分此三味諸經中  
熟地黃 和血生血涼血藥也

肉桂 二分大辛熟能散結積陰証瘡陽須  
當少用之此寒因熱用之意又為寒

柴胡 八分功同連翹如瘡  
不在少陽經則去之

防風 五分已上三陽  
必問手足太陽

症脊痛項強不可回顧腰似折項似拔者是也其防風一味辛溫如  
瘡在膈以上雖無手足太陽經症亦當用之為能散結去上部風邪

荆三棱 炮二分  
廣木 炮三分此二味  
若瘡堅硬甚者

鼠粘子 三分無腫不用  
羌活 一錢

獨活 五分  
白芍藥 三分如夏月  
倍之其味酸

症脊痛項強不可回顧腰似折項似拔者是也其防風一味辛溫如  
瘡在膈以上雖無手足太陽經症亦當用之為能散結去上部風邪

神曲 炒二分食不  
脾 麵消化者用之  
黃連 煎服治煩渴

厚朴 薑製一錢一分  
如腹脹者加之

用之如不甚堅  
硬者不須用  
食健牌  
炒三分如有熱或腿脚無力者加之如有煩燥

益智 二分如唾多者胃不和也咸病人吐  
沫吐食胃中寒者加之無則勿用也麥蘖麪一錢治腹中  
縮急又能消

黃柏

炒三分如有熱或腿脚無力者加之無則勿用  
欲去衣者腎中有伏火也更宜加之無則勿用

右件共為細末湯浸蒸餅捏作餅子日乾搗如米粒大每服三錢白湯送下 如氣  
不順加橘紅甚者加木香少許量病人虛實臨時斟酌與之毋令藥多妨其飲食此  
為治之大法也 如止在陽明分者去柴胡鼠粘子二味餘皆用之 如在少陽分

為馬刀挾癰者去獨活漏蘆升麻葛根更加瞿麥三分 如本人素氣弱其病勢來時氣盛而不短促者不可用考其平素宜作氣盛而從病變之權也宜加黃芩黃連黃柏知母防己之類視邪氣在上中下而用之 假令邪氣在上焦加黃芩半酒洗半生用 在中焦加黃連半酒洗在下焦則加酒制黃柏知母防己之類選而用之 如大便不通而滋其邪盛者加酒制大黃以利之 如血燥而大便乾燥者加桃仁泥酒制大黃二味 如風結燥不行者加麻仁大黃以潤之 如風濺而大便不行者加煨皂角仁大黃秦艽以利之 如脉濺覺身有氣濺而大便不通者加郁李仁大黃以除氣燥也 如陰寒之病為寒結秘而大便不通以局方中半硫丸或加炮附子乾薑煎水冷服之 大抵用藥之法不惟瘡瘍一家諸疾病重人素氣弱者當去苦寒之藥多加人參黃芪甘草之類瀉火而先補其元氣餘皆倣此

柴胡連翹湯治男子婦人馬刀瘡

中桂一分

當歸梢五分

鼠粘子炒另研

炙甘草

酒黃柏

生地黃各一錢

柴胡一錢

五分

黃芩炒

酒知母

連翹各一錢

瞿麥二錢

右細切作一服水一盞煎稍熱服

消腫湯治馬刀瘡

鼠粘子炒五分

黃連炒五分

當歸梢

甘草各七分

瓜蔓根

黃芪各一錢  
蜜炙

生黃芩

柴胡去蘆各一錢二分

連翹二錢

紅花少許

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗稍熱服

柴胡通經湯治小兒項側有核堅而不潰名曰馬刀瘡

柴胡去蘆

連翹

當歸梢

生甘草

黃芩

鼠粘子炒

荆三棱醋炒

桔梗各二分

黃連五分

紅花少許

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗食後稍熱服忌苦藥泄大便

散腫潰堅湯治馬刀瘡結硬如石或在耳下至缺盆或肩上或腋下皆手足少陽經中及  
癩癰遍於頸或至頰車堅而不潰在足陽明經中所生或二症瘡已破流膿水並皆治之  
黃芩八分酒洗半炒半生 草龍膽酒洗四分 瓜蔓根酒洗 黃柏酒制炒

知母酒炒

桔梗去蘆

昆布酒洗各五分

柴胡四分

炙甘草

荆三稜酒洗炒

廣木酒拌炒

連翹各三分

葛根二分

白芍藥二分

當歸梢二分

黃連二分

升麻一分

黃連二分

右細切作一服水二盞先浸半日煎至一盞去粗食後稍熱服於卧處仲足在高處頭低垂每含一口作十次嚥下服畢少頃依常安卧取藥在膈上停蓄故也另攢一料作細末煉蜜為丸如菉豆大每服百餘丸以前煎藥湯送下或加海藻五分炒入亦妙以海藻反甘草此東垣用藥妙處世醫莫曉也

升陽調經湯治癩瘡逸蹠或至煩車此皆出足陽明胃經中來若瘡深遠隱曲肉底是足少陰腎經中來乃戊脾傳於癸腎是夫傳與妻俱作塊子堅硬大小不等並皆治之或作丸亦可

升麻八分

葛根

草龍膽次製炒酒四

黃芩各四分酒製炒

連翹五分

廣木

荆三稜

二味俱酒製炒

炙甘草各四分

當歸梢三分

桔梗五分

芍藥三分

黃柏

酒製炒二分

知母酒炒一錢

黃連酒洗五分

黃芩各四分

右細切作一服水二盞先浸半日煎至一盞去粗食後稍熱服外另稱十貼之數為細末煉蜜丸如菉豆大每服一百丸服藥時足高去枕仰卧噙一口作十次嚥之留一口在後送下丸藥服畢寢卧如常

連翹散堅湯治耳下或至缺盆或肩上生瘡堅硬如石動之無根名曰馬刀瘡從手足少陽經中來也或生兩脇下或已流膿作瘡未破並皆治之

柴胡

一錢  
二分

草龍膽

酒制四次

土瓜根

酒制各一錢

黃芩

酒炒二次  
次七分

當歸梢

生黃芩

廣木

荆三稜

酒炒二次

連翹

白芍藥

炙甘草

黃連

酒炒二次

蒼术米

甘浸各二分

右細切作一服外另秤十貼之數為細末煉蜜為丸如菉豆大每服百餘丸煎者用  
水二盞先浸大半日煎至一盞去粗臨卧稍熱服去枕仰卧每口作十次嚥之留一  
口送下丸藥服畢如常安卧更以後藥塗之

龍泉散

龍泉粉

炒即磨刀  
石上粉也

瓦壘粉

廣木

荆三稜

酒洗炒

昆布各五錢

右同為細末煎熟水調塗之用此藥去疾尤速

三聖丸治瘰癧神妙刦藥

丁香五十粒

班貓及頭足炒

麝香一錢  
另研

右為末用鹽豉五十粒湯浸爛研如泥和前藥末丸如菜豆大每服七丸食前溫酒送下日三服至五七日覺小便淋澀是藥之効便加服或小便下如青筋膜之狀乃病之根也忌濕麪毒食

立驗大聖散治瘰癧劫藥

班貓一合同炒米黃色去米用班貓

白僵蚕一錢去絲嘴炒

黑牽牛半生半炒共三錢取頭末

荆芥穗一錢

右為細末每服一錢空心無灰老酒下服此藥須忌魚肉酒醋鹽醬及發風動氣等物止可吃菜蔬白粥且如次早服藥隔夜不吃夜粥黃昏煎川木通湯調下玉屑妙靈散二錢重次日五更酒調立驗大聖散一貼如不能飲酒用燈心木通湯調下至日中覺小腹攻痛小便澀痛又用燈心湯調下琥珀末一錢或玉屑妙靈散亦可當利惡物從小便中出如蒲萄肉狀中有凝血一點或未下三日後可再服至日中前用六丁神散一服催之必然自下五六日後再催一服以病根除盡為度如項上有癰一枚取下惡物十枚則盡病根如有小腹攻急革中澀痛之惱不必驚恐過後便

自平復無事

玉屑妙靈散

滑石細研為末每服一錢煎川木通湯調下

六丁神散

苦丁香

六枚或秤五分重

白丁香一錢

苦參末五分

赤小豆一錢

磨刀泥

青石者佳名龍泉粉

一大班猫頭足箇去炒

白僵蚕去蟲嘴炒各一錢

右共為細末每服一錢重空心無从酒調下

癰瘤方法

破結散治石癰氣癰筋癰血癰肉癰馬刀癰癰等症

海藻酒洗淨

龍膽草酒洗

海蛤粉

通草

貝母去心

昆布酒洗淨

礬石枯

桑寄生代效各三錢分以

麥麯炒四錢

半夏麯二錢

右為細末每服二錢熱酒調食後服忌甘草鯽魚雞肉五辛生果有人於項上生癰大如茄子潮熱不食形瘦日久百方不効後得此方去松蘿加真桑寄生一倍服三五日後其瘡軟而散熱退而愈屢醫數人皆効

南星散治皮膚頸項面上生瘤大者如拳小者如粟或軟或硬不痒不痛宜用此藥切不可輒用針灸多致不收

生南星

大者一枚

右細研爛入好醋五七點杵如膏如無生者即以乾者為末醋調如膏先以細針刺患處令氣透却以膏藥攤貼覺痒則頻換貼取效

瘤者氣血凝滯結聚而成或如桃李或如瓜瓠其名有六曰骨瘤曰脂瘤曰膿瘤曰血

瘤曰筋瘤曰風瘤以其中各有此物而名之也已上諸瘤通用龍珠膏治之

龍珠膏

方見前瘰癧條下

瘤宜服十六味流氣飲

方見前妙岩條下

凡癰氣先須斷厚味用海藻一兩黃柏二兩為末置掌中時時舐之以津唾濕下待消三分之二止藥

結核方法

丹溪曰大凡結核在項在臂在身如腫毒不紅不痛不作膿者多是痰注不散名曰痰核

用二陳湯加酒炒大黃連翹桔梗柴胡煎服

又方治臂核作痛用二陳湯加連翹川芎皂角刺防風黃芩酒炒蒼朮煎服

治耳後頂門各有一核用炒殭蚕酒蒸大黃青黛牛膽南星為末蜜丸噙化

疔腫方法

石香程氏曰疔腫之症皆蓄熱毒之深而成者也近者多見因食炙牛疫馬之肉而成此証其形有十三種皆以形而名之耳一曰麻子疔二曰石疔三曰雄疔四曰雌疔五曰火疔六曰爛疔七曰三十六種疔八曰蛇眼疔九曰鹽膚疔十曰水洗疔十一曰刀鎗疔十二曰浮溫疔十三曰牛狗疔惟三十六種疔最為可畏其狀頭黑浮起形如黑豆四畔大赤色今日生一明日生二後日生三乃至十數尤為可治若滿三十六則為不治之証也夫十三種疔其形狀雖各不同而其所由皆熱毒之甚也治法並急用奪命丹下之去其毒之銳勢次服化毒丸及內托散二活散雄麝湯隨証經絡病勢緩急用引經藥斟酌施治如無他証有熱即退熱有腫則退腫如身冷自汗嘔逆燥喘狂喝妄語直視者皆毒氣入內不可治矣如疔已拔去用金銀白芷散加減十宣散調之方獲全安也

今將十三種疔証候開列于後

一曰麻子疔其狀肉起頭如黍米色稍黑四邊微赤多痒忌食麻子近油衣布衣并入麻田中行

二曰石疔其狀皮肉相連色如黑豆甚硬刺之不入肉微痛忌瓦礫磚石之屬  
三曰雄疔其狀頭黑盤四畔仰炮起有水出色黃大如錢孔形高者忌房事

四曰雌疔其狀瘡稍黃向裏膚亦似灸瘡四面皰漿起心凹色赤如錢孔者忌房事

五曰火疔其狀如湯火燒灼瘡頭黑膚四邊有煙焰又如赤粟米者忌火燒烙

六曰爛疔其狀色稍黑有白斑瘡中潰有膿水流出瘡形大小如是面者忌沸熱食爛物

七曰三十六疔其狀頭黑浮起形如黑豆四畔起赤色今日生一明日生二及至十數未滿三十六猶可施治若滿三十六藥所不能治也忌嗔怒蓄積怨恨

八曰蛇眼疔其狀瘡頭黑皮浮生形如小豆狀似蛇眼大體硬忌惡眼人看并嫉妒人見忌毒藥

九曰鹽膚疔其狀大如是面四邊皆赤有黑粟粒起大忌食鹽味

十曰水洗疔其狀大如錢形中如錢孔瘡頭白裡黑膚汁出中硬忌飲漿水水洗渡河

十一曰刀鍊疔其狀闊狹如薤葉大長一寸左側肉黑如燒烙忌刺及刀鍊切割鉄刃所傷可以藥治不可亂攻

十二曰浮漚疔其狀瘡體曲圓少許不合長而狹如薤葉大內黃外黑黑處刺之不痛黃處刺之痛

十三曰牛狗疔其狀肉色皰起搗不破

右十三種疔瘡初起瘡心先痒後痛先寒後熱熱定則寒多四肢沉重心驚眼花若大重者則嘔逆嘔逆者難治其麻子疔一種始末惟痒初錄忌者不得觸犯觸犯者發作難治其浮溫疔牛狗疔兩種無所禁忌縱不療亦不能殺人其狀寒熱與諸疔不同皆宜將護依法治療禁忌不得觸犯若或觸犯脊強瘡痛極甚不可忍者是也又云疔腫初發時突起如釘故謂之疔令人惡心惡寒四肢強痛一日瘡變為焦黑色腫大光起根硬刺之不覺痛皆其候也在手足頭面胸背骨節間最急其餘處則可治毒入腹則煩悶恍惚似醉如此者三二日間死矣皆不可不速治也

返魂丹經云汗之則瘡愈必用此藥汗之

乳香

沒藥

辰砂

雄黃

各一錢  
五分

輕粉

片腦

麝香

各五分

海羊

即蠅牛也  
不拘多少

蟾酥

青黛

粉草

硼砂

各一錢

右為細末用海羊搗膏為丸如雞丸加酒麪糊些少丸如彈子大每服一丸兼生葱頭二三箇細嚼噙下疔腫及癰腫毒氣入膈者得微汗即解一方加銅綠寒水石輕粉枯礬各一錢重

按上藥皆非發汗之藥蓋能解毒又能追逐毒氣從腠理為汗化也

拔疔法以黑枯牛牽於石塔上必撒糞候糞上生菌取焙乾與豨莶草葉等分為細末先用竹筒兩頭去節一頭解十字路將不解頭套在疔上以線緊縛竹筒隔入肉內為度以前藥末一匙滴水和之放於筒內少時藥滾起則疔自拔起若一次未効漸加度數其疔必拔也

奪命丹

巴豆一兩去殼醋煮一伏時

黃丹三錢炒

硃砂

雄黃各三錢

乳香

鬱金各五錢

大黃一兩

輕粉二十粒

蟾酥一錢或五分

飛羅麪三兩

右為細末蟾水糊為丸如菉豆大隨身年分虛實加減丸數服之以下其毒如無事  
命丹雄黃丸代之亦効

雄黃丸

雄黃

鬱金各一錢

巴豆十四粒去殼

麝香少許

皂角

全蝎各一錢

右為細末滴水為丸如菉豆大每服二十九清茶送下亦看大小虛實斟酌加減丸數

數

化毒丸

片腦

麝麝香各五分

硝砂

硃砂

雄黃各二錢

輕粉十叢

蟬蛻二十枚  
洗去土

右為細末新取蟾酥為丸如菉豆大每用一丸放於舌上取涎而愈

獨蟾丸并取蟾酥法

拿取活蟾

蟆即大壯蛤蟆通身有兜壘者俗名癩蛤蟆又名風雞大者重五六兩不拘幾箇

捉住後脚以大桑葉或油單紙包掩其頭用鐵釘一箇括取眉間白汁濺於葉上凝結如濕真粉就丸如菉豆大一蟾或作一丸多者作二丸懸當風處陰乾如患疔腫者即以一二丸置舌尖上仰卧片時其苦水滿口就此水嚥下或以鍼刺疔腫頭上納藥一丸於中外以薄皮紙貼護之勿令藥脱落背癰及一切癰腫初起時亦可依此法治之神効已上取蟾酥法切防蟾

雄麝湯解疔毒如神

凡解毒不可無雄黃味砂

雄黃另研一錢

硃砂另研一錢

真菉豆粉二錢

麝香另研

乳香另研一錢

白芷

茜草根

紫花地丁草各二錢

牡蠣

殭蚕

牛蒡子炒

大黃

金銀花

青木香

梔子

荆芥穗

朴硝

甘草各一錢

胡桃殼膜二箇去

右以白芷以後一十四味細切用無灰酒一碗浸少時搗細又加水一碗同煎至一  
碗去粗及濁脚入前雄黃等五味調勻作一服更審患處經絡分野依東垣引經瀉  
火藥加之尤妙欲利倍加大黃朴硝二味臨後下 茵草即過山龍

二活散

卷活

獨活

當歸

烏藥

赤芍藥

金銀花酒洗

連翹

天花粉

甘草節

白芷各四錢五分

紅花

蘇木

荆芥

蟬蛻

乾葛各三錢

檀香二錢

右為細末每服三錢煎蒼耳湯調下

取疔散

雄黃

硇砂

蟾酥

信石各一錢

巴豆十粒

輕粉十條

右將疔四畔用針刺破醋調塗敷疔落後用長肉拔毒膏藥貼之

解毒丸

白芷十兩

木香五兩

硇砂研一錢

貫眾晒乾杵末秤四兩取新者去皮

切

朴硝四兩另研

蘿蔔子去殼醋浸炒易研末四兩

京墨八錢另研

右和勻糯米糊丸如龍眼大青黛為衣陰乾每服一丸無灰酒磨化下  
賀藍先生解毒丸解諸藥毒及山嵐瘴氣火牛馬豬羊肉毒魚腥羨菜毒暑熱濕毒傷寒  
濕毒小兒斑疹喉痺急証紅赤癰腫及諸般無名腫毒

黃柏

貫眾

茯苓

藍根

葛根

生地黃

雄黑豆

甘草

滑石

縮砂

陰地蕨

薄荷各三兩

益智

大黃

寒水石

紫荷車即金線重樓

馬勃

草龍膽

僵蚕炒

百藥煎

山梔子各一兩

右為細末煉蜜丸每一兩分作十九細嚼新汲水送下小兒驚風薄荷汁下蜜水浸  
蒸餅為丸亦可或加黃連白芷

萬病解毒丸

射干

文蛤即五子

杏仁

石膏

續隨子去殼去油

蚕休即金線重樓

土珠

大黃酒蒸各二兩

山豆根

山茨菰

白藥子

白芷一兩

麝香二錢

青黛一兩

威靈仙一兩

大戟一兩

黃連

風化硝各五錢

右為末糯米糊為丸如彈子大青黛滑石細研為衣陰乾此藥解一切毒蠱毒及鼠  
莽河豚魚毒菌毒疫死牛馬肉毒喉痺骨鯁竹木刺毒並用急流水磨下癰疽發背  
疔腫瘡瘍毒蛇犬咬蜈蚣蜂蝎蠻毒刀斧湯火傷並用井花水磨下併塗傷處婦人  
鬼胎惡氣積塊虫積心胸痞滿肚腹脹並用好酒磨下

千金漏蘆湯治疔腫神妙

漏蘆

連翹

黃芩

白欽

枳殼

升麻

麻黃去根節

朴硝另研一兩

大黃

紫花地丁

金銀花各五錢

右除朴硝外為細末後入硝和勻每服三錢水一盞半薑三片薄荷三葉煎至七分  
空心溫服利下惡物止藥 地丁即大薊也一云剪刀草開黃花者名黃花  
地丁開紫花者名紫花地丁

取疔瘡方

青木香根五錢

木香

雄黃

甘草各一錢

右為末湯調下以利去毒氣四五行即愈

破毒散

信石

硇砂

黃丹

雄黃

乳香各一字

斑貓

五箇去足炒

麝香少許

右為末取新蟾酥和丸如菉豆大以鉗針破開疔頭納藥一丸在内外以膏藥護之  
如無蟾酥加麪糊些少

灸法以大蒜爛搗成膏塗瘡四圍留瘡頂以艾炷灸之以爆為度如不爆稍難愈宜多  
灸百餘壯無不愈者

祖傳經驗秘方治食火牛馬肉成疔瘡欲死者以柏油木葉搗絞取真汁一二碗頓服之  
得大瀉毒氣而愈如冬月無葉時取嫩根研水服之亦效未利再服以利為度

諸瘡方法

活魂丹治一切惡瘡大有神効

血竭

乳香

沒藥

銅綠

枯白礬

黃丹

穿山甲

一錢

輕粉

蟾酥各五分

麝香少許

穿山甲

一錢

右為細末用蝎牛搗膏為丸如菉豆大每服一丸重者二丸又用葱白一寸嚼爛裹藥熱酒送下食前服

又方用真殭蚕蟬蛻二味等分為末香油調敷拔疗效

治諸般惡瘡

經霜芭蕉葉為末香油調敷先用忍冬藤葱椒蒼耳草煎湯洗瘡淨挹乾敷藥外以油紙掩之

又方治諸般惡瘡用松木上白蠟泥黃丹各等分炒黑香油調敷用油紙夾上日易後用龍骨沒藥欽瘡口收肉

又方治惡瘡用黃丹入香油煎入朴硝抹之

天泡瘡服防風通聖散及用蚯蚓糞炒蜜調敷之從肚皮上起者裡熱發外還用通聖散藥妙

又方治天泡瘡用野菊花棗木根煎湯洗黃柏滑石末敷

治脚上沙瘡清水出者用紫燕窠泥略炒黃柏二味共研為末香油調敷

治臙瘡用白膠香一兩黃柏石膏各一兩青黛五錢龍骨五分為末香油調敷

治臙瘡方以香油一兩入胎髮如梅大煎焦研去粗入白膠香黃蠟各一兩烊化入生龍骨赤石脂血竭炒各一兩攪勻候冷磁器盛擗作薄片貼瘡上外以竹箬包之三日後翻過藥再貼以活血藥煎湯洗之

又治臙瘡方用箭筈剪去兩頭以黃柏煮汁令稠和白膠香草麻子同搗成膏攤箬繩面折縛光面貼之先以清茶放溫洗挹乾貼之

又方治外臙脚瘡用灶心黃土研極細入黃柏赤石脂黃丹各五錢輕粉乳香沒藥各一錢細研和勻以清油調如膏以油絹攤藥將絹面貼於瘡上外以油紙掩之扎縛定縱痒不可開視數日後未愈再換藥緊縛直待結痂去藥先必以茶清洗瘡淨敷藥

桃花散治一切瘡生肌藥

白芨

白斂

黃柏

黃連

乳香另研

麝香另研

黃丹各等分

右為細末摻於瘡上二三日生肌平滿如故

治火燒及湯泡瘡用經霜桑葉焙乾燒存性為細末香油調敷或乾敷二三日結痂平

復

又方治火燒湯泡瘡時取黃蜀葵花以香油浸之其花日漸烊於油中以此油敷瘡即  
愈或只收花焙乾為末香油調敷亦妙

下疳瘡用青黛海蛤粉密陀僧黃連為末敷之

又方以雞內金燒存性為末敷之

又方治下疳瘡用鳳凰退燒存性研極細香油調敷外看瘡大小剪殼中白膜貼之須  
靜坐一日不動即結痂矣

頭瘡用豬油二錢半生半熟雄黃水銀各二錢五分和勻敷之

金絲瘡其狀如繩線巨細不一上下行至心即死可於瘡頭上截經刺之以出血後嚼

萍草根敷之立愈

手癩瘡用皂角枯礬輕粉黃連黃柏為末敷之

砂瘡用塌地藤燒灰敷之

諸瘡痛不可忍者用苦寒藥可施於資稟厚者若稟氣薄者宜於補中益氣湯中加苦  
寒藥也若血熱之人瘡痛宜四物湯加黃芩鼠粘子連翹在下加黃柏若肥人濕熱  
瘡痛宜防風羌活荆芥白芷蓋風能勝濕故也

疥瘡并馬疥瘡用馬鞭草不犯鐵器搗取自然汁半盞飲盡十日內愈神効  
白癩風癬以小麥攤石上以鐵器燒紅壓出油搽之立效

治風癬疣瘡用梓樹葉木綿子羯羊屎鼠屎盦油敷之

治癬瘡用浮萍末一兩蒼耳子蒼木各二兩苦參一兩五錢香附二錢五分黃芩五錢

水煎洗之

身上虛痒用四物湯加黃芩煎調浮萍末一錢服

又方治通身痒用凌霄花為末酒調服一錢

秘傳一擦光治疥瘡及婦人陰蝕瘡漆瘡天火丹諸般惡瘡神効

蛇床子

苦參

蕪荑各一兩

雄黃五錢

枯礬一兩

取肉

硫黃五錢

輕粉二錢

樟腦二錢

大楓子

五錢取肉

川椒五錢

右為細末生豬油調敷

又方治証如前兼小兒癩頭瘡治之

蛇床子一兩

雄黃五兩

硫黃一兩

枯礬二兩

大楓子

五錢取肉

川椒五錢

黃柏一兩

輕粉二錢另拌入

牛皮岸

薰牛皮煙岸也如無  
以香爐岸代之一兩

黃丹一兩

右為細末生豬油調敷

凡先哲治癰疽要方俱採摭于後以備選用

五香連翹湯治癰疽未成膿者服之可散但當看時令及資稟加減用之

乳香

木香

沉香

丁香

連翹

射干

升麻

木通

桑寄生

麝香

獨活

大黃

各等分

內托復煎散托裏健胃  
右細切每服三錢水一大盞煎七分去粗溫服

地骨皮

黃芩

茯苓

芍藥

人參

黃芪

白朮

桂心

甘草

防己

當歸

各五錢

防風

一兩

右細切先以蒼术用水五升煎至三升去木入前十二味再煎至三四盞取清汁作  
三四次終日飲之又煎蒼术粗如前再煎諸藥粗服之

蒼术半斤

白芷升麻湯治手陽明經分臂上生癰左右寸部脉皆短得之俱弦按之洪緩有力此得之八風之變者

白芷

一錢  
五分

升麻

四錢

桔梗

各一錢

甘草

炙半錢

黃芪

四錢

酒黃芩

四錢

生黃芩

三錢

紅花

五分

右細切分二服水酒各一盞煎至一盞溫服

托裏散治一切惡瘍發背疔腫便毒始發脉洪數弦實腫甚將作膿者三服消盡

大黃

牡蠣

瓜萎根

皂角刺

朴硝

連翹

各六分

金銀花

當歸各二錢

赤芍藥

黃芩

各四錢

右細切作一服水酒各一盞煎至一盞四分服

又托裏散

黃芪

當歸

金銀花

甘草各等分

右細切每服一兩酒水合煎更詳部位各加引經藥尤妙

烏金散治癰疽疔腫時毒附骨疽諸惡瘍等証若瘡黑陷如石堅四肢冷脉細或時昏冒譖語循衣煩渴危篤服此汗之即瘡起

蒼耳頭

五月五日  
午時收採

草烏頭

火麻頭

六月收採

木賊

去節

蝦蟆頭

鱗皮節

酥炙

麻黃

去根節

右晒乾各等分同入磁器內鹽泥固濟烈火煅從早至申時如黑煤色為度研為末每服二錢病重者三錢熟酒調下未汗再進一服如汗已乾却服解毒疎利之藥如脩合此藥必選天時清明好日於靜室中合勿令雞犬貓畜及陰人孝子見之

黃芪六一湯治癰疽發渴

黃芪

六兩  
蜜炙

甘草

一兩

右細切水煎不拘時服

一方治一切瘡癥癰疽發背殊妙亦能下瘀血

大黃

三錢

甘草

辰砂

血竭

各一錢

右為細末酒調服

內托護心散

乳香

一兩

真茱豆粉

四兩一方  
用二兩

右為細末每服二三錢煎甘草湯或新汲水調下

小五香湯

木香

沉香

乳香

藿香

連翹各二錢

麝香另研少許

右為細末每服一錢水一盞煎七分溫服

復元通氣散

當歸

穿山甲

煨脆各五錢

川芎

天花粉炒

青皮

陳皮各一兩

大黃

甘草

黑丑

取頭末各五錢

右為細末每服二錢溫酒調下

金銀白芷散

黃芪

當歸各一錢

檳榔

川芎各五分

甘草一錢

天花粉五分

乳香

沒藥各三分

皂角刺去尖炒

金銀花各一錢

防風三分

白芷一錢

右為細末分三服每服水酒各半盞煎連服

正鐵箍散

貝母去心五兩

白芷

蒼耳草灰各二兩

醋拌晒乾

或加龍骨一錢尤妙

右為細末水調或香油調貼瘡上

大鐵箍散

芙蓉葉

猪卷皮

木鱉子各四兩

白芷

黃柏

寒水石各二兩

大黃

紫荆皮各一兩

赤豆

白飲各二兩

白芨一兩

防風五錢

貝母二兩

真地青

羌活各一兩

右為細末涼水調圍癰四畔如肉脆去白芨白飲加生地黃地榆用芭蕉油調敷熱甚者用三消散

三消散退極熱証赤腫破開者

朴硝

硝硝

大黃

梔子炒黑色

寒水石

南星各等分

右為末生地黃汁調塗貼芙蓉葉汁調亦可

雲母膏治一切癰疽瘡瘍折傷等証

蜀椒

去日及閑口者畧炒

白芷

沒藥

赤芍藥

肉桂

當歸

鹽花

菖蒲

肉桂

白芷

沒藥

赤芍

麒麟竭

黃芪

白芨

芎芻

木香

龍膽草

白斂

防風

厚朴

麝香

桔梗

柴胡

松脂

人參

蒼朮

黃芩

乳香

附子

茯苓

良薑

合歡皮各五錢

硝石

甘草

雲母各四兩

柏葉

桑白皮

槐枝

柳枝

黃丹二十兩

水銀以絹另包待膏成以手細彈鋪在上名養膏母

陳皮各二兩

清油四十兩

右除雲母硝石麒麟竭乳香沒藥麝香黃丹臘花八味另研外餘藥並細切入油浸七日文火煎以柳枝不住手攪候匝沸乃下火沸定又上火如此者三次以藥黑色為度去粗再熬後入丹與八味末仍不住手以槐柳枝攪滴水中成珠不軟不硬為度磁器收貯候溫將水銀彈上用時先刮去水銀或服或貼隨宜用之其功甚大也太乙膏治一切癰疽瘡癧貼之神効亦可內服須詳証經絡作湯使送下

玄參

白芷

當歸

肉桂

大黃

赤芍藥

生地黃各一兩

黃丹

真麻油二斤

右細切入油浸夏三日冬十日春秋七日文火煎黑色去粗入黃丹再熬以槐柳枝  
不住手攪滴水中成珠不軟不硬磁器收貯  
神異膏治諸般癰腫癰毒殊效

露蜂房有蜂兒多者佳一兩

玄參五錢

黃芪七錢五分

金蛇退

五錢用鹽水洗淨晒乾

杏仁一兩去皮尖角者佳皂角水洗淨

黃丹五兩飛

香油十兩

亂髮

如雞子大一塊無病少年男子

右先將香油入亂髮於鍋中文火熬候髮焦烊盡以杏仁投入候杏仁黑色用真綿  
濾出粗再將油入鍋內然後下黃芪玄參二味文火熬一二時久住火候片時火力  
稍息漸入露蜂房蛇退二味以柳枝不住手攪慢火熬至紫黑色又再用綿濾過去  
粗入爐中文武火熬下丹急攪千餘轉滴水中成珠子膏即成矣冬月略嫩些夏月  
略硬些磁器盛貯隨意攤貼

萬梔青雲膏治諸般癰腫未成膿者貼散已成膿者拔毒追膿腹中痞塊止瘧疾貼大椎  
及身柱其效如神

及身在某處如神

白松香一斤去

草麻子三百粒去殼

杏仁三百粒去殼

銅青三兩

乳香

一兩五錢

沒藥一兩五錢

輕粉二錢

右共作一處用鐵槌木砧於日中搗成膏如燥少加香油杵之或用石臼木杵搗亦可用磁器盛絳帛攤貼湯中做不見火

一方治背癰附骨疽乳癰及一切癰腫未成膿者發散極効

槐花

一兩炒焦色

胡桃

十箇新鮮不油殼去殼

右二味於沙盆內研爛如泥熱酒調和溫服如能飲酒人多飲愈效一醉後而癰腫散矣

豨莶散治癰疽發背及一切癧毒等証效如神

豨莶草

其葉長如牛舌其氣如豬臭者

小薊根

五爪龍 即五葉藤

生大蒜

右四味各等分細研用酒和勻濾去粗服一碗得大汗通身而愈  
又方治諸般癰腫神效已上並祖傳方

新掘天門冬一味約三五兩洗淨入沙盆內研細以好酒盪起濾去粗傾服未効再服一二服必愈

癰風癰與頰通

六十一

論

內經曰風之傷人也或為寒熱或為熱中或為寒中或為癰風又曰癰者因營衛熱鬱其氣不清故使其鼻柱壞而色敗皮膚瘡潰風寒客於脉而不去名曰癰風丹溪曰是受天地間殺物之風故也然近見病此者原其所由多是熱血得寒所致或夏月勞甚而入寒泉澡浴或冬月酒後而乃踢冰履霜及入水取魚由是濕熱鬱於內而不散風寒客於外而不行內外怫鬱既久而漸成肌肉之敗腐矣經所謂熱勝則肉腐是也大抵此症屬肺歸重於手足陽明之經蓋手足陽明者胃與大腸主之肺脾二經之腑也脾主肌肉而肺主皮毛乃腑及於臟病也經又曰腸胃為市無物不受無物不包故其熱毒積於中而形於外耳故治法必先取陽明而後及於太陰亦本而標之之義也又濕熱甚必生風風甚則生虫如腐草為螢之類又治法必先殺其虫瀉其火然後生血涼血祛風導滯降陽升陰皆為治之急務也治雖多門大畧不越乎此也學者詳之

脈法

脉兩寸浮而緊

或浮而洪

陽脉浮弦陰脉實大

脉浮緩者易治

洪大而數者難愈

沉實者難愈

脉浮者浮而緊  
脉浮緩者易治

或浮而洪  
洪大而數者驚心

陽脉浮弦陰脉實大  
沉實者難愈

脉溢者病在上

脉浮者病在下皆為不治之証也

方法

丹溪方法  
凡五條

丹溪曰大風病是受天地間殺物之風古人謂之厲風者以其酷烈暴悍可畏耳人得之分在上在下氣受之則在上血受之則在下氣血俱受則在上復在下然皆不外乎陽明一經陽明者胃與大腸也無物不受治之者須致意看其死瘠與瘡上體先見者多者在上也下體先見者多者在下也在上者以醉仙散取涎血於齒縫中出在下者以通天再造散取惡物虫積於穀道中出後用防風通聖散調之更用三棱針於委中出血夫上下同得者甚重自非醫者神手病者鉄心罕能免此夫從上或從下以漸而來者皆是可治之証人見其病勢之緩多忽之以法治之雖已全愈若不絕味斷慾皆不免再發而終於不救也予治五人矣其不死者惟一婦人因貧甚無物可食耳餘皆三四年後再發孫真人云嘗治四五百人終無一人死非真人不能治蓋無一人能守禁忌耳其婦人於本病外又服百餘貼加減四物湯半年之上月經行十分安愈醉仙散須量人大小虛實與之証候重而急者須先以再造散下之候補養得完復與此藥須斷鹽醬醋諸魚椒果煎炒燒炙等物止可淡粥及淡煮熟時菜雖加亦不可食惟烏梢蛇菜花蛇淡酒蒸熟食之可以助藥力也

外科精要為諸瘡立法而不及癟風蓋風為百病之長以其殘害膚體去死不遠一有染此鮮能免者比之瘡瘍治法為難乃不言及夫八方之風起因於八方應其時則物生違其時則殺物人之稟受有殺氣者則感而受之如待虛受物後又因起居飲食男女漸成鬱氣二氣積於厥躬脾先受之乃為濕病濕積之久火氣出焉火氣滋蔓氣濁血汚一云血熱凝結其氣不清化生諸虫以次傳歷臟腑必死之病而有可生之理其始病者胃氣微傷脾主肌肉流行甚緩傳變以漸或可藉醫藥之功而免謂之必死非惟醫不知藥患是不能禁慾可哀也夫

近見粗工用藥佐以大楓子油殊不知此藥性熱有燥痰之功而傷血至有病將愈而先失明者

宋洞虛云大風有五黑色不治餘皆可治虫食肝眉落食肺鼻崩食脾聲啞食心足底穿膝虛腫食腎耳鳴啾啾耳弦生瘡或癰或痛如針刺狀食身則皮痒如虫行自頭面來為順風自足起者為逆風多因感寒熱與瘀濁雜氣而成治法先以雷公散即再造散下之以稀粥養半月勿妄動作勞後以醉仙散中間或吐或利不必怕怯但頤喉頭面腫吞不得下漸出惡水或齒縫中出臭水血絲或言不得或悶而死難以飲食只以稀粥用管灌入或一旬或半月一月而漸白而安重者又與換肌散

換肌散治大風年深不愈者以致眉毛脫落鼻梁崩塌此藥不端月取效如神

不得下漸出惡水或膩縫中出臭水血絲或言不得或陷而死難以飲食日以耗

月

換肌散治大風年深不愈者以致眉毛脫落鼻梁崩塌服此藥不踰月取效如神

黑花蛇

白花蛇皆斬黃來者並用酒浸一宿

地龍去土各三兩

當歸

細辛

白芷

天麻

蔓荆子

威靈仙

荆芥穗

甘菊花

苦參

紫參

沙參

木賊

不灰木

炙甘草

白蒺藜

天門冬

赤芍藥

定風草按本草即天麻也今皆用野天麻即益母草未知可否再宜審之

何首烏

蒼朮米泔浸去皮

石菖蒲

胡麻子

草烏頭去皮臍

枸杞子四味俱炒紫色

醉仙散

川芎

木鱉子各二兩

防風各五錢寶鑑前四味各一兩

右為細末每服五錢溫酒調下酒多為妙

胡麻子

牛蒡子

蔓荆子

枸杞子四味俱炒紫色

白蒺藜

苦參

括蔥根

防風各五錢寶鑑前四味各一兩

右為細末每一兩五錢入輕粉一錢拌勻再服一錢茶清調下晨午夕各一服後五  
七日先於牙縫內出臭涎渾身疼痛昏悶如醉後利下膿血惡臭屎為效

通天再造散

鬱金五錢

皂角刺獨生黑尖者去尖

大黃泡各一兩

白丑頭末六錢半生半炒

右為末每服五錢日末出時以無灰酒調面東服之當日必利下惡物或臭膿或虫如出口黑色乃是多年赤色乃是近者數日後又進一服無虫積乃止

愈風升治癩疾手足麻木毛落肩脫遍身瘡瘍皮膚癰癧之成瘡及一切疥癬風疾皆

效

苦參研取

土桃蛇

一條酒浸二三日去骨取肉日乾

烏梢蛇

頭末四兩  
白花蛇各一條並同上制

右為細末以皂角一斤剗長寸許段無灰酒浸一宿去酒以新水一椀採取濃汁去粗銀石器內熬膏和前末九如梧桐子大每服六七十丸煎防風通聖散送下粥飯壓之日三服三日浴以大汗出為應再三日又浴取大汗三浴乃安浴法見後條

一法用桃柳桑槐楮五般枝濃煎湯大缸浸坐沒頸一日俟湯如油安矣 本草治惡疾遍身生瘡濃前萍湯浴浸半日大效此神方也 又以荆芥穗大黃梔子蔚金地黃杜仲防風羌活獨活白蒺藜等分為細末以大楓子油入熟蜜丸如梧桐子大每服茶清送下四五十九一日三服須守戒三五年日誦觀音千萬聲以攝其心禁其

黃杜仲防風羌活獨活白芷川芎等分為細末以大楓子油入熱蜜丸如本丸一  
服茶清送下四五十九日二服須守戒三五年日滿觀音千萬聲以備其心禁其

慾乃安也

一法以苦參五斤好酒三斗漬一月每服一合日三服常與不絕覺脾既安細末服之亦良尤治癰瘍方出圖經陶隱居以酒漬飲治惡瘡久服輕身白華子以為殺虫本草除伏熱養肝膽氣子嘗以蒼耳菜為君以此物為佐更以酒煮烏蘆魚代補蛇之或缺研細糊丸如梧桐子大每服五六十九加至七八十九熟茶清送下日三服一二月而安若入紫萍尤捷紫萍多水蛭須寒月於山沼取之淨洗去泥畧蒸透乾用一法治手指攀曲節間痛甚漸至斬落用草麻子去殼黃連剉如豌豆大各一兩水一升小瓶浸春夏三日秋冬五日取草麻子破平旦時面東以浸藥水服一粒漸加至四五粒微利不妨忌猪肉魚腥宜如淡累獲神效

一法先服加減通聖散大瀉惡毒穢積又用三稜針看肉黑處及委中紫脉刺出死血不可令出太過恐損真氣後服神仙紫花丸

防風五錢

去蘆

浸洗

三錢酒

連翹三錢

去蒂

薄荷

二錢

川芎五錢

荆芥穗

五錢

白芍藥二錢

麻黃

三錢去根

節湯泡

梔子三錢

去殼

桔梗五錢

枳殼

去穰

荳蔻炒

去殼

石膏

各五錢

甘草三錢

去殼

滑石三錢

去殼

黃芩三錢

去朽

柴胡

五錢

黃連

五錢

黃柏

三錢

生地黃

三錢五分酒製

羌活

五錢

熟地黃

三錢五分酒製

錦紋大黃

六兩

芒硝

一兩

皂角刺

一兩獨生者去尖

右細切分八服每服用水一椀半煎至一椀空心服日進二服五六日後又進二服待補養完又行二次然後服後丸藥

神仙紫花丸治癲風及諸般惡瘡風瘡其效如神但要藥真無有不效者輕者一料可愈重者二三料除根

白花蛇

一具出新鮮者佳蚯腐者不堪用去頭尾各四五寸并一兩為率連皮骨用一兩

鐵

五錢

何首烏

荆芥穗

威靈仙

各四錢

麻黃

連根節

胡麻子

一錢

蛇床子

二錢

右六味

細切同蛇用無灰酒一大碗浸一宿去蛇皮骨通晒乾仍還原酒內再浸再

晒酒盡為度待晒極乾共為細末另包

木香

沉香

各二錢

人參

一兩

當歸

七錢五分

明天麻

猪牙皂角

各五錢

麝香

一錢五分鼻塞聲重者倍之

乳香

沒藥

各一錢

明雄黃

辰砂

各五分大塊者佳

肉豆蔻

一枚煨

定風草

二錢即天麻

還瞳子

即草決明一兩

右屬至辰砂五味各另研細細不見火其餘草木味亦另研細細過連前五味和同

足風草

明雄黃

辰砂

肉豆蔻

右麝至辰砂五味各另研極細不見火其餘草木味亦另研細羅過連前五味和匀  
另包

防風

去蘆

羌活

甘草

細辛

川芎

蒼朮

米泔浸宿

枇杷葉

去毛筋焙乾

白芍藥

金銀花

五加皮

香白芷

苦參

胡麻子

白附子

米泔浸炮

麻黃

草烏頭

米泔浸炮

川烏

米泔浸炮

石菖蒲

各二錢五分

右為細末另包

總合法治用大楓子三斤

新鮮者佳去油黃色者不堪用去殼

以磁罐一个盛之少入無灰酒以皮紙竹

箬重重包口勿令泄氣頓滾湯中勿令沒罐口外以物蓋鍋口密封固文武火蒸候

黑爛為度杵無渣滓成油分作三分每一分入第二號藥八錢重第一號藥六錢重

第三號藥一兩五錢重和勻加糯米飯搗極膠粘丸如梧桐子大曬乾勿見火每服

二十九漸加至五六十九雞鳴時午時臨卧時各一服茶清送下忌房勞鹹酸酒醋

糟淹豬羊雞馬驢內魚腥前燉水菓五辛薑椒大料辛辣熟物蕎麥菉豆之類若不

忌口斷慾則藥無功雖愈再發其餘肉味病愈後一年可食但猪羊雞肉終身用忌此法乃治癩之神方也不可輕忽

跌傷方法

治跌撲損傷用蘇木以活血黃連以降火白朮以和中童便煎為妙在下者可下瘀血但先須補托在上者宜飲韭汁或和粥吃切不可飲冷水蓋血得寒則凝但一絲血入心即死

骨損者用古文錢五分醋淬乳香沒藥各一錢酒研服或用接骨散

元戎接骨丹

沒藥

乳香

當歸

川椒

自然銅

人煅醋淬

赤芍藥

骨碎補

酒炙

敗龜板

酥炙

虎胫骨

酥炙

白芷

千金藤

即郁李仁上各等分

右為細末化蠟五錢丸如彈子大每服一丸好酒半升化開煎用向東南柳枝攬散熱服

一方加龍骨川芎

凡治損傷妙在補氣血俗工不知惟在速效多用自然銅以接骨然此藥必煅煉方可

服新出火者其火毒與金毒相扇挾齊氣燄藥本無雖有接骨之功其燶散之禍甚於刀

一方加龍骨川芎

服新出火者其火毒與金毒相扇挾杳熱藥毒雖有接骨之功其燥散之禍甚於刀劍飛之戒之

治金瘡急以石灰厚傅裹之如瘡深不宜速合者加滑石末敷之

又方老杉木皮為末敷之

凡跌撲損傷腹痛者知有瘀血用桃仁承氣湯加蘇木紅花下之

當歸導滯湯治跌撲損傷瘀滯不行等証

大黃

當歸在上用頭在中用身在下用尾

右細切等分每服一兩重酒煎服

鷄鳴散治從高墜下及木石所壓一切損傷瘀血凝積痛不可忍並以此藥推陳致新

大黃

一兩

杏仁二十粒去皮尖另研

右研為末酒大碗煎七分濾去粗鷄鳴時服至曉必取下瘀血即愈

愚按此方用杏仁而不用桃仁

者蓋跌乃血入氣分故用杏仁以行氣中之血矣

沒藥乳香散治跌撲損傷痛不可忍

白术

炒五兩

當歸

焙

甘草

炙

白芷

沒藥

另研各一兩五錢

肉桂

去粗皮

乳香

另研各一兩

右為末和勻再研極細每服二錢溫酒調下

杖丹膏藥方治受杖責後如死血壅腫宜先刺出惡血然後以此膏貼之三四日平復或早失調理成癰者貼之即散及治諸般癰疽瘡毒已潰未潰貼之無不神效

甘草

肉桂

蛇蛻

蟬蛻

露蜂房

連翹

白芷

白芨

白斂

白朮

蒼朮

人參

玄參

苦參

芍藥

南星

升麻

厚朴

梔子

百合

金銀花

天花粉

川歸

川芎

穿山甲

另末  
煨胖

羌活

獨活

黃連

黃芩

黃柏

大黃

生地黃

紅花

蘇木

柴胡

荳甲

青木香

何首烏

防風

荆芥穗

藿香

雲母石

花蕊石各一兩

亂髮

壯年無病男  
子者一塊  
為末

乾蟾

一隻即  
雞黃也陰乾用

鳳凰胎

一隻即  
雞黃也陰乾用

桃柳桑枝各五莖

藿香

雲母石

花益石各一兩

亂髮子者一撮

右各細切用香油六斤重浸藥三五日入鍋內熬黑色去粗入黃丹三斤別用槐柳枝不住手攬膏成候溫入後藥末

乳香

沒藥

龍骨各一兩

輕粉五錢

血竭一兩

麝香二錢

枯白礬二錢

右攬勻磁器收貯臨期看瘡大小攤貼

沒藥散治刀箭傷止血住痛

定粉

風化石灰各一兩

枯白礬二錢

乳香五分

沒藥另研一字

右各研為細末同和勻再研乾摻之

破傷風六十二

論

內經曰風者百病之始也清淨則腠理閉拒雖有大風苛毒而弗能為害也若夫破傷風証因事擊破皮肉往往視為尋常殊不知風邪乘虛而客襲之漸至變為惡候又諸瘡久不合口風邪亦能內襲或用湯淋洗或著艾灸灸其湯火之毒氣亦與破傷風邪無異其為証也皆能傳播經絡燒燙真氣是以寒熱間作甚則口噤目斜身體強直如角弓反張之

狀死在旦夕誠可哀憫治之之法當同傷寒處治因其有在表在裡半表半裡三者之不同故不離乎汗下和三法也是故在表汗之在裡者下之在表裡之間者宜和解之又不可過其法也閭閻野人多不識此証殺人之易早不求醫治療而袖手待斃哀哉

脉法

表脉浮而無力太陽也

脉長有力陽明也

脉浮而弦小者少陽也

河間曰太陽宜汗陽明宜下少陽宜和解若能明此三法而治不中病者未之有也

愚按河間先生論破傷風脈証詳明甚矣何其但云三陽而不及於三陰蓋風邪在於三陽之經便宜按法早治而愈若待傳入三陰其証已危或腹滿自利口燥咽乾舌卷卵縮皆無可生之証故置而弗論也

方法

丹溪曰破傷風同傷寒壞証治看在何經而用本經藥驅逐之誤則殺人劉河間有法有方宜選而用之

羌活防風湯治破傷風邪初傳在表

羌活

防風

川芎

藁本

當歸

芍藥各一錢

甘草

地榆

細辛各五分

右細切作一服水一盞半煎至一盞去粗熱服不拘時候量緊慢加減用之熱則加大黃一錢大便祕只加大黃五分緩緩令通

白朮防風湯若服前藥太過令自汗者宜服此藥

白朮一錢

防風二錢

黃芪一錢

右細切作一服水一盞半煎至一盞溫服不拘時臟腑和而有自汗可用此藥破傷風臟腑祕小便赤自汗不止者因服熱藥汗出不休者故知無寒也宜速下之先用小芎黃湯二三服後用大芎黃湯下之

小芎黃湯

川芎一錢

黃芩一錢

甘草五分

右細切作一服水一盞半煎至一盞溫服不拘時候三服即止再用後藥

大芎黃湯

川芎一錢

羌活

黃芩

大黃各一錢五分

右細切作一服水一盞溫服宜和為度

發表雄黃散

醫學正傳

卷六

平會文堂書局印行

雄黃一錢

防風二錢

草烏一錢泡裂

右為細末每服一字溫酒調下裡和至愈可服裡未和不可服

大蜈蚣散

蜈蚣

黃赤足各一條

江鱠

魚膠炒五錢即

左蟠龍

五錢炒煙盡為度即野鵲糞

右為細末每服一錢清酒調下治法依前用裡和至愈可服但有裡証不可服次當下之用蜈蚣散四錢巴豆霜五分飯丸如菜豆大每服一丸漸加至六七丸清酒調蜈蚣散少許送下宣利為度內外風去可服羌活湯緩緩而治不拘時候服之羌活湯者治半在表半在裏之藥也

大羌活湯

羌活

菊花

麻黃

川芎

石膏

煅另研

防風

前胡

黃芩

細辛

甘草

枳殼

白芷

蔓荆子

各四分

薄荷

各二分

右細切作一服人生薑五片水一盞半煎至一盞稍熱服不拘時日進二服

防風湯治破傷風同傷寒表証未傳入裏宜服此藥

右細切作一服入生薑五斤水一盞半煎至一盞稍熱服不拘時日進二服  
防風湯治破傷風同傷寒表裏兼用

防風

羌活

獨活

川芎各一錢  
二分

右細切作一服水一盞半煎至一盞溫服

小蠍蚣散

蠍蚣黃赤足各一條

江鰓三錢

右為細末用防風湯調下如前藥解表不已覺傳入裏當服左龍丸漸漸看大使軟硬加巴豆霜服之

左龍丸

左蟠龍五錢炒

白僵蚕五錢炒

江鰓五錢炒

雄黃一錢

右同為細末飯丸如梧桐子大每服十五丸溫酒下如裏証不已當於左龍丸末一半內入巴豆霜半錢飯丸如梧桐子大每服一丸漸加至以利為度若利後更服後藥若搐痙不已亦宜服後樂羌活湯也

小羌活湯治搐痙不止

羌活

獨活

防風

地榆

各二分一錢

右細切作一服水一盞半煎至一盞溫服如有熱加黃芩有痰加半夏若病日久氣血漸虛邪氣入胃全在養血為度

養血當歸地黃湯

當歸

地黃

芍藥

川芎

藁本

防風

白芷

各一錢  
細辛五分

右細切作一服水一盞半煎至一盞服

雄黃散治表藥

南星

三錢泡

半夏

五錢泡七次去滓

天麻

五錢

雄黃

二錢五分

右為細末每服一錢溫酒調下如有涎於此藥中加大黃為下藥  
地榆防風散治破傷風中風半在表半在裏頭微汗身無汗不可發汗宜以表裡治之

地榆

防風

地丁草

馬齒莧

各等分

右為細末每服三錢溫米飲調下

白木湯治破傷風大汗不止筋攣手足搐搦

白木

葛根各二錢

升麻

黃芩

酒炒各一錢

芍藥

四錢

甘草

五分

右細切作一服水一盞半煎至一盞溫服不拘時候

江鱠丸治破傷風驚而發搐臟腑秘澁知病在裡宜以此藥下之

江鱠丸治破傷風頭面大腫發熱等適在後家以九味羌活湯服取汗外用杏仁搗爛入白麵少許新汲水調敷瘡上腫消熱退而愈後以此法治若干人皆驗

江鱠丸炒五錢

雄黃一錢

白僵蚕五錢炒

蜈蚣一對  
黃赤足

天麻五錢

右為細末分作三分用二分以燒飯為丸如梧桐子大硃砂為衣用一分入巴豆霜一錢同和亦以燒飯為丸如梧桐子大不用硃砂為衣每服以前硃砂衣丸子二十丸巴豆霜丸一丸第二服二丸加至利為度再單服硃砂衣丸子病愈止藥

祖傳經驗秘方治初破傷風發熱紅腫風邪將欲傳播經絡而未入深者屢驗

杏仁去皮研細

羅白麵各等分

右以二味和勻用新汲水調和如膏敷傷處腫消熱退

一方治破傷風發熱用蟬蛻畧炒研細酒調一錢匕服効

安文陳珍四兄因鬱鬱頭面大腫發熱等適在後家以九味羌活湯服取汗外用杏仁搗爛入白麵少許新汲水調敷瘡上腫消熱退而愈後以此法治若干人皆驗

附翻花瘡一名綿花瘡

川芎

天花粉各五錢

輕粉二錢

雄黃一錢

辰砂一錢

分半

麝香五分

右為細末蒸餅丸如菉豆大每服八分溫酒下日三服  
一方無川芎天花粉二味亦效



4944  
1994  
n. 6