


婦人良方

坐月 產難
產後
十六之元



卷之十六

坐月門

產寶方圖題序一

將護孕婦方二

滑胎例三

月室方位例四

逐月安產藏衣忌向方位五

推妊娠行并法六

體亥子借地法七

禁草法八

禁水法九

入月預備藥物十

卷之十七

○產難門

○產難方一

楊子建十產方二

催生方三

交骨不開產門不閉方四

新附

郭稽中產難方五

○產難子死腹中方六

產難生死訣七

卷之十八

○產後門

○產後將護法一

調理法二

通用方三

胞衣不出方四

血量方五

顛狂方論六 狂言譖語方論七 不語方論八

卷之十九

產後門

乍見鬼神

方論一

心神驚

悸方論二

中風心驚驚方論三

中風恍惚方論四

虛極生風方論五

虛汗不止方論六

冒悶汗出方論七

汗多癰瘍方論八

口禁腰背反張方論九

中風力論十

四肢筋攣手方論十一

癱瘓方論十二

脚氣方論十三

新附

太醫院校註婦人良方大全卷之十六

江右臨川陳自明良甫編

太醫院使立齋薛已校註

建邑書林泗泉余彰德梓

坐月門

妊娠疾病既明須知
坐月門忌故以次之

產寶方周頤序

頤聞至靈者人最重者命人皆知命之重而不知養命之方以致年未衰邁疾病攻奪倉卒尋醫多致有誤先婦人病惟產難為急子母命懸戶時故產二三胎者臟腑未衰血氣未減疾病易治若產育過多復自乳子血氣愈衰尤難治若產後血氣未腹胃氣益傷諸症蟬起此古人所以專著產乳方論余故徧採

產寶等方兼拾外氏之遺，作為論說粹為一編刊行于世，以救危急。云時丁巳歲秋八月吉日周頤謹序。

將護孕婦論第二

凡妊娠至臨月當安神靜慮時常步履不可多睡飽食過飲酒體雜藥宜先貼產圖依位密鋪床帳預請老練穩婆備湯藥器物欲產時不可多人喧閑愴惶但用老婦二人扶行及凭物站立若見漿水腰腹痛甚是胎離其輕令產母仰卧令兒轉身頭向產門用藥催生坐草若心煩用冰調服白蜜一匙竟飢吃糜粥少許勿令飢傷恐乏其力不可強服催藥早於坐草慎之愚按前論當慎守之此先哲好生之德防患於未萌者也仁哉

滑胎例第三

凡妊娠十月宜服滑胎湯藥。
滑胎枳殼散令胎瘦產易。河陽公主每產累日不下。南山道人
進此方。

商州枳殼

炒二兩

粉草

炒一兩

右為末。每服二錢。空心沸湯調。日三服。凡孕六七月宜服之。
溫隱居加當歸、廣木香各等分。
易產薰治諸疾。下氣竇膈。

枳殼

炒五兩

甘草

一兩

香附子

三兩炒去毛

右為末。每服二錢。用白湯調服。
內補丸治妊娠衝任脉虛。補血安胎。

熟地黃二兩用生地酒
拌蒸熟杵膏

當歸一兩炒
為末

右爲末和丸梧子大每服三四十丸溫酒或滾湯下許李士
云大率妊娠唯在抑陽助陰然胎前藥唯惡群隊陰陽錯雜
別生他病唯枳殼散所以抑陽凶物湯所以助陰爾然枳殼
散其味多寒若單服恐致胎寒腹痛更以內補丸佐之則陽
不至強陰不致弱陰陽調和有益胎嗣此前人未嘗論及也
易產滑胎車前子爲末或酒或飲服寸匙詩云芣苢能令婦人
樂有子矣陸機注云治婦人產難愚詳孔子序詩云樂然而
生易於生育卽此謂也

神寢丸

臨月服之

神効

新州施少卿方
蘄州徐太丞傳

通明乳香

半兩
別研

枳殼

一兩
麸炒

仁砂

右爲末煉蜜丸梧子大每服三十九空心溫酒下

榆白皮散

治姪娠滑胎易生

榆白皮

甘草各二兩

葵子一兩

右爲末每服五錢水煎

孕及九月將產猪肚一具煮爛徐徐自食盡易產

保氣散

治寬氣進食瘦胎易產或居處失宜頓作胎動若胎

痛胎漏見通用方兼服佛手散

香附四兩

山藥二兩

枳壳一兩

木香四兩

粉草一兩

益智

紫蘇葉各半兩

右爲末每服二錢白湯調下

神寢左枳殼散見前此三藥入月宜常服

保產無憂散 治姪婦身居安逸口厭甘肥憂樂不常食物不
節致胞胎肥厚根蒂堅牢入月服之則易生矣

當歸

川芎

白芍藥

枳殼

乳香 銘三 木香

甘草

血餘

即髮灰以猿猪心和之各一錢半

右爲末每三錢水煎日二服神妙

月空方位例第四

出太平聖惠方外臺要同

正月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 在丙壬 在甲庚

逐月交產藏衣忌向方位第五

凡安產藏衣方位並於卧閣內分布太平聖惠方云凡姪婦初
入月便寫產圖一本以朱畫某月某日空貼在其位如正月在

丙壬可於壬位安產婦床帳丙位藏衣之類貼產房北壁若值
閏月只看節氣用之又云每月產圖有雷火招搖運東力士天
狗軒轅太時咸池豐隆吳時白虎太夫天候狂虎凡此十二種
並從月建易其位所謂月空者按內經云月廓空無寫玉水注
云論月輪中空日也即非十二神之數今太平聖惠方以六陽
月在丙壬以六陰月在甲庚正如外臺所言正月在丙壬至丁
二月在甲庚之類其理一也但外臺言之詳聖惠言之簡今人
多從其簡或云凡逐月安產藏衣並向月德月空方位所有十
三種殺並從節氣更換若交次月節便作次月用畫產圖者非
也假如正月十四日立春若妊娠十二日乳臥豈可作去年十一
二月用必依月分用之乃是若依節氣更換則天德月德所至

又堪輿曆有遊牛白虎殺祔在太歲後丁辰如太歲卯則白虎
在寅餘倣此推之若產及藏衣犯之則子母皆不利

王子亨嘗難產逆生論，稱犯一切神殺，固有其理。然亦有自然難產兒自逆生者，及有產腸俱下者，產已則復如故。此非疾病所致氣血所主，天下之理蓋有不可窮詰者，亦宜致之。

亥	戌	酉	申	未	午	巳	辰	卯	寅	丑	子
癸	壬	癸	壬	癸	壬	癸	癸	壬	癸	壬	癸
丑	子	丑	子	丑	子	丑	子	丑	子	丑	子
寅	卯	寅	卯	寅	卯	寅	卯	寅	卯	寅	卯
卯	辰	卯	辰	卯	辰	卯	辰	卯	辰	卯	辰

西

西

北

東

安產藏衣十二月也

藏安運雷招軒咸豐天狂天大白
衣產鬼公搖轅池隆狗虎侯夫虎

吉吉力 大 吳

方方士 時 時

正月 壬丙艮寅卯辰辰午申酉戌
二月 壬_甲庚乾亥卯子丑未巳酉巳戌亥
三月 丙壬坤申辰酉戌戌午子寅亥子
四月 甲庚巽巳巳午未丑未酉亥子丑
五月 丙壬艮寅午卯辰辰申子申丑寅
六月 庚申乾亥未子丑未酉卯巳寅卯

七月

丙壬坤申申酉戌戌戌子寅卯辰

八月

庚甲巽巳酉酉午戌丑亥卯亥辰巳

九月

丙壬艮寅戌卯辰辰子午申巳午

十月

庚甲乾亥亥子丑未丑卯巳午未

十一月

壬巽丙坤申子酉戌戌寅午寅未申

十二月

庚甲巽巳丑午未丑卯酉亥申酉

推婦人行年法第六

生氣方

產婦宜向之坐卧及產帳向之開門大吉

反支月

遇此月即鋪灰上用牛皮或馬驥皮訖鋪草勿令惡

血汚地吉

禍害月

不得於其上產又不得向之二便避之大吉

絕命方 不得於其上產又不得向之太小便避之大吉
懸尸日 遇此日產不得攀繩宜懸馬轡攀之大吉
閉肚方 臨月至滿月並不得向之大小便及糞不淨之水誰
之吉

八莊方 產帳不得向之開門已之大吉

生反禍絕懸閉八產卧宜

氣支害命尸肚莊母宜與

方月方日方方

十三歲行年在庚申庚七離巽辰戌

在正西偏北辛○在正東偏北申○黃色衣西南首○西南

方黃衣師看產

十四歲行年在己未

離月八坤爻卯酉

在正北偏西壬○在正北偏東癸○赤色衣正南首○正南

方赤衣師看產

十五歲行年在戊午

坎月三九乾艮丑未日

在正東偏北甲○在正北偏西壬○黑色衣正北首○正北

玄黑衣師看產

十六歲行年在丁巳震

四十艮乾丑未月

在正東偏北甲○在正西偏北辛○青色衣正東首○正東

方青衣師看產

十七歲行年在丙辰艮

五十震艮子午月

在正東偏南己○在正南偏南庚○黃色衣東北首○東北

方黃衣師看產

十八歲行年在乙卯乾

六十
二月
坎震
巳亥

在正南偏東丙○在正南偏西丁○白色衣西北首○西北
方白衣師看產

十九歲行年在甲寅父

正七
月
巽離
辰戌

在正南偏西丁○在正南偏東丙○白色衣正西首○正西
方白衣師看產

二十歲行年在癸丑巽

二八
月
父坤
卯酉

在正西偏南庚○在正東偏南乙○青色衣東南首○東南
方黃衣師看產

二十一歲行年在壬子坤

三九
離巽
寅申

在正西偏北辛○在正東偏北甲○黃色衣西南首○西南
方黃衣師看產

二十二歲行年在辛亥離四十坤父丑未

在正北偏西壬○在正北偏東癸○赤色衣正南首○正南

方赤衣師看產

二十三歲行年在庚戌坎五十乾艮子午

在正北偏東癸○在正北偏西壬○黑色衣正北首○正北

方黑衣師看產

二十四歲行年在己酉震六十艮乾己亥

在正東偏北甲○在正西偏北辛○青色衣正東首○正東

方青衣師看產

二平五歲行年在戊申艮正七震坎

辰戌月

辰日

在正東偏南乙○在正西偏南庚○黃色衣東北首○東北

方黃衣師看產

二平六歲行年在丁未乾二八坎震

卯酉月

卯日

在正南偏東丙○在正南偏西丁○白色衣西北首○西北

方白衣師看產

二十七歲行年在丙午父三九巽離寅申

正月

在正南偏西丁○在正南偏東丙○白色衣正西首○正西

方白衣師看產

二十八歲行年在乙巳巽

四月四十父坤丑未日

在正西偏南庚○在正東偏北乙○青色衣東南首○東南

正月未日

方青衣師看產

二十九歲行年在甲辰坤五十月離巽午

在正西偏北辛○在正東偏南甲○黃色衣西南首○西南

方黃衣師看產

三十歲行年在癸卯離六十月坤兌巳亥

在正北偏西壬○在正北偏東癸○赤色衣正南首○正南

方赤衣師看產

三十一歲行年在壬寅坎腎七乾艮辰

在正北偏東癸○在正北偏西壬○黑色衣正北首○正北

方黑衣師看產

三十二歲行年在辛丑震艮八艮乾卯酉

在正東偏北甲○在正西偏北辛○青色衣正東首○正東
方青衣師看產

三十二歲行年在庚子艮朏三九震坎寅申

在正東偏南乙○在正西偏南庚○黃色衣東北首○東北

方黃衣師看產

三十四歲行年在己亥乾朏四十坎震丑未

在正南偏東丙○在正南偏西丁○白色衣西北首○西北

方白衣師看產

三十五歲行年在戊戌兌五十巽離子午

在正南偏西丁○在正南偏東丙○白色衣正西首○正西

方白衣師看產

三十六歲行年在丁酉巽

六十月兌坤

亥

在正西偏南庚○在正東偏南乙○青色衣東南首○東南

方青衣師看產

三十七歲行年在丙申坤

艮

七離巽

辰戌

在正西偏北辛○在正東偏東甲○黃色衣西南首○西南

亥黃衣師看產

三十八歲行年在乙未離

二八月坤

父卯酉

在正北偏西壬○在正北偏東癸○赤色衣正南首○正南

亥赤衣師看產

三十九歲行年在甲午坎

三九月乾艮寅丑

在西北偏東癸○在正北偏西壬○黑色衣正北首○正北

方黑衣師看產

四十歲行年在癸巳震

四十

月艮乾

丑未

在正東偏北甲○在正西偏北辛○青色衣正東首○正東
方青衣師看產

四十一歲行年在壬辰艮

五十震坎

午

在正東偏南乙○在正西偏南庚○黃色衣東北首○東北
方黃衣師看產

四十二歲行年在辛卯乾

六十坎震

巳亥

在正南偏東丙○在正南偏西丁○白色衣西北首○西北

方白衣師看產

四十三歲行年在庚寅兌

正七巽離

辰戌

東在正南偏西丁○在正南偏東丙○白色衣正西首○正西方白衣師看產

四十四歲行年在己丑巽二八父坤卯酉

日

在正西偏南庚○在正東偏南乙○青色衣東南首○東南

方青衣師看產

四十五歲行年在戊子坤三九離巽寅申

日

在正西偏北辛○在正東偏北甲○黃色衣西南首○西南

方黃衣師看產

四十六歲行年在丁亥離四十一坤父丑未

日

在正北偏西壬○在正北偏東癸○赤色衣正南首○正南

方赤衣師看產

四十七歲行年在丙戌坎

五月乾艮日午

在正北偏東癸

○在正北偏西壬

○黑色衣正北首○正北

方黑衣師看產

四十八歲行年在乙酉震

六月艮乾日亥

在正東偏北甲

○在正西偏北辛

○青色衣正東首○正東

方青衣師看產

四十九歲行年在甲申艮

正月七震坎日戊

在正東偏南乙

○在正西偏南庚

○黃色衣東北首○東北

方黃衣師看產○坐產時更用後法

體亥子借地法第七

東借十步

西借十步

南借十步

百○五五

北借十步

上借十步

下借十步

壁方之中四十餘步安產借地或有穢汚或有東海神主或有西海神主或有南海神主或有北海神主或有日遊將軍白虎大夫遠去十丈軒轅招搖舉高十丈天符地軸入地十丈令地

空閑產婦某氏安居無所妨碍無所畏忌諸神擁護百邪速去急急如律令勅前賈借地法於入月一日朱書一本貼產婦房內牆壁上更不須避忌神殺也

禁咒大集卷八

鋪草及種祿訖即呪曰

鐵鐵湯湯非公所當是王一言得之銅一言得之鐵母子相生俱幾鐵急急如律令

禁水法第九

鑿產時貯水呪曰

南無三寶水

水在井中爲井水

水在器中爲淨水

自知非真莫當真求

以淨持濁

以正治邪

日遊月殺

五士將軍

青龍白虎

朱雀玄武

招搖天狗

軒轅女妓

天吞地呑

懸尸閉肚

六甲禁諱

十二神王

土符伏神

各安所在

不得動靜

不得忘干

若有動靜

若有忌干

施以神呪

當攝汝形

阿法尼阿毗羅莫多梨娑地梨娑訶

入月預備藥物第十

愚按前所預備內佛寺保氣枳殼榆皮黑神太聖蟲石七散

神經保生理中三丸催生黑虎二丹及催生神符又葵子生
地黃卷活竹茹烏梅雌雄右燕甘草海馬銜鐵大棗陳皮薑
錢黑豆白蠶無灰酒童子小便酸醋白采湯瓶鍋銚斷臍線
剪之類可謂周恤之至矣內花蒼石散爲盃入胞衣脹大不
能下或惡露上攻不能甦醒佛手散治血虛之危症加味芎
歸湯治亥骨不開草麻子治胎衣不能上下失笑散治惡露
腹痛不省人事蜡油調滑石塗入產門爲滑胎藥清氣散治
血暈等症平胃散朴硝水銀爲腐化死胎之劑八珍湯補血
氣虛損已上諸方皆爲緊要之藥必不可缺其斷臍帶先用
線近臍扎咬令帛裹咬斷如天氣風寒或難產母子勞傷元氣
者先扎臍帶以油紙燃燒斷此又爲迴生起死之要法也故

治者當舉其宜不可槩信而用之

催生靈符第十一

靈符宜以水飛硃砂書之貼於房內北壁上至坐蓐之時將符
以針劄就蓋內化之溫水調服

治產難橫生逆產胞衣不下靈符見後出聖惠方

局方同



弓光 弓光
不安穩朱砂
書貼枕頭
處北壁上
眉尾山
眉尾山
眉尾山
眉尾山
橫生朱砂
書此符以
順水吞下

紫雲
衡
劍
伯

此四符入月
日墨書鞋底上
家安產婦席尊
下勿令人知

扇
扇
扇
扇

囂
囂
囂
囂

此三十六符遇產難
以墨書吞之

鬼
鬼
鬼
鬼

此四符遇胞衣
不出以朱砂書
吞下

謹按前所著方論圖局符訣一帙自夫人之視之似爲迂遠然
艱於得子者恒相質問則惟此書爲要屢試有明驗也余每觀
其護孕之方極爲曲當易產之藥悉有根據至於圖局之趨避
吉凶所關符訣之玄微神妙顯用其誠有得於諸先哲者乎不
然王太僕諦公深於奧理著也豈諺詭耶則是書也誠妊娠良
方家戶之所當珍藏考究者使_不_失此而施治於妊娠鮮不有誤
矣觀者勿以爲迂遠云

太醫院校註婦人良方大全卷之十六終

太醫院校註婦人良方大全卷之十七

江右臨川陳自明良甫編

太醫院使丘齊薛已校註

建昌書林泗泉余彰德梓

產難門坐月既明須知
產難故以次之

產難論第一

婦人以血爲主，惟氣順，則血和胎安。則產順。今富貴之家，過於安逸，以致氣滯，而胎不轉動。或爲交合，使精血聚於胞中，皆致產難。若腹或痛，或止，名曰弄胎。穩婆不悟，入手試水，致胞破爛，乾兒難轉，身亦難生矣。凡產直候，痛極兒逼，產門方可坐草。時當盛暑，倘或血運血溢，當飲清水解之。冬未春初，產室用火，和

煖下部衣服尤當溫厚方免胎寒血結若臨月洗頭濯足亦致愚按丹溪先生曰余族妹苦於難產遇胎則驅之予甚憫焉蓋其形肥而勤女工形肥則氣虛久坐則氣不運而兒在胞胎因亦不能自運耳當補其母之氣則兒健易產故後有孕至五六月遂以紫蘇飲加補氣藥與之數十貼而產甚快太要在隨母之稟性若胎胞破早血水先乾或難產勞傷氣血者煎八珍湯或十全大補湯加益母草不時與服以協濟之或以薰芪數觔芳歸四五觔許大金水煎藥氣氤氳滿室使產婦口鼻俱受其氣腰帶以油紙燃燒斷補接其陽氣穩婆須擇老練者當先施惠預說與知倘有生息不順只說是未產或是雙胎只說胎衣未下恐驚則氣散愈難生息

附治驗方藥

荆婦孟冬分娩難勞傷元氣產子已死用油紙燃燒斷脣帶藉其氣以燙之俄頃忽作聲此兒後無傷食作瀉之症可見前法之功不誣世用刀器斷脣帶子母致危者竟不知其由矣且穩婆又喜平日常施小惠得其用心兼以安慰母懷故無虞耳一穩婆云我止有一女正分娩時適當巡街侍御行牌取我視其室分娩女因驚嚇未產而死後見侍御更以其威顧分付迨視產母胎雖順而頭偏在下邊以致難產因裹紫蘇飲方見十二卷第八論

十全大補湯

八珍湯二方見二十四卷第四論

楊子建十產論第二

凡生產先知此十症庶免子母之命於無辜也世之收生者少者精良妙手多致傾僑予因傷寒而備焉

一曰正產

正產者言懷胎十月陰陽氣足忽然作陣疼痛胎至谷道漿破血下兒即正產

二曰傷產

傷產者言懷胎未足月有所傷動以致忽然臍腹疼痛或腹脹過早或產母努力太早逼兒錯路不能正生凡分娩須待兒身轉順頭對產門努力一送兒即正生

三曰催生

催生者言欲產時兒頭至產門方服藥催生或經日夕產母困倦難生宜服藥以助其血氣令竟速生

四曰凍產

凍產者言天氣寒冷產母血氣遲滯兒不能速生故衣裳宜厚產室宜暖背心亦宜溫和庶兒易生

五曰熱產

熱產者言盛暑之月產婦當溫涼得宜熱甚產母則頭疼面赤昏暈若產室人衆熱氣蒸逼亦致前患名曰血暈若夏月風涼陰雨亦當謹避

六曰橫產

橫產者言兒方轉身產母用力過之故也。凡產母當令安然仰卧。穩婆先推兒身順直頭對產門以中指探其肩。不令脇帶羈扳。方用藥。催之繼以產母努力兒即生。

七曰倒產

倒產者言兒未能轉身產母努力故也。當令產母仰卧。穩婆推入候兒自順。若良久不生令穩婆等入產戶。一邊撥兒轉順。近產門却服催藥。并努力即下。

八曰偏產

偏產者言兒回身未順生路。產母努力過兒頭偏。一邊產。雖露項非也。乃額角耳當令產母仰卧。穩婆輕手正其頭向產門却念產母努力。子即下。若兒頂後骨偏。拄穀道露頸令穩婆以綿

衣炙緩舉手於穀道外傍輕手推正令產母努力兒即生

九曰礙產

礙產者言兒身已順門路已正兒頭已露因兒轉身腋帶絆其肩以致不能生令產母仰卧穩婆輕推兒向上以中指按兒肩脫膀帶仍令兒身正順產母努力兒即生

十曰坐產

坐產者言兒之欲生當從高處牢繫手巾一條令產母以手攀之輕輕屈坐令兒生下不可坐祇兒生路

十一曰盤腸產

趙都運恭人每臨產則子勝先出然後產子其腸不收名曰盤腸穩婆以醋水各半盞默然噀產婦面背交收不可不知

愚按前症古方以草麻子仁四十九粒研塗產母頭項脇收
上急洗去其腸若乾以磨刀水少許溫潤之再用磁石煎湯
服之即收上磁石須陰陽家用有驗者若以水噀母面腎恐
驚則氣散

治盤腸產以半夏爲末搗鼻中脇自上

又方大紙燃以麻油潤燈吹滅以烟薰產婦鼻中脇即上
又方腸出盛以潔淨漆器濃煎黃芪湯浸之脇即上

催生方論第三

五行論命以年月日時支干五行相生相值以推其貴賤其間
最切要者時也得其時則終身富貴失其時則丁世貧賤然則
命稟於有生之初豈可催乎世之催生之說蓋爲產難而設也

今開歷驗數方于後

催生柞木飲子 治產難或胎爛腹中腹悶其效如神

生柞木剉一尺

甘草剉五段

大者五寸

右用冰二鍾紙封罐口煎一鍾半候胎順共產門徐徐溫服即時分娩更無諸苦切不可早於坐草及穩婆下手催逼共催生如神散 治逆產橫生其功甚大

百草霜

白芷

不見火各爲末等分

右每服三錢至胎順產門以童便米醋和如膏加沸湯調下或童便酒煎進二服然血得黑則止此藥大能固血又免血乾甚妙

如聖散用黃蜀葵花焙爲末熟湯調下二錢若漏血胎胞乾澁

難產共併進三服即產如無花用葵子末半合調溫酒服尤妙
若打撲胎死紅花酒調下

順生丹 治症同上

兔腦髓去皮膜研細膏

母丁香兩末二

明乳香一錢研細

射香一錢研細

右以兔腦髓丸鷄頭大蔴乾每服一丸溫水下男左女右手
握出兔腦蠟月者尤佳

又方通明乳香一塊如皂子大爲末腰痛時用冷水醋少許調
服扶立令兩手拿石燕一箇念醫靈藥聖三遍行數步坐草
便生更無痛楚神效

愚按前法觀之似迂其用者云甚驗

治產不順

蛇蛻

一條全者

蠶蛻紙

一張無則一方

右入新瓦瓶內，蓋泥固濟，存性爲末，煎榆白皮湯下，一錢三服，覺痛便生。

又方用伏龍肝研末，每服一錢，酒調下。兒頭裹土而下，又方吞槐子十四粒，卽下。

又方當歸爲末，酒調一錢服，良久再服。

一方用魚膠一錢許，新瓦上煅灰，陳醋調服，立下。

又方大朱砂於端午日晒起，以百日爲度，研爲細末，用蟬角丸

腦髓丸，綠豆大，欲產時粥飲下，三十丸，良久便生。其藥男左女

右手中握出，晒硃砂不得着兩

又方 腹月來頭煅爲末葱白煎湯調二錢立生或臘月兔血紙袋盛挂當風處陰乾爲末前乳香湯調下二錢或鹿皮和毛燒爲末酒調服一錢即產如胎衣未下再服

神妙乳砂丸用明乳香爲末以猪心血丸桐子大珠砂爲衣陰又乾每服二丸嚼碎冷酒下良久未生再服○難產以蓮葉蒂七箇冰煎化服二丸良久未生再服○胞漿先乾胎不得下又急服太料四物湯滋其血氣并濃煎葱湯薰洗產戶更用油燭塗產戶內却服前藥○胎死不出用朴硝五錢滾湯調下或平胃散一服胞衣未下酒水眼二丸○橫逆不順先用如神散方見產門不開用加味芎歸湯仍服二丸湏月仍上床日修合鹽塗兒足底急按摩之即產

應急方

好墨新汲水濃磨服之墨水畢竊出○又方清油同

蜜等分入滾湯少許調服或油煎一盞服之或路傍破草鞋

一隻取鼻絡小耳繩燒灰酒調服

交骨不開產門不閉方論第四

新附

竊謂交骨不開產門不閉皆由元氣素弱胎前失於調攝以致血氣不能運達而然也交骨不開陰氣虛也用加味芳歸湯補中益氣湯產門不閉氣血虛也用十全大補湯

附治驗

地官李孟卿娶三十五歲女為繼室姪娠慮其難產索加味芳歸湯四劑備用果產門不開止服二劑頓然分娩上舍懷德之室產門不開兩日未生服前藥一劑即時而產

懷德傳服此方用者無有不驗。

一婦人分娩最易至四十姪娠下血甚多產門不開與前湯丁劑又以無憂散勦許前熟時時飲之以助其血而產一產婦陰門不閉發熱惡寒用十全太補加五味子數劑而寒熱退又用補中益氣加五味子數劑而陰戶歛若初產腫脹或欬瘡而不閉者用加味逍遙散若腫既消而不閉者用補中益氣湯切忌寒涼之劑

一婦人脾胃素弱兼有肝火產後陰門腫痛寒熱作渴嘔吐不食敷太黃等藥服驅利之劑腫及於腎虛症蜂起此真氣虛也先用六君子以固脾胃乃以補中益氣湯升舉而消一產婦失治腫潰不已形體消瘦飲食少思朝寒暮熱自汗盜

正半年矣。余用補中益氣加茯苓半夏以健脾胃，膿水漸少，飲食漸進，用歸脾湯以解脾鬱，共五十餘劑，元氣復而瘡亦愈矣。

一產婦陰門不閉，小便淋瀝，腹內一物攷動，脇下或脹或痛，用加味逍遙散加車前子而愈。

一婦人子宮腫大一百方入損落一片殊類猪肝面黃體倦欲食無味內熱晡熱自汗盜汗用十全大補湯二十餘劑諸症悉愈仍復生育

加味芎歸湯
治交骨不開不能生產

當歸各

自死龜板酥炙

婦人頭髮

一握
存性

右爲散每服五錢水煎服約人行五里即生如胎共亦下灼
過龜板亦可

十全大補湯方見二十四卷第四論
補中益氣湯方見二十四卷第六論

郭稽中產難方論第五

論曰產難者因兒轉身將兒枕血塊破碎與胞中敗血壅滯兒
身不能便利是以難產急服勝金散消散其血使兒自易生陳
無擣云多因兒未轉順坐章太早或努力太過以致胞衣破而
血水乾產路澁而兒難下宜先服催生如神散以固其血設或
逆生橫產當用前法針刺之

勝金散

麝香錄

豆豉

右每服一錢用秤錙燒赤淬酒下催生如神散亦可用

產難子死腹中方論第六

產難子死腹中多因驚動太早或觸犯禁忌其血先下胎乾涸而然也須驗產母舌若青黑其胎死矣當下之故產室坐卧須順四時方向并遵五行避忌則吉

附治驗

一穩婆之女勤苦負重妊娠腹中陰冷重墜口中甚穢余意其胎已死令視其舌青黑與朴硝半兩許服之化下穢水而安一婦人胎死服朴硝下穢水肢體倦怠氣息奄奄用四君子爲主佐以四物薑桂調補而愈

一方水銀半兩桂末一錢作一服溫酒調下粥飲亦可
又方以利斧煅赤置酒中待溫飲之其子便下

又方用錫粉水銀各一錢棗肉丸大豆許水吞下立出

又方朴硝三錢溫童便調下猶犬牛畜用之皆驗

又方平胃散五錢酒水各一盞煎至一盞投朴硝五錢再煎三
五沸溫服其胎即化水而出寶慶方云凡欲斷臍帶先以繫墜
物墜下後可斷之否則胞衣上即冲心而死

附方

四君子湯

四物湯二方見二十四卷第六論

產難生死訣第七

欲產之婦脉離經

難經云一呼三至曰離經此是陽加於陰二倍也一呼二至亦曰離經此是陰加於陽四倍也注云經者常也胃脉離常絡之處周卽言之一呼脈再至一吸脈再至曰脾和之脈故一呼脈行三寸一吸脈行二寸呼吸定息脈行六寸一日一夜一萬三千五百息脈行八百一十丈乃于一周復從始之經再行今一呼脈三至一吸脈三至呼吸定息脈行九寸一日一夜脈行通計一千二百一十五丈過於平脉之數不在此所起之經再起故曰離經若一呼二至脈行寸半一吸一至脈行寸半呼吸定息脈行三寸一日本夜通計脈行得四百單五丈乃謂一周是不及平脉之數周而復始亦不在所起之經再起亦曰離經也

沉細而滑也同名

臨產之婦脉見沉細而滑者乃腎臟本脉之形然腎繫胞胎見此脉者亦與離經之脉同名也

夜半覺痛應分誕來日日午定知生

若妊娠婦夜半時覺腹痛定知來日午時當分娩也聖惠方云夜半子時覺腹痛來日午時必定生產謂子午相半正半日夜半數也

身重體熱寒又頰舌下之脉黑復青反舌上卷子常死腹中湧遺子歸冥

凡妊娠婦身軀沉重者胃氣絕也又體熱寒牒頭併者正氣衰陰氣盛也若舌捲下脈青黑色也及舌反捲上水冷不溫者

子母俱死之候

面赤舌青細尋看母活子死定應難

凡妊娠面色赤是榮氣流通母活之候舌上青色是妊娠絡絕胎死之候

唇口俱青沫又出子母俱死總高判

若妊娠唇口俱青色者井榮衛氣絕也又口中吐出痰沫者是脾胃之氣俱絕此是子母俱死之候也

面青舌青沫出頻母死子活是知真不信若能看應驗尋之賢哲不虛陳

凡妊娠面與舌皆青色又吐痰沫者是產婦榮衛俱絕胎氣衝上之候此是子活母死之候產下共子母必死也此古賢哲

應驗之文不虛妄陳其說也

新產之脉緩滑吉實大弦急死來侵

凡婦人新產之後其脈來緩滑者爲氣血通利調和是生活安吉之兆也若見牢大弦急之脉則凶必死之脉也

若得沉重小者吉忽若堅牢命不停

若產婦診得沉重微小者此是形虛相應故云吉兆之脉忽然診得堅硬牢實之脉是脉盛形衰相反性命不可停留必死也

寸口澁疾不調死

若產後寸口脉澁疾大小不調者此是血氣衰絕之脉故云死也

沉細附骨不絕生

若重手按之乃得其脉沉細附着於骨不斷絕有_生力者此生

活之兆也

審看此候分明記長須念此向心經

凡爲醫者宜詳審脈証分明記於心_口也

愚按前論與脉訣刊誤所云不同觀者審之

太醫院校註婦人良方大全卷之十七終

愚
五經補遺
贊育身外風寒
散之張理
走氣升提之以扶其本氣
固其根柢
正陰陽
不無主

太醫院校註婦人良方大全卷之十八

江右臨川陳自明良甫編

太醫院使立齋薛已校註

不育子母養育法

產後門產難既明須知產後疾病故以次之

產後保護法第

婦人產畢飲熱葷便一盞閉目少坐上床，傍高立膝，仰卧不時喚醒，及以醋塗鼻，或用醋炭及燒漆墨，更以手從心脾至膝下，使惡露不滯。如此三百以防血暈血逆酒，雖行血亦不可多恐。引血入四肢，且能昏暈，宜頻食白粥少許。一月之後宜食羊肉，猪蹄少許，仍慎言語，七情寒暑梳頭洗足，以百日為度。若氣盈

素弱者不許日月否則患手足腰腿痠痛等症名曰華榮最難治癒初產時不可問是男女恐因言語而泄氣或以愛憎而動氣皆能致病不可獨宿恐致虛驚不可刮舌恐傷心氣不可刷齒恐致血逆須血氣平復方可治事犯時微若毫髮成病重犯山獄可不戒哉

產後調理法第二

產後將息如法脈腑調和庶無諸疾若湏先服黑神散四物湯四順理中丸七寶散若壯熱頭痛此乳脈性行用玉露散頭目不清是血量用清魂散粥食不美是胃氣虛用四順理中丸愚按丹溪先生云肉汁發陰經之火易成內傷之病當歸丸當歸建中湯四順理中丸雖滋補悉犯桂附乾姜僭熱之劑

臘臘無寒何處消受哉夫兒之初生母腹頸實便啖鷄子少
鹽不思鷄子難化少鹽發熱展轉爲病醫者不識妄精他病
窄爾用藥寧不誤人予每見產婦之無病者習不用黑神散
與鷄子少鹽諸般肉食每白粥調理間以此小石者魚乾淡
食之至半月以後少食雖鷄子亦豁開煮之方能養胃却疼
彼富貴之家嬌姿之婦率有白帶頭風氣痛腰滿瘀逆口乾
經事不調髮脫體熱皆因失於調理所致也

產後通用方第三

愚按前方即產後諸症各門自有方論王治故不再錄

胞衣不出方論第四

郭旛中曰胎衣不下者因氣力疲憊不能努出或血入衣中脹

大而不能下以致心胸脹痛喘急速服奪命丹血散脹消其衣
自下牛膝散亦效アリ

愚按前症若出而氣虛不能入用補中益氣湯或草麻子仁
一兩研末母頭頂心即止若胎未不下用草麻子仁塗右脚
心胎未下急洗之緩則胎衣仍以益母丸亦妙若胎衣未
若欲斷臍帶須先以少物繫遂然後斷之

附治驗

一婦人胞衣不出胸腹脹痛手不敢近用滾酒不失矣散一劑
惡露胎衣並下

一產婦胎衣不出腹作痛手按痛稍緩此氣虛而不能送出也
用無憂散而下前症常詢諸穩婆云宜服益母草丸或就以

產婦頭髮入口作墮胎衣自出其胎衣不出者必死授與前
法甚効

奪命丹

附子

半兩炮

牡丹皮一

乾漆一錢炒烟盡

大黃末一

右爲末醋煎大黃成膏丸桐子大溫酒吞五七丸
花蘆石散 治產後敗血不盡血迷暈腹中胎衣不下至完
心頭煖散 急用一服化水即出其效如神

花蘆石散

上色硫黃四

右和勻先用紙泥封固瓦罐一箇入二藥仍封固陰乾如急
用以焙籠內炙乾用炭煅赤去火次日取出細研每服一錢
童便熱酒下

牛膝散 治胎衣不出腰中脹痛急服此藥腐化而下緩則散

牛膝

川芎

朴硝

蒲黃

芍藥三
當歸一兩

桂心五錢

右每服五錢姜二片生地黃一錢水煎

附方

補中益氣湯 方見二十四卷第六論

失笑散 方見十六卷第五論

無憂散 方見十六卷第三論

益母草丸 方見十三卷第九論

又方用蠶下土二錢好醋調和納臍中續煎生甘草湯半盞
或以醋湯飲之即出

又方用草麻子仁研爛塗足心下即洗去

又方用紅花一兩酒煮濃汁服

又方用鹿角鏹三錢爲末煮葱白湯調服

又方取產母鞋底炙熟熨小腹上二七次

又方用浸寧水濃煮溫飲二碗立下

又方用皂角棘燒爲末每服一錢溫酒調

產後血暈方論第五

產後血暈乃血入肝經甚至眼花昏悶用黑神散主之下血過多用清魂散補之或以醋湯細飲或預燒秤鍤以醋沃之或釀醋塗口鼻或燒漆墨薰之使產母鼻吸其氣庶無此患

愚按前症若惡露上行用朱砂散血下過多考歸湯若過勞

所傷補中益氣湯氣血虛極用清魂散大凡產後口眼喝斜等症當大補氣血爲主而兼以治瘀若脾胃虛弱用六君子湯苟於七月之前服安胎飲至八九月間加太腹皮黃楊頭元氣虛弱八珍湯臨產用無憂散則無前患

附治驗

一婦八月胎下墜或動面黃體倦飲食少想此脾氣虛弱用稍
中益氣湯倍白朮加蘇梗三十餘劑而安產後眩暈胸滿咳
嗽用四物加茯苓半夏桔梗而愈

一姪婦因產飲酒惡露甚多患血暈口出濁氣此血得酒熱而
妄行虛而作暈也以佛手散加煨甘葛二錢二劑而痊酒性
又慄悞入月及產後不宜飲恐致前症產室人衆氣熱喧攘亦

致此症

奪命丹

治血暈腹痛沒藥血竭末等分每服二錢熟童便熱

酒下

牡丹皮散

治產後惡露悶絕

牡丹皮

芒硝

大黃蒸各一兩

冬瓜仁三七粒去皮尖

右每五錢水煎服

清塊散

治產後氣血暴損虛火妄動血隨火上以致心神昏亂口噤眼花甚至悶絕而甦

澤蘭葉

人參各一錢

荆芥三錢

川芎一錢

右各另為末和勻每服一二錢熱湯和酒調灌之

當歸芍藥湯方見十二卷第十二論

一方五靈脂末半生半炒每服二錢溫酒灌入喉即愈

一方荆芥爲末童便調

一方神麃末每服二錢熱水調

一方蕘菜切入瓶內注熟醋以瓶口對鼻氣入即醒

一方用紅花末五錢酒調服

一方半夏爲末丸豆大入鼻中即脅亦療五絕

一方赤小豆爲末東流水和服錢許不瘥再服

佛手散 治產後去盈眩暈欲絕方見十二卷七論

又方松烟墨二錢燒赤寶滅爲末溫酒調半七京墨亦可或燒
漆器取烟薰之

附方

失笑散方見二十卷第五論

補中益氣湯

六君子湯

四物湯

三方見二十四卷第六論

安胎飲

方見十六卷第二論

無憂散

方見十六卷第二論

產後癇狂方論第六

產後癇狂乃敗血上衝用大聖澤蘭散加砂仁末三分煎酸枣仁湯調下或硃砂二錢研細以乳汁調和入紫項活地龍一條滾二三沸去之入酒再用重湯煮溫分二服

愚按前症乃血虛神不守舍非補養元氣不可仍參後各門互用

附治驗

一產婦患前症或用太澤蘭湯而愈後又怔忡妄言其癥甚多
用茯苓散補其心虛頗愈又用八珍散加遠志扶神養其氣
血而瘥

一產婦亦患此用化瘀安神等藥病益甚神思消燥余以為心
脾血氣不足用大劑參木芎歸茯神酸棗仁四物餘而安乃
以歸脾湯五十餘劑而愈

附方

隱居澤蘭湯 方見二十卷第六益

茯苓散 方見十九卷第三論

八珍散

歸脾湯 二方見二十四卷第四論

產後狂言譖語方論第七

產後狂言譖語乃心血虛也用硃砂末酒調下龍虎丹參丸琥珀地黃丸亦可如驚悸歌哭顛狂等症當參十九等卷治之愚按前症當固胃氣為主而佐以見症之藥為善若一於致痰則誤矣

附治驗

一產婦形體甚倦時發譖語用柏子仁散稍愈又用加味歸脾湯而愈又因怒仍狂言脇痛小便下血用加味逍遙散以清肝火養肝血頓瘥又佐以加味歸脾湯而安治敗血上衝發熱狂走脈虛大者

金匱要略 卷之十八

乾荷葉

生地黃

牡丹皮等分

右濃煎湯調生蒲黃二錢服之即止

妙香散

治產後語言錯亂用生地當歸煎湯調服立効

方見六卷

論第八

附方

小柴胡湯 方見二十四卷第二論

柏子仁散 方見十九卷首論

加味歸脾湯 方見二十四卷第四論

產後不語方論第八

產後不語因心氣虛而不能通於舌則舌瘶不能言語者宜服
七珍散餘當推其所以治之可也

愚按經云太腸之脉散舌下又云脾之脉是動則病舌本強不能言又云腎之別脉上入于心繫舌本虛則不能言竊謂前症若心腎氣虛用七珍散腎虛風熱地黃飲太腸風熱加味逍遙散加防風白芷脾經風熱秦艽升麻湯肝經風熱柴胡清肝散加防風白芷脾氣鬪結加味歸脾湯加升麻肝木太過小柴胡加釣藤鈎脾受土侮六君加升麻白芷釣藤鈎肝脾血虛用佛手散脾氣虛用四君子氣益俱虛八珍湯如不應用獨參湯更不應急加附子補其氣而生其血若竟用血藥則誤矣

附治驗

一產婦不語用七珍散而愈後復不語肉熱肺熱肢體倦怠飲

食不進用加味歸脾湯爲主佐以七珍散而愈後因懸不語口禁腰背反張手足發搐或小便見血面色或青或黃或時兼赤余曰面青肝之本色也黃者脾氣虛也赤者心血虛也用八珍湯加鈞藤鈞茯苓遠志漸愈又用加味歸脾湯而痊

七珍散

人參

石菖蒲

生地黃

川芎各

細辛一錢

防風

辰砂半兩別研各

右爲末每服一錢薄荷湯調

胡氏孤鳳散 治產後閉目不語用生白芍末每服一錢熱水

調下

治產後不語

人參

石蓮肉心不去

菖蒲等分

右每服五錢水煎

附方

地黃飲

方見三卷第四論

加味逍遙散

加味歸脾湯

八珍湯三方見二十四卷第四論

秦艽升麻湯方見三卷第一論

清肝散方見二十四卷第三論

小柴胡湯方見二十四卷第二論

六君子湯

四君子湯二方見二十四卷第六論

佛手散方見十二卷第七論

獨參湯方見三卷第十三論

太醫院校註婦人良方大金卷之十八終

太醫院校註婦人良方大全卷之十九

江右臨川陳自明良甫編

太醫院使立齋薛已校註

福建邑書林泗泉余彰德梓

產後門

產後乍見鬼神方論第一

產後如見鬼神或言語譖妄皆由血氣虧損陰虛發熱或瘀血停滯以致心神煩躁而然也宜以調經散治之

愚按前症若敗血停滯用調經散若血虛發熱用八珍加炮
薑若心血虛損用柏子仁散太抵此証皆心脾血少所致但
調補胃氣則痰清而神自安矣若果係鬼祟所附即灸鬼哭

穴可愈其或不起者多因豁痰降火攻伐之過也

仍參第三卷產後證

語乍見鬼
神方論

附治驗

一產婦患前症或用調經散愈而復作仍服前散益甚瘀涎上
朝暮寒暑熟余朝用八珍散又用加味歸脾湯各五十餘劑
而愈

調經散 治血虛經閉心神煩躁渾身疼痛或時見怪

沒藥

琥珀並細研

桂心各一錢

芍藥三錢

炒蓮子半錢

當歸各半錢

細辛半錢

麝香少許

桔梗二錢

甘草一錢

右爲末每服半錢薑汁溫酒各少許調服下卽愈

柏子仁散 治產後元氣虛弱瘀血停滯狂言亂語

柏子仁

遠志

人參

桑寄生

防風

琥珀

研

當歸

炒生地黃

焙甘草

炒分

右用白羊心一箇水主盞煮清汁七分入藥五錢煎服

附方

八珍湯

加味歸脾湯

二方見二十四卷第四論

鬼哭穴

見六卷第八論

產後心神驚悸方論第二

產後心神驚悸恐懼或目睛不轉口不能言乃心氣虛而亦溼
內侵診其脈動而弱者驚悸也動則爲驚弱則爲悸矣

愚按人之所生者心心之所生者血心血一虛神氣不守此

驚悸所由作也當補血氣爲主仍參三卷第十論

附治驗

一產婦患前症二度服琥珀地黃丸局方妙香散隨効再患服之甚症益甚而脉浮大按之如無發熱惡寒此血氣俱虛余用十全大補加味歸脾二湯各百餘劑而愈後遇驚恐勞怒復作仍服前藥而安

琥珀地黃丸 治產後惡露未盡胸腹作痛或小便不利

琥珀另研

延胡索糯米同炒

當歸各一兩

甘蒲黃四兩炒香

生地黃研取汁留滓

生薑各二丁筋研取汁留滓

炒地黃津以地黃汁炒生姜汁用銀石器內

右爲末煉蜜丸如彈子大每服一丸當歸煎湯化下

治血虛驚悸少寐及產後敗血停留少腹作痛等症

辰砂另研

琥珀

沒藥另研

當歸爲末等分

右爲末每服一錢空心日午臨卧用白湯調下

產後驚悸亂語精神不定用好硃砂爲細末酒調服錢許

附方

局方妙香散方見三卷第十三論

茯苓補心湯方見三卷第十論

十全大補湯

加味歸脾湯二方見二十四卷第四論

產後中風心驚方論第三

產後眼張口噤肢體強直腰背反僵言語錯亂如癇者此氣虛

風邪所傷而成痙也

愚按仲景先生云有汗爲柔痙用桂枝湯無汗爲剛痙用麻黃湯然產後得此血氣俱虛之敗症也不可與傷寒例看舟溪先生云產後當大補氣血爲主可用十全大補湯以補元氣如不應急加附子更不應是藥力弗逮仍用參附湯多服余常治太虛之症參芪數劑附子數枚方應

附治驗

一產婦患此不省人事言語妄甚惡風寒喜熱飲形氣倦怠脉虛浮無力余謂血氣虛寒用十全大補湯二十餘劑不應又二十餘劑稍緩乃漸加附子至三錢服數劑諸症減一二又二十餘劑十退三四乃去附子五分數劑諸症頻退而安後

又發仍服前藥加附子三五分而愈

茯苓散 治產後心虛忪惶言語錯亂健忘少睡或則汗盜汗

人參

甘草炒

芍藥黃炒

當歸

生薑各八分

遠志去心

茯苓錢

桂心六分

麥門冬五分

大棗二枚

右水煎服

抱膽丸 治產後遇驚發狂或遇經行發狂

水銀兩

黑鉛一兩
五錢

硃砂一兩
細研

乳香一兩
別研

右將黑鉛入銚內火鎔下水銀結成砂子下硃砂乳末乘熟
用柳木搘研勻丸鷄頭子大每服一丸空心薄荷湯下得時

勿驚覺來即安妙香散亦善

一

附方

妙香散 方見三卷第十三論

十全大補湯 方見二十四卷第四論

參附湯 方見後第六論

產後中風 恍惚方論第四

產後恍惚因元氣俱虛心經血少或外邪所侵以致心神恍惚
怔忡不寧

愚按前症當大補血氣爲主而佐以後方爲善蓋風乃虛極
之假象也固其本源諸病自退若專治風則速其危矣

附治驗

一產婦患前症盜汗自汗發熱晡熱面色黃白四肢畏冷此氣

血俱虛用八珍湯不應更用十全大補加味歸脾一湯始應
後因勞怒發厥昏憒左目掣縫兩脣抽動小便遺余為脾
火熾盛用十全大補加鉤藤山梔而安再用十全大補湯辰
砂遠志丸而愈

辰砂遠志丸 治產後中風驚狂起卧不安或瘙涎上瀉

石菖蒲

遠志去骨芦草梗

人參

茯神去木

辰砂各三錢

川芎

山藥

缺粉

麥門冬去心

細辛

天麻

半夏湯

南星

白附子各兩

人右爲末盦汗糊丸，兼豆大別以殊砂爲衣，每服三十丸，臨

薑湯下

附方

八珍湯

十全大補湯

加味惺脾湯三方見二十四卷第四論

產後虛極生風方論第五

瘧發生風因去血過多氣無所主以致脣青肉冷汗出目眩神昏急服濟危上丹若投以風藥則悞甚矣大抵

愚按前症若心脾血氣俱虛用十全大補湯如不應加附子釣藤鈎若肝經血虛用逍遙散加釣藤經云脾之榮在心之液為汗若心脾二臟虛極急用參附湯效之

附治驗

一婦人患前症或用諸補劑四肢逆冷自汗泄瀉腸鳴腹痛禁
以陽氣虛寒用六君子薑附各加至五錢不應以參附各一
兩始應良久不服仍腸鳴腹痛後灸關元穴百餘壯及服十
全大補湯方妙

濟危上丹

乳香研

五靈脂

硫黃

玄精石同研極細

阿膠

卷柏

桑寄生

陳皮等分

右將上四味入石器內微火炒再研入餘末用生地黃汁丸
相子大每服二十九食前溫酒或當歸酒下

當歸建中湯

治產後腹痛拘急痛連腰背自汗少食

當歸

桂心酌三

白芍藥六兩炒黃

甘草酸二

右每服五錢薑塞水煎入飴糖一匙服如未應加之

附方

參附湯 方見本卷後

十全大補湯

逍遙散 二方見二十四卷第四論

六君子湯 方見二十四卷第六論

獨參湯 治一切失血惡寒發熱乍渴煩躁或口噤卒嗚自汗
盜汗 或氣虛脉脫手足逆冷蓋血生於氣故血脫補氣陽生
陰長之理也 方見三卷第十三論

產後虛汗不上方論第六

產後汗不止者皆由陽氣頓虛腠理不密而津液妄泄也若遇

風則交瘻縱虛乏短氣則身體消瘦唇口乾燥又則經水斷絕由津液竭故也

愚按前症屬血氣俱虛急用十全大補湯如不應用參附芪附等湯若汗多云陽發瘧尤當用前藥王海藏先生云頭汗出至頸而還額上偏多蓋額爲六陽之所會也由虛熱薰蒸而出竊謂前症當以部位分之額左屬肝額右屬肺鼻屬脾頤屬心治者審之仍參三卷

附治驗

一產婦客聞音響其汗如水而昏憊諸藥到口即嘔余以爲脾氣虛敗用參附末爲細丸時含三五粒隨液嚥下乃漸加之至錢許却服參附湯而痊

一產婦盜汗不止遂致廢寐神思疲甚口乾引飲余謂血虛有
熱用當歸補血湯以代茶又以當歸六黃湯內葛芩連柏炒
更倍加大人參五味子一劑而愈

麻黃根湯

治產後虛汗不止身熱發渴驚悸不安

當歸

黃芪炒

麻黃根

牡礪粉

人參

甘草炒等分

右每服四錢水煎

一方 治產後自汗盜汗胃氣虛弱服別藥則嘔吐不能入

當歸

黃芪各一兩

麻黃根兩

右每服三錢水煎

治產後氣脫汗不正小便短少四肢難以屈伸

甘草

炙一兩

附子

炮五錢

桂心

芍藥

各二兩

右每服三錢，薑水煎服。虛甚更加以效，為度。

止汗散

牡礪爲末

小麥麴

八兩炒黃爲細末

右每服三五錢，用豬肉汁調。

人參湯 治產後諸虛不足，發熱盜汗，內熱，暗熱等症。

人參

當歸

等分

右爲末，以豬腰子一枚，切片，水一鍾，糯米半合，葱白二根，煮取汁，分入藥二錢，煎服。

附方

當歸六黃湯

治氣血虛熱盜汗不止，不應加入參白朮心益。

太醫家

校正歸真良方

卷之九

不足加酸棗仁炒

當歸

熟地黃自製

黃芪炒各二錢

生地黃

黃柏炒黑

黃芩炒黑

黃連炒黑各一錢

右水煎服

參附湯 治陽氣虛寒自汗惡寒或手足逆冷大便自利或腰腹疼痛吃逆不食或汗多及癰瘍等症

人參兩

附子炮五錢

右作二服薑棗水煎徐徐服去人参加黃芪名芪附湯
當歸補血湯 治肌熱躁熱目赤面紅煩渴引飲晝夜不息脈洪大而虛重肢全無者

當歸錢

黃芪一錢

右水煎服

十全大補湯 方見二十四卷第六論

芪附湯 治陽氣虛脫惡寒自汗或口噤寒渴四肢逆冷或吐瀉肢痛飲食不入及一切虛寒等症

黃芪一兩

附子炮五

右作一劑薑棗水煎服如不應倍加附子方得全勝

產後冒悶汗出方論第七

產後忽冒悶汗出者因陰血虧損陽氣鬱暴故也急吞鷄子三枚參醡飲量便或時復發宜服竹瀝五合

愚按前症屬太虛宜固元氣為主其汗不止必變柔痓東垣先生云婦人分娩及半產漏下昏冒目瞑蓋因血暴亡而火

上熾但補其血則神自昌若常時血下當補而升舉其氣陽
得益而神安則自明矣今立一方以補手足厥陰之血兼益
陽氣名曰全生活血湯

全生活血湯 治發熱自汗盜汗目暎四肢無力口乾頭暉
行步欹側

柴胡

當歸各二
錢

生地黃炒
錢

一

熟地黃各一
錢

川芎

藁本各一
錢

防風

羌活

獨活

葛根

甘草炒各
錢

細辛

蔓荊子各五
分

升麻

芍藥炒各三
錢

紅花三分

右每服五錢水煎熱服

產後汗多發瘡因氣血虧損肉理不密風邪所乘其形口噤背
強如癇或搖頭馬嘶不時卒發氣息如絕宜速灌小續命湯若
汗出兩手杖不及者不治

愚按前症曰去血過多元氣虧極或外邪相搏以致牙關緊
急四肢痙強或陰火內動或腰背反張肢節抽搐若但汗而
不惡寒者曰柔瘡若無汗而惡寒者曰剛瘡由血過多筋無
所養故傷寒汗下過多潰瘍膿血大泄多憑之乃敗症也急
以十全大補湯治之如不應急加附子多有伏甦者亦有六
淫七情所致者治法見第三卷第三論

附治驗

一產婦牙門瘻急腰背反張四肢抽搐兩目連劄此去血過多

元氣虧損，陰火熾盛，用十全大補加炮薑一劑而甦。數劑安
余在吳江史方湖弟時，將入更聞喧譁，詢云：家人婦產後出
直樹，忽仆而死。余意其勞傷血氣而發症也，遂用十全大補
加附子煎滾，令人正其面，灌之。久不能下，令側其面，
而出之。換以熱藥，如此五次，方得下咽，遂甦。

小續命湯 治剛瘻或脚氣痺弱，不能轉睛，行步欹側，或口眼
喎斜，牙關緊急，角弓張攣。

麻黃桂心甘草各半 防風三
芍藥炒白术炒人參 川芎

附子炮

防已酒

黃芩炒各分

右每服五錢水煎入薑汁少許溫服。若自汗，去麻黃。

有熱去附子減桂一半盛冬初春去黃芩
十全大補湯方見二十四卷第四論

產後口噤腰背反張方論第九

產後口噤由血氣虛而風邪乘於手三陽經也蓋手三陽之脉循結於領得風令則筋急故致口噤腰背亦急角弓反張者是風邪入於諸陽之經也

愚按前症因氣血耗損腠理不密汗出過多而患之者乃虛象也宜固氣血爲主佐以本方舟溪云產後當大補氣血爲先雖有他症以采治之如惡寒發熱等症乃氣血虛甚之極也宜大劑參芪歸朮肉桂以培養之如不應急用炮附子再不應用人參一兩炮附子二至三錢名參附湯借猶未應乃藥

力未能及也宜多用之

愈風散

治前症用荆芥略焙爲末每服三錢豆淋酒下童便

亦可

其効如神牙緊灌口鼻

清順散

又名交解散方見第二卷第五論

治婦人產後不省人事吐涎瘻癰

當歸

荆芥穗等分

右每服三錢水一盞酒少許煎灌下咽即甦

愚按前症如有未應者急用大補氣血爲主

產後中風白癲皮一兩或共獨活三兩酒水煎服

張仲文用白朮四兩以酒煎頓服

小續命湯 治產後口噤角弓反張

見前

產後中風方論第十

產後中風或血氣未復風寒所感以致筋掣拘急口眼喎斜或肢體緩弱入臟則恍惚驚悸郭晉申云產後強力下床或誤入房或憂怒內傷臟腑陳無擇曰當以脉辯而治之若努為下床月內入房憂怒者又非中風類乃勞火邪之症也

愚按前症果外邪所屬形氣不足病氣有餘當補元氣為主
稍佐以治病之藥若強力下床月內入房屬形氣病氣俱不足當純補元氣多有復甦者若悞投風藥乃促其危也仍參

照第三卷諸論主之

治產後身首拘急妄言發熱四肢拘攣不時驚悸

川芎

羌活

羚羊角屑

酸棗仁炒

芍藥

炒黃各四兩

桑白皮分

防風分

右水煎分三服

治產後中風夜晝鼻黑用小續命湯連進二服即愈

產後中風煩渴用紅花子五錢水煎徐呷之

獨活桑生湯

治前症亦良仍與第二卷中風類通看方見後

產後四肢筋挛方論第十一

產後中風筋脈攣急乃血氣俱虛或風邪客於皮膚則頑痺羸乏若入於筋脉則四肢挛急皆由皮經空虛風寒乘虛而漸入愚按肝屬木而主筋前症若肝經風熱血燥用加味逍遙散如不應當用六味地黃丸以補腎水經云風客淫氣精乃云邪傷肝也仍參第三卷諸論主之

附治驗

一產婦筋掣臂軟，肌肉掣動，此氣血俱虛，而自熱也。用十全大補湯而安。

一產婦手麻，服愈風丹遍身皆麻，神思倦怠，余謂氣血虛弱，用十全大補加炮薑數劑漸愈。去薑又數劑及逍遙散而痊。治產後氣血不足，風邪所襲，肢節痺痛，背項強直。

防風一

赤芍藥炒

桂心各半

羚羊角

川芎

羌活

當歸

酸棗仁炒

牛蒡子

炒各三錢

右每服四錢水酒煎

愚按前方如未應當用八珍湯更不應用十全大補湯。

加味逍遙散

十全大補湯二方并二十四卷第四論

六味地黃丸方見二十四卷第十一論

產後癰癧方論第十二

新附

竊謂癰者筋脈拘急也。癧者筋脈張縱也。經云：肝主筋而藏血。蓋肝氣為陽為火，肝血為陰為水。前症因產後陰血去多，陽火熾盛，筋無所養而然耳。故癰疽、膿水過多，金瘡出血過甚，則陽隨陰散，亦多致此。治法當用八珍散加丹皮、釣藤以生陰血，則陽火自退，諸症自愈。如不應，當用四君等歸丹皮、釣藤以補脾土。蓋血生於至陰，至陰者脾土也。故小兒吐瀉之後，脾胃虧損，亦多患之。乃虛象也，無風可逐，無痰可消。若屬陽氣脫陷者，用

補中益氣加姜桂陽氣虛敗者用十全大補加桂附亦有復生者此等症候若肢體惡寒脉微細者此爲真狀若脈浮大發熱煩渴此爲假象惟當固本為善若無力抽搐戴眼反折汗出如珠流者皆不治

附治驗

一產婦因勞兩臂不能屈展眼蘇合香丸肢痺軟汗出如水余謂前藥辛香耗散真氣腠理虛而津液妄泄也先用十全大補湯加五味子補實腠理收斂真氣汗頓止又佐以四君子調補元氣漸愈用逍遙散大補湯調理而痊

一產婦先胸脇乳內脹痛後因懶口噤吐痰臂不能伸小便自遺左三部脉弦余謂此肝經血虛而風火所致不寐養筋先

用加味逍遙散治之臂能屈伸又以補肝散六味丸諸症悉
一婦人發癰遺尿自汗面赤或時面青飲食如故肝脉弦緊余
自此麻經血燥風熱名癰也肝主小便其色青人心則赤法
當滋陰血清肝火遂用加味逍遙散不數劑諸症悉退而安

附方

海藏愈風湯一名舉鄉古拜散 治一切失血筋脈緊急產後
盜汗後搐搦

荆芥未為細

右先以炒大豆黃卷以酒沃之去黃卷取清汁調前末三五
錢和滓飲之輕者一服重者二三服中病即止其効如神氣
虛者忌服一方用童便調○本事方云此藥奏有奇効神靈

之功太抵產室無風爲佳不可衣被帳蓐太燥太緩即汗出
汗出則腠理開易於中風便昏冒一婦人產後遮護太密更
生旺火睡久及醒則昏冒如醉不省人事用此藥佐以交加
散服之即睡睡中必以左手搔頭覺必醒矣良久果驗

交加散

治療癰或顫振或產後不省人事口吐痰涎

當歸

荆芥穗等分

右爲細末每服二錢水一盞酒少許煎至七分灌下神效
增損柴胡湯 治產後或經適斷致手足牽搐咬牙昏冒異症

柴胡八錢

黃芩四錢炒四分

人参

半夏三錢

石膏四錢

知母二錢

黃芪五錢炒五分

甘草二錢炙二分

右爲粗末每服半兩薑五片棗四枚水煎溫服

四君子湯

補中益氣湯二方見二十四卷第六論

產後脚氣方論第十三

論曰產後腳氣因元氣內虛外淫所致其狀發熱瞀悶搐掣驚悸心煩嘔吐氣上用小續命湯治之若以爲敗血攻之則誤矣

愚按前症當補氣血爲主佐以小續命湯寄生湯如不應用大防風湯仍參第一卷九論主之已上十一症誠似小兒慢驚風無風可逐無痰可清但專補元氣庶保其生

附治驗

一產婦患前症或用獨活寄生湯而產後復作服之其汗如水

更加口噤吐痰余用十全大補湯培養血氣漸愈後飲食日少肌體日瘦吐痰如湧此命門火衰脾土虛寒用八味丸及加味歸脾湯諸症漸退肌肉漸生

獨活寄生湯 治風邪內攻兩脛腫痛或緩縱癱痺等症

方見四卷

論第七

小續命湯 方見前

大防風湯 方見二十四卷第九論

十全大補湯

加味歸脾湯 二方見二十四卷第四論

八味丸 方見十五卷第十一論

大政風雲古風二十四禁諱本傳
清高宗御批

古今圖書集成

子告王曰 夏后服貞所以致其誠與其樂安
而未體明於其事無以成其德三
小朋歸日更相交於其氣也命人辨取土色
更取山礪土以余附于全大脉於其氣也
又於其處

