

婦人良方

瘡瘍

廿四之終

卷之二十一

大會

正月

序

卷之二十四

瘡瘍門

新附

齶唇方論一

耳聰痛方論二

瘰疬方論三

結核方論四

流注方論五

血風瘡方論六

赤白遊風方七

橫痃方論八

鶴膝風方論九

下注膿瘡方論十

足跟瘡方論十一

肺癰方論十二

腸癰方論十三

乳癰乳岩方論十四

四

大醫院校註婦人良方大全卷之二十四

補遺

吳郡後學薛 已著

書林泗泉余彰德梓

瘡瘍門

婦人繭唇方論第

諸骨木梗等咽
見口齒類要

內經云脾氣開於口又云脾之榮在唇蓋燥則乾熱則裂風則
潤寒則揭若腫起白皮破裂如蚕繭名曰繭唇有腫重凹如繭
者有本細末大如繭如瘤者其因或胎產經行而陰血損或七
情動火而榮血虧或心火傳授脾經或厚味積熱傷脾太要審
本症察兼症補腎水生脾血則燥自潤火自除風自息腫自消
若患者忽畱治者不察內用清熱消毒之藥外用追蝕線結之

法又爲敗症慎哉

附治驗

一婦人懷抱久鬱或時胃口嘈辣胸膈不利月水不調晡熱食少體倦唇腫已年餘矣此脾經鬱火傷血用歸脾湯加薑汁炒黃連山梔少佐吳茱萸嘈辣頓去飲食稍進乃去黃連加貝母遠志胸膈通利飲食如常又用加味逍遙散歸脾湯間服百餘劑月水調而唇脣愈

一婦人懷抱久鬱患繭瘡雜治消炎降火虛症悉具盜汗如雨余謂此氣血虛而有熱也用當歸六黃湯內裏今連柏俱炒黑一劑而盜汗頓止仍用歸脾湯八珍散兼服元氣漸復更以逍遙散歸脾湯間服百餘劑而瘡亦瘥

一婦人唇裂內熱二年矣每作服寒涼之劑時出血水益增
症此胃火傷血而藥傷元氣也余用加味清胃散而愈後因怒
唇口腫脹寒熱作嘔此屬肝木乘脾土用小柴胡加山梔枳芩
桔梗諸症頓愈復以加味道遙散調補元氣而愈

一婦人因怒唇腫內熱體倦用化瘀藥食少作嘔大便不實唇
出血水用理氣消導胸膈痞滿頭目不清唇腫經閉用清胃行
血肢體愈倦發熱煩躁涎水湧出余曰此七情傷肝脾屢用攻
伐反致他症遂用濟生歸脾湯食進便寬止用加味道遙散
腫消熱退體健後因怒寒熱耳痛胸膈脹悶唇瘻腫甚此怒動
肝火而傷血用四物合小柴胡加山梔頓愈又因怒胸乳作脹
肚腹作痛嘔吐酸涎飲食不入小水不通此怒動肝木而克脾

土也用補中益氣加川芎芍藥而愈又勞役怒氣飲食失節發熱喘渴體倦不食下血如崩唇腫殼甚此爲肝經有火不能藏血脾經氣虛不能攝血用補中益氣加炒黑山梔芍藥丹皮而一婦人月經不調兩足發熱至年餘而身亦熱勞則足腿酸疼又年餘唇腫裂痛又半年唇裂出血形體瘦倦飲食無味月水不通唇下腫如黑棗余曰此肝脾血虛火症也彼不信用通經藥而歿

一婦人忿怒而唇腫或用消毒之藥唇脹出血年餘矣余曰此腮木丸脾土而血傷也酒養脾胃滋化源爲主彼執用前藥狀如翻花瘤而歿

一婦人口苦脹此肝火之症也用小柴胡加山梔黃連少愈

更以四君子加芍藥當歸柴胡調補脾胃而瘥

一婦人每怒口苦發熱肺熱此肝火盛而血傷也以小柴胡合四物二劑以清火而生血更以四物加柴胡白朮芍藥丹皮生血健脾而愈

一婦人每怒則口苦兼辣胸痛脹乳內或時如刺此肝肺之火也用小柴胡加山梔青皮芍歸桑皮而安後又勞怒口復膨經水頓至此屬內火動血得熱而妄行用四物加炒芩炒梔膽草一劑而血止更以加味道逍散而元氣復

一婦人因怒齒痛寒熱作嘔用清胃等藥益甚余以爲此肝火傷胃寒藥復傷故也用六君子加芍藥柴胡山梔而愈
一婦人胃中嘈辣甚則熱痛後患齒疼此胃中痰火也用三陳

加芩連下，越鞠丸而瘳。

一婦人發熱齒痛日晡益甚，月水不調。此脾經血虛，用逍遙散加升麻、桑葉。愈後因怒復痛，仍以前藥加川芎而痊。

一婦人因怒牙疼寒熱，此肝火侮脾土。用小柴胡加芎歸苓术山梔而疼痛止。用加味逍遙散而寒熱退。

一婦人每產後齒齦皆動踰旦乃止。此氣血虛而火動也。後復懷姪臨月，余付十全大補湯二劑令產後煎服。其齒不動如故。一婦人善怒，舌痛煩熱。或用降火化瘀藥，前症益甚。兩脇作脹，又服流氣飲，肚腹亦脹。經行不正。此肝虛不能藏血，脾虛不能攝血。而前藥復傷也。用加味歸脾湯加五味子而愈。

一婦人冬患腦疽腫痛，熱渴，脈洪數實。此膀胱濕熱，上壅，用清

熱消毒散潰而愈。次年其舌腫大遍身患紫疔如葡萄手足尤多。各刺出黑血。此脾胃積熱毒也。服奪命丹七粒。出真污瘞熱益甚。又便祕。二十日與大黃芩連各三錢升麻白芷。山梔薄荷連翹各二錢。生草一錢水煎三五沸服之。大小便出真血甚多。下體疗稍退。乃入犀角汁再服。舌本及齒縫出真血。諸毒乃消。更與犀角地黃湯而愈。

一婦人善怒。舌本強。手脣麻。此肝木旺脾土治以六君子加柴胡芍藥而愈。

一婦人產後喉痛。服清熱等劑。益甚。此膀胱經血虛也。蓋膀胱之內脉上行。至喉而還。用八珍湯加牡丹皮柴胡酒炒黑黃柏二劑而愈。

一婦人喉間作痛旬餘突腫如赤楊梅狀二月後而腫遍身筋骨作痛余以爲此時行楊梅瘡也先以草薢湯數劑而平更以四物加草薢黃芪二十餘劑諸症悉退

附方藥

清胃散 治醇酒厚味唇齒作痛或齒齦潰爛或連頸面頸項作痛

黃連炒一錢

當歸

生地黃

牡丹皮各一錢

升麻二錢

右水煎服實熱便秘加太黃

加味清胃散即前方加犀角連翹甘草

涼膈散 治積熱煩渴面赤內熱頭昏咽痛便溺赤澁狂言譴

妄睡卧不安

大黃

朴硝

甘草

錢一

連翹

梔子

黃芩

薄荷

錢各一

右水煎服

補黃散

治脾胃虛熱口舌生瘡畏冷飲食

人參

白朮

炒各一錢

白芍

藥炒

陳皮

甘草

炒各五分

右薑囊水煎服

四順清涼飲加山楂牛蒡子清涼飲治臟腑實熱秘結口舌生瘡

當歸

赤芍

藥

甘草

大黃各一錢

右水煎服

人參安胃散 治服峻劑損脾胃口舌生瘡

人參一

錢

黃芪炒二

錢

生甘草一

錢

炙甘草各五

白芍藥七

分

白茯苓一

錢

黃連炒五

右水煎服

溫中丸

一名人參理中丸

治中氣虛熱口舌生瘡不善飲冷肢體倦怠

飲食少思

人參

甘草炒

白朮炒各

右爲末薑汁糊丸桐子大每服五十丸白湯下

柳華散

治熱毒口瘡

黃柏炒

蒲黃

青黛者

真正

人中白粉等分

右爲末敷之

四物湯 治血熱口舌生瘡或牙齦腫潰或日晡發熱煩躁不

安

方見本卷第六論

加味四物湯

即四物湯加丹皮柴胡山梔

當歸補血湯

治氣血俱虛口舌生瘡熱渴引飲目赤面紅其

脉洪大而虛重按全無

方見本卷第十一論

四物二連湯

治血熱口舌生瘡或夜發寒熱

當歸

熟地黃

白芍藥炒

川芎

黃連炒

胡黃連錢一

右水煎服

甘草和子

清咽利膈湯

治積熱咽喉腫痛痰涎壅盛盛煩躁飲冷太便祕

金銀花

防風

荆芥

薄荷

桔梗炒

黃芩炒

黃連炒

山梔炒

連翹錢各一

玄參

大黃煨

朴硝

牛蒡子研

甘草分七

右水煎服

龍射聚垂丹

治心脾客熱咽喉腫痛或成癰不消或舌本腫

脹口舌生瘡或諸物骨鯁

川芎兩

生地黃

犀角錢

羚羊角撈

琥珀

玄參

連翹錢各五

人參

赤茯苓

馬牙硝

片腦

麝香各三錢

桔梗

升麻

鉛白霜錢各五分砂

牛黃錢各二

南硼砂一

金箔五十片

右各另爲末和蜜丸龍眼大金箔爲衣薄荷湯化下或噙
嚥之

枝萃桔梗湯 治熱腫喉痺

桔梗炒

甘草

連翹

山梔炒

薄荷

黃芩各一錢

右竹葉水煎服

甘桔湯 治咽喉腫痛

甘草六錢

苦梗三錢

紫藥

輕香散一錢

寒冰散

右水煎服

解毒雄黃丸 治癰瘍風腫閉或卒倒死牙關緊急

雄黃一錢

鬱金一錢

巴豆十四粒

巴豆去油殼

茶末

右爲末醋糊丸菉豆大用熟茶送下七丸吐頭瘻立甦
奪命丹 治喉閉或疔毒或麻痺或嘔吐重者昏憒若疔毒牙
關緊急用三五丸爲末水調灌下誠有奪命之功

蟾酥乾者

輕粉各五

枯白藜

寒水石煅

銅碌

乳香

沒藥

麝香各一錢

硃砂三錢

蝸牛二十個另研如無亦効

右爲末用蝸牛或酒糊爲丸如菉豆大每服一二丸溫酒或
葱湯下

換肌消毒散 治時瘡不拘初起潰爛一名革薢湯

土茯苓五錢

當歸

白芷

皂角刺炒

薏苡仁六錢半

白鮮皮

木瓜不犯鐵器

木通

金銀花錢一

甘草分五

右水煎服

七味白朮散一名錢氏治中氣虛熱口舌生瘡不善飲食或吐

瀉口乾

方見二十卷第二論

四君子湯治脾胃虛熱口生瘡食少作嘔太便不實若肝木乘脾土所致加柴胡芍藥

方見本卷第六論

六君子湯方見本卷第六論

二陳湯方見本卷第五論

越鞠丸方見六卷第七論

補中益氣湯方見本卷第十論

清熱消毒散方見本卷第五論

犀角地黃湯方見本卷第二論

當歸六黃湯方見十九卷第六論

逍遙散 八珍湯 歸脾湯

十全大補湯四方見本卷第四論

小柴胡湯方見本卷第二論

婦人耳聰痛方論第二

耳聰屬手少陽三焦或足厥陰肝經血虛風熱或怒動肝火而致若發熱燃痛屬三焦厥陰風熱用柴胡清肝散若內熱疼痛或脹痛屬肝火傷血用梔子清肝散若寒熱作痛或作嘔吐屬肝火傷脾用益脾清肝散若口乾足熱爲肝腎陰虛用益陰腎氣丸若月經先期爲血熱用加味逍遙散過期爲血虛用六珍

湯食少體倦為鬱火用加味歸脾湯惡寒發熱肢體倦怠爲氣血俱虛用十全大補湯慎不可專治其外復傷氣血也

附治驗

一婦人耳內外腫痛胸脇不利寒熱往來小便不調余以爲肝火傷血先用龍膽瀉肝湯四劑諸症頓退又用加味道逍遙散而愈又因怒復作用小柴胡湯而痊

一婦人經行後因勞怒發寒熱耳作痛余以經行為血虛用珍湯加柴胡怒氣爲肝火用加味道逍遙散勞役爲氣傷用補中益氣湯加山梔而愈

一婦人素鬱怒耳內作痛腫熱寒熱面色青黃經行則變余用加味歸脾湯加味道逍遙散而愈

一婦人懷抱素鬱，因怒耳作腫痛，經行不正寒熱發熱面色青赤，肝脈弦數，余以爲久鬱傷脾，暴怒傷肝，先用加味小柴胡湯隨用加味逍遙散而痊。

一婦人因怒發熱，每經行兩耳出膿，兩太陽作痛，胸脇乳房脹痛，或寒熱往來，或小便頻數，或小腹脹悶，皆屬肝火血虛，先用梔子清肝散二劑，又用加味逍遙散數劑，諸症悉退，乃以補中益氣加五味而痊。

一婦人耳內腫痛出水，寒熱口苦，心煩，連頸項，飲食少思，此肝火甚也，用小柴胡湯加山梔牡丹皮稍愈，用加味逍遙散漸愈，用八珍湯加柴胡丹皮山梔調補肝脾，而全愈。

一婦人耳內外腫痛，胸脇不利，寒熱往來，小便不調，此肝經濕

熱也用龍膽瀉肝湯四劑諸症須退用加味道逍散而全愈又因怒復作用柴胡清肝散而痊

一婦人耳內不時脹痛內熱口乾勞則頭暉吐痰下帶此肝脾氣虛也朝用補中益氣夕用加味道逍散而痊

一寡婦耳內外作痛不時寒熱腋上魚際此血盛之症用小柴胡加生地以抑其血而愈又項間結核如貫珠寒熱用加味歸脾湯加味道逍散調補肝脾而愈

一婦人耳內外或作痛或赤腫或寒熱月經旬日而止潮熱內熱自汗盜汗余以爲肝脾氣血俱虛而有熱用歸脾湯六味丸而愈

一婦人性急或耳內作痛或耳外赤腫發熱胸脹日晡益甚余

以爲怒氣傷肝氣血俱虛二十一朝用加味逍遙散加黃柏桔梗又用歸脾湯送地黃丸而愈

一婦婦耳內外作痛或項側結核內熱晡熱月經不調吐痰少食胸膈不利余以爲鬱怒傷肝脾朝用歸脾湯以解肝鬱生脾氣夕用加味逍遙散以清肝火生肝血而愈

一女子耳下腫赤寒熱口苦月經不調小便內結一塊此肝火氣滯而血凝也先用小柴胡加山梔川芎丹皮又用柴胡清肝散而痊

附治驗方藥

小柴胡湯 治肝膽經症寒熱往來晡熱潮熱身熱默默不欲飲食或怒火口苦耳聾咳嗽發熱膀胱作痛甚者轉側不便

兩脇痞悶或瀉利咳嗽或吐酸食苦水皆用此藥主之

柴胡

錢二分

黃芩

炒一錢

人參

各七分

半夏

各七分

右薑水煎服

加味小柴胡湯 治肝膽經風熱耳前後腫痛或結核微痛或
寒熱嘔吐或經候不調等症即小柴胡加山梔牡丹皮
益脾清肝散 治肝經之症寒熱體痛脾胃虛弱

人參

白朮

炒

茯苓

各一錢

甘草

炒五分

川芎

當歸

黃芪

各一錢

柴胡

五分

牡丹皮

十分

右水煎服

梔子清肝散 治三焦及肝膽經風熱耳內作痒或生瘡出水
或脇肋胸乳作痛寒熱往來

柴胡

山梔炒

牡丹皮錢一

茯苓

川芎

芍藥

當歸

牛蒡子炒各七分

白朮炒

甘草各五分

右水煎服

柴胡清肝散

治肝膽三焦風熱怒火以致項胸作痛或頭目

不清或耳前後腫痛或寒熱體疼

梔子炒五分

柴胡

黃芩

炒五分

人參

山梔炒

川芎

各一錢

連翹

桔梗各八分

甘草五分

右水煎服

犀角地黃湯 治上焦有熱口舌生瘡發熱或血妄行或吐衄

或下血

犀角 磅

生地黃

白芍藥

黃芩炒

牡丹皮

黃連 炒各一錢

右水煎服若因怒而患加柴胡山梔

犀角升麻湯 治陽明經風熱牙疼或唇頰腫痛或手足少陽

經風熱連耳作痛

犀角 磅

升麻

防風

羌活各一錢

白附子

五分

川芎

白芷

黃芩

炒各七分

甘草 五分

右水煎熟入犀角末服

益陰腎氣丸 方見六卷第三論

婦人癩癰方論第三

婦人癩癰或因憂思鬱怒或因胎產經行則肝膽脾胃受傷以致前症蓋肝傷則血燥血燥則筋攣累累如貫珠多生耳前後胸脇間若寒熱腫痛乃肝氣動而爲病用柴胡梔子散以清肝火爲主佐以逍遙散以養肝血若寒熱既止而核不消乃肝經之血亦病矣宜用加味四物湯以養肝血爲主佐以柴胡梔子散以清肝火若初生如葷附着於筋白色不變內熱口乾精神倦怠久不消潰乃肝脾虧損用逍遙散歸脾湯六味丸以健脾土培肝木切不宜用散堅追毒之劑故外臺秘要云肝腎虛熱則生癩矣病機云癩癰不孫膏梁丹石之毒因虛勞氣鬱所致

補形氣調經脈其瘡當自消散若誤下之先犯病禁經禁矣若久潰不斂脉浮大邪火盛也面色㿠白金丸木也皆不治凡瘻癰亦脉貫瞳子有幾條則幾年死無則可治

附治驗

一婦人患前症久而不愈或以爲木旺之症不宜於春預用散
腫潰堅湯腫硬益甚余以爲肝經虧損用六味地黃丸補中益
氣湯至春而愈此症若肝經風火自病元氣無虧可用散堅消
毒之劑若肝自損虧或水不生木用地黃丸若金丸丸須補
脾土生腎水若行攻伐則脾胃傷而反致木旺矣

一婦人患之少寐年餘而潰膿水淋灑月經或五六十日一至
悞服通經丸屢轉無寐半前惡寒午後發熱余謂思慮傷脾用

歸脾湯作丸午前以六君子送下午後以逍遙散送下兩月餘得寐半載後經行如期年餘而瘡愈

一婦人潰後發熱煩躁作渴脈大而虛此血虛也以當歸補血湯六劑而寒熱退又以聖俞湯數劑而全愈更以人參加吳茱萸丸而瘡愈

遠志而瘡歎

一癱婦面黃體倦酸澀氣余以爲中氣虛弱欲用補中益氣湯加桔梗半夏不自信又降火利氣胸膈痞滿癰瘍脹腫痛又散堅利氣啜氣不絕太便不實四肢時冷余曰今變中氣虛寒矣用木君子湯加姜桂少用升麻柴胡漸愈更佐以補中湯尋愈一婦人患此啜氣用降火清胃食少吞酸胸膈痞悶用利氣消道止疼氣促飲食日少用清熱化痰太便堅澁內熱身瘦余

曰吞酸噉氣脾閒氣虛也胸痞痰喘肺氣虛也太便堅澀內
熱日瘦肺肺血虛也遂以補中益氣加炒黑吳茱萸三分數劑
佐以六味丸諸症頓退乃用歸脾湯逍遙散間服而愈

一婦人患前症遍身作痒脈大而虛此氣血俱虛不能榮於腠
理以十全大補湯治之而愈大凡潰後半前痒作氣虛半後痒
作血虛若作風症治之必死

一婦人項核腫痛察其氣血俱實先以必效散一服去之更
益氣養榮湯三十餘劑補之而消蓋此症初起而血氣虛弱者
先用前湯待其氣血稍充乃用必效散以去其毒仍用補藥無
不奏效若已成癰者即針而補托之氣血復而核不消者服散
堅之劑倘不應而氣血如故仍以必效散養榮湯又不應灸射

尖肩鶴二穴用豆豉餅琥珀膏自愈若氣血壯實不用追餸亦能自腐用藥以腐之者使易於收斂耳若血虛而用追餸不惟無益適以取敗凡不慎飲食七情者不治

附方藥

當歸川芎散 治手足少陽經血虛瘡症或風熱耳內痒痛，瘡出水，或頭目不清寒熱少食或經水不調胸膈不利腹脇疼痛小便不調

當歸

川芎

柴胡

白朮炒

芍藥炒各一錢

山梔炒一錢

牡丹皮

茯苓各八分

蔓荆子

甘草各五分

右水煎服

若肝氣不平寒熱往來加柴胡地骨皮肝氣實熱加柴胡黃
芩肝脾氣血虛熱加參芪熟地脾虛飲食少思倍加白朮茯
苓脾虛胸膈不利加入參黃芪脾虛痰滯胸膈不利加半夏
肝氣不順胸膈不利加木香肝虛小腹痞滿或時作痛加熟
地脾血不足小腹作疼加肉桂日晡發熱加熟地
加味地黃丸 治肝腎陰虛諸症或耳內痒痛出水或眼目疼
喘或熱渴便澀等症

乾山藥

山茱萸肉

牡丹皮

澤瀉

白茯苓

熟地黃白

生地黃

柴胡

五味子各另爲
末等分

右將二地黃酒拌杵膏如蜜丸桐子大每服百丸空心白湯

下如不應用加減八味丸

人參養榮湯 治潰瘍寒熱四肢倦怠體瘦少食面黃氣短不能收斂太瘡愈後多服之庶不變他症也

白芍藥一錢五分

人參

陳皮

黃芪炙各一錢炒

桂心

當歸

白术炒

甘草炙各一錢炒

熟地黃製

五味子炒

茯苓各七分

遠志去心一錢炒

右薑棗水煎服

瀉青丸 治肝經實火脇乳作痛或惡寒發熱太便秘結

當歸

龍膽草炒

川芎

山梔炒

大黃炒

羌活

防風各等

右爲末蜜丸桐子大每服三四丸白湯下若陰血不足肝火

血燥用四物加山梔柴胡或逍遙散加丹皮山梔若腎水虧損不能生肝不而筋攀結核或肢節拳瘤或似中風涎瘻十湧用六味丸料煎服

生地黃丸 治師尼寡婦室女乍寒乍熱或頸間結核肝脉弦長而出魚際

生地

一兩酒
拌杵膏

秦丸

黃芩

硬柴胡

各五錢

赤芍藥

兩

右爲末入地黃膏加煉蜜少許丸桐子大每服十五丸烏梅煎湯下日進二服

連翹飲子 治肝膽經氣滯癰癧結核或乳內結核者
連翹 川芎 瓜蕈仁 研 皂角刺 炒

橘葉

青皮

甘草節

桃仁鱗

右水煎服

散腫潰堅湯

治癩癰堅硬氣血無虧者宜用

升麻

連翹

當歸尾酒拌

白芍藥炒

黃柏酒炒

葛根

連翹

三稜酒拌微炒

廣木各三

龍膽草酒炒

桔梗炒

昆布

知母酒炒

瓜蔞根各五

柴胡四分

黃芩酒炒四分半

甘草炙二分

右水煎服

必效散 治癩癰未成者消已潰者飲須元氣無虧者可服若孕婦禁用

南鵝砂二錢半

輕粉盛

斑貓

四十枚去頭翅同
糯米炒熟去米

麝香鐵

巴豆五粒去心膜

殼

白欖榔

右爲末每服一錢五更用滾湯調下如小水滯滯或微痛此
癰毒欲下也進益元散一服即下此方斑貓巴豆似爲峻厲
然用巴豆乃解斑貓之毒用者勿畏

益元散

滑石鐵六

甘草鐵一

右每服一錢白湯調

琥珀膏治頸項或腋下初結小核漸如連珠潰而膿水不絕
或漏症者

琥珀一兩

丁香

白桂心

硃砂

木香

松香

白芷

防風

當歸

木通

木鱉子肉各五錢

麻油斤二

右先用琥珀等六味爲末其餘藥入油煎焦黑濾去粗徐徐

入黃丹再煎軟硬得中入前末即成膏矣

針頭散

治一切頑瘡內有瘀肉或癰核不化瘡口不合宜此

藥腐之

赤石脂五錢

乳香

白丁香

砒霜生用

黃丹各一錢

輕粉

麝香各五錢

蜈蚣一條炙乾

右爲末搽瘡肉上其肉自化若瘡口小用糊和作細條陰乾
絀之凡瘡久不答者內有膿管必須用之

逍遙散

大黃

川芎

芍藥

甘草

白芷

歸脾湯二方見本卷第四論

柴胡清肝散

梔子清肝散二方見本卷第二論

補中益氣湯一方見本卷第十論

四物湯 加味四物湯

六君子湯三方見本卷第六論

六味丸

歸脾補血湯二方見本卷第十一論

聖愈湯方見本卷第九論

益氣養榮湯方見本卷第五論

灸肩顎肝尖法方見本卷末

婦人結核方論第四

婦人結核皆因鬱怒虧損肝脾或因胎產經行失於調養或因暴怒觸動膽火若結於頸側耳前後或胸脇肋痛或發寒熱屬膽經風熱怒火宜用柴胡清肝散加釣藤山梔以養血氣清肝火若結於肉裡其色不變肺熱內熱屬肝火血虛宜用加味逍遙散加龍膽草以養肝血清肝火或結於肢節或累累如實珠其色不變亦肝火血燥而筋攣宜用柴芍參苓散加釣藤以養血氣佐以六味丸以生腎水若時消時作此氣滯而痰結也用歸脾二君二湯以調和脾肺之氣並佐以海藻丸若潰而核不腐或肉不生或膿水清稀肌寒肉冷自汗盜汗寒熱內熱面色癥黃食少體倦便利不調者五藏皆虛也但用補中益氣加味

六君子二湯調補脾胃以滋諸臟則各症自退故經云形陽則
痛氣傷則腫慎不可輕用行氣破血之劑以復傷也

附治驗

一婦人項結核寒熱頭痛脇脹乳痛肉熱口苦小便頻數屬肝
火血虛用加味四物而愈又用加味逍遙散調補肝脾而安
一婦人經事不調肢體結核如稜如豆不計其數隱於肉裡其
色不變三年餘矣大按則痛或投以降火消毒乃不按自痛發
熱作渴日晡益甚經水過期左關脉數此肝火血燥也用清肝
益榮湯六十餘劑諸症已愈惟項核未消又以當歸龍鬚丸數
服及八珍湯加柴胡山梔三十餘劑而痊
一婦人久鬱怒胸脇內股外臍各結核寒熱往來經候不調胸

腸不利飲食少，思太便不調。左關弦洪，左寸弦數。右關弦緊，右寸弦浮。余謂左關弦洪，肝經熱也。左寸弦數，木生火也。右關弦緊，肝刺脾也。右寸弦浮，木侮金也。法當生肝血，遂用加味四物湯而諸症退。用加味道逍遙散而經候調，用加味歸脾湯而全愈。

一婦人因怒肢體結核，睡中發癟。左關弦洪，余曰此爲肝火也。燥筋攀當清肝火，養元氣。遂用加味小柴胡湯加味道逍遙散，漸愈。又用八珍湯加牡丹皮、柴胡、山梔、鈞藤而愈。

一婦人肢體結核，胸腹痞悶，氣泄稍寬。余謂此肝脾鬱滯，不信服降火行氣化瘀，病愈甚，而氣愈虛。余用加味道逍遙加味歸脾，二藥間服，半載而痊。

一婦人項間結核，不時寒熱，左目緊，小頭項振樟，四肢抽搐。此

肝火血虛風熱也用加味逍遙加釣藤數劑諸症漸愈又用八珍湯調理而痊

一婦人耳內耳後項側結核作痛寒熱口苦月經不調此肝膽經火而傷脾胃也用四君柴胡丹皮及六味地黃而愈

一婦人因怒結核經行不止發熱晝安靜而夜譖語此血分有熱也用小柴胡加生地頭安其核尚在經候先期肝脉弦數此肝火血涸而筋攣也用加味逍遙加生地月經如期而愈

一婦人頸臂結核頭痛寒熱乳內時疼兩脇微痛以爲肝脾鬱火而血燥先以加味逍遙散再用加味歸脾湯而愈

一婦人素鬱怒患前症內熱晡熱久而不愈若面色痿黃則月經過期而少若面色赤則月經先期而多余曰面白黃過期脾經

虛弱也面赤先期脾虛少動也朝用補中益氣升舉脾土以益氣血夕用加味逍遙滋養肝血以息陰火復以歸脾湯解鬱結半載元氣復而瘡又有患前症因脾虛下陷而發熱乃專治其瘡變察而歿

一女子耳下結核焮痛寒熱此屬肝經風熱用梔子清肝散二劑諸症悉愈後因怒耳後并額兩角作痛寒熱此兼少陽經症仍以前藥加羌活二劑而瘡

一婦人項患五核時常寒熱肝肺弦長而出寸口此血盛無羈之症也用小柴胡湯加生地烏梅治之而愈

一婦人腹中結塊誤認血驚服驅逐之藥下血甚多致肢節間結核治法見二十卷第十一論

附方藥

八珍湯

治脾胃傷損

惡寒發熱或煩躁作渴或因脾胃虛損

膿水清稀久不能愈等症卽四君四物二湯相合

方見本卷第二論

十全大補湯

治瘡瘍胃氣虛弱腫痛不消或潰而不斂或自

汗盜汗食少體倦或寒熱作渴

頭痛眩暉或似中風又治氣血

俱虛胸腹脇痛或作脹滿或骨節作痛

經候不調或寒熱補熱

五心煩熱或吐血咽乾頭痛眩暉

眼目昏澁或痰嗽喘促胸膈

虛痞或嘔吐泄瀉手足冷熱

卽八珍湯加黃芪肉桂不論

加味道遙散

治肝脾血虛有熱遍身搔痒或口燥咽乾發熱

盜汗食少嗜卧小便澀滯等症又治療瘡瘍流注虛熱等瘧

甘草炙

當歸炒

芍藥酒

山茱萸正

白术

炒各一錢

柴胡

牡丹皮

山梔

炒五分

右水煎服

逍遙散即前方去丹皮山梔

歸脾湯 治脾經失血少寐發熱盜汗或思慮傷脾不能攝血

以致妄行或健忘怔忡驚悸不寐或心脾傷痛嗜卧少食或

憂思傷脾血虛發熱或肢體作痛太便不調或經候不准晡

熱內熱或癰瘡流注不能消散潰斂

人參

白术

炒各一錢

黃芪

炒各一錢

白茯苓

龍眼肉

當歸

遠志

酸棗仁

炒各一錢

木香

甘草

炙各五分

右薑棗水煎服

加味歸脾湯即前方加柴胡山梔

柴木參芩湯

治肝火血熱遍身癩痒或起赤疕或筋掣結核

白朮炒

人參

茯苓各錢

柴胡

川芎

山梔炒

芍藥炒

甘草炒各五分

熟地自製

當歸各八錢

右水煎服

柴芍參芩散

治肝膽經部分結核癰瘍瘤癰等症或肝血燥

熱脾氣虛弱發熱少食

柴胡

芍藥炒

人參

茯苓

白朮炒

山梔炒

陳皮

當歸各一錢

牡丹皮

甘草各五分

右薑棗水煎服

清肝益榮湯

治肝膽經風熱血燥筋攣結核或作瘊子

柴胡

山梔炒各五分

龍膽草酒拌炒黑五分

當歸

川芎

芍藥炒各一錢

熟地黃製

白朮炒

木瓜

不犯鐵器各一分

甘草三分

薏苡仁五錢

右水煎服

清熱涼血飲

治風熱血燥丹毒等症太便祕結

當歸

川芎

大黃炒

芍藥炒

生地黃各一錢

右水煎服

神効開結散

消癰塊甚効

沉香

木香各二兩

橘紅四兩

珍珠

四十九粒入砂罐內以硫泥封固煅赤取出火毒用

猪厭肉子

四十九枚用豚猪者生須間如棗子大

右爲末每服一錢臨卧酒調徐徐嚥下患者三五服大者一劑可愈切忌酸鹹油膩滯氣之物須用除日於靜室修合海藻散堅丸治肝經癰瘤

海藻

昆布各二兩

小麥四兩醋煑酒乾

柴胡二兩

龍膽草酒拌炒焦二兩

右爲末煉蜜丸桐子大每服二三十丸臨卧白湯送下噤化
戀之尤好凡患瘰癧服調治之藥未應宜佐以前二藥
九味柴胡丸方見本卷第八論

梔子清肝散

柴胡清肝散二方見本卷第二論

生地黃丸方見本卷第三論

婦人流注方論第五

婦人流注或因憂思鬱怒虧損肝脾或因產後勞役復傷氣血以致營氣不從逆於肉理腠理不密外邪客之或濕痰流注或跌撲血滯或產後惡露則氣流而注血注而凝或生於四肢關節或流於胸腹腰騮或結塊或漫腫皆屬虛損急用葛根及益氣養榮湯則未成者自消已成者自潰若腫起作痛起居如常飲食如故屬病氣有餘形氣未損者尚可治若漫腫微痛起居倦怠飲食少思屬形氣病氣俱不足最爲難治不作膿或膿成不潰氣血虛也用八珍湯憎寒畏寒陽氣虛也十全大補湯脯

熱內執陰血虛也四物加參术作嘔欲嘔胃氣虛也亦君加炮
薑食少體倦脾氣虛也補中益氣加茯苓半夏四肢逆冷小便
頻數命門火衰也八味丸小便頻數痰盛作渴腎水虧損也六
味丸月經先期不日而止肝脾虛弱也月經過期多日不正肝
脾虛熱也八珍湯加柴胡丹皮凡潰而寒凝瘡口不斂者用草
豉餅祛散之其潰而有膿管不斂者用針頭散腐化之若不補
氣血不節飲食不慎起居不成七情或用寒涼尅伐者復不治

附治驗

一婦人左臂患之年許不潰堅硬不痛脈弱少食月經過期日
晡發熱勞怒則痛此形氣虛而逆於肉裡也與參芪歸木川芎
芍藥熟地貝母遠志香附桔梗丹皮甘草百餘貼而消

一婦人因暴怒而腰腫一塊或胸膈不利或走氣作痛此營氣鬱滯與方脉流氣飲數劑而止更以小柴胡對四物加香附貝母月餘而愈

一婦人因怒脇下腫痛胸膈不利脈息沉滯此營氣鬱遏而爲腫用方脉流氣飲數劑少愈以小柴胡對二陳加青皮桔梗東母數劑頓退更以小柴胡對四物二十餘劑而痊

一婦人因胸脇肩腫遍身作痛用黑丸子二服而痛止又用方脉流氣飲二劑而腫消更以二陳對四物加香附枳殼枳梗而

一婦人患此遇勞必痛衆手按之痛甚止屬氣血俱虛用十全太補湯亦味丸逍遙散而痊

一婦人先肢體作痛後患流注發熱惡寒食少脇脹月經不調

痰盛喘嗽五心煩熱健忘驚悸盜汗無寐悉屬肝脾虧損氣血不足用十全大補加味歸脾兼服諸症悉瘳

一婦人素頭暉東流注月經遲少此屬中氣虛弱用補中益氣湯而愈後因勞作地月經如湧此勞傷火動用前湯加五味子丁劑而愈

一婦人患箭症用行氣化瘀等藥胸膈不利飲食少思用疎利之藥太便作泄中滿不食余以爲脾胃復傷用補中益氣湯加煨薑脾胃健飲食進又用六君子加芳歸百餘劑而愈

一婦人素鬱結肩臂各腫如覆杯余以爲肝脾虧損用加味道透散百餘劑元氣復而腫消後因勞役怒氣經行不止服涼血之劑其血如崩余以爲此因脾氣復傷下陷而血從之朝用補

中益氣湯又用加味歸脾湯而愈

一婦人懷抱鬱結不時心腹作痛寒熱倦怠服行氣化瘀等劑遍身結核木小不一二二十餘枚諸藥不應余用加味歸脾湯而一婦人腿膝筋攣骨痛諸藥不應脉遲緊此肝脾氣血虛弱而寒氣之變也用大防風湯二劑頓退又二劑而安又一婦患之亦然先用前藥二劑更服黑丸子而痊此一惠若不早治以致內潰必成敗症矣

一婦人患前症潰後發熱余以爲氣血俱虛彼不信乃服敗毒散之藥果發太熱竟至不救夫潰瘍雖有表症發熱宜以托裏爲主而佐以散之劑况於癰瘍流注乎

附方藥

仙方活命飲 治一切瘡瘍未成者即散已成者即癰又止痛
消毒之良劑也

白芷

貝母

防風

赤芍藥

當歸尾

甘草節

梔角刺炒

穿山甲炙

天花粉

乳香

沒藥各一錢

金銀花

陳皮

各三錢

右用酒一大碗煎五七沸服

托裡消毒散 治瘡疽元氣虛弱或行攻伐不能消散服之未
成即消已成即潰腐肉即去新肉即生

人參

黃芪

益水拌炒

當歸

川芎

芍藥炒

白朮

炒

茯苓各一錢

金銀花

白芷各七分

甘草五分

右水煎服

托裡散 治瘡瘍因氣血俱虛不能起發或腐潰不能收斂及惡寒發熱者

人參

氣虛多用之

黃芪

炒各一錢

白朮

炒

陳皮

熟地黃

自製一錢

茯苓

酒炒

芍藥

酒炒各一錢

右水煎服

益氣養榮湯 治懷抱抑鬱瘍瘍流注或四肢癟腫肉色不變

或日晡發熱或潰而不斂

人參

茯苓

陳皮

貝母

白芷附

當歸

川芎

黃芪

鹽水炒

熟地黃

酒拌

芍藥

炒各

甘草

炙

桔梗

炒各分

白朮

炒二錢

右薑水煎服

木香餅 治氣滯結，腫閉，肺風寒，所傷作痛。

木香

五錢

生地黃

一兩

右木香為末，地黃杵膏和勻，量患處大小作餅，置患處以熱熨斗熨之，腫痛悉退。

二陳湯 治中脘停痰，飲食少，思嘔逆等症。

陳皮

去白

茯苓

半夏

各一錢

甘草

五分

右水煎服

方脉流氣飲 治惱怒胸膈脹滿，或肢體作痛，或結壅腫，血氣

無虧

方見第三卷
第七論等症

隔蒜灸法

治一切瘡毒大痛或不痛或麻木如痛者灸至末

生
痛不痛者灸至痛其毒隨火而散用大蒜頭去皮切三分厚安瘡頭上用艾壯於蒜上灸之三壯換蒜復灸未成者即消已成者亦殺其太勢不能爲害如瘡大用蒜搗爛患處將艾鋪上燒之蒜敗再換仍服瓶裏之劑如不痛或不作膜不起癰者不治此氣血虛極也

神効葱熨法

治虛怯人肢體患腫塊或不痛或作痛或風襲

於經絡肢體疼痛或四肢筋骨痛又治流注跌撲傷損腫痛用葱頭細切杵爛炒熟敷患處冷易之再熨腫痛即愈其効如神此外補陽氣而運散雍滯之法也

豆豉餅

治瘡癰腫硬不瀆或瀆不歎并一切頑瘡惡瘡用江

西豆

豆豉爲末唾津和作餅大如錢厚如三丈置患處加艾壯

於上炎之乾則易之若背瘡大者

者用漱口水和餅裹患處鋪

艾於上炎之如未成者則消已成者能殺基

瘡有不效者乃

氣血虛也為不治

大防風湯

方見本卷第九論

八珍湯

方見本卷第三論

十全大補湯

方見本卷第九論

六君子湯

四物湯

二方見本卷第六論

補中益氣湯

方見本卷第十論

八味丸

六味丸二方見本卷第十一論

針頭散方見本卷第三論

小柴胡湯方見本卷第二論

黑丸子一名和血定痛丸
方見本卷第九論

婦人血風瘡論第六

婦人血風瘡因肝脾肺經風熱或鬱火血燥所致其外症或身發疮瘡搔痒或如丹毒痒痛或搔破膿水淋漓其內症月經失常小便不調夜熱內熱自汗盜汗惡寒憎寒肢體倦怠飲食不_常甘寒熱往來若發熱作痛屬肝經風熱用當帰飲加柴胡山梔若寒熱作痛屬肝脾鬱火用小柴胡加山梔黃連苦玄蔴薄荷

屬肺經風熱用清熱消風散若經候失常內熱晡熱屬肝脾血虛用加味逍遙散若肢體倦怠寒熱往來屬肝脾氣虛用加味四君子加柴胡丹皮若夜熱作渴或兼譁語乃血分有熱用小柴胡加生地黃血虛用四物合小柴胡若無寐盜汗內熱晡熱乃脾經血虛用歸脾湯兼寒熱加山梔若愈後身起白屑搔則肌膚如帛所隔此氣血虛不能榮於腠理用十全大補湯若用風藥以治其外則陰血復傷反致他症矣

附治驗

一婦人素清苦四肢患之誤服敗毒藥，晡熱內熱自汗盜汗月經不行口乾咽燥，余謂四肢者脾之所主當調養脾血，其病自愈遂用歸脾湯數劑而愈

一婦人性躁患之寒熱口苦脇痛耳鳴腹脹溺澀年餘矣此屬肝火傷脾用四君子加柴胡炒山梔炒龍膽敷劑更與逍遙散兼服而瘡愈又與六味丸及逍遙散七十餘劑而愈

一婦人日晡身痒月餘口乾又月餘成瘡服祛風治瘡之劑膜水淋濶午前畏寒午後發熱殊類風症余謂此肝火傷脾外邪所搏先用補中益氣加山梔鈎藤又以逍遙散加川芎貝母而愈一婦人癰癬發熱日晡益甚皮膚亦疊月經過期此血虛而有熱也以逍遙散加熟地熱止痒退更以四物加柴胡參芪炙草於夢調理遂愈

一婦人懷抱久鬱患前症膿水淋濶服連翹消毒散食少胸痞服清氣化瘀湯作嘔吐瘀服清熱化瘀丸煩熱畏寒四肢厥熱

面白赤色脈大而無力余以爲脾胃虧損而虛寒陽氣於外
遂用六君子湯加炮薑治之諸症稍愈飲食頓進又佐以四物
湯諸症漸愈又以四君子每味各一錢四物湯每味各五分諸
症全愈後因勞暯熱體倦懶食小腹痞墜小便澀滯自用四物
黃柏知母補熟尤甚更煩渴眩暉余以爲脾氣下陷用補中華
氣湯漸愈乃佐以逍遙散而安後月經至如前症復作此脾
氣傷而不能統血血虛而陰火動也仍用補中益氣而痊
一女子十一歲善怒遍身作痒用柴胡川芎山梔芍藥以清肝
火以生地當歸黃芩以涼肝血以白朮茯苓甘草以健脾土而
愈半年後遍身起赤痕或時眩暉此肝火熾甚血得熱而妄行
是夜果經至

附方藥

當歸飲 治血熱癰瘍癰癧癰水淋濺發熱等症

當歸

白蒺藜炒

白芍藥 川芎

生地黃

何首烏不見

甘草各五分

黃芪錢一

防風

荆芥

右水煎服

四君子湯 治胃氣虛弱或因射伐以致腫不消散潰不收斂
者宜用此藥調補脾胃諸症自愈若誤用致毒七惡隨至若
飲食少思或食難化或欲作嘔或大便不實瘡口出血吐血
便血尤宜用之凡氣血俱虛之症宜用前湯但如當歸則脾
胃健飲食進陰血生若用四物沉陰則脾胃復傷反致他症

若命門火衰而脾土虛寒者必用八味丸以補土母

人參

白朮

茯苓
錢各二

甘草
錢一

右薑棗水煎服

加味四君子湯即前方四君子加川芎當歸

六君子湯 治症同前即四君子湯加陳皮半夏各一錢若中氣虛寒假熱誤服寒涼尅伐以致四肢發熱口乾舌燥嘔吐此因寒氣隔陽於外湏更加姜桂不應急加附子

四物湯 治血虛或因失血或因尅伐或因潰後以致晡熱內熱煩躁不安若脾虛不能生血者宜四君加當歸并酒炒白朮以補脾土其血自生若血虛發熱誤服寒涼尅伐之劑以致發熱作渴目紅面赤脈洪大而虛此血脫煩躁急用當歸

補血湯

當歸酒拌一錢

熟地黃三錢

芍藥炒一錢

川芎錢

右水煎服

加味四物湯即四物加柴胡牡丹皮山梔

神妙當歸膏治一切瘡瘍搔痒疼痛去腐肉生新肉其妙如神如洗拭換膏必須預備即貼之新肉長風故也如用白蠟尤好此藥生肌止痛補血續筋故與新肉相宜

當歸

生地黃

黃蠟各一兩

麻油六兩

右先將當歸地黃入油煎黑去粗入蠟溶化候冷攢寫即成膏矣如用白蠟減半

滋陰腎氣丸方見六卷第三論

小柴胡湯 方見本卷第二論

歸脾湯

逍遙散 二方見本卷第四論

六味丸 方見本卷第十一論

補中益氣湯 方見本卷第十論

婦人赤白遊風 方論第七

婦人赤白遊風屬肝經怒火血燥生風或肝經鬱結血虛生熱或腠理不密風邪外襲其症或疙瘩癰癧或膿水淋瀉白屬氣而赤屬血因得風而遊行也若肝經血燥用柴胡清肝散肝經怒火用梔子清肝散肝經血熱用加味四物湯肝火血虛用六味地黃丸脾經鬱熱用加味歸脾湯肝脾血虛風熱用加味逍

逍遙散若因風邪鬱熱所致用荆防敗毒散或專用祛風之劑肝血愈燥則血隨火化反爲敗症矣

附治驗

一婦人素清苦因鬱怒患前症晡熱內熱自汗盜汗月經不行口乾咽燥余謂此鬱氣傷脾乃以歸脾湯數劑諸症稍退後兼逍遙散五十餘劑而愈

一婦人患此性躁寒熱口苦脇痛耳鳴腹脹澀濁乃肝脾血虛火旺也用六君加柴胡山梔龍膽數劑更與逍遙散兼服漸愈又與六味丸逍遙散七十餘劑諸症悉退

一婦人患前症誤服大麻風藥破而出水煩渴頭暉誠類風症六脈洪數心肝脾爲甚余曰風自火出此因怒火脾胃受邪血

燥而作非真風症也與逍遙散六味丸以清肝火滋脾血生腎水而愈心

一婦人患箭症久不愈食少體倦此肝脾虧損陰虛發熱也先用補中益氣加川芎炒梔元氣漸復更以逍遙散而瘡漸愈

一婦人身如丹毒搔破膿水淋漓熱鴻頭暉日晡益甚用加味逍遙散而愈

一婦人患赤遊風肺熱痒甚余用清肝養血之劑不信乃服大麻風藥臂痛筋攣又服化瘀順氣之劑四肢痿弱又一婦患箭症數用風藥煎湯泡洗以致腹脹並歟

一女子亦暈如霞作痒發熱用加味小柴胡加生地連翹丹皮而愈大凡女子天癸未至婦人月經不調受驚着惱多有此症

九陰真陰本草
附方藥

消風散 治風寒癰疹痒痛或膿水淋瀉頭皮腫痒

荆芥穗

甘草炙

陳皮

人參

茯苓

白僵蚕炒

防風

藿香

羌活

蟬蛻各一

厚朴姜製

右水煎服

大連翹飲

治風熱熱毒或赤白遊風表裏皆受患者

連翹

蘿蔔麥

荆芥

木通

赤芍藥

蟬蛻

甘草

防風

柴胡

滑石

山梔炒

黃芩炒

當歸

一兩

甘草

一錢

右水煎服

當歸飲 治風熱赤白遊風作痒，或瘡破膿水淋濺等症。
四物湯 治赤白遊風血虛發熱，或晡熱頭目不清，或煩躁不寐，或胸膈作痛等症。

六君子湯 治脾氣虧損皮膚癩痒，或癰疹不消。三方見本卷第六論

加味小柴胡湯 治肝膽經風熱怒火，赤白遊風，或寒熱往來，晡熱潮熱，身熱，或口苦耳聾等症。方見本卷第二論

加味逍遙散 治血虛有熱，遍身搔痒，赤白遊風發熱，晡熱症。
逍遙散 即前方去丹皮山梔。

歸脾湯 治脾經血虛癥，發熱，少寐，盜汗等症。三方見本卷第四論

荆防敗毒散 方見本卷第十論

婦人癰癧方論第八

一名便癰 一名
便毒俗名瘡子

婦人癰癧或肝經濕熱下注或鬱怒傷損脾胃其外症或兩拘
小腹腫痛或玉門焮腫作痛或寒熱往來增寒壯熱其內症或
小便澀滯或腹內急痛或小腹痞悶或上攻兩脇或肺熱裏墜
君兩拘小腹腫痛肝經濕熱壅滯也用龍膽瀉肝湯玉門腫脹
肝火血虛也用加味逍遙散及龍膽瀉肝湯加木香若槩投散
血攻毒之劑則誤甚矣

附治驗

一婦人拘中赤腫脹痛此腹內作用托裏消毒散加柴胡數劑
潰而膿清寒熱乃氣血復虛用托裡散而寒熱止用十全大補
百餘劑而愈

一婦人腹拘腫痛寒熱口苦或時帶下此肝經濕熱不利也用龍膽瀉肝湯而腫痛消用加味逍遙散而寒熱退

一婦人腹拘腫痛小水不利時或胸乳作痛脇腹作脹此肝火氣滯用四物柴胡青皮玄胡索木香而愈

一婦人拘中作痛小腹痞悶小便不利內熱體倦飲食少思此肝火內動脾胃受傷也用加味歸脾湯柴胡清肝散而安

一婦人拘中腫脹小腹作痛服下血之劑其痛益甚更吐瀉少食余以爲肝脾復傷用六君子湯加升麻柴胡而愈

一婦人兩拘腫痛腹內一塊不時上攻月經不調小便不利余以爲肝脾氣滯而血傷以四君加芍歸柴胡山梔而愈後因鬱怒前症復作兼胸滿腹脹盜汗此肝木甚而傷脾土也用加味

大醫門言卷之二十一
歸脾湯下，蘆薈丸而痊

一婦人小腹內或作痛，或痞悶，兩拘，腫痛，內熱寒熱，胸膈不利，飲食不甘。形體日瘦。此肝氣滯，而脾氣傷也。朝用補中益氣湯，夕用蘆薈丸漸愈。更用六味地黃丸全愈。

一婦人兩拘，腫痛，小腹痞脹，白帶時下，寒熱往來，小水淋瀝。余作肝氣滯，而血病。用龍膽瀉肝湯漸愈。又用加味逍遙散，六味地黃丸全愈。

一婦人患前症，胸脇脹悶，或小水不利，或時腹痛。此肝火氣病。先用龍膽瀉肝湯以清肝熱，又用加味逍遙散以生肝血。六味地黃丸以滋腎水而愈。

一婦人患前症，余以爲肝脾鬱怒，不信。另服化瘀利氣之劑，胸

腹愈脹又服峻利疎導之劑變脾虛發腫而歿

一婦人患前症內熱作渴飲食不甘肢體倦怠中作梗小便赤澁此脾經鬱經肝經濕熱用加味歸脾湯而愈後因怒復作小腹脹痛用小柴胡加山梔子歸痛止又用加味逍遙散而愈一婦人兩拗作痛寒熱內熱小便赤澁胸膈不利此肝火動而脾氣傷也用補中益氣湯加茯苓數劑少愈又與加味歸脾湯諸症悉退再用加味逍遙散而愈

一婦人小腹痞悶溺濇內熱體倦懶食此肝火動而脾血傷也用八珍加柴胡山梔膽草而安

一婦人陰中如梗兩拗腫痛寒熱不食小便頻數小腹重墜余以爲肝脾鬱怒所致先以補中益氣加茯苓山梔車前子青皮

以清肝火升脾氣更以加味歸脾湯調理，而愈

附方藥

龍膽瀉肝湯 治肝經濕熱兩拗脾痛或腹中疼痛或小便澀滯等症

龍膽草

酒拌炒黃

澤瀉各一

車前子炒木通

生地黃

酒拌

當歸

酒拌

山梔炒

黃芩

炒

右水煎服

九味柴胡湯 治肝經濕熱下注便毒腫痛或小腹脇肋結核
凡肝膽經部分一切瘡癧或風熱結核癰癧

柴胡

黃芩

炒各一錢

人參

山梔炒

半夏

甘草各五分

龍膽草焦炒

當歸

芍藥炒

右水煎服

蘆薈丸

治肝氣不和，尅侮脾胃，而患諸症。或二焦肝膽經風

熱，日生雲翳，或疳熱癩癧耳內生瘡，寒熱作痛，肌體消瘦，發

熱作渴，飲食少思，肚腹不調，或牙齦蝕落，頰頬腐爛，下部生

瘡等症。

蘆薈五錢

胡黃連

當歸

芍藥炒

龍膽草酒浸

川芎

蕪荑各一兩

木香

甘草三錢

右爲末用米糊丸，麻子大，每服五十丸，滾湯下。

加味小柴胡湯

小柴胡湯 治肝經下部腫脹小便不利或寒熱往來或嘔吐
潮熱或胸脇作痛二方見本卷第三論

加味逍遙散

治肝脾血虛濕熱

流注下部諸症發熱嘔吐

加味歸脾湯

治脾肝鬱怒下部諸症寒熱嘔吐少食無寐或

經候不調

二方見本卷第四論

補中益氣湯

治元氣下陷下部重墜或嘔吐寒熱少食體倦

或因過服寒涼之藥所致

一方見本卷第十論

加味四物湯

方見本卷第六論

八珍湯 治氣虛寒熱嘔吐或寒熱往來下部諸症

二方見本卷第三論

婦人鶴膝風症因胎產經行失調或鬱怒虧損脾胃而爲外邪所傷或先腿脚牽痛或先肢體筋攣既而膝漸大腿漸細如鶴之膝故名之也若腫高赤痛者易治漫腫不赤痛者難治二月潰而膿稠者易治半載後潰而膿清者難治設用攻伐已損元氣尤爲難治也太要當固元氣爲主而佐以太防風湯若食少體倦者六君子湯爲主肺熱內熱者逍遙散爲主寒熱往來者八珍湯爲主發熱惡寒者十全大補湯爲主少寐驚悸者歸脾湯爲主月經過期者補中益氣爲主月經先期者加味逍遙散爲主凡潰後當大補脾胃若濃出反痛或寒熱煩渴等症皆屬氣血虧損一於培補庶保終吉

附治驗

一婦人久鬱怒胸脇不利內熱寒熱經候不調遍身酸痛余謂
胃氣虧損先用補中益氣湯加半夏茯苓二十餘劑胃氣漸醒
又用太防風湯與歸脾湯膝腫漸消用加味道遙散太防風湯
而全消又用八珍湯加牡丹皮調理氣血而安

一婦人患前症腫痛寒熱先用太防風湯一劑又用加味道遙
散四劑月餘腫痛漸退感於速効另服祛風敗毒虛症蜂起仍
用太防風爲主佐以十全大補而消又服大補湯兩月餘而痊
一婦人患前症兩拘中腿股筋牽作痛內熱寒熱此肝火氣滯
之症先用加味小柴胡湯四劑後以加味道遙散爲主佐以太
防風湯而消又患痢後兩膝腫痛寒熱往來用十全大補湯爲
主佐以太防風湯而仍消

一婦人患乏雖潰而腫不消朝寒暮熱飲食不思經水三兩月
至此屬肝脾氣血俱虛也用補中益氣加味歸脾二湯各三十
餘劑腫漸消而寒熱止又佐以太防風月餘而能步履再月
餘經行如期又服六味丸八珍湯三月而歟

附方藥

大防風湯 治陰虛邪襲腿膝腫痛等症

防風

附子

炮

牛膝

酒浸

白朮

炒

羌活

人參

各一錢

川芎

五分

肉桂

錢一

黃芪

炒一錢

芍藥

炒

杜仲

去皮姜汁拌炒

甘草

炙各五分

右水煎服

熟地黃

自製一錢五分

黑丸子

一名和血定痛丸

治跌撲墜墮筋骨疼痛或瘀血壅腫或外感

風寒肢體作痛若流注膝風初結服之自消若潰而膿清與

補氣血藥自歛孕婦勿服

百草霜

白芍藥

各一兩

南星

川烏

各三錢炮

白斂

赤小豆

名六錢一兩

白芨

當歸

骨碎補

培各八錢

牛膝

培六錢

右爲末酒糊丸桐子大每服三十丸鹽湯溫酒任下
聖愈湯 治血虛心煩睡卧不寧或五心煩熱

地黃

酒拌蒸半日

生地黃

酒拌

黃芪

炙

川芎

當歸各一兩

水煎服

六味丸

方見本卷第十論

逍遙散

加味逍遙散

八珍湯

十全大補湯

歸脾湯

五方見本卷第四論

補中益氣湯

方見本卷第十論

四物湯

六君子湯

二方見本卷第六論

婦人下注膿瘍方論第十一

婦人兩癰生瘍或因胎產飲食失宜傷損脾胃或因憂思鬱怒
虧損肝脾以致濕熱下注外邪所搏外膿屬足三陽可治內膿
屬足三陰難治若初起發腫赤痛屬濕熱所乘用人參敗毒散
或檳榔敗毒散若漫腫作痛或不腫不痛屬脾虛濕熱下注補
中益氣湯氣血俱虛水火并稱湯若膿水淋瀉體倦少食內熱口乾

屬脾氣虛弱補中益氣加茯苓酒炒芍藥若午後頭目不清屬脾虛陰火用前湯加熟地芍藥若午後發熱倦怠屬氣虛血弱用前湯加川芎熟地若懷抱鬱怒屬脾氣不舒用歸脾湯加川芎山梔若內熱體倦瘀涎口瘡屬脾胃虛熱用六味丸若肢體畏寒飲食少思屬脾腎虛寒用八味丸太抵色赤屬濕熱易治色黯屬虛寒難治設誤用攻伐後傷胃氣多變療症

附治驗

一婦人兩乳生瘡漸至遍身發熱吐痰口燥咽乾盜汗心煩足熱小便亦澇日晡益甚此腎足三陰虛火也用加味逍遙散半味丸而愈

一婦人患崩症四畔微赤作痛重墜膿水淋漓脅脣不利飲食

少思內熱口苦夜間少寐此鬱結傷脾血也用歸脾湯鮮鬱結生
脾血用補中益氣加茯苓半夏補脾氣除濕熱尋愈

一婦人久不愈色赤微熱日晡煖脣形體虛弱飲食少思勞則
喘渴惡寒發熱此爲脾虛下陷用補中益氣湯而愈

一婦人患已二年色黯腫硬惡寒發熱飲食少思形體消瘦作
渴飲湯飲食稍多或腹脹或泄瀉或作嘔或作酸此脾氣虛寒
也用補中益氣加乾姜五分五十餘劑而愈

一婦人患此因步履勞復惡寒發熱倦怠懶食而瘡出血此元
氣虛而不能攝血歸經也用補中益氣湯而愈

一婦人患之因怒寒熱頭眩或耳項脹痛或小腹陰道悶
墜或小便頻數下血此屬肝火血熱先用小柴胡加炒黑山梔

芎歸草前二劑諸症悉退又用加味逍遙而愈後因飲食勞倦前症復作瘡口出血用補中益氣湯而安

一婦人患瘧兩肢厥腫赤痛小便頻數飲食如常此濕毒甚而氣血虛先用活命飲二劑去其濕毒又用八珍湯調補氣血愈一婦人患此痏痛惡寒發熱此濕熱乘於足三陽經分用檳榔敗毒散而寒熱退用仙方活命飲而痏痛止再用補中益氣湯而形氣健

附方藥

人參敗毒散 治瘡瘍痏痛寒熱或拘急頭痛

人參

羌活 独活 前胡

柴胡

桔梗

枳殼

茯苓

川芎

甘草
錢谷一

右水煎服

檳榔敗毒散即人參敗毒散加檳榔紫蘇
補中益氣湯 治元氣虛損或因剋伐惡寒發熱倦怠少食或

不能消散生前或兼飲食勞倦煩熱作渴

黃芪炒

人參

白术炒

甘草炙

當歸錢各一

陳皮五分

柴胡

升麻各三

右姜棗水煎空心午前服

烏沉湯 生氣血補心腎上瀉者服之其効勝大建中湯

人參

當歸

白术
炮去皮各二兩

烏藥

沉香各半兩

白茯苓

附子

炮去皮尖各二兩

肉桂去皮半兩

右爲末每服三錢姜棗水煎空心服

金鎖正元丹 治真氣不足四肢怠惰脚膝酸疼目暗耳鳴自

汗盜汗一切虛損之症

五倍子

兩

紫巴戟去心

四兩

補骨脂酒浸炒

二兩半

硃砂

七錢另研

肉蔻

兩

葫蘆巴炒

四兩

茯苓

去皮二兩

龍骨煅

一兩

白芍

四兩

右爲末酒糊丸桐子大每服二十丸空心溫酒或鹽湯下

平胃鎮心丹 治心血不足時或心忡驚悸夢如高歌常服安

心腎益榮衛

四兩

古硃砂

細研半兩

衣

五味子炒

半兩

人參

五錢

車前子炒

半兩

龍齒

五兩

白茯苓

五兩

茯神

五兩

麥門冬

五兩

天心

膏

肉桂各一兩

遠志

去心甘草製

天門冬

去心甘草製

山藥

製各一兩

酸棗仁

二錢半去皮尖

熟地黃

酒蒸五錢

右爲末蜜丸桐子大每服三十丸空心溫酒下。

威喜丸 治小便白濁

黃蟬

四兩

白茯苓

四兩一塊同蜜苓

一兩於

器皿內

下兩於

器皿內

右以茯苓爲末鎔蟬丸彈子大每服丁丸空心細嚼津液嚥下小便清利爲度忌食米醋

小柴胡湯

方見本卷第八論

加味逍遙散 八珍湯

歸脾湯

三方見本卷第四論

仙方活命飲

方見本卷第五論

六味丸

八味丸二方見本卷第十一論

(婦人足跟瘡腫方論第十二)

婦人足跟足指腫痛足心發熱者皆因胎產經行失於調攝虧損足三陰虛熱所致若腫痛或出腰用六味丸為主佐以八珍湯胃虛懶食佐以六君子湯寒熱內熱佐以逍遙散補熱益甚頭目不清佐以補中益氣湯痰盛作渴或口舌生瘡亦用前二藥以滋化源大凡發熱晡熱內熱自汗盜汗等症皆陰假熱也故丹溪謂火起九泉陰虛之極也蓋足跟乃督脈發源之所腎經所過之地若不求其屬而泛用寒涼則誤甚矣然俗謂為鬼齒瘡者蓋獵人被兔咬足跟久而不飲氣血滯盡其人必死男子酒色過度者多患此症

附治驗

一婦人素血虛因太勞兩足發熱晡熱月經過期或用四物芩連飲食少思曾痞吐痰用二陳枳實黃連大便不實吐痰無愛足跟作痛余曰足熱晡熱月經過期肝脾血虛也曾痞吐痰飲食少思脾胃氣虛也蓋胃爲五臟之根本胃氣一虛諸病悉至先用補中益氣加茯苓半夏脾胃漸健乃佐以六味丸補脾胃不兩月而痊

一婦人經候不調發熱晡熱胸膈不利飲食少思服清熱寬中消導之劑前症益甚更兼肢體酸痛服除濕化瘀等藥經候兩三月一至服通經降火之劑足跟足指作痛其熱如炙余以爲足三陰虧損用補中益氣六味地黃兩月諸症漸退又用前湯

井八珍湯兩月而康

一婦人足跟患腫兩腿酸軟或赤或白或痛或痒後或如無皮
或如破裂日晡至夜脹痛燉熟此屬足三陰虛損用加減八味
丸及逍遙散加熟地川芎百餘劑而愈

一婦人勞益氣則足跟熱痛余作陰血虛用八珍而痊後遍身搔痒
服風藥發熱抽搐肝脉洪數此肝家血虛火盛而生風以天竺
膽星爲丸用四物麥門五味芩連炙草山梔柴胡煎送而愈
一婦人兩足發熱足跟作痛日晡熱甚余謂腎肝血虛用逍遙
散六味丸五十餘劑諸症悉愈

一 故附方藥

當歸補血湯 治脾胃損傷或因服峻劑致血氣俱虛發渴引

飲目赤面紅晝夜不息其脉洪而虛重按全無若误服白屬
湯必死

黃芪

一枚一兩

當歸

二錢酒製

右水煎服

六味丸一名六味地黃丸此壯水制火之劑夫人之生以腎爲主人之病多由腎虛而致者此劣乃天一生水之劑無不可用若腎虛發熱作渴小便淋秘痰壅失音咳嗽吐血頭目眩暉眼花耳聾咽喉燥癟口舌瘡裂齒不堅腰腿痠軟五藏虧損自汗盜汗便血諸血凡肝經不足之症尤當用之蓋水能生木故也此水泛爲痰之聖藥血虛發熱之神劑又治肝腎精益不足虛熱不能起牀即八味丸去附子肉桂

八味丸 治命門火衰不能生土以致脾胃虛寒而患流注鶴膝等症不能消潰收斂或飲食少或食而不化或脅腹疼痛夜多旋溺經云益火之源以消陰翳即此方也

熟地黃自製八兩

山茱萸肉

山藥各四兩

茯苓

牡丹皮

澤瀉各三兩

肉桂

用三分厚者去皮取肉分許方能補腎引虛火歸源

附子

用一兩五錢重者切四塊用童便浸數日火煨切看無白星為度

右爲末蜜丸桐子大每服七八十九丸滾湯下

六君子湯方見本卷第六論

補中益氣湯方見本卷第十論

八珍湯

逍遙散二方見本卷第四論

婦人肺癰方論第十二

仍參外
利樞要

婦人肺癰因外邪內蘊或七情鬱火誤行汗下重亡津液以致肺氣受傷而惡風咳嗽鼻塞項強胃脹滿呼吸不利吐痰臭濁膿血腥穢若咳嗽喘急寒邪在表也小青龍湯咳嗽胃脹寒邪內壅也臺歷太囊瀉肺湯督脈咳唾腥臭膿已成也桔梗湯咳喘短氣或小便短少肺氣虛也佐以參芪補肺湯體倦少食或喘嗽短氣肺脾虛也佐以參术補脾湯作渴飲令午前嗽甚胃火盛也竹葉石膏湯作渴內熱午後嗽甚陰血虛也六味丸四物湯口乾飲湯體倦少食胃氣虛也補中益氣湯加五味麥門口乾內熱咳嗽痰涎腎水虛也六味丸益氣湯黃昏熟或嗽甚陰火熾也六味丸四物湯加五味麥門五更嗽或痰甚肺肺

虛也。六君子湯嗽而不得眠及兩脇痛，肝火血虛也。六味丸益氣湯，大凡前症因外溼所侵，當扶邪而實主。因心火太過，當伐木而補金。若肺氣虛弱，當補脾土而生肺金。若陰火上炎，當補脾肺以滋腎水。然而發熱喘嗽，咳唾膿血，飲食不入，皆脾土不能生肺金。肺金不能生腎水之敗症。苟能純補脾土而生諸藏，多有復生者。若用寒涼脾胃復傷，則肺經失養，腎水益涸，虛火上炎，薰蒸於肺，吾未見其能生之者。其唾膿血脉浮大，面色赤者，俱難治。若陰火妄動，或勞嗽吐膿血者，尤難治。若膿自止，脉浮短濶，及始崩者，易治。

附治驗

一婦人素血虛，發熱咳嗽，服痰火之劑後，吐膿血，面赤脈數。其

勢甚危此膜成而氣血虛也余用八珍湯補元氣桔梗湯治肺癰而愈

一婦人感冒風寒或用發表之劑反咳嗽喘急飲食少思曾膈不利大便不通右寸關脉浮數欲用躁通之劑余曰此因脾土虧損不能生肺金若更利之復耗津液必患肺癰矣不信仍利之虛症悉至後果吐膿余朝用益氣湯夕用桔梗湯各數劑吐膿漸止又朝仍用前湯夕用十全大補湯各五十劑喜其善調理獲愈

一婦人咳嗽吐痰胸膈作痛右寸關浮滑項下牽強此脾胃積熱之痰非癰癥也以二陳山梔白朮桔梗治之而痊一婦人素血虛內熱時咳里夜孟冬兩尺浮洪以脾胃不健請

治余曰當防患肺症丙午孟春果咳嗽左右寸脉洪數肺癰也
膿已成左寸脉仍洪數乃心火剋肺金夏令可憂余用壯水健
脾之劑稍愈彼遽自忽不事調攝果歿於夏令

附方藥

青龍湯 治肺經受風寒咳嗽喘急

半夏

湯泡

乾姜

細辛

麻黃去節

肉桂

芍藥

甘草

炙各一錢

五味子

附子

炮五分

右水煎服

葶藶大棗漏肺湯 治肺癰脅脇脹滿上氣喘急或身面浮腫
鼻塞，声重。用葶藶炒黃研末每服三錢先用棗十枚水煎去

棗入藥再煎食後服

桔梗湯 治肺癰咳而有膈隱痛兩肢腫滿咽乾口燥煩悶作

渴濁唾腥臭

桔梗炒

貝母去心

當歸酒拌

瓜蔞仁

枳殼麸炒

薏苡仁微炒

桑白皮炒

甘草煎

防已去皮各一錢

黃芪益水炒

百合蒸各一錢五分

五味子拌

甜荳麩炒

地骨皮

知母炒

杏仁各五分

右姜水煎服

人參補肺湯 治肺癰腎水不足虛火上炎咳嗽唾膿血發熱作

渴小便不調

人參

黃芪炒

白朮

茯苓

滋正公
白朮一

陳皮

當歸各一

山茱萸去核二

山藥各二

五味子杵

麥門冬

甘草炙去核各七分

熟地黃自製一錢五分

右姜水煎服

參芪補脾湯

治肺症因脾氣虛弱，咳唾，膿涎，中滿不食，宜兼

服此藥以補脾土生肺金。

人參

白朮各一錢

黃芪炙二錢

茯苓

當歸

陳皮各一錢

升麻三錢

五味子四分

炙甘草五分

右姜水煎服

人參平肺散

治心火剋肺，金惠肺痿，咳嗽喘促，痰涎壅盛，胸

膈痞滿咽嗌不利

人参

青皮

茯苓

天門冬

陳皮

各一錢

地骨皮

一錢

甘草

五分

知母

五味子

十粒

桑白皮

一錢炒

右薑水煎服

竹葉石膏湯 治胃火盛而作渴者

淡竹葉

石膏

煅

桔梗

炒

木通

薄荷

甘草

各一錢

右姜水煎服

竹葉黃芩湯 治癰疽氣血虛，胃火盛而作渴

淡竹葉

二錢

黃芩

炒

麥門冬

去心

當歸

川芎

甘草

炒

黃芩

炒

芍藥

炒

人參

半夏

石膏 煅 生地黃 鐘一

右水煎服

二陳湯 方見本卷第五論

六味丸 方見本卷第十一論

補中益氣湯 方見本卷第十論

四物湯 六君子湯 二方見本卷第六論

十全大補湯 八珍湯 二方見本卷第四論

婦人腸癰方論第十三

婦人腸癰因經行產後瘀血或七情飲食所致其症小便如淋發熱惡風身皮甲錯腹皮腫急按之軟如腫狀或腹脹大轉側有水聲或繞脅生瘡或大便出膿其脈遲緊者膿未成用活命

飲以解其毒，脈滑數者，膿已成。用雲母膏以下其膿。若二年間遍身微腫，太脇與臍出膿，此息積之症也。多致不救。內經云：腸癰爲病，不可驚驚。則腸斷而死。其坐卧轉側宜徐緩，時嘗少飲薄粥，靜養調理，庶可保生。

附治驗

一婦人小腹腫痛，小便如淋，此毒結於內，用神効瓜萎散二劑，少愈。又薏苡仁湯二劑，乃痊。

一婦人小腹痛，而有塊，脉芤而濇，此瘀血爲患。以四物加玄胡索紅花桃仁牛膝木香三劑，血下而愈。

一婦人小腹脹痛，大便秘滯，轉側有水聲，脈洪數，以梅仁湯二劑，頓下諸血，諸症頓退。以薏苡仁湯二劑，而瘥。

一婦人小腹脹痛小便不利脈滑數此膿已成也服太乙膏五錢膿下甚多脹痛頓退以瓜萎散蠟攀丸托裏藥而安

一婦人因經水多服藥止之致腹作痛以失笑散二服而瘳又用加味逍遙散數劑而經調

一產婦惡露停滯小腹作痛服瓜仁湯下瘀血而痊凡瘀血停滯急宜行之緩則腐化爲膿最爲難治若流注關節則患骨疽多爲敗症

附方藥

瓜子仁湯 治產後惡露未盡經行瘀血停滯小腹作痛或成癰塊

薏苡仁四兩

桃仁尖去皮一錢

牡丹皮一錢

瓜蔞仁各一錢

右每服五七錢水煎

敗醬散

治腹數身無熱腹無積聚按之軟濡此爲腸癰久積

陰瘻所成

薏苡仁二兩

附子炮半

敗醬草一兩三錢五分

右每服四錢水煎以小便利爲度

牡丹湯

治腸癰腹軟而痛時下膿血

牡丹皮

人參

天麻

白茯苓

黃芪炒

薏苡仁

桃仁去皮

白芷

當歸酒炒

川芎各一錢

官桂

甘草炙各五分

木香三分

右水煎服

大黃湯 治腸癰小腹堅腫按之則痛肉色如故或微赤微腫
小便頻數汗出憎寒脈遲緊未成穗者宜服之

大黃炒

朴硝各一錢

牡丹皮一兩

瓜蔞仁炒

桃仁去皮尖各二錢

右水煎服

梅仁湯 治腸癰壅痛大使秘澁

梅仁九箇去皮尖

大黃炒

牡丹皮一兩

芒硝各一錢

冬瓜仁研三錢

犀角镑末一錢

右水煎入犀角末服

神仙太乙膏 治一切癰疽不問膿之成否並宜貼之更作眼

玄參

白芷

當歸

肉桂

大黃

赤芍藥

生地黃各一
兩

淨黃丹十三
兩

右用麻油二斤入銅鍋內煎黑濾去粗入黃丹十二兩再煎
滴水中捻軟硬得中即成膏矣如軟太更加丹雲母膏固效至
難修合大之膏亦可

神効蓄礬丸 最解毒止痛

白礬

未一兩
明亮者

黃蠟半兩

黃色者熔
開一方用七錢

右和衆手丸桐子大每服三十丸滚湯下如服金石發疽更
用白礬末一兩作三五服以溫酒調下若遍身生瘡如蛇頭
服之尤効此藥能解毒氣內攻也須多服方驗亦治蛇咬瘡
化乘熟滴傷處毒即出痛即止仍服兩許

失笑散 治產後心腹絃痛或血迷心竅不知人事及尋常腹
內瘀血積血作痛

五靈脂去砂土炒

蒲黃炒各等分

右爲末每服一二錢溫酒調

活命飲方見本卷第五論

神効瓜蔞散方見本卷第廿四論

四物湯方見本卷第六論

加味逍遙散方見本卷第四論

乳癰乳巖方論第十四

經云乳頭屬足厥陰肝經乳房屬足陽明胃經若乳房忽壅腫
痛結核色赤數日之外微痛脹滿稍脹湧出膿盡而愈此屬膽

胃熱毒氣益壅滯名曰乳癰爲易治若初起內結小核或如鈿棋子不赤不痛積之歲月漸大處巖崩破如熟榴或內潰深洞血水滴瀝此屬肝脾鬱怒氣血虧損名曰乳巖為難療治法焮痛寒熱宜發表散邪腫熾痛甚宜疎肺清胃或不作膿暖成不潰宜用托裏或肌肉不生膿水清稀宜補脾胃或膿出又痛惡寒發熱宜補氣血或腹熾作痛肺熱內熱宜補陰血或飲食少思時作嘔吐宜補胃氣或飲食難化泄瀉腹痛宜補脾氣或旁碌腫痛宜補氣血怒氣痛腫宜養肝血慎不可用荆伐之劑復傷脾胃也乳巖初患用益氣養榮湯加味逍遙加味歸脾可以內消若用行氣破血之劑則速其亡

附治驗

一婦人內熱，脇脹，兩乳不時作痛，口內不時辛辣苦臥，而起急
則脣下牽痛，此帶脉爲患也。用小柴胡加青皮黃連山梔二劑而差。

一婦人因怒兩乳腫，兼頭痛寒熱，此肝經氣雍也。用入參敗毒
散二劑，表症已退，用小柴胡加芍、歸枳殼桔梗四劑而愈。

一婦人久鬱，右乳內腫硬，此肝經血症也。用八珍加遠志貝母

柴胡青皮及隔蒜灸，兼神効，瓜萎散兩月餘而痊。

一婦人先熱渴至夜尤甚，後兩乳忽腫，肝脉洪數，乃熱入血分，
用加味小柴胡湯而愈。

一婦人因怒，左乳作痛，發熱，因表散太過，腫熱殊甚，用益氣養
榮數劑，熱止，膿成，因不即針，益腫脹熱渴，針之膿大泄，仍服前

湯月餘而愈

一婦人因怒左乳作痛胃陽不利此屬肝脾氣滯以方肺流氣
飲加木香青皮四劑而安

一婦人腹清腫硬面黃少食內熱晡熱自汗盜汗月經不行此
肝脾氣血俱虛也用十全大補加遠志貝母及補中益氣各三
十餘劑外用葱熨法而消

一婦人腹成脹痛余欲針之不從至數日針出敗膿三四碗許
虛症蜂起幾至危殆用太補之劑兩月餘而愈

一婦人素弱多癰患積疫後脾胃愈虛飲食愈少因怒右乳脴
紅腫應內作痛或用炒熟皮熨之內痛甚甚服加減四物湯腫
勢愈大胸脇背心相引而痛余謂病後脾弱怒復傷所用八珍

加陳皮黃芩柴胡山梔白芷少劑稍愈去白芷加青皮木香桔梗又六劑而安

一婦人左乳內腫如桃不痛不赤發熱漸瘦此肝脾鬱怒也用八珍加香附遠志青皮柴胡百餘劑又兼補効水裏散三十餘劑膿潰而愈

一婦人久篤左乳內結核如杏二月不消心脈濇脾脉大按之無力此肝脾氣益虧損以八珍加貝母遠志香附柴胡青皮桔梗五十餘劑而消

一婦人稟實性躁懷抱久篤左乳內結二核按之微痛此皆氣血鬱滯以連翹飲十餘劑少退更以八珍加青皮香附桔梗貝母二十餘劑而消已上皆乳癰

一婦人右乳內結三核年餘不消朝寒暮熱飲食不甘此肝脾氣血虧損內服益氣養榮湯外以木香餅熨之年餘血氣復消一婦人乳內結核年餘晡熱少食余謂此血氣不足欲用益氣養榮湯彼又服用氣之劑潰出清膿而歿又一婦乳內結核如粟亦服前藥大如覆碗堅硬如石出血水而歿已上皆乳巣

附方藥

神妙瓜蔓散 治乳癰及一切癰疽初起腫痛即消膿成即潰
膿出即愈

瓜蔓爛研

生粉草

當歸酒洗各半兩

乳香

沒藥錢一

右用酒煎服良久再服若肝經血虛結核久而不消佐以四

物柴胡升麻白朮芩苓甘草若肝脾氣血虛弱佐以四君等
歸柴胡升麻若憂鬱傷脾氣血虧損佐以歸脾湯
玉露散 治產後乳脈不行或身體壯熱頭目昏痛大便澀滑
等症

人參

白茯苓

桔梗炒

川芎

白芷

當歸

芍藥錢

甘草五分

右水煎服

灸眉尖肘尖二穴圖

即肩髃肘膠

此穴治癆瘻之秘法蓋癆瘻屬肝膽二經故遺耳前後項脰
之間男子多因恚怒虧損肝經之血陰火內作或不慎起居
耗損腎水不能生肝血婦女多因恚怒傷肝久動血燥或聲

結傷脾火動血耗或患於胸乳間亦屬於前經此症若因恚怒傷肝氣血壅遏而不愈者宜灸此穴疏通經絡若因久於鬱怒元氣虧損而不愈當推其下而調補化源如取其穴當以指甲掐兩肘兩肩四所患處覺酸麻方是其穴

男子治驗見外

科樞要婦人見於註婦人良方小兒見保嬰粹要

門入俞應竹

姪勉學

扈劄賢

吳大賓

義烏朱用中

黃楠校正



太醫院校註婦人良方大全卷之二十四

寢永十三子中妻
大和田意閑

