

泰西名醫彙講

八

七  
六



泰西名醫彙講卷之八

美作 箕作 度儒庠西氏 纂述

水魯別耳遜氏莫耳費涅鹽、鹽酸莫耳費涅功能畧抄  
穆漢合著醫科時文會編第十二年部第四冊所載一千八百三十一年刊此篇係穆漢二家畧抄  
大凡神異瓊奇之藥方將始見知於世之時本分功能未悉呈露性內尚有驕駭之處功害相半瑕瑜遞存則其藥之名價或為之不興其為不幸孰甚焉嘗歷試醋酸莫耳費涅其性雖固抱瓊奇之質然善發頭痛舌褐胎睡寐失

常瑕瑜不能相掩而鴉片製劑約莫不皆然也然而此毒  
害之能固性內所固有之一元兮非製煉鹵莽外物雜糅  
以致之而其藥之尚未為世人所遍喜蓋職此之由也在  
昔瑪耳古傑伊竭爾二人名輓近呂毘結多皆謂依常法製  
者嘗試之性內猶舍那耳格質涅矣此兮製煉間善攬入  
鹽質然至今舍密家皆特厲精於祛其色兮取雪白鹽晶  
不盡心於除那耳格質涅之法近來嘗試乃云那耳格質  
涅未必太害於人雖然其性內苟挾此元則本藥效能為  
之萎蘭弗振頽敗不完而此元恣毒害之能於內也的矣  
且醋酸莫耳費涅其製固尚有欠精微處凡乾之者上火

炮炒、炮炒間、大量酸素、既闖入其質內、又此藥喜引大氣之濕、增本量之重、而減天性之能、若開水乃消然其舍本能之分、則頑然無融化也、若夫硫酸莫耳費涅亦其根分未免雜駁、黠而禮嘗試百爾列質<sup>ヒルチ</sup>所製硫酸莫耳費涅、闡發其性、內有不純粹之處、而云此藥善發頭痛、或生渴不食、便秘、猶鴉序、又善起惡心、嘔吐、或二三日後發此証方夜投之、明朝聲嘎、藥氣染脬、小便癃閉、其驂駁莫耳費涅及那耳格質涅皆克毒脬閉尿、而至鹽酸莫耳費涅、未曾見此害也、魯氏已有觀于此、述日用參研、所得以著一要說、而主張鹽酸莫耳費涅、其用法取鹽五氏、開亞爾

箇兜一分水三分之成液內其液二十五滴含鹽四分氏  
黎思東曰鹽酸莫耳費涅最易內服非餘鴉片劑所及善  
止疼打睡降氣一如鴉片行之前後不發微惡訟夢不驚  
鼈睡寐不熱狀不鼾息不覺戰惕及明朝莫發頭痛開鑑  
水點眼治眼疼甚為摩膏擦患處善止疼痛麻括粟多兜  
曰鹽酸莫耳費涅之效比舍電阿芙蓉液里究屋爾設達  
質扶斯援德利製劑殊優善治產後腹痛崩漏弟思默乃  
爾麗病名未詳與之三十滴為限若續加之漸增其量未曾有  
害其性微打睡大降鎮但其打睡亦比醋硫二酸者殊佳  
行之後半時身心安舒頃之乃睡寐覺後莫有體氣不流

利胸中憤悶、心思鬱重之患。雖秘大便、不閉小便，嘗試用之六月而發頭痛止。二人一病人神經性頭痛久憤服舍電阿芙蓉液後行鹽酸莫耳費涅水不少驗竟止。小兒不使內服之亦不使外用。格列刺淳利丹尼加與格列刺把斯水實加質加也。皆未詳其証酷肖行此藥大驗。余云每與後方。

鹽酸莫耳費涅水 一方 格倫朴丁幾 一方  
桂水 五分

右調勻每服三四七、善治上討又精神病亦效。麻建悉曰：鹽酸莫耳費涅降鎮效尤峻、發汗則伍乙百葛格屢試

屢效、黏液下利、伍苦味越幾分、婉後投之、最善降氣、勞瘵病、一、行此味大寬暢、乃至死期、不甚困惱、其吐咯如故、不被微害、止其困劇、頻發咳嗽、廻獨減殺、廿四時與此味分、分、一、至半斤、未有至四分斤之三以上者、思骨多日、霍亂大泄瀉、此藥應效、熱病、季程與之打睡、勞瘵、取十滴至二十滴分服、佳效、一人病頰痛、誤賴服此藥一勺半、初則心神昏沈、次之頭痛嘔吐不止、十八時頰痛全除、據以上諸家所論、商榷之、鹽酸莫耳費涅特為鴉片劑中之最、其功能、則尤善止痛、微打睡、且以製煉得宜、多治諸病、性少衝動、大降鎮、故熱病宜禁、騎駿鴉片者、與之無害、魯氏曰、試

之諸病多良效老人久感冒咳嗽行之不發過大熱樣管  
惕取化水六滴至十滴和海葱醋與服若配乙百葛格為  
餅子與之和氣管感惕促役吐略大泄瀉宜與中等分量  
飲食難化與少許大扶胃機令其人可耐規尼涅早朝服  
之日間不生睡寐能寧心思靜念慮故刻苦使心之人痴  
迷為鄣思慮不能精微行之澄清心神志氣浮躁欲妄顯  
達心中無定見者取四分匕至半匕加葛布悉鳩摩安意  
思抑妄念欲令其藥必效其人宜服之前後一時間禁一切  
飲食已服之時時服酸液至藥力大發而止此藥絕苦  
然調香竄舍利別即為所掩盡常水一勺半能匱中等分

量廿五之苦味為膏外用妙治痔核疼痛開鑿水燙潰瘍

滴

止疼痛點眼治諸眼疾疼痛若服大量中毒頻行蒲桃酒  
強壯藥吐納清新太氣涌胃內宿物後令平卧床上若吐  
後宿毒未除與下劑大率如是可了全局者多此藥宜配  
伍後藥大氣之緩未升華氏九十度之時候宜合炭酸麻  
倔涅失亞又密吉思黠刺舍列答設亞安質沒紐酒一切  
不孕諸沒尼亞丁幾幾種中和鹽亦皆宜配合若合剥薦  
亞斯曹達諸沒尼亞諸沒尼亞的炭酸諸劑泡沒食子石  
灰水鹿角煅麻倔涅失亞乃溶解粵鄧勃爾鹹人淳坎氏  
水開方先用水少許化開之濾過後加餘水及亞爾箇兜

其餅子、則四十斤內舍一斤、

醋酸莫耳費涅治久下利經驗

同上、第十五年部、第五卷所載、一千八百三十

六年

傑句華句利屈的兒

微斯拔  
匈醫人

和蘭土一商客之子、十七歲、天稟虛乏、面色蒼白、為兒、父  
母保護備至、以故除重痘外、未嘗有病、迨其十四歲、偶因  
飲食失節、得日發熱、亡幾而愈、獨泄瀉一證、歷二十年不愈、  
百治無效、其父素病痛風、來浴此土、溫泉、因謂孺子亦得  
風土變化、必將利於宿痾矣、乃携而俱來、既而請余診施

云望其容貌羸瘦骨立顏色㿠白身材比年齒頑長瘧家  
景況盡具加之心思鬱悶殊不爽快其脉朝則僅六十動  
按一今時之間小而弱輕輕按之亦絕夕則頗數其數八十動而  
緊氣息無所障礙然微動身即便短氣汗出一身疲倦食  
氣如平舌淨潔小便澀濁色澹白大便夜半即利二三行  
若四五行清稀鮮黃混許多黏物先將泄瀉必口燥舌渴  
頭熱而寤便自引枕頭扁桃酪以潤燥渴率以為常仰卧  
候腹每區皆軟重按無痛以肚肉虛瘦故臟腑歷歷應手  
因知其諸臟皆莫有受病的變化矣其父話曰加密列浴  
麥芽浴摩方羌菁膏健胃膏皆既試之諸家所處忌口亦

敬而遵從矣、因取方簿一冊示余、今以其冗雜、故無載云。  
余窺意、如彼所言、切當大法、既已盡行之矣、今則據賢塗  
而麻質斯法、用醋酸莫耳費涅外、無他技倆也、及明日遂  
行之、如下法、先近心窩、帖羌青膏可設屈斯結、樓揭兜大  
天約儒別爾質之大、按錢貨名當二斯多ヒル以打其泡、剪脩泡皮  
摻醋酸莫耳費涅細末四分氏、取連錢草葉覆其上、更用  
布片按定、以膠膚膏帖固之、令病人伏床內、一二時藥氣  
徑發、覺其部如火、頃之即止、無復他異、病人起而旋着衣  
仍在家靜養、夜半泄瀉三行、次日診之、創處甚紅、然四沿  
不焮衝略、疼痛、膿液布敷、乃洗去其膿、摻醋酸莫耳費涅

半日封固如昨、病人早已發、昨日證、霎間乃止、此夜泄瀉二行、前此惡心胸悶欲吐、口渴甚於常日、服扁桃酪即消、又不復吐、第三日、剥脫處結膿更多、餘證如前行前藥四分丸之三封之、如故、創面扒痒如火者、比昨日更甚、二時餘始止、渾身汗出、酣眠四時已寤、身心爽快、其夜蒸氣大宣洩、至十二時按此方子時、大便一行、微渴、頭稍困頓、夢魘驚覺二三次、第四日、皮脫處至赤、指微觸之甚痛、結膿夥於昨日、調醋酸莫耳費涅一氏於蠟膏帖上、扎縛如常法、創面如火、渾身汗出、就眠二三時、其夜皮氣蒸蒸發越、頭困頓、但其渴甚微、大便不復泄瀉、每日方畫輒通一行、狀如琶

布不混黏物後六日間續行莫耳費涅如上法而後止藥  
病人仍留此地三週厲食禁不妄飲食體氣增蘇心思和  
平怡悅上途

本草綱目卷之二十一

頓嗽試醋酸莫耳費涅摻法鈔

同上第十二年部第四卷所載一千八百三十四年刊○本章

傑麗弗思話而土醫事憲官大學師弗向傑向別崙獨多  
係二氏所抄

述依賢塗而麻質斯法用醋酸莫耳費涅以治頓嗽之經  
驗十六證其病人則自一二歲至七八歲之小兒而其藥  
每應兒齡乘除自四分氏半氏乃至一丘一丘半調和阿

辣比護摩末、若漿粉三四升、先打泡於腹正中距臍上二指許之地、達而塗兒來大隔日擦上藥末、或每日行亦可、至述藥之驗否則云、十六證內、其六名發中蒙汗毒之證、而克治頓嗽之能、乃明白可指、其餘十名、即發毒而不至麻醉、就裡四人、則其證比初甚輕快、然未能至一掃症性之嗽、而其六人、竟無少效也、由是觀之、藥氣大盛、直至發蒙汗之證、則克制頓嗽本有症性、盡芟夷之、可知也、然此治法本甚猛烈、一誤其法、易致危篤、故醫家不可妄投慢用、以災無辜也、但中蒙汗毒者、太率解其證、亦不甚難、而多不至遺他害也、雖然鑒識病性、易欠精覈、而病人天稟、

每不能同、則豈能保其皆如是哉、故行此法者、宜每謹慎  
行之為要、若夫至幼稚之兒、或其變起於不測、屏之不施  
用可、

硫酸莫耳費涅治目疾

同上第十二年部第五卷一千八百三十三年刊○此章二譯

氏自別華連獨

氏日記中鈔錄

喫咭唎龍動府醫人禮某曰、結膜暫性焮衝取硫酸莫耳  
費涅二氏、開水一弓內、臨用微溫點入、即效、

久吐下經驗

同上第十四年部第三卷、  
一千八百三十五年刊

于句越古

エツク

別

ルル

印

大學師

○長州醫

員田原綱尚卿通稱玄周譯

列應蘭土人名字姓思

ス

唯書名姓上一字其下畧不

載是彼邦畧書名姓之法

上一字其下畧不

年庚

二十一年歲體格嬌嫩自縷述病狀曰幼有腹疾大便泄利

若不慎飲食或餐生菓服新酒即大泄瀉勢極暴卒常時

乃胸膈頓但家世富贍是以得竟歲優遊養疴於家以不

沾大患既而祇役此土

按斥別

未幾宿疾加劇一千八百

三十二年十一月迨十二月更大發胸部諸患遂入病院

一二週明年一月起就職及其三十日又得上腹疼痛

水瀉因復歸於刺薩

サト

列多

按驗查疫

住四月餘云其證故

水瀉日四五行心下刺痛今次則無嗽咳短氣胸病水瀉

少減、短氣大作、舌白胎食機乏弱、身熱、皮膚却冷、脉纔與  
秒鐵應、諸證並竟、竟二月不治、生力大沈頓、乃行易化肉  
食際、施浴湯加小量硝沙若挖歇兒散於泡接骨水花或  
泡加密列花、以催督皮腠機運、行血角法於上腹、服果酪  
內點老利兒結爾斯水若化馬錢越幾、以和心下、多覺感  
惕、與小量大黃格倫朴、強固之、黏滑煎內點海鹽酸摩鎮  
瘡膏於心下、或打心下泡、皆不能一變其病況、或一日大  
便鞭、若為糊狀、食機畧蘇、明日乃又泄濁、痞脹疼痛又生、  
終即惡一切飲食、不復入口、如是病況不變、延至三月後、  
與海鹽酸點半勺、於遏爾託煎六勺內、一連八日、水濁畧

Bi(NB)

有節下肢更劇痛際適得熱樣景況其脉一寸時百動頭困重眩瞀胸骨下刺痛心下痞悶心動悸乃刺絡放血行泡實芟荅里斯半弓脉質動惕即安反得一嘔吐證其水瀉時劇時易心下憤悶又不愈殆二月許生力增罷極於是緩和劑強有力藥滾沸散按服硬氣止嘔吐法消酸蒼鉛按製法見舍密畧不載又菲阿舍密失鳩荅伍加羅默兒大黃少許老利兒結爾斯馬錢茛菪鴉片等鎮痙蒙汗諸藥外用則浴法阿魏浣腸心下打泡吐酒石摩膏心下艾灼陸續舉行皆不奏寸效嘔吐雖時止少焉復作病人日唯飲浙耳的兒水按含蓄炭酸加乳水幾盞其他一切飲食入口即吐却曹達之泉名

一身衰厄、不復能起立、纔得展轉床內而已。四月廿八日、以芫菁膏打兩膊泡、剪去膚皮、研和乳糖二三匙於醋酸莫耳費涅四分氏、摻上其部、嘔吐頓消、如有神助。然日行半法食氣始甦、初啜稀糜粥、漸進稠而軟者、皆不吐。但動風品件、白麥酒、以曾服之便吐、不可不禁也。既而大便有次序、一日一行、其狀如糊、生力日旺、及五月下浣、天日開朗、乃逍遙戶外、續行此法、身機快暢、大患痊可、但守忌口、避窄衣箱心下者、猶稍存舊患痕跡而已。至六月辭返故土、今記病誌方藥、而不論及水瀉、嘔吐為何原繇、然此記事、已足徵其性能不凡、非他藥之所及、而連別耳。多氏亦

載其治久吐功績則不必須呶呶議論也

蘇多麗格尼涅摻法發毒記同上○亦係田原尚卿所譯

傑句華句利屈的兒見上

病人行蘇多麗格尼涅彪刺、消酸蘇多麗格尼涅摻法、偶中其毒、毒勢猖獗、不可控制者、摻上醋酸莫耳費涅、救急解毒、應效如神、連別耳多列叟、兒二家已驗之於前、余亦繼其記於後、如下款、經驗一則、安危解急其功鴻鉅而迅疾、故今援舉之於此、亦恐非閑事、業乎和蘭土之人、名尋姓木、齡三十九歲、體資薄弱、感動頽敏、賦稟神經質、然平

素康寧無所病、迨三十四歲得右身麻痺不遂云、病人自述、年甫十二給仕和蘭一商家、徃喫咭唎八回、徃公斯璫知諾法兒二回、陟嶮嶼嘗艱難、勞碌備至、每引穠烈飲液以遣疲倦、意今病恐原於此矣、而後得輕微僂麻質斯歷一年餘不治、既而發卒中、未幾亦愈、終成今證矣、二年以來、鑿治百端除的切內藥外、又頗帖羌菁膏施打膿、前爾質加丁按以草麻鞭部位越力機艾灼等外用方法、皆無少驗、及歲杪病增加劇、或慾思來浴此地泉水、連浴二夏、亦不見寸效、因詢余治、於是決意行消酸蘇多麗格尼涅摻法、取羌菁膏二十箇、不下悉結爾林僊按錢許大其六點右膝

內側中央、又其一貼右脰內面中央、次日開其泡、洩去蓄液、剪修膚皮、而摻上藥末、如次款之法、初日取藥末八分、大、摻上、上下肢皮脫處、用油布片罨過、以膠膚膏帖固之、次日取四分、止、摻脰創上、脇創以油布片紮過而已、第、三日單扎脰創、止行半尺、於脇創上、脰脇番替、每日摻上、每摻增加其量四分之一、迨已增至一尺半、後件為郭、遂停不復行、行此藥際有局汎、二候、其局發則及行四分、大、初見其候如左、皮脫處甚赤、稍焮衝、不堪抓痒、覺四沿如鍼刺、及加至太量、此知覺延遍滿右手足、及一身抽掣、乃止、摻上際、病人輒覺疼痛如燒、日前日所用艾灼、比今

疼猶輕數等其皮脫處少有膿氣其汎發之候則身煖增  
加、溺大利、脉快疾、得麻痺之右半身抽掣終乃發似卒中  
之證等、迨加其分量至半尺、摻處不復刺痛、行藥後二時  
許、右手足輒抽掣漸加其量、抽掣隨劇、夜則其證最頻發、  
勢極劇烈、睡寐為之屢驚醒、朝則病健、四肢皆大強直、難  
動轉、既而次第消散、至宵盡解、其將發抽掣證也、摻上後  
一時許、身煖先亢盛、始自摻處漸遍滿渾身、渾身汗出、終  
乃發抽掣、皮機增、則脉亦太數緊實、或右頭偏痛、及汗出  
乃解去、消化力、腸泄德、食氣雖行此法、不蒙些害、脬泄德  
愈加、溺多利、色透明淡白、更加其量、至一尺半、險逆諸證、

卒然蜂起矣其抽掣之來早於常時幾刻先始於摻藥之足漸而加劇後頭疼痛如錐鑽眩瞀耳鳴今則抽掣不局一部延及右臂終連無病之左手足眩瞀頭痛增甚心識冒昧哮喘氣息艱難於是延余余一見大駭險逆之狀矣上證外其脉緊實徐而結代面紫赤脰大血大窘迫頭腦瞳仁散大目顆突起口唇不收四肢抽掣氣息喘鳴輾轉床內不暫自安余見其危急已極先解去向摻藥之足之紫赤其全脚紫色如腦癱所發之證余一見又大錯愕視其皮脫處創面焮赤乃淨拭其尚未被翕入盡之蘇多麗格尼涅以微溫湯濕洗創上依連別而多法摻醋酸莫耳

費涅末二氏於其本處此藥本預貯以行矣又令侍者冷  
水澆面毛彗劄足蹠兼行他外用衝動方摻莫耳費涅纔  
了一切危急諸證頓一掃其神速雖曰一瞬頃可也上藥  
解毒之效已如是迅速幾乎不可思議而今欲證所以然  
之狀則不可不細寫其病證以備考證也其四肢抽掣劇  
者乃微顏腴大減面色如故脉寬暢搏動有紋喘鳴消氣  
息流利心識惺惺乃向余話曰今止覺一身倦怠四肢太強  
已寤心識惺惺乃向余話曰今止覺一身倦怠四肢太強  
真而從前所發險逆之病茫乎莫記認矣其夜美睡翌日  
體氣佳好又話曰昨日將失氣前自覺後頭疼前所載後

頭疼痛云云即是眩瞀耳鳴及後遂失氣無所知矣續用此大勇猛治法際手足舉動比前安易日拄杖逍遙於外其手故不過得舉之齊肩今則能屈及肩口吃故不能言今則了了可聽其舌故控掣向右今則能正出於口麻痺部位覺如蟲行皮中者盡除溫煖如平居八日諸景況增入佳境此日得家書以事故切迫急促之返本國以是忽遽發程不能終其試

馬錢華爾斯

弗句麻元實

佛蘭西國把理

斯府解剖究理、病理、三科

大學師王國大學會士著作

一書名新藥

修煉效用說亞謨斯的爾戰藥局勃吉思譯亞謨斯  
的爾覃大學校內科大學士弗漢娃兒武烈乾附錄  
一千八百二十二年再板○友人攝津川本幸民藏  
此書寫本一卷又自譯其全篇藏篋底而余不始知  
有此舉也別依黑川良安所藏寫本起譯稿畧成適  
聞幸民氏有此譯乃亦借閱一過校訂是非改竄數  
效其賜亦不少也今不欲攘其功而沒其勞因附一言于此

余承之佛蘭西國醫大學師一千八百九年著一書以述  
試驗間所發明以判一要義而云凡植物中名苦味蘇多  
麗格乃斯之一宗類其性稟大奮興脊髓不直犯頭惱又  
不惹餘累之殊能而其末段乃云蓋此判日用際鴻益治  
療必矣

〔自注〕困重之疾巢穴脊髓亦夥矣此固人人之所熟知

也、苟有以能發明有藥物稟專治脊髓病之效能者、則醫道之天偉孰大焉。若夫烏把斯、未可互市齋載以供使用、假使鑒識其為特拔、一英物、其將何術以致諸、我乎、既莫術致之、則勉行新試、募求專效脊髓、克肖夫烏把斯之藥味而已矣。余與黎耳列考覈馬錢及花跋、聖多、伊倔那質烏斯、發明其性能、因詳確馬錢華爾斯之可供醫藥以專治脊髓病云、詳見余著書可就見焉。此說在當時唯述所見崖畧、然未及試之、事實居數年、歷試數十証、而後信前見之果不謬也。醫師福烏屈依兒、嘗治麻痺病數十人、紀其效驗以刊行、此時余方草馬錢說。

而未始知福

丙

先生之為此試驗

而收全效也

今則其說已

甲

布於世矣

乙

於是余大怡

丙

衆人景仰

丁

大家而先得我心也

戊

雖福先生然已

己

有此舉而余亦有不可以自己者也

庚

今試馬

錢亞爾

ル

箇兒越幾

エツキ

勿論汎局麻痺不仁

ハ

又善制克機性器

ハ

汎局衰弱諸證而先生未道及之則此書恐有小補焉

辛

汎局衰弱諸證

而先生未道及之

則此書恐有小補焉

壬

采局衰弱諸證而先生未道及之則此書恐有小補焉

癸

(製法)

取馬錢末量宜用四十度亞爾箇兒再三泡引

藥氣至氣味盡罄上文火煎為膏或用亞爾箇兒不甚濃

烈者但其性能不太駭

(再製製法)

取上方亞爾箇兒越幾用三十六度亞爾

箇兒製者以水化開瀝過內陶器上火煎為膏如幾那硬

越幾

性能

取亞爾箇兜越幾一氏、納木狗身中、若和食喂

之、狗發破傷風之狀、其証次第峻重、氣息困惱、至昏憤、脉

絕卒斃、試觸狗身、即震、猶遭迅烈、工レキル越力機之震擊、若再三

觸之、每觸輒震如初、若止、下斷脊髓連後腦處、若斫斷其頭

莖、而其証猶不止、或至二三時之久、此蘇多麗格乃斯、一

宗植物之亞爾箇兜越幾之所以異、從來所有衝動諸藥

之一性能也、死後剖而驗之、未曾認得有其身一毫傷損、

而足為駐其証於身之原繇者也、

亞爾箇兜越幾毒平人

平人中其毒、與狗無異、若投

大量即死、開剖視之、無他傷損、但見昏憒脉絕之徵、嘗見一女人中此毒以死、其徵儼存。

〔病人服亞爾箇兜越幾〕 痘麻痺之人服之、中毒之狀如上章、但藥氣大、中麻木地方、其部時震動、皮膚抓癢、此藥氣方盛也、及終局處汗出、偏枯人服馬錢亞爾箇兜越幾、病平二部各異其狀、其康平部位、則自若無變、止方疾病部位、發熾劇運動、痘樣震動、頻頻續興、自汗淋漓而出、嘗見一女人偏枯之部、發一異疹、而康平之部、毫無此訖、舌亦左右異候、一畔味苦、一畔如平、若加分量、左右身痙攣之狀不等、至其甚、病人為之所投床外、此其尤劇者也、

若小量行之、不甚驗、同餘藥數日後功害始見。

主治

汎局一切虛弱病、汎局麻痺、此藥主之、越獨活爾兜バカラ、用之治灰翳兼上瞼麻痺、余則與陰具虛弱、小便失禁者、收大效、又投馬錢華爾斯治胃弱消化機不利、及身體虛症、動作怠惰、

分量

用法 欲用亞爾箇兜アーリー・カーパー、越幾至藥氣洋溢、其人

惕然震動、用丸子最好、每一丸為一丸、初與一二丸、每日加其量至得所、期藥驗止、後服一二日、以防意外急變、其丸子、方夜服之最好、所以然者、夜則萬物寧靜、最便查點藥效應否故也、若欲至發角弓反張證、宜加分量至廿四

凡若三十氏、但四氏至六氏為平穩。若有事止藥一二日。  
宜更始從小量漸加至大量。若欲其徐效、每日行一氏、若  
一氏半、正好。

馬錢丁幾

三十六度亞爾箇兒  
一夕

馬錢越幾

三夕

右點化藥液。若飲汁內聽用效。同馬錢亞爾箇兒越幾。

蘇多麗格尼涅按馬錢類一成元。

麻元寶見上

底哇島有一物。其毒極慘酷。名越幾斯答刺屈黠摩亞爾。

箇立鳩摩紐幾斯塗花跋賓多伊僕那質按馬錢類之水也採其子斯答刺屈多故名云云其性善毒人畜百爾列質爾氏葛賢多烏氏皆謂此植物之本質內稟一異根生底羅僕鹽按即蘇多麗格尼涅是也其奇毒蓋根於此而發余嘗親自試之知其果然矣

製法

取馬錢亞爾箇兒越幾以水化開點滴流動醋

酸鉛見開宗卷十三二百二十一章有物簇簇而下器底倏生澱物至點之不復澱而止此鉛澱間夾他物俱下其蘇多麗格尼涅共一分色元剝餘醋酸鉛仍漂於水內不沈於是通硫化水素瓦斯見開宗卷五於其內離拆鉛質瀘過後加煅麻

倔涅失亞アシ煮過、麻倔涅失亞乃攝取醋酸而蘇多麗格尼  
涅不能孤立乃濺矣、於是用冷水洗淨更投亞爾箇兒內  
開之以今去剩餘麻倔涅失亞之尚混淆其質者、上火騰  
去亞爾箇兒即可收乾淨蘿多麗格尼涅若未十分瑩白  
更化於醋酸アソツイ<sub>亞悉伊女、亞</sub>若鹽酸アソツイ<sub>見開宗卷六百十六七章</sub>內新又加  
煅麻倔涅失亞打下於是取大量亞爾箇兒加些水稀開  
令之任性徐結芒於其內及已成晶芒用顯微鏡窺之其  
晶四面柱用向內勾曲之四瓣尖體以圍擁其兩端若急  
令結晶其晶瑩白形如顆粒味極慘苦帶鑛味質內不舍  
大氣暴大氣不變形因知其性不火鎔又不飛竄也若其

開化之之煖度輕於凡百植物成分若夫上之暴火其體先  
膨而黧黑於是現燃油阿利烏木、焰并些水醋酸炭酸瓦  
斯加爾淳尼究水、炭水素瓦斯喜慶羅厄經摩加爾淳那  
水素瓦斯炭素多於第二者二曰第一炭水有二種一曰第一炭  
水素瓦斯即油成瓦斯也詳見植學啓原若加酸化銅屋  
窯布栗蒸餾則收許多炭酸亞悉什木加淳尼究水而唯髮鬚亞所  
儒摩室於有無間已因知其本分成於酸素水素炭素而  
其亞所儒摩非根分所稟也此物雖味大苦不易化水及  
十度之後內於百瓦蘭馬水瓦蘭馬新粹名和蘭多羅當十五氏又百今氏之六其所開化之量僅居百今瓦蘭  
即此方二分五厘七毛二七其開化之量僅居百今瓦蘭  
馬之十五而已故遇此煖度則見六千六百六十七倍水

而化、若夫滾湯化之頗多、百瓦蘭馬滾湯、能開百分瓦蘭  
馬之四、故滾湯則得二千五百倍而化也、夫冷水之所化  
開其分量不及千分之一、而其味尚如此慘苦、雖更加百  
二十倍水、不覺其味減於初、則苦味之至慘、亦可知也、又  
此物遇庶酸、乃化為中和鹽、此其天性為然、

性能

此元毒人畜、同馬錢亞爾箇鬼、越幾、但此元其  
毒甚峻於彼耳、昇元八分氏、太狗即斃、平人服四分氏、  
其毒即發、

主治 應行本藥諸證、同馬錢華爾斯主治、故華爾斯  
之製、每皆同其法、力能精悍、每皆如畫一、而行之於病人

不應不必須換行本藥也、余故曰二藥已同主治、則寧停行華爾斯、而行本藥耳、何以言之、本藥則其性力核實、功能每同、不因製法精粗、而優劣其功能故也。

分量 用法

製丸子者、每丸宜舍十二分氏、若八分

氏、如下例、

○蘓多麗格尼涅丸

蘇多麗格尼涅 二氏

玫瑰昆設爾弗

半分

右細心調停、為廿四丸、每丸宜勻齊、不可些大小、銀箔為衣、以防粘連、

○蘇多麗格尼涅丁幾、

卅六度亞爾箇兜 一多

蘇多麗格尼涅

三氏

右調勺點開藥汁若飲液內自六滴至廿四滴

蘇多麗格尼涅

弗句般句葛都句蘇馬耳連勃爾祇

著舍密書二卷即  
開宗所謂蘇氏舍密

蘇多麗格尼涅又名蘇多麗格紐摩一千八百十八年百  
爾列質カ爾葛賢多烏二家初發揮此元此元一舍於斯  
多麗格乃斯紐吉思復密加子二寄於斯多麗格乃斯花  
跋イ乞那質ナ子三存於斯多麗格乃斯格律勃立那木  
印度有一製藥用以塗箭鏃名曰烏把斯質ウ烏多越近

聞製之亦以斯多麗格乃斯質乙烏多越為主味云上三物蘇多麗格尼涅與伊瓦修爾酸交按蘇多麗格那斯一宗所稟之酸之名而成其性者而下一物亦恐不外於此也製之之法亦夥矣而賢理氏法最好其法馬錢子末以水煎數回合前後汁熬為舍利別稠加水化石灰畧多於本劑於是用亞爾箇兒引其氣味數次濾過蒸餾去亞爾箇兒氣大半此際蘇多麗格尼涅初分矣取之更化亞爾箇兒內數回以淨潔之而後令送或化於至澆消酸用亞爾箇兒淨潔之用諸沒尼亞打澱用冷水洗滌澱粉更又解亞爾箇兒內令送蘇多麗格尼涅本與勃律屈涅此元亦百爾列質乙爾  
尊賢多烏之所發揮存

於勃律加歇爾律義乃撒第六十三綱植物者與沒食酸  
組結在蘇多麗格乃斯格律勃立那木蘇多麗格乃斯組  
吉思復密加子者與伊瓦修爾酸結此元今採於勃律加  
尤便捷其在蘇多麗格乃斯類者與蘇多麗格尼涅丸結  
分拆之相牢結不離分之之法取為諸沒尼亞所打下之  
不易也相牢結不離分之之法取為諸沒尼亞所打下之  
粉以澆瀉燒酒化其味勃律屈涅獨開其內而蘇多麗格  
尼涅頑乎不感分取此晶四面柱形小色瑩白觸氣不變  
無香臭味大苦可惡口中遺鑽味性不自融化又不變為  
飛竄遇熱分拆見濃烈硝酸初為雞冠紅亞蘭多繼變黃色  
入水不化見亞爾箇兒亞的兒即開蘇多麗格尼涅善與  
庶酸組結渾然化為中和鹽製之之套法取庶酸下蘇多  
麗格尼涅令饜飫上火徐徐蒸騰此鹽入水易化太約芒

結味大苦

硫酸蘇多麗格尼涅  
中和鹽殼子晶稍色遇暖即化  
為水大熱化為炭見十倍水乃開為水若夫飲酸鹽晶為  
束鍼文

硝酸蘇多麗格尼涅

其晶甚閃爍形為束鍼文至軟  
脆易撓折味大苦不擇冷熱入水即化亞爾茵兒稍難化  
亞的兒不能化些

鹽酸蘇多麗格尼涅

晶而為束鍼之狀質軟脆觸大  
氣稍色入水易化

大凡蘿多麗格尼涅及庶鹽皆大毒服少許即死取八分

氏、畀狗、狗斃人則服。四分氏即應、每必發。帝答  
紐思角弓友張

莫耳費涅

麻元寶見上

蠻天立安默弟加之學藥劑之說之未經講明殆莫甚於鴉片是以辨論此藥之性人人所見不啻霄壤或云大毒一切擯斥不肯舉用或云治萬病莫所弗效於是甲謂之寧靜中身心打睡寐乙謂之常惺惺開夾之藥丙則調停兩說謂之節知覺打睡寐蒙汗腐焦寧謐及後說出近百年來含

密家益查點鴉片元分拆幽微之性鉤沉匿之質又有名  
醫輩尤主張鴉片之劑班之他藥之上自冠名字於其藥  
居然不疑焉不知其所云舍電華謨阿芙蓉液盧烏旗亞  
烏夜鴉片丁幾實亞格日溫舍利別鴉片華爾斯鴉片水  
製越幾等如神效能果寓於那箇成分乎有何所本而廢  
他藥特專行此乎恣論橫議各講張其所見學科減裂其  
孰適從當今之世若莫有舍密家分拆植物新大成其學  
因擴而充之以及鴉片者則千古疑案恐終無斷拆之日  
已幸而大家輩出各參研此藥而若塗羅斯默斯薛而默  
乙耳涅兒魯鬼結多其尤琤琤者也三家各銳志分拆鴉

片以發揮其本性之成分曰一固油

見植學  
啓原

二肖阿仙藥

之物三麌筋但此物未經審查四延繩

斯麗摩  
斯多弗

五粉末、迷

亞屈  
塞突

六

原本脫  
其名

七根生纖維之餘膾

纖維  
說

八那耳

格質涅  
子

詳見  
本章

九默格尼酸

亞悉伊摩  
默格尼  
摩

詳見下蘇氏說注

十修爾係

魯毘結多方發明十一莫耳費涅其十成分今舍而不論

特開莫耳費涅如左

製法

魯毘結多方造濃厚鴉片水加煅麻僵涅失亞

少許麻僵涅失亞十氏鴉片一也煮四分時灰白物乃濾過冷水燙滌候乾又投緩亞爾箇鬼肉畧溫一二時不令至滾沸如是則可收大夾色分之莫耳費涅少許矣於

是更濾過用亞爾箇兜湯滌取殿物更以穠烈亞爾箇兜  
大量煮數時乘熱又濾過放冷乃結成晶晶形數品莫混  
些色矣

又法

多謨布遜氏述莫耳費涅之庶元素著一書內

載製純潔莫耳費涅便法云造穠泡鴉片加硝沙石灰精  
諸尼亞究母  
加烏斯黎完母打下粉末用洋漉紙分去褐粉蒸騰其液  
六分之一又加硝沙石灰精乃得純潔莫耳費涅殿粉着  
之於漉紙上漉下其水以冷水更洗淘候水氣盡瀝沃亞  
爾箇兜少許又令之瀝盡此液并許多色及些莫耳費  
涅而下於是開之於醋酸內加象牙霜少許以吸其色矣

時時攪動二十四時、濾過此液、瀝下、桶中、莫夾些色、於是  
又加硝沙石灰精、打下白粉、又開之於亞爾箇兒內、令其  
自蒸騰、乃結整正<sub>正</sub>达晶、其色純白、微瑩澈、如石珀、<sub>阿把爾</sub>  
<sub>石名乳</sub><sub>色玻璃狀、微透徹、受光輝現各色</sub>  
無臭氣氣味至苦、其晶正角四面柱、  
**性**<sub>能</sub> 純淨莫耳費涅、入水不易化、是以似不可曉、其  
在鵝序性內果為特稟那耳格質涅分之物也、然余既又  
覆試驗、明斷其果、然則又何容疑、於其間夫莫耳費涅見  
油善融、用此驗之、雖僅僅四分之一、若半氏之微、蒙汗之效  
歷歷明白、足可<sub>以下</sub>判可否、解凝團焉也、又伍庶酸、蒙汗之  
效亦復著大、何其相和為鹽者、比不和者、尤易化於酸液、

內故也。余曾用醋硫鹽三種莫耳費涅以試其功能。今而屈指既歷三年所矣。蓋此三鹽盡具鴉疔良和之功。而毒害之性既皆脫然一空。當時余初試鹽酸莫耳費涅際。自謂其效不及醋硫二酸者矣。故今畧而莫載其方。特開醋硫二酸方劑云。

醋酸莫耳費涅製法

內醋酸及莫耳費涅二味於陶器中令相得而結也。

硫酸莫耳費涅製法

製法同上。但用硫酸為異。

用法 大凡鴉疔之劑藥局所製已備矣。今欲亦劑莫耳費涅一一摸倣之。乃造莫耳費涅舍利別。

○醋酸莫耳費涅舍利別

舍利別

一九

醋酸莫耳費涅

四氏

右調停此方代用實亞格日溫舍利別其效優於彼何以言之實亞格日溫其製法人人有異同其效不核實故也方今在把理斯遍用此方

○硫酸莫耳費涅舍利別

舍利別

一七

硫酸莫耳費涅

四氏

右調停以上二方分量相同按分量四分氏至一氏為準病人慣上方者換用此方凡此種鹽劑交互行之久服不憊又不須加分量其效每峻

○鎮痛液 代含電華謨阿芙蓉液、盧烏旗亞烏液及  
鴉片丁幾等用、

醋酸莫耳費涅

十六氏

蒸餾水

一勺

右合勻加醋酸八九滴、亞爾箇兒一勺、今莫耳費涅鹽  
開化盡、服量六滴至廿四滴、或代醋酸莫耳費涅、用硫  
酸的亦得、

醋硫二酸莫耳費涅、俱皆為丸、舐膏清涼飲聽用、自四分  
氏至一氏、

莫耳費涅

樂忌居癥

四分

全圖

一叶

蘿馬耳連勃爾鹹見上

莫耳費涅那耳格貨涅相俱與默格尼酸按鴉斤本有之  
格尼酸共莫耳費涅膠結并峙鴉斤性內初發揮之薛爾  
默而涅兒為其人舍烏蘭土初親觀此酸於其本國罌粟  
膠結并存於鴉斤內然其存於罌粟乳汁僅僅至少發揮  
之薛牛應薛爾默而涅兒二人為權輿實在一千八百四  
年矣迨一千八百十六年薛爾氏又發其性之為亞爾加  
里云世之說今拆此藥之法者亦夥矣即一一詳錄煩冗  
無用故今畧而不載要之其說大同而小異云其法先取  
獨味鴉斤若加庶酸鴉斤化水內其酸用醋酸若硫酸尤  
多而後合麻僕涅失亞煎之若加諸沒尼亞打下之先以

水洗滌濺粉、次用緩燒酒燙滌乾去水氣、更加亞爾箇鬼、上火煮之、此物及冷乃結也矣、於是乘熱濾過、爾時尚帶色分、取之、又化於醋酸或蘇魯林水素酸海鹽、按亞加象牙、霸亦此意、用諸沒尼亞打下、而後再三開亞爾箇鬼內、今得純潔之質、製法間其尤難、莫如拆那耳格質涅之法也、其用上法製者、此分每併那耳格質涅、欲去之者、更化於亞的鬼內、那耳格質涅即開化、而莫耳費涅幾乎莫化也。

別爾入陋氏云、分拆莫耳費涅於那爾格質涅、後法為最優、水製鴉序越幾三分、水一分半、調勻、傾入列萬爾多之

具承餾壘者之內、加亞的兒二十分蒸餾、候其藥汁從入  
於承壘至全量之半、乘熱濾去亞的兒、更又澆餾過亞的  
兒、於越幾、嗣又合餘斗按即乘熱濾去之亞的兒、加水少許、稀過、放靜  
則見粒狀物、此那耳格質涅也、分去之、更大加水、用諸沒  
尼亞、打濱物、分取之、乾水氣後、用亞爾、箇兒化莫耳費涅  
加血炭清淨、如上法

勃龍塙アーラン亞烏法、先泡釀、鴉片、依此法製者、分莫耳費涅最  
易且又純淨者甚多、非他法之所及、法合鴉片十分、水二  
十分、蜜一分、酵十分之六、放在華氏煖六十五度ヨウジ、至七十  
五度之地、其成藥速發酵、八日而酵歇、於是濾去滓渣、潔

洗餘滓、捩去其汁、以諸沒尼亞打下濾物、小心洗淨後化至薄鹽酸內、不可至令之過廢、上火蒸發、以及冷乃凝為度、此為鹽酸莫耳費涅也、於是去汁、更開化於水內、用卑炭淨潔、ノ諸沒尼亞打下、取之又化於亞爾箇兜、令結晶、義胡淳烏而多魯兜、結多二人試此法可否、而曰、其所設施良好、可採用、但用鹽酸潔淨際、耗去莫耳費涅極多、不如直用亞爾箇兜之為有利、依此法、以涅塙モリデル兜蘭土之一也、而所收之量、多於彼一弓半、且行此法、則收得純潔者甚不難也、余按蘇氏自云、曰、如此製者、果能脫那耳格質涅之性否、我未能信之、凡製莫耳費涅之盡、脫那耳格質涅之性

者莫如用亞的兒之核實也化之於亞爾箇兒凝而晶其  
晶形小而無色光彩陸離若化之於庶酸內滴諸沒尼亞  
令沉澱乃成白色似醜醜之物若與庶酸相結則芒晶上  
火細心熱之其質不令拆而化其狀畧肖鎔硫黃冷則結  
晶其色白中大氣生大熱其質離折發華爾斯臭終乃放  
紅焰而燃其所觸煙煤焰止乃遺炭莫耳費涅味苦不化  
水投滾湯內其所化僅二百分之一然及冷復晶見亞爾  
箇兒冷則四十倍熱則三十倍而融亞的兒則幾乎不能  
化之脂肪油亞的兒性油亦能化之合羯布羅相共消融  
觸伊阿仔毋酸兩者俱令拆伊阿仔毋乃游離現其本然

色香、此又莫耳費涅之一異稟也。開一竅於七千兵之水  
入些煮漿粉、其水乃為青色。

造莫耳費涅鹽括套

此物見庶酸、乃結為鹽法、取稀

過庶酸、內莫耳費涅、令十分饜飲、酸氣上火、蒸散水氣、此  
鹽入水、亞爾箇兜乃開、見亞的兜不化、無色香味、極慘苦  
苛烈、大率與庶酸糾結、乃凝為晶、上火先解、嗣而分拆、  
硫酸莫耳費涅

其鹽成束鐵文、遇二倍水乃化、取莫

耳費涅、和硫酸令厭飲、加亞的兜除有餘、硫酸即成、  
鹽酸莫耳費涅

徐徐蒸散水氣、乃成毳狀線、線紋從

中心向兩畔岐出、上火久之、凝而成閃爍銀白之塊、細視

之、仍是皆成從中心向外射出之線紋之晶也。勃格爾氏  
曰、見十六倍水若廿倍水乃解。

(醋酸莫耳費涅)此物結晶成柱狀、且鍼紋如他莫耳  
費涅鹽一例、其晶數箇相束、味大苦、似馬錢、越幾中太氣  
不變、久之乃半、今拆見同秤水即潮解、亞爾箇塊化之頗  
不易。

或云、莫耳費涅、舍鴉序之本分功能矣、和之於庶酸、其能  
尤捷、而醋酸鹽為其最、可以供醫藥也、然余每疑鴉序諸  
能、未必盡寄莫耳費涅也、夫成鴉序之本分之物、亦重沓  
矣、雖舍密家探討極精密、弘博未能明瞭其真性、余謂若

就醫衆生處徑，分拆所流乳液驗試之。其或所發古來秘  
蘊乎？何此液略乾，乃變其初之性，而況於已捏斷可丸，乃  
輸之於遠乎？此非余臆見，其變候明白可指。而鴉片之分  
數品，亦恐由於此矣。又莫耳費涅之糾結鴉片性內，其狀  
不能每相同，而效能微甚係焉，亦勢之所不免。若夫如默  
格尼酸莫耳費涅此物自然存鴉片質內，不結晶，黑酸化  
銹鹽，發血紅色，見水亞爾箇兒乃開化，驗其功能如何，亦豈為於醫治不重切乎？又嘗見取鴉片  
可比例莫耳費涅之小量與人服之，莫耳費涅之效微於  
鴉片，此數項，余之所以不能不存此疑也。

那耳格質涅又塗羅斯涅氏所發明元

按那耳格質涅亦鴉片之一成分而未可以供醫藥則附錄之固似屬無用然麻氏蘇氏二書俱皆附之於莫耳費涅條以論辨彼是性質效能之異而發于古未發之秘蘊故今援引其說以備他日考證有志之士若能就此數則反覆考訖計校異同則於辨其涇渭或思過半矣夫

麻元寶見上

余嘗查點此元而後知其未可以供醫藥矣雖然此物既已為鴉片之一初成分則固不可無一言然而此物未免

蒙昧可疑、而況其鵝片亦尚猶不可辨認者洵多、則有亦欲成其說而不能者、是以止敘費西阿羅義家經驗以記其稟性大畧云、取此元一丘、化油內、畀狗喂之、狗乃失知覺、此狀昧者或認為睡寐、然與睡寐不同也、眼開而不瞑、氣息雖深、不如睡者之更甚深、搖之而不醒、約歷二十四五時即死、若配醋酸投畀、其效又不同、雖至千十四丘之多、尚不死、中毒際、發似搐掣之証、猶中鶉布羅毒之狀、驚惕卻行、不能為進前之運動、口角流涎、下齶戰振、又伍莫耳費涅試之、二毒一齊發動、其驗各殊、其法截開狗胸膜、取莫耳費涅那耳格質涅各一丘、化水中、洗胸膜內、初則不

免打瞌睡、或僅睡即覺、此莫耳費涅之效也、其同時發毒  
之那耳格質涅、乃作衝動、其效明白可記、而彼此之效大  
相反而矣、如是者約可半時餘、終乃昏睡矣、此又莫耳費涅  
之能也、抑那耳格質涅之本能、本一耳矣、今余故以意變  
化查點之法、再三覆驗、私有所發明、謂二個相反、元素已  
併、稟於一鴉片內、則其同時發相反証、亦奚足恆焉、且也  
見世之用莫耳費涅者、皆未驗知其建闢爽之勲、此功勲、  
在藥局之水製越幾、人人之所常熟見、而此物、固併有夫  
二元、余則於其效能、或思過半哉、

匱那耳格質涅的鴉片越幾

魯昆結多本上說始一

鴉片越幾其功能超出藥局越幾之上云法取判細鴉片化冷水內濾過騰去水氣令得硬舍利別之稠傾入應用器內加再餾硫酸亞的兒亞的兒修爾扶理究不停手攪渾頃之放定徐徐傾器分收其液乃蒸餾以細分亞的兒之氣如此再三蒸餾直至那耳格質涅不復迄止於是熬餘者令可丸用法同藥局水越幾

那耳格質涅

蘇馬耳連勃爾鹹見上

一千八百三年塗羅思涅氏初發揮此本分因名塗羅思

涅氏鴉片鹽及莫耳費涅出更其名曰那育格質涅云獨  
乙人或名之鴉片俺製之之法取鴉片若水越幾用亞的  
兒分之如別爾入陋氏分莫耳費涅法雖已分之其質尚  
未純潔欲精製之者更解蘇魯林水素內用血炭祛其色  
余加諸沒尼亞令濾下取之更化亞爾箇兒若亞的兒內  
放晶此晶哲白形大於莫耳費涅之晶或為真珠姿色之  
鱗無臭無味上文武火乃解耗其原量之百分之二三徐  
放令則結晶急則其塊止透亮而易破碎冷水不能開化  
滾湯僅解四百分之一冷亞爾箇兒化百分之一深湯則  
至百分之二五亞的兒化之良多溫之更多遇庶酸相溶

為鹽、其法先稀其酸、內下那耳格質涅、至不可復化而止。其鹽皆苦於莫耳費涅、見水即開、其性喜酸、不易令饗飲、故用以試庶酸、見沒食酸白而潰、其體叢束、此鹽未盡檢、查、稀過消酸、克解開之、然不至分拆、其質純則令之黃色、若溫之乃分離化、為修酸、配蘇魯林水素酸、雖相蘊結、不至可晶乾之、其質如護摩、醋酸、純烈、乃能開化之、稀則不能化、即化之至少、若溫之、其結者潰散。

阿爾斐樂云、那耳格質涅、人服之無功、至一勺之多、不見些害、解蘿魯林水素酸、醋酸、若油頗効、獸畜則毒中慘劇、油內化半勺、即殺狗。

秦西名醫彙講卷之八畢

天保八年丁酉五月發兌

京都寺町通松原下ル

勝 村治右衛門

書林

大阪心齋橋北二町目

秋田屋太右衛門

須原屋伊八

江戸浅草茅町二町目

