


[H]

Chinese

Vol XII

12

V31



唐王壽先生外臺祕要方卷三十一目錄

採藥時節所出土地諸家丸散酒煎解諸毒等二十三門

採藥時節一首

用藥分兩煮湯生熟法則一十六首

古今諸家丸方一十八首

尚德按今有法四十首

尚德按二首

首下疑脫並代茶飲

七

字

古今諸家散方六首

古今諸家膏方四首

古今諸家酒方一十二首

小字列於下

首下疑脫並代茶飲

七

字

古今諸家煎方六首

古今諸家丸方一十八首

解飲食相害成病百件

尚德按今有食忌九十四件論四首方三十二首

酒醉過度恐腸爛及喉舌生瘡方三首

飲酒連日醉不醒方九首

飲酒令難醉方一首

飲酒積熱方二首

斷酒方一十五首

服藥過劑及中毒方一十一首

解諸藥草中毒方二十九首

解諸蛇蠍毒方六首

辨五大毒方一首

解金鐵等毒方八首

惡毒障氣毒風腫毒方四首

尚德按鹽
疑當作蟲
疑當作瘴

唐王燾先生外臺祕要方卷三十

宋朝散大夫守光祿卿直祕閣判登聞簡院上護軍臣林億等上進

新安後學程衍道敬通父訂梓

採藥時節一首

尚德接月
千金翼作
日乃隨時月
通接此篇
藥多重出

而列所宜
採者如人
參一見於
二月再見於
於四月又見
於八月則注
之類翼止首
揭總藥名注其
擇取時月於
下如甘草則
注二月則不必
重出也

千金翼論曰夫藥採取不以時節不知陰乾暴乾雖有藥名終無藥實故不依時採取與朽木不殊徒費人功卒無裨益其法雖具本經學者尋覽造次難得所以甄別節目可知耳 姜蕤立春後藁本暴乾三月採陰乾藁本十月暴乾通草陰乾枝烏喙陰乾烏頭陰絡石並正月採扶苓陰乾扶神陰桂心陰白朮暴乾地黃陰天門冬暴麥門冬陰薯蕷暴甘草暴人參暴力見風石龍芮採皮藁本暴龍膽陰杜仲陰牛膝陰細辛陰獨活暴升麻暴柴胡暴榆皮暴藍葉暴當歸陰防風芍藥桔梗秦艽前胡知母桔梗根沙參狗脊茜根王不留行萆薢菝葜白芷杜若百合白斂地榆以上並陰乾大黃火虎掌黃連暴乾天雄防己烏喙烏頭甘遂牡丹巴戟天石南葉貫眾羊桃黃精黃耆以上並陰乾二月採黃芩陰大青陰天門冬暴水萍暴厚朴陰青陰澤蘭陰蕪荑陰杜蘅暴藍葉王瓜陰寄生陰防葵暴紫草陰芍藥暴苦參暴茜根暴紫參火澤漆陰藜蘆以上並三月採赤箭菥蓂子蒲黃玄參蘚蕪以上暴遠志陰景天陰人參暴芍藥大青陰白頭翁白鮮石南葉鼠尾草以上並四月採陰乾葛蒲陰卷柏陰白鮮陰澤瀉陰車前五月採陰石龍芮子蜀漆陰肉蓯蓉陰荷蕡子暴覆盆子乾漆夏至後採半夏暴五加陰杜仲茵陳陰恭草陰蕤核葛根暴丹參暴陰蛇床子陰葶苈子立夏後茺蔚子青葙子茅根杜仲蕘花以上六月採陰石解陰五加皮五加根莖卷柏陰海藻暴腐婢陰澤漆陰天門冬鼠尾花陰瓜蒂槐子麻黃立秋石龍芮暴景天陰飛廉陰薇銜

尚德按解
翼作解

又按耆
翼作耆
質

陰菌桂陰立秋採水蘇瞿麥立秋取貴陰桃仁陰續斷陰疾藜子暴以上並七月採白瓜子飛廉陰女青陰地榆暴
大黃火桔梗暴大棗暴橘實暴秦皮陰桂陰營實陰鬼白陰百合暴牡丹陰防已陰狼毒陰草解暴拔
葜暴白芷暴連翹陰苦參暴石龍芮暴狗脊暴白斂暴前胡暴知母暴括囊根暴巴豆猪苓陰扶神
陰蛇含暴扶苓陰虎掌暴薏苡仁天門冬麥門冬陰杜若暴當歸陰耆實暴柴胡暴升麻暴獨活
暴細辛陰牛膝暴石斛陰人參暴薯蕷暴甘草暴敗醬暴恆山暴半夏暴雷丸暴壯荆陰漏蘆暴陰酸棗
暴地膚子陰五味子暴蜀椒暴蘿蔔暴鬼箭暴附子暴秦椒澤瀉暴牙子暴黃耆暴芍藥暴石南實
暴陰以上暴松實暴菊花暴耆實暴乾薑枳實暴白朮暴楮實暴厚朴暴杜仲暴皂莢暴陰山茱萸暴吳茱
萸暴九月採暴旋覆子暴夷夷暴牡荆暴秦椒暴菟絲子暴營實暴九月採並麥門冬暴牛膝暴地膚子暴枳實暴陰
暴防風暴決明子暴皂莢暴桂暴蕘蘭子暴山茱萸暴五加根暴厚朴暴雲實暴貝母暴以上暴十月採菊子暴蕘
實暴陰欵冬花暴龍膽暴十一月採暴冬葵子暴菖蒲暴龍膽忍冬暴木蘭大戟暴以上並二月採暴枸杞子暴冬採
根春
夏採葉秋採莖暴桑根白皮暴柏葉暴四時各依方暴面採之暴神陰暴蒴蘚暴春夏採葉秋
暴根莖

論曰凡藥皆須採之有時日陰乾暴乾則有氣力若不依時採之則與凡草不別徒棄功用終無益也學者當要及時採掇以供所用耳

藥所出州土一首

千金翼論曰按本草所出郡縣皆是古名今之學者卒尋而難曉自聖唐開闢四海無外州縣名目事事惟新所以須甄明卽因土地名號後之學者容易卽知其出藥土地凡一百三十三州合五百一十九種其餘州土皆有不堪進御故不繫錄耳

關內道

雍州褒盆子華州王不留行杜薦荅白朮菌芋本防己黃精鹿甲茯神柏白皮天門冬麥門冬
茯苓仁白朮荅細辛黃精柏白皮天門冬麥門冬

又按巴
一翼
又按進翼
作連

又按壯桂
翼作杜仲
通按乳石
卽鍾乳也

益州
苧根

批杷葉
黃環
鬱金
百兩金
梅煎

蜀漆
沙糖
乾薑
楨火草
薏苡

眉州
豆

資州
木折傷

嘉州
豆

綿州
天雄
索
萬石
雄黃
礬石

喙側子
烏頭
附子
一歲天
甘皮

邛州賣子
本
松州
當州
當歸

邛州
本
扶州
芎
龍州
烏頭
烏喙

升麻
羌活
馬牙硝
朴硝
大黃

茂州
芒硝
馬齒莧
巴戟天
附子

柘州
黃

春州
封州
桂州
滑石
蝴蝶
膽
梧州
象州
並出
鰐蛇
賀州
梧州
象州
並出
鰐蛇
柳州
桂心
鈎樟根
潘州
鰐蛇
交州
龍眼
木藍
三百兩銀

峰州
峰州
峰州
峰州
峰州
峰州
峰州
峰州
峰州
峰州

廣州
石斛
決明子
白藤花
甘蕷根
丁根
恩州
膽蛇
賀州
梧州
象州
並出
鰐蛇
桂州
蝴蝶
滑石
梧州
象州
並出
鰐蛇
柳州
桂心
鈎樟根
潘州
鰐蛇
交州
龍眼
木藍
三百兩銀

瀘州
石斛
解
融州
桂
韶州
石斛
牡桂
柳州
桂心
鈎樟根
潘州
鰐蛇
交州
龍眼
木藍
三百兩銀

州者佳蔚州者無空塊大色深深曾青鄂州蔚州者佳餘州者惡白青簡州梓州者並佳石膽

蒲州處鄉東亭谷及辟集巖塊如雞子者佳乳石第一出始興其次連廣澧朗柳等州今陝州青溪房州三洞出者亞於始興者自餘不可用也芒硝同名為硝石嶺南始安出者佳萊州齊州者惡鑿潤服之勝乳桃花石舊出中華州鐘山縣似赤石脂但不善舌赤石脂號州盧氏縣澤州陵縣宣州梓州宣州呂鄉縣並有凡石中有石骨如玉陽起石齊州廢城西北五六里齊山西北六七里廬山出白者佳黑者不堪石腦一名石鉛餅出徐州宋里山入土一丈餘得之大如雞子觸著即破青琅玕出衢州西烏白蠻中及於閩國一名青珠蒼石梁州均州房州金州並出凝水石出同州韓城縣色青黃理如雲母者佳澄城斜文逆白者劣譽石漢川武當西邊坂名譽石谷卽是其真者梁州馬道成澗中有陰藥色白如脂出渭州鄆縣三交驛西北坡平地土窟中乳是也有六十餘坎人云服之同鍾乳不發熟成鹽沙州名為充登鹽鄉州名為土陰鹽生河岸山坡之陰曉之不鳴薑石齊州廢城東者良代赭今靈州鳴沙縣大勝齊代所出者

論曰既知無物非藥及所出土地復採得時須在貯積以供時用不得虛棄光陰臨時忽遽失其機要使風燭不救實可悲哉博學者深可思之用為備耳

用藥分兩煮湯生熟法則一十六首

千金或曰古人用藥至少分兩亦輕差病極多觀君處方非不煩重分兩亦多而差病不及古人者何也答曰古者日月長遠藥在土中自養經久氣味真實百姓少欲稟氣中和感病輕微易為醫療今時日月短促藥力輕虛人多巧詐感病厚重難以為醫故病輕藥味須少病重用藥卽多此則醫之一隅何足怪也

又古之醫者自解採取陰乾暴乾皆悉如法用藥必依土地所以療十得九今之醫者但知診脈處方不

知採藥時節至於出處土地新陳虛實一皆不悉所以療十不能得愈五六者實繇於此處方者常須加

意重複用藥藥乃有力若學古人徒自誤耳將來學者須詳熟之

尚德接千
金澈作微

躁作燥

尚德按木
千金作石

凡紫石英白石英硃砂雄黃硫黃等皆須光明映澈色理鮮淨者為佳不然令人身體乾躁發熱口乾而死

凡草木藥皆須土地堅實氣味濃烈不爾廢病不愈

凡狼毒枳實橘皮半夏麻黃吳茱萸皆欲得陳久者良其餘唯須精新也

問曰凡和合湯藥治諸草石蟲獸用水升數消殺之法則云何答曰凡草有根莖枝葉皮骨花實諸蟲有毛翅皮甲頭足尾骨之屬有須燒鍊炮炙生熟有定一如後法順方者福逆之者殃或須皮去肉或去皮須肉或須根莖或須花實依方鍊治極令淨潔然後升合秤兩勿令參差藥有相生相殺氣力有強有弱相君臣相理佐使相持若不廣通諸經卽不知有好有惡或醫自以加減意不依方分使諸藥草石強弱相欺入人腹中不能治病更加鬪爭草石相反使人迷亂力甚刀劍若調和得所雖未能治病猶得利安五臟於病無所增劇例曰諸經方用藥所有熬鍊節度皆脚下注之今方不然此篇具條之更不煩別注也

凡藥治擇熬炮訖然後秤之以充用不得生秤

凡石藥及玉皆碎如米豆以綿裹內湯酒中煮之

凡鍾乳及諸石以玉鍼著水研之三日三夜漂練務令極細乾研則七日七夜

凡銀屑以水銀和成泥

凡譽石以黃土泥團之火燒半日乃熟可用仍不得過之不鍊生入藥使入破心肝

金黃土泥作赤泥
凡朴硝礬石燒令汁盡乃入丸散芒硝朴硝皆絞湯訖乃內汁中更上火兩三沸令烊盡乃服

凡湯中用丹砂雄黃細熟研如粉臨服乃投湯中攪令調和服之

凡湯中用完物皆擘破乾棗梔子之類是也用細核物亦打破山茱萸五味子榧核決明子之類是也細

尚德按金黃土泥作赤泥
破作人破

外臺秘要

卷三十一

花子物正爾完用之旋復花菊花地膚子葵子之類是也米麥豆輩亦完用之

凡橘皮吳茱萸椒等入湯不咬咀

凡諸菓子仁皆去尖皮及兩人者湯搗撻去皮仍切之用梔子者去皮用蒲黃者湯成下
凡生麥門冬生薑入湯皆切三搗三絞取汁湯成去滓下之煮五六沸依如升數不可共藥煮一法薄切

用之

凡麥門冬皆微潤抽去心

凡麻黃去節別煮兩三沸掠去沫更益水如本數乃內諸藥煮之不爾令人煩寸斬之小草瞿麥五分斬
之細辛白前三分斬之膏中細切用之

凡牛膝石斛等入湯酒拍碎用之石斛入丸散者先以磧槌極打令碎乃入白不爾搏不熟

凡用桂厚朴杜仲秦皮木蘭皮輩皆削去上虛軟甲錯取裏有味者秤之茯苓諸苓削去黑皮秤牡丹天
門冬巴戟天遠志野葛等皆搗破去心紫菀洗去土乾乃秤之薤白葱白除青令盡莽草石南茵芋澤
蘭剔取葉及嫩莖去大枝鬼白黃連皆除根毛石葷辛夷拭去毛又去心蜀椒去目及閉口者用大棗烏
梅皆去核用鬼箭削取羽皮

凡茯苓藥補藥須白者瀉藥唯赤者

尚德按千字下金有苓字

擣之須臾悉盡極易碎

凡甘草厚朴枳實石南茵芋藜蘆皂莢之類皆炙之而枳實去穰藜蘆去頭皂莢去皮子

凡椒雲實微熬令汗出卽有勢力

凡湯丸散用天雄附子烏頭烏喙側子皆燒灰炮令微拆削去黑皮乃秤之唯薑附湯及膏酒中卽生用
亦削去皮乃秤之直理破作七八片半夏熟湯浸洗去上滑一云十洗四破乃秤之以入湯若膏酒丸散

尚德按千金無雲

尚德按千金半夏上

有凡字別
揭為一條

皆燔灰炮之用

凡巴豆去心皮膜熬令紫色杏仁桃仁葶苈胡麻諸有膏脂藥皆裹黃別搗令如膏脂機視之泯泯爾乃以向成散稍下白中合研搗令消散乃復都以輕絹篩之湛盡又內白中依法研治數百杵也湯膏中亦有敷者雖有生用者並搗破

尚德按俱
千金作湏
金孽作孽
今作令
尚德按誠
千金作誠

凡麥蘖麴末大豆黃卷澤蘭蕪荑皆微炒乾漆熬令煙斷烏梅入丸散熬之用熟者先炒細擘合和諸藥搗之令細散不可篩者內散中和之

凡用諸毛羽齒牙蹄甲龜鰐鮫鯉等甲皮肉骨角筋鹿茸等皆炙之蛇蛻皮微炙

凡用斑

貓諸蟲皆去足翅微熬用桑螵蛸中破灸之牡蠣熬令黃色殼蠶蜂房微熬之

凡湯中用麝香犀角鹿角羚羊角牛黃須末如粉臨服內湯中攬令調和服之

凡丸散用膠先炙令通體沸起燥乃可搗有不沸處更炙之斷下湯直爾用之勿炙諸湯中用阿膠皆絞湯畢內汁中更上火令烊盡

凡用蜜先以火煎掠沫令色紫黃卽丸經久不壞掠之多少隨蜜精麤遂至大稠於丸彌佳

凡丸中用

蠟烊之投少蜜中攬調以和藥

凡湯中用飴糠皆湯成下諸湯用酒者皆臨熟下之

又云古秤唯有銖兩而無分名今則以十黍為一銖六銖為一分四分為一兩十六兩為一斤此則神農之秤也吳人以二兩為一兩隋人以三兩為一兩今依四分為一兩為定方案有云等分者皆是丸散隨病輕重所須多少無定銖兩兩三種或五種皆悉分兩同等爾

凡丸散云若干分兩者是品諸藥宜多宜少之分兩非必止於若干之分兩也假今日服三方寸匕須差止是三五兩藥爾

凡散藥有云刀圭者十分方寸匕之一準如梧桐子大也方寸匕者作匕正方一寸抄散取不落為度錢

尚德按
千金作令

七者以大錢上全抄之若云半錢七者則是一錢抄一邊爾並用五銖錢也錢五七者今五銖錢邊五字者以抄之亦令不落為度一撮者四刀圭也十撮為一勺十勺為一合以藥升分之者謂藥有虛實輕重不得用斤兩卽以升平之藥升方作上徑一寸下徑六分深八分內散勿接抑之正爾微動令平調耳今人分藥不復用此

尚德按以小豆千金作穢豆作以二小豆

凡丸藥有云如細麻者卽胡麻也不必扁但令較略大小相稱爾如黍粟亦然以十六黍為一大豆也如大麻子者卽今大麻子準三細麻也如胡豆者今之青斑豆也以二大麻子準之如小豆者今赤小豆也粒有大小以三大麻子準之如大豆者以小豆準之如梧桐子者以二大豆準之一方寸匕散蜜和得如梧桐子十九為度如彈丸及雞子黃者以十梧子準之

凡方云巴豆若干枚者當先去心皮畢乃秤之以一分準十六枚附子烏頭若干枚者去皮畢以半兩準一枚枳實若干枚者去核畢以一分準二枚橘皮一分準三枚棗有大小以三枚準一兩乾薑一累者以半兩為正本草云以一兩為正

凡方云半夏一升者洗畢秤五兩為正椒一升三兩為正吳茱萸一升五兩為正菟絲子一升九兩為正菴蘭子一升四兩為正蛇牀子一升三兩半為正地膚子一升四兩為正此其不同也云某子一升者其子各有大小虛實輕重不可通以秤準皆取平升為正

凡方云桂一尺者削去皮重半兩為正甘草一尺者重二兩為正云某草一束者重三兩為正云一把者重二兩為正

凡方云蜜一斤者有七合豬膏一斤者一升二合

凡湯酒膏藥舊方皆云㕮咀者謂秤畢搗之如大豆又使㕮去細末此於事殊不允當藥有易碎難碎多末少末秤兩則不復均平今皆細切之較略令如㕮咀者乃得無末而片粒調和也凡云末之者謂搗篩如法也

尚德按以小豆千金作穢豆作以二小豆

凡丸散先細切暴燥乃搗之有各搗者有合搗者並隨方所言其濕潤藥如天門冬乾地黃輩皆先切暴乾獨搗令偏碎更出細擘暴乾若值陰雨可微火烘之小停冷乃搗之

凡濕藥燥皆大耗當先增分兩須得屑乃秤之為正其湯酒不須如此

凡篩丸藥用重蜜絹令細於蜜丸易熟若篩散草藥用輕疎絹於酒中服卽不泥其石藥亦用細絹篩令如丸藥者凡篩丸散藥畢皆更合於白中以杵搗之數百過視其色理和同為佳

凡煮湯用微火令小沸其水數依方多少大略二十兩藥用水一斗煮取四升以此為率皆綏去滓而後酌量也然則和湯欲生少水而多取汁者為病須快利所以少水而多取汁補湯欲熟多水而少取汁者為病須補益是以多水而少取汁好詳視之不得令水數多少湯熟可用新布兩人以尺木綬去滓澄去渣濁分再服三服者第二第三服以紙覆令蜜勿令洩氣欲服以銅器於熱湯上煖之若於鑄中勿令器中有水氣方云再服三服者要令力勢相及並視人之暴羸病之輕重以為進退增減之不必悉依方說也

古今諸家丸方一十八首

廣濟療傳屍骨蒸殮蝶肺痿疰忤鬼氣卒心痛霍亂吐痢時氣鬼魅瘴瘧赤白暴痢瘀血月閉痃癖丁腫驚癲鬼忤中小兒吐乳大人狐狸等病吃力伽丸方 吃力伽白朮是也光明砂 虶梨勒皮 麝香當門子
香附子 丁子香 沉香 華撥 檀香 青木香 安息香 犀角二兩薫陸香 蘇合香 龍腦
各半兩 右十五味搗篩白蜜和為丸每朝取井花水服如梧子四丸於淨器中研破服之老小一丸以
蠟裹一丸如彈丸紺絹袋盛當心帶之一切邪鬼不敢近千金不傳冷水煖水臨時量之忌五辛生血
物以臘月合神前藏之密器中勿令洩藥氣神驗

千金耆婆萬病丸療七種癰塊五種癩病十種注忤七種飛尸十二種蠱毒五種黃病十二時瘧疾十種
水病八種大風十二種瘰疬並風入頭眼暗膜膜及上氣欬嗽喉中如水雞聲不得卧飲食不作肌膚五

臟滯氣積聚不消擁閉不通心腹脹滿連及胸背鼓脹氣堅結流入四肢或復又心膈氣滿時定時發十年二十年不差五種下痢疳蟲蛇蟲寸白蟲諸蟲上下冷熱久積瘀飲令人多睡眠消瘦無力陰入骨髓便成滯疾身體氣腫飲食嘔逆腰脚酸疼四肢沉重不能久行久立婦人因產冷入子藏藏中不淨或閉塞不通胞中瘀血冷滯出流不盡時時疼痛為患或因此斷產並小兒赤白下痢及胡臭耳聾鼻塞等病服此藥以三丸為一劑服藥不過三劑萬病悉除說無窮盡故稱萬病丸以其牛黃為主故一名牛黃丸以耆婆良醫故名耆婆丸方牛黃麝香犀角硃砂雄黃並羌青去頭翅足熟研本方七枚黃連人參

又按千金無上字

又按狗字下千金有牛字

又按千金更服三丸

又按三千金作一

禹餘糧大戟炙芫花熬茯苓乾薑桂心桑白皮當歸芍藥甘遂熟黃芩蜀椒汗細辛巴豆去皮心
別研搗前胡桔梗紫菀蒲黃葶苈子熟防風各一寸一蝶蚣三節石蜥蜴一枚

右三十一味並令精細上牛黃麝香犀角硃砂雄黃禹餘糧巴豆別研餘者合搗篩之以白蜜和更搗三千杵極熟密封之除破日平旦空腹以酒服三丸如梧子微下三五升惡物為良若卒暴病不要待平旦無問早晚即服以吐利為度若不吐利更加一丸或至三丸五丸須吐利為度不得限以丸數病彊藥少卽不利吐若其發遲以熱稀粥一杯發之若吐利不止卽以酸飯兩三口止之服藥忌陳臭生冷醉滑粘食大蒜猪魚雞狗馬驥肉白酒行房七日外始得一日服二日補之得食新米韭菜汁作羹粥臘飲食之三四頓大良亦不得全飽產婦勿服之吐利以後常須閉口少語於無風處溫牀暖室將息若旅行卒暴無飲以小便送之若一歲以下小兒有疾者令乳母服兩小豆亦以吐利為度近病及卒病皆用多積久疾病卽少服常取微溏利為度崔氏無黃芩桑白皮桔梗防風

卒病欲死服三丸如小豆取吐利卽差

五注鬼刺客忤服二丸如小豆不差後日更服二丸

猫鬼病服小豆三丸不差更服

瘧病未發前服三丸未差更服

諸瘧飲者服三丸如小豆不差更服

尚德接平
金地膽斑
各七枝
巴豆五十枚

又接千金
並同
下金

又按千金
日三

又接三十
金作二

- 冷癬服三丸如小豆日三服皆間食常令微渴利為度
- 癥瘕積聚服皆間食以利差止
- 瘡濕灌下以一丸如杏仁和醋二合服
- 頭痛惡寒服小豆二丸覆取汗
- 小便不通服小豆二丸不差更服之明日更服之
- 耳聾聵耳以錦裏如裹核塞耳中差
- 癰腫丁腫破腫內一丸如麻子日一服之根自出亦服二丸差
- 癰瘍以布揩令汁出以酢和洗訖取和塗之
- 痔瘡以藥塗綿內孔中別易差止
- 癬瘍以布揩令汁出以酢和塗之
- 諸冷瘡積年不差者以酢和塗之亦餅貼之
- 蝮蛇蟄以少許內蠱處若毒入腹心煩閑欲絕者服三丸如小豆大
- 小兒驚癇服一丸如米許以塗乳令嗍之看兒大小量之
- 小兒乳不消心腹脹滿服一丸如米許塗乳頭令嗍之取差
- 又大麝香丸療鬼注飛尸等萬病皆療之方麝香分牛黃直珠研并附子炮鬼白莽草炙犀角屑礬石熬盡令細辛桂心擗肝炙藜蘆各二錢研各地膽熟斑鴉頭杏仁去尖皮熟研一枝丹砂二兩研一枝巴豆去心皮熟蜜和更搗三千杵丸如小豆每有病以飲服一丸日再漸至三丸尤妙毒蟲所螫摩之以知為度若欲
- 宿食不消服二丸一小豆取利
- 拘急心腹脹滿心痛服三丸如小豆末差更服
- 傷寒天行病服三丸間食服內一丸下部中則通
- 水病服之差止人弱偶日服
- 鼻衄服二丸如小豆無不差
- 犯丁腫血出以猪脂和塗有孔內孔中差止
- 漏瘡有孔以一丹如小麥內孔中和豬脂敷
- 瘰疬以酢和塗上差
- 胸背腰腸腫以醋和敷腫上日一夜之服二丸如小豆
- 惡刺以一丸內孔中卽差
- 蠍蟄以少許塗之
- 婦人諸疾胞衣不下服二丸如小豆大頭與嗍之以意量之

入毒疫癘鄉死喪家及鬼神廟塚墓處以絳囊盛之男左女右肘後繫之又以少許塗人中卧不麁魅
神驗忌如常法

又小麝香丸主療與大麝香丸同方 麝香分雄黃研各細辛 乾薑 桂心 苣藥各五

芒草

炙犀角屑 桔子仁各三附子炮烏頭炮各五 巴豆五十枚去皮熬心去皮熬一枚去

頭足炙

擣一千杵丸如小豆每服三丸至五丸日三一切尸注心痛皆主之忌生血物生葱生菜蘆筍猪肉冷

水神驗一方有當歸一兩

崔氏溫白丸療癰瘍塊等一切病並治之方 紫菀 吳茱萸 菖蒲 柴胡 厚朴

桔梗

皂莢去皮

炙

方已見第十二卷中 分兩不同 文亦小異

又按城前作咬又接淋字下前有五痔二字

白蜜和更擣二千杵丸如梧子大有病服一丸至二丸不知稍增至三丸五丸以知為度主心腹積聚

久癥瘕塊大如盂碗黃疽宿食朝起嘔吐支滿上氣時時腹脹心下堅結上來擔心傍攻兩脇微背連

胸痛無常處繞脅攬痛狀如蟲蛟又療十種水病八種痞塞反胃吐逆飲食噎塞五淋九種心痛積年

食不消化或婦人諸疾斷續不生帶下淋瀝或痃癰連年不差又療一切諸風身體頑痹不知痛癢或

半身不遂或疼痛或眉髮墮落又療七十二種風三十六種遁尸注或癩瘍或婦人五邪失心夢與鬼

神交通四肢沉重不能食飲昏昏默默只欲取死終日憂愁情中不樂或恐懼悲啼飲食無味月水不

調真似懷孕連年累月羸瘦困弊遂至於死或歌或哭為鬼所亂莫之知也但服此藥者莫不除愈臣

知方驗便合藥與婦人服之十日下出癩瘍蟲長二尺五寸三十枚下膿二升黑血一升青黃汁五升

所苦悉除當月有子臣兄墮馬被傷腹內有積血天陰即發羸瘦著牀命在旦夕與藥服下如雞肝黑

血如手者二百餘片白膿二升赤黃水一升其病即除臣知方驗敢不獻上忌生冷醉滑猪雞魚犬牛

馬鵝肉五辛油麵豆糯米陳臭等物

仲景三物備急丸司空裴秀為散用療心腹諸卒暴百病方

大黃 乾薑 巴豆

各一兩去皮心熬別搗如脂

右

又按前二升作三升一升作一升斗二百餘片作百片冷字下有二字鵝字猪字下有二字

尚德按
九疑當作
杵丸

千金翼必
取王相暗
明脩合不
極此方為
用愚意非
獨此方為
然凡修合
亦宜准此
又宜致敬
竭誠不得
忽

尚德按
寒論丸如
雞黃大以
沸湯數合
和一丸研
碎溫服之
日三服夜
二服

藥各須精新好藥擣篩蜜和更搗一千搗丸如梧子或小豆服三丸老小量之為散不及丸也若中惡客忤心腹脹滿卒痛如錐刀刺痛氣急口噤停尸卒死者以暖水若酒服之或不下搗頭起灌令下咽須臾差如未更與三丸以腹中雷鳴轉即吐下便愈若口已噤亦須折齒灌之令入尤妙神驗忌蘆筍猪肉冷水肥膩

又理中丸療三焦不通嘔吐不食並霍亂吐痢不止者並主之方 人參 乾薑 白朮 甘草 各三

右四味擣篩蜜和如梧子空腹以飲汁服十五丸忌桃李雀肉海藻菘菜

延年駐車丸主赤白冷熱血痢腹痛者方 黃連六兩乾薑 當歸 阿膠各三兩 右四味擣篩以三年米醋煮膠令消和藥衆手撚丸如梧子每以飲下三十九日再服亦療產婦下痢不止者服之甚驗忌豬肉冷水粘膩等物

救急五香丸療諸毒症氣心復張滿大小便不通鬼疰心痛不可忍方 牛黃研犀角屑各三分升麻 沉香薰陸香 當歸 桂心 青木香 膏香研雄黃研如鬼箭羽 巴豆去心皮熟阿膠各四分 虞美人 乾薑 甘草 豆蔻各四分 桃仁去尖皮熟附子炮各五分 右二十一味擣篩蜜和丸如梧子以燙水服三丸至五丸如不利更服以利為度此方甚驗人久不傳忌海藻菘菜豬肉冷水生葱薑等生血等物

通接此方

必效玉壺丸主萬病與麝香丸同效方 雄黃研硃砂研巴豆去心皮熟附子炮去皮特生譽石燒半日研藜蘆各三分桂心分四大黃分二 右七味擣篩蜜和丸如梧子飲下十五丸以意增減之常令漸瘳甚效

又五補七宣者麗正殿脩書學士李公所傳公名子昭字雲卿趙郡人幼志道法以棲名山往來茅嵩山經三十載云五補七宣丸方 人參 茯苓 地骨皮 乾地黃 牛膝等分 右五味擣篩蜜和丸如梧

子空腹以酒飲下三十九稍增至五十九日再此是五補丸服至五日十日及半月日覺氣擁卽服七宣丸服經二三日覺氣散還服五補丸若病候未退卽稍稍增之常自審以取調適終須五補及七宣丸並須合服之夫人所疾皆因風不宣散卽成擁緩熱風若氣不流行卽成痙攣冷氣轉生衆病皆因此由尋其本源都為不閑將理覺虛則補覺風氣擁卽利利卽腰背更虛且凡是利藥皆急服便透過未能薦潤諸病凡是補藥皆滯服未見效先覺風氣發動明知宣補必藉兼行故其人授余二法名曰五補七宣所以安七魄鎮五藏堅骨髓養神明久服長生百病日去髮黑行及奔馬

又七宣丸方 大黃十五兩 枳實炙五兩 青木香 柴胡 藥梨勒皮各五兩 桃仁六兩去皮熬 甘草四兩炙 右七味擣

篩蜜和丸如梧子以酒服二十九稍加至五十九病在下空腹服病在上飲後服之以宣利為度增減以意量之若風氣結聚宿食不消兼沙石皮毛在腹中服經七八日乃盡出下似牛涎魚腦等若病深痼則須半月或一月專服之不用五補丸若積年腰膝疼痛寒冷如冰石腳氣衝心憤悶將死頭旋暗倒肩背重悶心腹脹滿胸膈閉塞風毒腫氣運及頭面及大小便或利澀脾胃氣不理不能飲食夜卧脚轉筋脈掣痛恍恍然眠寢不安等疾以飲服之盡差此藥功效不可盡說如前十數種病則須服七宣丸自外輕病不妨與五補丸兼服循環不輒補養無限不問男女老小並可服餌但須量氣力細察候之加減服之是初生孩子可與三丸五丸稍稍加之取通利其二方當須經久常服不限春秋冬夏朝夕行止勿間藥性甚善禁如常法

近效大麝香丸療積年心痛尸疰蠱毒癥氣承心肋下有塊溫瘴毒氣精魅邪氣或悲或哭蛇蠍蜂蟻等方 麝香研牛黃研藜蘆炙硃砂研芍藥 當歸 茯苓 桔梗 鬼箭羽 金牙研烏頭炮桂心

吳茱萸

貴興各

一雄黃半分研乾薑

人參

大蟲骨各二分炙

蜈蚣二寸去足斷去牙

巴豆二十粒去心皮熬

右二十一味擣篩蜜和丸如梧桐子飲下三丸如未下以熱飲投之卽利三行後以酢飯止之卽定然後煮飯葱薤食之忌冷水猪肉如蛇蠍蜂蟻取一丸研和塗之卽差精魅狐狸之屬拋磚瓦或如兵馬

行夜發者是鬼魅無早晚每日服二丸只三兩日卽定仍每日燒一丸熏身體衣服無忌以三五丸用
紺絹袋子盛帶左臂上辟大蟲毒蛇精魅鬼氣等病

又犀角丸療癰腫腸癰乳癰發背一切毒熱腫服之腫膿化為水神方

犀角

二分川升麻

黃芩

防

風人參當歸黃耆

乾薑一作蓼實一方

黃連甘草

炙梔子

各四

大黃

五巴豆

二半四枚

去心皮熬

右十四味如法擣篩蜜和更搗三十杵丸如梧子以飲服三丸至五丸以利為度或不利投以熱飲如利以冷漿水粥止之未差每日服一丸以意量之腫消散為度若下黃水或腫輕皮皺色變即是消候忌如藥法效驗不可論之

又黃連丸療癰無問冷熱並主之方 黃連一兩茯苓二兩阿膠一兩右三味擣篩以水消膠和衆手丸暴乾有痢空腹以飲下十五丸日再以差止甚效

又加減麻仁丸療積年患氣不能飲食兼食不消化風氣冷氣衝上疫癖氣並乳石氣發動並療之服經三四日自覺有效方 蜀大黃錦文者四兩人參 大麻仁各二兩荊梨勒皮四兩右四味擣篩依法以蜜

和丸每服十九二十丸增減以意量之以溏利病除亦不損人雍州王長史常服三十餘年八十歲萬病皆無百無所忌補理腰腳服經七八日腰腎先冷者卽下膿水腰腳輕健以酒飲下之並得

又三黃丸療五勞七傷消渴不生肌肉婦人帶下手足寒熱主一切熱方 春三月用

黃芩

四兩

大黃

二兩

秋三月用

黃芩

六兩

大黃

一兩

冬三月用

黃芩六兩大黃兩黃連三兩右三味隨時月擣篩蜜和丸如梧子日服七丸諸病悉除

古今諸家散方六首

通接此方
子金翼無由跋有虎
枝分兩亦不同
尚德接善

千金小金牙散療南方瘴癘瘦氣脚弱風邪鬼注方 金牙五分牛黃一分天雄 草薢 黃芩 蜀椒
汗由跋 雄黃研硃砂研烏頭 桂心 莪草炙麝香研各姜蕤二分細辛 屋角屑乾薑各三錢蜈蚣一枚
長六寸 黃連四兩右十九味治下篩為散合牛黃麝香搗三十杵以溫酒服五錢七日三夜二以知為

通按今本
千金翼紫
雪方中無
石膏寒水
石金用一
升斤丁香四
升麝香半
兩餘同
尚德按千
金翼今本
無寒水石
石膏一味
硝石安得
成霜雪觀
此方後注
蓋翼舊
本脫之耳
通按此方
麝香雖無
分兩當與
本味可也

度以絳袋盛男左女右帶一方寸匕省病問孝不避夜行塗真人中辟鬼惡毒氣晨昏霧露亦塗之佳
崔氏五香散療疰忤邪氣或熱或寒時氣在骨節間似差似劇兼主百病方沉香丁香麝香薰
陸香鬼箭羽當歸豆蔻仁各四牛黃鬼白橘皮金牙各三犀角屑羚羊角屑大黃各六

升麻桔梗桃仁去尖光明砂研安息香各二日再服病差即停亦可蜜丸如梧子服十九

又備急散瘡卒中惡心痛脹滿欲吐短氣方大黃二桂心四巴豆一分皮熟研右三味搗篩為散取一錢
匕以湯七合和服當吐下卽愈甚妙

紫雪散療脚氣毒遍內外煩熱口中生瘡狂易叫走及解諸石草藥毒發邪熱卒黃等瘡痘毒癟卒死溫
瘧五戶五注心腹諸疾腋緩刺切痛鹽毒鬼魅野道熱毒小兒驚癇百病方尚德按此方已見第十八

卷中又有滑石磁石升麻

黃金一百寒水石

石膏各三斤一立參斤羚羊角屑犀角屑況香青木香各五

丁香八兩甘草八兩

右十味切以水三斗煮取一斗去滓取硝石四升芒硝亦可用朴硝十斤投汁中微火煎以柳木篦攬

勿住手候欲凝入盆中內硃砂三兩麝香一兩急攬卽成霜雪紫色以水和一二分服之以意加減一

劑十年用之神妙脚氣乳石天行熱病等服之若神

千金翼有磁石三斤滑石一斤升麻一斤
丁香用四兩朴硝用四升麝香用二分

仙人鍊絳雪療一切病肺氣積聚反逆嘔吐膿血丹石毒發天行時氣一切熱病諸黃疸等心風昏亂心
怯健忘四肢煩熱頭痛眼赤大小便不通煩悶不安骨節疼痛赤白痢血痢熱毒癟宿食不消化心腹脹
滿出氣不得下一切諸毒藥腳氣等飲酒多醉困久痢不差孩子驚癇等以上和水服之產後一切諸病

墮胎和酒服之方朴硝升麻各三
大青桑白皮槐花各二犀角屑各一
蘇方木斛竹葉口

詞黎勒山梔子三十
檳榔仁二十
硃砂半大
研
右十三味以水二斗瀆一宿煎去一斗去滓入鍋內
朴硝鑄煉攪勿住手候欲凝出於盆中攬入硃砂麝香訖雪成收於磁器中密封有疾量取之和水服
之以利病除身輕目明四肢調適療一切病神驗老小量之

上云入硃砂屬
香未見分兩

近效腎瀝湯煮散主除風下氣彊腰腳明耳目除痰飲理榮衛永不染時氣諸風疾方 黃耆 茄葉

茯苓 五味子 防風 澤瀉 獨活 立參 人參 牛膝各六兩

麥門冬去心地骨皮各八兩 桂心 甘草

草三兩 丹參五兩

右十五味切如大豆分作二十四貼貼著生薑一兩切杏仁十四枚去尖碎以水三升煮一貼取一升去滓澄清取九合頓服每日一貼晚間以氣下心胸空妙十服以後身力不可當常須護惜將養之以飲食補之每年春夏秋冬服一劑勝服腎氣丸二十劑永不患風氣先有諸病自然

除差張中丞自服以來神效不可言以為乳石力不可比今服不闕效驗妙方云腎瀝湯恐須用猪腎湯煎

古今諸家膏方四首

廣濟祐明膏主諸風頑痹筋脈不利療癬諸瘡瘍方 前胡 白朮 白芷 茄葉切椒去目吳茱萸各一升

附子三十枚當歸

細辛 桂心各二兩切

右十味以苦酒漬一宿令浥浥然以成鍊

豬膏一斗微火煎

十沸以來九上九下候附子白芷色黃絞去滓膏成病在外摩之在內以酒服棗核大芥瓣等瘡皆療之並去諸風病亦摩折傷被打等服之亦大療諸病

崔氏陳元膏會稽太守思翊昧死再拜上書

皇帝陛下思幸得典郡視事六年處地下濕身病苦瘳飲

食衰少醫療不差命在旦暮蒼梧道士陳元賣藥於市思取藥摩之日至再十五日平得思男嘗隨馬苦

為腰痛天陰雨轉發思取元膏摩之復愈思妻年四十五苦心腹積聚得病三年思復從元取膏摩之六

日下宿食即愈思銓下郭少苦頭眩思取膏摩三日鼻中下水二升所病即愈思知元藥驗謹取元本方

奉上 當歸三兩一方

生地黃二斤搗附子三兩

細辛二兩桂心一兩

天雄三兩乾薑二兩

丹砂一兩

芍藥二兩雄

黃半斤烏頭兩苦酒升

白芷一兩松脂半斤

不中水猪脂去滓

十斤鍊

右十五味㕮咀以地黃汁苦酒漬一宿

取猪脂內諸藥微火煎之令十五沸膏成去滓內硃砂等末熟攪勿令婦人難

孝子惡疾不具足人

小兒等見有人若胸脇背痛服之七日所下狀如雞子汁者二升卽愈又有人苦脇下積聚如杯摩藥

十五日卽愈又有人苦脣傍氣如手藥摩之去瓜中黃壤者升許卽愈有人患腹切痛時引背痛數年

下並同久異同分兩亦同翼與此尚德接若

疑當作人
又接于金
翼去字下
有如字皆
作腸

以膏摩之下如蟲者三十枚卽愈又有婦人若月經內塞無子數年膏摩少腹並服如杏子一枚十日下崩血二升卽愈其年便有子又療風搔腫起累累如大豆以膏摩之五日卽愈老少患脚膝冷痛摩之五日便愈又有人若頭項痛寒熱瘰疬頭及病上卽愈又有人患面目黎黑消瘦是心腹中病服藥下如酒糟者一升餘卽愈內外諸風及腹中積聚可服之百病無不愈所療人無數不可悉記

又烏膏療一切瘡引膿生肌兼殺瘡中蟲方 烏麻油升黃丹半兩上好者二兩羅之 蠟一兩銖 薑陸香乳頭者一兩末 松脂半升大升兩升各一升 右五味緩火煎油三分減一下鑄待冷乃內黃丹更上煎之又三分減一又停待冷次

內薰陸香末上火煎候銷盡又內蠟及松脂看膏稍稠卽點於鐵上試斟酌硬軟適中乃罷先問所患瘡如熱卽除薰陸及松脂瘡如久不差此涉於冷卽依方合其貼杖瘡者油若一升地黃汁半合和煎

黃丹二大兩蠟一小兩餘準上法此膏不須硬也

通按生乳
一作牛乳
然無地
食槽之牛
疑悞

近效蓮子草膏療一切風耳聾眼闇生髮變白堅齒延年本是婆羅門方 蓮子草汁升生巨勝油 生乳各一升不食槽者一升 右四味和於鍋中煎之緩火熬令魚眼沸數攪之勿住手看上沫盡清澄濾不津垍器中貯之云本方有青蓮蕊六分龍腦花三分鬱金香二分並末先煎諸藥三分減一次下汁及油等膏成每欲點卽仰卧垂頭牀下一孔中各點如小豆許久乃起有唾唾却勿咽之起訖即啜少熱湯飲點經一年白髮盡黑亮處並出韓庶子處得每用驗

古今諸家皆煎方六首

廣濟阿魏藥煎方 阿魏分四豆蔻仁七顆細研生薑十二分 人參 甘草各八分 麝甲十二分 藕汁二升 藥勒去核七枚 牛膝半斤 白蜜半升 地黃汁二升 右十一味下地黃等汁煎次下藥末微火煎攪勿住攪候如餳於不津器盛

每取一匙酒和服之

又鹿角膠煎療五勞七傷四肢沉重百事不任怯怯無力昏昏欲睡身無潤澤腰疼頑痹脚弱不便不能久立胸膈脹滿腹中雷鳴春夏手足煩熱秋冬腰膝冷疼心悸健忘腎氣不理五藏風虛並悉療之方

鹿角膠二斤擣碎作四分於鍋中熬令色黃紫蘇子升研濾取汁生地黃取汁生薑汁一斤黃牛酥升白蜜三斤右六味先煎地黃汁蘇子汁生薑汁等二十餘沸次下酥蜜又煎三五沸次以蜜並膠末下之攪令相得膠消盡

煎即成矣以器盛之空腹以酒調二合服之日再此藥補五藏益心力實骨髓生肌肉理風補虛耳聰目明腰脚甚效驗一兩劑彊健披覽十倍常時忌羊血

又主冷氣益氣力溫中下氣蒜煎方

剝了蒜仁牛乳升牛膝一斤末右三味以蒜內牛乳中煎之候蒜

消盡攪勿住手下牛膝末煎成於器中貯之食前以酒和兩匙服忌羊血

又地黃煎主婦人丈夫血氣勞晝熱日漸瘦悴方

生地黃汁升甘草炙三兩棗心升葱白切一升牛酥半斤藕

汁升白蜜一升右七味以小便六升煮葱政等取二升絞去滓次下地黃藥汁更煎取三五沸下酥蜜

攪勿住手候似稀錫以器貯之每服一匙漸至三匙成煎桑枝熬煎湯調和服之尤妙桃仁湯亦良

小品單地黃煎主補虛除熱散乳石癰疽瘡癥等熱方 生地黃隨多少取汁於銅鉢中重湯上煎勿蓋釜令氣得泄煎去半更以新布濾絞去麤滓入煎令如錫成矣此用地黃須肥大味濃者作煎甘美

東南地黃堅細味薄作煎鹹不美

近效地黃煎療肺氣欬嗽補心肺令鬚髮不白方

生地黃汁升麥門冬汁五升生薑汁合五升紫菀

目母

欬冬花

甘草炙各三兩右七味切以水七升煮取三大升去滓却入鍋中下地黃汁麥門冬薑汁等三

十沸下蜜一升煎如錫成矣盛不津器中冷含如棗許增加量之一方有人參三兩

古今諸家酒一十二首

並代茶飲

千金天門冬酒療五藏六腑大風洞泄虛弱五勞七傷癥結滯氣冷熱諸風癆惡疾耳聾頭風四肢拘攣

癇退歷節風萬病皆主之久服延年輕身齒落更生髮 天門冬與百部相似天門冬味甘兩頭方百部細長而味苦令人利右一

味擣取汁一斗漬麵二升以糯米二斗候麵發準家醞法釀之春夏極冷下飯秋冬稍溫如人肌下飯

酒熟取清飲一盞常令酒氣相接勿至醉吐慎生冷酢滑雞豬魚蒜特忌鯉魚亦忌油膩此是一斗法

尚德接處
字下千金黑
有白更黑
方四字

又按千金
灑作澣洗
字下有去
字皮字下
有乾渡去
二字

餘一石二石亦準此以為大率服藥酒十日覺身體隱形大癢二十日更大癢三十日乃漸止此是風氣出去故也四十日即覺身心朗然大快似有所得五十日更覺大快當風坐卧覺風不著人身中諸門冬汁法淨洗心皮水寸切搗押各三四遍令滓乾如草乃止此酒初熟味酸仍作臭泔腥氣但依式服之久停則香美餘酒皆不及也封四七日佳凡八九月即少少合至十月多合擬到來年五月三十日以來相續服之春三月亦得合入四月不得合服酒若得散服得力倍速散服如左天門冬去心及皮暴乾搗篩以上件酒服方寸匕日三加至三匕久服長生凡酒亦得服

尚德按金茯神茯苓苦辛狗脊各二兩蔓荆子人作牡荆子參丹參牛膝各三兩

金牙燒一斤白朮附子側子天雄蕤伏神當歸防風芎藭黃芩各二兩

薯蕷細辛桂心茵芋地骨皮五加皮杜仲草薢狗脊姜蕤白芷厚朴枳實炙桔梗黃芩遠志法蔓荆子各三人參二兩獨活半斤石南二磁石燒丹參牛膝各五薏苡

仁升麥門冬去心生石斛八生地黃切二兩龍頭四兩

右三十九味並切用絹袋盛以酒八斗漬七日溫

服一合日四五夜一石藥細研如粉別絹袋盛共藥同浸藥力安和主治極多凡是風虛四體小覺有

風病者皆須將服無不治者服者一依方合之不得輒信誣人大言浪有加減忌如常法

又鍾乳酒療虛損通順血脈極補益下氣方鍾乳碎附子泡石解伍甘菊花三莢蕊伍右五味

剉以生絹袋盛用酒三斗漬經五日每服二合日再稍加至一升

千金翼五精酒主萬病髮白反黑齒落更生方黃精四天門冬去心松葉斤白朮斤枸杞五斤右五

味皆生者內釜中以水三石煮之一日去滓取汁清翫如家釀法酒熟取清任性飲之長年補養忘鯉魚桃李雀肉等

又白朮酒方白朮五斤右一味㕮咀以東流水兩石五斗於不津器中漬之二十日去滓內汁於大

盆中夜候流星過時抄己姓名置盆中如是五夜汁當變如血取以清麵如家醞法造酒熟取清任性飲之十日萬病除百日白髮反黑齒落更生面白有光澤久服長年忌桃李雀肉等此酒至誠有靈風病服之百神衛人

尚德按千
金翼少作
石半作二
熱作熟

又枸杞酒方 枸杞一百

右一味切以東流水四石煮之一日一夜去滓令得一石汁漬麵釀之如家醞法酒熟取清置不津器中取乾地黃桂心乾薑商陸澤瀉蜀椒末各一升六味以絹袋盛內酒中清密封口埋入地三尺堅牢覆上二十日沐浴整衣冠向仙人拜訖開之其酒當赤如金色平旦空腹服一盞半升為度十日萬病皆愈二十日癩痕皆滅惡疾人以一升水和半升酒分為五服服之即愈若欲食少者取河中清白石如棗杏仁大者半升以水三升煮一沸以酒半合置中須臾即熱可食也

崔氏蒼耳酒

療大風惡疾及一切諸風乃至骨髓中毒風令人充悅方

蒼耳

白鼠粘根斗

右五物皆剉訖量之以水兩石五斗煮取六斗汁如釜小可分煮

松葉

牛膝根一升

商陸根二升

色者

和葉花實取

升

之即分三斗汁將浸麵一斗二升高量其麵加於常法五分為藥力費麵故也餘三斗汁留將拌餽料

糯米

一石二斗分作五鍤淨淘乾灑以上並大斗第一鍤一日炊四斗米取藥汁九升拌餽熟細切生

地黃三斗和米下之第二鍤三日炊三斗米取藥汁七升拌餽熟與杏仁一斗去皮尖碎和擣如泥下

之第三鍤五日炊二斗米取藥汁六升半拌餽熟取木麻子一斗擣碎和下之第四鍤七日炊二斗米

取藥汁四升半拌餽熟取胡麻一斗擣碎和下之第五鍤九日炊一斗米取藥汁三升拌餽下之

右以前五鍤法須候米消盡即炊鍤之未必要須隔日其酒如米少味薄更炊一二斗米下之使味足然

後去糟取清依常法飲半升不能者可量性多少常使有酒氣逼夜飲最是所宜此酒縱非風疾飲之

補養益精神令人充健

又烏麻地黃酒

療風虛補不足除百病已試大效方

六月六日

麴四升

王斯油

麻六斗

升出

州赤

色者是

如無別用臣

勝替之以脫去皮乾暴脫烏麻法以冷水浸經一宿出之置箆箕中漉水令盡春之即皮自脫去耳

生地黃四斗

冷熱湯洗待水氣盡便切之更取生地

黃一石以水一石和煮粗布絞去滓即取汁

六斗又以蠶及麻子莖瓮內蒸之丹參 生石斛 牛膝 杜仲 草薢 生薑各二人參兩

斤

右七味

之令既前三味總內瓮中浸之

丹參

生石斛

牛膝

杜仲

草薢

生薑各二人參兩

一切以生絹袋盛同內前件熟地黃汁瓮中浸封閉七日外更取烏豆四大斗摩使光淨分作四度微熬

令香取無灰重醞酒二斗八升三度淋豆豆一熬三淋淋訖並去豆總計十二度淋豆取淋酒別器中

盛然後更寫麴汁等物及諸藥並出在大瓮中以物閉頭及更將此酒先重蒸瓮者冷暖還內麴汁及

藥等安在瓮中其日即用八斗精糯米炊作飯如常釀酒法釀酒即以淋豆酒投在瓮中封閉經一兩

宿者米消盡又炊四斗糯米飯釀之此後更封閉經七日其酒即熟任性飲多少量之不限時候常微

微覺身潤夜中稍加少許或汗出佳避風及忌房室持禁毛桃芥生菜熱麴並酢蒜牛肉冷物醞初酒

法待此酒熟即將此更重醞 右麴依當家常用法每一斗麴用熟水一斗一升浸炊酒飯即量熟湯

多少用沾飯如凡釀酒法更不得加生水每一斗米酒為佳釀重醞酒法待此酒熟即將酒二斗八升

淋豆 右每一斗麴以熟水一斗浸其酒米每一斗餌料以四斗清酒淋其餌然後炊飯使熟更不得

加水其所洗瓢洗手盆瓮等皆須用此酒還投釀瓮中釀藥酒法石欲和藥酒時先置五斗許藥在瓮

底然後加五斗許飯每次如此斟酌至半即內藥袋其藥袋上亦使藥飯相參以至於盡然始閉封

封閉藥酒瓮法 右封閉瓮頭用紙火重布一重其釀酒室唯造酒得入自外貓犬婦人不得輒入室中

又枸杞酒療五內邪氣消渴風濕下胸膈氣頭風本方作痛堅筋骨彊陰利大小便填骨髓長肌肉破除結氣

五勞七傷去胃中宿食利耳目衄血吐血風證補中逐水破積瘀膿血石淋長髮傷寒瘴癘毒氣煩燥滿

悶虛勞喘吸逐熱破血及脚氣腫癰悉主之方 糯米一石黍米亦得麴計常釀酒米一石用麴一斗枸杞根十二

斤刮去赤皮半寸剉之以水生地黃二十斤洗去土秋麻子三斗杞湯取汁一石煮以枸杞 香豉二斗以杞湯取汁 右四

味地黃和米蒸之三物藥汁總合得五斗地黃濕即四斗分半漬米餌半及麴和釀飯即總和一釀密

蓋瓮口經二七日壓取封泥復經七日初一度一釀用麻子二斗多即恐令人頭痛服酒忌生冷醉滑

難魚麵蒜油白酒房室等服訖一二七日將息

又地黃酒療虛羸令人充悅益氣力輕身明目方

雍州高長史服用效

生地黃一石二斗

取汁四斗

杏仁一斗去皮兩

人者熬令黃搗

末

大麻子一斗熬末

糯米一石

暴乾

麵一斗五升淨

刮熟乾細剉

右五味先以地黃汁四斗清麵待發炊米二斗作飯冷

暖如人肌酸麵汁中和之候飯消更炊米一斗

杏仁麻子末各一升二合半一依前法酸之如此凡八酸訖待酒沸

定封泥二七日取清溫服一升漸加至二升日再服之

令人頓能食久服去萬病婦人服之更佳令人

有子

近效五加酒方

五加根莖

細剉五斗

六月六日

麵末三

黍米一石

糯亦得

右三味以水五斗共五加同下於大

釜中以木度深淺與水平赴之即更添水一石五斗並前計兩石即下火煎旋急火取藥汁減下至
木尅處即得以火盆安淨筐筐中安淨布單兼滓瀝著筐中其汁在盆中唯有五斗且別盛密封蓋之
又重取所瀝者五加滓以水煮之如別有五加添和同煮更佳取此汁用洮米拌飯炊之如常炊法用
前五加濃汁潰麵且炊米五斗釀之餘五斗分為兩般如常造酒法酒熟壓瀝密封頭每服一盞煖飲
之漸加勿令醉又遠志十兩末之下釀中益妙玄參及蛇皮肉亦得其糟與已下食之尤佳

又代茶新飲方

黃耆

通草各二

茯苓

乾薑

葛各一

桑根白皮一

鼠粘根

三斤漏加一片

生乾地黃

枸杞根

沈思冬十二月採枝莖葉陰乾濕加五兩

薏苡仁各十

茯苓八

麥門冬

法姜桂各五兩

右十四味並擇擇取

州

土堅實上者刮消如法然後秤大斤兩各各別擣

以馬尾羅篩之擣令勻調重篩務令相入不令偏並

別取黃白楮皮白皮根相兼細切煮取濃汁和瀝令硬軟得所更於臼中擣別作一竹捲子圍闊二寸

半厚二分以下臨時斟量大小厚薄作之此亦無定形手依摸捻成餅子中心穿孔日暴乾百餘餅為

一穿即以葛蔓為繩貫之竹作箋亦得掛之通風陰處妙若須煮用以炭火上炙令香熟勿令焦臼中

擣末任隨時取足煎以代茶大都濃薄量之著少鹽煮之頻揚之即滑美著鹽糯皮華撥亦佳除風破

氣理丹石補腰脚聰耳明目堅肌長肉煖筋骨通腠理頭腦閉悶眼睛疼痛心虛腳弱不能行步其效

通按此門
共六方三十首

八首

不可言若患腳氣肺氣疝氣欬入口即愈患消中消渴尤驗主療既多不復一一具說但服之立取其驗禪居高士特宜多飲暢腑臟調適血脉少服益多心力無勞餓飽飲之甚良若臘月臘日合之十年不敗

解飲食相害成病一百件

尚德按今有食忌九十四件論四首方三十二首

肘後凡飲食雜味有相害相得則益體害則成病以此致疾例皆難療所以病有不受藥療必至於死也今略疏其不可噉物不須各題病名想知者善加慎之諸鳥獸陸地肉物忌法 白犬血腎不可雜白
肝雞肝白鵝
白羊肉不可雜雞肉
犬肝不可雜烏鵲肉
狗兔肉不可雜雲不可合羊肝
豬肉不可合烏梅食一隻
魚及白雞心食白馬黑頭者不可食
麋肉不可合蝦
蠆及蝦生食菜慶脂梅李食麋肉不可合烏梅牛腸不可合犬食白馬青蹄肉不可食
白猪白蹄青爪斑不可食雞有六翮不可食
烏雞白頭不可食白脂不可卧狗不可合生白馬黑頭者不可食
食之殺人鹿可食不食猪肉不可合狗不可合牛羊不可合狗不可合牛
人不可暴脯不堪燥及大炎不動自自動及酒自竭祭肉自死口不開翼鳥獸被燒死不可食山不可食熊
食見水面動者不可食祭肉並不可食食也鳥獸不可食山不可食病人肉及猴肉

羊肉不可合雞

半夏菖蒲忌食

雞子不合法

羊內肉食之

忌

不食

白豆蘆筍

商陸犬肉

細辛桔梗

忌食

不見

忌

常山忌食

天門冬忌食

鯉魚黃連桔梗

不見

忌

胡蘿蔔

荳蔻

忌食

不見

忌

常山忌食

天門冬

鯉魚黃連桔梗

不見

忌

胡蘿蔔

荳蔻

忌食

尚德按殺人下肘後人有方字

尚德按殺人下肘後人有方字

又療中虛令不能飲食食則不消羸瘦四肢尪弱百病因此而生方 薑白朮枳實三兩大棗一枚粳米半升合豉合

二升

合

豆豉

半升

麥蘖

五升

熟

麥蘖

一升

熟

杏仁

一升

皮熟

右三味搗篩蜜和末食後服如彈丸一枚漸增之

又方 大黃 芍藥 芒硝各一 右三味末之以蜜三斤於銅器中湯上煎可丸服如梧子十九日再

尚德按附

後鹽一彈
右揭蜜和日

如彈丸日
三服

尚德按附

後得字下
有穀勞二字
字卧字下
有食畢飄
薰三兩有
甚四字乾
薰一兩有
尚德按附

又方 麴熟一斤 吳茱萸升乾薑兩 右三味搗為末服方寸匕
又療脾胃氣弱穀不消兼不復受食方 大麻仁半大豆黃二升並
加服

右二味搗篩以飲服一方寸匕漸

大麥蘖熟一升 乾薑兩

右二味搗篩為末服方寸匕

燒地令極熱即

激薄覆取汗愈

深師療食飽煩悶但欲臥而腹痛方

麴熟黃

右一味搗為末服方寸匕

大麥蘖亦佳

千金翼

凡六畜五藏者草自動搖及得醉鹹不變色

凡飲食有毒澆地地噴人

凡不池者皆殺人也

凡熟肉

肉在器中蓋密氣

脯肉

凡熟肉

鹽一兩
尚德按附

後得字下
有穀勞二字
字卧字下
有食畢飄
薰三兩有
甚四字乾
薰一兩有
尚德按附

鹽一兩
尚德按附

後別方療之

又療之方

常山四兩白鹽二

右二味以水一斗清之一宿以月盡日清之月一日五更以土釜煎勿令

奴婢雞犬見之煮取二升平旦分再服服訖少時即吐以銅盃盛之看若色青以杖舉得五尺不斷者

初得俚人毒藥未得餘藥且令定方

生薑兩甘草三兩

右二味以水六升煮取二升平旦分二服訖

即藥未盡一二日後更進一劑

又方 都琳藤十二兩此藥嶺南有土人識俚人呼為百兩銀藥甚細長有高三尺微藤生切

俚人呼為黃藤

右一味以水一升酒二升和煮取二升分三

服服訖藥毒逐大小便出十日慎毒食不差更服以差為度

黃藤附後云無

又療腹內諸毒方 都琳藤 黃藤各二虎口長

右二味以酒三升合釀中密封以糖火圍四邊燒令

尚德按鴻
肘後作鴻

三沸待令出之溫常服令有酒色無禁忌若不獲已欲食俚人食者先取甘草一寸炙令熟嚼咽汁若食著毒藥即吐便是藥也依前法療之若經含甘草而不吐非也宜常收甘草十數片隨身帶之自防

也嶺南將熟食米及生食甘蔗巴蕉之屬自更於火上炮炙燒食之永無慮也若被席上散藥卧著因

汁入肉最難主療可常自將淨席隨身及匙筋甘草解毒藥行甚妙

黃藤無

張文仲白黍不可合食黍米不可合食不可合食

白蜜不可合食黍首食病人及育花黃花菜不可食

胡荽莢芥菜并鷄子五

月勿食十月椒勿食生菜五月勿食生菜七月勿食生菜八月勿食生菜九月勿食生菜十月勿食生菜十一月勿食生菜十二月勿食生菜

生菜花黃花菜勿食

正月勿食生菜二月勿食生菜三月勿食生菜四月勿食生菜五月勿食生菜六月勿食生菜七月勿食生菜八月勿食生菜九月勿食生菜十月勿食生菜十一月勿食生菜十二月勿食生菜

月勿食十月椒勿食生菜五月勿食生菜七月勿食生菜八月勿食生菜九月勿食生菜十月勿食生菜十一月勿食生菜十二月勿食生菜

生菜花黃花菜勿食

正月勿食生菜二月勿食生菜三月勿食生菜四月勿食生菜五月勿食生菜六月勿食生菜七月勿食生菜八月勿食生菜九月勿食生菜十月勿食生菜十一月勿食生菜十二月勿食生菜

食馬肝中毒方 取牡鼠矢二七枚兩頭尖者是水和研飲之

仲景同

又食諸六畜鳥獸肝中毒方 取髮翦之長半寸投土作鴻沾二升合和所剗髮飲之須臾髮皆貫所食

通按誤食髮雖成癥此和土漿亦或取其立方者有必定見況內經此方則可謂無是理

肝出也謹按髮誤食之令人成髮癥為病不可療今和髮土飲之豈得有此理否可詳審之別有方法

仲景同

也尚德按鴻沾即

非地漿也

又方 服頭垢一錢亡立差

仲景同

又方 清水投豉絞取汁飲數升差止

又凡物肝臟自不可輕噉自死者彌勿食之

諸心皆勿食之為神識所舍使人來生獲報對又食生肝中毒方 服附子末方寸七日三須以生薑湯

服之不然自生其毒

字上疑脫

謂無是理

尚德按鴻沾

附過矣

尚德按鴻沾

又字又食
以下疑當
揭書

又禽獸有中毒箭死者其肉有毒可以藍汁大豆解射罔也

又食鬱肉及漏脯中毒方 取大矢燒末以酒服方寸匕

茅屋溜下沾脯為漏脯並有大毒

又食黍米中藏乾脯中毒方 濃煮大豆汁飲數升即解兼療諸肉及漏脯毒

又食自死六畜諸肉中毒方 搗黃柏末以水和方寸匕服未覺再服差

又凡六畜自死皆是遭疫則有毒人有食疫死牛肉令病洞下亦致堅積者並宜以利藥下之良

又食諸菜肉脯中毒方 燒猪骨搗下篩水服方寸匕日三四差同金

又方 燒笠子末服方寸匕日三

又食馬肉洞下欲死者方 政一百 杏仁二十枚

右二味合於炊飯中蒸之搗丸服之至差同仲景

辨魚鼈蟹毒不可食及不得共食

豆湯或是
無甘豆後
解毒方中
有甘草大
頭垢至此
皆本仲景
方也

通接本草
解毒方中
豆湯或是
也

尚德接繪
肘歌作膾

又接自要
略作目

又食食蟹及諸肴膳中毒方

濃煮香蘇飲汁一升解本仲景方

又人有食蟹中毒煩亂欲死服五蠶黃丸得吐下皆差夫蟹末被霜多毒熟煮及可食之或云是水良所為彭蜞亦有毒蒸謀食之幾死

又療食諸麁臚百物毒方

取貝齒一枚含之須臾吐所食物差

千金

又方

擣韭汁服一升冬以水煮根服

千金云

服數升

又方

掘廁傍地作坎深一尺以水滿坎中取故廁糞十四枚燒令燃以投坎中乃取汁飲四五升即愈

千金同

又詣餌食直爾何容有毒皆是以毒投之耳既不知是何處毒便應煎甘草薺羌湯療之漢質帝食鮑魏任城王歟喪皆致死即其事也

食魚中毒及食鱠不消方五首

通接繙鵝
鮫二音郎
鮫魚也今
名沙魚

古今錄驗療食鱠傷毒欲死方

取鮫魚皮燒之無皮壞刀裝取燒飲服之鮫魚皮也食諸鮑魚中毒

亦用之
同金

千金療食魚中毒方 烹橘皮停冷飲之

通接此方
仲景有橘
皮一兩

又療食魚鱠及生肉住胸膈中不化吐不出便成癥瘕方

厚朴炙大黃各二

右二味以酒二升

按千

金用煮取一升頓服立消人彊者倍大黃用三兩酒取二升再服

通接前食
魚中毒方
仲景方也
此解毒數
門多本仲
景方

肘後療食鱠過多冷不消不療必成蟲瘕方 馬鞭草擣絞取汁飲一升即消去亦宜服諸吐藥吐之

金十
按千

同

刪繁療食魚鱠不消生瘕常欲須鱠者方

尚德接餌
疑當作餌

獺骨肝肺 乾藍 大黃各等

蘆根

鶴骨格七

分

桂心

斑貓二十
枚炙

右九味

擣篩蜜丸酒服

十九至十五丸日再差

同
食椒菜瓠中毒方四首

肘後蜀椒閉口者有毒食之戰人咽使不得出氣便欲絕又令人吐白沫並吐下身體冷瘡療方 烹桂

飲汁多益佳又飲冷水一二升又多食蒜又土藥飲一升又濃煮豉汁冷飲之一二升又急飲酢又食
椒不可飲熱飲熱殺人

又療中苦瓠毒方 煮黍穠濃汁飲之數升此物苦則不可食恐作中藥毒也

千金療菌毒方 挖地作坎以水沃中攬令濁名地漿飲之

又療食菜中毒發狂煩悶吐下欲死方 取雞毛燒末以飲服方寸匕差

解一切食中毒方二首

千金論曰凡人跋涉山川不諳水土人畜飲啖誤中其毒素不知方多遭其斃豈非枉橫耶然而大聖久設其法以救活之正為貪生嗜藥忽而不學一朝逢遇便自甘心終不識其所以今述神農黃帝解毒方法好事者可少留意焉

又論曰甘草解百藥毒此實如湯沃雪有同神妙有人中烏頭巴豆毒甘草入腹即定中藥蘆毒葱湯下咽便愈中野葛毒土荊飲訖即止如此之事其驗如反諸掌要使人皆知之然人皆不肯學誠可歎息方稱大豆汁解百藥毒臣試之大懸絕不及甘草又能加之為甘豆湯其驗尤奇有人服玉壺丸吐嘔不已以百藥與之不止藍汁入口即定如此之事皆須知之此即成規更不須試練也解毒方中條例極多若不指出一二學者不可卒知餘方例爾

又療諸食中毒方 飲黃龍湯尚德按此黃龍湯蓋人中黃及犀角汁百無不治也若飲馬尿亦良

又療食飲中毒方 苦參兩右一味切以酒二升半煮取一升頓服之即愈

古今錄驗療諸食毒方 取桑黃心破作一斷著釜中令水出三寸煮取二斗瀝澄清微火煎得五升宿不食服之日三合則吐瘧未差更作羸者減之

酒醉過度恐腸爛及喉舌生瘡方三首

仲景用苦
酒煮取
吐水煎亦
得

千金療卒大醉恐腸爛方 作湯著大器中瀆之令復易之酒自消夏月亦用之佳附同

尚德按十
金飲三升
通按黃芩
千金作黃
芩附後作黃

又方 紓茅根汁飲二升

又療連月飲酒喉爛舌上生瘡方 大麻子一升黃芩二兩尚德按本方作黃芩通以萬黃蒸者何也 右二味搗末以蜜和

尚德按無
附後作蔓

丸含之 飲酒連日醉不醒方九首
肘後療飲酒連日醉不醒方 薰蕎菜並少米熟煮去滓冷之內雞子三枚或七枚調勻飲之二三升無雞子亦可單飲之

通接螺音
會醫編也
非水中物
此字疑誤

又方 取水中螺魄若螺蚌輩以著葱豉板薑煮如常食法飲汁數升即解尚德按今肘後無此方李時珍本草田羸下引肘後云用

水 中 螺 魄 菴 治 痘

又方 撷生葛根汁及葛藤餅和絞汁飲之無濕者乾葛煎服洼乾蒲煎服之亦佳

千金療酒醉不醒方 葛根汁飲一二升無多少取醒止

尚德按十
金云飲酒
令人不醉

方下二方
並同 尚德按葉
字上千金
有花字 尚德按十
金用葱白

又方 小豆葉陰乾一百日末服之日方寸匕良

又方 五月五日取井中倒生草陰乾末酒服方寸匕佳

又病酒方 取豉葱各一升以水四升煮取二升飲之差止

飲酒令難醉方一首

千金飲酒令無酒氣方 乾蕎蕎根二七枚三遍蒸乾末之取兩錢匕飲酒後水服之

飲酒積熱方二首

肘後飲酒積熱遂發黃病方 雞子七枚苦酒漬之器中密封內井底一宿出當軟取吞之二三枚漸至盡驗

千金治飲酒房勞虛受熱積日不食四體中虛熱飲酒不已人百脈心氣虛令人錯謬失常方 酸棗仁半升人參 白薇 枳實火知母 桔梗 芍藥各二錢芩云茯苓云甘草一兩 生地黃八兩 右十味切以

水一斗煮取三升分三服

斷酒方一十五首

千金斷酒方 酒七升著瓶中熟研砂半兩著酒中急塞瓶口安猪圈中任猪喙動經七日取盡飲之永斷

又方 腊月鼠頭灰柳花等分黃昏時酒服一杯

又方 正月一日酒五升淋碓頭搗一下取飲

又方 故槐中莢耳子七枚燒作灰黃昏時煖取一杯酒咒言與病狂人飲勿令知之後不喜飲酒

又方 白猪乳汁一升飲之永不用酒

又方 刮馬汗和酒與飲之終身不飲酒

又方 大蟲屎中骨燒末和酒與飲

又方 鷓鴣矢灰水服方寸匕永斷

又方 故紡車絃燒灰和酒與飲之

又方 驢駒衣燒灰酒服之

又方 自死蟻螬乾搗末和酒與飲永世聞酒名即嘔吐神驗

又方 酒客吐中肉七枚陰乾燒灰服之

又方 酒漬汁鞋著一宿且空腹與飲即吐不喜見酒

又方 白狗乳汁酒服之

服藥過劑及中毒方一十一首

尚德按前
是當作附

通接驢駒
衣是驢胞

前後服藥過劑及中毒多煩悶欲死方 刮東壁土少少以水一二升和飲之良

又方 水和胡粉稍稍飲之

又方 青粳米取其瀋汁五升飲之

又方 捣襄荷取汁飲一二升冬月用根夏月用莖葉

又方 屋審下作坎方二尺深三尺以水七升灌坎中攢揚之令沫出取沫一升飲之未解更作

又方 捣藍青絞汁數升飲之無藍以青布水洗飲之

又方 燒犀角水服一方寸匕

備急服藥失度腹中苦煩方 飲生葛汁良或乾葛煎湯服之附後

又方 雞子黃三枚吞之良又雞子清飲之又服猪膏良

又方 服諸石藥過劑者白鵝矢水和服之附後

又方 大黃三兩芒硝二兩以水五升煮取三升分三服得下便愈附後用地黃汁五升煮不用水

解諸藥草中毒二十九首

肘後療食野葛已死者方 以物開口取雞子二枚和以灌之須臾吐野葛出

尚德按
肘後作人
多二字

又方 取生鵝就口斷鵝頭以血潰口中入咽則活若口不開取大竹筒以一頭注其胸膈取冷水注筒

中數易注之須臾口開則可與藥若甚者兩脅及臍各筒注之甚佳

又方 飲甘草汁但唯多更善

三升服之

又鈎吻與食芹相似而其所生之地傍無他草莖有毛誤食之殺人方 薤莞八兩㕮咀以水六升煮取
此多生蘿井水瀆邊絕似茶人識之無敢食但不知之必是鈎吻按本草鈎吻一名野葛又云秦鈎吻
乃並入藥用非此又一種葉似黃精唯花黃莖葉亦呼為鈎吻不可食故經方引與黃精為比言其形色
相似也

備急療諸藥各有其相解者然難常儲今但取一種而兼解眾毒求之易得者方 甘草濃煮汁多飲之

無不生也又食少蜜佳

又方 煮桂多飲之又服葱涕佳

又方 煮大豆汁服或亦解

又方 煮耆尼濃汁飲之祕方卒不及煮便嚼食之亦可散服此藥在諸藥中並解眾毒

又方 藍青皮子亦通解諸毒可預蓄之急則便用之 凡此諸藥飲汁解毒者雖危急亦不可熱飲之

待冷則解毒熱則不解毒也

集驗療中諸毒藥及葛木死但聞腹中煩冤剝裂作聲如腸胃破斷狀目視一人成兩人或五色光起須

臾不救方 取新小便和清邊久屎一升絞取汁一升頓服氣已絕但絞口與之入腹便活也已死萬一

冀活但敷與屎汁也

又療中藥毒方 取竈中當釜月下土末服方寸匕

千金中百藥毒方 甘草薺尼大小豆汁藍汁及實汁根汁並解之

又中狼毒毒方 白斂鹽藍汁並解之

又中藜蘆毒方 雄蕊汁並解之

又中巴豆毒方 黃連菖蒲小豆蔻汁大豆汁並解之

又中躑躅花毒方 梔子汁解之

又中芫花毒方 防風防己甘草桂枝汁並解之

又中射罔毒方 藍汁大小豆汁竹懸大麻子汁六畜血貝齒屑蚯蚓屎蘿蔓汁並解之

又中半夏毒方 以生薑汁乾薑解之

又中大戟毒方 菖蒲汁解之

又中烏頭天雄附子毒方 用大豆汁遠志防風棗鴆糖解之

又中杏仁毒方 用藍子汁解之

又中莨菪毒方 薈羌甘草升麻犀角蟹汁並解之

尚德按十
金甘草二
分

又解諸毒雞腸草散方 雞腸草生藍子合芍藥分甘草四分薈羌分墳土一升麻分當歸仁右八味
為散以水服方寸匕多飲水佳若為蜂蛇等眾毒蟲蟄以鍼刺螫上血出著藥如小豆許於瘡中令濕
差為射罔箭所中削竹如釘股長一尺五寸以綿纏澆水沾令濕取藥內瘡中隨瘡深淺令至底止有
好血出即差若服毒藥水服毒解痛止愈

又解一切藥發不問草石始覺惡即服方 生麥門冬法葱白各八兩加豉三粒 右三味以水七升煮取三升
半分三服

又療一切諸藥毒方 甘草三兩炙以水五升煮取二升內粉一合更煎三兩沸內蜜半兩分服以定止
又解毒藥散方 薈羌分藍葉花取葉並花陰乾右二味搗末以水和服方寸匕日三

又中毒方 取秦鳩毛二枚燒灰以水服之

千金翼療藥毒不止解煩悶方 甘草二兩白梁粉升蜜四分一升同飲一升尚德按二
粉湯中攬令調下蜜煎令熟如薄粥適寒溫飲一千金
尚德按二
枚千金作二
七枚
疏通寒溫

解諸蛇蟲毒方六首

千金蛇虺百蟲毒方 並用雄黃巴豆並麝香乾薑解之

又蜘蛛毒方 藍青解之

又蜂毒方 蜂房及藍青解之

又斑猫羌青毒方 猪膏大豆汁戎鹽藍汁鹽湯煮猪膏巴豆並解之

又馬刀毒方 清水解之

辨五大毒一首

鳩一作鴟
尚德按證
鴟一名
鴟旦陶隱
居曰狀如
黑信雞

古今錄驗辨藥有五大毒不可入口方經曰夫藥有大毒不可入口鼻耳目即殺人一曰鈎吻生崖二曰鳩狀黑雞生山谷中一名雉三曰除命赤色著木懸其子生山海中四曰海蠻狀如龍赤色生海中五曰鳩羽狀如鶴雀黑頭赤足遇其毒解之則活卒無藥可飲小便

解金鐵等毒方八首

肘後療金毒已死方 雞矢半升淋取一升飲之可再三金云雞子清並
屎白燒豬脂和服

又方 吞水銀一兩即金出

又方 鳴血雞子並解之千金云
及屎汁

又中雄黃毒方 防已解之

又譽石毒方 大豆汁解之千金又云
白鵝膏

集驗療服金屑死未絕者知是金毒方 以水銀一兩寫口中搖動令下咽喉入腹金則消滅成泥即出
可三與服則活

千金解金銀銅鐵毒方 取鴟屎汁解之

又鐵毒方 磁石解之

惡毒瘡氣毒風腫毒方四首

千金療惡氣瘡毒百毒方 用犀角羚羊角雄黃麝香解之

又主喉腫邪氣惡毒入腹方 升麻射干並解之

又主哽腫毒方 用五香紫檀解之


又甘草湯王天下毒氣及山水露霧毒氣去地風氣瘴癘等毒方 甘草二兩右一味以水二升煮取一

尚德按證
鴟一名
鴟旦陶隱
居曰狀如
黑信雞

金云雞子
汁及屎
水淋雞
屎白燒
豬脂和服

升分服

種毒方四首



W 2467 w
1915
v. 31!