

[H] Chinese

15

Vol. XV

v. 36 - v. 38

唐王壽先生外臺祕要方卷三十六目錄

小兒諸疾下五十一門

小兒中風方四首

小兒效嗽方八首

小兒效逆上氣方七首

小兒傷寒方三首

小兒天行方八首

小兒諸黃方四首

小兒諸瘧方九首

小兒眼赤痛方八首

小兒諸淋方六首

小兒小便不通方五首

小兒遺尿失禁方五首

小兒大便有血方三首

小兒大便不通方四首

小兒赤白痢方七首

小兒蠱毒血痢方九首

小兒熱渴痢方四首

小兒疳痢方七首

小兒無辜瘡痢方三首

小兒諸雜痢方四首

小兒忽衄血方六首

小兒齒不生方二首

小兒頭熱盜汗方三首

小兒顛開不合方四首

小兒解頰方二首

小兒月蝕耳瘡方三首

小兒臍中汁出并瘡腫方一十一首

小兒癱腫方二首

小兒丹毒方七首

小兒无瘡方七首

小兒頭瘡方三首

小兒頭面熱瘡方七首

小兒瘰癧瘡方二首

小兒侵淫瘡方三首

小兒火灼瘡方二首

小兒惡瘡方五首

小兒疝氣陰癩方八首

小兒陰瘡及腫方八首

小兒蠶蟲蝕下部方四首

小兒疥蟲方七首

小兒瘰瘡方四首

小兒癬瘡方六首

小兒雜瘡方六首

小兒脫肛方六首

小兒疳濕瘡方六首

小兒蟻蟲及寸白方五首

小兒疥瘡方六首

小兒誤吞物方四首

唐王燾先生外臺秘要方卷三十六

宋朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞簡院上護軍臣林億等上進

新安後學程行道敬通父訂梓

小兒中風方四首

千金療少小中風手足拘急二物石膏湯方 石膏雞子真珠一兩 右藥以水二升煮取五六沸內真

珠煮取一升去滓稍稍分服之

又療少小中風脈浮發熱自汗出項強鼻鳴乾嘔方 甘草炙芍藥 桂心 生薑各一大棗四枚 右五

味切以水三升煮取一升去滓分溫三服忌如常法此張仲景桂枝湯但劑分小爾

又療少小新生中風二物鹽毛散方 鹽毛鬻頭毛一把 生麝香二枚 右藥以乳汁和於銅器中微火上

煎令焦熟出研末之小兒不能飲以乳汁和之於箆竹筒中盛瀉入咽中然後飲乳汁入腹

又療少小新生肌膚幼弱喜為風邪所中身體壯熱或中大風手足驚掣五物甘草等生摩膏方 甘草

防風略 白朮 桔梗略 雷丸二兩 右藥切以不中水猪脂一斤煎取成膏合諸藥於微火上煎

之消息視之凝膏成去滓取如彈丸大一枚炙手以摩兒百過寒者更熱熱者更寒小兒雖無病常以

少膏摩顙上及手足心甚辟風寒良翼同並出第五卷中

小兒咳嗽方八首

小品療少小咳嗽腹脹七物小五味子湯方 五味子碎紫苑略 甘草炙麻黃銜生薑 黃芩 桂心

略一 右藥咬咀以水一升煮取七合分五服忌如常法

又療少小咳嗽晝差夜甚初不得息不能復啼四物款冬丸方 款冬花 紫苑略 伏龍肝分桂心分

右藥搗篩蜜和如泥取如棗核大塗乳頭令兒飲之日三千金

又療少小十日以上至五十日卒得暴效吐乳嘔逆晝夜不得息四物湯方 桔梗 紫苑略 甘草分

尚德按千金鹽毛一把取鬻前交脊上會中取取如手母指大

灸麥門冬七分 右藥切以水一升煮取六合去滓分五服以差為度于金有桂心無桔梗以水二升
五過節哺乳四

又療小兒中冷及傷寒暴效嗽或上氣咽喉鳴氣逆者或惡寒鼻塞清水出紫苑湯方 紫苑 杏仁祛

尖甘草灸 黃芩 麻黃節 橘皮 桂心 青木香 當歸略 一大黃祛 右十味切以水三升煮取九

合去滓一歲以上至五歲兒以意量之分服斤金云兒六十餘日至二百日一服三合餘同

千金療少小效嗽八物生薑煎方 生薑兩 乾薑兩 桂心兩 甘草兩 杏仁一升 欬冬花各三 蜜三

升 右藥末之以蜜合諸藥微火煎之使如飴餽量其大小多少與兒含咽之百日小兒合如棗核許

日四五甚良出第五卷中

備急療少小效嗽上氣杏仁湯方 麻黃祛 杏仁四升 右二味切以水一升煮取七合去滓分服

百日小兒患熱氣急不得服小便赤黃服之甚良大人孩童以意量之忌如常法

又療少小效嗽方 紫苑祛 貝母祛 欬冬花祛 右三味搗為散取豆許著乳頭令兒飲之日三飲母忌

如常法

劉氏療小兒效嗽不得臥方 甘草六分 桔梗四分 桑白皮 貝母 伏苓各三分 大青 五味子

人參略 二 右九味切以水二升煮取八合去滓量多少大小與服忌如常法

小兒效逆上氣方七首

千金杏仁丸主大人小兒效逆上氣方 杏仁祛 右一味熟搗如膏蜜一升分為三分以一分內杏仁

搗合強更內一分搗之如膏又內一分搗熟止先食含之咽汁量其多少日三每可半方寸不得過也

又射干湯主小兒效逆喘息如水雞聲方 射干兩 麻黃節 紫苑 甘草灸 生薑略 桂心五半 夏五枝

大棗一十枚 右八味切以水七升煮取一升半內蜜五合去滓分溫服二合忌餽羊肉生葱

又方 半夏四兩 生薑三兩 桂心 紫苑 細辛 阿膠兩 甘草二兩 欬冬花二合 蜜一合 右九味切以水

尚德按合千金作令
尚德按千金五合下
有煎一沸三字去滓

二子在內
蜜上二合
下有日三
二字
尚德按干
金名五味
于湯麻黃
以下一分
作並六兩
疑是六錢
之說細幸
款冬花各
二分兩開
木分兩開
又按本文
不下即食
不下之謂

一斗先煮半夏取六升去滓內諸藥煮取二升五合去滓兩歲兒飲六合五歲兒飲一升量大小多少
加減之

又五味湯主小兒風冷入肺上氣氣逆面青喘迫晝夜不食則吐不下方 五味子分麻黃去節當歸

仁人參分細辛斜乾薑分桂心分紫宛分款冬花斜甘草分一大黃分 右十一味切以水二升半煮

取九合去滓兒六十日至百日日服二合半百日日餘至二百日一服三合出方編冬大黃有大棗三枚

食也不下不大便也故用大黃食也以下之氣降而吐自止喘自定

千金翼療小兒寒熱逆膈中有游乳吐不飲食尚德按食字 乾地黄兩麥門冬半升五味子合大黃

硝石兩一蜜升 右六味切以水三升煮取一升去滓內硝石蜜煮令沸服二合日三胸中當有宿乳

一升許出兒大便五合

又療小兒大人欬逆短氣胸中吸吸呵出涕唾嗽出臭膿方 燒淡竹瀝煮二十沸一服一合日五服大

大人服一升不妨食息乳哺並出第十卷中

劉氏療小兒上氣急滿坐卧不得方 鼈甲一兩灸令極熱橋為末 燈心握 右二味以水二升煎取八合以意量

之與服

小兒傷寒方三首

千金論曰夫小兒未能冒涉霜雪乃不病傷寒也大人解脫之久傷於寒冷則不論耳然天行非節之氣

其亦得之有時行疾疫之年小兒出腹便患斑者也治其時行節度故如大人法但用藥分劑少異藥小

冷耳

又療小兒傷寒方 生葛汁 淡竹瀝各六 右二味相和二三歲兒分三服不宜煮生服佳

又療少小未滿百日傷寒鼻身熱嘔逆麥門冬湯方 麥門冬分桂心分寒水石分石膏碎甘草各分

右五味切以水二升半煮取一升分服一合日三

尚德按千
金以水三
升煮

通按雷九
止汗之藥
粉亦撲汗
之藥不汗
之不字疑
設在作出
汗乃是

尚德按千
金治小兒
傷寒發黃
又按千金
無澄清以
下十字
尚德按千

又療少小傷寒芍藥四物解肌湯方 芍藥 黃芩 升麻 葛根各二 右藥切以水二升煮取九合
去滓分四服暮歲以上分三服並出第
五卷中

小兒天行方八首

廣濟療小兒天行壯熱欬心腹脹妨方 人參 甘草炙 生地黃 麥門冬法 茅根各六 右五味

切以水二升煮取七合去滓以意量之分溫與服忌如常法

又方 麥門冬法 茅根各六 甘草炙 人參各二 紫苑 升麻 貝母 竹瀝各二 右八味切以水二升

煮取八合分服忌如常法

千金療少小有熱不汗二味通汗散方 雷丸兩 粉半 右藥搗篩以粉兜身以差為度

又療小兒生一月至五月乍寒乍熱方 細柳枝煮取汁以洗兒立效若渴絞冬瓜汁服之

又療小兒寒熱及赤氣中人豬蹄散方 取豬後腳懸蹄燒反末以乳汁飲一撮立效並出第
五卷中

劉氏療小兒天行頭痛壯熱方 青木香分六 白檀香分三 右二味搗散以清水和服之以水調塗頂頭痛

立差

又方 吳藍 太青各十 甘草炙 生麥門冬法 生薑各六 茵陳分三 梔子仁 蘆根一握 右八味切以水

二升煮取九合分溫服之忌如常法

又療小兒天行五日以後熱不歇方 桑葉 麻黃一兩 葱白切一 豉合 右四味切以童子小便二升

煎取九合去滓分服之

小兒諸黃方四首

千金療小兒黃方 搗土瓜根汁澄清滴兒鼻中如大豆許日服三合

又方 搗麥青汁服之

又方 搗韭根汁以滴兒鼻中少許即出黃水差

金云搗韭
根汁澄清
取如大豆
許滴犯鼻
中即出黃
水瘰蓋不
臺誤以此
方節度挽
入上土瓜
根方中耳

尚德按干
金淡竹葉
一升小麥
二合

尚德按干
金隨發時
先服
尚德按干
金三七下
云并以火
炙身

又療諸黃方 小豆二十枚 瓜蒂十四枚 糯米四十粒 右三味搗散吹鼻中差並出第五卷中

小兒諸瘧方九首

廣濟療小兒瘧方 取蛇皮燒灰一錢七和冷水服之

又方 取驢軸下垢膩刮取和麪作燒餅與喫立差止

刪繁瘧小兒瘧或有能飲或不能飲母含藥與飲之常山酒煎方 常山兩 桂心兩 甘草兩 右三味切

以酒一升煎取七合去滓分服吐差止

千金常山湯主小兒溫瘧方 常山四分 淡竹葉握切 小麥合 右三味以水一升半煮取五合一日至

七日犯一合為三服八日至十五日犯一合半為三服十六日至二十日犯二合為三服四十日至六

十日犯六合為三服六十日至百日犯一服二合半百日至二百日犯一服三合其一歲至七八歲犯

增藥水並以此為率

又方 灸兩乳下一指各三壯

又方 燒雞臍胫黃皮末和乳與服男雄女雌

又方 生鹿角末發時與一錢七服之

又方 燒鼈甲灰以酒服一錢七至發時服三出第五卷中

劉氏瘧小兒瘧 黃丹半錢七以蜜水和與服苦冷以酒和與服之良

小兒眼赤痛方八首

古今錄驗療小兒眼痛方 取淡竹瀝試之

又方 取鯉魚膽點之

又方 取車前草汁和竹瀝點之

又方 以人乳浸黃連點之

小兒諸瘧方九首 小兒眼赤痛方八首

父... 小兒諸淋方六首 小兒小便不通方五首

劉氏療小兒赤眼方 黃連分朴硝令乾 右二味以婦人繡汁浸之點眼良

小品療小兒毒肉赤眼方 生地黃薄切冷水浸以貼之妙

又方 取羊子肝薄切以井花水浸以貼之妙

又方 取黃柏以乳浸點之

小兒諸淋方六首

千金療小兒淋方 車前子一升水二升煮取一升分服之一方用車前草

又方 以冬葵子煮汁服之

又方 取蜂房亂髮燒灰以水服一錢七日再服

文仲療小兒淋兼石淋方 取特牛陰毛燒灰以漿水服一刀圭日再服

又方 榆皮 瞿麥絡六 右二味切以水一升煮取半升去滓分溫服之

又方 小麥合葱白槿 右二味以水一升煮去滓取一半分服之

小兒小便不通方五首

廣濟療小兒熱極病小便赤澀或不通尿輒大啼呼滑石湯方 滑石計六分 苓計四分 冬葵子八分 車前草一分

切一 右四味以水二升煮取一升一歲至四五歲服一合日再服甚良

小品療小兒小便不通地膚子湯方 地膚子分 瞿麥 冬葵子絡三 知母 黃芩 猪苓 海藻 橘皮

皮 升麻 通草絡半 大黃分 右十一味切以水二升煮取一升大小多少量與服忌如常法有根

續與

千金療小兒小便不通方 車前草切一升 小麥一升 右二味以水二升煮取一升二合去滓以煮粥服日

三四量與服

又方 冬葵子一升 右一味以水二升煮取一升入滑石末一分溫分服

尚德按今
千金枳實
橘皮俱有
為十二味

尚德按千金人參一兩每食後服

尚德按千金漿字下有汁字黑作墨

尚德按千金名雙案圖

又按千金真珠作朱硃職作脫通按在子大豆也如大豆許二

劉氏療小兒忽不得小便急悶方 葱白搗通草兩冬葵子合 右三味切以水二升煮取一升去滓量服

小兒遺尿失禁方五首

千金療小兒遺尿方 瞿麥 龍膽 石韋去毛 桂心 皂莢去皮子各二分 雞腸草四分 車前子五分 人參二兩 右

八味搗篩蜜丸如小豆每服五丸加至六七丸

又方 灸臍下一寸半隨年壯

又方 灸大敦三壯

又方 小豆葉搗汁服佳

又療失禁不覺出尿方 以豆醬和龜突黑如大豆許內尿孔中佳

小兒大便有血方三首

救急療小兒大便訖血出方 龜甲一枚煨 右一味以水和量多少大小服日三忌如常法千金云龜頭一枚

又方 以車缸一枚燒令赤內水中與服差千金

又方 燒甌帶灰塗乳上與飲之差千金

小兒大便不通方四首

千金紫雙丸主小兒身熱頭痛食飲不消腹脹滿或小腹絞痛大小便不利或重下數起小兒無異疾唯飲食過度不知自止哺乳失節或驚悸寒熱唯此丸治之不差復可再服小兒欲下是其蒸候哺食減少

氣息不快夜啼不眠是腹內不調悉宜用此丸不用他藥數用神驗千金不傳方 巴豆去皮心 麩核仁十各

別攪麥門冬十錢 甘草五錢 甘遂二錢 牡蠣煨 臘各八錢 真珠二錢 右八味以湯熟洗巴豆研以新布絞去

油別搗甘遂甘草牡蠣麥門冬細篩畢搗巴豆麩仁令極熟乃內諸藥散更搗三千杵如藥燥入少蜜

足之半歲兒可服如桂子一雙一二歲兒服如半麻子作一雙三歲尚德按千金三四歲者服如麻子二丸 兒服如麻子

小兒遺尿失禁方五首 小兒大便有血方三首 四

粒尚德按桂
子即白蘇
非大豆也
然一二歲
肥服如半
麻子半歲
兒不當服
如豌豆

枝作一雙四歲肥服如麻子二九五六歲服如大麻子二九七八歲肥服如小豆二九九歲十歲肥微
大於小豆者二九常以雞鳴時服至日出不下者飲熱粥汁數合即下九皆雙出也下甚者飲冷
粥止之

必效療小兒大便不通方 炙口兩吻各一壯

又方 猪苓兩 右一味以水少許煮雞矢白一錢七與服立差

又主小兒大小便不通妨悶方 白蜜合 右一味煎為丸內下部中即通小便不通嚙生葱以綿裹少
許內小使道中即通

小兒赤白痢方七首

廣濟療小兒赤白痢腹痛方 赤石脂 龍骨 地榆 黃連各四分 厚朴炙 人參 當歸 乾薑各三

右八味搗散以飲汁服半錢七日再服之蜜丸以乳汁下三九至七九亦佳此方甚妙以意量之

又療小兒客冷白痢方 人參分厚朴 炙甘草四分 茯苓 桔梗各五分 檉皮炙 右六味切以水三升

煮取一升量其大小可一合為度以差止忌如常法

救急療二百日小兒赤白痢日夜五十行方 白朮 乾薑 茯苓 甘草各四分 附子二分 右五味切
以水三升煮取一升分溫服之

必効療小兒一歲以上二歲以下赤白痢久不差雞子餅方 雞子二枚 胡粉錢一 蠟兩 右三味熬蠟消
下雞子胡粉候成餅平明空腹與喫可三頓痢止

劉氏療小兒赤白痢方 油麻子炒令香 右一味搗末以蜜作漿調與服大人亦療之

又療小兒赤白痢咽脹不出方 黃柏半兩 當歸分 右二味切以水一升煮取六合分溫服之佳

又方 苒若子 羊肉薄切 右二味以綿裹內下部中不過再差

小兒蟲毒血痢方九首

廣濟療小兒熱毒膿血痢方 羚羊角 地榆 阿膠 赤石脂 黃連 當歸各八分 吳藍 茜根 甘

草各六分 黃芩五分 右十味切以水六升煮取二升半量大小服之甚妙

又療小兒熱毒血痢方 犀角分 地榆分 蜜分 地麥草分 右四味切以水三升煮取二升去滓量大小服之

又方 葱白兩三 香豉合三 梔子七枚 黃連兩 右四味切以水二升煮取九合去滓分服

又療下鮮血方 取梔子仁燒灰末水和一錢匕服之量其大小加減服之

小品療少小熱痢不止梔子丸方 梔子仁枚 黃連分五 黃柏分三 礬石分四 大棗分四 右五味末之以蜜丸空腹服小豆許七丸差如未除更服忌如常法

古今錄驗療小兒熱痢子苓湯方 子苓分二 知母 女萎分六 竹葉分八 黃柏 甘草分四 右六味切以水二升煮取一升分服甚妙

又療小兒痢血犀角糠皮煎方 犀角分二 梁州檉皮分二 右二味以水三升煮取一升量大小服之神良同崔氏

又療小兒蟲毒痢血囊荷湯方 囊荷根 犀角屑 地榆 桔梗分二 右四味切以水二升煮取九合去滓服一合至再服

劉氏療小兒血痢方 地榆 黃柏 黃連 黃芩分六 馬蘭子分二 茜根分一 生薑分三 右七味切以水二升煮取一升分服大小量與之一合至二合為度

小兒熱渴痢方四首

小品療少小壯熱渴痢八味龍骨散方 龍骨研 甘草分二 赤石脂 寒水石 大黃 石膏 桂心 桔

萸分三 右藥搗散以水及酒五合煮散二合量大小分服之效

又療少小夏月藥大下後胃中虛熱渴唯可飲麥門冬湯方 麥門冬分四 甘草分四 枳實分二 黃芩 人參

外臺祕要

卷三十六

小兒蟲毒血痢方九首 小兒熱渴痢方四首

五

各三龍骨分六 右六味切以水二升煮取九合去滓分温服

古今錄驗療小兒渴痢檉皮飲子方 梁州檉皮分二 栝婁 茯苓各 人參各 粟米各 右五味切以

水三升煮取一升二合去滓分服量大小與服之

劉氏療小兒痢渴不徹腹脹不能食方 訶梨勒皮分 桑葉分 右二味切以水一升煮取五合去滓

分服之亦治大人

小兒疳痢方七首

廣濟療老小一切痢久成疳方 白龍骨分 黃連 白石脂 雞矢白熟 胡粉熟 茯苓 阿膠各 右

七味搗篩蜜丸以飲汁下五丸漸加至七丸十九丸大小增減服之難夫一作

又療小兒疳痢渴瘦方 取椿木根炮末 粟米搗末 右二味以蜜和作丸服五丸至七丸十九丸以差為度

同崔氏

又療大人小兒久痢成疳方 豉并 葱白 檉桃葉一握 鹽二十 苦參五 青黛一 右六味切以水三升煮取

一升二合去滓仰臥灌下部中極妙

又療小兒疳痢困垂死方 益母草 右一味煮食之取差止同崔氏

劉氏療小兒痢大孔開并有瘡疳痢經四五月吹藥止痢療疳神驗方 黃連分 麝香許 右二味相和

以竹筒吹下部中三兩度差止

又療小兒疳痢三歲以上口裡有瘡身壯熱及手足心煩大便極臭即是疳痢方 黃連 黃柏 地榆

炙白頭翁 高良薑 酸石榴皮 生薑 當歸各 白朮分 龍骨分 右十味切以水二升煮取八

合分服大小量之其口中瘡以蘆薈末赤地麥搗末相和塗之下部末蚘蛻膽黃連麝香搗敷之兼以

竹筒吹少許內下部中差止亦主小兒疥瘡

必效療小兒久痢無問冷熱疳痢悉主之方 棗一枚去核勿令皮 右於炭火中燒令如炭於瓷器中

小兒疳痢方七首

破內胡粉令滿

通按墨食
子一名墨
石子即沒
石子也

尚德按人
參下四分
二字疑衍

尚德按四
字上疑脫
忽字

研之以米飲和分服之一歲以下分服之不過三服差王郎中處得之此方傳用甚妙

小兒無辜疳痢方三首

備急療小兒無辜疳痢方 龍骨 當歸 黃連 人參 墨食子 甘草炙 右六味搗散蜜丸服

三九日再以差為度大小增減量之

救急療小兒瘦頭乾無辜兼痢方 馬齒莧 右一味搗絞汁服三合以差止

劉氏療孩子頭乾肚中有無辜者益腦散方 地榆分 蝸牛分 青黛分 麝香分 人糞燒 蘭香根燒 蚬殼

膽分 龍腦香許 右八味搗散以飲下半錢七量大小與服之忌如常法

小兒諸雜痢方四首

劉氏療小兒膿痢直從春至秋冬以來不差者方 薤白切 生薑 蕪荑各 一子 芥 黃柏 阿膠

芍藥 厚朴炙 人參各 地榆 當歸各 香豉合 右十二味切以煮銀水重濾者一升半煮取九

合分服以差為度秋末冬末加赤石脂半兩乾薑一分白朮二分大小量之忌如常法

又療小兒痢後虛手足心熱痢縱未斷亦可服之方 橘皮 生薑各 右二味切以牛乳半升煎取

四合去滓分溫服之

又療小兒水痢不止方 厚朴炙 黃連各 右二味切以水一升煎取六合分服雜痢此方並治之

又療小兒久痢方 甘草炙 茯苓各 人參 黃連各 厚朴炙 生薑各 龍骨各 右七味切以水一

升煎取三合欲卧先取鹽麩麝香為小丸內下部中緩服此飲分服甚妙忌如常法

小兒衄血方六首

深師療少小衄血方 桂心針 亂髮洗 乾薑各 右三味搗篩為散服方寸七日再

又方 燒桑耳令焦 右一味搗散以內於鼻孔中為丸以內亦得

小品療少小未滿百日傷寒身熱衄嘔逆五味麥門冬湯方 麥門冬法 石膏 寒水石各 甘草分

尚德按雌
千金作雄
下同

尚德按不
合下千金
云藏瘦色
黃至四五
歲不能行
半夏發方

桂心分 右藥切以水一升煎取八合分服效

小兒齒不生方三首 小兒頭汗及盜汗方三首 小兒顛開不合方四首

古今錄驗療小兒鼻衄不止方 以馬屎綿裹塞鼻孔中

又方 燒髮灰末吹鼻孔中亦佳

又方 單服白馬屎汁三合甚良

小兒齒不生方二首

小品療少小齒落不生方 取牛尿中大豆二七枚小開豆頭小許以次注齒根數度即當生千金

又方 取雌鼠屎三七枚以一枚拭齒根處盡此止二十一日齒當生雌鼠屎頭尖是也千金

小兒頭汗及盜汗方三首

千金療少小頭汗二味茯苓粉散方 茯苓 牡蠣兩四分 右藥以粉八兩合治下篩有熱輒以粉頭汗

即自止

又此由心藏熱之所感宜服犀角餃子方 犀角三分 茯苓四分 麥門冬六分 甘草二分 白朮一分 右五味切以

水九合煎取四合分再服即定又加龍齒四分佳

延年療小兒盜汗方 麻黃根 雷丸 牡蠣兩三分 甘草二分 乾薑兩 梁米升 右六味搗粉以粉身汗

即止

小兒顛開不合方四首

廣濟療小兒顛開不合方 防風六分 白朮 柏子仁各四分 右三味搗末以乳汁和塗顛上以合為度千金

同

范汪療少小腦長頭大顛開不合臂脛小不能勝頭三歲不合發藥方 半夏 芎藭各一升 細辛二兩 桂心

三烏頭枚十 右五味切以酒四升漬之晬時溫之以絮熨顛門上朝暮各二三二十日自強急千金

桂一尺又有 生薑一升

又按千金
解酒五
尚德按千
金無煎說

尚德按蠅
疑當作癩

又按到疑
當作頭

千金療小兒顛隘方 灸臍上下各半寸及鳩尾骨端又足太陰各一壯

又方 取猪牙車骨煎取髓塗顛上愈生用亦得

小兒解顛方二首

千金療小兒解顛方 蛇脫皮熬 右一味和猪頰車骨中髓以塗顛上日三

又療小兒解顛方 細辛桂心各一乾薑分三 右藥搗散以乳汁和塗於顛上乾復塗

兜面赤即愈

小兒月蝕耳瘡方三首

集驗療小兒頭瘡月蝕口邊肥瘡蝸瘡恙差黃連胡粉膏散方 黃連二兩 胡粉 水銀研入各一兩 右三味

搗為散相和水銀研令相得以敷瘡上縱黃汁引成瘡亦以粉之一方有白礬一兩燒蛇床子一兩末

入用甚妙至耳邊到頂上並用

又療小兒耳瘡方 燒馬骨灰粉敷之

又方 敷雞屎白佳

小兒臍汁出并瘡腫方十一首

廣濟療小兒臍汁出不止兼赤腫白石脂散方 以白石脂一兩研成粉熬令温以粉臍瘡甚良同金

備急療小兒臍中生瘡方 以桑汁塗上使兒就飲之同金

又方 取殺羊乳飲兒同金

又方 取東壁土末以敷之甚良千金云若汁不止燒瘡耳子敷之

又方 燒藪帶灰和膏敷之同金

又兒生百日臍汁出方 燒絳皮敷臍中同金

又兒臍赤腫方 杏仁二猪牙車骨中髓 右二味先研杏仁入此髓和令調以塗臍上同金

小兒臍汁出并瘡腫方十一首

小兒癰腫方首 小兒丹毒方首

古今錄驗療小兒風臍汁出甘草散方 甘草炙 蜈蚣熟各 右二味搗散以安臍中差止甚妙

又療小兒臍中汁差不黃柏黑散方 黃柏兩 金底墨四分 右二味搗和作散以粉臍中即差

又療小兒臍著濕煖鹽鼓熨方 鹽 鼓等 右二味搗作餅如錢許安新瓦上炙令熱用熨臍上差止

赤用黃柏末以粉之妙

劉氏療小兒初生至七日者臍欲落封藥方 雄鼠屎七 乾薑大 胡粉三分 麝香少 緋綿灰 右五味搗研為粉看臍欲落不落即取藥以敷之是以不令風入故也著乾薑恐痛不著亦得

小兒癰腫方二首

千金漏蘆湯主小兒熱毒癰疽赤白諸丹毒熱瘡癰方 漏蘆用葉一分 升麻一分 連翹 白斂 甘草炙各

芒硝升 枳實炙 麻黃節 黃芩各半 大黃一分 右十味以水一升煮取五合兒生一日以上至七日取一

合分三服生八日至十五日取一合半分三服生十六日至二十日取二合分三服生二十餘日至三十日取二合分三服

又五香連翹湯主小兒風熱膏腫腫色白或有惡核瘰癧附骨癰疽節解不舉白丹走遍身中白癰搔不

已方 青木香 薰陸香 沉香 雞舌香 黃芩 麻黃去節各 連翹 海藻 射干 升麻 枳實

艾絡麝香研半分 大黃分竹 瀝合 右十四味切以水四升煮取二升內竹瀝煮取一升二合兒生百餘

日至二百日一服三合生二百日至期歲一服五合用麻黃一方不用

小兒丹毒方七首

廣濟療小兒丹毒方 青藍汁銜竹 瀝合 右二味相和分為二三服大小量之一合至三合

千金療小兒數十種丹皆主之搗湯方 大黃 甘草炙 當歸 芎藭 白芷 青木香 獨活 黃芩

芍藥 升麻 沉香 木蘭皮略 芒硝兩 右十三味切以水一斗二升煮取三升去滓內硝以綿

搗湯以搗之乾則易之取差止

尚德按千金芒硝六錢以水一升半煎

又按服字下千金有三十日取五合分三服十三字尚德按連翹以下五味千金各半兩外台一分疑是二分之說

尚德按千金取四升

又療小兒溺竈丹初從兩脇及臍間起走入陰頭皆赤方 以水二升煮桑根皮取一升以浴之
救急療小兒赤丹一名丹溜方 取小豆搗末以雞子白和塗之以差為度千金亦療久丹 尚德按火
毒

古今錄驗療月內兒發丹方 升麻 黃芩 犀角 大黃別柴胡各二 石膏分三藍葉切三 梔子分八甘草

一分 又療小兒丹毒方 取慎火草搗以封之差止

又方 搗藍汁塗之又藍淀塗之妙

小兒禿瘡方七首

千金療小兒頭上禿瘡方 取雄雞屎白陳醬汁苦酒和以洗瘡敷之日一度

又方 取不中水蕪菁葉燒灰和猪脂敷之

千金翼療小兒禿瘡無髮苦養方 野葛兩猪脂 羊脂各一 右三味合煎令消待冷以敷之不過三

上研金

備急療苦頭生瘡白禿不生髮有汁出或無汁乾燥痛方 煮雞子七枚剉 右一味取黃於銅器中急

火熬乾末以敷之取差為度

又方 取春秋桃葉心無間多少搗汁塗之千金并翼治小兒頭不生髮 取桃葉搗汁以敷頭上差

又方 燒鯽魚末以醬汁和塗之同

又方 取臘月猪屎乾末以敷之差為度

小兒頭瘡方三首

千金療小兒頭瘡方 胡粉兩黃連兩 右二味為末先洗瘡去垢拭乾敷之即愈更發如前敷之

又方 胡粉兩白松脂兩水銀研猪脂兩 右四味合煎去滓內胡粉水銀攪令和調敷之大人同翼

小兒禿瘡方七首 小兒頭瘡方三首

尚德按上
同疑當作
同上

尚德按千

金白松脂
二兩

救急療小兒頭瘡經年不差而後發方 雄黃研 大黃 黃柏 黃芩 薑黃 雌黃 研 白芷 當歸

青木香 俗 右九味切咬咀以苦酒浸一宿以猪脂一大升煎候白芷色黃膏成去滓入水銀一兩

以唾於手中研令消入膏攪相得於瓷器中收每以皂角湯洗瘡乾拭以膏塗之日夜再換以差為度

小兒頭面瘡方七首

廣濟療小兒面生熱瘡方 黃連 蛇床子 黃柏 俗 胡粉 分 右四味搗散以麻油和塗瘡遍敷之

佳

千金療三日小兒頭面瘡起身大熱方 升麻 柴胡 石膏 略 一大黃 甘草 當歸 略 二 右六味

切以水三斗煮取一斗去滓以浴小兒瘡上訖敷黃連散

又療小兒身體頭面悉生瘡方 榆白皮 燒 任者 右一味搗末以醋和塗之綿覆上蟲出立差亦可以

猪脂和塗之

千金翼苦參湯主小兒頭面熱瘡方 苦參 兩 黃芩 兩 大黃 芍藥 黃連 兩 二 蛇床子 升黃柏 兩 菘菹

洗 斤 右八味切以水二斗煎取一斗以洗兒日三即差 下倫云治上

又方 石南草 大黃 黃芩 黃柏 礬石 澤蘭 略 一戎鹽 真者 蛇床子 合 右八味切以水七升

煮取三升以絮內湯中洗拭兒日三度差

備急療小兒三歲患頭上起爛漿如釘蓋一二日及胸背皆生仍成瘡方 水銀 硃砂 各半 石硫黃 兩

研 臘月猪脂 右四味煮桑葉湯洗以敷之勿令猪犬婦人小兒等見之無效

古今錄驗療小兒頭瘡面上亦有日益甚者方 黃連 赤小豆 略 等 右二味搗末以臘月猪脂和塗

之即差止

小兒瘰癧方二首

千金連翹丸主小兒無辜寒熱疆健如故而身體項頸結核瘰癧及心腸腹背硬有堅不痛名為結風氣

尚德按干
金草作故
堅字下有

以水四升
煮取二升
分服日三
夜一翼同
但甘草二
分半方後
云多煮洗
瘡佳
尚德按干
金翼大黃
芍藥黃連
各三兩以
水三斗煮
取一斗半
尚德按干
金翼無草
字

小兒頭面瘡方七首
小兒瘰癧方二首

核字海藻
丰兩

尚德按侵
疑當作浸
下同
尚德按干
金治黃爛
瘡下同

尚德按炭
千金作炭
通按父根
疑即母足
跟也千金
方有針文
足跟出血
塗犯黑疵
法

腫方 海藻三分連翹 桑白皮 牡丹 白頭翁 防風 黃柏 桂心 香豉 獨活 秦艽各四

右一味搗篩蜜丸如小豆三歲以飲服五九至十九五歲以上以意加之

必效療小兒項上瘰癧方 以榆白皮爛搗如泥封之頻易

小兒侵淫瘡方三首

備急療小兒侵淫瘡方 取竈中黃土亂髮及各三分研成粉以猪膏和塗之差亦治身赤腫起千金同

又方 燒艾作灰敷之千金

又方 以牛屎燒作灰敷之千金

小兒蠖螻瘡方二首

備急療小兒蠖螻瘡繞身匝即死方 搗蒺藜苦藪之無葉子亦可耐千金

又方 取燕窠土研成粉以猪脂和塗之乾易耐千金

小兒惡瘡方五首

文仲療小兒身中惡瘡方 取笋煮汁洗之又燒笋皮作灰敷之

古今錄驗療小兒惡瘡方 取豆豉熬令焦黃末以敷瘡差止耐千金

又療小兒惡瘡匝身梁藥所不能瘡之方 取父根洗取汁以浴犯勿使母知良

又療小兒面及身上生瘡如火燒方 取黃米一升末以蜜水和塗之差為度

又方 以赤地利搗末以粉之佳

小兒火灼瘡方二首

千金療小兒火灼瘡者一身盡有如麻豆或有膿汁乍痛乍癢方 甘草 芍藥 白斂 黃芩 黃連

黃柏 苦參各半 右七味搗末以蜜和敷之日二夜一亦可作湯洗之

千金翼療小兒火瘡方 煮大豆濃汁温洗之差亦令無癩

小兒侵淫瘡方三首 小兒蠖螻瘡方二首 小兒惡瘡方五首

小兒風癩瘡方五首

廣濟療小兒風癩浴湯方 柳木空中屑杜胡蘿蔔根切鹽合樅木切 右四味切以水二斗煮取一

斗入鹽以洗浴頻為之以差止

又療小兒壯熱隱癩已服湯丸不消宜服竹瀝湯方 淡竹瀝二升葛根汁五合牛黃豆粒三 右三味相

和與兒服一歲至五六歲一合至三合五合再服以意增減之

千金療小兒風癩癰瘡方 胡蘿蔔切防風 羊桃 石楠 秦椒 升麻 苦參 茵芋 芫花一作

疾梨子 蛇床子 黃礬石燒枳實略 右十三味切以酢漿三斗煮取一斗內礬石令少沸以浴

之

又療小兒風搔癢癰瘡方 牛膝末酒服方寸七漏瘡多年不差搗末敷之主骨疽癰病瘰癧絕妙

千金翼療癩瘡方 巴豆五十粒去皮以水三升煮取一升半以綿內湯中拭病上隨手滅神良

小兒疝氣陰癩方八首

小品療少小陰癩白頭翁敷之神效方 生白頭翁根不問多少搗之隨病處以敷之一宿當作瘡二十

日愈除日取之

千金療小兒狐疝傷損生癩方 半夏洗芍藥 茯苓略防風一作防葵大黃略桂心 椒兩汗 右七

味搗散蜜丸如大豆以湯飲下一丸至二丸三丸日五服以差為度

又方 桂心切地膚子分白朮切 右三味搗蜜丸如小豆白酒服七九日三服亦治大人

千金翼療小兒氣癩方 土瓜根 芍藥 當歸略 右三味切以水二升煮取一升去滓分服五合

日三

備急療小兒癩方 以蜥蜴一枚燒灰末以酒服之

又方 灸足厥陰大敦左患灸右右患灸左各一壯即當差千金

尚德按千金無切一升三字及黃字作藥作茶水

尚德按千金翼以水二升煮取一升 尚德按三日千金作

尚德按千金地膚子二兩半白朮一兩十八錢

古今錄驗療小兒陰癩方

狐陰一具

飛生蟲十四枚

桂心

附子炮

乾薑

蒺藜

硝石

一作滑石

細辛各二

卷柏

桃仁六分

右十味

搗散

蜜九

大豆許

以飲下

五九至七九

再服

差止

劉氏療小兒疝氣陰囊核腫痛灸法

如一歲兒患何陰下縫子下有穴灸三壯差五歲以上即從陰上

有穴灸之即愈

小兒陰瘡及腫方八首

千金療小兒陰瘡及腫方

取狼牙濃煮汁洗之

又方

黃連 胡粉等

右二味末和以香脂油敷之

備急療小兒陰瘡方

人屎燒作灰以敷之即差

又方

貓兒骨燒作灰敷之即差

同

又療小兒歧股間連陰囊生瘡汁出先瘡後痛十日五日自差一月二十復發連年不差者方

灸瘡極

去疔以綿拭令乾以蜜敷麩作燒餅熟即以錫塗餅上熨之冷即止再度差

同

又治小兒陰腫方

猪屎五升水煮沸布裏安腫上

同

又方

灸大敦七壯

同

又方 搗蕪青葉根薄之

小兒脫肛方六首

備急鬘頭丸療少小積痢久下下後餘脫肛不差腹中冷肛中疼痛不得入者方

死鬘頭一枚

灸小形

蛻皮一枚 磁石四兩 桂心兩

右四味搗篩蜜丸如大豆三歲至五歲服五丸至十九日三丸漸大以意

加之同

又療小兒脫肛方

灸頂上旋毛中三壯即入

又方 灸尾翠三壯愈同

尚德按熟
千金作熱

通按尾翠
當昔尾翳

小兒陰瘡及腫方八首 小兒脫肛方六首 小兒鬘頭食下諸方四首

尚德按尾
翠骨在尾
尾下與尾
翳別

外臺初要 卷三十一 小兒疳濕瘡方六首 小兒蛇蟲方七首

又方 炙臍中三壯愈千金云隨年壯 東壁土五 鼈頭一枚 五色龍骨五分 卷柏四分 右四味搗散以粉敷之按

古今錄驗療小兒久痢脫肛方 內之即差

又方 取鐵精粉敷內之差

小兒蠹蟲食下部方四首

千金療小兒蠹食下部方 胡粉熬 雄黃等 右二味以者下部穀道中即差

又除熱結腸九斷小兒熱下黃赤汁沫及魚腦雜血肛中瘡爛生蠹蟲方 黃連 柏皮 苦參 鬼臼

獨活 橘皮 芍藥 阿膠炙 右八味搗篩以藍汁及蜜丸如小豆日服五丸冬天無藍汁可用

藍子一合 蠶蜜和丸凡三歲以下服三九三歲 又杏仁湯方 杏仁去皮 煑鹽合 右二味以苦酒一升煮取一半量與服之

又療小兒下部被蟲食大腸赤瘡爛方 水銀一兩以漿水煮之取少許以唾研安著竹筒中吹入下部

中三度差

小兒疳濕瘡方六首

備急療小兒疳濕瘡方 以鐵上衣少許內下部中即差千金

又方 自大椎數至第十五椎夾骨兩傍灸七壯不差加七壯千金同尚德按千金本無

又方 艾葉一兩水一升煮取四合分三服差千金云艾葉切五分以水

又小兒疳瘡方 胡粉熬八分猪脂和塗之差為度油亦得千金

又方 嚼栗子塗之差千金云嚼麻子

又方 羊膽二枚以醬汁和灌下部中猪膽亦得千金

小兒蛇蟲方七首

又方 羊膽二枚以醬汁和灌下部中猪膽亦得千金

小兒蛇蟲方七首

千金療小兒蛇蟲方 棟木削上蒼皮以水煮取汁飲之量大小多少為此有小毒

又方 大麻子研取汁與飲之

又方 石榴根一把水五升煮取一升分二服

又小兒羸瘦有蛇蟲方 藿蘆二兩以水一升米二合煮取米熟去滓與服之

又方 篇蓄三兩水一升煮取四合分服之搗汁服亦佳

又方 東引菜黃根白皮兩四桃白皮兩三 右二味切以酒一升二合漬之一宿漸與服取差

又方 蕪荑分六狼牙分四白斂分二 右三味搗末以苦酒和量與服之

小兒螻蟲及寸白方五首

千金療小兒螻蟲方 取猪膏服尤妙

又方 搗生槐實內下部中差為度

又寸白蟲方 東行石榴根一把水一升煮取三合分服

又方 桃葉搗絞取汁服之

又小兒蟲方 雷丸 芎藭各等分 右二味搗散服一錢匕日三

小兒瘰瘡方四首

千金療小兒瘰方 塚中石灰研敷之厚著之良

又方 燒桑根灰敷之并燒烏羊角灰和敷之

又療小兒疽瘰方 丹砂 大黃各五兩 雌黃 雄黃 藺茹各四 礬石燒如馬齒者佳 莽草各三 黃連分六 右八

味咬咀以猪脂一升三合微火煎三上三下膏成去滓下諸藥末攪凝塗之差

備急若患漏瘡頭盡開出膿夜復合者方 大附子一顆內鯽魚腹中於炭火上燒灰研以敷之更搗蒜

以封之良

尚德按千金以苦酒二合一宿次呈空腹服之

尚德按千金作皮

尚德按千金治小兒蟲

小兒疥瘡方六首 小兒癬瘡方六首 小兒誤吞物四首

小兒疥瘡方六首

范汪瘡小兒疥瘡雄黃膏方 雄黃研 雌黃研 兩各烏頭一枚 松脂 亂髮各一許 豬肝一升 右六味和煎

之候髮消烏頭色黃黑膏成去滓以敷之熟塗之

千金疥瘡方 以臭蘇和胡粉敷之差為度

備急瘡疥方 燒竹葉及以雞子白和塗之以差為度

又方 以亂髮灰以猪膏和敷之效

救急瘡疥瘡及小兒身上熱瘡並主之方 黃連 黃柏 赤小豆 臭黃各一兩 水銀相和 研 右五味

為散以麻油和先淨洗瘡然後塗之甚佳

又瘡小兒疥瘡等神驗方 黃連 糯米粉各分 水銀八分 胡粉六分 吳茱萸 赤小豆各一兩 右六味搗

散水銀手中和唾研如泥以猪脂并水銀成膏先洗瘡乾拭令淨以塗藥三兩度差意猪雞肉

小兒癬瘡方六首

集驗瘡小兒癬方 以蛇子末以白膏和敷之

千金瘡小兒濕癬方 枸杞根搗末和臘月猪膏敷之 一云酢和亦佳

又方 桃青皮搗末以醋和敷之日二

又方 煎馬尿洗之

又方 搗破以牛鼻上津塗之

又方 狗屎灰和猪脂以塗之

小兒誤吞物四首

小品瘡小兒誤吞鐵珠子如狸豆大者經年不以為害後病瘦瘠食不生肌膚時下痢或寒熱服諸藥自

瘡來反劇不效有師診之云是吞物不消作法服藥所吞物不去終不差令其家中察之云兒近歲常

尚德按瘡 疑當作瘡 又按蘇子 金作酥

尚德按碎 疑當作研 或是行

尚德按六 疑當作云

弄十六貝鐵珠覺失一顆慮是吞之從來積歲實不以為疑之師六診乃信是故令病矣為處湯藥所患即差復與將療其兒肌膚充悅而忘說其方且記之又有一家女子六七歲許患腹痛其母與摩按之覺手下有一橫物在兒肉裡正平橫爾問兒曰那得鐵在肉中大驚怪脫衣者之肉完淨無有刺處按之兒亦不患鐵痛惟覺腹內痛且其母即以爪甲重重介之乃橫物折爪下兩段亦不偏痛迎師診之共察若吞鍼刺物者其嬰兒時不經鯁礙惟恐養兒時母常帶鍼髻抱橫兒體鍼入兒肌膚中兒縱覺痛啼呼與乳臥息便止遂成不覺今因腹痛摩之知耳鐵得土木濕皆生屑易朽鍼在肉中經數歲肉得血氣皆朽也故介之即折令患腹痛不安但療腹痛服溫中湯下心腹病差後長大緣因產乳不聞道鍼處為患故記之

千金療小兒吞鍼方 取磁石如棗核大吞之其鍼立出

又誤吞鐵等物方 艾蒿一把剉以水五升煮取一升頓服之即下

肘後療小兒誤吞梅李方 以少許水灌小兒頭承其水與飲之即出良

近效療小兒誤吞錢在喉中不出方 取麩炭末指彈入喉中其兒當便咯出妙

小兒雜療方六首

劉氏療小兒上冷下熱上熱下冷難將息方 犀角末 甘草 生地黃各六分藥鈺白朮 茯苓 梔子各三分柴胡 人參 大黃 生薑各四分黃芩 桂心各一分 石十三味切以水三升煮取一升分溫服之

又療小兒身體滿氣急卧不得方 柳李仁一合搗末和麩澥作餅子如常法與兒喫微利即差

又方 柳李仁末六分以水七合和調去滓煮粥與兒喫之

又療小兒油丹赤腫方 枯婁三大兩以醖醋搗藥以敷之佳

又方 取蕎麥麩以醋和塗之差

外臺祕要

卷三十六

小兒雜療方六首

十二

又療小兒野雞下部瘡闊方

通按野雞未詳

枳實兩鬼箭青木香

鬼白略二

右四味搗為末以醞醋和

以青布裹以熨之有頭即破熨訖令根拔去之差止甚佳

唐王壽先生外臺祕要方卷三十七目錄乳石論十九門

乳石論序

薛侍郎服乳石體性論一首

李補闕研鍊鍾乳法一首

曹公草鍾乳丸法二首

崔尚書乳煎鍾乳餌法二首

雜餌鍾乳丸散補益法二首

東陵處士鍊乳丸餌并補乳法二首內缺一首

雜餌鍾乳酒法二首

周處溫段侍郎鍊白石英粉丸等餌法并論紫石白石英體性及酒法五首內缺一首

雜煮石英和金銀草藥餌及銀罐煮水飲法三首

同州孟使君餌石法一首

羊肉中蒸石英及石汁無豬肉兼作薑豉服法三首

豬肚中煮石英及飼牛乳兼石英和磁石浸酒服餌法三首

服石後有不可食者有通食而無益人者有益人利石者藥采一十條

張文仲論服石法要當違人常性有五乖七急八不可兼備不虞藥并論二十二條

乳石陰陽體性并草藥觸動形候等論并法一十七首

銓擇薛侍郎等服石後將息補餌法一十五條

飲酒發熱諸候將息補餌論并法一十條 餌寒食五石諸雜石等解散論并法四十九條

癰疽發背證候等論并法五十四首

尚德按服
字下疑脫
餌字
尚德按牛
字下疑脫
取字

知
學
社
書
卷
三
六

一

唐王勣先生外臺秘要方卷三十七

宋朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞鼓院上護軍臣林億等上進

新 安 後 學 程 行 道 敬 通 父 訂 梓

乳石論序

按古先服餌賢明繼踵合和調鍊道術存焉詳其羽化太清則素憑仙骨若以年留壽域必資靈助此蓋金丹乳石之用豈流俗淺近而能知所患其年代浸深訣錄微密世有傳習罕能詳正更加服石之士精粗不同雖志貪補養而法未精妙遂使言多鄙褻義益繁無每加披覽實長疑惑既弟子不得親受一家童莫能曉了存諸左右殆謂闕如余宿尚谷神栖心勿藥歲月云久經書粗通知文字之一失乃性命之深誤是以會集今古考量論訣取斷名醫都凡纂要建題篇目并五臟合氣經絡受病入風所中形候論訣兼諸家會同將息妙術及乳石丹與雜石壓理之法錄定倫次即以時代為先後今刪畧舊論纂集新要分成上下二卷可謂價重千金比肩萬古垂之於後學壽若冰消者乎

薛侍郎服乳石體性論一首

書中侍郎薛曜論曰夫金石之性堅剛而急烈又性清淨而惡滓穢凡服乳石訖即須以意消息尋檢舊法不可無備忌也但人性或冷或熱或寬或急皆須量性將衛不可輕有犯觸凡乳石一服之後常在腸胃若人氣力衰石氣強即發動若人氣力盛石氣安即強健謹按古法皆令五十以上始服乳石殊謂不然今驗所見年少服者得力速兼無病患何以言者年少筋力滿盛飲食飽飫彌益精明壯健終無發理年歲遲暮氣候衰竭食飲失宜此石氣勝人無不發動歷觀得失莫過於此夫人年少縱不吃飲食血氣自強年老力微縱肉精細猶不可健以此言之足明古法疎矣凡人身血脈經行不絕如血脈微有滯處便於其處發瘡或發熱神氣昏悶必欲防之每朝及暮溫一兩盞清酒或可以生薑刮碎和少菜羹飲之令遍體熱薰薰又作熱羹粥飲之使腸胃通利即石氣流行其初服石一二日百尤宜作此將息是古法

通按破州
一本作陝
州唐破州
屬山南東
道陝州屬
河南道

通按千金
翼云置金
銀器中可
鎮心益氣
資器亦可
用

服石不取夏月只取冬月所以然者石有發動與服時皆背此又殊乖通論今驗服石飲食失時勞役過
度立即發動豈待背時今應見將衛得宜並不發動復見名醫平章服石人之常作熱將息儻發調適乃
易耳脫若石氣發動暫須宣洩服少冷藥便得轉瀉若得通暢熱氣併除若常作冷將息脫若石氣發動
用冷藥無由得轉此一曲之說今古存之但欲廣聞見爾其將息皆須自量本性冷熱為候務取安穩不
可拘執古論捨已從人庶通幽君子以此為意也按本草石鐘乳味甘溫無毒主效逆上氣明目益精安
五臟通百節利九竅下乳汁益氣補虛損瘵脚弱疼冷下焦傷竭強陰久服延年益壽好顏色不老令人
有子不鍊食之令人淋一名公乳一名蘆石一名夏石生少室山谷及太山採無時蛇床子為之使惡壯
丹玄石牡蒙畏紫石蒼草少室猶連高山也今第一出始興而江陵及東境名山石洞亦皆有之唯通中
輕薄如鷲翎管碎之如爪甲中無雁齒光明者為善良擬乃有一二尺者黃色以苦酒洗刷則白仙經用
之少俗法所重亦甚貴之謹按鐘乳第一始興其次廣連澧朗柳等州者雖厚而光潤可愛餌之並佳今
破州清溪房州三澗出者惡作草於始興自餘非其土地不可輕服多發淋渴只可擣篩白練裏之合諸
草藥酒浸服之耳陶云鐘乳一二尺者謬說也

李補闕研鍊鐘乳法一首

研鍊鐘乳法 取韶州鐘乳無間厚薄但令顏色明淨光澤者即堪入鍊唯黃赤兩色不任用欲鍊亦不

限多少置鐘乳於金銀器中即以大鑊中著水沈金銀器於鑊中用火煎之常令如魚眼沸水減即添
若薄乳三日三夜即得若粗肥厚管者即七日七夜候乳色變黃白即熟如疑生更煎滿十日最佳煮
訖出金銀碗其鑊內煮乳黃濁水弃之勿令人服服必損人咽喉傷人肝肺令人頭痛兼復下利不止
其有犯者食猪肉即愈弃此黃水訖更著清水準前更煮經半日許即出之其水色清不變即止乳無
毒矣即於磁盆鉢中用玉鍊著水研之其鉢及鍊須夾白練袋籠口稍長作之使鍊得轉兼通上下每
日著水攪令調勻勿使者錠鉢即封繫練袋自作字記勿使人開一即免纖塵入中二免研人竊喫研

通按千金
翼石斛作
二兩吳茱

覺乾澀即是水盡即更添水常令如稀泔狀乳細者皆浮在上粗者沉在下復繞鉢四邊研之不及者即粗細不勻為此每日須一開或二開攪括令勻勿使著錠即得勻熟免有粗細研至四五日狀若乳汁研指視之狀如書中白魚膩即成自然光白便以水洗之不隨水落者即熟若得水而落者即未成更須研之以不落為限熟訖澄取暴乾任將和藥及和酒空腹服佳千金

曹公草鍾乳丸法二首

主五勞七傷肺損氣急瘵丈夫衰老陽氣絕手足冷心中少氣髓虛腰疼脚痺體煩口乾不能食服之安五臟補腸胃能息萬病下氣消食長肌和中方唐尚書 鍾乳二兩別 吳茱萸二兩 石斛研十日 菟絲子酒浸別

搗 右四味搗篩蜜丸如桐子空腹服七九日再服訖行數百步溫酒三合飲之復行二三百步口胸

內熱熱如定即食乾飯豆醬過一日食如常須暖將息不用聞見屍穢等氣亦不用食粗臭陳惡食初服七日內勿為事過七日後任性然亦不宜傷多服過半劑覺有效即相續服三劑終身更無所患欲

多陽事者加雄蛾三十枚若失精加茯苓花三兩佳千金

又鐘乳丸法 成鍾乳乳配石斛 蛇床子各五 人參 桂心各四 乾薑三分 椒三分 汗去目 右七味

總四十八分計以十二兩以鍾乳蜜和之搗三千杵藥成丸如梧子空腹溫無灰清酒下二十五九日

再服如性飲宜加飲少許仍行三數百步即乳氣溜下任食若能節量甚佳古法云令食乾飯得丸力速如覺熱衝上進一兩口飯行步消息良久任食若能即食甚佳古法云令食乾飯豆醬不得過多不

可依古法終是節食忌行陽事最要能依此法將慎補益之功不可具述終妙也

崔尚書乳煎鍾乳餅法二首

瘵風虛勞損腰脚弱補益充悅強氣力法 鍾乳三兩研如麴以夾綿練袋盛稍寬容急繫頭內牛乳一

大升中煎之三分減一分即好去袋空飲乳汁不能頓服為再服亦得若再服即待晚間食消時服之如能再服即平朝盡服之不吐不利若稍虛冷人即微下少溏利亦無所苦明朝又以一大升牛乳準

前煎之依法服餌其鍊袋每煎訖即以少許冷水濯不然氣不通洩如此三十度以上四十度以下即力盡其袋中滓和麩飼母雞取其生子食亦好不然用浸藥酒亦得若有欲服白石莖並依此法若患冷人即用酒煎患熱人即用水煎若用水及酒例須減半乃好若用牛乳三分減一分補益虛損無以加之永不發動千金翼同忌在別卷中

服乳粉法 乳小稱一兩分為兩服朝服夜盡無問多少一準此法一兩為度凡服乳皆須溫清酒服之常令酒氣不絕為佳不得使醉吐唯須少食日食一升許飯得滿三日不出即乳不隨食下化為度三日外任意作美食將息其乳多少任人貧富服之師云服一斤百病自除二斤流及三世三斤臨死之時顏色不變在土下滿五百年後乃成強壯人通按三日不出謂三日不大便使乳氣不下泄也

雜餌鍾乳丸散補益法二首

千金鍊鍾乳散療虛羸不足六十以上人瘦弱不能食息百病法能多得常服益佳 鍾乳一斤取白淨

尚德按千金息作音二作三磁器作磁堊器留作堊上

光明色好者即任用之非此者不堪用一味先泥一鐵鑊受四五斗者為竈貯水令滿去口二寸內孔著金銀磁器中任有者用之使得沉之於鑊中令水沒器留一寸餘即得常令如此勿使出水也微火煮之日夜不絕水欲竭即添成暖水每日一周時輒易水洗鑊并淘乳七日七夜出之淨淘訖內磁鉢中玉鈿縛格著水研之一日一夜多著水攪令大濁瀉取別澄為粉其乳粗者自然沉底可研之凡三日三夜皆細遂水作粉畢澄取暴乾更於銀鉢中研之一日候入水洗不落為佳可分秤入散藥服之

取鍊成乳粉三兩 上人參 上石斛 乾薑各三分 又按 右三味搗篩與乳令相得均分作九

貼早朝空腹溫酒服一貼昏黃後服一貼尚德按千金一貼有日午後服六字皆黃作黃昏 三日內準此服之三日後還須

延年祕錄鐘乳散主補虛勞益氣力消食法 防風 人參各一錢 鐘乳二分 細辛半分 桂心 乾薑 錢 右

六味為散分作三貼每晨溫酒服一貼食時服一貼食時進不用過飽亦不得過饑常令飲酒使體中

又按千金三日三夜夜人參上有黨字通按千金上石斛之上有服藥之日勿得飽食生食并忌葱蒜等

薰薰有酒氣若熱煩以冷水洗手面不用熟食亦不得冷忌法如常

雜餌鐘乳酒法二首

纂靈記腫乳酒主風虛氣上安五臟通百節利九竅益精明目補下焦傷竭脚弱久服延年益壽肥健好顏色不老法 鐘乳三兩細研兩重綿鍊袋盛內六升清酒中用白磁器盛密封安湯中煎令三分可

減二分即出湯還添酒滿元數封頭七日取飲一服三合忌如藥法

又和酒服餌鐘乳法 成鍊鐘乳以無反新熟清酒一斗於不津器中相和密封閉冬七日夏二日空腹溫服三合日再服漸加以知為度十五日令盡亦有此三兩和酒服三日令盡並令節食忌陽事

尚德按十金翼二作三五字下有六字

雜慎如藥法千金翼同

東陵處士鍊乳九餌並補乳法二首

通按此是鍊乳法其乳法缺

鐘乳無問州土但白薄光潤者即堪以疎布袋盛懸於釜中勿令著底炭火煮之日三度易水出釜水淨洗訖內釜中發火如前候水色不變為度將乳袋出於新汲清水中洗去乳袋上浮沫更以牛乳五升緩火煮之一日飲服乳先飲此牛乳任和酒飲之其袋中乳傾出於盤中以水淨洗入鉢即研滿七日七夜常添水令如牛乳狀勿令乾燥使粗細不勻候白光可愛水原缺其四色英今不復用謹按白石英所

在皆有今澤州魏州洛州山中俱出魏州者乃大徑三寸長五六寸者今通以澤州所出為勝採之妙

又經云紫石英味甘辛溫無毒主心腹竅逆邪氣補不足女子風寒在子宮絕孕十年無子療上氣心腹

痛寒熱邪氣結氣補心氣不足定驚悸安魂魄填下焦止消渴除胃中久寒散癰腫令人悅澤久服溫中

輕身延年生太山山谷採無時長石為之使得茯苓人參芍藥共療心中結氣得天雄菖蒲共療霍亂畏

扁青附子不欲鮫甲黃連麥冬薑本第一用太山石色重澈下有根次出雲零山亦好又有南城石無根

又有青綿石色亦重黑不明澈又有林邑石腹裏心有一物如眼吳興石四面鏡有紫色無光澤會稽諸

暨石形色如石榴子先時並雜用今散家採擇唯太山最餘處可作九酒耳仙經不正用而為俗法所重

通按此處缺周處溫陵侍即鍊白石英粉九等傾法并論紫石白石英體性及酒法五首目錄又缺鍊法一首

也採時依此

又鍊服石英法周司戶處溫傳授云於段侍即處得其妙 白石英兩大微搗碎以醱酢五大升於不津

磁器中蓋頭埋屋北陰處經七十日出瀉除酢搗碎研以水飛如出粉法澄清瀉之更研飛之可經二

七日以醱酢三小升還置不津磁器中蓋頭又埋可經二十日出以水洗去酢味盡研之極細即以好

醱乳三大升安不津器中重湯煮令乳竭止依方用和後九

又丸法 生乾地黄 校苓 薛州人參 涪州蜀天門冬 心枸杞 白皮取時月州 石五味搗篩為散入前

石粉令相得勻調鍊蜜和丸如梧子初服十九加至二十九日一服以後地黃酒服之

又酒法 生地黄切五升 烏豆二升 右二味以無及清酒漬經五宿取服

雜煮石英和金銀草藥餅及製罐中煮水飲法三首

千金翼煮石英服餌法 石英五大兩澤州光淨無點翳者取石英打碎如小豆蒼麥許大去細末更於

水中濶洗令淨重鍊袋盛之以繩子繫頭取五大升清水於不津鐵鑊中煮之煮時石袋不用着鑊底

恐沙石煎壞先以一杖橫鑊口掛石袋著杖上去底三二分許煮取一升汁置碗中經宿澄取清平朝

空腹頓服若以此汁煮稀粥服之亦佳每服後可行五百步并飲三兩蓋清酒又更依前法煮石二十

度者石即無力以布裏埋南牆下深三尺滿百日又堪用服之然終不如新者

又石英和金銀人參煎服餌法 金耐大銀兩 白石英兩五大 人參兩二大 右四味取一鐵金淨洗即下

前伴藥於釜中先下水三大升立一杖入釜中令至底水所浸著處即刻記之更下水二大斗七升通

前總三大斗煎之如魚眼沸漸減至杖所刻處即停火急取濕土置釜底取其汁貯以不津器中其金

銀石等漉出收取其人參隨藥汁細喫却其汁每朝空腹服三大合夜間又服二大合欲作食餌亦

任每服之後隨性多少酒使行藥氣忌如常法

纂靈記銀罐煮白石英服水法 白石英五大兩 通按罐底多開小孔四旁亦然欲令

通按枸杞 取時月若 春夏採葉 秋採莖實 冬採根是 也州土若 常山陝西 封州出者 是也 尚德按中 字按行 尚德按 千金翼作 陶

受可一小升罐底開小孔令遍側畔近下又兩行開孔遠遍於鐵鑪中著水五大升則內銀罐水中於炭火上煎取二小升去罐澄清分再服服訖飲少酒脯行一二百步許其石三遍煎一迴打碎一片作兩片乃至麻米大即休弃之不堪服也無所誠忌

同州孟使君餌石法一首

服石法 粗白石英一大片敲碎顆粒如酸棗核大不用全取白石顆先砂盤中和粗磊磊砂使壯兒仍少著水和投二三千下訖即淨洗取石又於砂盤中和砂更投一二千下依前淨洗即安柳籬箕中高葉兼少許水熟投訖以水淨淘出曬令乾又以手細細投之令淨碎總盡熟投使光滑即盛於夾帛練袋中若出將行若於家內安當門床上每日平明未梳裏前以七顆含於口中以酒或水下之一顆一迴咽七迴吞直令到小腹下以兩是飯壓著即依大家食一無所忌死生穢惡白酒牛肉但是石家所忌皆總不忌所以辛苦料理使光滑者恐有浮碎薄人腸胃作小瘡子亦無他疑即每日亦起梳裏前依前服之值令熱都總無忌比至日午左側即便轉出為新石推陳石下下訖還依大家食時即餐飯若自知病羸至夜食前又服七顆依前法吞一夜令在小腹下溫齊脚明日平明先便轉陳石總與石下訖又朝法夜法服之此石常在小腹內仍附倉門但小腹溫熱於四肢膀胱頭目髓腦膚體之內元無石氣欲發從何而作丈夫婦人多有積冷若下熱必須上冷若上下俱冷胃口不下食便成消渴致死若上下俱熱頭面生瘡唇乾眼赤手脚枯槁皮毛浮起不久成骨蒸凡人必須上下焦冷熱氣息調和筋脈通達若上熱下冷必有癩積服石之後即下熱自然上冷骨氣堅實腰腎強健萬病自除若不得力十斤亦須常喫若得力訖一斤即止也

羊肉中蒸石英及石汁無猪肉兼作薑豉服餌法三首

羊肉中蒸石英服餌法 精羊肉斤白石英三兩 右二味先取肉擘作兩段鑽作孔內石著肉中還相合即用荷葉裹又將臘紙裹又將布裹於一石米飯中蒸之候飯熟即出却石後取肉細切和葱椒薑等

疑當作蠟

通按燕音
岳蓋意也

尚德按千
金翼人參
生地黃生
薑各二大
兩

通按特音
字批牛又
凡獸育子
曰特
尚德按七
翼作十

外 壹 補 要 卷 三 一 猪肚中煮石英

絕小作餛飩子熟煮每旦空腹冷漿水中吞一百子吞訖將冷飯壓之百無所忌宜春夏服大驗其石永不發勿令餛飩破碎其石三兩週用之乃換之

又石汁中煮猪肉餌法 白石英兩 右一味絹袋盛以水三斗煮取四大升去石以猪肉一片細切

椒葱鹽豉一如食法煮之任意服隔十日一度打碎煮之一無所忌甚妙

又石英汁作薑豉服餌法 白石英兩 肥猪肉三斤 通按中破 右二味以水八升煮石英取五升

量煮猪肉得爛熟為度取猪肉汁下葱豉切肉作薑豉食之一劑可六七日喫令盡二兩石英三度煮

之第一度全用第二度中破第三度搗碎煮之每煮皆用白練袋盛之其石經三度煮即須換新者一

月以前八月以後皆可作餌也同

猪肚中煮石英及飼牛取乳兼石英和磁石浸酒服餌法三首

千金翼猪肚煮石法年四十以下服二大兩年四十五乃至六十以上加二兩常用四月以後服之者

緣石性重服經兩月以後石力若發即接秋氣石力下入其臟腰腎得力終無發理 白石英二大兩 未

種或縫 人參末 生地黃 切生薑 細切各七莖 切細抄椒目合丸 羊肉 細切猪肚 理如食法新

粳米 肚中急縛口勿使少泄氣及水入 右十味以水二斗煮至八升即停出藥肚著盤上使冷然後

破之如熟破惡汁流出先出石袋訖取煮肚汁將作羹服之每年三度服每服石英依舊餘藥換之分

數一依初法每服隔一兩日不得食木耳竹筍

又石英飼牛取乳服餌法 白石英三斤 取好者以上亦得 尚 右一味搗篩細研三兩日研了

取一牯牛十歲以上養犢者唯瘦其佳每日秤一大兩石末和剉豆與服經七日即得取乳每朝空腹

熱服一升餘者作粥喫任意食之百無所忌以五月上旬起服大好如急要亦不待時節終無發也牛

糞囊地隨意種菜供服乳人喫之

又石英和磁石浸酒餌法 白石英五斤 大兩澤磁石五兩 去毛石引鐵多者十兩亦得二

尚德按千
金翼五六
二作六七
三

酒一斗置不津器中懸藥浸經五六日以後每日飲三兩蓋常令體中微有酒氣欲加牛膝丹參杜仲生地黃吳茱萸黃耆等藥者各自量冷熱及所患并隨所有者加之仍隨所加有忌者禁之餘百無所忌一年以後鬚髮變黑腰疼耳聾悉差其酒三五日已後即漸添一二升常令瓶滿所加草藥宜力盡者任換之經三四個月疑石力稍微即更出搗碎還以袋盛經半年以後弃之準前更合

服石後有不可食者有通食而無益人者有益人利石者藥菜等一十條

不可食者油脂其性滑腸而令人不能食縱吃勿煎炙也

又蕪荑能生瘡發石氣

又薺芫云發石亦損石

又芥子及芥菜皆能發熱

又蔓青菜發氣損石

又葵菜滑而且穰亦不可食 凡不可食者勿食為佳

若欲食者皆須報鍊雜以葱椒然可通食者蘇其物潤腹而石氣

又冬瓜龍葵此二味甚壓腹胃燥溼可取

又蔓青作黃壘和肉作羹始可少食亦須椒葱雜之

又葵不可空吃三五葉入肉時食一頓也

張文仲論服石法要當遠人常性五乖七急八不可兼備不虞藥并論二十三條

五乖

重衣更寒一乖凡人寒衣即暖服石人宜薄衣若重衣更寒經云燕桂生寒故云一乖

飢則生臭二乖凡人飲食不消作生食氣服石人忍飢矣食即有所疲極即須消息恬養服石人久坐久

極即自勞三乖凡人有所疲極即須消息恬養服石人久坐久臥疲極唯須自勞適散石氣即得暢故云三乖

溫則泄利四乖凡人因冷乃得利暖便愈服石人食飲欲寒乃得安總故云五乖

飲食欲寒五乖凡人食溫則冷即差故云四乖

七急

當洗勿失時一急若覺身體暖疼調節強直翕翕發熱贖心悶即須洗浴若初寒先用冷水洗若初熱先用暖湯若初熱先用暖水後用冷水浴訖可以二三升冷水淋頭故云一急

當食勿飢二急須食即食不得忍飢故云二急

酒必高清令温三急無問冬夏常須飲多少任性熱尤飲佳故云三急

衣温便脱四急

食必極冷五急

卧必榻薄六急

食不厭多七急

八不可

飲食欲熱二不可

冬寒欲火一不可

凡服石常須消息節度覺小不安將息須依法不得自生孤疑

當疾自疑三不可

若覺頭風熱悶憤心煩則宜當枕頭以水洗手面即好不比尋常風濕依此尤佳

畏避風濕四不可

若久生久病有所勞極必須從行自勞

極不欲行五不可

若久生久病有所勞極必須從行自勞

飲食畏多六不可

居貪厚席七不可

若久生久病有所勞極必須從行自勞

所欲從意八不可

凡藥石發宜浴浴便得解浴訖不差者乃可餘瘡若浴不差即得依後服葱白麻黃等湯諸隨身備急藥

性將息節度為妙

目新附 紫雪 金石凌何也 甘草 姜藜 黄芩 大黃 狗白糞 芒硝 朴硝 加蘆根 麥門冬 香豉 石膏 犀角 胡豆 露蜂房 白鴨通 大麥奴 石以上諸藥皆乳石所要仲嗣今與名

醫擇之常用隨身備急

寒食諸法服之須明節度明節度則愈疾失節度則生疾愚者不可強強必失身智者詳而服之審而理之曉然若秋月而入碧潭豁然若春韶而泮冰積實謂美矣凡將理解折法具在中卷參而行之

乳石陰陽體性并草藥觸動形候等論并法一十七首

延年秘錄論曰乳者陽中之陰石者陰中之陽乳石從來陰陽精髓處至陰之裏有正陽伏其中正陽之中復在至陰之裏故陽生十一月甲子後服乳陰生五月甲子後服石陰陽發明互相為用而服之皆理

於內不泄於外也夫人膚虛皆帶風氣處人全軀常經含象理之有法則禍害不生乖於時候則危瘳立至竊覽古法皆云四月服石此謂浮學不曉由來按聞承開服石僉曰四月雖開而未平六月謂得氣之

尚德按金 石凌是以 金石煎成 者見千金 翼第十八 卷中

高德按 疑當作 疑當作 疑當作

節他皆倣此常以不全實其腑不全虛其臟即入風之道無所滯焉或有壅觸成痾飲食發病今并論次詳而行之通按雖開而未

舊論曰神農桐君深達藥性所以相反畏惡備於本草但深師祖學道洪道洪所傳何所依據云

鐘乳動末令人頭痛目疼木動鐘乳即胸塞氣短海蛤動乳即目疼氣短雖患不同其療一矣如與上患相應速服葱白豉湯其五石大散自後人發動將療亦非古法乃云鐘乳與木更互相動本草既無成文但學者穿鑿今但依頭痛目痛胸塞氣短證候速服葱白豉湯方千金云鐘乳葱白一斤香豉三升

吳茱萸升甘草三兩右四味以水一升半先煮葱白澄清取八升內藥煮取三升分三服訖令人按

摩搖動口中嚼物然後仰臥覆以暖衣汗出取衣服湯熱敷即便令濤尚德按濤飯醬脯等物任意食

之千金用葱半斤豉二升甘草人參各三兩甘草三兩桂心二兩豉升葱白升右四味合服如上法

若服此已解肺家猶有客熱餘氣復服桂心湯方 桂心 麥門冬三兩人參 甘草兩葱白兩

豉升右六味合服如前法出千金

防風細辛動疏黃令人煩熱脚疼腰痛或嘔忿無常或下痢不禁防風細辛能動疏黃而疏黃不能動彼

纔覺發便服杜仲湯方 杜仲三兩枳實炙甘草炙梔子仁枚李核仁去皮各豉升右六味合服如上

法若不解復服大麥奴湯方 大麥奴四兩甘草炙人參 芒硝 桂心各二兩麥門冬半斤右六味

合服如上法若服此已解脾腎猶有餘熱氣或冷復服人參湯方 人參 乾薑 甘草炙當歸各一

附子炮右五味合服如上法出千金

附子白石英兩更相觸若白石英先發令人煩熱腹脹若附子先發令人嘔逆不食或禁口不開或言語

難手足酸疼初覺宜服生麥門冬湯方 生麥門冬四兩甘草炙麻黃二兩右四味切先以水

一斗煮麻黃掠去沫訖內諸藥煮取三升分三服服訖若按摩臥覆取汗候藥氣散溫飯醬菜脯等任

食若熱未退更服大黃湯方 大黃別漬甘草二兩梔子枚豉升右四味切以水九升煮甘草

通按千金 吳茱萸作 人參然相 感志云服 乳石忌參 米二說未 詳孰是 尚德若按 服以下十 一字千金 大書

尚德按千 金梔子仁 在手核仁 後 又按四兩 兩千金作 四兩 通按石英 先發千金 作附子動 石發附子 英動附子

施子取二升半然後下大黃煎三四沸去滓分三服得下便止不下當盡服一法若煩熱加細辛一兩

若熱勢未除視瞻高而患渴復服栝蒌湯方 生栝蒌 大麥奴各四兩 甘草二兩 葱白半斤 豉半斤 右五

味合服如上法稍稍一兩合服之隱約得一升許便可食少糜動熱若已解胃中有餘熱復服芒硝湯

方 芒硝 桂心各二兩 通草 甘草各三兩 白朮二兩 大棗二十枚 李核仁二十枚 右七味合服如上法若

腹脹去芒硝加人參二兩出千金

人參動紫石英令人心急而痛或驚悸不得臥或恍惚忘誤失性發狂或惛惛欲眠或憤憤喜嘔或差或

劇乍寒乍熱或耳聾目暗又防風雖不動紫石而紫石猶動防風為藥中亦有人參緣防風動人參轉相

發動令人心痛煩熱頭項強纒覺發宜服麻黃湯方出千金 麻黃二兩 人參一兩 甘草二兩 葱白切一

豉升一 大麥奴把 右六味切以酒五升湯三升煮取三升分三服良

又解服人參湯法 人參三兩 細辛一兩 白朮 桂心各二兩 豉三升 右五味以水一斗煮取三升去滓分三

服若瞋盛加大黃黃芩施子各三兩出千金 甘草二兩

若忘誤狂發猶未除服麥門冬湯方在後卷 石發下

若心有餘熱氣更服人參湯方 人參 防風 甘草各兩 桂心 生薑切 白朮各二兩 右六味合服如

上法出千金

桔梗動赤石脂令人心痛寒嘔手脚逆冷心中煩悶赤石脂動桔梗令人頭痛目赤身體壯熱始覺發宜

溫清酒飲之隨能解須酒勢行則解亦可服大麥麴方 大麥熬令汗出燥止勿令大焦春去皮細搗

篩以冷水和服之入蜜亦佳出千金 麥門冬去心 豉半斤 葱白切半斤

舉石無所偏對發則令人心急口噤骨節疼痛強或節節生瘡將食太過發則多壯熱以冷水洗浴然後用

生熟湯五六石灌之食少暖食飲少熱酒行步自勞即服麥門冬湯方 麥門冬去心 豉半斤 葱白切半斤

右三味以水七升煮取三升分三服覆暖衣汗出即差一法加甘草三兩人參一兩半千金又有桂心

尚德按又 疑當作不 法疑當作 方且此七 字疑當與 上方後文 連書 尚德按各 一字千金有 一字 尚德按能 解千金作 能否 又按香字 上千金翼 有發令二 字

二兩云始覺發即服葱白豉湯用葱白半斤豉二升甘草二兩炙三味以水六升煮取二升半分三服
若散發身體卒生瘡即服麥門冬湯

銓擇薛侍郎等服石後將息補餌法一十五條

薛侍郎曰服石之後一二百日内須喫精細飲食羹粥酒等使血脉通利羹法 取麋鹿尾雉鴉鴨肉等

以水洗淨切如指大於鑊中炒令欲熟即多下葱白少下椒鹽熬令香即下少水煮次下粳米糝次下

豉清醬汁調鹹酸適口每欲食先須飲十數口羹汁令胃口開通皮膚津潤然後進諸食縱喫炙肉亦

無所慮作此將養食多且健縱喫餽飽亦須多吸臠汁

又若覺體氣沉滯石勢不行慎勿喫麪若覺虛假任餌薯蕷餽餠方 取大薯蕷刮去皮薄切日暴乾承

潤按作粉不粉者更暴依前按粉訖下篩以煖湯及鹽如麪細切作餽餠肉造臠如前羹法用澆餽餠

任食此肉補益強筋骨止渴

又若覺渴及熱感慎勿食炙肉羊膾尤惡自外肉性平冷者通食仍勿熱進恐成消渴

又若欲知體實而壅者先看脚拇指甲肉滿及肉色赤是實也實即畏熱發當須服藥微瀉

又若覺四肢筋強背脊重或頭痛如刺眼睛欲脫者宜以香湯浴須虛靜大屋內適寒溫先以湯淋大椎

及顛上三五十梳然後乃浴勿令犯風浴訖覆被安卧擬取汗仍須喫葱根葛豉粥法 葱根大 乾葛

城兩 豉合葱白大生薑切許椒十五 右六味先以水五大升煮葱根減半去滓下葛及豉煮取二

大升去滓細研少米作稀粥并著葱白等煮熟承熱啜服之訖依前覆被取汗訖令婦人以粉遍身措

摩使孔合半日許始可出外其病立差如不損可重為之

又若覺大熱者可服紫雪或金石凌或絳雪或白雪等但溫半大升水取次研一大兩香湯浴後頓服之

候一兩行利熱乃退矣凡此救急紫雪為上如不得通洩宜服黃芩飲子法 黃芩大 梔子仁 七乾

葛兩 芒硝兩 右四味切以水三大升煮取軟一大升絞去滓下芒硝調之分溫兩服快利即差

止

又若發熱但依法次第將息及服藥後得微汗微利為佳不要多利利多即反損石勢又如虛人

又若覺體氣昏惛不痛不養小便赤澀即搗茅根汁服之

又若口乾即搗蔗汁服之其甘蔗能利大小腸如先利即勿吃甘蔗在下卷口乾法中

又若少覺不下食服生薑汁酒等法 生薑汁倍生 白蜜倍生 清酒倍生 右三味相和溫頓服之半日乃效

甚佳

又若覺食不下兼嘔宜服麥門冬飲子法 麥門冬一大兩 甜竹葉一大 生薑兩切 小麥四合 右四

味以水三升煮取一升半分溫兩服

又若不下食體弱乏氣力即宜食鮮鯽鱒法 取鮮鯽魚剝去鱗破去腸血勿洗之但用新布一二尺淨

拭令血脈斷名曰上鱸餘依常鱸法美作蘇壘仍食灰薑等醬尤益人下食亦瘡氣痢赤痢

又若發瘡及腫有根無根但服五香連翹等湯及丸其法在此卷末癰疽法中 忌食猪肉蒜生菜等唯

宜食兔肉仍須熟喫甚佳

又若腫有根堅如鐵石帶紫赤色者服湯後仍以小小艾炷當腫上灸之日一兩炷為佳養如常法

又若觸穢必不善四體慄慄飲食無味亦可含香丸如不瘳服一盞五香湯取微利一行佳則不煩沐浴

也

飲酒發熱諸候將息補餌論并法一十條

古今錄驗論曰飲酒則石勢敷行經絡氣力強溢腎氣堅王即頓為陽事陽事過多便腎虛腎虛則上熱

熱盛則心下滿口乾燥飲隨嘔吐胃脘不和宜服葛根飲安穀神除熱嘔止渴也且石酒相得遮相為用

若石勢不行則須少飲如石氣調歇不復須飲

又若熱盛充滿經絡心腹少脹欲心下瘧瘧不消或時聚如堅隨後消者宜服秦丸湯得利便差秦丸湯

通按標音
寧音其因
極也

法 秦朮三兩細切以牛乳一大升煮取一小升去滓頓服之得利即差若老弱可量氣力進之其飲食亦宜

清冷不得濁熱濁熱則使石氣壅塞不行喜嘔吐病堅結也亦能發黃或小便赤心堅痛者亦宜服秦

朮湯得漉泄差熱氣散後黃色縱徹皮膚是差候勿怪熱散後慄慄寒顫若因顫黃復出外者是謂餘

熱欲散也勿厚覆但使肌膚中少寒顫即止

又若熱解寒不解者可飲三合熱酒使解

又若寒解後頭重耳鳴滿眼漠漠心下痛者可飲二合許清酒便差寒溫宜依此法

又若心下結硬腹脹大小便不利者急服前胡大黃湯下之法在下卷小便淋法中

又若欲狂癡失常者與白薇湯下之法在下卷痰癖乾嘔法中

又若酒熱歇石熱亦不復行心下熱結已消黃縱未歇亦無所苦但冷飲食勿進辛辣菜及熱補食若不

欲進清冷者可和暖餌勿令大熱

又若飲熱歇後石勢虛損飲食入口自覺諸脈中瘡瘡如冷水入者是酒石俱退經絡空虛故也宜積口

調冷食兼依服進猪蹄羹通養諸脈自差止

又若頭眩耳聞空中有人語心怯恐懼兼憂悸不安四肢如痺或起眠即輒驚如被虎狼所逐威勢所攝

者方 服淡竹瀝一二升乃至三升差止亦可進白薇湯下之消息稍與令飲粥常令有食力時進雞心

酸棗湯常令對偶安慰之以美言相悅慎不可以惡事驚之

又雞心酸棗湯瘡後陽多腎虛發熱積日不食胃中虛熱飲食不已氣入百脈心臟虛甚令人失常法

出古今錄驗 雞心十枚酸棗升半人參兩茯苓兩芍藥各二兩白薇兩枳實炙知母甘草炙栝婁兩生地黄兩

右十一味切以水一斗煮棗半熟內心煮取三升冷分三服

餌寒食五石諸雜石等解散論并法四十九條

尚德按體
疑當作體

通按此門
內有四
五條與手
金翼大同
其文有小
異者
尚德按手
中千金翼
作布手巾
通按酒字
當飲字
尚德按飲
酒二字互
錯

執而療之或取定古法則與本性有違或取法庸醫則昧於時候皆為自忤遂推石過深省其理未曰合
宜每尋古醫互相晦見直言沐浴實未探微寒溫適情蓋須自度隨時之義易所通焉故陶正白云昔有
人服寒食散簡古法以冷水淋身滿二百罐登時疆斃又有取汗乃於狹室中四角安火須臾則殞據茲
將息豈不由人迫之昔事守株何甚今列篇章幸擇長而錄用耳寒食藥得節度者一月輒解或二十日
解堪溫不堪寒即已解之候也其失節度者或頭痛欲裂為服藥食溫作癖宜急下之

又若手脚卒患頑癖者為犯熱經久故也急與冷水洗飲熱清酒進冷食即止一法飲冷清酒亦止
又若體上生瘡結氣腫痛不得動者為自勞太過也宜服香豉飲法 香豉并葱白一虎 右二味以水
三升煮三沸服之不止乃至三四劑自止

又若腰痛欲折兩目欲脫者為熱上肝膈腰腎冷極故也宜服黃連飲法 腰痛欲折兩目欲脫千金翼作二條 黃連 甘
草各二兩 右三味切以水三升煮取一升去滓內朴硝一兩頓服得微利止

又若眩暈欲倒者為衣厚犯熱故也宜冷水淋頭并洗之須臾即愈 千金翼云宜洗頭尚德按翼云宜針頭冷水洗

又若脚疼欲折者為久坐溫處故也宜常須單淋行役并以冷水洗浴即止

又若腹脹欲裂者為久坐下熱衣溫失食故也宜數冷食冷洗當風取冷須臾即差

又心痛如刺者為應食不食應洗不洗寒熱相擊氣結不通填於心中故也宜數飲熱酒任性多少酒氣
行經絡通達淋以冷水又冷淹手中搭著苦處溫復易之須臾解也解後仍速與冷食食多蓋善於諸痛
之中心痛最急宜速救之法在下卷心痛法中

又若發急遍身熱如湯火或氣結不識人時倒口噤不開不自覺知者救之要以熱飲隨其性酒之卒不
得下者當打去齒灌之咽中塞盛酒入必還出但灌勿止半日許以酒下氣徹乃蘇酒卒不下者難可救
矣

又若下痢如寒中者為行止食飲犯熱所致宜速脫衣冷食冷飲冷水洗即差

又若百節酸疼者為卧處太厚又蓋覆被衣温不脫故也但單淋薄被單衣或以冷水洗勿著新衣著故垢衣雖冬寒常須散髮受風仍以冷石熨其衣勿繫帶若犯此酸悶者急入冷水浴勿忍病而畏冷兼食冷飯

又若兢顛惡寒或發熱如温瘧者為失食忍肌失洗不行又食臭穢故也宜急飽冷食冷水洗數行即愈又若惡食臭如死物氣者為食温作癖故也宜急以三黃湯下之若不下終不差法在下卷解壓法中又若咽中痛鼻中塞清涕出者為衣温近火故也但速脫衣取冷當風以冷石熨咽鼻當自差不假洗也

又若胸脇滿氣上嘔逆者為飢而不食藥氣上衝故也速與冷水洗食冷飯止
又若食便吐出不得安住者由癖故也宜急以甘草飲下之不下當危人命爾甘草飲法 甘草二兩大黃三兩黃芩兩二 右三味切以水三升煮三兩涕去滓分服以利為度

又若大便難腹中堅如盤蛇者為犯温積久腸中有乾糞不去故也宜銷酥蜜膏服一二升津潤腹內即下若不可服大黃朴硝等下之

又若患淋者為久坐温處或乘鞍馬坐處太熱熱入膀胱故也但冷食冷水洗冷石熨腹不過一日即差止千金翼云若不

止可下之不下殺人
又若寒慄頭掉不自支持者為食少藥氣溢於肌膚五臟失守百脈搖動與正氣相就故也宜強飲熱酒以和其脈強食冷食以定其臟強行以調其關節強洗以宜其擁滯即差

又若小便稠數者為熱食及噉諸熱餅肉之屬故也宜冷水洗服兼服梔子湯法 梔子仁兩二甘草炙芒硝湯成黃芩各二 右四味切以水五升煮取二升分温三服取利即差

又若失氣不可禁止者為犯温不時洗故也但冷水洗之即差
又若遺糞不自覺者為熱氣入胃大腸不禁故也當冷洗即差

又若目痛如刺者為熱氣衝肝上眼故也但數冷食清朝温小便洗之不過三日即差止

尚德按
千金翼作
雍

尚德按
千金翼云
不可更下
乃止

又若耳鳴如風聲又有汗出者為自勞過度陽事不節氣上耳故也宜數飲食補之節禁陽事即差

又若口中傷爛舌強而燥不得食味者為食少穀氣不足藥氣積在胃管故也宜急作豉湯服之豉湯法

香豉仁姜糖 甘草二兩麥門冬法小柏各三兩

佳再合為度

又若關節強直不可屈伸為久停息不自勞洩藥氣不散漸侵筋血故也出力使溫冷洗即差止

又若得傷寒溫瘧者為犯熱故也宜以常瘧藥救之無咎但勿服熱藥耳其傷寒瘧藥等皆除熱破癖不

與寒食相妨故通服也凡服寒食雖已熱解而更病者要先以寒食救之終不中冷其法在下卷解壓法

中

又若飲酒不解食不得下乍寒乍熱不洗便熱洗之復寒甚者數十日輕者數十晝夜不得寢寐愁悲志

怒自驚跳悸恍惚忘誤者為犯溫積久寢處失節食熱作癖內熱與藥併行寒熱交爭雖以法救之終不

可解也昔皇甫氏曾餌此散每發即欲自刑尊親制之乃免斯禍強令飲食其熱漸除縱家有寒熱藥發

急皆忘雖素聰明發皆頑冥告令難喻為茲斃者不可勝數遂簡家兄士元救急之法合三黃湯服之大

下便差止而錄之法在下卷解壓法中

又若脫衣便寒著衣便熱為脫著之間失適故也小寒自可著小溫便可脫即止洗之則爽然差慎勿忍

之使病成也小品云洗則了然差矣應洗勿忍之忍則病成也

又若齒斷腫唇爛牙齒搖痛頰車嚙為生犯熱故也宜時救之可當風張口使冷氣入咽漱寒水即差

又若脈洪實或斷絕不足似死脈或細數弦駛其所犯非一此脈無醫不識也熱多則弦駛有癖則洪實

急痛則斷絕凡寒食藥熱率常如此自無所苦非死唯勤節度為妙

又若大便稠數為坐久失節度將死之候也如此難瘡矣可與前大黃黃芩梔子芒硝湯下之儻十有一

生耳可為必死之瘡不可不利致死令人恨也

又若人已因而脈不絕為藥氣盛行於百脈人之真氣已盡藥氣尚自行故不絕非生氣也死後體因溫如生人肌腹中雷鳴顏色不變一兩宿乃作死人也

又若周體患腫不能迴轉者為久坐不行又不飲酒藥氣滯在皮膚之內血脈不通故也宜飲酒冷水洗自勞即差若不能行者遣人扶持強行使肢節調暢乃止亦不得令過度使反發熱或發熱者還當洗之
又若食患冷不可下者為久冷食口中不知味故也當作白酒糜多著蘇熱食一兩頓若小悶者還令冷飲食即差止

又若下部臭爛者為坐薦席厚熱故也當坐冷水中即差

又若夜眠不得睡者為食少熱在內故也服梔子湯方 梔子仁十四枚 大黃兩三 黃芩兩二 右三味切以水

五升煮取三升去滓分三服微利又當數進食食自得眠睡

又若嘔逆咽喉中傷清血出者為臥溫及食熱故也但飲冷水冷石熨咽喉即差

又若藥發輒安臥不與人語者為熱盛食少失其性故也但與熱酒冷洗冷食自勞便差千金翼云藥發輒少即不識人

又若四肢面目浮腫者為飲食溫久不自勞力藥與正氣相隔故也但飲熱酒冷食自勞洗浴即差千金翼云

由熱氣盛食少不充邪性正性故也

又若鼻中有氣如蝦雞子臭者為著衣溫故也或陰囊臭爛為坐熱故也入冷水中即差宜脫衣洗浴即

自差

又若卒目暗無所見者為飲食居處太溫故也但脫衣冷洗冷食須臾差止

又若身肉痛痛無常處如遊風者為犯熱所作非風冷也宜冷洗宜冷石熨之自差

又若服藥心悶亂者為服溫藥與疾爭力故也法當大吐如或不吐病當至死若吐不絕可食冷食飲自

然差也若絕不識人口不復開者亦當斷齒以熱酒灌之入咽吐出者更與之但得酒氣下通不半日即

便蘇矣

又若嗜寐不覺者為久坐熱悶故也宜冷洗冷食即差

又若肌膚堅如石不可屈伸為熱食温卧作痺五臟隔閉血脈不通故也急服前三黃湯下之食冷食飲

熱酒自勞即差

又若臂脚偏急痛苦者為久坐卧温熱不自移轉氣入肺脾胃故也宜勤以二布巾淹冷水搭之覺温則

易如此不過三日即差

千金翼云熱入
腹附骨故也

又若患腹背熱如子如杯如盤許大者以冷石隨處熨之又若脚指間生瘡者為履襪大温故也當以脚

踐冷地以冷水洗足差

又若口熱痛煩悶者方 生雞子如 右一味頓服之即便愈

癰疽發背證候等論并法五十四首

夫二儀含象三才貫形五體以類於五行六腑乃同於六呂人之肉也則脾之所主人之皮膚則肺之所
管膚肉受病皆繇滋味而與衣服衣服厚暖則表之呼寒滋味失度則腑臟皆熱腑臟既擁則血脈不流
血脈不流則毒氣偏注湊於俞穴俞穴之所陰陽會津承虛伏守必煮其血血敗即潰肉肉腐而成膿實
則為癰浮則為腫也若兼腎肝虛熱遂成疽成癰矣且疽則附骨應則著筋凡曰癰疽脈皆有狀有浮有
滑有數有澀有弱有沉浮為陽虛滑為陽實數為陽燥澀為陰寒弱為陰虛沉為陰堅三陽三陰之脈也
若三部之中脈有一陰一陽復結為失常經者癰疽之候也且脈法心洪肺浮肝弦腎沉若肺肝心俱至
即發癰疽何以言之為一陰一陽水火競焉舊論寒熱客於經絡血澀不通其理乖也論熱盡發於內而
形於外未有外熱能入於內而成其腫皆繇表虛客寒所搏故衣厚暖呼其寒是其義也凡癰發生皆繇
自召一呼吸失度二喜怒不調三飲食不節四陰陽乖候犯此四者則六腑不和榮衛不利榮者血也衛
者氣也血傷寒則澀氣傷熱則益氣則為火血則為水水火相搏遂形癰疽故加虛則氣撮心悞四肢顛

取三升
尚德按臘
疑作蠟

尚德按酒
字下千金
有肉字

陳

黃芩 肉桂 芎藭 茯苓 巴豆各三兩去心皮熱 右二十三味搗篩蜜和更搗一

千杵封以油臘紙無在有患時溫熱疔病鬼瘧病心腹鼓脹疽黃垂欲死者可服四五九九如梧子大
或至六七九但取三兩行快利為度利止即差

又療發背腸癰乳癰一切毒腫服之腫化為水神驗方

防風 蜀當歸 甘草炙 薑薑 人參 黃連 黃耆各四兩 巴豆二十顆去心 右十三味搗篩蜜和

為丸初服十九取快利三兩行如不快利更服三兩九以快利為度若利多以冷酢飯止之後服每

減九常取溘利腫消乃止麥實一方有

又療一切腫初覺痛不可忍神效方 取麩漫如十指許粗繞腫令匝滿中布生板又以一片麩可板上

蓋之當中以艾炷如酸棗大灸之蓋麩欲焦即換著新麩痛停止

又療風毒及一切腫塗散方天后賜會稽王岑十六遂於嶺南見郭訥駙馬患腫發背會稽與蘆黃門等

親與藥須臾平復岑侯因得此法 大黃兩 白斂兩 寒水石 紫葛 青木香各兩 硝黃 黃芩各二兩

節好肉處移取腫搗即消

又方汝陰靈明府說傳云甚驗 水銀斤 右一味以紙分為兩裏蜜繫頭更以帛重裹物令走失遞互

將榻上覺溫即易不過十數度熱毒盡歇即消矣神效

又發背神驗方 狗白糞兩 右一味覺欲作腫者以煖水一升絞取汁分再服以滓敷上每日再為之

差止

又方 凡腫起背胛中頭白如黍粟四相連腫赤黑令人悶亂者名發背也宜禁陽事酒蒜與麩若不炙

療即入內殺人可當瘡灸七八百壯有人不識多作雜腫瘡皆乃死

又方 取三年酢滓微火煎和牛脂封上日一易之

通按千金
猪狗牙灰
皆可封日
三四易
通按救急
方云猪羊
脂作片冷
水浸貼
易之五六
十片差初
帖即寒寒
定料既行

尚德按十
金覆麥一
兩芍藥以
下六味各
二兩

尚德按十
金背由太
作此由大
山茱萸以
下四味各

又方 取亂髮及酒服一方寸匕亦治癰疽

又方 狗牙灰酢和封之差

又方 飲鐵棗三升下痢即差尚德按三千金作二

又方 猪羊脂封之亦療乳癰妙

又方 鹿角反酢和塗之佳尚德按鹿千金作鹿

又療石氣在皮膚腫熱膏方 生麥門冬法姜蕤 鼠李皮 石膏碎凝水石 沙參略一青箱子 露

蜂房略一竹瀝 杏仁油大合牛酥兩 生地黄汁三 右十二味切內酥油漚中微火上煎令魚眼

沸一炊久膏成覺有熱處即摩之差止

又療發背及癰疽潰漏并未潰腫毒方 栝萹 榆皮 胡燕窠 鼠坐土 女人潮信帛水洗 右五

味等分潮信汁和如泥塗腫上乾即易之潰者四面封亦覺即封之三五日差

又排膿內塞散主大瘡熱已退膿血不止瘡中肉虛疼痛方 防風 茯苓 白芷 桔梗 遠志法甘

草多人參 芍藥 當歸 黃耆略一桂心二分附子炮厚朴兩赤小豆五合 右十四味搗散酒

服一方寸七日三服夜一服

又排膿止痛利小便散方 瞿麥兩芍藥兩赤小豆微桂心 芍藥 麥門冬法白斂各二黃耆 當歸

略二 右九味搗篩先食溫酒服一方寸七日三

又療癰腫令自潰長肉意苧仁散方 苧苧仁 桂心 白斂 當歸 肉苻蓉 乾薑各二 右六味

搗篩為散先食溫酒服一方寸七日三夜再之

又療諸虛不足發背及癰疽差後經年復發背由太風聚結毒氣在內閉塞得夏月出攻背不治積聚作

膿血或為內漏內塞排膿散方 山茱萸 五味子 茯苓 乾薑略六當歸 石葦法芍藥略四附子

二分肉苻蓉 巴戟天法遠志法麥門冬法乾地黄略八菟絲子酒地麥各三分石斛 人參 甘草

癰疽發背證候等論并法五十四首

六兩地麥

作地脂

尚德按干

金無已漬

二字人參

以下三味

各一兩日

七八服夜

二三服以

多為善方

後之最詳

尚德按干

金黃者黃

連芍藥各

三兩澄清

取二斗煮

取一斗日

一

又按瘡疑

當作痛

尚德按干

金八味各

二分

多芍藥 桂心 右二十味搗散服一方寸七日三夜一稍加至二七長服終身不發癰痂

又瘡癰疽發背婦人發乳諸癰已潰未潰者便消不消者速清疾愈內補散方 木占斯 敗醬 細辛

乾薑 厚朴 炙桔梗 甘草 防風 右十味搗篩為散酒服方寸七

日三夜二開食長服去敗醬

又瘡癰疽發背猪蹄湯方 猪蹄具黃耆 黃連 芍藥 黃芩 薔薇根 狼牙 右七味切

以水三斗煮猪蹄令熟澄取三升漬諸藥煮取一升洗瘡一食頃著帛拭乾著生肌膏日二生痂止瘡

痛者加當歸甘草各二兩

又蝕惡肉散方 馬齒礬石 麝香 研丹砂 雄黃 雌黃 白礬 硫黃 右八

味細作散敷之先蝕惡肉令盡即封生肌膏

又癰疽蝕惡肉膏方 大黃 附子 桂 莽草 芎藭 雄黃 雌黃 真珠 白斂 白礬 薔薇 右

藺茹 右十一味先以猪膏一升半煎六種草去滓內藺茹礬石末絞之塗瘡中惡肉盡即止

又散方 藺茹 礬石 礬石 雄黃 硫黃 右四味為散內瘡孔中惡肉盡止勿使過好肉也

又瘡癰疽發十指或起膀胱及發背去惡肉方 猪蹄如餌法當歸 大黃 芎藭 芍藥 黃芩 獨

活 莽草 右八味以水三斗煮猪蹄取八升汁內藥煮取四升去滓洗瘡兩食頃拭令燥以後

麝香膏封之

又麝香膏王諸惡瘡及癰疽發背去惡肉方 麝香 礬石 雄黃 真珠 右四味以猪脂攪

令如泥塗惡肉盡即止更敷生肌膏

又生肌膏主癰疽發背已潰方 甘草 當歸 白芷 椒 去地黃 細辛 續斷 烏喙 椒

皮肉從容 薤白 蛇 右十一味切以好酢半升和漬一宿取指膏三斤微火煎之令魚眼

沸三上三下候白止黃膏成用塗之佳

各二兩
 烏喙六分
 無續斷
 通按千金
 名竹葉黃
 者湯有黃
 芩作十四
 味
 尚德按千
 全名黃芩
 竹葉湯治
 癰疽發背
 黃耆灸門
 冬各三兩
 有黃芩三
 兩以水一
 斗一升先
 煮竹葉取
 一斗
 尚德按千
 金名五利
 湯黃芩二
 兩梔子仁
 五兩分四
 服
 尚德按千
 金名大黃
 牡丹湯要
 梔同芥子
 半升作水
 子一升要
 畧瓜子半
 升芒硝二
 兩以五水
 升煮取一
 升頓服要

又療胸背遊腫癰黃耆湯方 黃耆 人參 麥門冬 石膏 碎 芎藭 當歸 各二兩 生地黃 兩 甘草 炙 芍

藥 各三 生薑 五兩 大棗 三十 枳殼 半夏 四兩 洗 去滑 竹葉 握 右十三味切以水一斗煮竹葉取九升去滓內藥

煮取三升分四服日三夜一

又療服石之人患瘡腫等單服牛蒡方 每吞三撮

又方 每食訖含生乾地黃丸如梧桐大除熱補益也

又療年四十以上強壯常熱發癰無定處大小便不通大黃湯方 大黃 黃芩 各三升 麻 兩 梔子 五兩

硝成下 右五味切以水五升煮取二升四合去滓下芒硝攪令調分三服得利為度不過三劑即

差

又癢散發生瘡腫赤嫩方 取赤石白一片燒令赤置酢中搗作末敷之如燥更易以差為度又取糞中

瘡槽蟲搗如泥塗腫上不過三度即合口甚妙

又主腹內癰方 大黃 兩 牡丹 兩 芥子 半 硝石 合 桃仁 五十枚 去 右五味切以水六升煮取一升五合

分再服膿即下無膿者下血

又若大熱背腫身多生瘡下諸石方 露蜂房 兩 木緋帛 一尺 尚德按 亂髮 兩 升麻 兩 右四味先用

緋帛裏蜂房等以麻纏使遍於炭火上燒令烟盡及熱搗碎作黑灰篩之取末候熱時空腹酒和服一

方寸七日再服此藥五六日即常以小便及大便下青黃赤汁及黑物極滑而腥臭者此石下候三五

度下即休若多恐令瘦損若不大急困但煮五加木汁服亦療丁腫

又瘡背上初欲作腫方 大黃 升麻 甘草 炙 黃芩 各三 梔子 仁 枚 右五味切以水九升煮取二升

半分服快利便止不下便進

又凡發背為癰疽腫已潰未潰方 香豉 三 右一味少著水和熟搗如強泥作餅子厚三分依腫大小

貼之以艾布其上灸其鼓餅使溫溫熱而已勿令破肉也若熱痛急易之或一日二日灸之若先有瘡

外臺祕要 卷三十七

孔勿令鼓餅蓋却但四面著灸孔中汁出差止

又瘡惡瘡腫著陰明或偏著一邊疼急掣痛牽入小腸痛不可忍一宿殺人方 茴香草 右一味搗取

汁飲一升日三四服又取滓敷腫此外國神法從元嘉未來用之神效起死人

又生魚薄主乳癰方 生鯉魚長七大黃 莽草 竈中黄土各六 右四味別搗魚和膏三味下篩更

搗令調以生地黃汁和敷腫上日五六夜二三即愈

又瘡動散背腫已自利虛熱不除宜服竹葉黃耆湯方出古今錄驗 竹葉切三分 黃耆兩 小麥升 芍藥兩 甘草

二兩 石膏研 人參兩 升麻兩 茯苓二兩 桂心六分 當歸兩 乾棗十四 五味子 生薑兩 乾地

黃兩麥門冬去心 知母兩 右十七味切以水一斗二升煮竹葉小麥取九升去滓內藥煮取三升温

分四服

又商陸貼諸腫方 商陸 黃芩 黃連 白芷 白斂 大黃 莽草 白芨略二 右八味搗篩消

膠汁和如泥塗紙貼腫乾即易之

又有患癰破下膿訖著兒藥塞瘡孔乃瘡痛煩悶困極有人為去兒藥以楸葉十重以布帛裏緩急得所

日再三易之痛悶即止此法大良無比勝於母法貼此主癰疽潰後及凍瘡有刺不出甚良冬無椒葉當

早收之臨時以鹽湯沃令潤用之亦佳薄削楸白皮用之亦得

又梔子湯主表裏俱熱三焦壅實身體生瘡或發癰癤大小便不利方 芒硝湯成 甘草二兩 黃芩 知

母各三 大黃四兩 梔子仁枚 右六味切以水五升煮四味減半下大黃煮取一升八合去滓內芒硝

分三服

又癰疽發背後小瘰癧李根散方 李根切 甘草炙 桔梗 黃芩略 葛根 當歸略 桂心 芍

藥兩 四芎窮 大通草 白斂 厚朴炙 附子切 栝蒌子半 半夏洗 右十五味搗篩為散酒服一

方寸七日三瘡大困者夜再有人發背骨出十餘節服此即差

畧同但用 水六升內 芒硝再煎 尚德按手 金取三升 分三服便 道作更進 尚德按疼 急掣痛十 金作疼痛 學急 又按元嘉 說見第三 十卷中 尚德按十 金甘草三 兩梔子仁 二十枚 尚德按十 金後作及 少二字括 梗黃芩各 一兩當歸 二兩芍藥 六兩栝蒌 子作栝蒌 根半夏各 五兩云有 人患背從 瘡中出膿 有三十餘 癰癧云云 尚德按手 金芎藭黃 芩人參乾 薑各二分

法心一分
 尚總按千
 金無未清
 二兩桂心
 一兩桂心
 尚總按此
 方及前後
 文與千金
 大異外台
 全據單子
 金本方第
 二十四卷
 中所引者
 是
 又按翼離
 字下有清
 及二字絕
 字下有絕
 可忍三字
 作法方無
 赤小豆下
 末字替諸
 藥作字末
 之合四字
 日三夜二
 作日夜各
 五三五日
 作三日春
 作告

又主癰疽發背方 蜀椒汗 黃苓 人參兩 乾薑 附子炮 白斂 防風 桂心 甘草各 芎藭兩

赤小豆一合 右十一味為散酒服一方寸七日三夜再服之

又內補散癰疽發背已清未清排膿生肉方 當歸 人參兩 桂心 芎藭 厚朴炙 防風 白芷

桔梗 甘草各 右九味為散以酒服一方寸七日三夜再瘡未合服勿停

又瞿麥散主諸癰未潰瘡中疼痛膿血不絕法 瞿麥 白芷 黃耆 當歸 細辛 芎藭

薏苡仁 赤小豆末 右九味先以清酒一升漬小豆出銅器中煮之乾復漬復熱五遍止然後

搗諸藥下篩酒服一方寸七日三夜二服三五日後痛者養肌肉生一法以春酒漬小豆多痛倍瞿麥

痛未開倍白芷多膿倍黃耆薏苡仁芎藭甚妙

又黃耆散主癰疽撮膿方尚總按千金無此方見翼白斂三分下有 黃耆五倍 赤小豆一分 芎藭

二分肉 芍藥三分 白斂三分 栝蒌三分 右六味搗散酒服方寸七日三服之草三分

又療發背及癰腫熱焮已熟者即膿出未熟者自然消除神驗方 牛蒡根者洗去土勿令 右一味

以水三大升煮令爛絞去滓更盛於磁器中重湯煎之使如稀糊以塗爛帛貼腫上熱則易之驗

卷終

唐王壽先生外臺秘要方卷三十八目錄石下八門

乳石發動熱氣上衝諸形候解壓方五十二首

石發熱嗽衝頭面兼口乾方六首

石發兼虛熱痰癖乾嘔方五首

石發吐血衄血方七首

石發熱煩及渴方一十六首

石發熱風頭痛心煩寒熱方三首

石發口瘡連胸面及身上心痛方一十四首

諸石發腹脹痞滿兼心痛諸形證方七首

石發熱目赤方一十首

石發癭結大小腹留壅老小虛羸方六首

石發大小便澀不通兼小便淋方一十六首

石發後變霍亂及轉筋方一十六首

石發後變下痢及諸雜痢方一十二首

石發兩脚卒冷兩脅腋卒熱并口噤方三首

石發苦熱解折下石方四首

服石後將息飲食所宜法二首

紫縛既并食飲將慎法三首

服石後防慎貯雜藥等一首

高德按諸石之諸疑衍

唐王燾先生外臺秘要方卷三十八

宋朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞簡院上護軍臣林億等上進

新安後學程行道敬通父訂梓

乳石發動熱氣上衝諸形候解壓方五十二首

尚德按悍疑當作悍

論曰夫乳石之性緩而且速能悍風寒逐暑濕導經脈行飲食之氣在陰即補其不足在陽即能發其炎陰盛陽虛則二儀亢位所以炎上府之受邪則表熱氣隔至陰之伏也脈形陽浮而數陰伏而沉理之於經自然通泰若炎之於孫絡即血脈過流或全抑之則乖於石性理而兼助則表裡周榮若遇小發可自勞力按摩不可即治熱不已者別法於隨事擇用解散方

瘡寒熱胸中塞面腫手足煩疼是鐘乳發宜服生麥門冬湯方 生麥門冬去心四兩 豉三升 葱白切半斤 右

三味以水八升者取三升分服體氣熱是客熱當自漸加衣物雖似惡加之後必佳忌如常法此方甚良千金同

又壓丹石發方天台山國清師所專用 杏仁一百枚去皮尖 右一味以水二升於盤中研之絞取汁令盡以白麩二升

用杏仁汁漫作餽既還以杏仁汁煮務令極熱其病者量性多少噉之令盡訖又取美酒數升煮十餘

沸候熱訖病者量性多少飲之徐令盡蓋覆安卧初覺心悶頃間四體輕虛一服三年不發大效

又療乳石發方 甘草炙麻黃一兩 右二味切以水三升煮取半升和清酒半升其患者先須火邊

炙熱撒欲汗承熱服令盡蓋衣卧須臾大汗即差千金同

又若因食倉米糞肉動乳方 必須葱豉湯細細服之五六度即差千金同

又食飲損者方 於葱豉湯中加當歸一兩煎之去滓分服即差若未可即服蘆根湯千金同

又若已服安和藥仍不退者此小觸動服葱豉等湯不醒者可服蘆根湯解壓之方 蘆根 地榆 五

加根兩各一 右三味切以水三升煮取一升服之即解千金同

通按千金湯有二一草麻黃一多甘草人參所主俱不同尚德按千金生麥門冬湯有三其二和通所說其一多甘草桂心人參尚德按交千金翼作矣尚德按根千金翼作皮

乳石發動熱氣上衝諸形候解壓方五十二首

通按千金
莫肺臟氣
不和作肺
氣所生臟
氣不和

通按此條
有誤字

尚德按半
疑當作半
通按此方
千金夏療
服石散發
癰疽其節
度不同

又若得時氣冷熱不調動乳者皆是寒熱所致其狀似瘧久久不瘳損人性命縱服湯藥必終難差宜作
生熟湯浴之方 以大器盛湯若大熱投少冷水即於湯中坐勿動須臾百節開寒熱之氣皆從毛孔中
出變作流汗若心中熱悶者還服少許熱湯即定久乃出湯以衣被覆蓋蓋睡豁然平復如患太重者不
過三兩度即差千金

過三兩度即差千金

又解一切石發方借珍

量之

胡豆并

右一味搗研之以水八合絞取汁飲之即差虛弱人半升中平以意

又大黃丸方

大黃五兩

構末五兩 大麻子中 以手按去皮取仁研如膏

右二味合治令勻以蜜和丸如梧子大

以湯飲下十九至二十九以宣利為度此方甚妙通陽壅秘服之尤良忌如常法

華陀齊危湯療石毒卒發者慄慄如寒或欲食或不欲食若服紫石英發毒者亦熱悶惛惛喜臥起上無
氣力或寒皆是腑臟氣不和所生瘳之方尚德按肺臟氣不和所生 齊危四兩 甘草各一 茯苓各一

黃芩各二 蔓青子并 人參兩 芍藥兩

右八味切以水一斗煮蔓青子取八升去滓內餘藥煎取三升

去滓分三服日三若虛弱倍人參若氣上加茯苓齊危一兩甚良千金翼云若體寒者倍人參減黃

尚德按體寒
令翼作虛弱

應揚州所得昇故單葱白湯藥瘳沉體中數年或更發宜服之方 葱白切一 右一味以水五升煮取

二升半去滓服盡未定更作服之至二劑即止

又瘳乳石發樊尚書傳蕭亮常服良驗余因熱重盛切慮不安過於李虔祐率更吳昇諾議處求解法亦

稱此味奇絕方 甘草二 生犀角一兩 姜蕤三兩 右三味切以水四升煮取一升半分服甚效

又方 烏豆并 右一味以水九升煮取五升去滓以銅鉢重湯煮取一升每服一匙盡即差未定更作

住

又若感熱發方 取無灰酒煮三五沸承稍熱服之以布手巾兩箇浸水以搗熱處取差為妙更互用之

通按此方
千金要治
雜石發動
尚德按一
疑當作二

又療諸乳石發動口乾寒熱似鬼神為病方 麥門冬八分 五加皮 犀角屑 黃芩各四分 姜蕤四分 梔子四分

升麻四分 大黃五分 芍藥四分 大青 甘草三分 苦參六分 右十二味搗篩蜜丸食後以蜜水服十四丸漸加

至二十九日再意加減千金

又療諸石發熱困苦方 豬脂五斤 芒硝四分 葱白五合 豉心 右四味以水三升煮葱豉取一升二

合去滓下豬脂芒硝分三服未差再服千金

又療石發熱盛充實四體煩滿脈急數大小便赤澀升麻湯方 升麻 黃柏 黃連 甘草各兩 黃芩

兩芍藥六兩 白鴨通五兩 淡竹葉升切 梔子十枚 豉升 大黃兩 右十一味切以水二斗煮竹葉鴨通取一

斗一升去滓澄清取一斗內諸藥煮取四升去滓分三服若上氣者加杏仁五合滿加石膏二兩千金

又常防備熱發法方尚德按法 麥門冬三兩 甘草兩 人參兩 右三味搗篩蜜和丸如彈丸一日服三

丸甚良千金

又三黃湯折石熱通氣泄腸胃解肌方 大黃三兩 黃芩兩 梔子七枚 甘草兩 豉升 麻黃兩 右六

味切以水九升煮麻黃去上沫下諸藥煎取三升半下大黃三五沸去滓分服得利以差止千金

又方 黃芩兩 豉五合 葱白五合 梔子七枚 右四味切以水四升煮取一升八合去滓分服三劑差止千金

翼同

又療石發身熱如火燒黃芩湯方漸仰 黃芩三兩 枳實兩 厚朴各兩 桔萼 芍藥各兩 梔子仁 甘草

右七味切以水七升煮取三升去滓分三服忌如常法千金

又療熱氣結滯經年數數發方 胡荽半斤 五月五日採陰乾如此物可先收肥備之 右一味以水七升煮取一升半去滓分

服未差更作服春夏取葉秋冬取根莖用

又療膈上熱方 柴胡 黃芩 甘草 茯苓 麥門冬 枳實 生地黄 竹葉切 右八味切

以水一斗煮取三升去滓分服

又方 取河中石不限多少燒令赤投小便一大升候令頓服之良

又方 取寒水石長含以差為度

又方 取黃連水漬服一升最良

又療心下煩熱悶內熱不安冷石湯方 冷石半兩細研之尚右一味以水攪如白飲頓服不差更

作

又去石毒麻黃湯方 麻黃二兩 甘草二兩 各一升 右三味切以水五升煮取一升去滓分溫再服之

又猪膏湯解大散方 猪膏二兩 豉二兩 右二味以水三升煮豉取汁一升內猪膏服七合日三服石人

飲食宜清冷不宜熱熱即氣擁痞石唯酒一種須熱也并陰

又療乳石發如寒熱狀似瘧方 前胡半斤 黃芩 甘草炙 生薑 知母略 三牡蠣熟 石膏各六兩 大棗二十枚

右八味切以水一斗煮取四升去滓分為四服取差為度此方甚良

又療胸背頭中遊熱補虛方 黃耆 芍藥各三兩 甘草炙 桂心略 茯苓 人參 石膏 生乾地黄

生薑 麻黃節 麥門冬去心各二兩 大棗三十枚 竹葉切一升 右十三味切以水一斗二升煮竹葉取一斗去

滓下諸藥煎取三升去滓分服之一方無茯苓有大黃

又療石發諸藥療不差方 以硝石含之效

又方 若熱盛可向冷地卧腰下以厚物薦之腰以上令薄使受稍似涼即起不得過度

又三黃丸療虛熱氣壅不通方 黃連 黃芩各三兩 大黃二兩 右三味搗篩蜜丸以湯飲下十五丸至二

十九丸如梧子以利即差

又療精神如失氣攻上骨熱方 柴胡 升麻 黃芩 澤瀉略 三淡竹葉切一升 生地黃切二升 乾藍 芒

硝略 右八味切以水八升煮取三升去滓下芒硝分服取利止忌如常法

又療石熱將行體微筋耆即此方從叔汾州刺史河東公口受此法余久服石每服此飲頗甚為效方

通按冷石未詳

通按此條疑有誤字

茱萸 姜藜各一兩 鼓心芥葱白各一握 右四味切以水四升煮取減半分服

又療服諸藥石後或熱不寐多向冷地臥又不得食諸熱麪酒等方 五加根皮兩 右一味切以水四升煮取二分半候石發之時便服未定更作服

又療諸石盛熱不除心腹滿小便赤大便不利吐逆氣衝胸口焦乾目赤重熱三黃湯方 黃連 芒硝

各二兩 甘草炙 大黃兩 黃芩兩 右五味切以水五升煮取二升半去滓下芒硝分服以利為度甚良妙

又療天行丹石發動上下擁隔不通頭痛口苦不能食立效方 醴泉社主簿陳 青木香 紫葛 紫參 玄參

丹參 苦參 人參 石膏 代赭 細辛 桂心 獨活 茯苓 乾薑 齊鹽 吳藍各一兩 巴豆

二分去 皮心熬 右十七味搗篩蜜和丸如梧子有患服三九強者服五九餘即量與之以飲下得快利三兩

行即差忌如常法

又療石發內有虛熱胸中痞滿外風濕不解肌肉拘急方 香豉半 梔子十四枚 葱白一握 黃芩兩 右四味

切以水七升煮取五六沸去豉內藥煮取三升分三服之不止更為之 翼同

又療熱腫初起始欲作癰便宜服升麻湯方 升麻 大黃 黃芩 芍藥 枳實兩 甘草炙 當歸各

兩 右七味切以水八升煮取三升分三服腫即消散如熱加黃芩三兩 翼同

又淡竹葉湯方 淡竹葉切 茯苓 白朮 甘草炙 枳實炙 梔子 人參各一兩 大黃兩 黃芩兩 右九

味切以水七升煮取三升分服以差止

又療服散不得力食不下飲酒解散嘔吐七味三黃湯方 豉五合 梔子十四枚 枳實八分 甘草炙 前胡

大黃略 芒硝兩 右藥切以水七升煮取三升分服

又增損竹葉湯解散下氣方 黃連 麥門冬法 竹葉切 人參略 枳實炙 梔子略 甘草炙 茯苓各二

右八味切以水八升煮取三升分服之差止

又療心忪熱煩悶如火氣上方 石膏兩 茯苓 姜藜 黃芩各 橘皮 五味子 乾藍 麻黃節 甘

草犀角二兩各 杏仁去皮 梔子各三 右十二味切以水八升煮取三升分服之差止

又療虛勞下焦虛熱骨節煩疼肌肉急內痞小便不利大便數而少吸吸口燥少氣折石熱方 大麻仁五合 豉仁 右二味以水四升合煮取一升五合分三服三劑即止翼同

又療內熱結不除或再服散或以酒飲冷食澡洗猶不解或腹脹頭痛眼腫疼或先有癢實不消或連飲不食或時作心痛服此湯皆愈方 甘草炙 黃芩 大黃各二 右三味切以水五升煮取二升分三服翼同

又散熱白鴨通湯方 白鴨通五升以沸湯二斗半 麻黃四兩 豉升二 冷石一兩 梔子仁二十 甘草破五 石膏碎 右七味切以鴨通汁煮取六升去滓內豉煎三沸一每服五合若覺冷小便利關其閉若熱猶盛小便赤促服之不限五合宜小小勞漸漸進食不可令食少但勿頓多耳同

又下氣除熱前胡湯方 前胡 黃芩 甘草炙 茯苓各二 梔子仁 枳實炙 大黃各一 杏仁六十枚 薑切三 右九味切以水九升煮取二升半分服

又麻黃湯下氣解肌折熱方 麻黃四兩 黃芩 甘草炙 石膏碎各三兩 升麻二兩 梔子仁 右六味切以水一斗煮取三升半分三服之

又療服升麻湯內解外不解者宜此麻黃湯方 麻黃節 升麻 大黃 黃芩 石膏碎各三兩 甘草炙一 梔子仁 右七味切以水九升煮取三升分服之差止

又療腹中無妨直患虛汗方 澤瀉 知母 石膏碎各二兩 當歸 甘草炙 人參 桂心 黃芩 茯苓 麥門冬去心各三兩 竹葉切三 右十一味切以水一斗二升煮竹葉取一斗去滓下諸藥煮取四升分服 差忌如常法

石發熱嗽衝頭面兼口乾方六首

論曰五臟之尊心雖為王而肺最居其上也肺為華蓋覆其四臟合天之德通達風氣而肺母火也性慣

通按肺母之火也更詳

尚德按頭
疑當作瘡

尚德按食
疑當作頤

受温而惡寒心火更炎上蒸其肺肺金被火傷則葉萎倚著於肝肺發痒即嗽或因石增熱心肝虛弱不能傳陽至下焦遂被正陽俱躋變成嗽矣或為發背或作癰頭也夫言惡寒則何以知也肺主皮毛皮毛遇寒即慄而粟起其肺嗽亦萎倚著肝而成病亦由木能扣金與鳴也凡如此先食養肺抑心肺虛熱和其腎即愈矣

療石發熱衝頭面兼口乾嗽方 生麥門冬法萎蕤 石膏碎各三兩 生地黃汁七合 葱白一握 乾葛四兩 豉心三合

右七味切以水七升煮取三升分三服忌如常法

又療熱嗽方 取生豉漬汁温之纔免令食服訖即卧勿令入腰中故也以意消息之

又天門冬煎主定肺氣去風熱明目止嗽喘粗血腥乳石發冷而補之方通按天冬性冷而能補病虛熱者宜服 天門冬

汁升 生地黃汁升 生薑汁二合 杏仁五合 白蜜八升 酥釀 欬冬花升 麻百部 根紫苑 麻黃

去兩 甘草兩 右十二味切以水八升煮麻黃去沫下諸藥煎取二升去滓澄濾銅器中微火煎

去半下天門冬等汁次第下之鍊成煎取一匙含咽之日三五度取差忌如常法

又療上氣肺熱呼吸喘涕唾方 麥門冬十分 杏仁皮去 貝母生薑切 石膏碎 黃芩伍 甘草炙

五味子白朮 枳枳 淡竹葉切 白蜜匙 右十一味切以水四升煮取一升二合去滓內蜜分服若

須利入芒硝

又療肺脹氣急呼吸喘麤眠卧不得極重惡氣即絕紫苑湯方 紫苑六分 甘草炙 茯苓切 檳榔碎 葶

藶子三分 右五味切以水六升煮取二升去滓分再服

又宜服九主上氣呼吸不得卧卧即氣絕方 芸薑子熱 葶藶二合 馬兜苓十 紫苑十 人參杏 杏仁炙

火皂莢子 白前甘草 漢防已 右十味搗篩蜜和丸如梧子大服十九至二十九增減量

之

石發兼虛熱痰癖乾嘔方五首

論曰凡人有五臟合則脾胃為水穀之府且國府足穀則足食足兵也人胃足食則榮衛不厥若人能食則能悅也陰陽和平有何患乎若服食之人皆增於熱失時不食則胃口乾焦胃口乾焦則土不足或因飲酒水而食少變為痰結酒水流下迎令上昇下焦無陽即陽虛也中腑無穀上焦漸炎致陽嘔噦經曰陽數即嘔吐又曰嘔噦發下焦之間此之義也可以破痰結通水穀填胃腑則無咎也夫通填之義不可虛其虛實其實岐伯曰瀉虛補實神去其室他臟皆倣此

療因飢空腹飲酒飲水食少痰結心頭乾嘔方 枳實酸三兩 梔子仁兩 香豉升半 大黃三兩 右四味切以水六升煮取二升分再服忌如常法

又療結熱澀心下腫胸中痞塞嘔逆不止雁肪湯方 雁肪具 甘草炙 當歸 桂心 芍藥 人參 石膏碎 桃仁去皮尖 太棗二升 大黃兩 右十味切以水一斗二升煮雁肪取汁一斗者諸藥取五升

去滓分服無雁肪以雁肉無雁以鴨代之雞亦得 又療嘔不止不下食方 雞白握 橘皮兩 豉升 麥門冬去心 粟米合 右五味切以水三升煮取一升去滓細細服之差止

又療熱發胸中痰醋乾嘔煩熱方 半夏洗 白薇 乾薑各一兩 甘草炙半兩 右四味切以苦酒五升煮取三升分服夫苦酒能令石朽爛故用之

又療數振動煩悶嘔逆人參湯方 人參 甘草炙 栝婁 麥門冬去心 各兩 黃芩 蘆根略一兩 右六味切以水四升煮取二升分四服差止

石發吐血衄血方七首 論曰五臟所藏心藏血也血之傷盛則心脫力制固無守自然流溢為陽氣傷故也或有衄血者加以肺風熱之謂也若益之於服石則客熱復盛榮衛增勞旋周無度則投虛而出出而多則傷榮氣色奪而黃久不療則氣撮振傷損先須破汚血留好血調經絡平腑臟則愈也

尚德按乾
蓋下疑脫
末字

尚德按送
疑當作搖

尚德按斤
疑當作升

尚德按衷
疑當作衷
陽在其上
四字疑當
在陰在其
上下

療石發熱盛吐血方 生地黃兩 小薊根切 黃芩二兩 梔子仁七枚 右五味切以水五升煮取二升分溫服之

又衄血方 生地黃汁 小薊汁 右二味隨多少以點鼻中兼服之良

又瘡心腑中熱其鼻中衄血不止方 胡粉煮 光墨末 金下墨末 乾薑 髮灰 伏龍肝分等 右六種

但得一物以兩棊子許以竹筒吹令入兩鼻孔中即止

又方 橘皮 蒼耳莖葉 翹逆莖葉 生地黃 雞蘇苗 右五種但得一味搗絞汁服五六合即止

如未定即更服之

又療頭痛壯熱鼻衄血心上硬遍身疼痛四肢煩悶兩膊舉不得方 小薊兩 青竹茹 生麥門冬碎 去

雞蘇各三兩 生薑兩 生地黃汁斤 右六味切以水九升煮取三升去滓分服之以上為度忌如常法

又療卒吐血一二升口鼻俱出至一二斗者方 生地黃汁 小薊汁 生麥門冬汁 伏龍肝匙 右地

黃等三味汁相和每服五合著伏龍肝末一匙許和攪服之以上為度忌如常法

又療心悶吐血方 生麥門冬八分 生地黃四分 甘草一分 薺芎 乾薑各六分 茅根十分 香豉五合 以

右七味切以水五升煮取二升去滓分服之忌如常法

石發熱煩及渴方一十六首

論曰凡人陽處其表陰處其裏則非純陰在其下復非純陽在其上皆須陰陽通平陰陽通平則五氣不
乏五氣不乏則人無病只如服石之人多為陰虛而服攝之過溫則經脈湊溢或遭陽時亦發其證也正
陽本自浮昇石力更藏陽氣客主兩陽併蒸肺肝故患渴也或臟實腑虛而生發背亦渴不獨兩陽為禍
也且肺是庚辛庚辛畏火即告其子其子腎腎為壬癸雖子投而性惡寒陽雖得水暫寒而水潛流於下
容水正水足為滂沱渴乃未除更增腎冷凡遇此候皆先泄瀉瀆致陰氣於腎微理其石氣孰不痊乎
療解散失度飲食冷熱不消虛脹吐清水而渴悶欲死方 人參 栝婁 枳實炙 甘草炙 白朮各一大

棗二十枚 右六味切以水六升煮取二升半分溫二服差止

又療發癰虛熱大渴方 生地黃兩 竹葉切 小麥升 黃耆 黃芩 通草 前胡略 桔萸兩 芍藥

升麻 甘草炙 大黃剉 知母 茯苓略 人參 當歸略 右十六味切以水二斗煮竹葉小麥取

一斗去滓內餘藥煮取四升去滓分服之小便利除通草大熱者去人參當歸忌如常法

又療客虛熱衝上焦胸中口乾燥頭面熱赤并渴方 生葛汁 生地黃 生麥門冬汁 白蜜格 棗膏

合生薑汁合 右六味和煎之內蜜候如稀錫食後漸漸含之其功甚妙

又療消渴止小便方 黃連色新 麥門冬去心 生地黃汁 羊乳 桔萸汁略 右五味搗上二味

為末以汁相和藥末衆手一時丸如梧子食後以飲服二十九忌如常法

又療熱渴竹葉湯方 淡竹葉切 茯苓 石膏碎 小麥升 桔萸兩 右五味切以水二斗煮竹葉取

八升下諸藥煮取四升去滓分服忌如常法

又療發癰盛患渴口乾排膿止渴方 黃耆 梔子仁 桔萸 生乾地黃 升麻略 麥門冬法 芍藥

略 二黃芩半 兩 右八味切以水一斗煮取三升服之差止忌如常法

又療消渴方 取螺升 右一味以一石江水浸養之傾澄取汁飲之經日放却更取新者漬之准前服

又方 竹根濃煮汁飲之

又方 煮青梁米汁飲之

又方 搗冬瓜汁飲之

又方 冬麻子升 右一味搗以水煮三四沸飲之

又方 以水浸雞子取清生服甚良

又方 黃柏斤 右一味切以水一斗煮汁飲之

又方 桃仁五升 去尖 研白米升 右二味以水一斛煮取三升渴即飲之良

又方 石膏碎枳實炙茯苓各三兩 右三味切以水九升煮取四分分服之

又方 茯苓半斤澤瀉兩白朮乾薑桂心各三兩小麥半斤甘草二兩 右七味切以水一斗煮小麥取八

升入藥煎取五升分服之

石發熱風頭痛心煩寒熱方三首

論曰五行五臟皆互相生肝雖處中而為臟首位在甲乙懷養懷仁故應春而王也為心之母餘臟循而次生焉心為王主身神毅而無纖不察四臟為四鄙四鄙有憂王必懷憂四臟和平則王有悅悅則榮衛不錯憂則經絡患生心不受邪所病者為憂憂能致也肺為風腑施於太穹為呼吸之門氣息之道也諸臟紊亂氣息皆形誰能出不由戶耳若熱風感心憂即頭痛若過憂即心煩熱感必寒寒感必熱倚伏之道足可明焉皆絲風狂邪熱之謂也但平風熱抑狂邪榮衛自然通泰也

瘡熱如火燒頭痛心煩悶乍寒乍熱胸中熱嘔逆方 升麻 前胡 甘草炙黃連各二兩黃芩 生地黃

略三枳實 梔子仁 枳實各一兩 豉五合 右十味切以水八升煮取三升分服忌如常法

又療食訖心煩悶眩心下胸中不安方 茵陳四兩 大黃二兩 梔子仁二十枚 右三味切以水五升煮取二升

分服取差

又療頭疼欲裂方 取當歸二兩清酒一升煮取六合飲至再服

石發口瘡連胸面及身上心痛方一十四首

論曰夫人痒者為虛痛者為實在表為虛在裏為實心肺虛熱衝胸口乾乾久乃成瘡生膿則痒矣自然虛極非是實也藏者藏也為不能含藏陽氣使陽氣妄出發則日虛若獨肝家有風即木氣搏心故痛亦非真心痛苦真心痛只得半日而死為心不受邪故也

療乳石熱發頭痛心胸痛協脹滿寒熱手足逆冷或口生瘡爛或乾嘔惡聞食氣氣上欲絕久虛者方

前胡 芍藥 黃芩 大黃 甘草炙 大棗二十枚 右六味切以水八升煮取三升分服若堅實加

尚德按裏
疑當作裏
若疑當作
尚德按協
疑當作腸

石發熱風頭痛心煩寒熱方三首 石發口瘡連胸

茯苓二兩若胸滿塞加枳實一兩炙若吐逆加乾薑二兩若口燥加麥門冬二兩增減以意量之忌如

常法

又療食失度口中發瘡漱之湯方 黃芩^{三兩}升麻^{二兩}甘草^{二兩}石膏^{二兩} 右四味切以水五升煮取三

升去滓冷含漱口吐却日十數過差止

又療口瘡方 子柏^{四兩}龍膽^{三兩}黃連^{二兩}升麻^{一兩} 右四味切以水四升煮取二升別取子柏冷水浸投湯

中令相得絞取汁稍稍含之取差忌如常法

又若熱發腹內胸悉有瘡方 升麻^{二兩}烏梅^{十枚}黃芩^{二兩}黃連^{二兩}桔萸^{二兩}甘草^{一兩} 右六味切以水五升

煮取半去滓含之咽亦不妨

又療體赤熱煩悶口中瘡爛表裏如燒痛不能食方 黃芩^{三兩}梔子仁^{二枚}香豉^{二升}大黃^{二兩} 右四味切

以水四升煮取一升半去滓分服

又塗飛雪湯方 麻黃^{四兩}石膏^{二兩}黃芩^{三兩}芒硝^{四兩} 右四味切以水八升煮取四升去滓內生雞子

白二枚及芒硝攪令勻以拭瘡上取瘡差即止

又療熱不散體生細瘡并熱不止方 黃連^{五兩}芒硝^{五兩} 右二味切以水六升煮取三升去滓內硝以

拭瘡上取差為限

又瘡紫石發動惡寒壯熱口舌乾焦方 烏豆^{二升} 右一味以水四升煮令稀調得所如錫去豆下蜜二

合更一兩沸以是抄細細含之如腹中鳴轉欲利即停得利即差忌熱食陳臭物^{千金翼治發背癰疽}

又瘡石氣發熱身體微腫面生瘡方 升麻^{二兩}葶藶^{各六兩}黃芩^{二兩}紫雪^{各八分}甘草^{二兩}犀角^{各四兩} 右四味切以

水一斗煮取三升去滓分服之忌如常法

又瘡體卒熱生瘡麥門冬湯方 麥門冬^{五兩}豉^{二升}桂心^{二兩}人參^{各二兩}甘草^{二兩}葱白^{一斤} 右六味切以

水一斗煮取三升去滓分服之忌如常法

尚德按裏疑當作裏

尚德按裏不用蜜

通按飛雪湯塗千金翼作用寒水石冷水研濃汁塗

勿令乾
尚德按翼
用寒水石
別為一方

又療表裏俱熱身體生瘡或發癰癩大小便不利方

芒硝湯成下 黃芩

知母

甘草各二兩 梔子仁七枚

大黃四兩

右六味切以水五升煮取二升下芒硝分服忌如常法

又療兩鼻生瘡熱痒內亦熱兼頭痛方

麥門冬法知母

澤瀉

甘草各二兩

梔子仁各二兩 小麥各一升

右七味切以水一斗半煮竹葉小麥取九升去之內諸藥煮取四升去滓分服日三夜一忌如常法

又療生瘡熱氣奔胸方

豉升 葱白切

梔子仁略

右三味以水二升煮取九合去滓分服之忌如常法

法

又療石熱發煩熱滿脹及體生瘡兼氣力弱方

黃芩

芒硝

麥門冬各二兩

大黃三兩

梔子十四枚

甘草一

右六味切以水六升煮取二升分再服之

石發腹脹痞滿兼心痛諸形證方七首

論曰服石之人發狀非一或發於外陽則頭角皮膚作病癰腫頭痛是也或發於內陰則反冷臟虛口瘡吐血是也凡氣內溫五臟外榮經絡石性清淨不喜煩穢目所覩鼻所聞皆欲馨香不愿鬱腐因成種種之病也或食陳臭生酸之物貯於胃腑胃腑不受推諸臟諸臟不受即肝膈痞滿或為臚脹而堅積便發心痛亦非心自然而痛為穢觸神氣也覺此候者可速滌腸胃無令留壅不然即成痰癖其心轉痛豈能不勉哉

新卻瘡寒過度成痰癖水氣心痛百節俱腫者大黃丸方

大黃

葶藶子熟

豉各一兩

杏仁去皮

巴豆各三

十顆去

右五味大黃搗篩末四味別搗如膏入少蜜和更搗一千杵以飲下一丸如麻子稍強至二

丸三九以意量之忌如常法

又療赤石脂發心痛飲熱酒不解方

葱白切半

豉二升

右二味以水六升煮取二升半分服之良

又療大熱心腹滿脹方

石膏碎

黃芩

麻黃

芍藥各二兩

大青

續斷各三兩

右六味切以水八升

煮取四升去滓分服之

外臺祕要 卷三十八

石熱發目赤方一十一首

又療心腹痛不解若通身顫寒者榮衛不通人參湯方 麻黃去節三兩人參 枳實炙黃芩 甘草炙茯苓

各一兩 右六味切以水五升煮二升分服之

又療散發心腹痛脹兼冷熱相搏甘草湯方 甘草炙枳實炙白朮 梔子各二兩桔梗三兩 右五味切以

水六升煮取二升分再服之忌如常法

又療腹脹頭痛眼眩夜先有癖實不消或飲酒下食內熱或時時心急痛方 甘草炙黃芩 大黃別浸麥

門冬法芒硝兩梔子三十枚 右六味切以水七升煮取三升分服忌如常法

又療石發動上氣熱實不除心腹滿小便赤大便不利痞逆衝胸口乾燥目赤痛方 大黃別浸黃芩三兩

黃連 甘草炙芒硝 麥門冬去心各二兩 右六味切以水五升煮取二升入大黃更煎三五沸去滓分

再服之

石熱發目赤方一十一首

論曰凡人五臟盡有風而發有高下動有深淺則腎風發脚氣肝風目淚而暗肺風鼻軌嚏而嗽脾風肉緩而重心風恍惚而忘若加於熱亦隨臟觀候即肝風脅滿而怒喜靜加之熱即目漠漠而暗若石氣乘之則赤而益痛或生努肉及腫而爛速可隨輕重瀉之不然喪明矣經曰肝王則目赤若兼石則冬慎勿食熱熱既不散遂成伏氣遇春必發預宜法防之即非石藥之過豈不惜哉黃帝曰形受味精受氣皆為飲食寒溫呼吸之召也諸臟倣此

療眼久赤痛方 乾棗相接長一尺切黃連相接長一尺 右二味以水一升煎三合綿裹夜臥點眼管中以差為度

忌如常法

又瀉肝湯不服石人亦主之方 大黃 黃連 石膏碎各二兩甘草炙黃芩 細辛 生薑 半夏洗各一兩梔

子樹膠 右九味切以水八升煮取三升分溫服忌如常法

又療眼赤閉目不開煩悶熱胸中澹澹瀉肝湯方 前胡 大青 秦皮 乾薑 子芩 細辛各三兩

明子^三枚^仁石膏^兩八^兩淡竹葉^各車前葉^{一升}右十一味切以水一斗煮取三升去滓分服或

加朴硝三兩得利即差忌如常法

又療眼腫痛不開方 精猪肉薄切以貼眼上熱即易之一方用子肝又以井花水浸更再用之取差

又療久風目赤兼胎赤方 光明鹽^分杏仁油^{五合}又云^{半雞子}右二味以淨銅鑊一尺面者一枚內鹽油即

取青柳枝如筋大者一握急速截令頭齊用研之三日候如稠墨即先剉地作一小坑置瓦于底又取

熟艾一鴉子許於瓦上燒火即安前藥鑊覆坑上令烟薰之勿令火滅候火盡可收置於銅合子或埴

合子中每夜用點眼皆間便臥頻點之取差^{通按前日病胎赤用此方}

又主眼生赤脈息內疼痛不開者方 大棗^{七枚}黃連^{二兩}碎^{淡竹葉}切^{五合}右三味以水二升煮竹葉

取一升澄清取八合內棗肉黃連煎取三合去滓以點眼皆中差止

又療眼痒赤方 黃連^兩碎^半丁香^{七枚}碎^半黃柏皮^兩切^半青錢^{七文}麩仁^{三枚}碎^半右五味以水二升煮取一升去

滓以綿纏杖子頭點之妙

扁鵲療令人目明髮不落方 取十月上巳日槐子去上皮不限多少於瓶中封口三七日初服一枚再

服至二枚十日十枚還從一起甚驗

又療發熱心腹脹滿小便赤大便難逆衝胸中目燥目赤痛方 黃芩^兩大黃^{各二兩}右二枚子^兩豉^{三合}右四

味切以水三升煮取一升二合去滓分服

又療目瞽方 乾藍^{二分}雄黃^{二分}右二味相和以少許點上三五度即便差

石發痰結大小腹留壅老小虛羸方六首

論曰夫老小疴羸為和氣不足寒氣獨積於地炎氣獨散於天天地不交故體成否體成否則肌肉不潤

腠理不通胸膈氣急腸胃招滿為陰氣衝陽陽不接也或膀胱堅積支足沉疴為陽氣不能下營陰氣獨

盛也致大腸留擁湯藥不下或水穀不消更加短氣若不利闕格實不得其死也

尚德按內疑當作肉

石發痰結大小腹留壅老小虛羸方首

瘡瀉方老弱體性少熱因服石散而寒氣盛藥伏胸膈冷熱不調煩悶短氣欲死者藥既不行又不能大便作害於人急宜吐之方 甘草生用 右一味切以水五升煮取折半去滓令頓服之當大吐藥亦與

病俱去便愈矣夫散家患心腹痛服諸藥不差者服此甘草湯諸膈即通大便亦利甚驗

又瘡其虛弱去熱益氣力方 竹葉切 大棗二十枚 黃耆四兩 芍藥兩 甘草炙 人參 乾地黄 升麻 生

薑兩 桂心 黃芩 茯苓略 右十二味切以水一斗五升煮竹葉取一斗去竹葉入諸藥煎取

三升分溫服之忌如常法

又瘡散發後虛熱瀉之或脚疼腰痛本是虛勞人并挾風巨腎滯湯方 羊腎脂膜切 五味子三當歸

甘草炙 芍藥 遠志法 芍藥 麥門冬法 茯苓略 乾地黄 生薑切 黃芩 桂心略 大棗二十枚

右十四味切以水一斗者腎取八升內諸藥煎取三升半去滓分服忌如常法

又瘡性熱虛瀉補益方 生地黃二石細切極熱 右一味以好酒一升灑之暴乾搗碎併手丸之每食前含

一九如胡桃大咽令盡日三五度甚妙

又瘡人身體黃瘦不能食及服藥腰背拘急痛眼卧臨床沉重不能起行宜秋夏中服之方 半夏洗茵

陳略四 生薑 茯苓各三 黃芩 土灰根 梔子兩 大黃別浸 右八味切以水八升煮取三升

去滓分溫服

耆婆湯瘡人風勞虛損補髓令人健方 麻油斤 牛酥斤 葱白握 胡麻仁研 歧二升以水二升 蜜升上

酒斤 右七味先於鍋中入油煎令沸者葱白令色黃下酥蜜歧汁麻仁沸下酒成煎收不津器中盛

之日服一匙兩匙或和酒服亦妙冷即加生薑一片取汁乾薑末亦可用之

石發大小便澀不通兼小便淋方一十六首

論曰夫言大小便澀者皆緣大腸虛受和氣所致也且腑有高下而肺腑係在天上中接土腑名之大腸為傳導之腑也有風氣熱結即大便乾澀而不通順或發癰腫口鼻乾燥或腎腑有虛則心肺俱熱使小

便赤而澀也。或腎氣虛熱，膀胱不足，加之渴飲，即小便淋澀，皆緣臟虛不能主其腑也。且形能受味，氣能致精，氣散則精虛，味益則體實。體實之人，筋骨有餘，因勞精氣，精氣既衰，即招其病。故一石氣流入膀胱，作其淋疾，則非正石氣而行。此肺遭熱，盛傳之於腎，腎為精竭，純陰自孤，石氣懼陰，不入便投其膀胱。膀胱受邪，遂成淋也。淋狀合澀，數赤熱而痛，何以知之？澀至故知肺傳於子也。數至為子被母逼，水急奔下也。熱赤至為心與石氣相傳也。痛至為本臟自虛，客氣衝擊也。所以服石藥者，藉其少滋味而助精氣，即神門之固，病邪不能入也。何以知因石虛竭虛竭之人，其陰好怒而交接難畢，其病名強中或不交接，其精自流也。或為消利，為作消渴，皆由少服諸石，用之傷勞也。夫遇茲候等，可救其病，失時不療，使至天枉，不可全服補虛之藥，恐變證，亦常以不虛不實於大腸不寒不燥於腸，理能調神氣，有何患乎。

療小便淋澀少腹痛方 大黃 芍藥 茯苓 麻仁 右四味切以水五升煮取二升去滓分服之良

又方 桑螵蛸二十枚 黃芩兩 右二味切以水一升煮取四合頓服之

又療熱淋澀痛方 車前草 葵根一切各通草兩三 芒硝八分 右四味切以水五升煮取二升去滓入芒硝分服之

又療血淋不絕方 雞蘇 竹葉各一握 葵子未 石膏八分 蜀椒末四 右五味切以水二升煮取九合後下葵末服之

又療初患淋方 滑石兩 通草兩 石葦去毛 瞿麥各三兩 芒硝二兩 冬葵子仁 右六味切以水九升煮取三升分服之忌諸熱物

又療淋積年醫不能愈或十日五日一度發即可時或頻發不定方 冬葵子 滑石各八分 茯苓 芍藥 子芩 蒲黃 芒硝各六分 石葦去毛 瞿麥各五兩 陳橘皮四分 右十味搗散空腹煮後飲子和服一方寸七

加至二匕以小便通利為度忌如常法

下散飲子方 桑白皮六分白茅根針通草分甘草分四滑石分 右五味搗散煎湯服前散

又卒患淋方 取缸底青苔如雞子大以水一升煮服之

又主熱淋方 白茅根斤切四 右一味以水一斗半煮取五升適寒溫飲之是止

又石淋狀如碎沙石下者方 車前子二斤以 右一味以水八升煮取三升經宿空腹服之即石下

又療煩熱身體微腫不能食飲小便不利方 茯苓兩甘草兩桔婁根 人參 黃芩 桂心 白朮各

兩枳實兩 右八味切以水六升煮取三升去滓每服三合盡即差甚妙

又療氣上不得食嘔逆大小便澀氣滿煩悶折熱下氣方 前胡 黃芩兩三梔子 大黃兩一甘草多

茯苓 生薑兩二杏仁四枚去 右八味切以水八升煮取三升分服之忌如常法

又療熱小便數少如淋葵子湯方 冬葵子升 右一味以水三升煮取一升分服之忌如常法

又若大小便塞不通或淋瀝尿血陰中疼痛此是熱氣所致先以冷物熨之小腹又以熱物熨更互冷熱

若小便數亦是取冷所致即暖將息也

療發熱體氣昏不痛不痒小便赤澀方 生茅根五大斤淨洗擇搗絞取汁服之差

又方 取葶藶五兩煮汁飲之差

石發後變霍亂及轉筋方一十六首

論曰服石之人體常多熱熱即引飲飢復加食水穀既傷胃府失度土既衰損木必來乘故曰肝入胃即

泄或單下而不吐是肝乘之盛也木既尅土尅過必宣二氣俱虛而肝必怒陽氣既之則發轉筋變吐加

腎肝之病也宜速止之仍溫足而兼復調以五味其病必痊矣

療石發霍亂絞痛不可忍方 茱萸升 右一味以酒三升煮取一升強服之得下差

又療霍亂吐多者必轉筋不渴即臍上築者腎氣虛先療其築理中湯方 人參 桂心 甘草各乾

通按腎氣
虛仲景謂

通按一跌
約上當是
長一跌之
下也然脚
長一尺二
寸跌居其
大半而天
樞至橫骨
徑長六寸
何穴
通按美黃
當是美黃
黃

薑兩二 右四味切以水八升煮取三升分服又加白朮三兩

又療霍亂轉筋入腹方 取雞屎白乾者一方寸匕以水和頓服之

又療轉筋入腹痛方 灸脚心下當拇指上七壯

又方 灸足大拇指下約中一壯

又乾嘔方 灸手腕後中指兩筋間左右各灸七壯名間使

又若吐止而下痢不止方 灸臍下一跌約上二七壯尚德按跌與當作夫千金云覆手并舒四指對度四指上中節上橫過為一夫

又嘔不息者方 薤白根 右一味切以水一升煮取六合頓服之

又吐痢不止轉筋入腹欲死方 生薑切三 右一味以酒一升半煮三沸頓服之良

又方 藿香根 右一味以水四升煮取一升服之差文亦佳

又療轉筋不吐不下氣息急方 木瓜根 右一味切以水二升煮取一升服之差

又方 高良薑五兩 右一味以酒二升煮取一升服亦主腹痛

又方 桑葉切二 右一味以水三升煮取一升三合去滓服之

又療腹滿痛不可忍方 取鹽一合熬以水二升煮取一升頓服即得吐止若吐痢止心中煩悶及渴不

止取竹瀝一升分服即止不止心中復似冷取茱萸一兩於鑊中炒穡末以水二升煮取一升著少鹽

澄清服之取差

又療霍亂吐痢不止方 粟米少研 右一味以水攪如乳服之即差

又療脚轉筋方 灸兩大拇指爪甲後連肉處當中央三壯

石發後變下痢及諸雜痢方一十二首

論曰凡石性剛烈氣多炎上理之傷溫即火轉為熾內煎脾肺脾肺若熟遂成其渴飲水過量即澀腸胃
胃得水則吐腸得水則金寒藏難寒火炎不滅水漸流下而為行潦遂變癱腸胃虛冷水穀不消在陽益

氣不食在陰腸鳴而泄久將不差有成痢者經言嘔噦發下焦之閭其斯之謂歟療下痢乾嘔服香豉多服之佳如不損更發宜服此方 香豉_兩乾薑_兩甘草_兩葱白_升 右四味切以水五升煮取二升

去滓温分服之甚良

又方 乾薑_兩 右一味切以水二升煮取一升去滓頓服之

又療白赤痢兼熱悶方 梔子仁_枚十四 薤白_切一 右二味以水三升煮取一升二合去滓分服之良

又療白痢方 黃連_兩 白蜜_合 右二味以童子小便二升漬一宿煮取一升去滓入蜜分服之

又方 黃連_兩 薤白_升 烏梅_枚 右三味以水二升煮取一升分温服之

又療解散已經快利熱尚不退兼痢不斷黃連湯方 黃連_兩 白梁米_合 右二味以水五升煮取二

升分服之

又療癰腫熱盛取冷過多寒中下痢食完出方 甘草_炙 乾薑 附子_{炮各兩} 蜀椒_{二百三} 右四味切以

水六升煮取三升分服之忌如常法

又療天行兼有客熱下血痢止血破棺起死黃連湯方 黃連_兩 黃柏_兩 梔子仁_十 阿膠_兩 乾薑

枳實_{多芍藥} 右七味切以水六升煮取三升分服之忌如常法

又療解散除熱止痢黃連湯方 甘草_炙 升麻_兩 黃連_兩 鼓_五 梔子仁_十 右五味切以水三升煮

取一升分温服之

又解散因痢宜服甘草湯方 甘草_炙 人參 黃連_兩 梔子仁_二 右四味切以水五升煮取二升

分服之

又療熱毒赤白痢方 羊肝_{去膜切以水洗二十遍} 右一味以水煮熟漉著漿水中淘之乾漉以美

蒜齏候極飢食之不過三兩頓即差

又療水穀痢方 取鯽魚無問多少治如食法以新布乾拭斷血脈切作鱠以蒜齏食之取足候至夜要

以白粥量事喫之即得差忌如常法

石發兩脚卒冷兩脅腋卒熱并口噤方三首

論曰經言脈有陰踣陽踣有陰搏陽搏此在三陰位也脈足太陰脾脈也脾為中州含藏陽氣壓本脈者矣若人之和平則脾能行陽氣暖其三陰三陰暖則足能舒適若脾虛不能含藏則地氣漸泄陽上騰則三陰堅寒足便冷也或有踵緩急不仁者則加之以腎肝之氣不足使少陰厥陰之闕也所以足無載運之功而不能踣提其力是陰搏其陽此由臟虛所生陽氣傷狂而陰不能獨理有因發熱口噤及腋下熱不可近者即三陽傷盛之所致也况服石增熱食飽失度在陰為瘵可外溫其足內置陽氣於三陰則愈也在陽為瘵可微冷於外又以寒藥散其內熱其痾豈能逃乎

瘵兩脚卒冷方 以醋漿溫置盆中以浸脚即差

又瘵口噤氣上欲絕方 蔓菁子三枚三枚三麥藍子 人參 薺危 甘草炙 黃芩 白朮各一 右八

味切以水二斗煮蔓菁子取八升去滓內餘藥煮分服若口噤以物嚙之即差

又瘵兩腋熱不得相近方 滑石斤寒水石斤芒硝斤 右三味搗散取絹一尺分作袋盛散藥結口更

互於腋下夾之勿住取涼冷止

石發若熱解折下石方四首

論曰五形之人其性各別則土形之人骨聳氣清水利形之人體薄氣長木形之人筋骨巖聲圓而長火形之人性急氣火而散其有固疾者則先服草藥病愈後始服石必速應也凡土火二形人性躁氣高而肥盛多火氣若更服石益之於炎物盛必哀自焚之名也若覺禍發速宜下之只如固疾之人服石者病氣久強石熱尚薄不能破其病但增其熱亦能損人若熱不濟者亦可速下自餘形人服之者如有發動但以石投之自然而差不可見小熱即求大冷為山九仞終虧一篲醫

尚德按唯
疑當作霍

尚德按右
疑當作吉

蜂房飲解石餘方 露蜂房三 右一味以水三升煮取一升去滓頓服不定三五日更服如熟悶服後

方 千金翼藥石發熱田苦宜下石方露蜂房一升切以水三升煮

又下石方 葛根 紫草各一 犀牛角兩 露蜂房十 芒硝 大黃各二 齊鹿 人參各七 玄參 甘

草 炙銀屑 細研各 猪脂 二兩 右十二味以無灰酒漬經十日其猪脂用酒一升煎取脂三兩取銀屑

和研內藥中每日空腹服之 匙前合藥末得本法元本如此可求別定本細而勘之 千金翼方中更

七兩黃芩八兩梔子十四枚計十六味以無灰酒八升漬經十日猪脂用酒一升煎

又療散發不可堪忍欲下之方 肥猪肉斤 葱白 薤白各半 右三味並搗研合器中蒸之令熟早朝

噉之盡為度

又療雖服乳石等而常患冷此由不先服瀉湯而服石等以其病藥各在一處丹石不行則病所以依舊

患冷宜依此法瀉之冷自差石勢行方 人參 茯苓 乾地黄 當歸 桔梗 甘草 芍藥各二大

黃 兩 右八味切以水三升煮取一升二合去滓分服之

服石後將息飲食所宜法二首

論曰服石所宜飲食時宜以自調護隨所取適若一一依方慎之則動成滯礙能依此法庶得通濟方

取少脂猪肉一月二服百沸餽餽任性無妨新熟白酒少飲亦好及白羊頭蹄並猪肉作薑豉任作食

之壓石肥肉梨柿等甚佳

凡欲喫熟羊肉餽餽宜先食三五是冷飯後喫之即不畏熱喫訖乃速以飯壓之行步適散乃可不慮致

損生菜亦然云苦胡荽等亦不宜多食服石人有性好齋嗜醋不能禁慎者宜食淡糠醋百沸紫餽餽及

水漠餅即不慮熱冷韭薑亦大補時時宜食之諸飲食品類既多不可一一但言不得服所不宜者服石

人亦不宜多飲酒飲酒多則失食味失食味則不多食不多食則令人虛熱虛熱則令石數發惡寒寡沉

又損石力為酒能壓石故也多飲則損石勢亦令人風虛脚弱此錄飲酒致之耳若能飲食者大佳甚妙

尚德按
疑當作衝

其方藥如右服石特忌熱麪陳臭羶寒涼憂患大醋生薑薤白醬雞犬肉鮑魚肉鮮衡熱老牛肉忍飢冷酒有反酒蕎麥小豆胡麻餽餽枸杞羹倉米羹魚脯勿承飢虛熱沐浴夏月不宜喫猪肉冷水恐致滑痢不止傷冷飲食不消或成霍亂特宜消息慎之

紫餽餽并食飲將慎法三首

千金紫餽餽方 烏豆任多少煮 右一味以和麪稍鹽和之依常法作餽餽以此豆汁中熟煮可三二

十沸溢添冷烏頭汁以猪羊肉為臠亦精好或以山芋粉尤妙

又宜食麪餅方 取麪漚如家常作餅法細切如小豆許以麪於籠箕中拌令圖煮之令極熟承熟任以

諸肉作臠食之大涼補腰脚又夏月冒熱遠行早食晚失飢石氣發動作大麥餅將行在路食之亦壓得石氣

凡患瘡腫無問大小或如黍米即須加意專精療之或以冷水淋或鹽湯洗以指搥破即以指甲細細搗傍邊亦以藥塗之或以倉耳湯浸洗之或以冷石熨之即差夫服石將慎至難若不能將息特宜勿服非但服之若瘦熱更增他疾性行躁暴唯多忽恚飲食日減形體日消妻子不能供承卑下何其能濟此皆由將慎失度致使然也人之無檢慎勿輕服至於背坏腦裂藥物無及也婦人則發乳體腫帷簿不脩特宜審慎自量其力將息尤佳

服石後防慎則備雜藥等一首

凡服石人當宜收貯藥等 人參 朴硝 苦竹瀝 大黃 梔子 大麥麪 好豉 薺芎 黃連


升麻 石膏 荆瀝 葛根并粉 猪骨 酥蜜 紫蘇子 白鴨屎 糲米 前胡 冬葵子

生薑 冬瓜 大豆 車前 地榆 五加皮 大小麥奴 天門冬 葱白 萎蕤 麥門冬 生

地黃 蘆根 紅雪 紫雪 黃芩 露蜂房

本草卷之八

紫餽餽并食飲將慎法三首 服石後防慎則備雜藥等一首



W2467 W

1915

V. 36-38