


[H]

Chinese

Vol IV

v.8 - v.10

4



唐王壽先生外臺秘要方卷八目錄

痰飲等三十門

痰飲說二首

懸飲方二首

支飲方九首

酒辟飲方三首

痰辟方二首

癖飲方七首

痰結實及宿食方三首

痰厥頭痛方八首

療諸痰飲方四首

脾胃弱不能食方三首

胃實熱方二首

五膈方八首

氣噎方六首

卒食噎方九首

諸骨哽方三十五首

尚德接今有方三十首

尚德接今有方一十首

尚德接今有方六首

痰飲食不消及嘔逆不下食方九首

溢飲方三首

留飲方二首

飲辟方二首

冷痰方四首

胸中痰辟方三首

風痰方五首

胃反方二十首

脾胃病日漸瘦困不食方三首

胃虛寒方七首

七氣方三首

諸噎方一十二首

五噎方三首

雜誤吞物方一十七首

外臺祕要

卷八

唐王壽先生外臺祕要方卷八

宋朝散大夫守光祿卿直祕閣判登聞簡院上護軍臣林億等上進

新安後學程衍道敬通父訂梓

疾飲論二首

尚德按肺  
病源作府

又按飲病  
源作痰

病源疾飲者由氣脈閉塞津液不通水飲氣停在胸腑結而成疾又其人素盛今瘦水走腸間瀝瀝有聲謂之痰飲其為病也胸脅脹滿水穀不消結在腹內兩肋水入腸胃動作有聲身體重多唾短氣好眠胃背痛甚則上氣欬逆倚息短氣不得卧其形如腫是也脈偏弦為飲浮而滑為飲其湯熨針石別有正方補養宣導今附于後養生方導引法云左右側卧不息十二通療痰飲不消右有飲病右側卧左有飲病左側卧又有不消氣排之左右各十二息療痰飲出第二十卷中

千金痰飲論問曰夫飲有四何謂師曰有痰飲一云有懸飲有溢飲有支飲問曰四飲之證何以為異師曰其人素盛今瘦水走腸間瀝瀝有聲謂之痰飲飲後水留在脅下欬唾引痛謂之懸飲飲水過多歸於四肢當汗出而不汗出身體疲重謂之溢飲其人欬逆倚息短氣不得卧其形如腫謂之支飲凡心下有水者篤篤而悸短氣而忍其人眩而癲先寒即為虛先熱即為實故水在於心其人心下堅篤篤短氣惡水而不欲飲水在於肺其人吐涎沫欲飲水水在於脾其人少氣身體盡重水在於肝脅下支溼嘯而痛水在於腎心下悸夫病人卒飲水多必暴喘滿凡食少飲多水停心下甚者則悸微者短氣脈雙弦者寒也皆大下後喜虛耳脈偏弦者飲也肺飲不弦但喜喘短氣支飲亦喘而不能眠加短氣其脈平也留飲形不發作無熱脈微煩滿不能飲食脈沉滑者留飲病有留飲者脅下痛引缺盤欬嗽轉甚一云其人欬而不得卧引項上痛飲者如小兒掣瘲狀夫胃中有留飲其人短氣而渴四肢歷節痛心下有留飲其人背寒冷大如手病人胃氣上引此皆有溢飲在胃中久者缺盤滿馬刀腫有劇時此為氣飲所致也膈上之病滿喘欬吐發則寒欬背痛惡寒目泣出其人振振身瞞劇必有伏飲病人一臂不隨時復轉移在

尚德按肺  
病源作府  
千金作盜  
下同

一臂其脈沉細此非風也必有飲在上焦其脈虛者為微勞榮衛氣不周故也

出第十八卷中通按形不發作謂表無病狀也

痰飲食不消及嘔逆不下食方九首

病源夫痰水結聚在於胃腑膀胱之間久而不散流行於脾胃脾胃惡濕得水則脹脹則不能消食也或令腹裏虛滿或水穀不消化或時嘔逆皆其候也

出第二十卷中

廣濟療心頭痰積宿水嘔逆不下食前胡丸方 前胡 白朮 甘草

五分各旋覆花 豆蔻仁各三人參

麥門冬去心各枳實炙大黃各四分

右九味擣篩蜜和為丸如梧子大空肚以酒下二十九漸加至三

十九日再服不利忌桃李雀肉海藻松菜麪炙肉魚蒜粘食生冷等物

又療心腎中痰積氣喧嘔逆食不下方 柴胡 橘皮分六茯苓分人參

麥門冬去雞蘇各八生薑十二分橘榔仁四分末湯成下

右八味切以水八升煮取二升五合絞去滓分溫三服服別相去如人行七八里

進一服未差三日更服一劑以利為度忌酢物生冷油腻粘食

並出一卷中

千金療痰飲飲食不消乾嘔湯方 澤瀉 杏仁去尖

枳實炙白朮各三茯苓 柴胡 生薑

芍藥各四兩

雨旋覆花人參橘皮細辛各二半夏四兩

右十三味切以水九升煮取二升七合分為三服

忌桃李雀肉大酢生菜羊肉錫等物

又療腎中痰飲腹中水鳴食不消嘔吐水湯方 大腹積榔

四十生薑八兩半夏洗半升杏仁四兩去橘皮三

甘草炙茯苓桔梗各一蜀椒二合橘皮二兩

右九味切以水七升煮取二升半去滓內薑汁煎取

四升半分三服服三劑佳若欲服大散并諸五石丸必先服此方及進黃耆丸輩必佳忌海藻松菜羊

肉鴨生葱豬肉冷水酢物子金翼驗同並合煎取四兩半升可疑半升可疑

尚德按千金翼出第十一卷中

范汪薑椒湯主胃中積聚痰飲飲食減少胃氣不足欬逆吐噦方 半夏

三兩生薑合桂心附子炮

尚德按千金翼出第十一卷中

桔梗各一蜀椒二合橘皮二兩

右九味切以水七升煮取二升半去滓內薑汁煎取

四升半分三服服三劑佳若欲服大散并諸五石丸必先服此方及進黃耆丸輩必佳忌海藻松菜羊

肉鴨生葱豬肉冷水酢物深師同

尚德按千金翼出第十一卷中

平金及冀

又白术茯苓湯主胃中結痰飲滯結臍下弦滿嘔逆不得食亦主風水方

白术五  
兩茯苓三  
兩橘皮

當歸

附子

炮

各二兩

生薑

半夏

各四兩

桂

雨加四兩

細辛

四兩

作人參

右九味切以水一斗煮取三升分三服服三劑良忘

羊肉鴨

桃李雀肉

豬肉

冷水

生葱

生菜

醋物

等千金

羊

肉

鴨

桃李雀

肉

豬肉

冷水

生葱

生菜

醋物

等千金

又旋覆花湯主胸膈痰結唾如膠不下食者方

烏頭

五枚去

旋覆花

細辛

前胡

甘草

炙

茯苓

各二兩

夏

雨

主

薑

八兩

桂

心

四兩

細

辛

四兩

右九味切以水九升煮取三升分為三服忌

羊肉

鴨

海藻

菘菜

生葱

物

豬肉

冷水

等

並出第

十

延年茯苓飲

主心胸

中有停痰宿水

自吐水

出後

心胸間

虛氣滿

不能食消痰氣令能食方

茯苓

兩人

參

二兩

白术

三兩

生薑

四兩

枳實

二兩

橘皮

一兩

右六味切以水六升煮取一升入合去滓分溫三服如人

行八九里

進之忘

酢物

桃李雀肉

等

仲景傷寒論同

古今錄驗

療胸膈痰飲

食噉經日則併吐

出食皆不消

如初空腹一兩日

聚食還復吐之極不便此由

痰飲聚下絕不通服此丸宣通下氣方

吳茱萸

澤瀉

芍藥

白术

漢防己

赤茯苓

各二兩

蜀大

黃

右七味

擣篩蜜和丸

如丸如梧子大飲服二十五丸忌桃李雀肉酢物

出第十一

卷中

左

七味

擣篩

蜜和丸

如丸如梧子大飲服二十五丸忌桃李雀肉酢物

出第十二

卷中

左

七味

擣篩

蜜和丸

如丸如梧子大飲服二十五丸忌桃李雀肉酢物

出第十三

卷中

懸飲方二首

病源懸飲謂飲水過多留在脅下令脅間懸痛放唾引脅痛故云懸飲

出第二

卷中

范汪大甘遂丸

療久澼留水澼飲方

芫花

大甘遂

葛根

大黃

苦參

大戟

芒硝

目母

桂心

各一兩

杏仁

三十枚

巴豆

三十枚

去心皮熬

令折

烏喙

三分炮

右十二味

擣篩其

巴豆杏仁

擣如膏合

以蜜和丸

如大豆許

服二丸日三服

不知稍加以意

將息之大佳

療大水飲病忌食廬筭

豬肉生葱等

出第十四

卷中

左

七味

擣篩

蜜和丸

如大豆許

服二丸日三服

千金療懸飲十劑湯方

芫花甘遂大戟芒硝目母

桂心杏仁巴豆烏喙葛根

右三味等分擣篩以水一升五合煮大棗十枚取八合

綏去滓內藥末

強人

半錢匕

頓服之

平旦

不下者

益藥半錢

平旦更加

繢半錢

要畧同

尚德按

干金云平

日服而不下者

明日更加

繢半錢

要畧同

尚德按

干金仲

論方出第十八卷中

尚德按

干金云平

論方出第十八卷中

尚德按

干金仲

論方出第十八卷中

尚德按

干金仲

論方出第十八卷中

溢飲方三首

病源溢飲謂因大渴而暴飲水水氣溢於腸胃之外在於皮膚之間故言溢飲令人身體疲重而多汗是其候也

出第二十卷中

范汪溢飲者當發其汗大青龍湯王之方

麻黃六兩桂心二兩甘草炙兩生薑兩石膏如雞子杏仁四十枚去節去皮大棗十枚

右七味㕮咀以水九升先者麻黃減二升乃內諸藥者取二升絞去滓適寒溫服一升溫覆令汗汗出多者溫粉粉之一服汗出者勿復服汗出多亡陽逆虛惡風煩躁不得眠脈微弱汗出惡

風不可服服之則厥逆筋惕肉瞶此為逆也忌海藻菘菜生薑

此本仲景傷寒論小青龍方出第十六卷中

湯也

出第十卷中

千金溢飲者當發其汗宜青龍湯方

麻黃去節芍藥

細辛

桂心

乾薑

甘草三兩各半

五味子

半夏

細辛各半升

右八味切以水一斗先煮麻黃減二升乃內餘藥者三升去滓溫服一升忌海藻菘菜羊肉鴟

生菜生葱

此仲景傷寒論小青龍湯也

出第十卷中

千金翼大五飲丸主五種飲一曰留飲停水在心下二曰澼飲水澼在兩脅下三曰痰飲水在胃中四曰

溢飲水溢在膈上五藏間五曰流飲水在腸間動搖有聲夫五飲者由飲後傷寒飲冷水過多所致方

有取字傷寒論同

遠志心苦參 烏鵲魚骨 蓼蘆 白朮 廿遂 五味子 大黃 石膏 桔梗 半夏 洋紫苑

桂心 茼菪 目母 芫花 當歸 人參 茯苓 芎藥 大戟 草薢

黃芩各一常山 甘草 美山藥 厚朴 細辛各三分附子三分炮去皮心 巴豆三十粒

大戟如梧子大酒服三丸日三稍加之忘裡肉桃李雀肉豬肉羊肉鴟生葱酢物生菜野豬肉蘆筍等

胡洽同出第十九卷中

支飲方九首

病源支飲謂水飲停於胃膈之間支乘於心故云支飲其病令人欬逆喘息身體如腫之狀謂之支飲

出二十卷中

當汗出而不汗出身體如腫今云多汗不卜何故尚德按傷寒論大東十二枚又按傷寒論二升下有去上沫作遂虛尚德接干金云小青龍湯不云青龍湯又接于金

尚德按要略云煮取

深師療心下有支飲其人喜眩一作冒澤瀉湯方 白朮二澤瀉五兩 右二味切以水二升煮取一升又以水一升者取五合合此二汁分為再服忌桃李雀肉等此本仲景湯寒論方

千全療支飲不得息。歷大棗瀉肺湯方。荳蔻子。大棗枝。右二味先以水三升煮。

**大棗得汁二升內草麯煎取一升頓服三日一劑可服三四劑**此本仲景傷寒論方

卷之三

傷寒四半夏加淡芩湯主之。寒噏心下痞脹腹有水目眩悸。小半夏加淡芩湯方半夏半生薑斤

酒尚德按渴字下千金更有渴字又假令瘦人脣下有擗者吐涎沫而頰核水也五苓散主之方 猪苓去白朮 茯苓各三钱心去皮翠竹一束

瀉分 右五味下飾水服方寸匕日三多飲水汗出愈忌桃李雀肉生葱醋物等

又心下有痰飲胸膈支滿目眩甘草湯主之方 甘草二兩桂心一兩  
白朮各三兩茯苓四兩右四味細切以

水六升煮取三升去滓服一升日三小便當利忌海藻菘菜生葱桃李醋物等此本仲景傷寒論方

又夫酒客飲者必致吐血此坐以極飲過多所致也其脈虛者必冒其人本有支飲在胸中也支飲胸滿

厚朴大黃湯王之方 厚朴矣 大黃兩枳實矣 在三味細切以水五升煮取二升去滓溫分再服

之傳寒論方  
夫上氣汗出而歎者此為飲也乾棗湯主之若下後不可與之乾棗湯主壅及支滿辟飲方 大黃

**大戟湯**一 芫花炒蕘花各半 甘草炙甘遂 黃芩各一 乾棗一枚 右八味切以水五升者取一升六合

分四服空心服以快下為佳忌海藻菘菜

又膈間支飲其人喘滿心下痞堅面黧黑其脈沉緊得之數十日醫吐下之不愈木防已湯主之方

**木防已** 石膏桂心兩枝人參一兩 在四味以水四升煮取二升去滓分再服虛者即愈實者三日更劑更服三全方宜六君子湯之二清湯入古方三君心二合一全人名四神丸

文機子

有支飲故也小半夏湯主之加茯苓者是也先渴却溫此為水心下痞膈間有水目眩悸小半夏加茯苓湯方半夏二生薑半升五合分再服治羊肉鴨大醋仲景傷寒論茯苓三兩餘並同尚德按渴字下千金更有渴字拉水也五苓散主之方諸苓去白朮茯苓各三錢心去皮莖

多飲水汗出愈忌桃李雀肉生葱醋物等此本中景寫寒論方

王之方 甘草二兩 桂心 白朮各三兩  
芍藥一兩 苓一兩 右四味細切以

便當利忌海藻松菜生葱桃李醋物等此本仲景傷寒論方

多所致也其脈虛者必胃其人本有支飲在胸中也支飲胸溝

右三味細切以水五升煮取二升去滓溫分再服

主之若下後不可與也。既瘳易主，種吸支萬辟飲方。大黃

右八味切以水五升者取一升六合

卷之三

其脈沉緊得之數十日醫吐下之不愈未防已湯主之方

右四味以水四升煮取二升去滓分再服虛者即愈實者

木防已雨桂心雨人參  
蒺藜雨柏也辟合

發字下更  
有發字與  
字下有若

中

留飲方二首

病源留飲者由飲酒後飲水多水氣停留於胸膈之間而不宣散乃令人脇下痛短氣而渴皆其候也

出第十八卷中

尚德按去  
字下疑脫  
目字

范注海藻丸療腹中留飲方 海藻 木防己 甘遂 蔴蓉 蜀椒去芫花 汗芫花煮 蒿朶子煮 各一兩 右七味

擣篩蜜和丸如梧子服十九不差當增之

出第十  
六卷中

尚德按十

金十二枚

下云水三

升煮取一

升一枝下

亦同一升

作一升半

要略右四

味下云以

水二升煮

取半升去

滓云云

又接弓藥

千金二枚

要略五枚

作一升半

之忌海藻松菜羊肉鷄

方出第十八卷中

此本仲景傷寒論

第十八卷中

病源夫酒澼者因大飲酒後渴而引飲無度酒與飲俱不敢停滯在於脇肋下結聚成澼時時而痛因却

呼為酒澼其狀脇下泣急而痛

出第二十  
七卷中

深師消飲丸療酒澼飲酒停痰水不消滿逆嘔吐目視瞞瞞耳聾腹中水聲方 乾薑 茯苓各三

白朮

八枚實四枚

右四味擣篩蜜和丸服如梧子五丸日三稍加之若下去枳實加乾薑二兩名為五飲

丸忌桃李雀肉大醋生冷之類大神驗

又倍木丸

療五飲酒澼方

白朮一斤桂心 乾薑各半

右三味擣篩蜜和丸如梧子飲服十九稍加之

取下先食服之日再忌桃李雀肉生葱

又溫脾丸療久寒宿食酒澼方

乾薑炒一兩

芍藥三兩

蜀椒二兩

小草一兩

桔梗一兩

茯苓一兩

桃仁去皮一兩

柴胡一兩

熬各三兩

大黃八兩切煮

右九味擣篩蜜和更擣萬杵服如大豆許十九日三忌大醋

並出第二十三卷中

留飲宿食方七首

病源留飲宿食者由飲酒宿食後飲水多水氣停留於脾胃之間脾得濕氣則不能消食令人噫氣酸臭腹脹滿亦壯熱或吞酸所以謂之留飲宿食也

出第二十卷中

深師通草丸療積聚留飲宿食寒熱煩結長肌膚補不足方

椒目附子炮半夏洗厚朴炙芍藥芒硝五

大黃兩桑蠅三兩杏仁三兩去皮尖

右八味擣篩為末別擣桑蠅杏仁令如膏合諸末以蜜和丸擣五千

杵服如梧子二丸忘豬肉羊肉鷄等大效

方中無通草未詳其名出第二十三卷中

范汪千金丸療心腹留飲宿食方

沙參丹參苦參桂心各二石膏研五分人參大黃各一半夏

洗乾薑各五戎鹽分巴豆六十枚附子一分

右十二味皆擣合以白蜜和如小豆谷一丸日再令人

先食服一丸不知稍益以知為度忘豬肉冷水羊肉鷄蘆筍生葱

又療留飲宿食桑耳丸方

桑耳二兩巴豆一兩去皮右二味擣和以棗膏丸如麻子先食服一丸不下服二

丸病下即止忘野豬肉蘆筍等

又主留飲宿食光花丸方

光花一兩大黃甘遂黃連麻黃去杏仁去皮甘草炙附子炮各一兩

豆五十枚去皮心右九味擣篩杏仁巴豆別擣如膏合和以蜜丸如小豆先食服一丸日再不知稍增以知

為度忘海藻菘菜猪肉冷水蘆筍等

又順流榮丸療百病留飲宿食心下伏痛四肢煩疼男子五勞七傷婦人產有餘疾等方

當歸代顏各一枝芩烏鵲魚骨桂心各三肉蓴苓仁五分巴豆六十枚去心皮

右八味擣篩白蜜和丸先食

服如小豆一丸日再不知增之欲下倍服之別擣巴豆令如膏忘生葱裡肉酢物野豬肉蘆筍並出第二十六卷中

千金療留飲宿食不消腹中積聚轉下當歸湯方

當歸人參桂心甘草炙芒硝芍藥各二大

黃四兩生薑黃芩澤瀉各三兩右十味切以水一斗煮取三升分三服空心食後服忘生葱海藻菘

尚德按千金黃芩二

尚德按字下疑脫折字

菜出第十卷中

尚德接飲  
疑雷作辨

集驗痰飲積聚嘔逆兼風虛勞陰疝方 霜後疾藜苗子搗汁一石先以武火煎減半即以文火煎攪勿停手候可丸止空腹酒下梧子大三十九煎服亦得

出第五  
卷中

痰飲方二首

病源痰澼者由飲水未散在於胸腑之間因遇寒熱之氣相搏沉滯而成痰也痰之停聚流移於脇肋之間有時而痛則謂之痰澼

出第二  
十卷中

延年療左肋下停痰澼飲結在兩脇脹滿羸瘦不能食食不消化喜唾乾嘔大便或澀或利或赤或黃腹中有時水聲腹內熱口乾好飲水漿卒起頭眩欲倒脇下痛旋覆花丸方 旋覆花分五錢大黃分七錢茯苓三分澤瀉分人參桂心皂莢子去皮附子炮去皮各二分芍藥四錢蜀椒三分去汗乾地黃四兩防葵取水中浮者乾薑枳實炙杏仁去皮厚朴子熟芩根子右十六味擣篩為末內杏仁革壓脂中碎研調篩度蜜和為丸每食後少時白飲服三丸如梧子日二服稍增以微利為度禁食諸肉魚麫蒜生葱酢今既在脇下有澼氣水飲結聚不散數發則悶刺心痛又未曾服如此破澼飲藥雖服補藥澼氣不除終是不損忍久積聚更急飲食減少此方正與澼氣相當更有三兩種毒藥今商量除訖其方內有附子及別本續命丸有烏頭此並破澼疾不得不用復聽臨時不如服烏頭丸澼氣得減亦未必須服旋覆花丸忌酢物生葱豬肉蕷羹

出第十一  
六卷中

集驗療痰澼心腹痛兼冷方 膻甲柴胡赤芍藥各八分甘草炙枳實炙生薑白朮各六分

大棗七個水六升煮七味取二升半去滓內檳榔末分服八合當利忌海藻菘菜莧菜桃李雀肉等

出第五  
卷中

飲辨方二首

病源飲辨者由飲水過多在於脇下不散又遇冷氣相觸而痛呼為飲辨也其狀脇下拉急時有水聲

出第十一  
二卷中

尚德按要略  
麻黃細辛各二兩

**深師附子湯** 治氣分心下堅如盤邊如旋杯水飲所作此湯主之方  
**桂心 生薑 麻黃** 去節各二兩 **甘草**  
**火二 細辛三 大附子炮一粒** 大棗枝十二枚 右七味切以水七升先煮麻黃再沸掠去沫乃下諸藥煮取二

升去淳分服七合當汗出如蟲行

麻黃細辛附子湯並出第二十二卷中

備急療心下堅大如盤邊如旋盤水飲研作枳實曰木湯方 枳實七枚  
白朮三兩 右二味切以水一斗

煮取三升分三服腹中輒即散此出姚大夫忘桃李雀肉等物

白术右兩

右論

癥飲方七首

十卷中 痘源此由飲水多水氣停聚兩脇之間遇寒氣相搏則結聚而成塊謂之癰飲在於兩脇下痃且起按之

深師朱雀湯療久病癬飲停痰不消

療久

深師朱雀湯療久病癥飲停痰不消在胸膈上夜夜時頭眩痛舌紫眼睛身體手足十指頭盡黃亦昏昏下支滿飲輒引脇下痛方 甘遂 芫花各一大戟分三右三味爲散以大棗十二枚擘破以水六升先煎棗取二升內藥三方寸匕更煎取一升一合分再服以吐下爲知未知重服甚良無比

此即前十棗湯 尚德按 十  
棗湯分兩服法與此不同

1

千金中候黑丸療癬飲停結悶滿目翳方 巴豆八分去皮心熬芫花三錢桂心 桂梗各四杏仁三分去皮尖右

五味擣篩蜜和丸飲服如胡豆三  
粒一湯匙日三服之可治口一

一  
也

**千金半夏湯** 治痰飲肺膩中不逕者。白术兩半夏洗三薑兩微冬兩分參一錢心十五分子炮各一錢。右八味切以水八升煮取三升綃去滓分溫三服。忌羊肉鷄桃李雀肉大酢生芻海藻菘菜。

二  
猪肉冷水

金名大半

尚德按五

分十金作  
五兩

冷痰方四首

炮譽石燒各細辛八分

大黃 黃芩

茅廬子蒸熟

厚朴 芫花炒熟

吳茱萸

橘皮

各四分

甘遂三分

右二十

味擣篩蜜和丸酒服如梧子五丸日再服加之以知為度忘桃李雀肉大酢豬肉生菜生薑水大驗出並

第十八

卷中

千金翼前胡湯王胸中久寒癖實宿痰膈塞胸痛不通利三焦冷熱不調飲食損少無味或寒熱體重卧

不欲起方 前胡三生薑四兩黃芩一錢半參二兩吳茱萸一大黃二兩防風二兩杏仁三十枚當歸一錢半甘草各二兩足半

夏三兩麥門冬一兩

去心

右十二味切以水一斗煮取三升去滓分溫三服日三服三劑良深師云若脇

下滿加大棗二枚利水亦佳忌海藻松菜羊肉餳等

又半夏湯主痰飲辟氣吞酸方 半夏三兩生薑六兩附子一枚吳茱萸三百粒炒

右四味切以水五升煮

取二升半去滓分溫三服老小服半合日三忌豬羊肉餳

又薑附湯主痰辟氣方 生薑八兩附子一枚右二味水五升煮取二升分再服亦主卒風大良忌猪肉

冷水深師同出第十九卷中

冷痰方四首

病源冷痰者言胃氣虛弱不能宣行水穀故便痰水結聚停於胸膈之間遂令人吞酸氣逆四肢變青不能飲食出第二十卷中

范汪病痰飲者當以溫藥和之療心腹虛冷遊痰氣上胸膈滿不下食嘔逆胸中冷半夏湯方 半夏一升生薑一斤橘皮四兩右三味切以水一斗煮取三升分三服若心中急及心痛內桂枝四兩若腹痛內

當歸四兩羸瘦老小者服之佳忌羊肉餳

又方 半夏一升生薑一斤桂心三兩甘草三兩右四味切以水七升煮取二升半分三服忌海藻松菜羊

肉餳生薑並出第十六卷中

千金茯苓湯主胸膈痰滿方 茯苓四兩半夏一升生薑一斤桂心八兩右四味切以水八升煮取二升半分

四服令極者加大附子四兩氣滿者加檳榔三七枚忌酢物羊肉生葱鴟八卷中

千金翼論曰凡痰飲盛吐水無時卽其源為飲冷過度遂令痼冷脾胃氣羸不能消於飲食入胃皆變成冷水反吐不停者赤石脂散主之方 赤石脂三斤右一味擣下篩服方寸匕日三酒飲並可稍稍加至三七服盡三斤則終身不吐水又不下利補五藏令肥健有人久患痰飲諸藥不差惟服此一斤則愈出第十九卷中

痰結實及宿食方三首

尚德接肺

病源此由痰水積聚在於胸腑遇冷熱之氣相搏結實不消故令人心腹痞滿氣息不安頭眩目暗常欲嘔逆故言痰結實出第二十卷中

集驗療宿食結實及痰澼癖實瓜蒂常散方

瓜蒂兩赤小豆四兩

右二味擣篩溫湯三合以散一錢匕投

湯中和服之須臾當吐不吐更服半錢湯三合令吐如吐不止飲冷水

備急救急同出第四卷中

千金松蘿湯主胸中痰積熱除之方 松蘿二兩烏梅

梔子各二常山三兩甘草一兩

右五味切以酒

三升清一宿平旦合水三升煮取二升半去滓

頓服之亦可再服得快吐止忌海藻菘菜生葱菜

又療膈散療心上結痰實寒冷心悶方 瓜丁二十枚赤小豆二十枚

人參 甘草炙各一兩

右四味擣為散酒

服方寸匕日二亦療諸黃忌海藻菘菜並出第十卷中

胸中痰澼方三首

肘後療胸中多痰頭痛不欲食及飲酒則瘀阻痰方 磬石兩 右一味以水二升煮取一升內蜜半合頓服之須臾未吐飲少熱湯

又方 杜衡兩瓜蒂三七松蘿三兩右三味切以水酒一升二合漬之再宿去滓溫分再服一服不吐晚

更一服千金同並出第三卷中

千金治膈湯主胸中痰澼方 常山三兩甘草 松蘿各一兩瓜蒂二七右四味酒水各二升半煮取一升

尚德接肺後無水字  
千金同尚德按千金名斷腸

湯

又接千金

二七枚作  
二十二枚作  
一升半作

尚德按千  
金適吐作  
摘吐渴而  
作而渴

半初服七合取吐不盡餘更分二服得快吐差後須服半夏湯在前冷痰部中忌海藻菘菜生葱生

疾厥頭痛方八首

菜備急附後同出第十八卷中

病源謂疾水在於胸膈之上又犯大寒使陽氣不行令痰水結聚不散而陰氣逆上上與風痰相結上衝於頭即令頭痛或數歲不已久連脣痛故云膈痰風厥頭痛若手足寒冷至節則死出第十九卷中千金療卒頭痛如破非中冷又非中風其病是胸膈中疾厥氣上衝所致名為厥頭痛吐之則差方但單煮茗作飲二三升許適冷慢飲三升須臾適吐過吐畢又飲能如此數過劇者須吐膽汁乃止不損人渴而則差集驗同出第十八卷中

千金翼葱白湯主冷熱膈痰發時頭痛悶亂欲吐不得方

葱白

七

烏頭炮

二分

甘草

二分

常

直珠

研

常

墨

附子

三分

炮

水

升

合

煮

取

三升

去滓

內

真珠服

一升得

吐止

忌海藻菘菜猪

山仁桃葉一右六味切以酒四升水四升合煮取三升去滓內真珠服一升得吐止忌海藻菘菜猪

肉冷水生葱生菜生血等物師同千金深

又療痰飲頭痛往來寒熱方常山兩雲母粉兩

右二味為散熱湯服方寸匕吐之止若吐不盡更服

忘生葱生菜

深師云用雲母半兩鍊之並出第十九卷中

備急葛氏主卒頭痛如破非中冷又非中風是胸膈中疾厥氣上衝所致名厥頭痛吐即差療方

金下

墨附子三分炮右二味搗散以冷水服方寸匕當吐愈一方有桂心一分忘猪肉冷水文仲附

又方以鹽湯吐不吐擦

出張文仲同

又方苦參桂心半夏洗

右三味等分為末苦酒和以塗痛上則差忌生葱羊肉鴟附後

又方常山四分甘草半兩

右二味切以水七升煮取三升服一升不吐更服亦可內蜜半升忌生葱生菜

海藻菘菜千金附後

延年同

又方烏梅三十粒鹽二指

右二味以酒三升煮取一升一服當吐愈附後

風痰方五首

延年白朮丸主除風痰積聚胃中冷氣每發動令人嘔吐食或吐清水飲減少不作肌膚方 白朮分  
白芷分乾薑 石斛各六分 五味子 細辛 橘皮 厚朴 炙桂心 防風 茯苓 甘草各四分 右十  
二味擣篩蜜和丸如梧桐子服十九粒飲下日二加至二十九粒桃李雀肉生葱海藻菘菜生菜酢物方  
有人參五分半三味藥各分半處

又茯苓湯主風痰氣發即嘔吐久咷煩悶不安或吐痰水者方 茯苓三人參一兩 生薑 橘皮 白朮各  
兩 右五味切以水五升煮取一升五合去滓溫分三服中間任食忌大醋桃李雀肉等出第十一卷中  
又木蘭湯主熱痰飲氣兩肋滿痛不能食者方 木蘭 枳實炙黃芩 白朮各三兩 漏蘆根 白斂 升  
麻 苦藥 桔梗各二兩 生薑 大黃各四兩 右十一味以水八升煮取二升六合分為三服如人行三  
四里進一服忌桃李雀肉一方兩元參三分兩

又茯苓飲主風痰氣吐嘔水者方 枳實炙一兩 茯苓 白朮 人參各二兩 生薑四兩 橘皮一兩 右六味切  
以水五升煮取一升半分三服中間任食忌桃李雀肉大醋張文仲處並出第六卷中

又療風痰飲氣逆滿惡心不能食方

人參二兩 枳實炙白朮各三兩 生薑四兩 桂心一兩 右五味切以水五升煮取一升五合分溫三服忌桃李雀肉生葱張文仲處出第十七卷中

療諸痰飲方四首

廣濟療飲氣痰膈食則嘔吐方 茯苓八分橘皮分甘草四分生薑分雞蘇分人參四分右六味切水五升  
煮取一升五合去滓分溫二服服別相去如人行六七里進一服不利忌海藻菘菜酢物出第一卷中  
千金順流紫丸療心腹積聚兩脅脹滿留飲痰澼大小便不利小腹切痛膈上寒方 代赭 烏鰐魚骨  
炙半夏各三分 巴豆七分去心皮研分半分桂心四分石膏五分 右六味擣篩蜜和丸平旦服一丸如胡豆至二丸忌羊  
肉鴨猪肉蘆筍生葱出第十八卷中通按此方比前紫丸少當歸茯苓從容蓼蘆多半夏石膏

延年前胡湯主胸背氣滿膈上熱口乾疾飲氣頭風旋方 前胡二  
枳實半細辛 杏仁去皮碎芎窮 防

風 澤瀉 麻黃去節乾薑 菖蒲藥各三兩各淡芩一作淡芩淡神生薑各四桂心 半草二兩 右十四味切以水

九升煮取二升六合三分三服微汗忌生冷油滑猪牛肉麪海藻菘菜生葱生菜酢物出第十七卷中

古今錄驗薑附湯療冷胸滿短氣嘔沫頭痛飲食不消化方 附子分生薑分右二味切以水八升

煎取三升二合分為三服忌豬肉冷水等出第九卷中

胃反方一十首

尚德按今有方一十首

病源夫營衛俱虛血氣不足停水積飲在於胃管則藏冷藏冷而脾不磨脾不磨則宿穀不化其氣逆而成胃反也則朝食暮吐暮食朝吐心下牢大如杯往來寒熱甚者食已則吐其脈緊而弦緊則為寒弦則為虛虛寒相搏故食已則吐名為反胃也出第二十卷中

集驗療胃反不受食食已嘔吐大半夏湯方 人參一錢芩一錢青竹茹五錢大黃六錢橘皮 乾薑各三澤瀉

甘草炙桂心各二錢右九味切以水八升煮取三升服七合日三夜一己利去大黃用泉水東流水尤

佳忘海藻菘菜生葱大酢半金備急張文仲同方

又療胃反吐而渴者淡芩小澤瀉湯方 淡芩 澤瀉 半夏各四錢桂心 甘草炙各二錢右五味以水一

斗煮取二升半去滓服八合日三忌海藻菘菜羊肉鴨生葱酢物等半金加生薑四兩

又療胃反朝食暮吐食訖腹中刺痛此由久冷者方 橘皮兩白朮 人參各二錢椒一百二十粒汗桂心一薤

白一握右六味切以水二升煮一宿內猪肚中縫合三升水煮水盡出之決破去滓分三服忌桃李去青

雀肉生葱半金用羊肚外臺蓋脫大半夏湯方并此方主治也

又療反胃大驗方 前胡 生薑各四兩阿膠一錢大麻子仁熬吳茱萸各五桂心三十甘草炙大棗十

右八物切以酒二升水三升煮取一升七合分再服忌生葱海藻菘菜等物一方有橘皮三兩

又療胃反吐食者方 棣粟米作粉水和作丸如棋子大七枚爛煮內酢中細細吞之得下便已趨床得

用之

又方 好麵十斤粗地黃二斤二味擣日乾酒服若飲三方寸匕日三服千金云治醉酒之殺蟲蟲去則胃安也

又主胃反食則吐出上氣者方 矢兩乳下各一寸以差為度

又方 矢脣上一寸二十壯

又方 矢內踝下三指稍邪向前有穴三壯即差

又方 蘆根茅根各二兩 右二味切以水四升煮取二升頓服得下食以上並與十六金同

朱靈感錄送

製半夏六兩

崔氏療食則吐或朝食夜吐名曰胃反或氣噎不飲食數年羸削唯飲水亦同此方

朱靈感錄送

制半夏六兩

人參三兩生薑一兩橘皮二兩春杵頭糠一升牛涎半升厚朴二兩羚羊角三兩

右八味切以水八升煮取三

升分溫三服相去十里久欲頻服者可至三劑氣噎病者胃閉不受食唯飲水水入吐出積年不差乃

至於死人間多有此病此方救療有效忌羊肉鴨粘食

又華佗療胃反胃反為病朝食夜吐心下堅如杯往來寒熱吐逆不下食此為寒癖所作療之神效方

真珠 雄黃

丹砂以上研末朴硝二兩乾薑一兩甘草半錢

累

右五味擣篩蜜丸先食服如梧子二丸小煩者飲水則

解之忘生血物

一方有桂心一兩必效云治心下堅痛胃反寒病所作久變成肺痿方備急集驗千金張文仲同並出第六卷中

救急瘡胃反方

昔在幼年經患此疾每服食餅及羹粥等物須臾吐出正觀中許奉御兄弟及柴將等

尚德按肘後附方引外臺口馬所患作各人所長士而云作士云此日服食四字作

必效入參湯主胃逆不消食吐不止方 人參 濤瀉 桂心各二兩  
甘草 黃耆各三錢 苓四兩生薑八兩麥門冬二升大黃一兩右十一味切以水一斗二升煮取三升二合服八合日三夜

當作隔

又接隔疑且服二字

薑八兩麥門冬二升大黃半兩右十一味切以水一斗二升煮取三升二合服八合日三夜

必效同出第六卷中

外臺祕要

卷八

胃反方二十首 脾胃病日漸瘦由不食方三首

一服若羸人服六合已下去大黃忌海藻菘菜酢物生葱羊肉餳千金同

又療胃反朝食夜吐夜食朝吐諸藥療不差方 羊肉去脂膜作脯以好蒜空腹任意多少食之立見效驗

又療胃反吐水及吐食方 大黃四兩甘草二兩  
右二味切以水三升煮取一升去滓分溫再服如得可  
則隔兩日更服一劑神驗千金不傳忘海藻菘菜此本仲景傷寒論並出第二卷中

萬全方療脾胃食吐逆水穀不化此為胃反半夏飲子方 製半夏分厚朴半夏人參 白朮 生薑切棗各六枚米兩橘皮四分 右八味細切以水二大升煎取一升去滓分溫四服空肚服二服忘羊肉餳並出第六卷中

卷第一

脾胃弱不能食方三首

病源脾者臟也胃者腑也脾胃二氣相為表裏胃為水穀之海主受盛飲食者也脾氣磨而消之則能食今脾胃二氣俱虛弱故不能食也人脈浮滑速疾者食不消脾不磨也

出第二十卷中

廣濟瘡脾胃氣微不能下食五內中冷時微下利方 白朮兩神鞠末五甘草炙乾薑 枳實炙各五味擣篩蜜和丸空腹溫酒服如梧子二十九日二服漸加至三十九腹中有痛加當歸二兩忘鶴海

藻菘菜桃李雀肉等

出第一卷中

延年人參飲主虛客熱不能食惡心方 人參 麥門冬去心橘皮 白朮 厚朴各二兩 苦苓四兩生薑三分兩

甘草一兩

出第一卷中

右八味切以水八升煮取三升分為三服日三忘海藻菘菜桃李雀肉等

蔣季瑜處

又厚朴湯療不能食腹內冷氣方 厚朴三兩白朮 人參各一兩 苦苓三兩生薑五兩橘皮二兩

水四升煮取一升二合分為三服忘桃李雀肉酢物

蔣季瑜處

出第六卷中

脾胃病日漸瘦因不食方三首

廣濟主脾胃中熱消渴小便數骨肉日漸消瘦方 黃連 麥門冬各十二分去心苦參 桔梗 知母 茯神

土瓜根各八人參甘草炙各六分右九味擣篩蜜和丸每食後少時煮蘆根大麥飲服如梧子二十九丸日二服漸加至四十九不利忘海藻松菜豬肉冷水酢等物又主胃氣冷弱食則吐逆從朝至夜不得食食入腹則脹氣滿急大便出飯粒如故帶酸氣而羸計日漸困者方吳茱萸二兩白朮三兩人參乾薑甘草炙五味子各兩二錢末麥蘖末各厚朴一兩桂心一兩十味擣篩為散空腹煮生薑湯服方十七日三服漸加至二十七日生葱桃李雀肉海藻松菜出第

中

延年白朮丸療惡心數吐水不多能食少心力者方白朮乾薑人參厚朴炙桂心各六分細辛茯苓當歸芍神枳實炙五味子附子炮吳茱萸各六分遠志去心旋復花四澤瀉五分澤瀉五分右十六味擣篩蜜和為丸梧子酒服二十九日再服加至三十五丸忘桃李雀肉大酢生菜生葱豬肉冷水出

卷中

胃實熱方二首

千金凡右手關上脈陽實者足陽明經也病苦頭痛脈經云陽中汗不出如溫瘡脣口乾善噦乳癰缺盆腋下腫名曰胃實熱也

尚德按千金後茶射干升麻各二兩赤蜜一升下蜜煮取三升

又方灸膝下三寸兩脚三里穴各三十壯主胃中熱病

胃虛寒方七首

尚德按今有方六首

千金右手關上脈陽虛者足陽明經也病苦脛寒不得卧惡風寒洒酒目急腹中痛耳虛鳴時寒時熱脣口乾面浮腫名曰胃虛冷也

又療胃虛冷少氣口苦身體無澤補胃湯方 防風 柏子仁 細辛 桂心 橘皮各二 芒硝 吳茱萸 人參各三 甘草一兩 右九味切以水一斗者取三升分溫三服 忌海藻菘菜生葱生菜等物 又補胃虛寒身枯絕骨諸節皆痛人參散方 人參 細辛 甘草各六分 桂心 當歸 麻門冬去心各乾薑八錢志肉四分 蜀椒三分 吳茱萸二分 右十味為散食後服方寸匕溫清酒進之 忌海藻菘菜生葱生菜並出第十一卷中

范汪療胃氣虛不欲食四肢重短氣調和五藏并療諸病調中湯方 薤白切一枳實六枚 橘皮一枚 大棗十二枚 木香豉六枚 合右六味切枳實橘皮棗以水六升先煮薤得四升內諸藥煮取一升半適寒溫服中分服之良一方生薑四分出第二十卷中

刪繁療胃虛苦饑寒痛人參補虛湯方 人參 當歸 桃芩 桔梗 芍藥 橘皮 厚朴各三兩 桂心甘草各二兩 白朮五兩 吳茱萸二兩 大麥蘖炒二升 右十二味切以水一斗二升者取三升去滓分三服 忌海藻菘菜桃李雀肉生葱豬肉酢等物出第十一卷中

又白朮八味等散方與前同 白朮 厚朴 人參 吳茱萸 茶葉炒淡芩 芍藥 橘皮各三

擣篩為散食前服方寸匕緩酒進之隨性服忌桃李雀肉大酢

出第四卷中

延年補胃飲主胃氣虛熟不能食兼渴引飲方 茯苓四兩 人參三兩 桔皮二兩 薤白切一豉五合 糯米合右七味切以水七升者取三升去滓分溫六服中間任食一日令盡忌酢物聚文中處出第一卷中

### 五膈方八首

病源五膈氣者謂憂膈恚膈氣膈寒膈熱膈也憂膈之為病胃中氣結煩悶津液不通飲食不下羸瘦不為氣力恚膈之為病心下苦實滿噫嘔酢心食不消心下積結牢在胃中大小便不利氣膈之為病胸脇逆滿噎塞胸膈不通噫嘔食臭寒膈之為病心腹脹滿欬逆腹上苦冷雷鳴繞脅痛食不消不能食肥熱膈之為病藏有熱氣五心中熱口中爛生瘡骨煩四肢重脅口乾燥身體頭面手足或熱腰背疼痛胸脅

通接三陽  
結謂之膈

引背食不消不能多食腹瘦少氣及癥也此是方家所說五膈形證也經云陽脈結謂之膈言憂寒寒動氣傷神而氣之與神並為陽也傷動陽氣致陰陽不和而腑藏生病結於胸膈之間故稱為膈氣眾方說五膈互有不同但傷動之由有五故云五膈氣出第十三卷中

備急膈中之患名曰膏肓湯丸徑過針灸不及所以作丸含之令氣勢得相熏染有五膈要丸方 麥門

冬十分

心

椒

汗

遠志

附子

炮

乾薑

人參

桂心

細辛

各六

甘草

十分

右九味

擣篩

以蜜

和丸如

梧

子

飲

服

七丸

日三

忘

生

冷

肺

後同

出隱居效驗備急

三卷中

彈子以一枚著牙齒間含稍稍嚥汁日三主短氣胸滿心下堅冷氣此病有十許方率皆相類此丸最效五膈者謂憂膈氣膈恚膈寒膈忘猪肉生菜海藻菘菜生葱千金肘後文仲同出第三卷中

張文仲五膈丸方 吳茱萸 蘿蔴 杏仁去皮乾薑

六味等分擣篩蜜和丸如梧

子飲

服

七丸

日三

忘

生

冷

肺

後同

出隱居效驗備急

三卷中

延年祕錄凡憂膈氣膈食膈寒膈飲膈五病同藥常以憂愁思慮食飲而得之若寒食食生菜便發其病苦心滿不得氣息引脊痛如刺之狀食則心下堅大如粉絮大痛欲吐吐則差飲食不得下甚者乃手足

冷上氣欬逆喘息氣短療以九物五膈丸方 麥門冬去蜀椒汗遠志去心各甘草

附子

乾薑

各六

甘草

十分

右九味

擣篩

蜜和微使淖置有蓋器中先食服大如彈

子丸

一丸

置喉中稍嚥

之喉中

胸中當熱

藥力稍盡復含一丸日三四夜一二服服藥七日愈二十日

平復若不能含者可一大丸作二小丸盡服之唯夏月合乃益麥門冬甘草人參耳其餘不異神良椒

當以銅器放於火上使極熱下置地內椒器中熟攪之須臾汗出便擣合同處椒力有熱亦去其毒非

令有熱也

忌海藻菘菜豬肉冷水生葱

生菜

十全集驗同不能具

古今錄驗大五膈丸療膈中遊氣上下無常處藏有虛冷氣迫咽喉胸滿氣逆膈有邪氣食已氣滿羸瘦著牀骨立往來寒熱腹中不調或下痢嘔逆欬嗽骨肉銷盡服之令人能食長肌肉強筋骨利五臟好顏色補不足益氣力方 細辛 桂心 黃芩 食茱萸 厚朴炙各杏仁三十枚 乾薑 川椒汗遠志三

心分去小草 苕藥 附子 炮當歸 黃連各二 右十四味擣篩蜜和服如梧子二丸日三不知加之以知為度忌猪肉冷水生葱菜等

又五膈丸療憂膈氣膈食膈寒膈飲膈異病同藥神方 人參 附子 炮遠志去桂心 細辛各四 乾薑 蜀椒各五  
甘草少麥冬二味 右七味擣篩以蜜和服如彈丸著牙下咬咀嚥之若病劇者日三夜再并療諸毒風注氣腹中百病皆應當得真新好藥即可中病耳神祕妙方不傳忌生葱生菜豬肉冷水等物前五膈丸同此

又療邪氣嘔逆吸氣五膈為病五藏俱虛則受風冷五藏有邪呼吸不足陰注於內陽結於外陰陽錯亂語言無常膈中左右狀如結氣喉咽不利氣出不入此血氣良微藏凝冷氣成之服此丸安穀通氣溫藏五膈丸出僧深方 蜀椒汗一升乾薑 桂心各二 苕藥一兩 半夏洗細辛 茯苓各一 前胡半兩 右八味擣篩蜜和服如彈丸一枚喉中稍稍吞之可增至三丸或冷則加速志一兩佳日再忌羊肉鷄生葱生菜醋物

又療胸痛達背膈中煩滿結氣憂愁飲食不下藥悉主之宜丸方 製半夏分甘草去桂心各四分 乾薑桂心細辛 椒去目附子炮二分 右八味擣篩以蜜和為丸先飲酒若粳米飲服如梧子五丸日三稍增至十九忌海藻菘菜羊肉鷄豬肉冷水生葱生菜並出第十八卷中

經心錄五膈丸療寒冷則心痛咽中如有物吐之不出咽之不入飲食少方 乾薑三錢門冬二兩附子一兩細辛二兩蜀椒汗遠志去甘草吳茱萸各二 桂心三兩通按此方即前多食茱萸一味 右十味蜜和為丸如梧子服五丸日二忌豬肉冷水海藻菘菜生葱生菜干金同出第二卷中

七氣方三首

病源七氣者寒氣熱氣怒氣恚氣喜氣憂氣愁氣凡七種氣積聚堅大如杯若拌蒲<sub>官切</sub>在心下腹中疾痛欲死飲食不能時來時去每發欲死如有禍祟此皆七氣所生寒氣則嘔吐惡心熱氣則說物不竟言

尚德接千  
金四肢下  
有腑腫二字  
掌字下  
有提字

而迫一云恍怒氣則上氣不可忍熱痛上搶心短氣欲死不得氣息憲氣則積聚在心下心滿不得飲食喜氣則不可疾行不能久立憂氣則不可劇作暮卧不安席愁氣則喜忘不識人語置物四方還取不得去處若聞急則四肢手足筋掣不能舉狀如得病此是七氣所生男子卒得飲食不時所致婦人則產中風餘疾十三卷中  
千全同出第

千金七氣丸方

烏頭炮七分

紫菀

前胡

半夏洗細辛

丹參

茯苓

芑窮

桃仁

去尖

吳茱萸

桂心

桔梗

石膏各三分研

人參

甘草

防葵各四分金作防風

大黃

分乾薑

蜀椒各二分汗葛蒲分

右二十

味擣篩為末蜜和丸酒服如梧子三丸日三加至十九丸一方去半夏加甘遂三分忌海藻菘菜羊肉鷄

豬肉冷水生葱大酢生菜

藥無菖蒲一方有芍

又七氣丸主七氣七氣者寒氣熱氣怒氣憲氣喜氣憂氣憊氣此七氣為病皆生積聚堅牢如杯心腹絞

痛不能飲食時去時來發則欲死凡寒氣狀吐逆心滿熱氣狀恍惚眩冒失精怒氣狀上氣不可當熱痛

上盪心短氣欲絕不得喘息憊氣狀積聚心滿不得食飲喜氣狀不可疾行久立憂氣狀不可苦作卧不安席愁氣狀平故怒氣善忘四肢跗腫不得舉止亦癢產後中風餘疾方

大黃十分分椒二分人參

半夏洗

金蜀椒三分

尚德接千  
金四肢下  
有腑腫二字  
掌字下  
有提字

氣噎方六首

尚德接千  
金四肢下  
有腑腫二字  
掌字下  
有提字

病源此由陰陽不和藏氣不理寒氣填於胸膈故氣噎塞不通而謂之氣噎令人喘憚脅背痛也

出第二十卷中

廣濟療噎胸膈氣噎通氣湯方

半夏洗生薑兩橘皮

桂心各三兩切一右四味切以水八升煮取二升

煮取二升五合絞去滓分溫三服服別相去如人行六七里服忌羊肉生葱鷄等

出第一卷中

深師瘡胸滿氣噎通氣湯方 半夏八兩 生薑六兩 桂心三錢 大棗三十枚 右四味切以水八升煮取三升分

服五合日三夜一忌

羊肉錫生葱

半金同出第十二卷中

集驗療氣噎煎方

蜜酥薑汁各一升

右三味合和微火煎五六沸取如大棗二枚內酒中飲之直

批服之亦好

千全古今錄驗全

又通氣噎湯方 半夏洗桂心各三錢

生薑八兩 羚羊角三

右四味切以水八升煮取三升分服半升日再

服忌羊肉生葱錫

古今錄驗同並出第十四卷中

救急瘡喉中氣噎方 半夏洗柴胡

生薑各二兩

羚羊角屑一法犀角屑

桔梗

昆布

通草

甘草各

右九味切以水八升煮取三升分三服忌

羊肉錫豬肉海藻菘菜等

古今錄驗羚羊角湯瘡噎氣不通不得下食方

羚羊角屑二兩

厚朴吳茱萸

乾薑各三錢

通草

橘皮

洛二烏頭一枚炮

右七味以水九升煮取三升分三服日三忌

豬肉冷水

深師千金同出第二十七卷中

諸噎方一十二首

病源夫陰陽不和則三焦隔絕三焦隔絕則津液不利故令氣塞不調理也是以成噎此由憂恚所致憂恚則氣結氣結則不宣流使噎者噎塞不通也

出第十二卷中

深師瘡噎方

羚羊角屑前胡

甘草各一兩

人參

橘皮各二兩

右五味切以水六升煮取二升分四服

忌海藻菘菜

又方 鷓鴣喙 右一物當噎時以銜之則下

射後同

又方 羚羊角 右一物多少自在末之飲服亦可以角摩噎上艮

並出第二十二卷中

廣利方療因食即噎塞如炙肉懸在咽中不下方

吳射干六升麻

桔梗各四兩

木通十二赤茯苓百

合各八紫菀頭一枚

右七味切以水二大升煎取九合去滓分溫三服食後良久服忌豬肉酢物出第

千金理諸噎方 常食乾粳米飯即不噎

又方 炭末細羅蜜丸如彈子大含少細細嚥津即下集驗同並出第十六卷中

集驗療噎方 取頭垢如棗大以粥若漿水和服之附後深師同出第十七卷中

必效主噎方

鐵捺大椎盡力則下仍令坐之通接鐵捺未詳仍今坐之亦未詳

又方 以酢煮鈎糊啜之則差此只可一兩日差欲長久絕者取漫為丸如彈子酢中煮熟於水中澤却及熱則食二十丸神驗不過三兩度則差大效

又半夏湯主噎方

生薑四兩半夏一升石膏四兩小麥一升吳茱萸一升赤小豆二十顆大棗二十個人參甘

草 桔梗

桂心各二梗各乾薑湯不用生薑

葱等

古今錄驗有括葉無桔

又方 杏仁

去皮桂心二兩

右一味末之蜜和丸含之如棗核許稍稍嚥之臨食先含極效忌生葱

古今錄驗噎方 蘆根三斤右一味切以水一斗煮取四升分四服出第二十卷中

立食噎方九首

古今錄驗噎方 蘆根三斤右一味切以水一斗煮取四升分四服出第二十卷中

尚德按鐵鑄疑當作鑄  
鑄五到切音做餅鑄也燒器也  
難入聲半重接也俗作捺鑄捺按之令坐之蓋也  
坐餅鑄也按也令坐之蓋也

又方 春杵頭糠置手巾角以拭蓋立下集驗深師千金同並出第十五卷中

深師療卒噎法傍人可緩解衣帶勿令噎者知則愈

又療卒噎下方水一杯刀一口右二物先以刀橫畫水已後盡飲之則下出第二十卷中

又療卒噎方與其食人當以手捉噎人筋問曰此等何物噎人當答言筋其食人云噎下去則立愈

又療卒噎下方水一杯刀一口右二物先以刀橫畫水已後盡飲之則下出第二十卷中

又療卒噎方與其食人當以手捉噎人筋問曰此等何物噎人當答言筋其食人云噎下去則立愈

又療卒噎下方水一杯刀一口右二物先以刀橫畫水已後盡飲之則下出第二十卷中

又療卒噎方與其食人當以手捉噎人筋問曰此等何物噎人當答言筋其食人云噎下去則立愈

又療卒噎下方水一杯刀一口右二物先以刀橫畫水已後盡飲之則下出第二十卷中

又療卒噎方與其食人當以手捉噎人筋問曰此等何物噎人當答言筋其食人云噎下去則立愈

又療卒噎下方水一杯刀一口右二物先以刀橫畫水已後盡飲之則下出第二十卷中

又療卒噎方與其食人當以手捉噎人筋問曰此等何物噎人當答言筋其食人云噎下去則立愈

集驗療噎方 羌活五兩 擣用水一升浸三宿每日溫服五合差

又療氣噎不下食兼嘔吐方 半夏四兩 生薑三兩

右二味以東流水二大升煎取一升去滓溫服三

合口三服忌羊肉鴟

並出第  
五卷中

備急瘡卒食噎不下方 取麥含之則下

千金集驗  
肘後同

又方 取老牛涎沫如棗核大置水中飲之終身不有噎必效

並出第三卷中

### 五噎方三首

病源夫五噎謂一曰氣噎二曰憂噎三曰食噎四曰勞噎五曰思噎雖有五名皆由陰陽不和三焦隔絕津液不行憂恚嗔怒所生謂之五噎噎者噎塞不通也

出第二十卷中

古今錄驗五噎九瘡胸中久寒嘔逆氣隔飲食不下結氣不消氣噎憂噎勞噎食噎思噎氣噎者心悸上下不通噫噯不徹胸膈苦痛憂噎者天陰苦厥逆心下悸動手足逆冷勞噎者苦氣隔脇下支滿胸中填塞令手足厥冷不能自溫食噎者食無多少唯胸中苦塞常痛不得喘息思噎者心悸動喜忘目視矇矇此皆憂恚嗔怒寒氣上逆胸膈所致療之方 乾薑 蜀椒 汗食茱萸 人參 桂心各五細辛 白木 茶芩 附子炮各六分 橘皮 分右十味擣篩以蜜和為丸如梧子酒服三丸日再不知漸增忌桃李雀肉大酢豬肉冷水生葱生菜酢物

出第二十卷中

經心錄五噎丸主五種之氣皆令人噎方 人參 半夏 桂心 防葵一方用防附子炮細辛 甘草

二兩食茱萸合紫菀

乾薑 苦藥 枳實炙烏頭各六分炮

右十三味擣篩以蜜和為丸如梧子大服

五丸日三不知加至十五丸忌羊肉鴟海藻菘菜猪肉生葱生菜

千金同出  
第二卷中

集驗噎塞不通方 膿實根分

右一味擣為散酒下方寸匕日三服

出第五卷中

### 諸骨哽方三十五首

尚德接今  
有方四首三十

尚德接續

肘後瘡食諸魚骨哽百日哽者方 用綿二兩以火煎蜜內一段使綿熱灼灼爾從外縛哽所在處灼鉗

以熨綿上若故未出復煮一段綿以代前并以皂莢屑少少吹鼻中使得噦出矣祕方不傳禮云魚去乙謂其頭間有骨如「」字形者哽入不肯出故也

又方 取捕魚竹筍鬚燒末飲之魚網亦佳

又療食諸肉骨哽方 白雄雞左右翮大毛各一枚燒末水服一刀圭也仍取所食餘者骨左右手反覆

擲背後則下也

文仲備急同

又方 燒雞足末服方寸匕酒下立出

深師同

又方 生艾蒿數升水酒共一斗煮取三四升稍稍飲之

深師同

凡瘡病皆各以其類宜宜以鷄鵝瘡肉骨狸虎瘡魚哽耶主於竹篾薤白嚼筋綿蠻事乃可通為諸哽用耳又有呪術小小皆須師解故不備載

出第五卷中

深師療食魚骨哽方 捕魚網燒飲服刀圭已良是魚哽燒魚網服之良

又療哽及刺不出方 服薑微灰末方寸匕日三亦療折箭刺入膿瘻不出堅燥及鼠撲服之十日哽刺

皆穿皮出效

又療鐵棘竹木諸刺在肉中折不出及哽不下方 半夏

洗白斂各二

右二味搗篩酒服半錢匕日三

窗從少少起者半夏戰人喉中故也忌羊肉鴨等加乾薑一兩尤佳

又方 鼠膽厚塗瘡上則出亦可用墳鼠大殼

又療哽方 蟬蛄腦 右一物吞即下亦療刺不出塗刺瘡上

又療咽哽方 取魚尾蒼衣領令下推立下

又方 白斂白芷等分搗散飲服刀圭

又療食哽方 鷄糞燒灰存性 右一物篩下服方寸匕虎狼鵝屎皆可服之佳

又療骨哽咽不得下飲食方 白雞翼翮大毛各一枚著銅器中燒之焦作灰飲服一刀圭立下

尚德接魚哽以下與上文義相重疑有一誤

云元作撲蓋朴撲音義相通

又療哽方 半夏洗白芷各五兩

右二物搗飾服方寸匕則嘔出忘羊肉餳

又方 以東流水一杯東向坐以手指畫水中作龍字訖飲水不自曉書令他人持手書良

又方 凡書文曰天有門地有根諸家人口者皆當得吞集驗同並出第二十二卷中

千金療哽方 取鹿筋清之濡索之大如彈丸持筋端吞之候至哽處徐徐引之哽著筋出集驗同

又方 極吹之食骨哽燒虎狼屎服

又方 末虎骨若狸骨服方寸匕集驗同

又方 服瞿麥末方寸匕集驗古今錄驗同

又方 吞猪膏如雞子大不差更吞差止古今錄驗同

又療諸哽方 作竹箋刮令滑綿縷內咽中令至哽處可進退引之哽即出小品古今錄驗深師同

又療諸哽方 鷓鴣屎末服方寸匕集驗古今錄驗同

又療魚骨哽方 口稱鷄鷄則下並出第二十六卷中

張文仲療食諸魚骨哽方 以魚骨補頭上則立下陶云因嚙刻則出肘後急備同

又方 小嚼薤白令柔以繩繫中央持繩一端吞薤到哽處引便當隨出集驗古今錄驗深金同

又療魚骨哽在腹中眾法不能去者方 取飴糖丸如雞子黃大吞之不去又吞此用效得也千金集驗

小品同

尚德按嚙  
刻肘後作  
譽刻  
尚德接千  
金云煮薤  
白令半熟  
云小嚼之云

又療食中吞髮哽不去繞喉者方 取梳頭髮燒灰飲服一錢匕肘後急備同並出第三卷中

救急療哽方 好蜜以一匙抄稍稍嚙之令下良文仲同

又療魚骨哽在喉中方 以少許礪砂口中咀嚼嚙之立下出第七卷中

必效療魚骨哽方 含水獭骨立出小品同

又方 魚網覆頭立下千金云燒灰服半匕小品同出第二卷中

古今錄驗療魚哽骨橫喉中六七日不出方 取鯉魚鱗皮合燒作屑以水服之則出也未出更服之取

出為度

出第十九卷中二十

雜誤吞物方一十七首

九卷中

肘後療誤吞鉤方 若繩猶在手中者莫引之但益以珠璫若葷子輩就貫之著繩稍稍令推至鉤處小引之則出

又方 以小羊喉以沓繩推至鉤處當退脫小引則出

又方 但大戾頭四向顧小引之則出

又方 常思草頭一把二升水淘灌之十餘過而飲之

又療誤吞諸木竹釵葷方 取布刀故鋸燒清酒中以女人大指甲二枚燒末內酒中飲之

又方 若是桃枝竹釵但數數多食白糖自消去

又療以銀釵簪筋擿吐因氣吸誤吞不出方 多食白糖漸漸至十斤當裏物自出此說與葛氏小異

並出

第五卷中

深師療誤吞鉤方 虎珀珠 右一物貫着鉤繩推令前入至鉤所又復推以牽引出矣若水精珠卒無

珠堅物摩令滑用之也

出第二十卷中

千金療誤吞環若指嘔方 燒鴈毛二七枚末服之竊利亦佳

仲同急文

又誤吞珠銅鐵而哽者方 燒弩銅牙令赤內酒中飲之立愈

出第二十卷中

張文仲療吞諸珠璫鐵而哽方 燒弩銅牙令赤內水中飲其汁立愈

附後急同

又療誤吞錢方 捣火炭末服方十七則出

附後小品集驗千金備急同

備急葛氏誤吞釵方 取薤暴令熟勿切食一大束釵則便隨出生麥葉若繁縷皆可用良效針

附後同

又誤吞釘及箭金鍼鐵等物方 多食肥羊肉脂及諸肥肉自裹出

肘後千金文仲同  
並出第五卷中

古今錄驗療誤吞銀環及釘者方 取飴糖一斤一頓漸漸食盡多食之環及釘便

小品集驗千金作白糖同千金同

又方 取水銀一兩分服之釘便下去也亦可以胡粉一兩搗調之再分服食銀令如泥也若吞金銀物

在腹中皆服之令消烊出也

又療誤嚥鍼方 取真吸鐵磁石末酒白飲服一方寸匕解曰磁石特能吸取鍼難云今吞鐵哽在喉中而服磁石末入腹耶若含磁石口中者或吸鐵出耳二理詳取其義焉

小品集驗千金同  
出第二十九卷中

唐王臺先生外臺祕要方卷九目錄

欬二十三門

欬嗽方三首

尚德按欬  
疑當作欬

新久欬方三首

尚德按欬  
疑當作欬

暴熱欬方二首

尚德按欬  
疑當作欬

欬失聲方四首

尚德按欬  
疑當作欬

呻欬方二首

尚德按欬  
疑當作欬

瘡欬方一十四首

尚德按欬  
疑當作欬

久欬坐卧不得方二首

尚德按欬  
字下疑脫

九種欬方一首

尚德按欬  
字下疑脫

十欬方七首

尚德按欬  
字下疑脫

欬嗽脹血方一十一首

尚德按欬  
字下疑脫

欬嗽唾粘方二首

尚德按欬  
字下疑脫

雜瘡欬方三首

尚德按欬  
字下疑脫

五欬方四首

辛欬方八首

冷欬方三首

氣欬方八首

熏欬法六首

積年久欬方二十一首

欬嗽短氣方七首

欬逆及厥逆欬方七首

尚德按今有方六首

久欬嗽上氣唾脹血及濁涎方五首

久欬嗽脹血方四首

尚德按今有方十一首

許仁則療欬方一十二首

又按今有方十一首

外  
書  
卷  
八

一

唐王燾先生外臺祕要万卷九

宋朝散大夫守光祿卿直祕閣判金闈簡院上護軍臣林億等上進  
新安後學程衍道敬通父訂梓

欬嗽方三首

尚德按病  
源無劇字  
宋本同

又接與字  
上病源有  
者字宋本  
同

病源欬嗽者由肺感於寒微者成欬嗽也肺主氣合於皮毛邪之初傷先客皮毛故肺先受之五藏與六腑為表裏皆稟氣於肺以四時更王五臟六腑皆有欬嗽各以其時感於寒而受病故以欬嗽形證不同五藏之欬者乘秋則肺先受之肺欬之狀欬而喘具有音聲甚則唾血乘夏則心先受之心欬之狀欬則心痛喉中介介如哽甚則咽腫喉痺乘春則肝先受之肝欬之狀欬則兩一作左脇下痛甚則不可以動動則欬劇乘冬則腎胠下滿乘季貞則脾先受之脾欬之狀欬則右脇下痛陰引於肩背甚則不可以動動則欬劇乘冬則腎先受之腎欬之狀欬則腰背相引而痛甚則欬逆此五藏之欬也五藏欬久不已傳與六腑脾欬不已則胃受之胃欬之狀欬而嘔嘔甚則長蟲出肝欬不已則膽受之膽欬之狀欬而嘔膽汁肺欬不已則大腸受之大腸欬之狀欬而遺糞心欬不已則小腸受之小腸欬之狀欬而失氣氣與欬俱出腎欬不已則膀胱受之膀胱欬之狀欬而遺溺久欬不已則三焦受之三焦欬之狀欬而腹滿不欲食飲此皆聚於胃關於肺使人多涕唾而面浮腫氣逆也又有十種欬一曰風欬欲語因欬言不得終是也二曰寒欬飲冷食寒注入於胃從肺脈上氣內外合因之而欬是也三曰支欬心下硬滿欬則引四肢痛其脈反遲是也四曰肝欬欬而引脇下痛是也五曰心欬欬而唾血引手少陰是也六曰脾欬欬而涎出續續不止下引少腹是也七曰肺欬欬而引頭項而唾涎沫是也八曰腎欬欬則耳聾無所聞引腰并臍中是也九曰膽欬欬而引頭痛口苦是也十曰厥陰欬欬而引舌本是也診其右手寸口氣口以前脈手陽明經也其脈浮則為陽實陽實者病苦腹滿善喘欬脈微大為肝脾欬引少腹欬脈浮大者生沈小伏匿者死又云脈浮直者生沈硬者死欬且嘔腹脹且泄其脈弦絃欬絕者死欬脫形發熱脈小硬急者死欬且羸瘦絡脈大

硬者死歟而承血羸瘦脈大者死

出第十一

小品瘡欬嗽紫菀七味湯方 紫菀兩半五味子一桂心二麻黃四兩去節杏仁七十枚去皮 乾薑兩甘草二兩

右藥切以水九升煎取二升半去滓溫服七合日三服忘海藻松菜生葱蒜鰐腥膩

經心錄古今錄驗

延年紫菀飲主欬嗽方 紫菀 月母 茯苓 杏仁去皮共生薑兩三人參二橘皮去脈 右七味切

以水五升煮取一升五合去滓分溫三服如人行七里更進一服忘海藻松菜酢

張文仲處古今錄驗

古今錄驗天門冬前瘡欬嗽方 天門冬六兩杏仁三升去雙殼三升熟仁皮共碎殼令汗出桂心

同出第十二卷中

雨附子一錢薑各六烏頭炮去皮一錢人參六兩蜈蚣一枚去頭足矣 右十二味別擣杏仁其餘者合擣下筛以五斤

膠飴和擣千杵服如大棗一枚日三忘冷水豬肉生葱鯉魚

出第九

五噏方四首

深師療五噏一曰上氣噏二曰飲噏三曰燥噏四曰冷噏五曰邪噏四滿丸方 乾薑 桂心 蹤躅花

芎藭 紫菀 芫花根皮各二人參 細辛 甘草炙半夏 沉鬱子各一蜈蚣一枚去頭足矣 右十二味

擣篩蜜和服如大豆五丸米飲下日三不知加之至七八丸服此丸無不差方祕不傳忘羊肉鴨生葱

生菜海藻松菜

又方 特生譽石一兩泥色燒半日水飲冬花兩枝搗千杵巴豆十六枚去皮心 右四味擣篩蜜和服如大豆米

飲下二丸不知稍增至四五丸忘野豬肉蘆筍

古今錄驗廢三十年

備急華佗五噏丸方 皂莢 乾薑 桂心 右三味等分擣篩蜜和丸如梧子服三丸酒飲俱得日三

忘葱

出第三

古今錄驗四滿丸療五噏一為氣噏二為寒噏三為燥噏四為邪噏五為冷噏悉療之方 蜈蚣二枚羌

艽根五分 蹤躅花 乾薑 川芎 桂心各四人參 細辛各二 右八味擣篩蜜和丸一服米飲

下五丸如大豆許日三稍加至十九忘生葱生菜

出第十

新久欬方三首

尚德接千  
金欬冬花  
乾薑各三  
兩光花一  
兩五味子  
二兩

深師療新久欬嗽唾膿血連年不差晝夜肩息麻黃湯方 麻黃去節四兩桂心 甘草各二大棗十四  
右四味切以水九升煮取二升去滓分溫三服日三數用有效忌海藻菘菜生薑等物  
又療新久欬嗽前胡丸方 前胡六兩頭泡二桔梗 乾薑各二桂心 蜀椒八分右六味擣師蜜和  
如櫻桃大一丸含化稍稍嚥之日三又療久欬晝夜不得卧咽中水雞聲欲死者療之良忘猪肉冷水  
生葱並出第十 八首

千金療新久咳嗽欬冬花煎方 款冬花 乾薑為光花根熟熬爲末五味子 紫莞各三  
以水一斗煮三味取三升半去滓內光花乾薑末加白蜜三升合投湯中令調於銅器中微火煎令如  
飴可一升半服素核大含之日三服曾數用甚良忘蒜鶴腥膾深師同出第十八卷中

卒欬嗽方八首

肘後療卒欬嗽方 金月下土分枝熬右二味熬擣蜜丸如梧子大米飲服十四丸曾用有驗

又方 飴糖 乾薑末各一兩六分豉一右三味先以水二升煮豉三兩沸去滓內飴糖消後內乾薑末分爲三  
服

又方 生薑汁 百部根汁 右二味合煎服二合

並出第一卷中

尚德按煮  
肘後作清

張文仲卒欬嗽方 百部根四

兩

右一味酒一斗煮之再宿火溫服一升日再服之效

肘後同

又方 温清酒

驢膏各一升

右服之亦療上氣並出第三卷中

備急卒欬嗽方 芫花二兩

共

右一味水二升煮四沸去滓內白糖一斤服如量大分食鹹酸物亦療久

欬同肘後

又方 爐中取鉛屑分桂心一

皂莢去皮子二兩

右三味擣篩蜜和丸如梧子大人米飲下服十五丸小

兒五丸日二服忘生葱肘後同出第三卷中

外臺必要

卷九

新久欬方三首

卒欬嗽方八首

暴熱欬方二首

深師療卒欬逆上氣肩息晝夜不止欲絕麻黃湯方 麻黃去節細辛各二  
甘草半兩 桃仁二十枚去皮一錢

杏仁本作杏仁 右四味切以水七升煮取三升去滓分三服祕方忌海藻菘菜生菜出第十八卷中

暴熱欬方二首

千金療暴熱欬杏仁飲方 杏仁四十枚去皮兩仁炒研柴胡兩紫蘇子升橘皮兩 右四味切以水一斗煮取三

升分三服常服飲之不妨

本方無紫蘇子有乾

延年目母煎主暴熱欬方 月母兩紫菀 五味子 百部根 杏仁去皮火者研 甘草火各二兩 右六味切以水五升煮取二升去滓和地黃汁三升生麥門冬汁一升白蜜五合好酥二合生薑汁一合又先取地黃麥門冬及湯汁和煎減半內酥薑汁攪不得停手又減半內蜜煎如稠糖煎成取如棗大含嚥之日三夜再服忌海藻菘菜鹹物

蕡孝璋處出第五卷中

冷欬方三首

深師療冷欬逆氣乾薑湯方 乾薑四兩紫菀兩杏仁七十枚去皮火者研

麻黃去節桂心 甘草火各二兩 五味子兩

右七味切水八升煮取二升七合分三服平體人加射干一兩代乾薑忌海藻菘菜生薑等

又療冷欬光煎方 光煎 乾薑各二兩白蜜二升

右三味擣篩二味內蜜中攪令相和微火煎令如

糜服如棗核一枚日三夜一飲病者多服

子金主新久欬並出第十八卷中

千金療冷嗽方 乾薑三兩膠饴斤 右二味攪令和調熬五升米下令熟以棗大含化稍稍嚥之日五

八卷中

欬失聲方四首

廣濟療咽喉乾燥欬嗽語無聲音桂心散方 桂心 杏仁去皮火者研各三兩

裏如棗大含之嚥汁日三夜二忌生葱油膾

出第二卷中

古今錄驗療暴中冷傷寒鼻塞喘欬喉中壅塞失音聲者方 取芫花根切暴口 右一味令病人以薦

自紫就裏春花根全飛揚入其七孔中當眼淚出口鼻皆羅刺那達畢畢耳勿住令光花根盡則止病必於此差

又療忽暴欬失聲語不出杏仁煎方 杏仁一升去皮尖兩仁者熬通草四兩紫菀三兩五味子各三兩桑白皮五兩

蜜沙糖生薑汁各一升右九味切以水九升煮五味取三升去滓內杏仁脂薑汁蜜糖和攪微火上

前取四升初服三合日再夜一稍稍加之忘蒜鷄炙肉等千金

又通聲膏方 五味子 款冬花 通草各三兩人參二兩杏仁一升去尖皮兩仁者熬桂心 細辛 青竹皮 薑蒲

酪酥各二升蜜膏三升白蜜 薑汁各一升右十三味細切以水五升微火煎三上三下去滓內薑汁蜜膏

煎令調和酒服如棗二枚忌生菜生葱羊肉鷄肉鷄千金用酥五升蜜膏蜜各二升餘同並出第十九卷中

氣嗽方八首

尚德按骨  
字下千金  
有酸蜜二字

病源夫肺主氣候皮毛人有運動勞役其氣外洩腠理則開因乘風取涼冷氣卒傷於肺即發成嗽故為暴氣嗽其狀嗽甚而少涎沫出第十四卷中

古今錄驗療寒氣嗽并下焦冷結方後四方同療此大夫別錄要方紫菀 胎母 百部根 款冬花 五味子 半

夏洗各五分射干分桔梗花根皮四分切乾薑 桔皮各四分杏仁八分去皮尖蘇子分白石英研八分鍾乳十分研

右十四味擣篩以蜜和為丸如梧桐子酒服十九日再稍加至三十丸忌羊肉鷄諸生冷等物

又方 乾地黃 桂心 山茱萸 五味子各三兩茯苓四兩旋覆花

十味擣篩蜜和酒服十五丸如梧子大日增至三十丸忌海藻生葱醋物松菜蕪荑

又酒方 丹參 乾地黃各五兩甘菊 石斛 牛膝 黃耆 白朮 旋覆花各四兩防風 獨活 附子炮

秦艽 桂心 乾薑各三兩鍾乳六分右十五味切以酒三斗浸七日初服二合日再稍稍加之忘食

桃李雀肉生葱豬肉冷水蕪荑

又丸方 乾地黃四兩防風 旋覆花 澤瀉各三兩山茱萸 丹參 五味子 茯神各二兩桂心半兩

右九味擣篩蜜和丸如梧子酒服二十九日再稍加至三十九忌醋物生葱薑等益出第十

並出第十九卷中

延年杏仁煎主氣嗽方 好杏仁一升去皮六兩仁者研熟糖合蜜五升一升以水研取汁生薑汁各一

目母八合別蘇子汁一升以水研取汁七小合

右七味先擣杏仁如泥內後六味藥合煎如稠糖取如棗大含嚥之日三但嗽發細細含之忌猪肉薄處

又療氣嗽煎方 目母 薜莞 百部根炙款冬花 甘草炙各三兩桂心二右六味切以水六升煮取一升

五合去滓內後藥

生地黃汁三升麥門冬汁 生薑汁 白蜜 酥 白糖各五

杏仁三合去皮尖雙仁者研熟擣作膏

煎如糖一服一匙日三稍加至三匙嗽定則停忘海藻生薑松米蕪荑蒜酢鹹食豬肉等

又療氣嗽杏仁煎方 杏仁五合去皮尖雙者研熟擣取汁生薑汁合酥一蜜合一升去皮六兩仁者研熟擣作膏右四味以水三升研杏仁取汁內銅鑄中

煎攪可減半內薑汁煎如稀糖內酥蜜煎令如稠糖一服一匙日三服夜一服稍加至兩匙忘豬肉

又杏仁煎主氣嗽方 杏仁一升去皮六兩仁者研熟擣取汁酥 白蜜各三合右三味以水三升研杏仁令味盡內銅鑄中煎可減半內酥蜜煎二十沸內目母末四分薑莞米三分甘草炙末一分更煎攪如稀糖一服一匙日三夜一服以欬嗽止為度大驗忘蒜猪肉並出第五卷中

呻吟方二首

尚德按病原呻吟者  
效隨效之  
并作歌

病源呻吟者猶是欬嗽也其胸膈痰飲多者欬則氣動於痰上搏咽喉之間痰氣相擊隨欬動息呀呻有聲謂之呻吟其與欬嗽大體雖同至於投藥則應加消痰破飲之物以此為異耳出第十四卷中

崔氏三十年以來呻吟并療之方 良岩子新南青木香者真黃無石右三味等分擣篩為散以羊脂塗青紙一張以散藥著紙上卷裹之平旦空腹燒裏頭令煙出吸取十喫日中時復吸十喫日晚後吸

十喫七日內禁生冷醋滑三日則差出第六卷中

古今錄驗療呻吟書墨丸方大神驗萬年縣令席君懿送 書墨 甘遂 莼虧子二分前胡大黃五

分巴豆

二升去心皮熟

右六味擣篩為散巴豆草應別細研蜜和丸如梧子以白蜜粥清飲旦空腹服三丸

人弱服二丸

則利水或吐三日以後更一服還如上法不過三服愈癒三十年欬如利不止者以冷白

飲止之吐利止後食禁生冷醋滑猪魚雞鷄油酒冷水蒜蘆筍此藥宜春夏服之有毒之藥當從少起

廣濟療癥散上氣喉中作水雞鳴出第十九卷中

重欬法六首

尚德按千

金復作後無石字

烟從秋孔

中出七字

作烟從孔

出四字無

昨日餘者

後日復薰

之九字

尚德按千

金蠟蠟紙

並出第十

八卷中

驗同古今錄

千金療欬熏法 細熟艾薄薄布紙上廣四十復以石硫黃末薄布艾上務令調勻以荻一枝如紙長卷之作十枚先以火燒鑊下去荻其煙從荻孔中出口吸取煙熏之取吐止明日復熏之昨日餘者後日復熏之三日止自然差惟得食白糜餘者禁之

又法 重黃

研令細一兩

以蠟蠟紙并上熏黃令與蠟相入調勻卷之如前法燒之亦如上法日一二止以

吐為度七日將息後羊肉羹補之

又法

蠟青布

廣四十上布艾艾上又布青礬石末礬上布少熏黃未又布少鹽又布少豉末急卷之燒

令著內燥罐中以紙蒙頭作小孔以口含取煙嚥之以吐為度悶時復息煙盡止日一二用三卷用不

盡差三七日慎油膩

並出第十

八卷中

崔氏療久欬不差熏法 款冬花

右一味每旦取如雞子許用少許蜜拌花使潤內一升鐵鑊中又用

一瓷枕合鑊底鑽一孔孔內插一小竹筒無竹葦亦得其筒稍長作枕鑊相合及插筒處皆麪塗之

勿令漏煙氣鑊下著炭火少時

款冬煙自從筒中出則口含筒吸取煙嚥之如覺心中少悶須暫舉頭

即將指頭捻筒頭勿使漏煙氣吸煙使盡止凡如是三日一度為之待至六日則飽食羊肉餌飪一頓

則永差

出第六卷中

古今錄驗療欬飲

呼合切下同

煙法

鍾乳

研白石英研人參

丹參

研雄黃七分水銀二分

烏羊腎脂具淨

紙

右八味各擣篩為末以水銀投藥裏細研使入諸藥半脂熬取置紙中令均平使厚一分散藥

令周遍剪紙一張作三分瘦弱婦人五日用半寸熏末服藥前齋五日服藥後一百日忌五辛酒肉此一劑得療五十人上氣悉皆愈忘生血物

又療欬腹脹氣上不得卧身體水腫長孫振重法  
蠟紙一張熟艾薄布遍紙上重黃末三款冬花末分右三味并遍布艾上著一葦筒卷之寸別以繩繫之燒下頭欲煙燄之亦可三十喚欲訖則差飲盡三劑一百日斷鹽醋日一每欲三十三日盡一劑出第十九卷中

### 療欬方一十四首

深師療欬方 巴豆炮去殼勿傷肉

白飲吞下初日飲服二枚二日三枚良志野豬肉蘆筍千金

又方 蜀椒

一合汗去皮尖半合熬去皮熱倍少於椒與杏仁相似熟

宋本半合宋本少多款冬花小半合宋本

右四味擣蜜和爲丸晚間不食含一丸如彈丸大含一丸則知效驗十年者五六日知良並出第十八卷中

小品療欬

生薑五味子湯方 五味子

五合生薑八兩紫莞一兩夏光二兩吳茱萸一兩款冬花半細辛一附子一枚

炮茯苓四兩甘草二兩桂心一兩右十一味切以水一斗煮取五升分溫三服老人可服五合忘海藻松

菜豬肉冷水羊肉錫生菜醋物生葱

古今錄驗同出第一卷中

備急療欬方 杏仁

半斤去皮尖兩仁者熬紫莞二兩

右二味先研杏仁取汁使盡細切紫莞更煎少濃去滓內蜜

使稠細細飲之立定

卷中第三

崔氏療欬方 杏仁

一升去尖皮兩仁者熬蘇子合五生薑汁五合蜜五合前

蜜令沫盡

右四味先擣杏仁作脂訖內諸藥和煎攪調三四沸藥成含嚥如棗大日三四忌蒜鷄卷中第六

延年紫莞飲主欬方 紫莞

半兩月母二兩人參一橘皮半兩生薑兩

杏仁一兩半去皮兩仁者研

右六味切以水二升五合煮取八合分三服欲再服亦得直鹹醋蒜鷄蔣孝璋處出第五卷中

必效療欬方 藝頭

一百二十粒一百二十顆去核

桃仁一百二十顆去皮尖兩仁者熬令黃色

右三味合擣為丸如棗大含之無不差

又方 雞子白皮

十四枚去節熬令黃麻黃二兩

右二味擣成散每服方寸匕日二食後飲下之無所忌

又方

麻黃去節紫莞兩

二月母三兩去心

右三味擣篩蜜和丸如杏核綿裹含稍稍嚥汁盡更作日四五度

又方

杏仁一百二十枚去皮尖熬

豉一百枚去皮尖熬令乾

乾棗四十枚去核

右三味合擣如泥丸如杏核含嚥令盡日七八度盡

更作出卷中第一

古今錄

驗百部湯瘡疾晝夜不得眠兩眼突出

方百部兩生薑半細辛

目母各三甘草二兩去節

杏仁四兩

去皮尖

兩仁者紫莞三兩

桂心

白朮各二

麻黃六兩去節

五味子二兩

右十一味切以水一斗二升煮取三升分三

服忌桃李雀肉海藻松菜生菜

子金無杏仁紫莞餘同

又療

欬喻散方細辛

紫莞

天雄炮

石膏

款冬花

鍾乳各二

右六味

擣篩作散如大豆七聚以小竹筒喻服日二不得食生魚醬醋生菜但食糜七日欬愈乃止若大豆聚不知亦小益勿大多甚良忌生菜冷水猪肉千金同金

又療

欬麻黃五味子湯方

麻黃四兩去節

五味子合甘草半兩去節

半夏洗各二兩

乾薑合細辛

二兩桂心

杏仁

三兩去皮尖

仁右八味切以水一斗者取四升去滓溫分五服日三夜二忌海藻松菜羊肉鴨生菜生葱

又療

欬羊肺湯太醫史脫方

款冬花

紫莞

乾薑

細辛各一桂心

甘草

半兩去節

五味子

斤白前

食茱萸

各半兩

羊肺

一切

右十味切以水八升合煮取三升去滓一服三合日二禁食鹽蒜生菜海藻

菘菜生葱

並出卷中第十

積年久欬方二十一首

病源肺感於寒微者則成欬嗽久欬嗽是連滯歲月經久不差者也凡五藏皆有欬嗽不已則各傳其腑諸久欬不已三集受之其狀欬而腹滿不欲飲食此皆寒氣聚於胃而鬱於肺使人多涕唾而變面浮腫氣逆故也

出卷中第十

深師療五藏欬積年劇則上氣不得卧喉中如有物醫所不療五愈丸方

桂心

細辛

乾薑

白前

甘草

吳茱萸各半兩

蜀椒汗

代赭

通草

款冬花

芫花

一分伏龍肝

紫莞

牡蠣各二

右十三味擣篩

外臺祕要

卷九

積年久效方二十一首

以飴糖和之擣令調和如棗核一丸含之稍稍嚥其汁盡復含令胸中熱為候不知以意加之其久病重者晝夜二十餘丸若一歲效者一月愈十歲效者百日愈忘海藻松菜生葱生菜等又療三十年欬芫花煎方 芫花兩乾薑三兩右二味以水五升煮芫花取三升去滓內薑末加蜜一升合煎之如糜一服如半棗日三不知加之一方不用乾薑取芫花汁蜜和煎令可丸服如梧子三丸

日三

又療三十年欬氣奔上欲死醫所不療海藻丸諸仲堪方 海藻分麥門冬五分去心分昆布 乾薑 細辛 文蛤 桂心 蜀椒汗各二分右八味擣篩蜜和服如杏仁許夜卧一丸著舌上稍稍嚥汁盡更著一丸忘生葱生菜等

又療三十年欬嗽上氣短氣久冷五藏客熱四肢煩疼食飽則劇時有發甚不能行步夜不得卧多夢香豉丸 香豉熟四分杏仁皮二分去尖紫菀 方字下疑脫字 分甘草八分乾薑分細辛三分吳茱萸二分右八味擣篩蜜和服如梧子四丸日三不知增之能含嚥汁亦佳忘海藻松菜生葱生菜

又療三十年上氣欬嗽款冬花丸方 款冬花六分桂心四分紫菀六分杏仁四分去尖附子二兩藜蘆分乾薑

六分甘草七分細辛六分防風分芫花六分蜀椒汗野葛四分去心右十三味擣篩蜜和丸如梧子服三丸

稍加日三服忘生葱生鹹醋豬肉冷水海藻松菜生菜狸肉等一方十四味此方忌酢恐有痰等  
又療三十年欬逆上氣咽喉如水難鳴或唾膿血師藥不能療者方 香豉熟三升蜀椒汗升乾薑斤猪肪  
斤三斤右三味擣篩內肠中以水五升合豉等物熟煎每以二合服之大效

又療三十年欬嗽七星散方 蜀椒汗 桑根白皮 芫花根皮 款冬花 紫菀 代赭 細辛 伏龍肝各一 龍肝各一右八味擣為散取作七星聚散如糓豆大以竹筒口當藥上一一噙嚥之令藥入腹中先食訖即服藥日三服後三日不差復作七聚以一鬱肉炙令熟以轉展藥聚上令藥患在炙肉中仰卧咬咀炙肉汁令藥力散散皆毒蠶咽中藥力盡吞肉前後所療皆不至食肉便愈若不愈復作如初法本有藥字

尚德按辨  
疑當作辨

必愈乃止。羊牛鹿肉皆可用勿用猪肉。忌生菜。

子金延年不用鐵與芫花根餘同並出第十八卷中

千金療三十年欬嗽方 蜜斤生薑二斤取汁

右

二味光秤銅鉗知斤兩訖內蜜復秤知斤兩次內蜜汁以

微火煎令蜜汁盡惟有蜜斤兩在止且服如棗大含一丸日三禁一切雜食

又療三十年欬方 紫莞兩款冬花兩

右二味為散先飲食服一錢七日三七日愈

張文仲古今錄驗深師同

又療三十年欬方 百部根斤

右一味擣取汁煎之如飴以溫粥飲服方寸匕日三服

深師方白蜜二升更煎五六沸服三合有驗

又療久欬不差方 危矢九枚胡桐律分研砂分

右三味擣篩蜜和為丸服如梧子三丸令吐冷物盡

則差並出第十八卷中

延年療久欬不差方 猪腎一具去脂膜一椒二十八顆

右二味取腎一顆上作十四孔取椒內孔中兩腎搗

著二十八顆了以水緩煮令熟割破細切嗽之令盡有驗

張文仲處出第五卷中

崔氏療積年欬喉中啞聲方 芫花根白皮六分切熬

貝母十二分款冬花分百部根八分

杏仁十分去壳

英四分去皮子炙五味子六枚蛇床半枚桑白皮六分麻黃節紫莞各八

右十一味擣篩蜜和為丸如梧子大一

服五丸日再服加至十五丸煮棗汁送之

出第六卷中

必效療欬嗽積年不差者胸膈乾痛不利方 紫莞兩

大杏仁四十九枚去皮熱酥

蜜大合

右四味紫莞

及杏仁各別擣先煮酥蜜攬令和內紫莞杏仁研破塊煎十餘沸藥出瓷器中每日空腹服一彈丸

細細含嚥之忌酒麪及豬肉等凌空道士得此方傳效不復可言

又方 蔓荳二分以水淘去浮者水煮

令芽出培乾炒令黃黑色研子許大棗一枚

右三味鑊中煎令酥盡取棗去皮食之日二

又方 生薑五兩鷄半升大

右二味取薑刮去皮如算子切之置鷄中微火煎薑使熟食使盡則差段侍御

用之極效

又方 款冬花 右一味和蜜火燒含取煙喚之三數度則差

久欬坐卧不得方二首

效最短氣分七首

又方 取葛石子三指撮吞唾嚥之日五六度光祿李丞自服之極神效

並出第  
一卷中

古今錄驗療人三十年寒冷欬逆上氣麻黃湯方 麻黃八分去節蜀椒四分細辛分量本分杏仁五十枚去皮尖兩仁各一兩

碎者右五味切以水七升煮取三升分為三服日三忌生菜

又許明療人久欬欲死方 取厚榆皮削如指大去黑刺令如鋸長尺餘內喉中頻出入當吐膿血則愈

又香豉丸療上氣三十年欬氣久寒冷脾胃中客熱變為冷方 食茱萸 甘草各一香豉二十細辛

杏仁去尖皮兩仁碎各一兩紫菀兩根者熟各一兩右六味擣篩為末別擣杏仁如膏乃內末攪令勻蜜和丸如梧子服三丸

日三不知增之至五丸暮卧時含十九著咽喉中噉之忌海藻菘菜生菜出第十一卷中

久欬坐卧不得方二首

集驗療久患氣嗽發時奔喘坐卧不得并喉裏呀聲氣欲絕方 麻黃去尖皮兩仁者碎杏仁去尖皮兩紫菀各三兩柴胡

橘皮各四兩右五味切以水六升煮取二升半去滓分三服一劑不差頻兩三劑從來用甚驗張文仲同出第十一卷中

四卷中

備急療久欬奔喘坐卧不得并喉裏呀聲氣絕方 麻黃去尖皮兩仁者碎乾蘇葉 橘皮各三兩柴胡

杏仁去尖皮兩紫菀各三兩柴胡 杏仁去尖皮兩仁者碎各一兩橘皮各四兩

四卷中

欬嗽短氣方七首

病源肺主於氣候於皮毛氣虛為微寒客於皮毛傷於肺氣不足則成欬嗽夫氣得溫則宣和得寒則瘡

澀虛則氣不足而為寒所迫併聚於肺間不得宣發故令欬而短氣也

出第十一卷中

深師療傷中欬嗽短氣腸中痛流飲厥逆宿食不消化寒熱邪癖五內不調肉蓯蓉湯方 肉蓯蓉五分兩

地黃四大棗二十枚烏頭一兩甘草炙桂心紫菀五分兩五味子各二兩生薑裹碎石膏碎綿麥門冬去心三兩

右十一味切以水一斗五升煮取七升去滓分為七服日四夜三一方用大棗五十枚水一斗二升煮取九升忌海藻生葱菘菜蕪荑猪肉冷水

尚德按不  
利干金作  
下利

又療上氣咽喉塞短氣不得卧倚壁而息腰背苦痛支脢滿不能食面色痿黃目母飲方 目母 石膏  
綿裹碎桂心 麻黃去節甘草炙各三十枚去尖生薑五兩半夏右八味切以水一斗煮取三升去滓分三服忌海藻松菜羊肉生葱鷄等

又療欬而不利胸中痞而短氣心中時憊四肢不欲動手足煩不欲食肩背痛時惡寒海藻湯方 海藻  
四兩淡芩六兩半夏洗五味子各五兩細辛二兩杏仁五十枚去皮兩仁者右六味切以水一斗煮取三升忌

羊肉鷄生葱醋物

金同出第十八卷中

古今錄驗五味子湯療逆氣欬嗽胸膈中寒熱短氣不足方

五味子一兩前胡三兩紫菀甘草炙桂心

生薑各二兩細辛一兩山茱萸三兩

右八味切以水一斗煮取七升絞去滓服一升日三夜三忌生葱海藻

松菜廣濟方用橘皮不用茱萸

又胡椒理中丸療欬嗽逆氣不能飲食短氣方 胡椒 菖蒲 乾薑 款冬花 甘草炙橘皮 高良

薑細辛各四兩白朮五兩

右九味擣篩蜜和丸如梧子一服五丸日再忌桃李雀肉生菜海藻松菜

又瀉肺湯療欬逆短氣方 人參

生薑四分半夏五分甘草四分橘皮二分竹葉二分

右六味切以水六升煮取二升分三服此方亦療霍亂忌羊肉鷄海藻松菜

又療欬嗽及短氣脢痛薑椒湯方 生薑 椒去目汗 右二味切以水五升煮取三升每服一合並出第十九卷中

九種欬嗽方一首

千金九種氣欬嗽欲死百病方 乾薑

二半夏洗細辛

紫菀 吳茱萸 芫花 淡芩

甘草

炙人參

烏頭炮大黃

蕷藴子

巴豆去皮心熟

厚朴

炙

杏仁

去皮尖兩仁者熟各一分

五味子

遠志

去核

枳實

炙皂角子去皮當歸

桂心 前胡 菖蒲 大戟

蜀椒炙半分

白薇三分

右二十八味擣合蜜丸先食

服如梧子二丸日三以知為度不知增之忌海藻松菜羊肉鷄生葱酢物野豬肉蘆筍

一方無巴豆有餘杏仁以

金華廢二分巴豆厚朴各三分

尚德按千金草廢二分巴豆厚朴各三分

出第十一  
八卷中

十四味  
各五分  
尚德按今  
有方六首

欬逆及厥逆飲歌方七首

病源欬逆者是欬嗽而氣逆上也氣為陽流行肺藏宣發腠理而氣肺之所主也欬病由肺虛感微寒所成寒搏於氣氣不得宣胃逆聚還肺肺則脹滿氣逆不下故為欬逆其狀欬而胸滿氣逆轉背痛汗出尻陰股膝踹筋足皆痛也其湯尉鍼石別有正方補養宣導今附于後養生方導引法云先以鼻內氣乃閉口欬還復以鼻內氣欬則愈向晨去枕正偃卧伸臂脰瞑目閉口無息極脹腹兩足再息噴間吸腹仰兩足倍拳欲自微息定復為之春三夏五秋七冬九湯除五藏津潤六腑又云還向反望側望不息七通療欬逆胸中病寒熱出第十四卷中

深師療欬嗽短氣不得息發熱胸苦滿不得飲食五味子湯方 五味子配桂心 甘草炙細辛兩一乾

薑三兩紫菀二兩一  
大棗二十  
麻黃二兩

右八味切以水八升煮取三升分三服無乾薑生薑亦得忘

海藻松菜生菜生葱

出第十一  
八卷中

千金竹皮湯主欬逆下血不息方 生竹皮二兩紫菀二兩飴糖斤生地黃半斤右四味切以水六升煮取

三升分三服忌藍美

深師同

又療大逆上氣喉咽不利止逆下氣麥門冬湯主之方 麥門冬二升去心半夏一升人參 甘草炙各梗米

合一大棗十四  
右六味切以水一斗二升煮取六升服半升日三夜一忌羊肉餚海藻松菜

此本仲景  
並出第十一  
八卷中

常有核遊腫大便不利遊氣湯方 厚朴四兩人參 甘草炙牡蠣熬各梗米

金大棗十二枚干

十枚

古今錄驗療厥逆藏氣有餘寒氣虛勞憂氣驚氣其人善憚胸中或寒上下無常多悲傷流四肢臍四臺

常有核遊腫大便不利遊氣湯方 厚朴四兩人參 甘草炙牡蠣熬各梗米

并出第十一  
八卷中

收生薑八兩黃芩三  
右十味切以水九升煮取三升半去滓分服七合日三夜再服若腹痛去黃芩加

芍藥三兩良驗忌海藻松菜生葱羊肉餚醋物等

尚德按千  
金斤作升  
汁作切

尚德按要  
略麥門冬  
七升大棗  
十二枚干  
金大棗二

又療欬逆上氣丸方

乾薑四桂心

附子四枚

炮

五味子二

巴豆

六十枚老者三十枚

去皮心熬

右六味

先擣上五味下篩別擣巴豆如膏內藥末以蜜和丸如麻子以一丸着牙上咬咀常暮卧時服亦可日

三服忌生葱豬肉蘆筍

又小胡椒丸療寒冷欬逆胸中有冷咽中如有物狀吐之不出方

胡椒五乾薑六款冬花三

右三味

擣篩蜜和丸如梧子大米飲服三丸日再服以知為度禁如前法

並出第十卷中

十欬方六首

尚德按六  
疑當作七

千金問曰欬病有十何謂也師曰有風欬有寒欬有支欬有肝欬有心欬有脾欬有肺欬有腎欬有膽欬

有厥陰欬問曰十欬之證何以為異師曰欲語因欬言不得終謂之風欬飲冷食寒因之而欬謂之寒欬

心下堅滿欬則支痛其脈反進謂之支欬欬引脇下痛謂之肝欬欬而唾血引手少陰謂之心欬欬而涎

出續續不止下引少腹謂之脾欬欬引頸項而唾涎沫謂之肺欬欬則耳無所聞引腰并臍中謂之腎欬

欬而引頭痛口苦謂之膽欬欬而引舌本謂之厥陰欬夫風欬者下之寒欬支欬肝欬灸足太衝心欬灸

刺手神門脾欬灸足太白肺欬灸手太泉腎欬灸足太谿腎欬灸足太陽陵泉厥陰欬灸手太陵留欬欬者

其人欬不得卧引項上痛欬者時如小兒瘧癓狀夫久欬為水欬而時發熱脈在九絡一云卒者非虛也此

為胸中寒實所致也當吐之欬家其脈弦欲行吐藥當相人強弱無熱乃可吐耳通接太泉

又欬家其人脈弦為有水可與十棗湯下之不能卧坐者陰不受邪故也

尚德按千  
金下字上有不字無  
字下五矣  
字並作刺  
字水作寐  
寐式類切  
音脫腫病

又夫有支欬家欬煩胸中痛者不卒死至一百日一歲與十棗湯方

芫花

甘遂

大戟

並熬

右三等分

味擣下篩以水一升五合煮大棗十枚取八合絞去滓內藥末強人取重一錢羸人半錢七頓服之平旦服而不下者明日更益藥半錢下後自補養古今錄驗同此方

又欬而引脇下痛者亦十棗湯主之用前

又夫酒客欬者必致吐血此坐久極飲過度所致也其脈沈者不可發汗久欬數歲其脈弱者可療實大

數者死其脈虛者必苦冒也其人本有支飲在胸中故也治屬飲家上氣汗出而欬屬飲家欬而小便利若失溺不可發汗發汗出則厥逆冷

又欬逆倚息不得卧小青龍湯主之

麻黃附芍藥

細辛

桂心

乾薑

甘草

半夏

二兩

五味子

半夏

半夏

半夏

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

半升要略  
尚德按一升干金作半升要略同

若面熱如醉狀者此為胃中熱上衝熏其面令熱加大黃利之方 細辛 甘草炙乾薑各三錢芩四五味子 半夏洗杏仁去皮尖各半升 大黃三兩 右八味切以水一斗煮取三升去滓溫服一升日三服忌海藻菘菜生菜餚醋羊肉並出第十

藻菘菜生菜餚醋羊肉八卷中

久欬嗽上氣唾膿血及濁涎方五首

卷十四  
中

深師療肺氣不足欬逆唾膿血咽喉悶塞胸滿上氣不能飲食卧則短氣補肺湯方 款冬花兩桂心  
鍾乳 乾薑 白石英各二錢 冬去心各四兩 五味子三錢米合桑白皮根斤大棗一枚  
一斗二升先煮桑白皮奏令熟去滓內藥煮取二升二合分三服忌生葱等千金

又療欬逆上氣時時噦濁但坐不得卧皂莢丸方 長大皂莢一挺去子炙 右一味擣篩蜜和服如梧子一  
丸日三夜一以大棗膏和湯下之千金經心錄延年同此本仲景傷寒論方一名棗膏丸

又療欬逆上氣吐膿或吐血胸滿痛不能食補肺湯方 黃耆五兩桂心 乾地黃 淡芩 厚朴 乾  
薑 紫菀 橘皮 當歸 五味子 遠志去心各三兩 甘草炙 鍾乳 白石英各二錢桑白皮根  
人參各三錢大棗二十枚 右十八味切以水一斗四升煮取四升分溫四服日三夜一忌海藻菘菜生葱

醋物千金并出

第十八卷中

桑白皮根  
宋本作桑  
白皮

七宋本作  
七

尚德按桑白皮根疑當作桑根

第十九卷中

必效療上氣唾膿血方 焉兩乳下黑白際各一百壯良千金同

欬嗽膿血方一十一首

卜家必文

卷九

久欬嗽上氣唾膿血及濁涎方五首

九

尚德按陰  
病源作陽  
宋本同

放收腺血方(十一首)

病源欬嗽膿血者損肺傷心故也肺主氣心主血肺感於寒微者則成欬嗽傷於陰脈則有血血與氣相隨而行欬嗽極其傷血動氣俱乘於肺以津液相搏蘊結成膿故欬嗽而有膿血也

出第十  
四卷中

廣濟療癥瘕吐膿損肺方 人參二升瓜蒂三升杜衡五升 右三味擣篩為散平旦空腹以熱湯服方寸匕當

吐痰水惡汁一二升吐已復煮白粥食淡水未盡停三日更進一服忌生冷油膩猪魚

用杜衡三分人  
錄驗

參一分服一錢  
七出第二卷中

深師療欬逆唾膿血雞子湯方 雞子一枚甘草二分甘遂分大黃 黃芩各二 右五味切以水六升煮

取二升去滓內雞子攪令調盡飲之良忌海藻菘菜

又療傷肺唾血方 茅根右一味擣篩為散服方寸匕日三亦可絞取汁飲之主熱渴

出第四  
卷中

刪繁療肺偏損胸中應肺偏痛唾血氣欬嗽冬花散方 欽冬花 當歸各六桂心 芎芢 五味子

附子炮各細辛 月母各四乾薑 乾地黃各八白朮 甘草炙杏仁各五分紫菀三升

出第五  
卷中

篩為散清酒服方寸匕日二服忌生葱生菜桃李雀肉海藻菘菜豬肉蒸羨

出第五  
卷中

千金百部丸主諸欬不得氣息唾膿血方 百部根兩升麻半兩桂心 五味子 甘草炙紫菀 乾薑各

兩 右七味擣篩蜜和丸如梧子服三丸日三以知為度忌生葱海藻菘菜等物

又療肺傷欬唾膿血腸澀背氣不飲食惡風目闇瞓瞓足膝脰寒湯方 乾地黃切半桑白皮切二芎芢

升切一白膠五兩桂心二人參 紫菀各二大棗枚擘生薑五分白糖 大麻仁各一 大麥升 右十二味切

以水一斗五升煮麥瀝取一斗去滓內藥煎取三升分三服忌生葱

又療肺病欬嗽膿血及唾涕血出不止方 好酥五十克 右三遍鍊停凝當出釀糊服一合日三以差止

又方 三遍鍊酥如雞子黃適寒溫灌鼻中日二夜一

又療欬嗽喘息喉中如有物唾血方 杏仁皮兩仁者猪脂二糖一升蜜一升右五味先以猪膏

煎杏仁黃黑出以紙拭令淨擣如膏合煎五物令可丸服如杏核日夜六七漸加之

並出第十一  
八卷中

古今錄驗瀉肺湯療肺中膿放唾血氣急不安卧方 芒硝 麻黃 酸細辛 椒口汗 去目閉 當歸各一 右

五味切以水七升煮取三升分為三服日三微汗或吐膿血忌生菜

一方有生薑一兩

當歸各一

又羊肺湯療放畫夜無聞息氣欲絕肺傷唾血方 鍾乳五兩牡蠣熬桂心六兩射干

桃仁去尖皮一兩

橘皮百部根五味子各三生薑六兩白石英半夏五兩款冬花甘草炙厚朴炙各羊肺具一右十

六味切先以水二斗三升煮羊肺取一斗去肺內諸藥煮取三升分四服日三夜一忌海藻菘菜羊肉

鴟生葱

出第十九卷中

久欬嗽膿血方四首

病源久欬嗽膿血者肺感於寒微則成欬嗽放嗽極甚傷於經絡血液蘊結故有膿血氣血俱傷故連滯積久其血黯瘀與膿相雜而出也

出第十九卷中

廣濟療積年欬嗽膿血方

葛根二升大棗一百顆

青州者

右二味以水三大升取馬糞燒大煎熟之候令汁盡

取棗早晨服一枚日中一枚日暮一枚不覺漸加口乾胸熱則以為度不利忌並如前法

又療欬經年不差氣喘欲絕傷肺見血方

桑白皮切五

白羊肺一具芍藥分款冬花分茯苓分貝母

十二麥門冬杏仁去皮熬為

升麻分二

生地黃汁一升芩分二蜜升一

右十二味切以水一斗煮

取三升去滓內杏仁脂地黃汁蜜等微火上前如魚眼沸攪勿停手取二升二合煎成淨綿夾布瀝每

食後含一合日夜三四度老小以意減之佳忌生冷油醋麪魚蒜薑羨

並出第二卷中

深師療欬逆氣喘不息不得眠唾血嘔血短氣連年欬冬花丸方

款冬花十八

紫菀分十二

杏仁八分去皮兩

仁者香豉熬十分人參分甘草炙蜀椒汗各三分

天門冬六分

去心乾薑

桂心乾地黃各三右十一味擣篩

蜜和如彈丸含稍稍嚥汁日四夜再神良忌海藻菘菜生葱蕪荑鯉魚

出第十九卷中

近效療久欬兼喫血方 白前三兩桑白皮桔梗各二

甘草一兩

右四味切以水二大升煮取半大升

空腹頓服若重者十數劑忌豬肉海藻菘菜

李子

剝方

外言必要

卷九

久欬嗽膿血方四首 欽收唾粘方二首

欬嗽唾粘方二首

廣濟瘡肺熱欬嗽涕唾多粘甘草飲子方

甘草六分 款冬花少分 豉心一升 麥門冬去心三分 葱白一握 檳榔十

碎合子 桔梗六分 地黃汁半升

右八味切以水六升煮取二升絞去滓下地黃汁分溫三服如人行四五里

進一服

不利忌生菜麪火肉海藻菘菜魚蒜粘食猪肉蕪羨

出第五卷中

延年紫蘇飲

療欬嗽短氣唾涕稠喘乏風虛損煩發無時者宜服此方

紫蘇一兩 目母各二紫莞一升 麥門

冬去心各

五分 藜蕷子熟令黃甘草火各一兩

右七味切以水六升煮取二升分為四服每服如人行

七里禁

猪魚肉蒜海藻菘菜

出第五卷中

許仁則療欬嗽方一十二首

許仁則論欬嗽病有數種有熱嗽有冷嗽有肺氣嗽有飲氣嗽

熱者年少力壯體氣充滿將息傷熱積

嗽此亦但將息以溫兼進溫藥則當平復肺氣嗽者不限老少宿多上熱後因飲食將息傷熱則常嗽不

斷積年累歲肺氣衰便成氣嗽此嗽不早療遂成肺痿若此將成多不救矣飲氣嗽者由所飲之物停滯

在胸水氣上衝衝入於肺肺得此氣便成嗽久而不除漸成水氣若作此病亦難療之熱嗽之狀更無其

餘但遇於熱便發此者宜合生地黃等七味湯服之方 生地黃

一升

生薑二合 桑白皮根升

升乾葛切六分 紫蘇合竹瀝升

右藥細切七味以水一斗煮取三升去滓內竹瀝攪調每食後良久則

服之

分一劑作四服若覺可則重合服之病輕者三數劑則差忌蕪羨

又依前生地黃等七味飲雖得暫差於後還發宜合紫莞等十味丸方

紫莞少分桑白皮六合射干四百部

根五分 麻黃二兩 去節乾葛五分 地骨皮

升麻各四兩 乾地黃芒硝各六

右藥擣篩蜜和丸如梧子以竹瀝

下之初服十五丸日再服稍稍加至三十九忌蕪羨

又冷嗽之狀但遇諸令此疾便發有如此者宜合大棗等七味湯主之方

大乾棗三十枚桂心四兩杏仁一

人宋本作  
义  
尚德接桑白皮  
白皮根疑當作桑根

枚去尖皮  
兩仁研 細辛五兩 吳茱萸 當歸各三

右藥切以水八升煮取二升六合去滓溫分三服每服如人

行十里久服一劑覺得力至三四劑亦住隔三四日服一劑此湯元久一味忌生葱生菜

又依前大乾棗湯服之雖可未能斷其根遇冷便發宜合當歸等十味丸服之方

當歸切

細辛 甘草

炙各五兩 桂心 吳茱萸 人參各三 蜀椒三合 橘皮 乾薑各四 桑白皮八兩 右藥擣篩蜜和丸煮乾棗

飲下之初服十九日再服稍加至三十九如梧子服此丸經三五日覺熱每服藥後良久喫三數口粥

食壓之忌海藻菘菜生葱生菜

又肺氣嗽經久將成肺癱者其狀與前肺痿不無異但唾悉成膿出無多少有此病者於白前湯中加半夏五兩黃耆三兩以水一斗煮取二升八合於麻黃丸中加黃耆五兩苦參六兩芍藥三兩於桑白皮煎前等七味湯服之兼有麻黃等十味丸桑白皮等十味煎

又肺氣嗽經久有成肺癱者其狀與前肺痿不無異但唾悉成膿出無多少有此病者於白前湯中加半夏五兩黃耆三兩以水一斗煮取二升八合於麻黃丸中加黃耆五兩苦參六兩芍藥三兩於桑白皮煎中加黃耆切三升共桑白皮地骨皮同前又加水三升同前忌羊肉鷄

白前湯方 白前 桑白皮各三 生地黃升 大棗五枚 地骨皮四兩 麻黃二兩 生薑六兩

右藥切

以水八升煮

取二升六合去滓加竹瀝五合分溫四服食後服之晝三夜一覺得力重合服五六劑住隔三日服一

劑忌醋蕪荑

又依前白前等七味湯雖服覺可根本未除宜合麻黃等十味丸服之方

麻黃去白前各二桑白皮六兩

射干去白微三百部根五兩 乾地黃六兩 地骨皮五兩 橘皮三兩

右藥擣篩蜜和丸煮桑白皮飲下之初服十

九日再服稍稍加至十五丸如梧子大本久一味忌蕪荑

又凡病在胸膈上者宜飽滿而在夜肺既居上此是病在上已晝服丸夜無憑靠宜合桑白皮汁等十味煎每夜含咽之方

桑白皮切一升 地骨皮切三升 二味用水七升煎取三升汁去滓澄清 生地黃汁

十五生麥門冬十二升 生薑十一升 竹懸 生葛根汁各三升 白蜜一升 牛酥三升 合大棗膏一升 右八味先於微火上  
取生地黃汁以下生葛汁以上和煎減半則內桑白皮等二物汁和煎之三分減一則內酥蜜棗膏燒  
之勿停手得如稠飴狀煎成訖置利器中服之每夜欲卧時取一胡桃大含之細細嚥汁稍加至雞子  
大欲盡日間丸服亦得忌蕪羨

又飲氣嗽經久不已漸成水病其狀亦不限四時晝夜嗽不斷遇諸動嗽物便致因劇甚者乃至雙眼突  
出氣即欲斷汗出大小便不利吐痰飲涎湧沫無復窮限氣上喘急肩息每旦眼腫不得平眠有如此者  
宜合細辛等八味湯草藥子十五味丸服之方細辛 半夏洗桂心 桑白皮各五兩 乾薑當歸各四兩  
芒硝六兩杏仁六合去尖兩仁者研 右藥切以水九升煮取三升去滓內芒硝分溫三服每服如人行十里久當  
得快利後好將息經三四日合丸服之忌生葱生菜羊肉餚

丸方 草藥子熬六合 細辛 五味子各五兩 乾薑當歸兩 桂心 人參 丁香 大黃 商陸根各三兩  
橘皮四兩 桑白皮六兩 皂莢肉二兩 大腹檳榔二十個 麻黃去節二兩 右藥擣歸蜜和丸煮桑白皮飲下初服十  
丸日再服稍加至十五丸如梧子大若利則減祕則加大便通滑為度時時得鴨溏亦佳忌生葱生

菜

又依前細辛等八味湯草藥子等十五味丸不覺可漸成水病餘一如前況更加大小便祕澀頭面身體  
浮腫宜合大棗三味丸服之方 大棗六十枚去核 草藥子熬杏仁去皮去核各一升 右藥合擣令如膏可作  
丸如硬燥不相著細細下蜜作丸依前以桑白皮飲下之初服七八丸日再服稍稍加之以大便通為  
度病重者時令鴨溏佳亦有以前三味煮湯服之

又依前大棗等三味丸服雖覺氣數歇然病根深固藥力微弱且停服大棗凡合巴豆丸五味細細服之  
瀉滌宿病方 巴豆仁二十枚去心皮 杏仁一百顆去尖兩仁者熬 草藥子五合熬去核 草藥子六十枚去核 右藥合擣一  
如前大棗丸法還以桑白皮飲下之服三四丸日再服如利即減祕即加常以大便調為候病甚時

取鴨鷄亦佳忌蘆筍野猪肉

吳昇同出下卷中

雜療欬嗽方三首

古今錄驗五藏六腑皆令人欬肺居外而逆上合於皮毛皮毛喜受邪故肺獨易為嗽也邪客於肺則寒熱上氣喘汗出欬動肩背嗟鳴甚者唾血肺欬經久不已傳入大腸其狀欬則遺糞腎欬者其狀引腰背痛甚則欬延腎欬經久不已傳入膀胱其狀欬則遺尿肝欬者其狀左脇痛甚者不得轉側肝欬經久不已傳入膽其狀欬則清苦汁出心欬者其狀引心痛喉中介介如鍾狀甚者喉痺咽腫心欬經久不已傳入小腸其狀欬則夫氣脾欬者其狀右脇痛陰陰則引肩背甚者不得動動便欬劇脾欬經久不已則傳入胃其狀欬即嘔甚則長蟲出久欬不已則三焦受之三焦欬之狀欬而腹滿不能食飲此皆聚於胃鬱於肺使人多涕唾而面浮腫氣逆也又非時有風寒令人觸冒解脫傷皮毛間入腑臟為欬上氣如此也又非時忽然暴寒傷皮膚中與肺合則欬嗽上氣或胸脇又痛欬唾有血者是其熱得非時之寒暴薄之不得漸散伏結深喜肺癰也因欬服溫藥欬尤劇及壯熱吐濃血汗出惡寒是也天有非時寒者急看四時方也

時方也

又療欬嗽上氣時時嘔白唾沫數十歲者方 吳茱萸 五味子 大黃 桂心 甘草

炙細辛 人參

紫菀

款冬花各一兩

大戟 竹茹各三

深師同並出第十九卷中

右十一味切以水一斗煮取三升分為三服亦療陰冷欬至

良忘海藻菘菜生菜生葱

深師同並出第十九卷中

深師療諸欬心中逆氣氣欲絕杏仁煎方 杏仁

四兩去皮末猪膏二斤

白蜜半升

生薑汁半升

右四味著銅器中

於微火上先煎薑汁次內蜜膏令如餳置器著地乃內杏仁末復令得一沸煎成服如棗大一丸含之

日三不知稍稍增之

又療氣上迫滿或氣不通煩悶喘嘔蘇子湯方 蘇子半升乾薑半升夏桂心

四兩去皮末

桂心

人參各一兩

橘皮

茯苓

各三兩 甘草一兩

右八味切以水八升煮取二升半分為三服若虛熱去乾薑用生薑六兩加黃芩

二兩忘海藻松菜羊肉鴨生葱酢等物並出第十  
八卷中

外臺祕要卷九終

唐王燾先生外臺祕要方卷十目錄

肺痿肺氣上門  
欬嗽二十八門

肺痿方一十首

尚德按今  
有方八首

肺熱兼欬方七首

肺氣不足口如含霜雪方四首

肺氣積聚方二首

大腸論二首

大腸虛寒方三首

大腸論二首

大腸虛寒方三首

大腸虛寒方三首

上氣方九首

上氣欬身面腫滿方四首

因飲水上氣方四首

上氣及氣逆急牽繩不得卧方八首

欬逆上氣嘔吐方四首

上氣欬方一首

欬逆上氣方五首

尚德按今  
有方二首

尚德按今  
有方二首

肺氣客熱方二首

肺虛寒方三首

肺脹上氣方四首

肺虛方二首

大腸熱實方三首

皮虛實方二首

卒上氣方六首

上氣胸滿方二首

上氣喉中水難鳴方一十二首


卒短氣方四首

欬嗽上氣方八首

上氣欬嗽多唾方三首

久欬嗽上氣方三首

雜療上氣欬嗽方四首



唐王燾先生外臺祕要方卷十

宋朝散大夫守光祿卿直祕閣判登聞簡院上護軍臣林億等上進  
新安後學程行道敬通父訂梓男龍錫為光父全校

肺痿方一十首

千金論曰寸口脈數其人病欬口中反有濁唾涎沫出何也師曰此為肺痿之病肺痿之病何從得之師曰病熱在上焦因欬為肺痿或從汗出或從嘔吐或從消渴小便利數或從便難被駁藥下利重亡津液故得肺痿又寸口脈不出而反發汗陽脈早寒陰脈不澀三焦踟躕入而不出身體反冷其內反煩多唾唇燥小便反難此為肺痿傷於津液便如爛瓜亦如豚脰但坐發汗故也其病欬欬不得欬欬則出乾沫久久小便不利甚則脈浮弱肺痿吐涎沫而不欬者其人不渴必遺溺小便數所以然者上虛不能制下故也此為肺中冷必眩師曰肺痿欬唾咽燥欲飲水者自愈自張口者短氣也出第十七卷中

仲景傷寒論療肺痿吐涎沫不欬者其人不渴必遺溺小便數所以然者以上虛不能制下故也此為肺冷必眩甘草乾薑湯主之以溫其臟方

甘草四兩乾薑二兩

右二味切以水三升煮取一升半分溫二

服服湯已小溫覆之若渴者屬消渴忌海藻菘菜

又療肺痿涎唾多心中溫溫液液者灸甘草湯方

甘草四兩生薑三兩

去皮人參二地黃一阿膠三兩

大麻

汁取酒各一飴糖斤紫菀末四

滓內膠上微火烊銷溫服七合日三夜一八卷中並出第

肘後療肺痿欬嗽吐涎沫心中溫溫咽燥而渴者方

一云不渴

生天門冬

橘汁取酒各

一飴糖斤紫菀末四

右四味合銅器中於湯上煎可丸服如杏仁一丸日三忌鯉魚

范汪經心錄同出第一卷中

集驗療肺痿欬嗽吐涎沫不止咽燥而渴方

一云不渴

生薑五兩人參三兩甘草二兩

大棗十二枚擘

右四味切以水

肺氣客熱方二首

五升煮取一升半分再服忌海藻菘菜

仲景傷寒論備急范注千金經心錄同

又療肺痿欬嗽涎沫心中溫溫咽燥而渴方不渴

一云生薑五兩甘草二兩

大棗十二枚

右三味切以水五升

煮取一升半分再服一方乾薑三兩生薑忌海藻菘菜

文仲千金古今錄驗同

深

又療肺痿時時寒熱兩頰赤氣急方童子小便每日晚取之去初末少許小便可有五合取上好甘草

量病人中指節男左女右長短截之炙令熟破作四片內小便中置於閑淨處露一宿器上橫一小刀

明日平旦去甘草頓服之每日一劑其童子勿令喫五辛海藻菘菜

並出第

四卷中

刪繁療虛寒喘鳴多飲逆氣嘔吐半夏肺痿湯方半夏湯洗母薑一升橘皮一斤白朮八桂心四兩

升并出第

五卷中

切以水九升煮取三升去滓分溫三服忌羊肉鷄桃李雀肉生葱皮切一方有桑白

又療凡虛寒肺痿喘氣乾地黃煎方乾地黃五兩桑根白皮切二升葛根五兩桂心

人參各三

大麻仁炒一升

右六味切以水九升先煮五味取三升去滓內大麻仁煎數沸分三服忌生葱薑夷

並出第

二卷中

千金療肺痿涎唾多出心中溫溫液液甘草湯方甘草二兩

右一味切以水三升煮取一升半分溫

三服忌海藻菘菜

范汪經心錄同並出第十七卷中

肺氣客熱方二首

又療肺痿吐涎沫桂枝去芍藥加皂莢湯方桂心三兩甘草二兩

大皂莢一挺去皮子炙

生薑三兩大棗十二枚

五味切以水七升微火煮取三升分三服忌生葱海藻菘菜

范汪經心錄同並出第十七卷中

延年百部根飲主肺氣客熱暴傷風寒因嗽不安方百部根一兩天門冬二兩

去心紫菀一兩

貝母

葛白前橘皮各一兩生薑二兩葱白切各三

右十味切以水六升煮取一升七合去滓分溫三服

疏數任情亦可分為四服欲間食亦得禁生冷鯉魚蒜

卷中出第五

古今錄驗療肺客熱并肝心家氣人參湯方桂心甘草三兩各人參

乾薑防風各二兩

白朮半兩

右六味切以水八升煮取三升分三服日三宜溫忌桃李雀肉生葱海藻菘菜

出第二十卷中

尚德按今  
有方八首

肺熱兼欬方七首

刪繁療肺熱氣上欬息奔喘橘皮湯方 橘皮 杏仁各四兩去皮柴胡 麻黃去節各三兩乾蘇葉二兩母薑去心一兩

蓋十全同出

尚德按一  
斗干金作  
一斗五升

尚德按熱  
實干金作  
實熱下同

石膏八兩右七味切以水九升先煮麻黃兩沸除沫下諸藥煮取三升去滓分三服不差再服母薑十全同出

金云宿

千金療肺熱悶不止胸中喘多驚悸客熱來去欲死不堪服藥泄胸中喘氣方 桃皮 芙花梢各一兩右  
二味以水四斗煮取一斗去滓以故布手巾內汗中薄胸溫四肢不盈數日即歇

又凡右手寸口氣口以前脈陰實者手太陰經也病苦肺脹汗出若露上氣喘逆咽中塞如欲嘔狀名肺  
熱實也

又療肺熱實胸過仰息泄氣除熱湯方 枸杞根皮二兩白前三兩石膏八兩碎

膏綿裹杏仁三兩去皮研橘皮白朮各二兩

兩赤蜜合

火

右七味切以水七升煮取二升去滓下蜜更煮兩三沸分三服忌桃李雀肉等

又療肺熱言音喘息短氣好唾膿血方 生地黃切二兩石膏八兩淡竹茹如雞子大一枚杏仁四兩去皮研羚羊角屑芒硝各三兩

去節升麻三兩右九味以水七升煮取二升去滓下蜜煮兩沸分三服忌蕪荑粥

十七

卷中

延年天門冬煎主肺熱兼欬聲不出方 生天門冬汁一升橘皮二兩生地黃五升白蜜合牛酥三升白糖五兩杏

仁一升去皮紫菀通草各三百部根白前甘草炙人參各二兩右十四味切以水六升煮

貝母等藥取二升五合去滓內天門冬地黃汁煎可減半內酥蜜生薑等煎令可丸稍強取如雞子黃  
大含嚥之日四五度忌鯉魚蕪荑海藻菘菜等張文仲處

又地黃麥門冬煎主肺熱兼欬方 生地黃汁 生麥門冬各三升生薑汁合酥 白蜜各二兩  
右五味先

煎地黃麥門冬薑汁等三分可減一分內酥蜜煎如稀餳內貝母末八分紫菀末四分攪全調一服一  
匙日二服夜一服忌薑羨

尚德按麥門冬下疑脫汗字

肺熱兼欬方七首 師虛寒方三首

又天門冬煎主肺間熱欬咽喉塞方 天門冬去心麥門冬去心欬冬花 目母各一紫菀 茯苓 升

麻各二生薑汁三蜜升酥合地黃升十三

右十一味切以水八升煮七物取一升去滓內生薑地黃汁

煮取一升內蜜酥於銀器中加湯上煎令成丸一枚含嚥日夜三五丸忌醋物兼羹鯉魚

等

楚處

又羚羊角飲主肺熱胸背痛時乾欬不能食方 羚羊角兩二月母 生薑 茯苓各三橘皮 人參

芍藥各二右七味切以水五升煮取一升八合去滓分溫三服每服如人行八九里久更服禁生冷

蒜鈎臂並出第

五卷中

肺虛寒方三首

通按本卷

小柴苑丸

內甘皮一

作甘草但

不知五具

未何說耳

尚德按五

具即五枚

猶第三十

三卷中云

石櫞皮一

具之類

尚德按千

刪繁療肺虛寒癲風所傷聲音嘶塞氣息喘憊欬唾酥蜜膏酒止氣欬通聲方 酥 崖蜜 餡糖 生薑  
生百部汁大棗肉脂研為杏仁去皮末五具 甘皮未右八味合和微火煎常攬三上三下約一炊久薑  
汁并百部汁各減半停下溫清酒一升服方寸匕細細嚥之日夜三千金同出第六卷中尚德按甘  
金數用之云去膜又云甘子皮亦可見其非

甘草也 尚德按千金杏仁下云各一升研

猪脰一百枚好酒五升

右三味以酒漬二

味秋冬七日春夏三日生布綾去滓二七日服盡忌鹽無猪脰以羊脰代

同出第十八卷中

又凡右手寸口氣口以前脈陰虛者手太陰經也病苦少氣不足以息嗌乾不津液病名曰肺虛寒也

又療肺虛寒則聲嘶傷語言用力戰掉緩弱虛瘠風入肺防風散方 防風 獨活 芎芻 泰椒 汗黃

者 附子炮乾薑各七石膏研天雄炮甘草炙山茱萸 麻黃去五味子各六秦艽 桂心 山藥

二七日忌

杜仲 人參 防已各五 貢眾收紫菀 菊花各四細辛 當歸各五 方十七日再忘海藻菘菜豬肉冷水生葱生菜

出第十七卷中

肺氣不足口如含霜雪方四首

廣濟療肺氣不足寒從背起口如含霜雪語無聲音劇者吐血苦寒五味子湯方 五味子三兩大棗十二枚

桑根白皮一兩大棗二兩二鍾乳三兩款冬花

雞屎各二

右七味切以水九升煮取三升分溫三服每服如

人行七八里進一服忌猪魚炙肉麪陳臭等物此甚良

又療肺氣不足逆氣胸滿上迫咽喉閉塞短氣連唾相屬寒從背起口如含霜雪語無音聲劇者吐血腥

臭或歌或哭乾嘔心煩耳聞風雨聲皮毛悴面白紫菀湯方

紫菀

五味子

生薑合皮

白石英

研

麥門冬

去心

桑根白皮

兩

三大棗

一枚

梗米

二合

款冬花

兩

雞屎各二

右十二味切水

一斗五升先煮桑根白皮梗米取九升去滓內諸藥煎取三升去滓分溫三服每服相去如人行七八

里久忌生葱麪炙肉

深師千金無紫菀人深師千金無紫菀人

深師療肺氣不足逆滿上氣咽喉中閉塞短氣寒從背起口中如含霜雪語言失聲甚者吐血補肺湯方

五味子三兩乾薑

款冬花

各二

桂心

一升

大棗

一百枚

梗米

二合

桑根白皮

一斤

右八味切以水

一斗二升先煮桑根白皮梗米五沸後內諸藥煮取三升分三服忌生葱千金同出

集驗補肺湯療肺氣不足欬逆短氣寒從背起口中如含霜雪語無音聲而渴舌本乾燥方 五味子

白石英研綿鍾乳

同桂心

橘皮

桑根白皮

各三

梗米

合

茯苓

竹葉

款冬花

紫菀

各二

大棗

十五枚

杏仁

兩

仁

去皮

蘇子

一升

薑

五兩

麥門冬

四兩

去心

右十六味切以水一斗三升先煮桑根白皮梗米

熟去滓內諸藥煮取四升分三服日再夜一忌大酢生葱千金同出

熟去滓內諸藥煮取四升分三服日再夜一忌大酢生葱千金同出

肺脹上氣方四首

五法

廣濟療患肺脹氣急欬嗽喘羸臥不得極重忍氣欲絕紫菀湯方 紫菀六分甘草八分檳榔一枚茯苓八

葶苈子三合炒末 湯成下水 右五味切以水六升煮取二升半絞去滓分溫三服每服如人行四五里久進之

以快利為度忌生葱菜麪海藻菘菜大醋蒜粘食卷中 第二

仲景傷寒論肺脹者欬而上氣煩躁而喘脈浮者以心下有水宜服小青龍湯加石膏主之方 麻黃三兩

尚德按要  
略石膏二兩  
尚德按要  
略煮取三升

雨略  
尚德按要  
略煮取三升分溫三服

尚德按要  
生薑各三兩  
金麻黃各三兩  
藥生薑各三兩

去五味子半升石膏一錢  
乾薑 芍藥 細辛 桂心 甘草炙各三兩半夏半升 右九味切以水一斗先  
煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取二升半去滓溫服強人一升瘦人及老小以意減之日三夜一忌  
生葱生菜海藻菘菜羊肉鴟等

又肺脹者病人喘目如脫狀脈浮大也肺脹而欬者越婢加半夏湯主之方 大棗一枚半夏洗半升 生薑  
三兩 麻黃六兩 甘草二兩 石膏半斤 右六味切以水六升先煮麻黃三沸去沫內諸藥煮取二升去滓  
溫服八合日三不知更作之忌海藻菘菜羊肉鴟等並出第十卷中

深師療欬而上氣肺脹其脈浮心下有水氣小青龍加石膏二兩設若有實者必躁其人常倚伏小青龍

湯方用前仲景方

半夏湯主之方 大棗一枚半夏洗半升 生薑

去節

芍藥

生薑

各二兩

細辛

桂心

各二兩

麻黃

去節杏仁

去皮

柴胡

生薑

半夏

洗十遍

半夏湯主之方 大棗一枚半夏洗半升 生薑

去節

芍藥

生薑

各二兩

細辛

桂心

各二兩

麻黃

去節杏仁

去皮

柴胡

生薑

各二兩

半夏

洗十遍

肺氣積聚方二首

救急療肺氣積聚心肋下滿急發即欬逆上氣方 麻黃三兩 去節杏仁去雙仁 柴胡 生薑 半夏洗十遍

葛根子各四兩 烘研如脂 乾棗十二枚 檳榔十個 右八味切以水一斗煮取二升八合去滓分溫三服每服相去

如人行八九里久七日忌食生冷猪魚羊肉此方服一劑訖將息滿七日則服後方忌羊肉鴟

又方 茯苓 乾蘇莖葉 橘皮 麻黃各三兩 杏仁去尖皮兩仁者 柴胡 生薑各四兩 右七味切以水一斗煮

取二升七合去滓分溫三服每服如人行八九里久禁酢物蒜麪豬肉五日服一劑並出第六卷中

肺癰方九首

千金論曰病欬唾其脈數實者屬肺癰虛者屬肺痿欬而口中自有津液舌上胎滑此為浮寒非肺痿也若口中辟辟燥欬即胸中隱隱痛脈反滑數此為肺癰也問曰病者欬逆師脈之何以知此為肺癰當有

膿血吐之則死後終吐膿死其脈何類何以別之師曰寸口脈微而數微則為風數則為熱微則汗出數則惡寒風中於衛呼氣不入熱過於榮吸而不出風傷皮毛熱傷血脈風舍於肺其人則欬口乾喘滿咽喉不渴唾而濁沫時時振寒熱之所過血為凝滯蓄結癰膿吐如米粥始萌可救膿成則難治寸口脈數跌陽脈緊寒熱相搏故振寒而欬跌陽脈浮緩胃氣如經此為肺癰跌陽脈浮緩少陰微緊微為血虛緊為微寒此為鼠乳其病屬肺也問曰振寒發熱寸口脈滑而數其人飲食起居如故此為癰腫病醫反不知而以傷寒治之應不愈也何以知有膿膿之所在何以別知其處師曰假令在胸中者為肺癰其脈數欬唾設膿未成其脈自緊數緊去但數膿為已成也出第十一卷中

仲景傷寒論欬胸中滿而振寒脈數咽乾不渴時出濁唾腥臭久吐膿如粳米粥者肺癰也桔梗白散

主之方 桔梗 貝母各三 巴豆一粒研作脂心 右三味搗篩強人飲服半錢亡羸人減之若病在膈上者必吐膈下者必利若利不止者飲冷水一杯則定忌猪肉蘆筈等出第十一卷中

集驗療胸中滿而振寒脈數咽燥而不渴時時出濁唾腥臭久吐膿如粳米粥是為肺癰桔梗湯方

桔梗二兩子金古今各用一兩甘草炙二兩右二味切以水三升煮取一升分再服朝暮吐膿血則差張文仲景傷寒論方出第四卷中

千金療欬有微熱煩滿胸心甲錯是為肺癰黃昏湯方 黃昏手掌大一枚合歡木皮右一味切以水三升煮得一升分再服范汪同此本仲景

同此

尚德按此證要略用下二味桔梗湯桔梗白散則傷寒論瘧塞實結胸無大熱者尚德按要桔梗一兩

尚德校千金草庵三雨要略大劑十二枚又接千金內藥一劑大煎取七合外臺益據要

又肺癰喘不得卧草庵大棗瀉肺湯王之兼療胸脇滿一身面目浮腫鼻塞清涕出不聞香臭酸辛欬逆上氣喘鳴迫塞方 草庵三煎令色紫右一味擣全可丸以水三升煮擘大棗二十枚得汁二升內藥如彈丸一枚煎取一升頓服古今錄驗刪繁仲景傷寒論范汪同並出第十七卷中

備急療腸癰肺癰方 升麻 白斂 漏蘆 芒硝各一 黃芩 枳實 灸連翹 蛇銜各三梔子二十粒柏子仁一升

壅根四右十味擣全細以水三升清經半日以猪脂五升煎令水竭去滓傳之日三若交急合水煎

出第  
卷中

尚德按前  
字下千金  
有取字

尚德按前  
當作治

古今錄驗療肺癰方 薦苡仁一升 醇苦酒三升

右二味煮取一升溫令頓服有膿血當吐

范汪經心錄同

又療肺癰葦莖湯方 剑葦一升 薦苡仁半升 桃仁五十枚去尖

皮兩仁者爪瓣升半得五升去滓悉內諸藥煮取二升分再服當吐如膿仲景傷寒論云葦莖切二升半金范汪同

又療肺癰經時不差桔梗湯方 桔梗半升 白木

兩當歸兩 地黃二升 甘草一升敗醬 薦苡仁各二升

桑白皮升

切右八味切以水一斗五升煮大豆四升取七升汁去豆內清酒三升合諸藥煮之取三升去滓服

六合日三夜再忌豬肉蘋果桃李雀肉海藻菘菜等

又療肺癰生地黃汁湯方 生地黃汁半升當歸

甘草一錢白石英綿人參各一兩附子炮二分白小豆三十粒

雞一頭男用雌女用雄療

右八味切以水一斗五升煮雞取七升汁去滓內地黃汁諸藥等煮取三升

升去滓分服六合日三夜二忌蘋果海藻菘菜冷水猪肉等

並出第二十一卷中

大腸論二首

千金論曰大腸腑者主肺也鼻柱中央以為候也肺所以合氣於大腸者大腸為行道傳瀉之腑也號監倉樞重二斤十二兩長一丈二尺廣六寸臍右迴疊積還反十二曲肱水穀一斗二升主十二時定血脉和利精神又曰肺前受病移於大腸肺欬不已則大腸受之大腸欬則遺失便利肺應皮皮厚即大腸厚皮薄即大腸薄皮緩腹裏大者大腸緩而長皮急者大腸急而短皮滑者大腸直皮肉不相離者大腸結

同前

又扁鵲云大腸絕不療何以知之洩痢無度則死實即腸熱熱則脹滿不通口為生瘡食下入腸則腸實而胃虛下胃則胃實而腸虛所以實而不滿乍實乍虛乍去虛則傷寒寒則腸中雷鳴洩青白色而發於氣水根在大腸大腸有寒驚瘻有熱便腸垢大腸有宿食寒慄發熱有時如瘧狀大腸病者腸中切痛而鳴灌灌冬日重感於寒則洩當脅而痛不能久立與胃同候腸中雷鳴氣上衝胸喘不能久

立邪在大腸也大腸脹鳴而痛腸寒即洩食不化

出第十八卷中

大腸熱實方三首

千金凡右手寸口氣口以前脈陽實者手陽明經也病苦腸滿善喘效面赤身熱喉咽中如核狀名曰大腸實熱也

又療大腸實熱腹脹不通口為生瘡生薑溴腸湯方 生薑 橘皮 青竹茹 白朮 黃芩 桃子各兩桂心各二兩再生地黃各一兩茯苓 芒硝各二兩大棗十四枚擘右十一味切以水七升煮取三升去滓下芒硝分

三服忌生葱薑蔓海藻菘菜醋物桃李雀肉等

出第十八卷中

刪繁療肺脈厥逆大於寸口主大腸熱放上氣喘鳴心煩麻黃湯方 麻黃六兩去節芍藥生薑 半夏十升洗遍細辛 五味子各兩桂心二兩石膏八兩右八味切以水九升先煮麻黃七八沸去沫次下諸藥煎取

三升去滓分三服忌羊肉鷄生葱生菜等

又療大腸熱甚腸滿掌中熱淡竹葉飲泄熱氣方 淡竹葉升切三兩橘皮 乾蘇葉各三兩白朮四兩甘草兩

升切三兩

桂心一兩石膏六兩杏仁六十枚去皮尖熬

右九味切以水一斗二升先煮竹葉取一斗去滓澄清

葱白切一升取九升下諸藥煮取三升絞去滓分三服若須利下內芒硝三兩忌海藻菘菜桃李雀肉生葱並出第十八卷中

大腸虛寒方三首

千金凡右手寸口氣口以前脈陽虛者手陽明經也病苦胸中喘腸鳴虛渴脣乾目急善驚泄白名曰大腸虛寒也

又療大腸虛寒痢下青白腸中雷鳴相逐黃連補湯方 黃連 茯苓各四兩芍藥三兩醋石榴皮五兩地榆兩兩金波苓三兩兩酸石榴兩兩皮五片

刪繁療大腸虛寒久呴欬氣短少腹中痛欲冬花丸方 欲冬花分桂心 五味子各六兩乾薑 芍藥

尚德按今  
有方二首

甘草炙各五分附子炮桔梗各四分蘇子熟五分蜀椒升百部汁合七升白蜜升乾棗去皮五十枚薑汁升右十四味細  
擣為末將薑蜜汁和微火上煎取為丸如梧子每服溫酒下三十九加至四十九日再忌海藻菘菜猪

肉冷水生薑出卷中第二

皮虛實方二首

尚德按

金菖蒲葉

切二升桃

葉皮枝剉

二升

又換千金

三日下云

蒸還溫藥

足汗用之

尚德換三

千金作二

刪繁論曰夫五臟六腑者內應骨髓外合皮毛膚肉若病從外生則皮毛膚肉關格強急若病從內發則骨髓疼痛然陰陽表裏外皮內髓其病源不可不詳之也皮虛者寒皮實者熱凡皮虛實之應主于肺大腸其病發於皮毛熱即應藏寒即應腑千金同出卷中第三

千金療皮虛主大腸病寒氣關格蒴蘆蒸湯方

蒴蘆根葉切桃皮葉

菖蒲葉各三

細糠斗

秋米升

五

右五味以水一石五斗煮取米熟為度大盆器貯於上作小竹牀子罩盆人身坐牀中四面周迴將席

薦墮風身上以衣被蓋覆若氣急時開孔對口洩氣取通身接汗可作兩食久許如此三日若盆裏不

過熱盆下安炭火也非惟療寒但是皮膚下一切勞冷並皆療之忌羊肉同出卷中第三

又療皮實主肺病熱氣梔子煎方

梔子

枳實炙

太青杏仁

去兩壳皮柴胡

芒硝各

三生地黃切一

石膏八兩淡竹葉切一升玄參兩

五

右十味切以水九升煮取三升下芒硝分三服忌薑蔓同出卷中第十八

升并出

黃濟療上氣方

蓼蕎子五合熟紫色

桑根白皮切

大棗枝擘

右三味以水四升煮取一升絞去滓

內

蓼蕎子泥如棗大煮之三分減一頓服以快利為度忌如藥法出卷中第二

肘後主上氣方

灸從大椎數下行第五節下第六節上空閒即灸一處隨年壯祕方深師千金翼文仲同出卷中第三

千金療上氣方

上酥一升獨頭蒜

五個去皮先以酥

生薑汁合

右三味同煎使熟空腹服一寸七溫服

之忘麪

又方

芥子三

右一味末之蜜和為丸寅時井華水服如梧子七丸日二服散亦佳禁如藥法尤忌油

麪等並出第七卷中

十

必效療上氣方 半夏洗茯苓各兩橘皮 白朮各三生薑五兩檳榔十

取二升七合分三服更加

甘草三兩人參

前胡各二兩紫蘇一兩

忌羊肉鴨桃李雀肉醋物

出第一卷中

古今錄驗溫中湯療上氣方

甘草炙三兩桂心四兩生薑一斤

右三味切以水七升半煎取三升分五服忘

生葱海藻菘菜

又昆布丸療胸滿上氣方 大黃 硝石 海藻洗水銀略一昆布洗三兩苦瓠辦四十草庵半升通草分

桃仁五十枚熟 右九味擣篩以蜜和為丸如梧子許先食服三丸日再服

又已試鯉魚湯療上氣方 杏仁熬貝母 桂心各三兩橘皮 人參

甘草炙厚朴炙麻黃去節茯苓 胡

麻 白前各二兩鯉魚五斤生薑六兩半夏洗五兩

右十四味切先以水二斗煮魚得一斗二升去魚內藥煎

取三升二合分四服日三夜一忌海藻菘菜醋物羊肉鴨生葱等物

又上氣二物散本司馬將軍方 大麻黃一斤杏仁一百粒 右藥各別擣合和下篩為散上氣發時服方寸匕可至

三方寸匕以氣下為候不必常服深師療上氣兼效范汪同並出第十九卷中

卒上氣方六首

深師療卒上氣胸心滿塞半夏蘇子湯方 半夏洗五兩蘇子升生薑五兩大棗四十枚擘橘皮 桂心各三兩甘草

右七味切水七升煮取二升七合分三服氣即下忌海藻菘菜羊肉鴨生葱

又療卒急上氣胸心滿竹簾下氣湯方 生甘竹簾口虎石膏一兩生薑 橘皮 甘草炙各三兩

右五味切以水七升煮竹簾取四升半去滓內諸藥煮取二升分二服此方療忽上氣不止者服兩三劑差忌

海藻菘菜並出第十卷中

備急葛氏療卒上氣鳴息便欲絕方 桑根白皮切三升生薑升半吳茱萸半升

右三味切以酒五升煮三

沸去滓盡令服之入口則愈千金祕方

上氣方九首

卒上氣方六首

尚德按出  
字上疑久  
並字

又方 麻黃去節甘草炙各二兩 右二味切以水三升煮取一升半分三服古今錄驗用水八升煮取三升八合忌海藻菘菜差後欲令不發者更取二味并熬杏仁五十枚擣篩蜜和丸服四五丸日三文仲附後又療卒上氣氣不復報肩息方 乾薑三兩吸咀 右一味以酒一斗清服一升日三服

又方 麻黃三兩去節桂心 甘草炙各一兩杏仁如製法 右四味切以水六升煮取二升分三服此二方名小投杯湯有氣疾者亦可為散將服之冷多加乾薑三兩淡唾者加半夏三兩忌海藻菘菜生葱出第三卷中

久上氣方四首

千金療積年上氣不差垂死者方 萬石子

熟羊肺薄切暴乾為末

右二味各別擣等分以七月七日神

醉拌令相著復不食空肚服二方寸匕須臾拾針兩食間以冷漿白粥二口止之隔日一服永差三十日內得煮飯汁作羹食之以外一切禁斷文仲附後同

又療上氣三十年不差方 大棗一百枚去核皮

一百顆 杏仁一百粒 椒二百粒 拉汗

右四味先擣杏仁令極熟後內

棗椒豉更擣作丸如棗核大含稍稍嚥之日三夜

並出第十七卷中金先擣杏仁政夜字下有一字

尚德按千

近效療久上氣氣急卧不得方 紫蘇葉兩生薑

麻黃去節杏仁各三赤茯苓

桑根白皮 萬石子各二兩

橘皮一兩 煮八味切以水八升先煮麻黃去沫下諸藥和煮取二升七合絞去滓分三服每服如

人行七八里久溫服之畢服後凡

又丸方 萬石子六兩煎令紫色 右一味擣如泥丸如梧子大每食後以棗飲下十九日二服乾棗十顆擘碎

上氣胸滿方二首

古今錄驗胡椒丸療欬上氣胸滿時復嘔沫方 胡椒 薑撥

乾薑各三兩 白朮 桂心 高良薑 人

參 款冬花 紫苑 甘草炙各二兩

右十味擣篩蜜和丸如梧子一服五丸日二服不知增之以知為

度忌生冷醋滑猪魚肉蒜桃李雀肉生葱海藻菘菜出第十卷中

救急茯苓人參散療上氣胸脇滿悶益心力陰陽忘水不霍亂能飲食此方功力諸藥不逮有人年四十時因患積痢羸憊不能起止形狀如七十老人服此藥兩劑平復如舊久服延年益壽方 茯苓二斤去皮  
再易水出於日中暴乾為末人參七兩甘草一兩牛乳七升白沙蜜五合右五味以水五升內甘草煮取二升除甘草澄濁內茯苓緩火煎令汁盡次內白蜜牛乳次內人參緩火煎令汁盡仍攢藥令調勿許焦成日中暴乾擣篩為散以紙盛之溫乳及蜜湯和喫並得亦不限多少夏月水和當飴忘海藻菘菜大醋並是大斗大升大秤兩也此方極驗合數劑立效出第六卷中

上氣欬身面腫滿方四首

崔氏療肺熱而欬上氣喘急不得坐卧身面腫不下食消腫下氣止欬立驗方 蕤蕷子二十月母六分杏仁炮十紫菀 茯苓 五味子各六人參 桑白皮各八兩右八味擣篩蜜和丸如梧子一服十九日二服甚者夜一服漸漸加至二三十九煮羹汁送之若腥氣盛者宜服此藥若小便不利者宜服後方忌酢物

又方 蕤蕷子分熬杏仁十二茯苓六分牽牛子八分右四味擣篩蜜和為丸如梧子許每服八丸日再夜一漸漸加至二十九煮羹汁送之大忌酢物

又療上氣欬嗽長引氣不得卧或水腫或遍體氣腫或單面腫或足腫並主之方 蕤蕷子三升微熬右一味擣篩為散以清酒五升漬之春夏三日秋冬七日初服如胡桃許大日三夜一冬日二夜二量其氣力擣篩為度如患急困者不得待日滿亦可以綿細絞即服其莖葉單莖向上葉端兩角角處且粗又有種苟芥草葉近根下作岐生角細長採時必須分別前件六種病狀發動各不同始終至固並歸於水但人腹中有塊及兩邊皆有者或當心有塊稍壯大者並是水病即此藥必須得好新熟無灰酒清者始可用經日多者惡不堪用前件病皆是熱服藥唯須慎酒麯生冷雞魚肉大困及不得入口則定老少任意量力必須好差平復始可停藥此方神驗服藥如傷多悶亂者作玉漿飲即定並

第六  
卷中

必效療上氣欬嗽腹滿體腫方 取楸葉升 右一味煮三十沸去滓煎堪作丸如小棗子以竹筒內下

部立愈

出第 一

上氣喉中水雞鳴方一十二首

深師療久逆上氣胸滿喉中如水雞鳴投杯湯方 小麥升麻黃

四兩去節厚朴五兩石膏如雞子杏仁合

右五

味以水一斗煮取小麥熟去麥內藥煮取三升分三服欬嗽甚者加五味子半夏洗各半升乾薑三累

經用甚良

又療上氣脹浮欬嗽咽喉中水雞鳴喘息不通呼吸欲死麻黃湯方 麻黃八兩射干二

兩甘草四兩大棗

顆

三十顆右四味切以水一斗先煮麻黃三沸去上沫內諸藥煮取三升分三服已用甚良忌海藻菘菜等物

又療欬逆上氣胸中塞不得息卧不安席牽繩而起咽中如水雞聲投杯湯方 款冬花升麻黃杏仁

四十顆

甘草一兩桂心二兩生薑半夏洗各紫菀細辛各一兩

右十味切以水八升煮

取二升頓服之一方分再服卧令汗出食粥數口勿飽食神良忘海藻菘菜羊肉鷄生葱菜

又療欬逆上氣燥嗽冷嗽晝夜甚喉中水雞鳴鍾乳丸方 鍾乳人參桂心

乾薑各八分附子炮款

冬花細辛各六兩紫菀分杏仁四分右九味擣篩蜜和酒服如小豆二丸日三不知稍稍加之忌猪肉

冷水生葱生菜等物

又療上氣欬嗽喉中水雞鳴唾膿血腥臭麻黃湯方 麻黃六兩桂心一甘草

一兩杏仁各二兩生薑八兩

用乾薑三兩右五味切以水七升者取三升半分五服已用療欬唾膿血腥臭得力後長將大服忘

海藻菘菜生葱

又療久欬上氣喉中鳴晝夜不得卧月母散方 覆盆子三兩

麻黃去節乾薑各二桂心甘草一兩

右五味

擣篩平旦酒服方寸匕日二不知增之至二七天劇可至再服酒隨飲多少忘海藻松菜生葱等

又療久欬逆上氣體腫短氣脹滿晝夜倚壁不得卧喉常作水雞鳴白前湯方 白前二兩紫菀三兩半夏一升洗

千金古今錄驗同雨大戟切七合右四味切先以水一斗清之一宿明旦煮取三升分三服忌羊肉鷄此四方味千金方

並出第十卷中

小品療欬逆喉中如水雞聲目母湯方 目母 甘草炙各二兩麻黃去節各一兩桂心各四兩半夏一升洗乾薑內一升杏仁十五

仲景傷寒論方千金古今錄驗同右七味切以水二斗三升先煮麻黃得十沸內藥煮取三升溫服七合日三忌海藻松菜生葱羊

肉鷄古今錄驗同

又療欬而上氣咽中如水雞聲射干麻黃湯方 射干十二麻黃去節各四兩紫菀一升款冬花三細辛三

雨五味子半升半夏八枚大棗七枚升洗右九味切以東流水一斗二升煮取三升分三服忌羊肉鷄生菜本此

錄驗同並出第一卷中

必效療病喘息氣急喉中如水雞聲者無問年月遠近方 肥皂莢雨好酥一升右二味於火上炙去火

高一尺許以酥細細塗之數翻覆令得所酥盡止以刀輕刮去黑皮然後破之去子皮筋脈擣篩蜜和為丸每日食後服一丸如熟豆日一服訖取一行微利如不利時細細量加以微利為度日止一服忌

如藥法出第一卷中

今古錄驗沃雲湯療上氣不得息卧喉中如水雞聲氣欲絕方 麻黃去節細辛二兩桂心一升乾

薑各一升半夏八枚洗去滑右六味切以水一斗煮取三升去滓適寒溫服一升投杯則卧一名投

杯麻黃湯令人汗出不得卧勿怪亦可從五合不知稍增日再凡煮麻黃先煎二沸去上沫又內餘藥

忌生葱生菜羊肉鷄

集驗經心錄范汪同

又投杯湯療久欬嗽上氣胸中寒冷不得息食卧不安席每牽繩而起咽中如水雞聲方 款冬花四十

細辛一兩紫菀三兩甘草炙桂心一升麻黃去節乾薑各二升五味子半升杏仁四十半夏半升右十味切以水八

升煮取二升分再服卧汗出即愈忌海藻菘菜生葱生菜羊肉鷄並出第

### 因飲水上氣方四首

古今錄驗宮泰說李將軍見得病喘息甚難并數上氣呼吸療之不差遂亡本由食餅後乃飲水得之服五味湯不差此輩皆死是後乃有婢得之行極而渴飲水多此為所發起同與五味湯亦不差然後小差泰因此與三物備急藥半錢吐下得差由此思惟病之所由以冷水入肺及入腸寒熱不消化結聚逼迫於胃口故令其呼吸乏氣息不得下過謂喘而上氣數也宜吐下之亦可與三物瓜蒂散吐之

三味備急散本療卒死感忤宮泰以療人卒上氣呼吸氣不得下喘逆差後已為常用方 巴豆 乾薑

大黃 右藥等分巴豆小熬去心皮合搗下飾服半錢七得吐下則愈忌野猪肉蘆筍

同 汪

又三味吐散宮泰以療上氣呼吸喘逆方 倭帶 杜衡各三人參分 右藥搗飾為散以溫湯服一錢

七老小半之

范汪同並出第十九卷中

時後療太走馬奔走喘乏便飲冷水冷飲因得上氣發熱方 竹葉三兩橘皮切三斤

煮取三升去滓分為三服三日服一劑良集驗用竹葉三兩

文仲備急

又方 萱蕡子一兩乾姜四顆

熱搗取第

右二味以水三升先煮取一升內萱蕡子煎取五合大人分一二服

小兒分三四服

並出第一卷中

### 卒短氣方四首

肘後卒短氣方 捣韭取汁服一升立愈

文仲備急千金同出第一卷中

千金療卒短氣方 枸杞葉 生薑各

二兩切各

右二味以水三升煮取一升頓服之

又方 生薑切五小麥升 右二味以水七升煮取一升頓服之

又方 紫蘇莖葉升 一 大棗二七 右二味以酒三升煮取一升半分再服水亦得又方加橘皮半兩

並出

小參二升  
又按千金云下氣方  
二方千金云下氣方  
尚德按此

卷中十七

上氣及氣逆急牽繩不得卧方八首

廣濟療肺氣痰上氣急及欬方

柴胡兩五味子 橘皮 紫菀 覆母

杏仁各三 麻黃四兩甘草炙

黃芩各二

右九味細切擣令極碎每服取麥門冬一兩去心生薑半兩切竹葉一兩半以水二升五

合先煮麥門冬生薑竹葉有一升五合內散二兩煎取一升二合絞去滓分二服平旦空肚服之一服

日晚食消後服之每日作一劑忌油麪猪犬肉小豆粘滑酸鹹海藻菘菜

卷中

肘後療欬上氣喘息便欲絕方

未人參服之方寸匕日五六

出第一

卷中

深師療上氣及諸逆氣神驗白前湯方

白前五兩紫菀 杏仁 厚朴炙各三兩半夏洗去節生薑一斤

一方用

人參 桂心各二 甘草炙一兩

大棗十四枚

右十一味切以水八升煮取二升半分三服良忌海

藻菘菜羊肉生葱餚

又療肺氣不足欬上氣牽繩而坐吐沫唾血不能飲食補肺溢湯方

蘇子升桑白皮各五兩半夏六兩紫

菀 人參 甘草炙 麻黃去節五兩五味子 乾薑 杏仁去各一兩 細辛一兩 桂心三兩款冬花 射干各一兩

右十四味切以水一斗二升煮取三升分五服日三夜再忌海藻菘菜羊肉餚生葱生菜

同干金

又療諸欬病上氣胸滿晝夜不得卧困篤鍾乳丸方

鍾乳八分乾薑六分款冬花一分細辛 桑白皮 半夏

洗各月母 附子炮各五分蜀椒三分芎藭四分紫菀八分杏仁三分

右十二味擣篩蜜和服如大豆二丸日三

忘冷食猪羊肉餚生菜

並出第十

千金療上氣不得卧神祕方 橘皮 生薑 紫蘇 人參 五味子各三

右五味切以水七升煮取

三升分三服子

出第十七卷中

古今錄驗療積病後暴上氣困篤投杯湯方

石膏四兩甘草二兩五味子三兩大棗二十枚人參 桂心

半夏洗 杏仁各二兩 麻黃三兩 生薑去節

右十味切以水一斗煮取三升一服六合日三夜一忌羊肉餚

海藻菘菜生葱等

尚德按三  
千金作五

字下疑有  
尚德按去

又療上氣呼吸牽繩肩息欬死復杯湯方 麻黃四兩去節甘草炙一兩乾薑 桂心 目母各二兩 右五味切以

水八升煮取二升分再服則愈有人先有風寒兼有石熱取冷當風飲酒房室體虛末春因天行病至夏中差尚虛有風熱未除兼藥石勢過傷於胃氣因腹脹堅如石氣息不利因自下後變四肢腫遊走無定小便不通積服利藥忽吐逆不下食變噦至掣動百脈狀如噓唏積日乃變上氣服此方加杏仁二兩與兩劑上氣得止忌海藻生菜菘菜范汪經心錄出第十九卷中同

欬嗽上氣方七首

尚德按權  
病源作壅

病源欬嗽上氣者肺氣有餘也肺感於寒微則成欬嗽肺主氣氣有餘則喘欬上氣此為邪搏於氣氣壅滯不得宣發是為有餘故欬嗽而上氣也其狀喘欬上氣多涕唾面目浮腫則氣逆也出第十一卷中同

深師療上氣欬嗽蘇子煎方 蘇子 生薑汁白蜜 生地黃汁杏仁各二升 右五味搏蘇子以地黃薑汁澆之絹絞取汁更搏以汁澆復投如此六七過令味盡去滓熬杏仁令黃黑搏令如脂又以向汁澆之絹絞取汁往來六七過令味盡去滓內竈和置銅器中於重陽中煎之令如飴煎成一服方寸匕日三夜一忌蕪荑子金同

尚德按千  
根無光花

又療欬嗽上氣射干煎方 射干八兩紫菀半兩膠飴五兩細辛半兩乾薑五兩生竹瀝升光花根半兩桑根白皮

款冬花各八兩附子炮甘草炙各半兩白蜜一升右十二味先切射干合蜜竹瀝汁煎五六沸絞去滓㕮咀諸藥以水一升四合清一宿煎之七上七下去滓乃合飴薑末煎令如餌服酸棗一丸許日三夜一不知稍增之忌海藻菘菜豬肉冷水生菜子金同

又療欬上氣中寒冷鼻中不利杏仁煎方 杏仁五兩五味子三合甘草炙四兩麻黃一斤款冬花三兩紫菀 乾薑各三桂心四兩右八味切以水一斗煮麻黃減二升掠去沫乃內諸藥煮取四升絞去滓又內膠飴半斤白蜜一斤合內汁中攪令相得湯中煎如飴咸先食服如半羹日三不知稍加之忌海藻菘菜生

葱十八金同出第十九卷中同

崔氏療上氣暴欬方 紫蘇葉

二升葉

大豆

升

右二味以水四升煮大豆次下紫蘇煮取一升五合分為三

服晝二夜一忌

醋酸油膾等

卷中

必效主上氣腹脹心胸滿并欬不能食方

段明府云極微

杞子

升

牛酥

升

白蜜

升

牛酥

升

右三味杏仁搗碎於瓷盆中研取汁五

升淨磨銅鑄勿令脂膩先傾三升汁於鑄中刻木記其深淺又傾二升汁以緩火煎減至於所記處即

內白蜜及酥還至木記處藥乃成膿不津瓷器中每日三度以燒酒服一大匙不能飲酒和粥服亦得

服一七日唾色變白二七日唾稀三七日欬斷此方非但療欬兼補虛損去風冷兼悅肌膚白如瓠婦人服之更佳

出第六年祕錄同

救急療上氣欬肺氣胸痛方

杏仁

升

大

白蜜

升

牛酥

升

右三味杏仁搗碎於瓷盆中研取汁五

古今錄驗療上氣兼欬蘇子湯方

蘇子升五味子

升

麻

升

黃芩

升

甘草

升

各人參

桂心

當歸各半升

生薑

升

牛夏

升

兩

右十二味切以水九升煮取三升分二服

上氣病亦特單者

蘇子及生蘇葉冬天者

乾枝莖葉亦佳忌海藻菘菜羊肉鴨生葱生菜

升

九

卷中

欬逆上氣嘔吐方四首

病源五臟皆稟氣於肺肺感微寒則成欬嗽也寒搏於氣氣聚還肺而邪有動息邪動則氣奔逆上氣上則五臟傷動動於胃氣者則胃氣逆而嘔吐也此是肺欬運滯氣動於胃而嘔吐者也又有季夏脾王之時而脾氣虛不能王有寒氣傷之而欬嗽者謂之脾欬其狀欬則右脇下痛陰陰引脾背甚則不可動動則欬發脾與胃合脾欬不已則胃受之其狀欬嗽而嘔吐甚則長蟲出是也凡諸欬嗽甚則嘔吐各隨證候知其腑臟也

出第十一

深師療欬嗽上氣喉咽中腥臭虛氣攬心頭痛眼疼耳中嘈嘈風邪毒注天行食不生肌胸中隔塞嘔逆

尚德按合  
千金作合

多唾惡心心下堅滿飲多食少療症并淋通氣丸方 膠飴五斤蜀椒半升 烏頭炮六分 桂心六分大附子五枚  
乾薑 人參各四分 杏仁升天門冬分 媽蛤頭炎五節去 右十味末之搗杏仁作膏稍稍內藥末搗干過秤

膠飴乃內藥中攢令調和合如半臺一枚日六七夜二三服令胸中溫為度若夢與鬼神交通及飲食者全用媽蛤食不消者加杏仁五合有虛氣少腹急腰痛加天門冬杜仲有風加烏頭二枚附子一枚立夏後勿加也有留飲加草庵子一兩熬末之忌猪肉冷水生葱鯉魚等物同千金

又療上氣欬嗽逆口乾手足寒心煩滿積聚下利嘔逆岩墜瘀血上氣胸脇脹滿少氣腸鳴飽食傷中裏急婦人乳飲滯下有邪濕陰不足大小便不利肢節皆痛硝石丸方 硝石升乾薑 前胡 大黃各一杏仁升右五味搗篩蜜和飲服如梧子三丸日再五日後心腹諸疾隨大小便去月經絕則通下長蟲數十亦利血及冷熱赤白汁癥瘕毒悉主之藥利以意消息

又療上氣煩悶嘔逆不得飲食厚朴湯方 厚朴炙人參各一半夏四兩生薑八錢芩 甘草炙橘皮

桂心

枳實炙各二兩

右九味切以水八升煮取三升分三服忌海藻菘菜羊肉餚生葱醋物並出第十一卷中

必效療上氣欬嗽逆不下食氣上方 橘皮 紫菀各三分人參 伏苓 柴胡 杏仁去皮 右六味

功以水六升煮取二升分為三服患冷加生薑二兩患熱加麥門冬三兩去心不能食加白朮二兩厚朴二兩忌醋物桃李雀肉等出第一卷中

上氣欬嗽多唾方三首

廣濟瘡上氣肺熱欬嗽多涕唾方 白前四分生麥門冬十分去心目母 石膏 甘草炙五味子 生薑各四

黃芩五分杏仁四十顆淡竹葉切一升白蜜一匙

右十一味切以水七升煮取二升七合絞去滓內白蜜更上火煎三沸分溫三服每服如人行五六里須利三兩行湯成後宜加芒硝八分忌熟麵及內油膩醋食

海藻菘菜出第二卷中

古今錄驗小紫菀丸療上氣復欬嗽多唾潤方 乾薑

甘皮一草作細草 款冬花

紫菀各三附子一枚

尚德接大  
醫以下十  
六字疑當  
大書

炮 右六味擣篩以蜜和為丸如梧子先食服三丸日再以知為度忌冷水猪肉生菜等物  
又療欬氣上多涕唾杏仁煎方出徐王升 杏仁一升 右一味擣碎研取大升三升汁以水和研之煎取一大升酒服一匙日三忌猪雞魚肉胡荽等物並出第十九卷中

上氣欬方一首

古今錄驗療欬逆上氣胸滿多唾太醫令王叔和所撰  
去皮一分泡杏仁一升四分 葛蒲一分紫苑二分皂莢皮子炎欬冬花三分麻黃四分一分子去節 右十二味擣篩蜜和丸如梧子夜卧吞一丸日二不知加之療二十年欬不過二十九便愈御藥也祕在石室不傳忘猪羊肉鴨生菜冷水一方有桂心三分無麻黃  
千金同出第十九卷中

久欬嗽上氣方三首

肘後療久欬上氣十年二十年諸藥療不差者方 猪胰具乾棗一百 右二味以酒三升漬數日服二三合至四五服愈服盡此則差第十三卷中

深師療久上氣欬麻黃散方司馬太傅欬常將此服愈麻黃一斤杏仁一枚甘草二兩桂心一兩 右四味擣篩別擣杏仁如脂內諸末合令調臨氣上發時服方寸匕氣下止食頃氣不下更服一匕可至三匕氣發便服即止忌海藻菘菜生薑千金古今錄驗同

又療久上氣欬亦療傷寒後欬嗽方 甘草二兩 大棗二十枚 右二味以水七升煮取二升分再服數用驗忌海藻菘菜等古今錄驗名溫脾湯並出第八卷中

欬逆上氣方五首

病源肺虛感微寒而成欬欬而氣還聚於肺肺則脹是為欬逆也邪氣與正氣相搏正氣不得宣通但逆上喉咽之間邪伏則氣靜邪動則氣乍上煩悶欲絕故謂之欬逆上氣出第十四卷中

深師療欬逆上氣支滿息欲絕氣結於胸中心煩躁不安一合湯方 芫花二分 桂心 乾薑各五分 甘草

羌  
細辛各四  
茺蔚分二

右六味切以水三升煮取一升先食服一合日三夜一又云合湯亦得分六七

服一日盡便愈一方有菖蒲四分無茺蔚花忌海藻菘菜生葱生菜等  
又癰欬逆上氣腹中有堅痞往來寒熱令人羸瘦不能飲食或時下痢此腹中如絞在脣上下關疝氣上  
腸使然為病有氣涌逆蜀椒散方 蜀椒五合去目并桂心 甘草各一通草 半夏洗各三兩 八卷中  
篩飲服方寸匕日三夜一忌海藻菘菜羊肉鷄生葱並出第十

古今錄

驗麥門冬丸主氣逆上氣方 乾薑六分

麥門冬去心昆布洗海藻洗各細辛

海蛤

蜀椒

蒸桂

心各四

右八味擣篩蜜和丸如梧子以飲服十九漸加至二十九日三

有人患風虛得冷暈胸中上

氣喉中常如吹管聲

欬唾清沫將此丸服得差若散服方寸匕日三夜一忌生葱生菜

細辛兩

白蜜

半

紫莞

桂心

人魚湯

療欬逆上氣喉中不利方 生鯉魚尾熟艾半白蜜升紫莞

杜鵑根各一

款冬花

升杏仁

二十

豉升射干

細辛兩

白蜜

菖蒲兩

右十二味

㕮咀藥和內魚腹中置銅器中蒸之五斗米飯下藥成

服一升日三夜一忌生菜羊肉鷄等

又杏仁煎療欬逆上氣方 杏仁升石斛 乾薑各四

桂心

甘草

大黃去節

各五

味子

款冬花

紫莞兩

右九味

擣八味下篩以水一斗先煮麻黃取八升去滓內藥末膠飴半斤蜜一斤攪令相

得未食服如棗大一枚日三忌生葱海藻菘菜等

並出第二十九卷中

雜療上氣欬嗽方四首

廣濟療上氣欬嗽兼水氣癖氣方 萍虧子

桑葉子

桔梗

鼈甲

防葵

各六

枳實

紫莞

旋覆花

杏仁

橘皮

各四

茺蔚

二分

空腹

以飲服

如梧子五丸日二服漸漸加至十九以微利為度忌桃李雀肉莧菜醋物豬肉陳臭等

第三出

深師療上氣搶心胸奄奄不得息腹中脹滿食輒吐蘇子湯方 蘇子升大棗

三十

半夏

洗三

橘皮

生

中二卷

薑 桂心各一 蜀椒半分

右七味以水七升煮取二升分三服忌羊肉鴨生葱

油第十一卷中

兩

古今錄驗半夏湯療上氣五臟閉塞不得飲食胸中脇下支脹乍去乍來虛氣結於心中伏氣住胃管脣乾口燥肢體動搖手足疼冷夢寐若見人怖懼此五臟虛乏諸勞氣不足所致并療婦人方當歸防風

黃耆各二

兩

柴胡半

細辛

麻黃節人參各一

杏仁五十粒

桂心二半

夏升一大棗枝

生薑二十

兩黃芩一

右十三味切以水一斗先煮麻黃一沸去上沫更入水一升及諸藥煮取五升分為五服日三夜二忌

羊肉生葱生菜鴨等

並出第九卷中

第十

近效療上氣腹內脹滿飲食不消欲作霍亂及放噉紫蘇子丸方 紫蘇子 橘皮各二 高良薑 桂

心 人參各一

兩

右五味擣篩蜜和為丸每服十五丸飲酒任下若食瓜膾等物有生熟氣擬似霍亂

者即半劑粟許大細細噙取汁令消盡應時立愈常有此藥永不患霍亂甚神效也忌生葱猪肉陳臭

等物

外臺祕要卷十一終



W 2467 w

1915

V. 8-10