卷十六火鬱門

一 脇痛　五 跌撲損傷　十六 疥瘡　天疱瘡

楊梅ニ瘡　凍瘡　脚上爛ニ瘡　頭面ニ瘡　二十七 癰疽　乳癰

五十九 疔瘡　七十一 諸瘡

Dr. Saiki's Library.
京都産院文庫藏書
架號
或函之番號
冊之番號 4441
備考

丹溪心法附餘卷十六　庚集

火鬱門

脇痛（七十四）

丹溪心法

○脇痛肝火盛　木氣實　有死血　有痰流注　肝急木氣實用蒼朮川芎青皮當歸之類　痛甚者肝火盛以當歸龍薈丸薑汁下是瀉火之要藥　死血用桃仁紅花川芎　痰流注以二陳湯加南星蒼朮川芎　肝苦急急食辛以散之用撫芎川芎蒼朮血病入血藥中行血　治咳嗽脇痛以二陳湯加南星香附青皮青黛入薑汁　脇痛有痰血行氣藥中加桃仁不去尖并香附之類　有火盛者當伐肝木　左金丸治肝火

[illegible]藥室圖書之記

有氣鬱而胷脇痛者看其脈沉澁當作鬱治　痛而不得伸舒者蜜丸龍會丸最快　脇下有食積一條扛起用吴茱萸炒黄連　控涎丹一身氣痛及脇痛痰挾死血加桃仁泥丸服　右脇痛用推氣散出嚴氏方　左脇痛用前藥爲君加柴胡或小柴胡湯亦可治

入方

小龍會丸

當歸　草龍膽（酒洗）　山梔（炒）　黄連（炒）

川芎（各半兩）　大黄（煨半兩）　蘆薈（三錢）　木香（一錢）

一方有黄芩柴胡各半兩無大黄木香

一方有甘草柴胡青皮無當歸梔子

右為末入麝香少許粥糊丸如菉豆大每服五十丸薑湯下仍以琥珀膏貼痛處　龍會丸亦治有積因飲食大飽勞力行房脇痛

當歸龍會丸　治內有濕熱兩脇痛先以琥珀膏貼痛處却以生薑汁吞此丸　痛甚者須炒令熱服

草龍膽　當歸　大梔子　黃連

黃芩各一兩　大黃　蘆會（半兩）　木香（一錢半）

黃栢（一兩）　麝香（半錢）

右十味為末麪糊丸　一方加柴胡川芎各半兩　又方加青黛半兩　蜜丸治脇痛　麯丸降肝火

抑青丸　瀉肝火

黃連（半斤）

右為末蒸餅糊丸服

附諸方

推氣散　治右脇疼痛脹滿不食

枳殼　桂心　片子薑黃（各半兩　一本作畺蚕）

甘草（炙一錢半）

右為末每服二錢薑棗湯調下酒亦可

枳芎散　治左脇痛刺不可忍者

枳實（炒）　川芎（各半兩）　粉草（炙一錢半）

右為末每服二錢薑棗湯下酒亦可

[illegible]前散（和劑方）治男婦一切冷氣攻上胸脇刺痛不能已及

脾胃虗冷嘔吐泄膀胱小腸氣婦人血氣

縮砂仁（去殼）　甘草（炙）　茯苓（去皮）　草果仁（去皮煨）

肉豆蔻　川芎（洗）　茴香（炒）　蓽澄茄

大麥芽　檳榔　良姜　枳殼

蒼术　陳皮（去白）　羌活　厚朴

右㕮咀每服三錢水一盞入鹽少許煎至七分去渣空心溫服

沉香升氣丸（御藥院方）治一切氣不升降脇肋刺痛胸膈痞塞

沉香　檳榔（各二錢半）　人參　訶子（煨去核）

大腹皮（各半两）　白术　紫蘇葉

香附子（炒）　神麯（炒）　麥蘗　烏藥（各一两）

陳皮（去白）　甘草（炒）　姜黄（各四两）　京三稜（煨）

蓬莪朮（煨） 益智（炒去殼） 厚朴（去皮姜製各二兩）

右㕮咀每服三錢水一盞煎七分不拘時去渣温服

分氣紫蘇飲 治男子婦人脾胃不和胸膈噎塞腹脇疼痛氣促喘急（見喘類）

調中順氣丸（拔萃方）治三焦痞滞水飲停積脇下虛滿或時刺痛者

木香 白豆蔻仁 青皮（去白） 陳皮（去白）

三稜（炮各一兩） 大腹子 半夏（湯泡七次各二兩）

縮砂仁 檳榔 沉香（各半兩）

右為末水為糊丸如梧桐子大每服三十丸至五十丸陳皮湯送下

復元通氣散（和劑方） 治氣不宣通或成瘡癤并閃挫腰脇氣滯

不散 方見腰痛

枳殼煮散 治悲哀傷肝氣痛引兩脇 方見氣滯

一方 治脇下疼痛如神效

小茴香（一兩炒） 枳殼（五錢麩炒）

右為末每服二錢鹽湯調下

十棗湯 治脇痛甚效病人氣實可用虛人不可用

甘遂 芫花（慢火炒紫色） 大戟（各等分）

右為末水一大盞棗十枚切開煮取汁半盞調半錢人實更

加一錢量虛實加減

控涎丹 見痛風

二陳湯　見痰類

左金丸　見火類

小柴胡湯　見濕熱

琥珀膏　見積聚

○或謂予曰脇痛之症多是肝火上升不得條達之故而局方鹽煎散沉香升氣散分氣紫蘇飲調中順氣丸俱是辛溫之劑但能行氣開欝豁痰消積而已其扵降火未之有也病源是火而用辛溫之藥治之則是以火濟火而痛愈甚矣予曰不然古人之方必經有驗而筆之扵書豈肯妄作而誣後人哉但後人不善用也丹溪曰脇痛肝火盛木氣實有死血有痰流注予每度之凡左脇痛甚者則是

肝火盛木氣實也宜用龍會丸左金丸辛凉之劑以治之凡右脇痛微者即是痰流注并食積宜用塩煎散順氣丸等藥辛温之劑以治之是也又嘗論夫左脇痛胃脘痛二証婦人多有之以其憂思忿怒之氣素蓄于中發則上衝被濕痰死血阻滯其氣而不得條達故作痛也故治婦人諸痛諸疾必以行氣開欝為主而破血散火兼之庶乎得法矣諺云香附縮砂婦人之至寶山藥茯苓男子之佳珍此之謂也

跌撲損傷七十五　　庚集

丹溪心法

○跌撲損傷須用蘇木和血黄連降火白朮和中童便煎炒

在下者可先須補接後下瘀血　在上者宜飲韭汁或和粥喫切不可飲冷水血見寒則凝但一絲血入心即死

入方

治跌撲損傷

跌撲出血者姜汁香油各四两酒調服之

治攧傷骨折及血出者

用滑石甘草為末人參湯調服次用生姜自然汁一盞米醋一盞獨核肥皂四個敲破挼於姜汁米醋中紗片濾過去渣入牛皮膠煎成膏藥貼之遍身者皆可

接骨散

沒藥　乳香各五分　自然銅一两煅淬

滑石（一兩） 龍骨（三分） 赤石脂（三分） 麝香（一字另研）

右為末好醋浸沒煮多為上乾就炒燥為度臨睡服時入麝香抄以茶匙留舌上温酒下分上下食前後服若骨已接尚痛去龍骨赤石脂而服多儘好極効

○世以自然銅為接骨藥然此等方儘多大抵在補氣補血補土俗工惟在速効以罔利迎合病人之意而銅非煅不可服若新出火者其火毒金毒相扇挾香挾藥毒雖有接傷之功而燥散之禍甚於刀劍戒之

又方

冬瓜皮 阿膠（各等分）

右炒乾為末以酒調飲醉為度

附諸方

加味芎藭湯（三因方）治打撲傷損敗血流入胃脘嘔黑血如豆汁

當歸　白芍藥　芎藭　荆芥穗

百合（水浸半日等分）

右㕮咀每服四錢水一盞酒半盞同煎七分不拘時服

紫金散（楊氏家藏）治打撲傷折内損肺肝嘔血不止或有瘀血
停積於内心腹脹悶

紫金藤皮（二兩）　降真香　續斷　補骨脂

無名異（煆細酒淬七次）　琥珀（別研）　蒲黄

牛膝（酒浸）　當歸（洗焙）　桃仁（去皮尖各一兩）

大黄（紙裹煨）　朴硝（別研各一兩半）

右爲末每服二錢濃煎蘇木當歸酒調下等進三服利則安

復元活血湯方（拔粹）治從高墜下惡血留於脇下及疼痛不可忍

柴胡（五錢） 花粉 當歸（各三錢） 紅花 甘草（各一錢）

大黃（酒浸一双） 川山甲（三錢炮） 桃仁（五十个酒浸研如泥）

右㕮咀每服一兩水一盞酒半盞加桃仁泥煎至八分服以利爲度

當歸導滯散方（聖惠）治落馬墜車打撲傷瘀血大便不通浮腫痛昏悶畜血內壅欲死

大黃（一兩） 當歸（二錢半） 麝香（少許）

右爲末每服三錢熱酒下和劑方只大黃當歸二味等分酒調下或以酒煎服亦可

鷄鳴散　治從高墜下及木石壓傷瘀血凝積痛不可忍並以此藥推陳致新

大黃（酒蒸一兩）　桃仁（七粒去皮尖）　當歸尾（五錢）

右爲末酒一碗煎去渣五更鷄鳴時服取下惡血卽愈　若氣絕不能言急以熱小便灌之卽甦

奪命散方（濟生）治刀刃所傷及從高墜下木石壓損瘀血凝積心腹疼痛大小便不通

大黃　黑牽牛（各二兩）　紅蟶（用石灰慢火炒令乾黃色半兩）

右爲末每服二錢用煎酒調下約行四五里再熱酒調牽牛末二錢催之須下惡血成塊以盡爲愈

巳上諸方辛涼踈導瘀血之劑

花蘂石散和劑方治一切金刃所傷打撲傷損身體出血者急於傷處糝藥其血自化爲黃水如有內損血入臟腑熱煎童子小便入酒少許調一錢服之立效若牛觝腸出不損者急送入用細絲桑白皮尖茸爲線縫合肚皮縫上糝藥血止立活如无桑白皮用生麻縷亦得並不得封裹瘡口恐作膿血如瘡乾以津液潤之然後糝藥婦人產後敗血不盡惡血奔心胎死腹中胎衣不下並用童子小便調下

　硫黃上色明淨者四兩擣為粗末　花蘂石一兩擣為粗末

右二味相拌和勻先用紙筋和鹽泥固濟瓦罐子一個候泥乾入藥於內再用泥封口候乾安在四方磚石上書八卦五行字用炭一秤籠疊周匝自巳午時從下着火令漸漸上徹

直至經宿火冷炭消又放經宿鑵冷取出細研以細絹羅了

羅極細磁盒內盛依前法服

二藥降聖丹（和劑方）治打撲閃肭筋斷骨折挛急疼痛不能屈伸及榮衛虛弱外受遊風內傷經絡筋骨緩縱皮肉刺痛肩背拘急身躰倦怠四肢少力並皆治之

自然銅（火煅醋淬十二次研為末水飛）　川烏頭（生去皮臍）

骨碎補（爁去毛过焙）　白芍藥　沒藥（別研）　乳香（別研）

當歸（洗焙一錢）　生乾地黃　川芎（各一錢半）

右並生用爲細末以生姜自然汁與蜜等分煉熟和丸每一兩作四丸每服一丸槌碎水酒各半盞入蘓木少許同煎至八分去蘓木熱服空心食前

打撲內損筋骨疼痛　本事方

沒藥　乳香　芍藥　川芎

川椒（去目及閉口者）　當歸各半兩　自然銅（三錢半炭火燒）

右為末黃蠟二兩溶開入藥末不住手攪匀丸如彈子大每服一丸用好酒煎開乘熱服之隨痛處卧霎時連進有効

乳香定痛散　治打撲傷損落馬墜車一切疼痛

乳香　沒藥　川芎　白芷

芍藥　甘草　牡丹皮　生地黃

右為細末每服二錢溫酒弁童子小便調不拘時服

沒藥乳香散（御藥院方）治打撲損傷痛不可忍者

白朮（剉五兩）　當歸（焙）　白芷　沒藥（別研）

肉桂（去皮） 乳香（別研） 甘草（炒各一兩）

右為末入研藥滓研令勻每服一錢溫酒調下不拘時服

乳香萬靈散（應驗方）治打撲損傷筋骨及瘡腫焮作疼痛

乳香（五錢另研） 沒藥（五錢另研） 黃耆 當歸（酒浸）

赤芍藥 川芎 甘草 麻黃

陳皮（各一兩） 粟殼（去頂蒂蜜炒一兩） 人參（去芦一兩）

右為散每料分作十服每服用水二盞煎至一盞去滓溫服

接骨散（和劑方）治從高墜下及馬上折傷筋骨碎痛不可忍者

此藥能接骨續筋止痛活血

定粉（二錢） 當歸（二錢） 硼砂（二錢半）

右為末每服二錢煎蘇木湯調下服後時時進蘇木湯

補損當歸散（和劑方）療墜馬落車傷腕折臂呼吸疼痛運進此藥其痛即止筋骨接續

澤蘭（炒） 附子（炮去皮臍各一兩） 當歸（炒）

蜀椒（炒出汗） 甘草（炙） 桂心（各三分） 川芎（炒六分）

右為末每服二錢溫酒調下日三服忌生葱猪肉冷水菘菜

治打損接骨方（本事方）

接骨木（半兩） 乳香（半錢） 赤芍藥 川當歸

川芎 自然銅（各一兩煅醋淬十二次研為末水飛過焙用）

右為末用黃蠟四兩溶藥末攪勻候溫衆手丸如龍眼大如只打傷筋骨及閃肭疼痛者用藥一丸好舊酒一盞浸化藥乘熱服之若碎折筋骨先用此藥貼之然後服食

治打撲損傷骨折（百一選方）此藥專能接骨

夜合樹（俗謂之萌葛即合歡花越人謂之烏顆樹）去粗皮

炒黑色四兩　芥菜子炒一兩

右為末酒調二錢澄清臨卧服又以粗滓罨瘡上扎縛之

治打攧折骨損斷（經驗方）服此藥自頂心尋病至下兩手遍身遇受病處則颯颯有声覺藥力習習往來則愈矣

乳香　沒藥　蘇木　降真香

松明節　川烏（去皮尖）　自然銅（火煅醋淬七次各一兩）

龍骨（半兩生用）　地龍（半兩去土油炒）　水蛭（油炒半兩）

血蝎（三錢）　土狗（十箇油浸焙乾為末本草名螻蛄）

右為末每服五錢無灰酒調下病在上食後服病在下食前服

治打撲傷損　（經驗方）

用胡孫薑研爛取汁以酒煎服滓傅傷處

接骨散　（張子和方并治惡瘡）

金頭蜈蚣（一箇）　金色自然銅（半兩燒紅醋淬研為細末用）

乳香（一錢研為細末）　銅錢（重半兩者或二文或五文燒紅醋淬研細）

金絲水蛭（一錢半每箇作三截瓦上煿去氣道為度）

右為細末如瘡腫處津調半錢塗立止痛如見出膿先用粗藥末少許小油少半匙同打勻再入少半匙再打勻又入前藥接骨散半錢再都用銀釵子打成膏子用雞翎掃在瘡腫處立止痛天明一宿自破便効

如打破骨頭并損傷可用前項接骨散半錢加馬兜鈴末半

錢同好酒一盞熱調連渣溫服如骨折損以接定不疼如不折了喫了藥立便止住疼痛此方累經効驗不可具述

神聖接骨丹 治打撲傷損跌折肢體

水蛭（用糯米和砂鍋內炒黃去米 三錢） 兎絲子

髮灰 好綿灰 沒藥 乳香

血竭各一錢 半兩錢（一文燒七次醋淬七次另研） 麝香（一錢另研）

右研令勻每服三錢熱酒調下損在上食後服損在下空心服約車行六七里間骨作聲忌聽鐘皷砧杵之聲震動恐生蘆節忌食驢肉 一服見効

續股散 治折傷筋骨

用半兩錢七箇以桑柴火燒紅好醋內淬之取錢上碎末

再入珍珠末一分乳香沒藥少許同研極細好酒調服

接骨散　治跌撲閃肭骨節疼痛

黃麻（燒灰二兩）頭髮（燒灰一兩）乳香（五錢）

右為末每服三錢溫酒調服立効

茴香酒（直指方）治打墜肢體凝滯瘀血腰脇疼痛

破故紙（炒）茴香（炒）辣桂（各一錢）

右為末每服二錢食前熱酒調服

木香調氣散　治從高墜下或打撲傷損腰脇心痛

白豆蔻仁　丁香　檀香　木香（各二錢）

藿香　甘草（炙各八錢）砂仁（四錢）

右為末每服二錢加紅麴末少許童子小便同酒調空心熱

服如無紅麯紅酒亦好

應痛丸（經驗方）治折傷後為四氣所侵手足疼痛

生蒼朮（一斤） 破故紙（一斤半炒半生） 舶上茴香（十二两炒）

骨碎補（一斤去毛） 穿山甲（去膜去皮炒脹為度先以灰煨亦可）

生草烏（一斤剉如麥豆大）

右除草烏一斤用生葱二斤連皮生姜二斤擂爛將草烏一處淹兩宿焙乾連前藥一處焙為細末酒煮麪糊丸如梧桐子大每服五十丸酒湯任下忌熱物

○已上諸方辛温散痛接骨之劑

乳香消毒散（御藥院方）治一切傷折蹉跌焮腫疼痛不可忍者

乳香（另研） 沒藥（另研） 白歛 白芍藥（各一两）

白芥子　當歸（各半两）黄栢（另研細末）二两

滑石（二两）　黄丹（三錢）　加血碣（半两另研）

右為細末入另研者一處再另研勻每用新水調如稠膏攤在紙花上貼患處

烏金散應驗方治打撲損傷敷藥

用小黄米粉四两葱白細切一两同於砂鍋炒至黒色杵為細末用好醋調成膏子攤在紙上貼於損傷病處後用杉木皮或板以紙包裹四面四片用絹袋扎縛不可動揺三日一換内服前接骨藥

一方

用葱白砂糖二味相等爛研傅之痛立止且無瘢痕

治打撲傷折手足

用菉豆粉新鉄銚內炒令紫色用新汲井水調稀厚傅損處

以紙將杉木片縛定立効

走馬散（經驗方）治折傷接骨

柏葉（生少用）皂角（生多用）骨碎補（去毛）荷葉（生各等分）

右為末於折傷揣定入原位以姜汁調藥加糊攤在紙上貼骨斷處用杉木片子夾定以繩縛之莫令搖動三五日後開看以溫葱湯洗之後再貼藥經候七日如痛甚加沒藥

治打損傷（醫方大成）

南星　白芷　半夏　白蘞

黃柏皮　赤小豆各等分

右為細末姜汁調傅患緊縛方好

沒藥散（拔粹方）專治箭傷止血定痛

定粉（一两）　枯白礬（二錢另研）　沒藥（另研）

乳香（另研各一两）　風　石灰（一两）

右各研為末和勻摻上

治諸般打撲傷損皮破血出痛不可忍者

右用赤石脂研末傅之效

金絲膏藥（應驗方）治打撲傷損閃朒疼痛風濕氣痛

當歸　川芎　蒼朮　香白芷

赤芍藥　木鱉子　大黃　草烏頭（各半两）

香油（四两）　瀝青（半斤）　松香（半斤）　乳香（二錢半另研）

沒藥（二錢半另研）

右前八味同香油四兩熬去渣瀝青松香看熬軟硬冬軟些夏硬些乳香沒藥攪膏藥時用之

立應金絲膏（經驗方）

當歸尾　香白芷　杏仁　草烏（生剉用）

豬牙皂角（不蛀者去皮各三錢）葱連鬚葉肥者十莖

白膠香（三錢）瀝青（明者八兩）黃蠟（一兩）乳香（另研為末）

沒藥（另研為末各半兩）清油（七兩）

右將前項六味入清油內依法熬濾去渣入白膠香瀝青溶化攪勻入黃蠟又攪勻待冷入沒乳末攪勻

至聖黑龍膏（御藥院方）治一切筋骨損傷疼痛

米粉（四兩於銀器內炒成塊子褐色於冷研為細末後入二味）

乳香　沒藥（研細各半兩）

右研極細末每用或好酒或醋調如膏攤在紙花上貼患處

一方　治跌撲損傷及金刃所傷　此藥止血散痛消腫

風化石灰（重羅過半兩五月五日以韮汁和陰乾）

海螵蛸（半兩）老松香　血竭　軽粉

乳香　沒藥　黃丹（飛過）　無名異（去土）

松白脂（去皮各半兩）

右為極細末濕者乾糝乾則水調蜜調傅患處

淋渫頑荊散　治從高失墜及一切傷折筋骨瘀血結痛

頑荊葉（一兩半）蔓荊子　白芷　細辛（去苗）

防風去芦　川芎　桂心　丁皮

羗活各一两

右為末毎用一两塩半匙葱白連根五莖漿水五升煎七沸去渣通手淋渫痛處冷即再換宜避風

○已上諸方外治傳貼之劑

疥瘡七十六　附天疱瘡　楊梅瘡　凍瘡

脚上爛瘡　頭面瘡

丹溪心法

○諸瘡痛不可忍者用苦寒藥加黃連黃芩詳上下根梢用及引經藥則可　又云諸瘡以當歸黃連為君連翹甘草黃芩為佐　諸痛痒瘡瘍屬火若禀受壯盛宜四物加大承氣湯下之

○若性急面黑瘦血熱之人因瘡而痛宜四物加黃連黃芩大力子甘草在下焦者加黃栢　若肥胖之人生瘡而痛乃是濕熱宜防風羌活荆芥白芷蒼术連翹取其氣能勝濕

○諸瘡藥　膿窠治熱燥濕爲主用無名異　乾疥開鬱爲主用吳茱萸　虫瘡如癬狀退熱殺虫爲主用蕪荑黑狗脊白礬雄黃硫黃水銀殺虫樟腦松香退熱　頭上多加黃連方解石蛇床定痒殺虫松皮炭主膿　腫多者加白芷開鬱　痛多加白芷方解石　虫多加藜蘆斑猫　痒多加枯礬　陰囊加茱萸　濕多香油調　乾痒出血多加大黃黃連猪脂調　紅色加黃丹　青色加青黛　虫多加錫灰蕪荑檳郎　在上多服通聖散在下多須用下　脚腫出血分濕熱用藥

入方　瘡有三種

膿泡瘡治熱為主

黄芩　黄連　大黄（各三錢）蛇床

寒水石（三两）黄丹（半錢）白礬（一錢）輕粉

白芷　無名異（少許炒）　木香（少許痛者用）

右為末油調傅

沙瘡

蕪荑（二錢）　剪草（一錢）　蛇床（三錢）　白礬

吳茱萸　黄栢（各一錢）蒼朮　厚朴

雄黄（各半两）寒水石（二錢）輕粉（十貼）

右為床油調傅

疥瘡藥　春天發瘡疥開欝爲主　不宜抓破傅

白礬（二錢）　吳茱萸（二錢）樟腦（半錢）　輕粉（十盞）

寒水石（二錢半）蛇床（三錢）　黃栢　大黃

硫黃（各一錢）檳榔（一个）

右爲末香油調傅

又方

蕪荑　白礬（枯）　軟石膏　大黃

樟腦（各半兩另入）　管仲　蛇床（各一兩）

硫黃　雄黃（各二錢半）

右爲末香油調須先洗瘡去痂傅之

一上散

雄黃（三分半）　寒水石（一两）　蛇床　白膠香

黑狗脊（各一两）　黃連（半两）　硫黃（三分半）　吳茱萸

白礬（枯五分）　斑猫（十四个去翅足）

右硫黃雄黃寒水石另研如粉次入斑猫和匀蛇床狗脊等為極細末同研匀洗瘡令湯透去痂用臘猪油調手心中擦熱鼻中嗅三二次却擦上一上即愈如瘡甚腫痛高起加寒水石一倍如不苦痒只加狗脊如微痒只加蛇床子如瘡中有虫加雄黃如喜火燒湯洗加硫黃只臭不止亦可愈也

附諸方

四物湯　見補損

大承氣湯　見傷寒

升麻牛蒡子散　治時毒瘡疹脉浮洪在表者瘡發於頭面胸膈之際

升麻　牛蒡子　甘草　桔梗

葛根　玄參　麻黄　連翹各一錢

右㕮咀姜三片水二盞煎一盞服

升麻和氣飲　治瘡腫癤疥痒痛增寒發熱

甘草　陳皮各一两半　芍藥七錢半　大黄半两煨

乾葛　蒼术　桔梗　升麻各一两

當歸　半夏　茯苓　白芷各三錢

乾姜　枳殼各半錢

右㕮咀每服一两水煎服

加味羗活飲（三因方）專治四氣外搏肌膚發為癮疹憎寒發熱

羗活　前胡（各二两）　人參　桔梗

茯苓　甘草（炙）　枳殼（麩炒）　川芎

天麻（各半两）　蟬蛻（去鬚）　薄荷（各三条）

右㕮咀每服五錢水一盞姜三片煎七分溫服

當歸飲子　治內蘊風热發為瘡疥風癬濕毒燥痒瘡

當歸　白芍　川芎　生芐

白蒺藜　防風　荆芥（各一两）　何首烏

黄芪　甘草（各半两）

右㕮咀每服一两水煎或為末每服一二錢亦得

苦參丸（御藥院方）治肺受热毒遍身生瘡

用苦參為末粟米飯和丸如梧桐子大每服五十丸空心米飲下

○已上諸方內消之劑

輕粉散

寒水石一斤　硫黄　朴硝各二两　松香五两

枯礬二两　輕粉五分

右為細末香油調搽

硫黄散

硫黄　川椒　石膏　白礬等分

右為細末香油調搽

立効散

全蝎三十枚　巴豆三十粒　皂角七个炒焦

右為粗末以清油四两熬至焦黄色去渣次入大楓子蛇床子白礬末各一两黄蠟一两同熬成膏以瓷器收貯任意擦瘡

一方

白芷白礬各等分為細末入硫黄少許以香油調擦

治諸般疥癩瘡藥

蛇床子一斤為末　大楓子取肉四两

白礬五两為末疼剪少用　檳榔一两末

右糖油半斤調擦小児頭瘡加松香輕粉

水銀膏　此藥會稽徐彦釗傳大効

楓子取肉四两　輕粉二手　水銀末要茶研末不見星一禾

樟脳（二錢半）礬生熟（二錢半）

右先將梹肉研膏次入餘藥勻臘月豬脂和稀用絹布裹任意擦

又秘方

黑狗脊　䕡茹　藁本　蛇床子

硫黄　井泉石　剪草　百部

藜芦（各等分）

右碾為細末用香油搽手心內搽鼻聞之

一方　治疥癬諸瘡

雄黄（五錢）　樟脳（五分）　大楓子（取肉）　斑猫（去足翅各十双）

狗脊　蛇床子　寒水石　硫黄（各五錢）

右為極細末疥瘡用栢油調搽癬瘡用栢油調搽

治疥瘡

大楓子　杏仁（各十粒）

右同羊脂搗勻以褁火烘油出搽之

胡粉散（濟生方）治一切瘡癬瘙痒甚者

胡粉（一分）　砒霜（半分）　大草烏（一个生用）

碣稍（七枚）　雄黄　硫黄（各另研一分）

斑猫（一枚）　麝香（少許）

右為末先用羊蹄菜根蘸醋搽動次用少許藥搽患處

如意散（宣明方）治疥癬不時痛痒愈發有時不問久新者

吳茱萸　牛李子　荆芥穗（各二兩半）

輕粉（半錢）　信砒（二分）　牡蠣（半兩）

右爲細末研勻每臨時卧炒一錢油調遍身搓摩上一半如後痒不止更少旋塗之股髀之間聞香悉愈

又治疥藥方

蜜陀僧　蛇麻子　硫黃　枯礬

胡椒

右爲末香油調傳

○已上諸方外散之劑

丹溪心法

○天疱瘡　用防風通聖散末及蚯蚓泥略炒蜜調傳極效（從肚皮上起者是裏熱發於外也還復通聖散　見斑疹類）

○楊梅瘡　新增

附諸方

治楊梅瘡方

硃砂（二錢）　雄黃（一錢五分）　苦參　荊芥穗

天麻　麻黃　牛蒡子　卮粉

槐角子（各三錢）

右爲末細用糖心鷄彈爲丸梧子大毎服三十丸用雞湯或

羊肉湯送下一日一服表出毒氣再不服忌一月房室神効

又方

土茯苓（四兩）　牙皂　地骨皮　五加皮

白蘚皮（各一兩）

右作二十服用灯草車前子爲引子煎服

又方

冷飯團（一名土茯一斤）　五加皮　白蘚皮

防風　白芍藥　木瓜（各一兩半）　皂角子

白丑（各三十粒）　生地黄（酒洗）　地骨皮　牛膝（去蘆）

黄連（去須）　槐花　川芎　尋風藤

威靈仙　杜仲（炒斷絲）　白芷　當歸刄（酒浸洗各一）

白茯苓　甘草（炙半兩）　荆芥穗（一兩半）

右㕮咀二十服每服水一鍾半酒半鍾共煎至一鍾飯後温服服動此藥可用後又開薰楊梅瘡藥並治

又方

當歸　連翹　羌活　荊芥穗
薄荷葉　枳殼　黃栢　茯苓
車前子　防風　木通　芍藥
川芎（頭上用）　山梔　桔梗　天花粉
殭蚕　白芷　甘草　金銀花
獨活（各一兩）　柴胡　前胡（各半兩）

右㕮咀作二十服每服用水二鍾煎至八分溫服上多食後服下多食前服服此仍用薰藥並治

薰楊梅方

雄黃　沉香（各三分）　乳香　沒藥
硃砂（各五分）　血竭（三分）　黑鉛　水銀（各一錢）

右爲末均作紙撚七條用香油點燈放床上令病人兩腿抱住上用單被通身蓋之口噙冷水頻頻換之則不損口頭一日用三條後每日用一條熏之有効

又方

水銀　板硃　黑鉛（各三錢）　白花蛇（一錢）

共研爲末作紙撚七條頭一日用三條後每日用一條用香油點燈放兩腿單被連頭蓋了口噙冷水頻換

治楊梅瘡後腫塊方

冷飯團（十五兩）　防風　木通　薏苡仁

防巳　茯苓　金銀花　木瓜

白鮮皮　皂角刺（各一五錢）　白芥子（四錢）　當歸身（七錢）

右作三十服每服用水鍾半煎至八分空心午飯前晚飯前各一服忌魚雞生冷房事及煎炒茶酒十餘日立効屢有人加人參五錢其妙不可盡述

一方　專治年久楊梅頑瘡

水花硃（一錢）　枯礬　朱砂（各一錢三分）

三味共研細末用全蝎酒煎膏爲丸作六丸分作三日服用羊肉鮮魚等湯送下九日全好

一方　治楊梅癰

柏油（二兩）　全蝎（三箇）　蜈蚣（一條）　鉛粉（一兩）

右先將香油二兩煎熬全蝎蜈蚣待焦去渣次入柏油鉛粉柳條攪勻捏成餅子照瘡大小攤貼三日一換九次全好

一方　治楊梅痔漏瘡

用大蟾一箇去肉湯洗淨加刺蝟皮一箇象牙末三錢共爲細末棗肉爲丸如櫻桃大每服一丸空心童子小便送下服七日後仍用三味末猪膽汁調傳

丹溪心法

○凍瘡　用煎熟桐油調蜜陀僧末傳

丹溪心法

○脚上爛瘡久不愈　先以豆腐漿水洗二三次懸鈎渣葉地棠渣葉搗細入塩些少盦之

附諸方

治凍瘡（百一選方）

用茄子根濃煎湯洗并以雀兒腦髓塗之

治手足皸裂　（百一選方）

用瀝青二兩　黃蠟一兩　共熬攪勻瓦罐盛貯先以熱湯洗令皮軟拭乾將藥於慢火上畧炙擦傳

治手足皸裂春夏不愈者　（澹寮方）

生姜汁　紅糟　塩　、　猪膏（臘月者佳）

右研爛炒熱擦入皸內一時雖痛少頃使皮軟皸合再擦（即安）

治脚跟皸

用頭髮一大握桐油一碗於瓦鍋內熬候油沸頭髮溶爛出火攤冷以瓦器收貯勿令灰入毎用百沸湯泡洗皸裂令軟拭乾傳其上即安　一方加米粉

又方（醫方大成）

用五倍子爲末同牛骨髓填縫内即安

治手足裂　張子和方

用白芨不拘多少爲末水調塗裂處

治脚指縫爛瘡

擣鵝時取鵝掌黄皮焙乾燒灰存性爲末濕則糝之

治脚指縫爛瘡及因暑手抓兩脚爛瘡

用細茶口嚼碎爛塗之解熱燥濕其瘡立愈

神應散　治脚指丫濕爛

枯礬（六錢）　黄丹（半錢）

○右爲細末乾糝患處經夕立瘥

○頭面瘡　新增

附諸方

摩風膏（聖惠方）摩風止痒消腫定疼治頭面唇鼻諸瘡及肌肉裂痛者悉治之

沉香　白附子　木香　獨活

白斂　白芨　天麻（各一錢半）　當歸（去芦）

白芷　檀香　零陵香　藿香

杏仁（去皮）　桃仁（去皮各三錢）　茅香

甘草　防風　白芍藥（各一錢半）

川芎　木通（各一錢）　黄芪（一兩二錢）

龍腦（研四錢）半夏（十二兩半）清油（二斤二兩）

黃蠟（冬月用九兩） 大苽蔞（連穰一箇剉）

右剉用油浸七日於石罷內慢火煎候白芷微黃色以白綿濾去滓放淨鑵內密封澄一宿再濾過於上等磁碗中慢火再輕溫動次下黃蠟攪勻放溫次下研細龍腦糝面於磁盒內盛定每用少許摩患處

治頭面生瘡燥痒黃水出

密陀僧 硫黃（各二錢） 輕粉（少許）

右爲末酥油調搽

一方 治白禿瘡

用金頭蜈蚣一條皂角不蛀一斤擘開去皮弦以蜈蚣納入夾定以麻縶緊沉於糞缸底七日取出焙乾碾爲細末先以

温湯將瘡浸洗温潤然後敷之如乾以清油調搽數次除根

一方

用䝘皮烟膠一兩輕粉一錢研勻調搽又法用枯白礬同烟膠調搽亦佳

禿瘡藥

輕粉（五錢）　黃蠟（二兩）

右用鵝油一二兩調搽

治小兒白禿瘡　聖惠方

用淡豆豉一合炒令煙出色燋爲末用飯飲調屋塵一團於炭火內煆令灰燼並細研入輕粉少許油調剃頭了搽之

一方治頭瘡無屋塵　一方有射香無輕粉

合面上耳邊浸滛瘡聖惠方有黃水出久不愈名香瓣瘡

羖羊鬚　荊芥　乾棗去核各二錢

右焼存性入膩粉半錢同研末先用温水焼香油調塗

玉粉散　治熱汗浸漬頭面及遍身成瘡瘇痒焮痛

定粉一两　蛤粉九两半　石膏　白石脂各半两

滑石八两半　粟米粉　寒水石焼出火毒各二两

白龍骨半两

右爲末研令極細每用少許乾搽患處

癰疽七十七　附腸癰　乳癰　　庚集

丹溪心法

○癰疽只是熱勝血　六陽經六陰經有多氣少血者有少氣

多血者有多氣多血者不可一槩論也若夫要害處近虛怯薄處前哲已曾論及惟分經之言未聞諸經惟少陽厥陰經生癰疽理宜預防以其多氣少血肌肉難長瘡久未合必成死證遽用驅毒利藥以伐其陰分之血禍不旋踵　陽滯於陰脉浮洪弦數陰滯於陽脉沉細弱濇陽滯以寒治之陰滯以熱治之人中年以後不可生癰纔有痛腫參之脉症但見虛弱便與滋補氣血可保終吉若用尋常驅熱拔毒紓氣之藥虛虛之過如指諸掌　内托之法河間治腫焮于外根盤不深形證在表其脉多浮病在皮肉非氣盛則必侵於内急須内托以救其裏宜復煎散除濕散欝使胃氣和而平如或未已再煎半料飲之如大便秘及煩熱少服黃連湯如微利及煩熱已退却與復煎散

○兩如此使榮衛俱行邪氣不能內傷也然世俗多用排膿內補十宣散若用之於些小瘡與冬月時令即可若潰瘍於夏月用之其桂朴之溫散佐以防風白芷吾恐雖有參芪難爲倚仗

一婦年七十形實性急而好酒腦生疽纔五日脉緊急且澁急用大黃酒煨細切酒拌炒爲末又酒拌人參炒入姜煎調一錢重又兩時再與得睡而上半身汗睡覺病已失此內托之意

又一男子年五十形實色黑背生紅腫及胛骨下痛其脉浮數而洪緊食亦不下冬月與麻黃桂枝湯加酒黃栢生附瓜蔞子甘草節羌活青皮人參黃芩半夏生姜六貼而消此正內托之法　精要內托散乳香菉豆等藥想此方專爲服丹石而發者設不因丹石而發恐非必用之劑　瘡先發爲腫以致欝積

蒸肉爲膿故其痛多此瘡之始作時也膿潰之後腫退肌寬痛必漸減而反痛者此爲虛宜補亦有穢氣所滯宜和解風寒逼者宜温服

入方

附骨癰

熱在血分之極細初覺先以青皮甘草節後破其熱血初腿腫以人參黄連茯苓各二錢瓜蔞子四十八粒分二貼入竹瀝熱飲之

治環跳穴痛不已防生附骨疽

以蒼朮佐黄柏之辛行以青皮冬月加桂枝夏月加條子芩體虛者加牛膝以生甘草爲使大料煎入姜汁帯辣食前飲

之病深者恐朮栢桂枝十數貼發不動加少麻黄二三貼又不動恐癰將成矣急掘地坑以火煆紅沃以小便赤体坐其上以被席圍抱下截使熱氣薰蒸腠理開氣血暢而愈

鐵圍散　治癰疽腫毒

乳香　沒藥（半兩）　大黄　黄栢

黄連　南星　半夏　防風

皂角刺　木鼈子　瓜蔞　甘草節

草烏　阿膠

右為末醋調成膏砂石器内火熬黑色鵝翎傳之

圍藥　諸般癰疽傳上消散

乳香　沒藥　大黄　連翹

黃芩　黃連　黃栢　南星

半夏　防風　羌活　瓜蔞

阿膠　皂角刺

右研細末好醋煎黑色成膏寒者熱用熱者寒用

圍藥鉄井欄

貝母　南星（各七分）　連翹　五倍子

経霜芙蓉葉（各一兩）

右為細末用水調傅四向腫處止留中間一竅出毒氣

隔皮取膿法

驢蹄（切細一兩）　蕎麥麵（一兩）　白塩（半兩）　草烏（四分去皮）

右為末水調作餅子慢火炙微黃色出火毒研末醋調成膏

用白紙攤貼患處水自毛孔而出其腫自退

騎馬癰

大粉草帶節四两長流水一碗以甘草淬焙水盡為末入皂角炭少許作四服湯調頻服効

又方

甘草節白芷黄連破者龍骨枯礬赤石脂併用

敷疽癤方

草烏　黄連　紫金皮　白芷

大黄　芙蓉皮　朴硝　糯米（各等分）

右為末蜜水調敷如瘡盛以蜜調雄黄末圍定瘡穴大小前後敷前藥末

取朽骨　久疽及痔漏者有之

取烏骨雞脛骨以上等雌黃實之鹽泥固濟火煅通紅取出地上出火毒去泥用骨研細飯丸如粟大以紙撚送入孔中竅内更用膏藥貼之

便毒

山梔子　大黄　乳香　没藥

當歸（半錢）　瓜蔞仁（二分）　代赭石（一分）

右作一服煎

又方

木鱉子　大黄　瓜蔞仁　桃仁

草龍胆

右㕮咀濃煎露星月一宿清早温服立愈

又方

白殭蚕槐花為末酒調服　一方加酒大黄

附諸賢論

劉河間宣明論曰人之瘡腫因内熱外虚所生也為風湿之所乘則生瘡腫然肺主氣候於皮毛脾主肌肉氣虚則膚腠開為風濕所乘脾氣濕而内熱即生瘡也腫者皆由寒熱毒氣客於經絡使血澁而不通壅結成腫風邪内作即無頭無根氣血相傳作者即有頭有根結壅盛則為膿赤核腫則風氣流潰也瘡以痛痒痛則為實痒則為虚非謂虚為寒也正謂熱之微甚也痒者表痰故火旺於夏而萬物蕃鮮荣美也炙

之以火漬之以湯而其痒轉甚者微熱之所使也痒去者謂熱令皮膚縱緩腠理開理陽氣淂泄熱散而去或夏熱皮膚痒而以冷水沃之其痒不去謂寒收斂腠理閉密陽氣鬱結不能散越怫熱內作故也瘡痒皆為火熱而反腐出膿水者猶穀肉果菜熱極則腐爛而潰為污水也潰而腐爛水之化也癰淺而大疽深而惡熱勝血則為癰膿也瘍有頭小瘡也疹浮而小癮疹也瘤氣赤瘤丹熛熱勝氣火之色也

附脈理

脈訣舉要曰癰疽浮數惡寒發熱若有痛處癰疽所發脈數發熱而疼者陽不數不熱不疼陰瘡發癰之脈弦洪相搏細沉而肺肝俱數

附諸方

狗寶丸（濟生方）專治癰疽發背附骨疽諸般惡腫將發時先覺口中煩渴四肢沉重遍身壯熱乃其候也此藥功効不可具述

蟾酥（一錢）金頭蜈蚣（七條全者酥炙黃色）輕粉

雄黃　滴乳香　沒藥　烏金石（即石灰各一乄）

狗寶癩（狗復中得之一乄又云一兩）　狗膽（一個乾者用之去皮黑狗臘月者佳）

鯉魚膽（一个乾者用之臘月者佳）　粉霜

黃蠟（各三乄）　硇砂（半兩）　射香（一分）　孩兒乳（一合頭首者）

鉛白霜（一錢一本無此）

右先將乳汁黃蠟放在鑵內文武火化開次將各藥末和成劑用時大人丸菉豆大小兒丸如芥子大每服三丸病重者

加至五丸用白丁香七个研爛新汲水調送下腰已下食前服腰已上食後服如人行五里用熱葱白粥投之即以衣被盖定汗出為度已後只喫白粥常服十宣散留頭其四邊以烏龍膏貼

烏龍膏（濟生方）治一切腫毒癰疽收赤暈

木鱉子（去殼）　半夏（各一兩）　水粉（四兩）　草烏（半兩）

右於鐵銚内慢火炒令轉焦為末出火毒再研以水調傅瘡四邊留頭出毒氣

追毒丹（濟生方）治癰疽疔瘺諸惡瘡黑陷者先服狗寶丸次貼烏龍膏收腫觧毒去赤暈然後用鈹刀開瘡納追毒丹覆以乳香膏使之潰去敗肉排膿然後用生肌藥

乳香一錢雄黃二錢巴豆（七粒去殼皮心不去出皮如泥）

黃丹（二錢）輕粉（一錢）

右研和加白麪三錢滴水爲丸如麥狀針破瘡納之上覆以乳香膏追出膿血毒物痛瘡四壁死肌不去不可治者亦以此法追毒去死肌生新肉瘡小者一粒大者加用之

乳香膏斉生方追膿血消惡毒

木鱉子（去殼細剉）當歸尾（各一兩）柳枝（七八寸剉之）

此已上用清油四兩慢火煎令黑色次用

白膠香（明淨者四兩共研細入油煎化以綿濾之）乳香

沒藥（各半兩）

右再治淨鐵銚又傾前藥油蠟在內候溫入黃丹一兩半以

兩柳枝攪極勻再上火煎不住手攪候油沸起手下直待注在水中成珠不散為度秋冬欲軟春夏欲堅傾在水盆中出火毒捜成劑收之遇用以絹帛攤貼

桃花散（宣明方）一切瘡生肌藥

白芨　白斂　黃栢　黃連

乳香（另研）　麝香（另研）　黃丹（各等分）

右為極細末摻在瘡上二三日生肌平滿

○已上諸方治癰疽次第之劑（如无狗宝丸以淵然真人奪命用代之）

內踈黃連湯　治瘡皮色腫硬發熱而嘔大便燥結脉洪實者

黃連　芍藥　當歸　檳榔

木香　黄芩　梔子　薄荷

桔梗　甘草（各一两）　連翹（二两）　大黄（二两半）

右㕮咀每服一两入姜煎

秘方奪命散　治一切癰疽無名惡瘡皆可治之其效不可盡述

當歸尾　乳香（各一錢）　川山甲（用蛤粉炒黄色去粉六錢）

皂角刺（炒）　陳皮　金銀花（各三錢）　貝母（一錢）

赤芍藥　甘草節（各六錢）　沒藥（二）

花粉（八錢）　防風　白芷（各五錢）

右㕮咀每服一两用無灰酒一大碗煎至半碗紙糊口勿令走氣病在上食後病在下食前服

當歸消毒散（應效方）治癰腫初發

荊芥　牛蒡子　甘草　防風

當歸　赤芍藥（各一錢半）

右用水二盞煎至八分去滓溫服食後

神仙活命飲　治癰疽發背發腦發鬚發腋瘰毒騎毒便毒肚癰腿癰附骨癰疽惡瘡惡瘡癰瘡并瘰氣塊面目手足浮腫隨病加減并皆治之

金銀花（一兩五錢）　皂角針（一兩）　貝母（去心）

天花粉（各四錢）　當歸尾　滴乳香　大黃（各五錢）

沒藥　木鱉子（去殼）　甘草　穿山甲（用蛤粉炒）

黃去米淨　赤芍藥（各三錢）　防風（去芦）　香白芷（各二錢半）

橘皮（去白一錢半）

右每服五錢水煎服若老人及體虛者加生黃芪半兩若
臟腑閉濇者服九寶飲量病上下服之

九寶飲

當歸　白芷　甘草　瓜蔞
黃芩　生地黃　赤芍藥　熟地黃
川芎各等分

右每服五錢水酒共一鍾半煎病上食後服病下食前服

九珍散（簡易方）

治一切癰疽瘡癤腫毒因氣壅血熱而生者

赤芍藥　白芷　當歸　川芎
大黃　甘草　生乾地黃　苽蔞
比黃芩各等分

右㕮咀每服五錢水二盞煎至一盞去滓熱服兼治乳癰及丁瘡

赤芍藥散　治一切惡瘡癰疽丁腫初覺不消增寒疼痛

金銀花　赤芍藥（各半兩）　大黃（七錢半）　當歸
枳實　甘草（各三錢）　大瓜蔞（一個）

右每服五錢水酒各一鍾煎至一鍾不拘時温服

玄參散　治癰疽腫痛不進飲食

玄參（一兩）　升麻　射干　大黃（各五錢）
甘草（二錢半）

右每服五錢水一鍾半煎至八分不拘時温服

懸蔞散（張子和方）　治發背惡瘡

懸蔞（一個）　大黄　金銀花　皂角刺（各一两）

當歸（半两）

右剉碎每服五錢酒一碗煎七分去滓温服如有頭者服黍粘子

消毒湯（德生堂方）一名紫花地丁散治惡瘡膿未成已成者腫大等証

紫花地丁（去芦）　金銀花　當歸　大黄（酒浸焙）

赤芍藥　黄耆（各半两）　甘草（一錢）　加升麻

右剉為末作二服每服酒一碗銀石器煎五分服

當歸連翹散（通玄論）治一切風熱癰腫瘡疽咽膈不利舌腫喉閉鼻衄出血咳嗽痰實腸胃燥澁大小便結滯消癰腫解風

毒活血脉保真元宣通遍身結滯

連翹　當歸　大黄　梔子

芍藥　金銀花

右各等分水二盞生姜三片煎至一盞去滓熱服甚者加大黄

一方　治發背惡瘡

瓜蔞（一个）　金銀花　皂角刺（各一两）　沒藥（一分）

甘草節　當歸（各半两）

右每服五錢以酒一碗煎温服加鼠黏子更佳

治七十二等無頭惡瘡

荊芥　枝子（各二錢半）　茯苓　白术

人参（各三分）　川芎　芒硝　大黄

當歸　芍藥　升麻　薄荷

蒼术　連翹　石膏　桔梗

滑石　黄芩（各半兩）黄芪　甘草（各二錢）

右㕮咀病重者一兩輕者五六錢葱白一根并金銀花同煎去滓熱服汗出爲度如疼加乳香咽喉痛加竹葉灯心同煎

藤黄飲子（秘方）治一切丁腫惡瘡癰疽疼痛

大黄（四兩）　甘草　茯苓　牡蠣（生用各一兩）

人參　川芎　梔子　赤芍藥

金銀花（各半兩）木香　白芷（各六錢）當歸（七兩）

右㕮咀每服八錢水二盞煎至一盞温服

加減藤黄飲子（應驗方）治一切癰疽瘡腫

金銀花　黃芪　防風　川芎

羌活　大黃　赤芍藥　薄荷

連翹　麻黃　當歸　石膏

黃芩　桔梗　白朮　白茯苓各八分

荊芥三分　甘草三分　山梔子一分二厘半

人參二分　滑石一分七厘半　芒硝二厘半

右用水二盞生姜三片煎至一盞去滓溫服

漏蘆湯　精義治一切惡瘡毒腫丹瘤瘰癧疔腫魚睛五發瘭疽初覺三日便如傷寒頭痛煩渴拘急惡寒肢節疼痛四體沉重恍惚悶亂坐卧不寧皮膚壯熱大便秘濇小便赤黃並宜服之

漏蘆　白斂　黃芩（去黒心）麻黃

枳實（麩炒去穰）升麻　芍藥　甘草（炙各一錢）

大黃二錢　朴硝一錢

千金漏蘆湯（精要治證同前）

漏蘆　連翹　黃芩　白斂

枳殼（去穰麩炒）升麻　粉草炙　麻黃（去根節各一錢）

大黃一錢半（濕紙煨）　朴硝（別研一錢）

右作一服用水一盞半煎至八分去滓空心熱服

解毒丸（通玄論）治中外諸邪熱毒癰腫瘡疽筋脉拘攣咬牙驚悸一切熱毒蠱宜治之

○已上諸方辛涼內疎之劑

内托復煎散機要癰疽托裏健胃

地骨皮　黄芩　茯苓　白芍

人参　黄芪　白术　桂

甘草　防己　當歸各一兩防風三兩

右㕮咀先以蒼术一斤水五升煎至三升去术入前十二味再煎至三四盞取清汁分三四次終日飲之又煎蒼术渣爲湯去渣依前又煎十二味渣分飲之

神效奪命丹秘方治一切發背疔瘡及破傷風陰傷寒

枯礬一錢　蝸牛二十個焙乾　血竭二錢

銅緑一錢　蟾酥二錢　輕粉二錢　硃砂三錢爲衣

右用小兒母乳汁和丸如梧桐子大硃砂爲衣遇此病令患

人自嚼生葱一二根爛吐出裹藥一丸在內吞下前藥恐藥末嫌逆之狀却以熱酒二三盃送如重車行十里路遍身汗出天氣斟酌衣被蓋易汗出毒氣腫自消如病人昏沉人代嚼葱白如前服

淵然真人奪命丹　專治疔瘡發背腦疽乳癰附骨疽一切無頭腫毒惡瘡服之便有頭不痛者服之便痛已成者服之立愈此乃惡証藥中至寶病危者服之亦可矣萬無一失不可輕易

蟾酥（二錢乾者老酒化）　血竭一錢　乳香

沒藥　銅緑　硃砂（爲衣各二錢）　輕粉半錢

膽礬　寒水石（各一錢）　雄黄三錢　麝香半錢

腦子（半錢無亦可）　蝸牛（二十一箇連殻用）

蜈蚣（一條酒浸炙黄去頭足）

右爲細末將蝸牛研作泥和前藥爲丸如菉豆大若丸不就以好酒煮麪糊爲丸每服只二丸先用葱白三寸令病人嚼爛吐於手心男左女右將丸子褁在葱白内用無灰熱酒三四盞送下於避風處以衣被蓋覆約人行五里之久再用熱酒數盃以助藥力發熱大汗出爲度如汗不出重者再服二丸汗出卽效初覺者二丸卽消三五日病重者再進一丸如疔瘡走黄過心者難治汗出冷者亦死如病人不能嚼葱擂爛褁藥仍以熱酒呑下瘡在上食後服瘡在下食前服服後忌冷水黄瓜茄子油麪猪羊雜肉魚一切發風瘡毒等物及婦

人洗換狐臭犯之難治

蟾酥丸（李俞南方）治一切諸惡瘡已發未發服之微汗即愈

雄黃　乳香（各一錢）蟾酥（一厘）

右三味用黃酒熟麪糊爲丸如菉豆大每服二丸葱汁湯下不退再一服

止痛當歸散（精義）治腦疽發背穿潰疼痛

當歸　黃芪　人參　官桂

芍藥　甘草（炙）　生地黃（各二錢半）

右用水一盞半煎至一盞去滓温服日進三服

内托散　治一切惡瘡疼不可忍神効

甘草（半兩）　御米殼（半兩去頂蒂蜜炙）　乳香

沒藥（各二錢）

右爲細末用雌雄黑豆十枚生姜半兩棗五枚水一大盞半同煎五七沸隨病上下食前後服

乳香散（本事方）治發背肉潰及諸惡毒衝心痛不可忍多令人嘔吐

菉豆（四兩） 乳香（好者一兩）

右同研極細爲末每服三錢新汲水濃調食後服

乳香護心散 治癰疽發背丁瘡防毒氣攻心

菉豆粉（四兩） 乳香（一兩） 硃砂（一錢）

右爲細末每服三錢濃煎甘草湯調下

一方 治癰疽無頭者

用蜀葵花子一粒新汲水吞下須臾即破如要多破服三四粒有驗

透膿散（瑞竹堂方）治諸癰瘡及貼骨癰不破者不用針刀一服不移時而自透累有効驗

蛾口蠒（川出了蛾兒蠒兒）

右將蠒兒一箇燒灰用酒調服即透切不可兩箇三個蠒兒燒服若服一個只一個瘡口服兩箇叅個即兩箇叅個瘡口切莫輕忽

竹葉黃芪湯（精義）治諸癰疽發背煩渴及一切惡瘡發大渴者

淡竹葉（二分半）　生地黃（一兩）　黃芪　黃芩（去腐）

當歸　川芎　甘草　芍藥

人參　麥門冬（去心）　半夏（湯洗）　石膏（各四分）

右用水一盞半竹葉五片生薑五片煎至一盞溫服

內托千金散（瑞竹）治腦背癰疽乳便等惡瘡

人參　當歸　黃芪　芍藥

川芎　甘草　瓜蔞　白芷

官桂　桔梗　金銀花　防風（各七分半）

右用水二盞煎至七分入酒半盞去滓溫服如痛甚者倍加當歸芍藥或乳香二錢日進三服一服之後瘡口內有黑血出者或遍身出汗皆藥之功効如病勢猛惡須秤藥一兩水一大碗煎服未成膿者自散已成膿者不用針砭自透此藥累經功効

黃芪茯苓湯（精義）治諸瘡潰後托裏除虛熱

黃芪　白茯苓　官桂（去皮）　麥門冬

五味子　川芎（各一錢半）

右用水一盞半薑三片棗三枚煎至一盞去滓溫服食前日三服

內補十宣散（精要）治一切癰疽瘡癤未成者自消之已成者速潰敗膿自出無用手擠惡肉自去不用針刀服藥疼痛頓減其效如神

黃芪（鹽湯潤焙）人參　當歸（各四錢）厚朴

桔梗　桂心　川芎　防風

甘草　白芷（各七錢）

右爲細末每服五錢熱酒調服不飲酒木香湯調下

內托散

綿黃芪　甘草　金銀花　牡蠣（煅淬二次各三錢半）

右爲末作一服水一盞煎至七分入酒一盞再煎七分隨瘡上下食前後服

參蘇內托散（李俞甫方）

川芎　當歸　薄荷　甘草（各一錢）

紫蘇（二錢）　苦參（三錢）

右㕮咀用水二鍾棗二枚煎七分服不拘時

神効托裏散（和劑方）治癰疽發背腸癰妳癰無名腫毒焮作惡痛增寒壯熱若傷寒不問老幼虛人並皆治之

忍冬草（五兩去梗）　黃芪（五兩去芦）　當歸（八兩三条）

甘草（炙八錢）

右為細末每服五錢酒一盞半煎至一盞病上食後病下食前少頃再進留滓外傅未成内消已成即潰也

○已上諸方辛温内托之劑

一方　治癰疽發背初起

用獨蒜一片厚二指置患處以熟艾灸二七壯如無獨蒜大蒜亦可

南星膏（濟生方）　治皮肌頭面上生瘡瘤大者如拳小者如栗或軟或硬不疼不痛宜用此藥不可輒用針灸

天南星大者一枚細研調黏滴好醋五七滴和膏如無生

者則以乾者為末醋調如膏先將小針刺腫處令氣透却以膏攤紙上象瘡大小貼之覺痒則頻貼取効

消腫毒方（簡易方）專用塗諸瘡疽

川芎　蚌粉　草烏　海金沙

赤小豆　天南星

右為末用生地黃汁調塗患處

蜀葵膏（直指方）治癰疽腫毒

以黃蜀葵花用鹽摻服入磁器密封経年不壞每用患處傳之如無花根葉皆可用（医方大成）

治發背未潰已潰最有神効

厚朴（二兩姜汁製）　陳皮（二錢去白）　蒼朮（五兩米泔浸）

甘草（二錢）

右入桑黃菰五錢同為末瘡已潰則乾摻之未潰則油塗之

拔毒散　消腫定痛

蒲黃　白芷　半夏　黃丹（各一两）

赤小豆（半兩為末）

右將半夏白芷為末入蒲黃黃丹豆末和勻金銀藤搗自然汁調傅四圍頻頻水潤腫退

拔毒膏（李俞甫方）治腫毒諸惡瘡神効

南皂角　五倍子（各五分）　乳香　沒藥

雄黃（各二分）

右五味各生用為細末用好醋熬貼瘡上留頂

乳香散　止痛消腫

乳香　沒藥　粉霜　輕粉（各一分）

黃米粉（四刄）赤皮葱　蝸牛（十四個三味一處砂碯內炒黑）

右為末津調紅絹留孔貼周圍

敷腫毒未破者

用蝦蟇一個先炒石灰後用剜開炒研泥用絹攤上貼患處自破

拔毒散　治癰腫丹毒肉色变異或著四肢或在胸背遊走不定焮熱疼痛拔毒消腫散熱定疼

石膏（一刄半）寒水石（三兩半）甘草　黃蘗（各半刄）

右為細末水調時復以雞翎刷掃以芭蕉自然汁調妙

水澄膏　治熱毒腫痛大効

黃連　黃栢　白芨　白歛（各四分）

雄黃（一分）　乳香　沒藥（各五分）

右為細末水調雞翎掃在瘡腫處

治一切惡腫及發背高起未破膏藥方

萆麻子（一百粒）　男髮（一塊）

右以熬膏入黃丹成膏貼之只一個便消加黃蠟少許

鐵箍散　治諸般發背瘡癤腫毒杖瘡

用芙蓉花及葉晒乾為細末以好醋敷貼患處如杖瘡赤腫用雞彈清調貼冷水亦可加皂角少許尤妙

一方　治癰疽發背及惡腫毒

飯姜石一斤出淮安清河駉　野西瓜藤　茨菇箭（各四刄）

右為細末用雞清調敷患處如乾汲井花水勤掃妙

一方

用五葉藤即瓜龍搗爛敷患處立瘥

一方　治癰疽未潰

用瓜蔞根赤小豆等分為末以醋調敷之

一方　治發背癰疽丁瘡腫毒吸出膿血惡水此法甚佳

用苦竹筒三五七个長一寸一頭留節薄削去青皮大小用之以蒼术白歛烏桕皮厚朴艾葉茶芽白芨白蒺藜等分為粗末將竹筒并前藥水煮十數沸藥乾為度乘竹筒熱以手按上緊及於瘡口上候膿血水滿自然脫落不然用手拔脫

易換竹筒如此三五次其毒自消即敷生肌藥肉滿後用膏藥即愈

一方

用蜂蜜同葱研為膏先將瘡口撥動或見血或不見血將藥塗在瘡上中留一孔以帛縛定如人行約五里其瘡覺疼更待多時其丁自出然後敷生肌藥忌一切毒物

一方　治癰疽腫毒

用蒼耳根及葉燒灰存性同乾靛以醋和勻塗上乾易之不過十餘次拔出其根

一方

用景天草一名慎火草不拘多少搗取汁塗之

水澄膏　治熱腫毒疼痛

大黃　黃栢　鬱金　白芨

天南星　朴硝　黃蜀葵花（晒乾各一兩）

右為細末每服二錢以新水一種半攪勻候藥澄底去面上浮水取藥攤紙上貼於腫處如覺燥津唾潤之若皮膚白色者勿用　一方只用白芨末半錢水碗內沉下澄去水脚於皮紙上攤貼瘡上亦名水澄膏

圍藥　治諸般腫毒傅上消散

用黃栢白芨草烏南星白芷天花粉石膏鬱金甘草貝母大黃木鱉子皂角刺各等分為細末用雞清調傅神効加石灰尤妙

針頭散　治瘡疽臖腫如木硬者

蟾酥　麝香各一錢

右同研極細以人乳汁調和如泥入甆合內盛乾不妨每用少許以唾津調敷扵腫處更以膏藥貼之其毒氣自出不能為瘡雖成瘡亦輕

針頭散通玄論　治惡瘡追毒去死肉

人言一錢　雄黃半錢　乳香一錢　麝香少許

右為細末每用少許以唾塗瘡上用膏藥貼之

桃花散通玄散　治一切惡瘡去死血生肌肉去風活血

龍骨　虎骨各二錢　白芨　白歛

烏魚骨　赤石脂　白石脂各一錢　黃丹少許

寒水石（用炭火燒赤放冷一兩六錢）

右為細末量大小貼之立効

生肌散　治癰疽瘡毒歛口生肉

赤石脂　海螵蛸　龍骨（各一兩）乳香

沒藥　血竭（各一錢）輕粉（一錢）朱砂

鬱金　黃丹（飛過）　黃連　白芷（各五錢）

右為細末糝瘡口上用燈心數莖却用膏藥貼之

木香散　治瘡口久不歛者

木香　檳榔（各一錢）黃連（二錢）

右為細末摻瘡上如痛加當歸一錢

[illegible]生散　一切腫毒癰疽生肌肉

用寒水石不拘多少以塩泥包裹火煆黃丹少許水飛過用

皮紙襯於火上烘乾為度研細末糝瘡上

洗毒散 通玄論治諸般惡瘡風濕陰蝕瘡並宜此洗之

用蛇床子地骨皮地丁麻黃荊芥防風枯礬各三錢

右用水三碗葱白三根煎至二碗無風處洗

軟青膏 治一切風熱瘡及小兒頭瘡

巴豆十个 瀝青 黃蠟 香油各五兩

膩粉一錢

右先將瀝青香油黃蠟熬次入巴豆不住手攪候巴豆焦黑

色去巴豆却入膩粉令勻放冷敷瘡上

神仙太乙膏 治八發癰疽及一切惡瘡軟癤不問年月深遠

已成膿未成膿並宜貼之如蛇虎傷蝎螫犬咬湯火刀斧所傷打撲跌損者無不可治如發背先以溫水洗瘡淨用無縫軟帛拭乾却用緋絹帛子攤膏藥貼之其膏藥可收十年不壞愈久愈烈可用磁罐盛之

玄參　白芷　川當歸（去芦）　肉桂（去粗皮）

大黃　赤芍藥　生乾地黃（各半兩俱剉）

右用麻油一斤浸春五日夏三日秋七日冬十日濾滓油熬得所下黃丹半斤滴油在水聚為度

善應膏（應驗）方治一切癰疽腫毒發背腦疽漏瘡瘰癧子金瘡便毒癰瘡及小兒頭瘡丹毒寒濕冷痹肢節疼痛手足頑麻打撲傷損　內脞瘀血蜈蚣咬蝎螫婦人乳癰月間敗血臍腹

疼痛並用此拔散毒氣立効如再發癢瘡腫然後貼藥

黄丹（半斤水飛）沒藥　乳香（各二錢半）白斂

木鼈子（去皮）白芨　當歸　官桂

杏仁　白芷（各二錢）血碣（錢二分半）槐枝（一两二錢半）

柳枝（一两二錢半條三十）真麻油（一斤四两）

右件十味內除丹乳沒碣外七味剉碎入油浸三日文武炭火鍋內熬黄色濾出粗藥方下黄丹以新柳枝長五六寸如小錢大攪勻令熬丹褐色掇下鍋子在地却用柳枝攪藥出盡烟方入乳香沒藥血碣入鍋內仍用柳枝攪勻三五十遍候藥冷傾在甆器內盛春二月間合如常貼用

千槌膏　治一切無名惡瘡

萆麻仁（四十九粒）杏仁　山豆仁　胡桃仁（各四十九个）

楓香脂（四兩）加乳香沒藥（各二錢半）

右為一處搥一千下成絲者新水扙之為度

乳香善應膏　治癰疽發背諸般惡瘡打撲傷損筋骨疼痛並皆治之

乳香　沒藥　血竭（各五）　阿魏（三錢）

麝香（一錢另研）　大黄　黄連　黄栢

防風　荊芥　芍藥　白芷

玄參　當歸　連翹　巴豆

蘇木　大楓子（各一兩）　木鱉子（八个）川山甲（八片）

黄丹（一斤水飛过）胡桃仁（四十九个）　清油（二斤）

右將乳香等五味另研如末將前藥剉碎入清油内煎令黑色濾去渣入黄丹不以手攪成膏却入前五味藥末再攪令匀攤貼患處

青金九龍膏　治癰疽瘡毒

香白芷（如棗大者）　巴豆（去殼）　萆麻子（去殼）

木鱉子（去殼各一百二十个）槐條　柳條（各一百二十寸）

乳香　没藥（各三钱）白礬（五錢）　黄丹（二十两）

香油（三斤）

右將前藥同香油煎以槐柳條不住手攪滴水中成珠方濾去渣再煎却下黄丹攪匀將白礬逐時入内後下乳香没藥攪匀務要煎熬得法然後收貯攤貼忌婦人雞犬見之

千槌膏

瀝青一斤六刄 杏仁四十九个 乳香 沒藥各一両

輕粉二錢 香油五刄 黄蠟四刄

右將瀝青香油黄蠟同鎔化攪勻却入前四味取出於石上槌千餘下用紅絹攤貼之

綠膏藥 治諸般惡瘡腫毒軟癤

銅青 蓖麻子去殼各一両 松香四両

木鱉子去殼五十个 杏仁五錢 巴豆五箇

乳香二錢 輕粉五十貼

右各為末搗令勻於淨石上用斧槌千餘下成膏收貯水浸旋用

紅膏藥　治臁瘡及諸瘡毒湯火金瘡等傷

黄蠟（一两）　香油（三錢）　黄丹（半两）

右先以黄蠟鎔化次下香油黄丹攪匀再熬以磁鑵收貯臨用攤貼

妙應膏　治瘰癧一切惡瘡腫毒及杖瘡

桃柳槐枝（各半斤）　當歸（一两）　木鱉子（去殼半两）

黄丹（一斤）　乳香　沒藥（各半两另研）

右先將香油三斤慢熬次下桃柳槐枝木鱉子當歸候焦濾去渣待冷方下黄丹乳香沒藥以槐條攪匀再以慢火熬不住手攪滴水成珠不散為度以磁瓶收貯旋攤用

○已上諸方外消之劑

忍冬酒　癰疽發背初發不問何處或眉或頤或頭或項或腰或脇或手足及婦人乳癰當服此藥神効

忍冬藤（五两搥碎不可犯鉄器）大甘草節（一两生用）

右同入砂鑵内以水二碗文武火慢煎至一碗入好酒一大碗再煎數沸去滓分作三次温服一日一夜喫盡如病重一日一夜要服两剤候大小腸通利則藥力到若無生藤乾者亦好若取忍冬葉研爛入白酒少許調和敷疽瘡四圍中留一口洩其毒氣亦妙

遠志酒　（三因方）治一切癰疽發背癤毒

用遠志一味洗净去心焙乾為末酒調二銭澄清服之以滓傅患処

一聖膏楊氏家藏方治發背發腦一切惡瘡

甘草（半兩為粗末）　沒藥（研二錢半）　大瓜蔞（一枚去皮）

右用無灰酒二升煮至一升放温頓服如一服不盡作三次

一方　治癰疽發背疔瘡

野紅花（即小薊草）　五葉草（即五爪龍）

豨薟草　大蒜（一箇）

右擣爛用好熱酒一碗調汁服之立効

一方　治發背癰疽惡瘡丁腫疥癬及遍身生瘡如蛇頭者

用生白礬一兩為末黃蠟七錢鎔開和勻為丸如梧桐子大

每服十丸至二三十丸不拘時米飲送下溫熟水亦可如瘡

未破則內消如已破則便合若服金石藥中毒宜服此藥最

如欲治咳嗽化痰用人参五味子湯臨卧吞下

一方　治癰疽疔腫惡瘡及黄疸

用茨菇蓮根同蒼耳草等分搗爛以好酒一鍾濾汁温服若

以乾末每服三四錢温酒調服

一方　治癰疽腫毒一切惡瘡

豨薟草（一兩）　蚕繭（七箇燒）　乳香（一錢）

右為末每服二錢熱酒調服如毒重連進三服得汗妙

○已上諸方專治之劑

救苦散（和劑）方治便癰疽冷物

大黄　桔梗　金銀花　黄芩

甘草　梔子　紫花地丁（各等分）

右㕮咀每服一兩酒半碗煎隨瘡上下服

五聖散聖惠方治症同前

瓜蔞（一箇）　生薑（一兩）　大黃（一兩）　皂角刺（二兩）

甘草　金銀花（各一兩）

右㕮咀每服一兩水酒各一盞煎至一盞去滓露一宿空心服

又方　治症同前

猪牙皂角（七箇燒存性）　梔子（七箇燒）　川山甲（七箇燒）

油胡桃（七箇去殼）

右為末作一服空心調下用酒

又方　治症同前

木鱉子（七箇去殼）　甘草　荊芥　當歸尾（各一兩）

右㕮咀水酒煎露空心服併進三服成膿亦散　一方鼠黏子二錢炒細末入蜜一匙净朴硝一匙温酒空心服亦効

一方蜈蚣三條搗碎好酒調服有膿即散　一方牙皂為末南星生姜搗爛濕貼上

又方　治症同前

大黄　梔子　貝母　川芎

白芷　牡蠣　大瓜蔞　當歸

右煎法如前

又方皂角膏

皂角（炒焦）　韶粉

右等分和匀以熟炒醋調仍以紙攤患處貼頻頻以水潤之

即效

治便毒　不問日久有膿者其効如神

大黄　梔子　木鱉子（去殼）皂角

牡蠣　地丁　連翹　甘草（各一兩）

右㕮咀酒水煎露一宿空心服之以利為度

治毒散（聖惠方治便毒）

當歸　甘草　大黄（各五錢）金銀花（少許）

右㕮咀水酒各一盞煎至一盞去滓露一宿溫服之

消毒飲　治便毒初發三四日可消

皂角刺　金銀花　防風　當歸

大黄　甘草　瓜蔞仁（等分）

右㕮咀水酒各半煎食前溫服仍頻提掣頂中髮立效

○已上諸方治便毒之劑

丹溪心法

○腸癰　大腸有痰積死血流注　桃仁承氣湯加連翹秦艽　近肛門破入風者難治防風之類

附脉理

脉訣舉要曰腸癰難知脉滑可推數而不熱腸癰何疑遲緊未膿下以平之洪數膿成不下為宜

附諸方

桃仁承氣湯　見吐血

復元通氣散　拔粹方　治諸氣澁耳聾腹癰便癰瘡疽無頭止痛

消癰

青皮　陳皮（各四两）　川山甲（炮）　瓜蔞根（各二两）

加金銀花（一两）　連翹（一两）　甘草（三两生熟各半）

右為細末每服二錢熱酒調下

治腹内癰腫

大黄（一两取末四錢半）　破故紙（一两取末二錢）

牛旁子（一两取末一錢）　牽牛（一两取末二錢半）

右和作一服蜜水調空心服以利為度

丹溪心法

○乳癰　乳房陽明所經乳頭厥陰所屬乳子之母不知調養怒忿所逆鬱悶所遏厚味所釀以致厥陰之氣不行故竅不得

通而汁不得出陽明之血沸騰故熱甚而化膿亦有所乳之子膈有滯痰口氣焮熱含乳而睡熱氣所吹遂生結核扵初起時便須忍痛揉令稍軟吮令汁透自可消散失此不治必成癰癤治法踈厥陰之滯以青皮清陽明之熱細研石膏行汙濁之血以生甘草之節消腫導毒以瓜蔞子或加沒藥青橘葉皂角刺金銀花當歸或湯或散或加減隨意消息然須以少酒佐之若加以艾火兩三壯扵腫處其效尤捷不可輒用針刀必至危困若不得扵夫不得扵舅姑憂怒鬱悶昕夕積累脾氣消阻肝氣橫逆遂成隱核如大棊子不痛不痒數十年後方為瘡陷名曰妳岩以其瘡形嵌凹似岩穴也不可治矣若扵始生之際便能消釋病根使心清神安然後施之治法亦有可安之理

又方

乳癰方

青皮　瓜蔞　橘葉　連翹

桃仁　皂角刺　甘草節　如破多加參芪

右以水煎入酒服

乳癰妳勞焮腫

石膏（煅）　樺皮（燒）　瓜蔞子　甘草節

青皮

右以水煎服

治乳有核

南星　貝母　甘草節　瓜蔞各一兩

連翹（半兩）

右以水煎入酒服

又方

人參　黃芪　川芎　當歸

青皮　連翹　瓜蔞　白芍

甘草節　（乳岩小成加柴胡川芎）

右以水煎入酒服

乳硬痛

沒藥（一錢）　甘草　當歸（各三錢）

右作一服水煎入酒少許熱飲

吹妳

金銀花　天蕎麥　紫葛藤（等分）

右以醋煎洗患處立消如無天蕎麥子葛藤只金銀花亦可

乳粟破　少有生必大補

人参　黄芪　白朮　當歸

川芎　連翹　白芍　甘草節

右以水煎服

附諸方

秘傳湧泉散應驗方治乳婦氣脉壅塞乳汁不行及經絡凝滯

妳乳脹痛或作癰腫

王不留行　白丁香　漏蘆　天花粉

白殭蚕　川山甲（火煅黄色各七分）

右為細末每服四錢用猪蹄湯調下

秘傳金銀花散應驗方治乳脉不行結成癰腫疼痛不可忍者

金銀花　當歸　黃耆（蜜炙）　甘草（各二夂半）

右作一服水二鍾煎至一鍾入酒半鍾去滓温服食後

橘香散圣惠方治乳癰未結即散已結即潰極痛不可忍者藥下即不痛神効盖因小兒吹乳変成

陳皮（不拘多少湯浸去白白乾麪炒黃）

右為末射香研酒調下二錢

治婦人吹乳奇効

用大車頭邊油垢丸如梧桐子大每服五十丸温酒下

勝金丹　治吹乳

用百齒而相即梳上髮垢是也丸如梧子大黄册為衣每服三丸倒流水送下服後如患左乳左卧右乳右卧温覆出汗倒流水者取水傾屋上流下是

瓜蔞散　治乳癰妳劳

瓜蔞一个去皮焙　甘草生三錢　乳香一分另研

當歸酒浸焙半兩　沒藥二錢另研

右用無灰好酒三升銀石器内慢火熬取一升清汁分作二服飲之

通和湯　治乳癰疼痛不可忍者

穿山甲炮黄川木通各一兩自然銅半兩醋淬七次

右為細末每服二錢熱酒調食遠服之

一方　治乳癰無名腫毒初起

用五葉藤（即五爪龍）不拘多少生姜一塊好酒一碗擂爛去渣熱服汗出為度仍以渣敷患處

一方

用新栢葉去枝梗一握洗净以朴硝一勺同入臼内杵之旋加清水紐取自然汁半碗先令病人飲三兩口仍用雞翎蘸汁掃於患處中間留一眼四邊頻頻掃之其腫自消

一方

用生地黄擂汁塗之一日三五次立効

○廣按丹溪云癰疽之証陽滯於陰脉浮洪弦數陰滯於陽脉沉細弱濇陽滯以寒治之陰滯以熱治之此乃治癰疽

[illegible]大法也謹陳其旨夫所謂陽者氣也鬱而為火無形之物也陰者血也鬱而為痰有質之物也陽無形故浮而在表淺而大所謂癰也陰有質故沉而在裏深而惡所謂疽也癰脉浮洪弦數陽之象也疽脉沉細弱澁陰之象也癰屬氣滯於血疽屬血滯於氣總而言之皆是熱勝血也治癰以寒藥是正治之法也治疽以熱藥是從治之法也夫藥性熱則開行性寒則疎泄疽乃有形之陰非熱藥從治豈能開行之乎此古人用藥內踈內托乃正治從治之義也

疔瘡七十八

丹溪心法

○疔瘡用針刀鎞破頭上以蟾酥敷之後用菉豆野菊莎末酒

調飲醉時覺即痛定熱除不必去疔自愈也　治一切疔瘡用紫梗菊花根莖葉皆可研碎取汁滴口中飲之

○瘰癧　血氣痰熱　以牡蠣煆過為末玄參搗膏為丸桑椹黑熟者搗汁熬膏湯調服紅者晒乾為末湯調服　師云大田螺連肉燒灰存性為末入麝香少許濕則乾敷乾則油調敷夏枯草大能散結氣而有補養血脈之功能退寒熱虛者儘可倚仗若實者以行散之藥佐之外施艾灸亦漸取効

入方　治瘰癧

海藻（洗去沙土晒乾）　昆布（澡去土同上二味先研為末）

何首烏（木臼搗為末）　皂角刺（炒令黃色）

公蛇退（樹上或墻上是雄用一條平地上者是雌）

右五味為細末和勻一處豬項下刀口肉燒熟蘸前藥末吃
食後倒患處眠一伏時每核灸七壯口中覺烟起為度膿盡
即安初生起時灸曲池男左女右

附諸方

寶鑑保生挺子　治疔瘡背疽瘰癧一切惡瘡
金脚信　雄黃　硇砂各二錢　麝（一錢）
輕粉（半大匣半大盞）　巴豆（四十九粒文武火炒研）
右為極細末用黃蠟五錢溶開將藥合成挺子冷水浸少時
取出旋丸捏作餅子如錢眼大將瘡頭撥開安一餅子次用
神聖膏貼後服托裏散若瘡氣入腹危者服破棺丹

神聖膏　治一切惡瘡

當歸　藁本（各半兩）沒藥（二錢）黃丹
黃蠟（各二兩）乳香（一錢）琥珀（二錢半）膽礬
粉霜（各一錢）白膠香（三兩）清油（二斤）木鱉子（五十箇去皮）
巴豆（十五箇去殼）槐枝　柳枝（各一百二十條）

右件一處先將槐枝柳枝下油內熬焦取出不用後下餘藥熬至焦黑亦漉出不用將油澄清下黃丹再熬成膏用緋帛攤之立効

千金托裏散　治疔瘡發背一切惡腫

官桂　人參　甘草　川芎
白芷　芍藥（各一兩）木香　沒藥（各三錢）
乳香（二錢）當歸（半兩）連翹（一兩二錢）黃芪（一兩半）

防風　桔梗　厚朴（各二两）

右十五味為細末每服三錢酒一盞煎三二沸和渣温服無時

破棺丹　治瘡腫一切風熱

大黄（二两半生半熟）　芒硝　甘草（各一两）

右為末煉蜜丸如彈子大每服半丸食後茶清温酒任化下童便半盞研化服亦得忌冷水

○已上数方治疔瘡次第之劑

蟾酥丹（危氏方）治疔瘡

蟾酥（不拘多少）

右以黄丹白麪等分搜和為丸如麥粒大針破疔瘡以一粒内之　又方单用蟾酥每用粳米大重針瘡口納入輕者不

須針用水澄膏用白芨末半銭水盞內澄去水脚於皮紙上攤開貼瘡上　聖惠方取蟾酥油調封瘡口立効

蟬蛻散　聖惠方治疔瘡最有功効

蟬蛻殻　白殭蚕（各等分）

右為末酸醋調塗四圍留瘡口候根出稍長然後拔根出再用藥塗瘡　一方不用醋只用油調塗　一方用蟬蛻為末蜜水調半碗服之及以津唾調搽瘡上即愈

一方　治疔腫初發

用蒼耳根莖苗子一色者燒灰為末用醋泔調塗瘡上毒根即出或藍靛調尤好　一方用蒼耳草一大握生姜四兩同研爛入生頭酒一碗去渣熱服大汗即愈仍用渣傳瘡

回生錠子　精義方　治疔瘡

草烏（去皮尖十二兩）　麝香（一字用當門子）

蟾酥（七粒粳米大）　巴豆（七粒去皮）

右為末麪糊丸作錠子如有疔瘡先鍼刺至痛見血用此錠子紝入用膏藥貼之重者於疔瘡四面紝之三二日根自拔下藥最宜緊用

立馬回丁丹　治疔瘡走亂下止

金脚信　蟾酥　血竭　硃砂

沒藥（各五分）　輕粉　片腦　麝香（各一字）

右為細末生草烏頭汁為錠如麥子長大用時將瘡頭刺破納入一錠第二日瘡腫為効以膏藥貼之

俞楔　一名紫金錠子　治疔瘡諸惡腫毒

續隨子（五兩）川烏頭　甘草（各二兩）蟾酥

雄黃　白礬（各一兩）麝香（二錢半）辰砂（一兩五錢）

片腦（二錢）　人言　輕粉（各五錢）桔梗（一兩五錢）

黃連（一兩三錢）白丁香（三錢）巴豆（四十九粒去殼油心膜）

右各為細末再入乳鉢内挼蟾酥巴豆同研匀麪糊丸成錠子如指彈大陰乾如遇諸瘡以井花水磨塗瘡上如乾再搽

飛龍奪命丹　聖惠方治一切惡疔瘡

人言（二錢半）斑猫（十二箇去足翅）巴豆（十二箇去殼油）

硃砂（三錢）　硇砂　硼砂　乳香

沒藥　黃丹（各二錢）南星（水洗）半夏（水洗各一錢）

血竭（二錢）　麝香（一錢二分半）

右為末蟾酥汁為丸如紅豆大五分内分一分加入斑貓四箇然後捻成錠子如小麥大每一瘡針破下一錠子用飯粘白紙封口用前四分内一丸噙在舌上覓麻凉水吞下忌熱物片時如蟾酥乾用人乳汁化開　一方用雄黄二錢

○已上数方疔瘡外治之剂

一方　治疔瘡

用白芷二錢生薑一两同擂爛熱酒一碗調服出汗立効

鐵柱杖　治疔瘡發背頭風

用草烏頭不拘多少去皮净為末用葱白去鬚葉擣爛為丸如豌豆大以雄黄為衣每服一丸先將葱細嚼熱酒送下或

有悪心吐三四口用冷水一口止之即卧以被厚盖汗出為度

返魂丹（瑞竹）治十三腫疔瘡

硃砂　膽礬（各一錢半）血竭　銅緑

蝸牛　雄黃　白礬（枯各二錢）輕粉

沒藥　蟾酥（各五分）麝香（少許）

右將七味為末和擣蝸牛蟾酥極爛和藥時旋入藥内為丸如雞頭大每服一丸令病人先嚼葱白三寸吐在手心將藥丸裹在葱白内用熱酒一盞吞下如重車行五里許有汗出即瘥如不能嚼葱研爛裹藥下　曾有一僧貨此藥極有効子自合救人累獲効驗真妙方也

寸金丹　治疔瘡　又名返魂丹再生丹延命丹延壽丹來甦

丸得道丸此藥嚥下即活

辰砂（二分半） 蟾酥 輕粉（各五分） 枯礬

寒水石 銅青（各一錢） 海羊（二十箇即蝸牛）

麝香（一字）

右為末研蝸牛一處搗爛丸如菉豆大每丸添酒成之病輕者二丸重者三丸未効再服服法先嚼葱白一大口極爛置手心中放藥在内裹熱酒下暖處卧汗出即愈忌冷水

○已上數方疔瘡辛温内托之劑

治魚臍疔瘡（醫方大成）

虞刺葉（即系瓜葉） 連鬚葱 韭菜

右入石鉢内研末如泥以酒和服以滓貼腋下如病在左手

貼左腋下在右手貼右腋下在左脚貼左胯在右脚貼右胯如在身中則貼心臍並用帛縛住候肉下紅線處皆白則可為安如有潮熱亦用此法却令人抱住恐其顛倒倒則難救矣

一方　治疔瘡

用菊葉一握擣爛取汁灌入口即活用根亦妙

一方　治疔瘡

土蜂窠（一小窠全）　蛇蜕（一條全）

右作一處納瓦器中以黃泥封固火煅存性研為細末空心酒調服一錢少頃腹中大痛痛止其瘡化為黃水仍服五聖散

五聖散

大黃　生姜　金銀花　甘草（各一兩）

瓜蔞（一箇） 皂角針（二两）

右㕮咀每服一两用好酒二盞煎至一盞温服

破棺丹（瑞竹） 治疔黄走舋不止

甘草 京三稜（各二錢） 山梔子 牵牛（各一錢半）

地丁 連翹 金銀花 牡蠣（各一錢半）

瑞竹堂加大黄（三錢半） 赤芍藥 當歸（各二錢）

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸用童子小便化開

服之食前忌酒并生冷硬物

治疔瘡（醫方大成）

黄連 羗活 白殭蚕 青皮

獨脚茅 防風 赤芍藥 獨活

蟬蛻　細辛　甘草煎（各等分）

右㕮咀每服五錢先將一服入澤蘭葉少許姜一兩同研爛熱酒和服然後用酒水各半盞姜三片煎服熱不減後再加大黃少許煎服畧下一兩湯蕩去餘毒更用白梅蒼耳子研末貼瘡上拔去根脚此方以藥味觀之甚若不切然效驗神速留試之驗

○已上數方乃瘡辛凉內踈之劑

連翹丸（濟生方）治瘰癧結核已破或未破者

薄荷（新者二升製取汁）　皂角（一挺水浸去皮製取汁）

以上二味一處於銀石器內熬成膏次入

青皮（一兩不去白）皂角子（慢火炮去皮取皂子仁擣羅為末半兩）

陳皮（一两不去白） 連翹（半两） 黑牽牛（一两半半生半炒）

右五味為末用前膏子為丸如梧桐子大每服二十丸前連翹湯食前送下

治瘰癧（揚氏家藏方）

斑猫（二十八箇去頭翅足用糯米炒） 荊芥穗

殭蚕 黑牽牛（各三錢）

右為末臨睡時先將滑石末一錢用米飲調服半夜時再一服五更初却以温酒調藥一錢服訖如小便無悪物行次日早再進一服又不行第三日五更初先進白糯米稀粥湯却再進前藥一服更以燈心湯調琥珀末一錢服之以小便内利去悪毒乃為愈矣

一方　治瘰癧（張子和方）

白殭蚕（去絲直者）　白丁香（直佳）　斑猫（去翅足）

磨刀泥　苦丁香　赤小豆（各等分）

右為末十歲以上每服一錢二十歲已上服二錢病人不要吃晚飯五更時用新汲水一盞調服至辰時見効男子大便中女人小便中利下赤白色二三次或膿血如鼠狀為効當日食粥不得吃別物忌油膩患三四年者只一服七八年者再一服

尅效散　治瘰癧子癧

官桂　硇砂（各半錢）　赤小豆　粳米（各四十九粒）

斑猫（四十九箇不去翅足）

右五味研為末初服一字次服二字次服三字次服四字煎商陸根湯送下空心服小便淋瀝為効如惡心嘔吐黄水無妨瘰癧日日自消矣

無比丸　治瘰癧

白术　梹榔　防風　牽牛（半生半熟）

蜜陀僧　郁李仁（泡去皮）　斑猫（糯米炒各等分）

右為末麪糊丸如梧桐子大每服二十丸空心臨卧甘草梹榔湯送下至一月後覺腹中微痛於小便中取下癧子毒如魚眼大已破者自合未破者自消有驗

一方　治瘰癧

用斑猫一两去翅足以粟米一升炒黄色去米細研入薄荷

末四兩以雞彈清丸如菉豆大空心臘茶湯下一丸每日加一丸加至五丸每日減一丸減至一丸又每加一丸加至五丸後每日仍服五丸

一方　治瘰癧

用烏雞彈一箇頂上開一竅攪清黃令勻以斑猫一箇去頭翅足入雞彈中以細糊封之飯上蒸熟剝去殼去斑猫空心喫雞彈一日一箇以瘥為度

一方　治瘰癧

雄黃　鬱金各五錢　巴豆去油殼半錢

斑猫去頭翅足　糯米炒七箇

右為末麪糊為丸如菉豆大每服五七丸臨卧以冷茶清送下

五香連翹湯（精要）治一切惡核瘰癧癰疽惡腫等病

舶上青木香　沉香　乳香

丁香　麝香　升麻　獨活

桑寄生　連翹　射干　木通（去節各七分）

大黃（蒸一錢）

右用水二盞煮取一盞以上去滓取八分清汁空心熱服半日以上未利再喫一服以利下惡物為度未生肉前服不妨以折去毒熱之氣本方有竹瀝芒硝恐泥者不能斟酌故缺之知者自當量入　一方有黃耆藿香無獨活麝香一名五香大黃湯

玉燭散　治瘰癧和血通經服之自消日進一服七八日功効

方見婦人門

東垣升陽調經湯　治瘰癧遶頸或至頰車此皆出足陽明胃經中來若瘡深遠隱曲肉底是足少陰腎經中來乃戊脾傳於癸腎是夫傳與妻俱作塊子堅硬大小不等並皆治之或作丸亦可

升麻（八錢）　葛根　龍膽草（酒製）　酒芩

莪朮（酒洗炒）　三稜（酒炒）　甘草（炙）　黃連（酒洗）

連翹　桔梗（各三錢）　生黃芩（四錢）　歸稍

芍藥（各三錢）　黃栢（酒炒二錢）　知母（酒洗炒一兩）

右另秤一半作末煉蜜為丸菉豆大每服百餘丸一半作㕮咀每服五錢若能食大便硬可旋加至七八錢水二盞先浸

半日煎至一盞去滓臨卧熱服足高去枕仰卧嚥一口作十次嚥下留一口在後送下丸藥服畢其卧如常

○已上數方療癧内消之劑

太乙膏 治癧子瘡神効

腦子（一錢研）輕粉　乳香（各二錢研）射香（三錢研）

沒藥（四錢研）黄丹（五両）

右用清油一斤先下黄丹熬用柳枝攪又用葱兒葱七枝先下一枝熬焦再下一枝葱盡為度下火不住手攪覷冷熱得所入腦子等藥攪匀磁器盛之用時旋攤

一方

用瀝青萆麻子去殼同研成膏先用葱椒湯洗瘡淨以紅絹

攤膏貼患處

一方

用石灰一塊自辰時晒至午時將瀝青搥細杏仁四十粒单麻子十四粒同搗成膏依前攤貼

一方

用白膠香一两磁器内鎔開去滓再鎔以萆麻子六十四粒研爛入膠内更入油半匙熬匀滴水中試軟硬得所量瘡大小以絹帛攤貼先以葱椒湯洗瘡淨後貼一膏可治三五瘡并治惡瘡軟癤皆効

一方

用荆芥煎湯待冷洗瘡淨踈黑紫處以針刺破却用雄黄樟

腦為末清油調搽三四次候黃水出處仍取未見日蚯蚓糞

如雞彈大一塊火为燒紅川山甲九片或十一片微炙為末

入乳香沒藥少許香油調搽妙

一方

梧桐淚（一錢半）巴豆去皮油皂角刺（各一錢）

右為末於淨室中勿令人見以不語唾調和捻成錠子如黃重糞大陰乾每用先刺開瘡入藥一錠已潰者就內入藥用紙封之勿令透氣待膿水出或有便塊在內擠出惡物瘡口自斂即愈忌生冷油膩葷腥麪食

又方

以羊骴髭燒灰末摻未破香油調傅已破乾摻

又方

用夏枯草不拘多少於鍋內煮爛除草將汁熬膏貼之

治項上生瘰癧瘡未破灸法

以男左女右中指屈過用草量中節橫紋名為同身寸量三寸半為則於手板盡處量三寸半臂中立穴灸兩三壯半月癧處水如泥惡物盡膿流出後以膏貼之妙

○已上数方瘰癧外散之劑

諸瘡七十九

丹溪心法

○金瘡　五倍子紫蘇等分

又方　白膠香三錢龍骨一錢

金瘡狗咬

五月五日午時用陳石灰一斤搗為末韮一斤搗汁和成餅陰乾為細末敷之

治陽証腫毒并金瘡

大粉草剉碎用竹筒一段割去青兩頭留節節上開一竅入粉草在內滿後用油灰塞孔竅從立冬日放糞缸內待立春先一日取起竪立在有風無日陰乾二十一日多最好却破竹取草為細末用傅金瘡乾者水調

附諸方

花蘂石散（和劑方）治一切金刀所傷打撲傷損身体出血者急於傷處掺藥其血自化為黃水（方見損傷類）

一方　治金刃所傷一切臁瘡良馬新梁等瘡

用冬月黑牛膽一个裝新石灰四兩白礬一兩陰二十七日待乾取出再用黃丹一兩另炒紫色研細同一處再研勻敷瘡即差

刀箭藥　治金刃跌撲狗咬湯火所傷

端午日採一去草花蕋擇嫩者搗爛量入舊石灰搗極勻或丸或餅陰乾碾為末濕則摻之乾則油調搽

一方

用初生小鼠同石灰搗勻陰乾傅金刃跌撲出血甚妙

如聖散（秘方）治一切金刃所傷血不止牙關緊急皆治大有効驗

香白芷　川芎　防風去芦各五分

細辛（五錢）　雄黃（三錢半）　蒼朮（米泔浸一宿去皮二兩）

草烏（去皮臍四兩）　兩頭尖（去皮臍四錢）

右為極細末血不止乾貼破傷風牙関緊急用熱酒一盞調服一錢又貼破處風牙疼乾擦之流涎即愈狗咬蛇傷煎鹽湯洗凈乾貼用熱酒調半錢服如重車行五里並服三服如重服一錢小兒量力減服多年不效惡瘡煎葱白鹽湯漿水口漱洗去膿血一二次拭乾貼一切蜂蝎小蟲所傷唾調於痛處貼之婦人產後敗血上衝下注熱酒服一錢調忌腥葷麪食滋膩之物

丹溪心法

○湯火瘡　臘月猪膽塗黃栢炙乾為末傳之

湯燒　以淋了第二次灰柤傅患處

火澆

桐油（二錢）　水（二錢）

右二件以桃柳枝不住手攪成膏再入少水溶外用猫兒肚底毛紙剪摻上

附諸方

治湯火傷未成瘡者

用小麥炒黒為度研為末膩粉减半油調塗之

赤石脂散（経驗方）治湯火所傷赤爛熱痛

赤石脂　寒水石　大黄（各等分）

右為末以新汲水調塗傷處

治湯火所傷

用大黃當歸各等分爲末以清油調傳之濕則乾摻之

冰霜散　治火燒損傷熱油澆傷皮爛肉大痛

寒水石（生）　牡蠣（煅）　明朴硝　青黛（各一兩）

輕粉（一錢）

右爲末新水調或油調濕貼乾則痛處即止如神

治火傷

凡被火傷急向火炙雖極痛强忍一時即不痛慎勿以冷物激之熱不出爛人筋肉

一方　治火傷

以杉木皮燒灰存性爲末濕用乾摻乾用雞清調塗

治湯盪火燒瘡立効

用擣猪毛燒灰香油搽患處

四黃散（澹寮）治湯盪火燒熱瘡連痛

大黃　黃連　黃蘗　黃芩

白芨（各等分）

右爲末水調成膏以雞翎時塗瘡上

治湯火瘡（澹寮方）

用螺螄殼多年乾白者火燒爲末如瘡破用乾糝之如不破

輕粉清油調傳之

丹溪心法

○下疳瘡

蛤粉　蠟茶　苦參　蜜陀僧

右爲末河水洗淨臘猪油調傅　兼治臁瘡

又方

米泔水洗瘡淨用頭髮以塩水洗淨去油再用清湯洗晒乾燒灰傅瘡上即時生靨

附諸方

治下疳

用黃栢以磁尾割下細末同蛤粉末等分搽上即愈蓋黃栢去熱蛤粉燥濕故也

又方

用米泔水洗瘡淨以雞肶胵內黃皮焙乾爲細末傅之

又秘方

用鍛明白膠香爲末入輕粉麝香少許乾搽乾則用油調傳

立効方（瑞竹堂方）治下疳

灯草灰入輕粉麝香少許乾貼

治下疳（秘方）

旱田螺（燒灰）　腦子　麝香　輕粉（少許）

右爲末香油調傳患處即愈

下疳藥（聖惠方）

用五倍子爲細末先以漿水洗淨瘡乾貼

治下疳妬精瘡（秘方）

七月七日採鳳眼草燒灰淋水洗之

詑粉散 治下注疳瘡蝕臭腐爛疼痛不可忍者

黃栢（蜜炙） 密陀僧 黃丹 高末茶

乳香（各三錢） 輕粉（一錢半） 麝香（少許）

右為末用葱湯洗瘡後次貼此藥兼治小兒疳瘡

下疳瘡洗藥

黃連 黃栢 當歸 白芷

獨活 防風 朴硝 荊芥

右等分水煎熟入銅錢五十文烏梅五箇塩一匙同煎溫洗五日五七次用下藥敷

木香 檳榔 黃連 銅青

輕粉 枯礬 螵蛸各等分 麝（少許）

右為極細末洗後至夜敷上

黄連散　治下疳

黄連　黄柏各（二錢）　蜜陀僧　輕粉

黄丹　没藥各（五分）

右為細末瘡濕乾搽瘡乾香油調搽

麝香杏仁散　宣明方治婦人陰瘡

杏仁（不拘多少燒存性）　麝香（少許）

右為細末如瘡口深用小絹袋子一箇盛藥滿繫口臨上藥炙熱安在陰内

丹溪心法

○癬瘡

防風通聖（去硝黃加浮萍皂角刺 又方加蘇樟腦蒼耳濕）

萍煎洗

一方

浮萍一兩　蒼耳　蒼朮一兩　苦參一兩半

黃芩半兩　香附二錢半

右用酒糊為丸

又方

蘆薈　大黃　輕粉　雄黃

蛇床子　槿樹皮　檳榔

右為末先刮癬後用米醋調藥末塗之

又方

蘆會（研三錢） 江子（去殼十四粒） 草麻子（去殼十四粒）

斑猫（七箇去翅足） 白蠟

右以香油二两熬江子草麻斑猫三藥以黑為度去三藥入蠟并蘆會末在內用磁罐盛貯微微刮癬令破以油塗上過夜畧腫即愈

附諸方

碧玉散　治癬

銅緑　硼砂　白礬（各等分）

右為細末香油調搽

樗皮散　治頭面荷葉癬

用川槿樹皮為末醋調湯頓如膠敷上候癬瘡抓破再搽數

連粉散　風癬濕瘡皆治之

黃連一錢　輕粉五分　膩粉　黃栢

黃丹　枯白礬（写各一錢）龍骨　芦甘石各三分

右為細末每用少許濕則乾搽乾則香油調搽

如聖散　治疥風癬瘡

蛇床子（一兩）黃栢　苦參　藺茹各五錢

白礬　狗脊　藜芦　剪草各二錢半

輕粉一錢二分半　胡粉一分半

右為細末清油調搽

白礬散（聖惠方）治遍身生癬日久不愈上至頭白

用獨莖羊蹄根別擣白礬爲末一處以極酸米醋調抓破搽
藥候痒極至痛即止隔日洽出不過兩上即愈　又洽癜風
以苧麻刮熱以此藥摻之三四度愈

黃藥子散（經驗方）洽妳癬瘡經年不差
黃連　玄參　赤芍藥（各五錢）
右件爲細末隨以多少入輕粉少許嚼芝麻取汁調先煎韮
菜湯洗令淨以藥傅之愈

何首烏散（和劑方）治脾肺風毒遍身癬疥瘙痒或致肌肉木麻
疥紫癜白癜風並皆治之
荊芥穗　威靈仙（洗[illegible]）蔓荊子（去皮）蚵蚾草（去土）
何首烏　防風（去芦）　甘草（炙）（各等分）

右為細末每服二錢食後溫酒調下

丹溪心法

○臁瘡

乳香　沒藥　水銀　當歸

川芎　貝母（各二錢半）黃丹（二錢半　一云二兩半）

真麻油（五兩）

右㕮咀除黃丹水銀外先將餘藥用香油熬黑色去渣下黃丹水銀又煎黑色用柳桃枝攪成膏油紙攤貼

又方

龍骨（生用）　血竭　赤石脂（共一兩）頭髮（如指入）

黃蠟（一兩）　白膠香　香油（不拘多少）

右件以香油煎頭髮三五沸去髮入黃蠟白膠香却入龍骨血竭赤石脂攪勻安在水盤內候冷取起以磁器盛之每遇一瘡捻作薄片貼瘡口以竹箬貼在外三日後番過再貼仍服活血藥

又方

用沙糖水煎冬青葉三五沸撈起石壓平將藥貼瘡上日換三次

又方

以頭垢燒灰和枣肉搗作膏先以葱椒葉煎湯洗淨用輕粉摻上却以前膏用雨傘紙攤貼之

又方

地骨皮（一两）白蠟（半两）甘草節（半两）

右以香油入地骨皮甘草節文武火熬熟去渣入黄丹一两半緊火熬黑提起白紙攤貼之次用冬青葉醋煎过以藥貼之

附諸方

夾紙膏　治臁瘡久不愈者

乳香（三錢）血竭（二錢半）沒藥（四錢）欝金（五錢）

射香（一錢半）牡蛎（半两）黄連　黄栢（各二两）

大黄　黄丹（各一两）輕粉（三十貼）

右為細末清油調勻攤油紙上貼瘡每一箇貼三日每日以冷水洗三次膏藥亦翻轉三次两層夾紙以線縫四边鉼刺眼透藥氣其藥末同和一処收要用旋調

至聖隔紙膏

水龍骨（另研） 輕粉（研） 黃丹（飛各二錢） 樟腦

黃連（各四錢）

右為細末桐油調勻以油紙隨瘡眼大小糊袋以藥內袋內
貼在瘡上用軟綿緊束之

臁瘡膏藥

輕粉 赤石脂 黃丹 甘草

黃栢（去粗皮切為末） 火龍丹（即竈口上燒紅土或用
伏龍肝即竈心紅土亦可）

右各等分先將五味研為極細末後下輕粉用真香油調勻
再用油单紙夾住勿令藥侵瘡貼上絹帛繫住一日三翻拭

去瘡上血沫

治外臁脚瘡（秘方）

用累經燒过窑竈黄土研極爛入黄栢赤石脂黄丹輕粉等匀以清油調稀用油紙盛藥傳瘡上却以布絹縛定縱痒不可以手開動直候十數日後瘡愈却去之

○廣按此方與前方相類其用竈心黄土以燥濕清熱用黄栢之辛以散火邪真諸方所不及但再加没藥與乳香以散瘀血可謂十全矣

又方

白膠香末以蠟酒攤上箬葉夾藥在內貼之

治遠年近日臁瘡（聖惠方）

黄丹（飛）　輕粉　蜜陀僧　龍骨（各等分）

射香（少許）

右為細末漿洗浄瘡口乾貼之

又秘方

輕粉（二錢）　黄蠟（一兩）　猪膽（一个）

右溶化攤油紙上貼

○漏瘡　（新增）

附諸賢論

刘宗厚曰諸瘡患久成漏者常有膿水不絶其膿不臭盖無互肉宜用附子浸透切作大片厚二三分於瘡上着艾灸之仍服内托之藥隔二三日再灸之不五七次自然肌肉長滿矣

至有膿水惡物漸漬根深者郭氏治用白麫硫黄大蒜三物一處搗爛看瘡大小捻作餅子厚約三分於瘡上用艾炷灸二十一壯一灸一易復隔四五日方用翠霞錠子并信效錠子互相用之絍入瘡内歹肉盡去好肉長平然後貼收歛之藥内服應病之劑調理即瘥矣

附諸方

灸法　冷漏多在腿足之間先是積熱所注久則為寒附子破作兩半用人唾浸透切成片安漏孔上用艾灸之

内托散

川芎（半兩）　細辛　白芷稍（各二錢半）

右為末每日作湯服之病在下食前服病在上食後服看瘡

大小討隔年黃麻根刮去皮撚成繩子入孔中至入不去則止瘡外膏藥貼之

內補十宣散　治冷漏在遍身用此內托補虛　方見癰疽類

當歸拈痛湯　治冷漏在腰腿之間用此以補虛散邪　方見脚氣類

翠霞錠子　治年深冷漏日久惡瘡有歹肉用之

銅綠　寒水石（煅）　滑石各三錢　明礬

膩粉　砒霜　雲母石（研如粉各一錢二分半）

右研細末糊為錠子如麻黃粗細長短不拘量瘡內深淺紝之如修合此候（天色）晴明則可

信效錠子　治一切惡瘡

紅娘子　黃丹　砒霜　鷹屎

土硝　白及（各一錢半）銅綠（二錢半）腦子

射香（各少許）

右研細末厮兒乳汁和為錠子用中病即止

生肌散　斂口生肉

太乙膏　護瘡散（並見癰疽類）

丹溪心法

○杖瘡疼

黃柏生地黃紫金皮皆要藥热血作痛　凉血去瘀血為先須下雞鳴散之類　生地黃黃柏為末童便調傅或加韮汁　不破者以韮菜葱頭舂碎炒热貼冷則易　膏藥

用紫金皮（剉）乳香 沒藥 生地黃 黃栢 大黃之類

又方

用大黃 黃栢為末 生地黃汁調傅 乾則再傅

又方

野生苧麻根（取）嫩者 不拘多少 洗淨 同鹽擂傅瘡上 効傷重多用鹽

附諸方

雞鳴散　見跌損傷

乳香散　治杖瘡腫痛

乳香（另研） 沒藥（另研各一錢） 大黃

黃連 黃栢 黃芩（各三錢） 腦子（少許）

右為細末冷水調勻攤於緋絹上貼之

當歸散

乳香　沒藥（各二錢）　茴香（四錢）　當歸（一兩）

自然銅（火燒醋淬七次）

右為細末每服五錢温酒調服

五黃散

黃丹　黃芩　黃連　黃栢

大黃　乳香（各等分）

右為細末冷水調成膏攤緋絹上貼之

陳巡檢方　治杖瘡

大黃　當歸　芍藥　川芎

木鱉子　巴豆　白芷　白及

乳香　沒藥　射干　槐枝

柳枝已上十三味各一兩　黃丹十三兩飛过

香油二十六兩

右除乳香沒藥外十一味用香油浸三日熬白燋黃色濾去滓入飛丹再熬滴水中不散為度候油温下乳香沒藥去火毒

當歸散

右為細末冷水調下[illegible]不拘