

Dr. Saiki's Library.

京都産院文庫藏書

函之架號

或番號

冊之番號

備考

4439

卷十二 風熱門

口舌

頭風

牙齒

眼目

麻疹

耳聾

頭眩

鼻病

頭痛


眉眶痛


丹溪心法附錄十二卷

五十九

丹溪心法

○斑屬風熱挾痰而作自裏而發於外通聖散中消
 汗散之切不可下 內傷斑者胃氣極虛一身火遊行於外
 致宜補以降於陰証略例中求之 發斑似傷寒者痰熱之瀰
 發於外微汗以散之若下之非理 疹屬熱與痰在肺清肺
 降痰或解散出汗亦有可下者 疹即瘡疹汗之即愈通聖散
 中消息之 發疹多屬脾隱隱然在皮膚之間故言隱疹也
 則多痒或不仁者是無風蕪濕之殊色紅者熱火也





丹溪心法附餘十二卷

風熱門

斑疹

五十九



集

丹溪心法

○斑屬風熱挾痰而作自裏而發於外通聖散中消息當以
汗散之切不可下 內傷斑者胃氣極虛一身火遊行於外

致宜補以降於陰証略例中求之 發斑似傷寒者痰熱之病

發於外微汗以散之若下之非理 疹屬熱與痰在肺清肺六

降痰或解散出汗亦有可下者 疹即瘡疹汗之即愈通聖散

中消息之 癩疹多屬脾隱隱然在皮膚之間故言癩疹也發

則多痒或不仁者是蕪風蕪濕之殊色紅者蕪火化也 黃瓜

水調伏龍肝去紅點斑

戴云斑有色點而無

頭粒者是也疹浮小疔又出是也非若

斑之無頭粒者當明辨之

附諸方

玄參升麻湯 三因方 治傷寒失下熱毒在胃發癍或汗下吐後

餘毒不散表虛裏實發於外甚則煩躁譫妄

玄參

升麻

甘草

炙各等分

右以咀每服四錢水一鍾煎七分溫服濕毒發癍亦宜服之

陽毒升麻湯

活人方

治陽毒赤斑狂言咽喉痛出膿血

升麻

三分

犀角

射干

黃芩

人參

甘草

炙各二分

右吹咀水二鍾煎至一鍾去滓溫服不拘時

椰子仁湯 活人方 治發斑煩燥面赤咽痛潮熱

梔子仁 赤芍藥 大青 知母 各一兩

升麻 黃芩 石膏 各二兩 甘草 炙半兩

杏仁 去皮尖 柴胡 一兩五錢

右吹咀每服四錢姜三片豉百粒水煎溫服

化癘湯 治傷寒汗吐下後斑發脉虛

人參 石膏 知母 甘草

守真加白朮一方加玄參

右吹咀時時煎服

黃連橘皮湯 治濕毒發斑

附錄 卷上 守真方 卷上 守真方 卷上 守真方

黃連去毛

陳橘皮

杏仁去皮

枳實

麻黃湯去節

葛根各二兩

厚朴姜製

甘草各一兩

右咬咀水煎服

調中湯

治內傷外感而發陰斑

蒼朮

一錢半

陳皮

一錢

砂仁

藿香

芍藥炒

甘草炙

桔梗

半夏

白芷

羌活

枳殼各一錢

川芎五分

麻黃

桂枝各五分

右咬咀姜三片水煎服

消毒犀角飲子

牛旁子六錢

荆芥

防風各三錢

甘草一錢

右咬咀水煎服

通聖散 出丹溪經驗方

川芎

當歸

麻黃

薄荷

連翹

白芍 略半

黃芩

石膏

桔梗 略一

滑石 三兩

荆芥

梔子

白木 各二錢半 甘草 二兩

右剉水煎服

如身疼加蒼朮羌活

痰嗽加半夏

每服細末三錢 生姜三片 搗細盪起煎沸服之

已集

頭眩

六十

丹溪心法

○頭眩 ○痰挾氣虛併火 ○治痰為主 挾補氣藥及降火藥 ○無痰則不作眩 痰因火動 又有濕痰者 ○濕痰者多宜二陳湯

丹溪心法 去付除夏

醫聖綱目 十一

三

火者加酒苓挾氣虛者相火也治痰爲先挾氣藥降火藥如東
垣半夏白朮天麻湯之類○眩暈不可當者以大黃酒炒爲末
茶湯調下○火動其痰用二陳加黃芩蒼朮羌活散風行濕○
左手脉數熱多脉澹有死血○右手脉實有痰積脉大是久病
久虛久病之人氣血俱虛而脉大痰濁不降也○昔有一老婦
患赤白帶一年半頭眩坐立不得睡之則安專治赤白帶七愈
其眩亦安

附脉理

脉訣舉要曰風寒暑濕氣鬱生涎下虛上實有暈而眩風寒
緊濕細暑虛涎弦而滑虛脉則無治眩暈法尤當審諦先理
痰氣次隨證治

諸方

獨活散

揚氏家藏方 消風化痰治頭目眩暈

細辛 去藥一兩 石膏 研

甘草 炙各半兩 防風 去蘆 藁本 去土

旋覆花 蔓荊子 川芎

獨活 去蘆各一兩

右為末每服二錢水一鍾姜二片煎至六分食後熱服

川芎散 本事方 治風眩頭暈

山藥 甘菊花 人參 茯神

小川芎 各五錢

山茱萸肉 一兩

右為末每服二錢酒調不拘時日三服不可悞用野菊花

芎朮湯 濟生方 治冒雨中濕眩暈吐逆頭重不食

川芎 半夏 白朮 各一兩 甘草 炙半兩

右吹咀每服四錢水一鍾姜七片煎七分溫服不拘時

芎朮除眩湯 直指方 治感寒濕頭目眩暈

甘草 炙 川芎 附子 白朮 官桂 等分

右吹咀每服三錢姜七片水煎溫服食前

劑黃湯 張子和方 治頭眩

大黃 荆芥穗 防風 各等分

右為粗末大作劑料水煎去滓服以利為度

芎辛湯 濟生方 治風寒在腦或感邪濕頭重痛眩暈欲倒嘔吐

不定並皆治之

川芎 一兩 細辛 洗去土 白朮 甘草 各半兩

右吹咀每服一兩姜五片茶芽少許水一鍾半煎八分臨卧

溫服或食後服亦可

頭暈方 利痰清氣降火

南星製五分 半夏一錢 桔梗七分 枳殼一錢 陳皮一錢

甘草二分 茯苓一錢 黃芩一分

右作一服姜七片水煎服食後

香橘飲 治氣虛眩暈

木香 白朮 半夏麩 橘皮 茯苓

砂仁各半兩 丁香 甘草炙二錢五分

右剉散水二鍾姜五片煎服 加當歸川芎官桂治血虛眩暈

白附子丸 治風痰上厥眩暈頭疼

全蝎炒半兩 白附子炮 南星炮 半夏 旋覆花

其菊 天麻 川芎 橘紅 殭蚕炒

乾薑 生各一兩

右為末生姜半斤取汁打糊丸梧子大煎荆芥湯下五十九

人參前胡湯 治風痰頭暈目眩

半夏麴 木香 枳殼炒 紫蘇 赤茯苓

南星炮 甘草 炙各五錢 人參 三錢 前胡 橘紅 各五錢

右劉散每服五錢姜五片水煎服

川芎茶調散 治風眩頭痛 見傷風

半夏白朮天麻湯 見頭痛

喝起散 大金良方 治婦人血風攻腦頭旋悶倒不知人事喝起

草即蒼耳草也

右取嫩心不以多少陰乾爲末每服二錢酒調下

黑錫丹 治早起眩暈須臾自定以爲常此因老痰鬱痰所作

必須此藥劫之 見痰類

○廣按頭眩之症多主於痰無痰則不作眩有因寒痰濕痰者有因熱痰風痰者有因氣虛挾痰者有因血虛挾痰者其証不一也夫寒痰濕痰作眩或因外感寒濕或因內傷生冷執痰風痰作眩或因外感風暑或因內動七情氣逆眩暈或因脾虛不進飲食或因胃弱嘔吐泄瀉血虛眩暈男子每因吐血下血女人每因中產後而作也已上數方雖各有所主未能盡其變在籍者擴充之也又嘗論之夫咳嗽頭痛頭眩三者乃病之標必治其病之本而病方

已如產後眩暈只補其血如脾虛眩暈只補其氣是治其病之本也

頭痛

六十一

附眉脛痛

丹溪心法

○頭痛多主於痰痛甚者火多可有吐者可下者 清空膏治諸頭痛除血虛頭痛不可治 出東垣試効方 血虛頭痛自魚尾

上攻頭痛用芎歸湯古方有追涎藥

附諸賢論

王節齋曰火頭痛病畧感風寒便發寒月須重綿厚帕包裹者此屬鬱熱本熱而標寒世人不識 罕用辛溫解散之藥暫時得効誤認爲寒殊不知因其本有熱毛竅常疎故風寒易

入外寒束其內熱閉逆而為痛辛熱之藥雖能開通閉逆散其標之寒邪然以熱濟熱病本益深惡寒愈甚矣唯當瀉火涼血為主而佐以辛溫散表之劑以從治法治之則病可愈而根可除也 ○附脈理

脈訣舉要曰頭痛陽弦浮風緊寒風熱洪數濕細而堅氣虛頭痛雖弦必瀦痰厥則滑腎厥堅實

頭痛治例

心法附錄曰頭痛須用川芎如不愈各加引經藥

太陽川芎 陽明白芷 少陽柴胡 太陰蒼朮

少陰細辛 厥陰吳茱萸

如肥人頭痛是濕痰宜半夏蒼朮

如瘦人頭痛是熱宜酒製黃芩防風

如感冒頭痛宜防風羌活藁本白芷

如風熱在上頭痛宜天麻蔓荊子台芎酒製黃芩

如白人頭痛是氣虛宜黃芪酒洗生地黃南星秘藏安神湯

如形瘦蒼黑之人頭痛乃是血虛宜當歸川芎酒黃芩之類

如苦頭痛用細辛

如頂顛痛宜藁本防風柴胡東垣云頂顛痛須用藁本去芎

且如太陽頭痛惡風脉浮緊川芎羌活獨活麻黃之類為主

少陽頭痛脉弦細往來寒熱柴胡為主

陽明頭痛白汗發熱惡寒脉浮緩長實升麻葛根石膏白芷

為主

太陰頭痛必有痰體重或腹痛脈沉緩以蒼朮半夏南星為主

少陰頭痛是寒氣逆為寒厥其脈沉細麻黃附子細辛為主

厥陰頭痛或吐痰沫厥冷其脈浮緩以吳茱萸湯主之

血虛頭痛當歸川芎為主

氣虛頭痛人參黃芪為主

氣血俱虛頭痛調中益氣湯內加川芎三分蔓荊子三分細

辛二分其効如神

又有痰厥頭痛所感不一是知方者體也法者用也徒知體

而不知用者弊體用不失可謂上工矣

附諸方

加減三五七散 和劑方 治八風五痺肢體不仁大治風寒入腦

陽虛頭痛畏聞人聲目旋運轉耳內蟬鳴應有濕痺脚氣緩弱並皆治之

山茱萸去核三兩

細辛半兩

乾姜炮三兩

防風去蘆四兩

茯苓去皮三兩

附子三箇半炮去皮臍

石為細末每服溫酒食前調服

川芎茶調散 治諸風上攻頭目偏正頭痛

見傷風

都梁丸和劑方治風吹項背頭目昏眩以及腦痛婦人產前產後傷風頭痛

香白芷揀大者沸湯洗五次到晒乾

右為末煉蜜為丸如彈子大每服一丸細嚼用荆芥湯下

小芎辛湯濟生方治風寒在腦頭痛眩暈嘔吐不已

川芎 一兩

細辛 洗去上

白朮

甘草 炙各半兩

右咬咀每服四錢水一盞姜五片茶芽少許煎服

一方 治傷風感風一切頭痛

甘草 一兩

細辛 半兩

甘草 七錢

白芷 羌活

香附子

薄荷 各三兩

荆芥 二十枝

茵陳 半兩

蒼朮 泔浸

川芎 各一兩

右為末每服二錢茶清調下婦人產後當歸石膏末調下

定風餅子 秘方 治偏正頭痛

草烏頭 半兩

微炮

香白芷 一兩

川芎 二兩

防風

天麻

甘草 炒各一兩

細辛 半兩

右為末姜汁丸如龍眼大捏作餅子每服一餅食後茶湯下

川芎丸 聖惠方 消風壅化痰涎利咽膈清頭目旋暈心忪煩熱

頸項緊急肩背拘攣肢體煩疼皮膚瘙癢腦昏目疼鼻塞聲

重面上遊風

川芎

薄荷

各七兩五錢

甘草

細辛

防風

各二兩五錢

桔梗

十兩

右為末煉蜜丸每兩半作五十九丸每服一九細嚼茶清食後

臨卧時下

二芎餅子

濟生方

川芎

撫芎

乾姜

炮

甘草

藜本

去蘆

天南星

炮去皮

防風

去蘆

白朮

各等分

一方有蒼耳無白朮

右為末姜汁蒸餅為劑如雞頭大捏作餅每服五錢餅細

茶清下

徹清膏

蔓荊子

細辛各一分

薄荷葉

川芎各三分

生甘草

炙甘草各五分 藁本一錢

右為末茶清調下二錢

神靈散 治偏正頭疼不止 止及破傷風等疾

煨硝一兩 黃丹

雄黃各三錢 沒藥 乳香各二錢

右為細末令患人用略溫水用竹筒吹藥入鼻中少許

一方 治偏頭疼以雄黃細辛等分研末每服一字左邊疼吹

右鼻內右邊疼吹左鼻內

○已上諸方辛温外散風寒之劑

天麻散

治頭項痛頭面腫拘急風傷衛氣躁熱

方見風熱

生朱丹

御藥院方

治諸風痰盛頭痛目眩氣鬱積滯胸膈不利

朱砂

一兩二錢

龍腦

一錢

白附子

炮去皮臍半斤

石膏

燒通紅令冷半斤

右為末燒粟米飯為丸如小豆大硃砂為衣每服三十丸食

後茶酒任下

大川芎丸

治首風暈眩外合陽氣風寒相搏胸膈痰飲偏正

頭疼

川芎

一斤

天麻

四兩鄭州者

右為末煉蜜為丸每兩作十丸每服一丸細嚼茶酒下食後

上清散

集成

治因風頭痛眉骨眼眶俱痛不可忍者

川芎

鬱金

芍藥

荆芥穗

薄荷葉

芒硝

各二錢半

乳香

沒藥

各半錢

腦子

一分半

右為末每服一字鼻內搐之

菊花散

和劑方

治風熱上攻頭痛不止

石膏

甘菊花

防風

旋覆花

枳殼

蔓荊子

甘草

羌活

各一錢半

右用水一盞生姜五葉煎至一盞去渣溫服

芎芷散

直指方

治風壅頭痛

川芎

白芷

荆芥穗

軟石膏

右為末每服一錢食後沸湯調下

川芎散 按粹方 治偏頭痛神效

甘菊花 石膏 川芎 各三錢

右為細末每服一錢茶清調下一方有白姜蚕六錢生用

石膏散 按粹方 治頭痛不可忍

麻黃 去根 石膏 各二兩 何首烏 半兩 乾姜 七錢半

右為細末每服三錢臘茶清調服

點頭散 聖惠方 治偏正頭痛

川芎 生二兩 香附子 去毛四兩

右為末每服一錢好茶調下常服除根

一方 治頭痛去風痰

南星 一箇大者七片 皂角 十四箇七箇生七箇煨 白梅 一箇 姜 三片

牙茶 一撮

葱頭 一寸四分

右將前藥俱在石器內搗碎水一盞半煎至一盞去滓溫服不可輕犯鐵器搗

一方 治頭痛連眼痛 此風痰上攻須用白芷開之

兩前茶

川芎

白芷

防風

藁本

細辛

當歸

右用水煎服

川芎散 聖惠方 治頭風偏正頭痛

羌活

細辛

川芎

香附子

槐花

甘草 炙

石膏

荆芥穗

薄荷

菊花

茵陳

防風 各一兩

右為末每服二錢茶清調食後服忌動風物

○已上諸方辛平外散風寒內消風熱之劑

清空膏

治偏正頭痛年深不愈者又治風濕熱頭上壅及腦

痛除血虛頭痛不治餘皆治之

川芎

五錢

柴胡

七錢

黃連

酒炒

防風

羌活

各二兩

炙甘草

一兩五錢

細挺子黃芩

半兩

三兩去皮一半酒製一

右為末每服二錢執蓋內入茶少許湯調如膏抹在口內少

用白湯送下臨卧

如苦頭痛每服加細辛二分

痰厥頭

痛脉緩減菴活防風川芎甘草加半夏一兩五錢

如偏正

頭痛服之不愈減菴活防風川芎一半加柴胡一倍

如發

熱惡熱而渴此陽明頭痛只與白虎湯加吳白芷

白虎湯加

鑿砂丹 御藥院方 治風熱鬱結氣血蘊滯頭目昏眩鼻塞聲重

鼻流清涕口苦舌乾咽嗌不利胸膈痞悶咳嗽痰實腸胃燥

澁小便赤黃或腎水陰虛心火熾甚及偏正頭疼髮落牙痛

遍身麻木疥癬瘡瘍一切風熱並皆治之

天麻

獨活

羌活

細辛

石膏

防風

連翹

薄荷

川芎

槐子

芍藥

荆芥穗

當歸

黃芩

大黃生

全蝎去毒炒

菊花

人參

白木

各半

硃砂

二兩為衣

寒水石

生

桔梗

各一兩

硝砂仁

二錢半

生甘草

二兩

滑石

四兩

右為末煉蜜丸每兩作十九硃砂為衣每服一九細嚼茶清

送下

真珠散 聖惠方

治偏正頭痛頭風

盆硝牝錢

白滑石 半兩

乳香 半錢

片腦 少許

右研細用一字口噙水啗鼻內

豆粉丸 聖惠方

治風熱頭疼

川芎

細辛

甘草

白芷

豆粉

各二錢半

薄荷

石膏

各半兩

朴硝

二錢

右為細末煉蜜和丸如彈子大石膏末為衣每服一丸細嚼

茶清下

川芎散

聖惠方

治風盛膈壅鼻塞清熱氣攻眼下淚多眵齒

間緊急作偏頭痛

川芎 柴胡各一兩 半夏麩 甘草炙 井菊花

細辛 人參 前胡 防風各半兩

右咬咀每服八錢水一盞半生姜三片薄荷少許煎至八分

温服

安神湯 聖惠方 治頭痛頭旋眼黑

羌活 黃蘗各一兩 防風二錢 柴胡 升麻

知母酒浸 生地黃各半兩 酒浸 黃芪三兩

生甘草二錢 加蔓荊子半錢 川芎三分

炙甘草三錢

右咬咀每服八錢水一盞半煎至八分去渣温服食後

治頭痛

片苓酒浸透晒乾為末茶清調下 治諸般頭痛亦治血

虛頭痛

治頭痛如破

酒炒大黃半兩一半茶煎

○已上諸方辛涼內消風熱之劑

定風餅子 治風寒客於陽經邪傷腠理背脊強直言語蹇澀

體熱惡寒痰厥頭痛肉瞶筋惕手顫鼻淵

方見傷風

如聖餅子 和劑方 治風寒伏留陽經氣厥痰飲一切頭痛

防風 天麻 各半 南星 洗 乾姜 川芎

甘草 川烏 各一兩 半夏 生半兩

右為末水丸作餅子每五餅同煎茶細嚼茶酒下澹寮方加

細辛

三生丸 濟生方 治痰厥頭痛

半夏 白附子 天南星 生各等分

右為末生姜自然汁浸蒸餅為丸如棗豆大每服四十九食

前姜湯米飲任下

天香散 簡易方 治年久頭風頭痛不得愈者

天南星 半夏 湯洗去滑盡 川烏 去皮 白芷 各等分

右咬咀每服四錢水一盞煎一半入姜汁半盞煎八分溫服

九龍丸 聖惠方 治男女八般頭風一切頭痛

川芎 石膏 白芷 川烏頭 半夏

南星 各半 加細辛 全蝎 各二錢半

右為末 蕪汁為丸 如梧桐子大 每服五十九 茶清送下

不卧散 治頭痛不可忍者

玄胡索 七枚 青黛 二錢 猪牙皂角 兩 肥實者刮去皮及子二

右為末 用水調丸成 小餅子 如杏仁大 用時令病者仰卧以

水化開 用竹管送入 男左女右 鼻中 竟藥味至喉 少酸令病

者坐却 令咬定銅錢一箇 於當門齒上 當見涎出 成盆即愈

玉真丸 濟生方 治腎厥頭痛不可忍 其脉舉之則弦 按之則堅

生硫黃 二兩 另研 石膏 煨者 半夏 湯洗 七次 硝石 別研 各一兩

右為末 研勻 用生姜汁煮糊丸 如梧桐子大 每服四十九 食前

姜湯米飲任下 虛寒甚者去石膏 用鍾乳粉一兩

芎烏散 治氣厥頭痛 因氣所觸 心腹脹滿 嘔吐酸水 頭昏眩

川芎

天台為藥各等分

右為細末每服二錢臘茶清調服

芎木湯 三因方 治畧濕頭痛身重眩暈痛極

附子

生去皮

白木

川芎

桂心

各二錢半

甘草

一錢半

右咬咀每服四錢水一盞姜七片棗子一箇煎食前服

○已上諸方治痰厥腎厥着濕之劑

順氣和中湯 治氣虛頭痛此藥升陽補氣頭痛自愈

黃芪

一錢

人參

一錢

甘草

分

白木

分

陳皮

當歸

分

芍藥

各五

升麻

分

柴胡

各三

細辛

蔓荊子

川芎

各二分

右作一服水煎食後服 亦治氣血俱虛頭痛

半夏白朮天麻湯 治脾胃証已經服疎風丸下二三次元證

不瘳增以吐逆痰唾稠粘眼黑頭旋目不敢開頭苦痛如裂

四肢厥冷不得安卧此氣虛頭痛也

黃栢二分 乾姜三分 澤瀉 白茯苓 天麻

黃芪 人參 蒼朮各五分 炒神麩 白朮各一錢

麥芽 半夏湯洗 陳皮各一錢半

右每服五錢水煎熱服

芎歸湯 治血虛頭痛

川芎 當歸等分

右每服五錢水煎服

四神散 大全良方 治婦人血風眩暈頭痛

菊花 當歸 旋覆花 荆芥穗

右等分為細末每服二錢葱白三寸茶末二錢水一盞半煎

至八分去滓食後溫服

調中益氣湯 治氣血俱虛頭痛

內加川芎三分蔓荊子三分細辛二分 方見脾胃

○已上諸方治氣虛血虛之劑

丹溪心法

○眉眶痛屬風熱與痰 作風痰治類痛風

入方

黃芩 酒浸燒 白芷

丹溪心法付余夏甫

右為末茶清調二錢

又方

川烏

草烏

二味為君童便浸炒去盡

細辛

羌活

黃芩

甘草

等分為佐

右為細末茶清調服

一本加南星

附諸方

選奇方

治眉骨痛不可忍大有効

羌活

防風

各二錢

甘草

二錢夏月生冬炒

酒黃芩

一錢冬月不用有熱者用

右每服三錢水煎食後溫服水一鍾煎七分

玉清散

治因風頭痛眉骨眼眶俱痛不可忍者

方 治頭痛連眼痛

俱見頭痛

巴集

頭風

六十二

舟溪心法

○屬痰者多 有執有風有血虛 在左屬風薄荷荆芥屬血

虛川芎當歸 在右屬痰蒼朮半夏屬熱酒芩為主又屬濕

痰川芎南星蒼朮 偏頭風在左而屬風者用荆芥薄荷此

二味即是治之主藥有君臣佐使之分凡主病者為君而多

臣次之佐又次之須要察其兼見何症而佐使之如有痰即

以二陳湯治痰而佐之他症皆倣此又須察識病情全在活

法出入加減不可執方

大方

酒片苓

一兩

蒼木

羌活

防風

各五錢

細辛

二錢

蒼耳

三錢

右為末每服三錢生姜一大片同搗勻茶湯盪起服之

又方

酒片苓

五錢

蒼木

二錢

羌活

蒼耳

川芎

生甘草

酒黃連

各一錢半

半夏

炒三錢半

右為末服法同前

瘦人搗藥

軟石膏

朴硝

各五錢

腦子

荊芥

檀香皮

薄荷

各一錢

白芷

細辛

各二錢

右為末搐鼻內

頭痒風屑髮黃

用大黃酒浸炒為末茶調服

一粒金搐鼻方 治偏頭風

藁本

玄胡索

白芷

川芎

青黛各一兩 草撥不以多少研細用獐猪膽汁拌勻再入膽

內懸陰乾與前等分

右為末入製草撥末一兩半用無根水丸每服一粒長流水

化開搐鼻以銅錢二三文口咬定出涎

治頭風

烏頭尖

七箇

荆芥

防風

甘草

蔓荆子

台芎

桔梗

麻黃

右為末茶調

二人頭風鼻塞

南星

蒼朮

酒芩

辛荑

川芎

各等分

右為末茶調

附諸方

川芎散

拔粹方

治偏頭痛頭風神効

甘菊花

石膏

川芎

各三錢

右為末每服一錢茶清調下一方有白姜蚕六錢生用

清風散

和劑方

治諸風上攻頭目昏眩偏正頭風及婦人頭眩

腫痒並皆治之

川芎茶調散 和劑方 治諸風上攻頭目昏重偏正頭痛頭風並

見傷風

菊花茶調散 治諸風頭目昏重偏正頭痛頭風鼻塞

菊花 川芎 荆芥穗 羌活 甘草

白芷 各二兩 細辛 一兩 防風 去蘆一兩 蟬蛻 殭蚕

薄荷 各五錢

右為末每服二錢食後用茶清調下

芎辛湯 治膈痰風厥頭目昏疼鼻塞聲重有背拘急

川芎 五錢 細辛 三錢 甘草 炙一錢半

右用水煎食後服

二方 治一切頭風

用猪牙皂角炮玄胡索各一錢青黛半錢為末滴水為丸如
梧子大捏作餅子晒乾每用一餅新水化開男左女右仰面
以蘆筒鼻內灌之口咬銅錢一十五文其涎便出更不再發
亦治痰疾妙

三方

天麻

防風

川芎

等分

右為末每服三錢温酒食後調下以豆豉湯洗頭避風即愈

四方

治偏頭風

用草撚為末令患者口中含水如左邊痛左鼻吸一字右邊
痛右鼻吸一字甚効

金花一聖散 治頭風

川芎

川烏

白芷 各等分

右為末每服二錢生葱三寸薄荷葉三四皮同煎食後服
灸法

宜灸顛會百會前頂上星等穴

已集

眼目 六十三

丹溪心法

○眼黑睛有翳皆用知母黃柏 眼睛疼知母黃柏瀉腎火當
歸養陰水 眼中風淚出食後吞龍會丸數粒日三次 冬
月眼暴發痛亦當鮮散不宜用涼藥

入方

神効七寶膏

治暴發眼熱連有翳膜者

蕤仁

去油

白硼砂

片腦

硃砂

右用蜜調成膏點眼

爛眶眼

薄荷

荊芥

細辛

右為粗末如燒香狀燒之以青碗塗蜜少許於內覆香烟上
取烟盡之後以小青罐收烟藏之凡眼有風熱多淚者皆可
點此是陽明經有風熱所致

生熟地黄丸

治血虛眼

見後

龍會丸

見後

人病眼至春夏便當作疔治

黃芩

酒浸

南星

姜製

香附

童便浸

蒼朮

童便浸

各二兩

道朮

酒浸一兩半

山梔

炒一兩

龍膽草

酒浸

陳皮

連翹

蘿蔔子

蒸

青黛

各半兩

柴胡

二錢

右為末神麩糊丸

附諸賢論

王節齋曰眼赤腫痛古方用藥內外不同在內湯散用苦寒辛

涼之藥以瀉其火在外點洗則用辛熱辛涼之藥以散其邪

故點藥莫要於冰片而冰片大辛熱以其辛性甚故借以拔

出火邪而散其熱氣古方用燒酒洗眼或用乾姜末生姜汁

點眼者皆此意也蓋赤眼是火邪內炎上攻於目故內治用

苦寒之藥是治其本如鍋底之去薪也然火邪既客於目從
內出外若外用寒涼以阻逆之則鬱火內攻不得散矣故點
藥用辛熱而洗眼用熱湯是火鬱則發因而散之從治法也
世人不知冰片為劫藥而誤誌為寒常用點眼遂致積熱入
目而昏暗翳故云眼不點不瞎者此也又不知外治忌寒
涼而妄將冷水冷物冷藥挹洗嘗致昏瞎者有之

附諸方

明目流氣飲 和劑方 治肝經不足內生風熱上攻眼目視物不
明常見黑花當風多淚癢澁難開或生障翳婦人血風時行
暴赤一切眼疾並皆治之

大黃 炮

牛蒡子 炒

川芎

菊花 去皮

白疾藜 炒去刺

細辛 去苗 防風 去苗

玄參 去蘆 山梔子 去皮

黃芩 去蘆 甘草 炙

蔓荊子 去白

荆芥 去便 木賊 去根節 各一兩

草決明 一兩半

蒼朮 米泔浸炒 二兩

右為末每服二錢臨卧用冷酒調下

洗心散 和劑方 治風痰壅滿心經積熱邪氣上衝眼遊睛痛或

腫或赤迎風多淚怕日羞明並皆治之 方見火類

洗肝散 和劑方 治風毒攻上暴作赤目腫痛癢澁多淚

薄荷 去梗 當歸 羌活 防風 各去 川芎

甘草 大黃 各一兩

右為末每服三錢食後熱水調下

蜜蒙花散

和劑方治風氣攻注兩眼昏暗多淚羞明并暴赤腫

蜜蒙花

陳淨

杜蒺藜炒去尖

羌活去蘆

木賊

菊花

石决明用鹽同東流水煮沸時取研粉等分

右為末每服一錢臘茶清食後調下

撥雲散

和劑方治男子婦人風毒上攻眼目昏暗翳膜睛怕日

羞明一切風毒眼疾並皆治之

羌活

防風

柴胡

甘草

炒各一斤

右為末每服二錢水一鍾煎服食後薄荷湯調茶并菊花苗

煎湯皆可服忌諸毒物

障花散

和劑方治肝經蘊熱毒氣上攻眼目赤腫多淚羞明一

切風毒并宜服之

穀糠草

去土

菊花

去梗

蟬蛻

洗去土淨

羌活

甘草

白蒺藜

炒去刺

草决明

防風

去蘆

山梔子

去皮

川芎

不見火

蜜蒙花

去枝

荆芥穗

去梗

黃芩

去土

蔓荊子

去皮

木賊

洗淨各等分

右為末每服二錢食後茶清調服或荊芥湯調亦可

菊花散

和劑方

治肝生風毒眼目赤腫昏暗羞明多淚

菊花

去梗

羌活

去蘆

白蒺藜

炒去尖

木賊

去節各三兩

蟬蛻

去頭足翅三兩

右為末每服二錢食後茶清調下

四生散

治肝腎風毒上攻眼赤痒痛不時羞明方見風熱

芍藥丸

御藥院方治遠視不明常見黑花久服明目

芎藭

菊花

荊芥

薄荷

甘草 各一兩

蒼朮

一兩米泔浸

右為末煉蜜丸如梧子大每服五十九食後茶清下

荊芥散

三因方 治肝經蘊熱眼目赤腫

荊芥穗

當歸

赤芍藥

各一兩半

黃連 一兩

右以咀每服三錢水一鍾煎三沸瀝去滓溫服或洗

十全神麴丸

三因方 明眼目百歲可讀細書常服有效

神麴

四兩

光明硃砂

一兩

磁石

二兩煨醋重淬

右為末煉蜜丸如梧子大每服二十九食後茶飲下

黃連丸

本事方

治肝經風熱上攻眼目澁痛不可用藥補者

乾熟地黄

一兩半

黃連

決明子

各一兩

沒藥

光明硃砂

甘菊花

防風

羌活

桂心 各半兩

右為末煉密丸如梧子大每服三十丸食後熟水下

决明子散

濟生方

治風毒上攻眼目腫痛或平生翳膜或赤澀

翳肉或痒或痛羞明多淚

黃芩

甘菊花

去枝梗

木賊

决明子

石膏

赤芍藥

川芎

川羌活

去戶 甘草

蔓荊子

石决明

各一兩

右為末每服三錢水一鍾姜五片煎至六分食後服

首龍膽散

聖惠方

治風毒熱氣攻衝眼目暴赤殫澀羞明及腫

痛多眵迎風有淚翳膜攀睛胬肉癢痛

龍膽草洗去

菊花去梗

木賊洗淨

草決明微炒

甘草炙各二兩

香附子炒去毛

川芎不見火各四兩

右為末每服三錢用麥門冬湯入沙糖少許調服食後或米

泔調下亦得

又方和劑方治眼目暴赤腫痛風毒熱氣上衝睛疼連眶臉皆

赤爛肉侵睛時多熱淚及因忿怒逆損肝氣久勞瞻視层

沙塵土入眼澁痛致成内外障翳等疾

龍膽草

疾藜炒去刺各六兩

茯苓去皮四兩

菊花去枝五兩

赤芍藥八兩

防風去皮

甘草炙

羌活各三兩

右用為末温酒調二錢食後服

按熱飲子按粹方治眼暴赤暴腫

防風

羌活

黃芩

黃連

治牙分水一鍾半煎八分去滓溫服食後如大便秘加大黃

兩扁甚加當歸地黃各一兩如煩燥不眠加梔子一兩

○已上諸方散風熱之劑

石膏羌活散宣明方治久患雙目不觀光明遠年近日內外氣

障風昏暗拳毛倒睫一切眼疾

羌活治腦熱頭風

蜜蒙花

治羞明怕日木賊退翳障

香白芷清利頭目

乾菜子

細辛二味起倒睫

麻子起拳毛

川芎

治頭風蒼朮開鬱行氣

甘菊花明目去風

荊芥穗

治目中生蒼石膏

黃芩二味先心退熱

薄荷治偏頭痛

甘草和諸藥各等分

右為末每服一錢至二錢食後臨卧用蜜水一盞調下或茶

清亦可日進三服至十日漸明至二十日大驗此方醫數十

餘人矣 後人加當歸枸杞子梔子仁連翹柴胡薄荷葉防

風天麻桔梗 各等分為小丸服

蟬花無比散 和劑方 治大人小兒風毒傷肝或為氣攻一切眼

目昏翳漸生翳膜及久患頭風牽搐兩眼漸細小連眶赤

爛小兒瘡疹入眼白膜遮睛赤澁癢痛並治

茯苓 甘草 各 防風 去芦各 川芎 羌活

當歸 洗焙各三兩 赤芍藥 十三兩 蛇蛻 多一兩

羨黎 炒去皮尖半斤 蟬蛻 去頭足翅二兩 石决明 用鹽

水煑研細為粉 蒼朮 去皮炒十二兩

右為末每服三錢食後米泔調服茶清亦可忌毒食

明眼地黄丸

和劑方

治男子婦人肝虛熱積上攻眼目翳膜遮

睛羞澁多淚此藥多治肝腎兩經俱虛風邪所乘並治暴赤

熱眼

牛膝

去蘆酒浸三兩

石斛

去苗

生地黄 一兩

熟地黄

洗糖

防風

去蘆四兩

杏仁

去皮尖炒去油研細

枳殼

去白麩炒各四兩

右為末煉蜜丸如梧子大每服三十九食前盪湯溫酒任下

羊肝丸

濟生方

治肝經有熱目赤睛疼視物昏澁

羊肝

一具生用

黃連

去鬚另研為末

右先將羊肝去筋膜於沙盆內搗爛入黃連末杵和丸如梧

子大每服五十九熟水送下利濟方用白羊子肝

上清丸 秘方 治風熱上壅眼目昏花迎風冷淚羞明赤爛

羚羊角 犀角 黃連 厚朴 各一兩

牛黃 黃芩 川芎 羌活 蟬退

白芷 菊花 大黃 防風 草決明

地膚子 各五錢 滑石 各五錢 生地黃 熟地黃 各七錢 牽牛 半

右為末煉蜜丸如梧子大每服三五十九茶清下食後

杞苓丸 曾氏家傳 專治男子腎臟虛耗水不上升眼目昏暗

視不明漸成内障

白茯苓 去皮入兩 真枸杞 四兩酒浸 歸 二兩酒洗 青礬 一兩別煎

兔絲子 二兩酒浸蒸

右為末煉蜜丸如梧子大每服七十丸食前熱湯下

道赤散

曾氏家傳

治心臟積熱上攻眼目兩背浮腫血侵白睛

羞明洒淚一切治之

牛蒡子

炒

榆子

槐子

炒

生乾地黃

黃芩

各等分

右為末每服二錢食後麥門冬湯調下

車前散

曾氏家傳

肝經積熱上攻眼目逆順生翳血灌瞳人羞

明多淚

蜜蒙花

去枝

甘菊花

去枝

白蒺藜

炒去刺

羌活

粉草

草決明

車前子

各炒

黃芩

龍膽草

洗各等分

右為末每服二錢食後飯湯調下

五味子丸

曾氏家傳

治心肝二經蘊積風邪并腎臟虛耗眼目

昏暗或生翳膜

阿膠

蛤粉炒

熟地黄各一兩

白茯苓

麥門冬各半兩

芍藥

五味子

杜仲去皮姜汁炒斷絲各二兩

貝母炒

栝子仁

茯苓去木

遠志去心

人參

百部

防風去芦各一兩

右為末煉蜜丸如彈子食前姜湯嚥下一丸

蔓荊湯

聖惠方

治勞役飲食不節內障眼疾此方立効

黃芪

人參各一兩

蔓荊子二兩

甘草炙八錢

白芍藥二兩

黃柏

三錢酒浸晒四次

石咬咀每服五錢水二盞食後服

助陽和血補氣湯 衛生寶鑑 治眼 口發後熱白睛紅多眼淚無

疼痛而癢澁難開此服苦寒藥太過而直氣不能通九發故

眼昏花不明宜助陽和血補氣

防風七分 黃芪二錢 甘草炙一錢 蔓荊子一錢

當歸身半錢 白芷五分 升麻 柴胡各五分

右咬咀作一服水一鍾半煎一鍾臨卧通口服忌風寒及食

冷物

地黄湯 按粹方治眼久病昏澁因發而久不愈者

防風 羌活 黃芩 黃連

地黄 當歸 人參 茯苓

辨法... 附錄... 凡... 凡... 凡...

右等分為粗末水一鍾半煎八分食後臨卧通口服

四物龍膽湯 按辨方治目赤暴發作雲翳疼痛不可忍者

當歸 川芎 芍藥 地黃各伍錢

羌活 三錢 草龍膽 二錢 防風 三錢 防己 二錢

右吹咀每服八錢水一鍾半煎八分食後通口服

○已上諸方散風熱兼補虛之劑

菊睛丸 和劑方治肝腎不足眼目昏暗常見黑花多有冷淚

枸杞子 三兩 菘蓉 二兩 菊花 四兩 巴戟天 去心一兩

楊氏家藏方加五味子 三兩

右為末煉蜜丸如梧子大每服五十九丸食後溫酒鹽湯下

加減駐景丸 簡易方治肝腎氣虛兩眼昏暗視物不見

車前子兩 熟地黄洗 當歸身各五錢 五味子

枸杞子各一兩 鬼絲子酒製 楮實子無翳膜則勿用

川椒炒出火毒各一兩

右為末蜜糊丸如梧子大每三十丸温酒鹽湯下食前

養肝丸濟生方 治肝氣不足眼目昏花或生眵淚

當歸去蘆酒浸 車前子酒蒸 防風去蘆 白芍藥

蕤仁另研 熟地黄酒蒸 川芎 楮實各等分

右為末煉蜜丸如梧子大每服七十丸熟水下不拘時

生熟地黄丸 治血虛陰虛眼目昏花

生芋 熟芋 玄參 金釵石斛各一兩

右為末煉蜜丸如梧子大每服五十九丸空心服

東垣孰乾地黄丸 治血少神勞腎虛眼目昏黑

孰地黄 一兩 生地黄 五錢 柴胡 八錢 天門冬

茸草 炙 枳殼 地骨皮 黃連

五味子 路 三人參 錢 當歸身 酒浸 焙乾 黃芩 各五錢

右為末煉蜜丸如菉豆大每服百丸茶清下

○已上諸方補虛之劑

白龍散 海藥院方 去翳膜明眼目

用芒硝五兩取真白如雪者置鋪金銀鍋子內以新瓦蓋又

用熟炭火用一小磚火內放先燒磚熱然後下藥在鍋磚上

四面有穴慢慢熬溶良久鍋內與聲先去頂上火并瓦鍋中

觀未沸顯清明汁以紙鉗鉗出傾藥汁在別器中凝煉

五色者方好研如極細入龍腦各等分用點退下翳或吹入

鼻中立有神効

黃連膏

宣明方

治一切眼目癢肉攀睛風痒淚落不止

黃連

半斤

白丁香

五升

淨去土攪細用朴硝

淨去土

陰乾

瓶

右取水入消香釜內熬至七分洵出令經宿水面浮牙者取

出控乾以紙袋子盛風中懸至風化將黃連細末熬清汁熬

乾硝用猪羊膽和加蜜點之効美

撓雲散

秘方

點眼中有翳雲膜遮障近日疼痛眼不可點

硃砂

去揆石研細末

黃丹

水飛

青鹽

盆硝

各五錢

礞石

半斤

入童子小便

輕粉

一錢

麝仁

六十箇去皮用白

右為極細末研無聲為度忌雞魚一切辛熱之物

碧霞丹 宣明方 點一切惡眼風赤者

龍腦 射香 硃砂各二錢 沒藥

血竭 乳香 銅青各一錢 硃砂二錢

右為末滴水和丸如梧子大每服一九新汲水化開點之效

秘雲膏 秘方

礪甘石 黃丹一兩 川烏七分半 犀角

乳香 沒藥 硃砂 輕粉各一錢

青塩 血竭 片腦半錢 射香

麝仁各七 分半 當歸二錢半 黃連一兩 蜜一斤

銅綠 鷹條各一錢二分半

右件脩合各如法研細用白沙蜜十五兩慢火初沸下黃丹
二沸下蘆甘石三沸下諸藥不粘手為度用磁盞內熱水泡
開熱點不拘時

捲簾散

楊氏家藏方

治久新痛眼昏澁難開翳膜遮睛成獨肉

或暴發赤腫疼痛並皆治之

礪甘石

四兩碎

黃連

欠六錢搥碎用水一
煮數沸除去前滓

碗

朴硝

五錢細研

已上先將礪甘石末入沙鍋內開口煨令外有霞色為度次
將入黃連朴硝水中浸飛過候乾又入黃連半錢水飛過再
候乾次入

白礬

二錢一錢生
用一錢飛過

膩粉

另研一字

黃連

半兩

青鹽

膽礬

各七錢

丁香

另研

乳香

另研

鉛白霜

各一字 銅錢七

礪砂

另研一字

右為末同前件藥和合令勻每用少許點眼

○已上諸方點攀睛痰肉之劑

黃連散

楊氏家藏方

治肝受風熱眼眩赤爛

乳香

一錢半另研

黃連

去鬚半兩

荊芥

六百穗

燈心

乙百莖

右吹咀每服二錢水二鍾煎一鍾瀘去渣熱洗

光明湯

秘方

治一切暴眼

白礬

一字

銅綠

一錢

杏仁

甘草

各一錢

乾姜

三分俱各搥末

右件用生絹袋盛貯頓放於磁器內以沸湯浸用紙封蓋定

待冷臨卧洗之

洗眼湯 治暴赤眼

當歸尾

黃連

各一

赤芍藥

防風

各半

杏仁

四个去皮尖

右用水半鍾將小孩乳汁少許蒸過澄清點洗不拘時

消毒散

御藥院方

治眼赤腫疼痛不定兼治瘡腫不消

大黃

生五

黃芩

黃柏

各一兩

右為末每用生蜜水調藥如糊攤在緋絹花子上隨目赤左

右貼於太陽穴如乾用溫水頻潤

五黃膏

御製院方

治目赤

黃柏

一兩

黃連

黃芩

黃丹

大黃

各半兩

右為細末每一錢蜜水調成膏攤緋絹上隨左右眼赤貼於

太陽穴

赤眼方 秘方

鷄瓜黃連 銅綠 半餅 大艾葉

右將黃連銅綠研末用淨水調膏攤於磁器蓋內却將艾揉軟為丸燒艾炮黑蓋內藥乾用沸湯炮澄清以銀簪蘸藥之

礪甘石散 海上方 治一切目疾不問得病之因悉治之

礪甘石真者半斤黃連四兩剉如豆大於銀石器中用水二碗煮二次再揀去黃連取出甘石細研

片腦二錢半別研

右二味同研勻每用半字白湯泡時時洗之點亦可

方 海上方

礪甘石

半兩飛三次去沙石

硼砂

各一兩

白礬

腦子

各半斤射香必許

右為極細末用沸湯泡點洗俱可

乳香散 治眼赤腫痛疼不可忍

欝金 二斤半

盆硝

黃連

各一斤雄黃

乳香

沒藥

片腦

各半斤

右為末鼻內搗少許點亦可

復明方 秘方 點遠年近日雜患眼目昏花

黃連

一斤洗淨去鬚剉

當歸

半斤洗淨擘開股兒

柯子

三兩洗淨搥碎

黃柏

三兩去粗皮

右四味用臘水一大桶磁器內浸十五日入銅鍋內熬至數
十沸濾去滓礶甘石半斤桑柴火煨七次用前藥四味汗藥
七次如雞子黃色為用研極細末水飛過鵝梨二十五個搗
爛用生絹袋濾去滓黃丹半斤水飛過去為用蜜二斤半水
二升半葱一把熬水盡去滓豬胰子十五個擇淨脂油用擇
草袴一大把同搗爛泥生絹袋濾去滓再過一次同前藥汗
下入銅鍋內煎熬成稀膏下後六味

青鹽

盆硝

各一兩

銅綠

研極細末

硼砂

硼砂

熊胆

各五斤

右為極細末入鍋再熬一時欵成稠膏子下後四味

射香

三斤水

龍腦

輕粉

粉霜

各三斤

再熬從緊至慢漸、微火熬成膏出鍋入磁器內盛放土中埋一個月去火毒可用已後若乾時却用乳汁化開點每日可點三五十筋若腫時歇一二日再點以效為度二月九月修合為妙

珊瑚膏

秘方

治遠年近日不覩光明一切雜患病眼五輪不損

者並皆治之新患眼翳日見効每用皂角子一大塊冷水半鍾雞子殼少許於小盞內浸化研開點眼或洗眼亦得臨卧點用奇効不可具陳除內障氣眼不治

紫金膏

秘方

同珊瑚膏治証每過病眼用藥如菜豆許點眼大

角內點五七遍看病大小用此膏與珊瑚膏

方並見片腦膏

龍膽膏

秘方

治暴赤眼腫痛癢澁難開怕日羞明迎風淚出視

物昏花每用豆許點眼大角內少時連點數節大有功效今

具藥品于後

玄精石 一斤 桂府滑石 一斤俱為細末 黃連

秦皮 切細 龍胆草 苦練根 五味子 各用十兩

當歸 赤芍藥 大枝子 麩仁 搗碎

杏仁 各五兩 槐枝 二斤切三寸許 柳枝 二斤切三寸許

玄精石至五味子七味用大鍋盛水二大桶煎至一半去滓
將細生絹濾過磁器盛放又當歸至柳枝七味亦要用水二
桶煎至一半去滓再將細生絹濾過亦用磁器盛放白沙蜜
五斤先用少油搽鍋內慢火煉蜜紫色為度將煎二次煎成
藥水同煎數沸再用生絹濾過再熬至一半入銅鍋內下棚

砂五兩猪膽大者五個慢火煎用鉄鏟不住手澆熱成稀膏
除二斤於磁器內盛放一宿將上等片腦六錢研細入藥內
攪勻用油紙封固一宿名為片腦膏○下礮耳石六兩黃丹
六兩用水飛過礮砂九錢撿鹽九錢盆硝九錢銅綠九錢輕
粉三錢粉霜二錢俱研細用水一碗用細生絹濾過盡入煎
熱成三斤藥內將鉄鏟不住手攪慢火再熬成稀膏又除二
斤半用磁器內盛放經一宿再用上等片腦一錢射香二錢
研細入藥內攪勻將油紙封固一宿名為紫金膏○又以珊
瑚半兩為粗末用水一大碗煎數沸去滓不用入煎熬成稀
膏半斤於內又下礮耳石二兩黃丹二兩用水飛過將鉄鏟
不住手攪煎成稠膏再下上等片腦一錢研細入藥內攪勻

於磁器內盛放名為珊瑚膏

脩煉礪甘石黃丹之法

礪甘石不拘多少砂器盛煨木炭火煉通赤用黃連水蘸
七次水飛淘澄為泥用之

黃丹不拘多少以砂鈔炒候紫色用水飛過淘澄為塵用

光明撥雲鏡子 治遠年近日一切眼疾

礪甘石一斤煨過用黃連半斤水一碗煎五七沸滓七次

止取淨末二兩

硼砂 一兩
片腦 一糸
海螵蛸 一糸
射香 二分

珍珠 一糸
血竭 三糸
乳香
沒藥 各一糸

右研極細以後黃連膏子和劑槐成鏡子淨水磨化點

劑藥黃連膏子

黃連 半斤

龍膽草

當歸

芍藥

大黃

黃柏

黃芩

川芎

生地黄

白芷

防風

木賊

薄荷葉

羌活

紅花

菊花 各等分

右用水七八碗浸藥三日煎成膏子和劑前藥成錠子

開光錠子

礪甘石

較黃連水淨末二兩

硼砂

五錢

珍珠

片腦

各三分

牛黃

雄黃

各一錢

右為細末熬黃連膏為錠子磨點

春雪膏

丹溪心法附錄卷之...

卷之...

廿一

於春天雪冷凍之時取明淨朴硝三四斤爲末或不拘多
少用黃連防風赤芍藥當歸尾各五錢牙皂三個各剉片
與硝拌和入雪與硝一般多同拌勻爲水過一宿瀝去黃
連等藥却將硝雪水用瓦盆或銅盆盛之於露天淨處受
霜露之氣其盆弦上自然結成砂却用瓦盆一個以紙筋
墊盆底內用厚皮紙盛砂於盆內紙筋一使砂中水氣盡
滲於紙內候砂乾爽以磁器收貯封固用每硝砂一錢
加硼砂半錢片腦三分研細點眼

○已上諸方點洗之劑

○廣按眼疾所因不過虛實二者而已虛者眼目昏花腎經
真水之微也實者眼目腫痛肝經風熱之甚也

散其風熱若虛焉則滋其有陰苟虛實如物則散風熱
真陰蕪之夫何眼疾之不寥哉此內治之法也至於久而
失調熱壅血凝而為攀睛於肉翳膜赤爛之類不假點洗
外治之法則何由而全愈乎蓋病情有殊本治法有內外
故也又嘗論之氣有餘便是火而散火仕於破氣血不足
則陰虛而滋陰在於補血也常使血能配氣水能制火則
眼疾胡為而作也歟

耳聾

六十四

已集

丹溪心法

○耳聾皆屬於熱少陽厥陰熱多當用開火散風熱 通聖散
滾痰丸之類 大病後耳聾者須用四物湯降火 陰虛火動

耳聾者亦用四物湯因鬱而聾者通聖散為大黃酒煨再用酒炒三次後入諸藥通用酒炒耳鳴因酒過者大劑通聖散加枳殼柴胡大黃甘草南星桔梗青皮荆芥不愈用四物湯炒耳鳴必用龍會丸食後服氣實入楨榔丸或神芎丸下之聾病必用龍會丸四物湯養陰濕痰者神芎丸楨榔丸耳濕腫痛涼膈散加酒炒大黃黃芩酒浸茵風荆芥羌活服腦多射少濕加枯礬吹耳內閉閉然亦是陰虛戴云亦有氣閉者蓋亦是熱氣閉者耳不鳴也

入方

草麻子

四十九粒

棗肉

一筒

右入人乳汁搗成膏石上畧晒乾使無如指大綿裹塞於耳

又方

鼠膽汗滴入耳中尤妙

又方

將龜放在漆桌上尿出用綿滓之掬入青葱管中滴入耳中

附諸賢論

王節齋曰耳鳴證或鳴甚如彈或左或右或時閉塞世人多作腎虛治不効殊不知此是痰火上升鬱於耳中而為鳴鬱甚則壅閉矣遇此疾但審其平昔飲酒厚味上焦素有痰火只作清痰降火治之大抵此症多因先有痰火在上又感惱怒而得怒氣上少陽之火容於耳也若是腎虛而鳴者亦是膀胱相火上升故也其鳴不甚其人必多慾當見勞怯之證

附諸方

犀角飲子

濟生方

治風熱上壅兩耳聾閉內外腫痛膿水流

犀角

菖蒲

木通

玄參

赤芍藥

赤小豆

炒

甘菊花

去枝梗各一刃

甘草

炙半刃

右咬咀每服四錢水一盞半生姜五片煎七分溫服

清神散

治風氣壅上頭目不清耳常重聽

姜蚕

炒去絲嘴

乾菊花

各一刃

荆芥穗

羌活

木通

川芎

香附

防風

石菖蒲

甘草

各三刃

右為末每服三錢食後臨卧茶調下

復聽湯

姚芳伯傳

治痰火上攻耳聾耳鳴

半夏 製

陳皮 去白

白茯苓 去皮

甘草 炙

篇蓄

木通

瞿麥

黃柏 去粗皮炒 色各一

右用水二茶鍾生姜三片煎至一茶鍾空心臨卧各一服

涼膈散

治風熱上攻耳聾

見濕熱

通聖散

治風熱上攻耳聾

見斑疹

滾痰丸

治熱痰濕痰耳聾

見痰類

神芩散

治濕熱濕痰耳聾

見火類

換柳丸

治濕熱濕痰耳聾

見病類

龍會丸

治肝火上升耳聾

見脇痛

和劑流氣飲

治氣閉耳聾

見氣滯

內加菖蒲生姜葱白同煎服

凡治聾須開鬱行氣

六味地黄丸 治陰虛火動耳聾

見補損

內加知母黃柏菖蒲遠志

地黄丸 治勞損耳聾

熟地黄

當歸

川芎

辣桂

兔絲子

川椒 炒

故紙 炒

白茯苓 炒

胡盧巴 炒

杜仲 炒

白芷

石菖蒲

各二分半

磁石

火燒醋淬七次研水飛一分二分半

右為末煉蜜丸如梧子大每五十丸葱白溫酒下

磁石羊腎丸

治諸般耳聾補虛開鬱行氣散風去濕

磁石三兩火煨醋淬七次用葱子一合木通三兩用水同

煎一晝夜去葱子木通不用取淨三兩

川芎

白朮

川椒 去目

寒肉 去核

防風

茯苓

北細辛

山藥

遠志

去心

大川烏

炮

木香

當歸

鹿茸

酒浸一宿炒

羌活

酒浸炒

黃芪

各一兩

肉桂

六錢半

熟地黃

二兩

石菖蒲

一兩半

右為末用羊腎兩對去皮膜以酒煮爛研細好酒糊丸如梧子大每五十九空心温酒下鹽湯亦可

○廣按冊溪云耳聾皆屬於熱而已上二方又用辛熱之藥

不無使人疑議殊不知耳聾多屬痰火鬱結非磁石之鎮

墜川烏之流通與夫川椒細辛肉桂菖蒲之辛散則老痰

鬱火何由而開耳聾何由而愈哉雖然耳聾由此而愈亦

為劫劑後當以通聖散和之可也

○已上諸方內治之劑

一方 治耳聾久不聞者

紫磁石 一塊如豆大 山川甲 燒存性為末一字

右用新綿子裹塞於患耳內口中含些生鉄覺耳內如風聲即愈

一方 用甘草末吹入左耳甘草末吹入右耳立効

一方 治耳痛及聾

用巴豆十四粒研爛以鷄脂半兩鎔化和巴豆末為丸如小豆大以綿裹塞耳中

耳鳴方

草烏燒 石菖蒲

右等分為末用綿裹塞耳中一日三度

耳鳴暴聾方

川椒

石菖蒲

松脂 各二錢半

山豆肉 半斤

右為末溶蠟丸如棗核大塞入耳

取耳方 治風熱搏之津液結鞣成核塞耳

生豬脂

地龍

釜下墨 等分

右件細研以葱汁和捏如棗核薄綿裹入耳令潤即取出

紅綿散 治聾耳有膿及黃水

海鱧鮓

枯礬

各一升

射香 一字

乾胭脂 五分

右為末用管吹入耳中

一方

用五倍子焙乾一兩全蝎三錢燒存性為細末吹入耳中

一方

用枯白礬一錢胭脂一字射香少許研細以綿杖子先輾去

耳中膿水即用別纏杖子送藥入耳中 一方加龍骨亦佳

一方 治耳內膿出或黃汁

石膏新瓦上煨明礬枯

黃丹炒

真蛤粉

龍骨各等分射香少許

右為末綿纏竹筒拭耳換綿蘸藥入耳

一方 治耳作膿者

用甘草一塊如棗核大以綿裹塞耳中以甘草口中徐徐嚼

耳爛 用貝母研末乾摻

治百虫入耳

一方用香油灌入耳即出

一方用雞冠血滴入耳即出

一方驢牛乳最良灌入耳即出

治一切虫物入耳

用竹管入耳門 口氣盡力吸出最妙

一方 治凍耳

用橄欖核燒灰清油調敷雀腦亦可

○已上諸方外治之法

○廣按丹溪云耳聾皆屬於熱誠哉斯言然有左耳聾者有右耳聾者有左右耳俱聾者不可不分經而治也夫左耳聾者少陽火也龍會丸主之右耳聾者太陽之火也六味

地黃丸主之左右耳俱聾者陽明之火也通聖散滾痰丸
主之何以言之有所忿怒過度則動少陽膽火從左起故
使左耳聾也有所色慾過度則動太陽膀胱相火從右起
故使右耳聾也有所醇酒厚味過度則動陽明胃火從中
起故使左右耳俱聾也蓋左耳聾者婦人多有之以其多
忿怒故也右耳聾者男子多有之以其多色慾故也左右
耳俱聾者膏粱之家多有之以其多肥甘故也總三者而
論之忿怒致耳聾者為多丹溪云厥陰少陽火多皆用
痰散風熱其此之謂乎

鼻病

六十五

已集

丹溪心法

○酒瘡鼻是血熱入肺 治法用四物湯加陳皮又云栢皮紅
花酒炒黃芩煎入好酒數滴就調炒五靈脂末同服格致論中
於上藥有茯苓生姜氣弱者加黃芪

入方

用桐油入黃連末以天吊藤燒灰熱傅之 一云用桐油入
天吊藤燒油熟調黃連末拌傅之

又方

用山柘末蜜蠟丸彈子大空心嚼一丸白湯下

治鼻中瘰肉 胃中有食積熱痰流注治本當消食積

蝴蝶簪 二錢

細辛 一錢

白芷 半錢

右為末內鼻中

治鼻淵

南星

半夏

蒼朮

白芷

神麩

酒芍

辛夷

荆芥

各等分

右末水調食後服

諸賢論

王節齋曰鼻塞不聞香臭或但遇寒月多塞或畧感風寒便塞
 不時舉發者世俗皆以為肺寒而用解表通利辛溫之藥不
 効殊不知此是肺經素有火邪火鬱甚則喜得熱而惡見寒
 故遇寒便塞遇感便發也治法清肺降火為主而佐以通氣
 之劑若如常鼻塞不聞香臭者再察其平素只作肺熱治之
 清金瀉火消痰或丸散藥化或末煎輕調緩服久服無不効

矣此予所親見而治驗者其平素原無鼻塞舊證一特偶感風寒而致窒塞聲重或流清涕者自作風寒治

附諸方

菖蒲散 御藥院方 治鼻內窒塞不通不得喘息

菖蒲

皂角 等分

右為末每用一錢綿裹塞鼻中仰臥片時

增損防風通聖散 治鼻塞不利肺氣不清

鼠粘子

桔梗

桑白皮

紫苑

荊芥穗

三兩

甘草

生二兩

右以咀每服八錢水一鍾半姜五片煎八分食後溫服

羌活散

治腦有爵執遇寒鼻塞

見傷風

附

五

仙木芎散 治腦有鬱熱遇寒鼻塞

見風熱

川芎石膏湯 治腦有鬱熱遇寒鼻塞

見中風

○已上數方治鼻塞之劑

蒼耳散 三日方 治鼻流濁涕不止名曰鼻淵

辛荑仁 半兩 蒼耳子 炒 二香白芷 一兩 薄荷葉 半錢

右為末每服二錢 葱茶清食後調下

辛荑散 濟生方 治肺虛為四氣所干鼻內壅塞涕出不已或氣

息不通或不聞香臭

川芎 木通 去節 防風 去蘆 甘草

辛荑仁 細辛 洗去土 藜本 升麻

香白芷 各等分

右為末每服三錢茶清調下

防風湯 治鼻淵腦熱滲下濁涕不止久而不已必衄血

防風 二兩半 黃芩 人參 甘草炙

川芎 麥門冬 夫心各一兩

右為末每服二錢沸湯調食後服

○已上數方治鼻淵之劑

鉛紅散 治風熱上攻面鼻生紫赤刺癢疹俗乎肺風

舶紅硫黃 白礬 枯各半兩

右為末黃丹少許染與病人面色同每上半錢津液塗之

卧再塗兼服升麻湯下瀉青丸以險病根也

蜀方升麻湯

熟半夏

茯苓

白芷

當歸 各二錢

蒼朮

乾葛

桔梗

升麻 各一兩

熟枳殼

乾姜 各半錢 大黃 蒸半

芍藥 七錢半

陳皮

甘草 各一兩半

右吹咀每服五錢生姜燈心水煎食前服

瀉青丸

見中風

白龍丸

治酒瘡鼻并滿面紫赤酒刺

川芎

藁本

細辛

白芷

甘草

等分

右為末每四兩入煨石膏末一斤水丸逐日用此丸末洗面如澡豆法更晝少時方用湯洗去

方

用黃柏苦參槐柳等分為末傳以豬脂調尤妙

又方

用青黛槐花杏仁研傳之

又方

用杏仁研乳汁傳之

○已上數方治酒瘡鼻之劑

白黃散 簡易方 治鼻艱癢肉鼻痔等症

雄黃

白礬

細辛

瓜子各等分

右為末搗入鼻中

干黃膏 御藥院方 治鼻生瘰肉窒塞不通有時疼痛

方

四

辛美藥 二劑 細辛

木香

不通

白芷

杏仁湯炮去皮尖研各五錢用

右將羊髓猪脂二兩和藥於石器內慢火熬成膏取赤黃色
放冷入龍腦射香一錢為丸綿裹塞鼻中數日肉脫即愈

爵金散

治鼻中生瘻肉

用爵金猪牙皂角各一兩二味水浸一宿火煮透爵金為度
去皂角不用以爵金焙乾再用此細辛半兩射香硃砂各一
錢同為末煉蜜丸如茶子大每服一丸食後細嚼茶湯嚥下

輕黃散

治鼻中瘻肉

雌黃 半兩

射香 少許

輕粉

杏仁湯炮去皮尖

雙者仁各一錢

右於乳鉢內先研杏仁如泥餘藥同研細勻磁盒蓋好每
患者不問深淺夜臥用筋頭點梗米大絛鼻中隔夜一次半
月効

又方

用狗骨燒灰加硃砂少許每用搗鼻中瘰肉自化

又方

以胡荽搗爛塞鼻中一夕自然落也

又方

用白礬燒為末面脂和之鋪塞鼻中數日瘰肉隨藥落

又方

用雄鼠一塊如棗塞鼻中過十餘日瘰肉自落

○已上數方治瘡肉之劑

口舌 六中六

已集

丹溪心法

○口瘡服涼藥不愈者因中焦土虛不能食相火衝上無制
用理中湯人參白朮甘草補土之虛乾姜散火之標甚則加附
子或噙官桂亦妙 一方生白礬為末貼之極効或噙良久以
水漱之再噙 一方治口瘡甚者用西瓜漿水徐徐飲之冬月
無此用西瓜皮燒灰傳之 又方煮建好酒煮呷下立愈 又
方遠志醋研鷲毛掃患處出涎

方

細辛

黃栢 炒等分 一云黃連

右為末貼之或摻舌上吐涎水如再傳須旋合之若合下既
又甚効

治滿口白爛

萹撥為末一兩

厚黃栢一兩

右用栢火炙為末醋煎數沸後調上藥漱涎再用白湯漱口
則愈

附諸方

立効散 端効方 治唇緊瘡疼痛

訶子肉

五倍子

右為末乾貼唇上立効

赴筵散 端効方 治赤白口瘡

黃栢

青黛

蜜陀僧

右為末乾貼瘡

黃柳散 應驗方治口瘡疼痛大有神效

五倍子 三錢 寒水石半兩 蒲黃

黃丹 三錢半

右為末每服少許乾貼瘡

龍石散 和劑方治大人小兒上隔壅毒口舌生瘡咽噎腫塞疼

病妨悶每用少許搽貼患處嚥津小兒瘡疹毒氣攻口齒先

用五福化毒丹掃後仍再用此藥搽貼立效

硃砂一錢半 研用 寒水石煨通赤三錢二分半 生腦子 二錢半 研

右為末每日三五次用夜卧搽貼妙

清金散 端効方治大人小兒白口瘡急惡狀似木耳

五倍子

去上四錢

青黛

四錢

右為末好油調貼瘡上咽喉中瘡爛用竹管吹入喉中有

津吐出

兼金散

三因方

治熱毒生瘡於舌

細辛

黃連

各等分

右為末先以布帛蘸水揩淨患處搽藥於上涎出即愈

赴筵散

澹寮方 治口瘡疼痛

五味子

嫩者

滑石

半兩研

黃栢

半兩蜜炒

右為末每服半錢乾搽瘡上良久便可飲食

治口瘡

張子和方

白礬

一兩枯

黃丹

一兩 煖火紅放下再炒紫色為度

右為末，搽於瘡上，即愈。

一方 治爾蠶

用黃栢一兩，去粗皮，以五倍子二錢，蜜陀僧上草各少許，三味為末，水調敷在黃栢上，灸三五次，藥末盡為度。後將黃栢切作片子，臨卧時貼於患處，天明則愈。

一方 治爛疔瘡

用橄欖燒灰，存性為末，先用米泔水洗淨，後搽上藥。

一方 治舌腫

用百草霜為末，以好醋調敷，立效。

柳花散 治口舌生瘡

玄胡索 一兩
黃栢

黃連 各半兩
蜜陀僧 三錢

青黛 二升

右為末傳貼口內有津即吐

○已上諸方治標之劑

升麻散

濟生方

治上膈壅毒口舌生瘡咽喉腫痛

甘草

生用五錢

升麻

赤芍藥

人參

桔梗

乾葛

各一兩

右咬咀每服四錢水一鍾半姜五片煎八分溫服

瀉黃飲子

濟生方

治風熱蘊於脾經唇燥折裂口舌生瘡

白芷

升麻

枳殼

去白炒

黃芩

防風

半夏

湯洗

石斛

各一兩

甘草

炙半兩

右咬咀每服四錢水一盞姜五片煎七分溫服

黑參丸 治口舌生瘡久不愈

黑參

天門冬

麥門冬 去心各炒一兩

右為末煉蜜丸如彈子大每用一九綿裹噙化嚥津

增損如聖散 治上焦熱壅口舌生瘡

桔梗 二兩

甘草 炙一兩半

防風 半兩

枳殼 製二各半

黃芩 一兩

右為末每服三錢水煎食後服

○已上諸方治本之劑

○廣按口舌証中治標之劑毛靜而治本之劑稍畧宜於火類風熱類之中選而用之

〔牙齒〕 六十四

丹溪心法

○牙痛梧桐淚為末少加射香擦之 牙大痛必用胡椒薑擦

能散其中浮熱間以升麻寒水石佐以李涼荆芥薄荷細辛之

類 又方用清涼藥便便痛不開必須涎治薑擦川芎薄荷荆

芥細辛樟腦青鹽

治牙痛甚者

防風 羌活

青鹽合同 細辛

薑擦 川椒

右為末擦噙

又方

南星為末霜梅五個取其引涎以剗芥薄荷散風熱青鹽入
腎入骨擦噙

又方

蒲公英燒灰香附末

白芷

青鹽

右為末擦噙

治陰虛牙出鮮血氣鬱

用四物湯加牛膝香附生甘草側柏

蛀牙

蘆薈白膠香塞蛀孔中

陽明熱而牙痛

大黃香附各燒灰存性為末入青鹽少許不時擦牙上

固齒

用羊脰骨燒存性二錢當歸白芷猪牙皂角青鹽各一錢為末擦牙上

刷牙藥

燒白羊骨灰一两升麻一两黃連半錢擦用

附諸賢論

王節齋曰牙床腫痛齒痛動搖或黑爛脫落世人皆作腎虛治殊不知此屬陽明濕熱蓋齒雖屬腎而生於牙床上下床屬陽明大腸與胃猶木生於土也腸胃傷於美酒厚味膏粱甘滑之物以致濕熱上攻則牙床不清而為腫為痛或出血或生虫由是齒不得安而動搖黑爛脫落也治宜瀉陽明之濕

熱則牙床清寧而齒自然安固矣

附諸方

血竭散 應驗方 牢牙定痛治牙齒根注復連臍骨疼痛久而不

愈者

血竭

石膽

乳香

五靈脂

蜜陀僧

各等分

右研令勻每用一字以指蘸貼牙病處候少時荆芥湯漱

立効散

御藥

治牙疼不可忍

百草霜

細研

澹鹽

研各一

射香

淨

乳香

研細各半

右拌一處再研勻每用少許口噙溫水隨牙疼一邊鼻內搗

之用無時尤妙

又方

用蒼耳草細辛芫花小麥川椒各等分剉碎水煎時時噙嗽吐去藥不可嚥下 又細辛芫花二味擦漱尤妙

青龍散

御藥院方

治陽經風熱齒斷腫痛

香白芷

川芎

盆硝

細辛

各半兩

青黛 三錢

薄荷葉 二錢

右為末以指蘸藥擦牙腫處吐津誤嚥不妨

宣牙膏

御藥院方

治齒牙動搖不牢疼痛不止斷肉出血

射香 一字

龍骨

定粉

另研各二尔半

右二味為細末後入射香勻用黃蠟一兩磁盞內鎔開入藥於內攪勻放冷取出熨斗燒鋪紙內藥攤之勻薄每用剪作

紙條見臨卧於齒患處齒斷間封貼一宿至次日早晨取出
藥每夜用之此半月消牙齒腫忽生斷肉治痔蝕去風邪牢
牙齒大有神効

梧桐淚散 御藥院方 治牙齒斷腫悶宣露血出

梧桐淚 川号 細辛 白芷 各半錢

生地黃 一錢 青鹽 二分 寒水石 燒熟二分

右件同為細末每用塗貼患處吐涎候燥不妨無時日五七次

露蜂房散 御藥院方 治牙齒疼痛經驗神効

露蜂房 炒黃 細辛 各二分 大戟 七錢半 防風 一錢一分半

右以咀每五錢水一鍾煎七分去滓熱嗽冷吐無時

消毒散 御藥院方 治齒斷并口唇生瘡腫痛

晚蚕蛾

五倍子

蜜陀僧各一錢

右為細末每用少許乾傳瘡上有津吐出

開關散應驗方治牙關緊急不開因風熱攻注牙齒

川芎

薄荷

盆硝

白芷

全蝎各一錢 蠶蚕

天麻各半錢

細辛一錢

右為末每用少許以指蘸藥滿口擦牙斷斷噙半時用溫水

漱吐

太和散御藥治牙齒動搖斷肉浮腫虫鉗發痛

梧桐淚

白茯苓

生地黄各半錢

川芎

香白芷

升麻各三分

華陰細辛三分 青鹽一分

射香半分

牙皂燒存性二分

荆芥去梗 一兩 硝砂半兩 細辛一兩 川椒去目炒 白芷二兩

鶴虱 牙皂 單搽各半 草烏一兩

右為末每用少許於痛處頻頻搽之有涎吐出仍用漱鹽湯

丁香散御藥 治牙齒疼痛

丁香 草撥 蝎稍 大椒各等分為末 擦法同前

定痛散御藥院方 治牙風疼痛立効

細辛生半兩 草烏兩 全蝎半兩 乳香二錢

右為末每用少許擦牙痛處引涎吐之須臾以鹽湯灌漱即止

雄黃定痛膏楊氏家藏方 治牙齒疼痛

盆硝三錢 雄黃一錢 細辛二錢 大蒜二枚 牙皂四錠 二錢

右為末同大蒜一處搗為膏丸如梧子每用一丸將綿子裹

藥左邊牙痛放在左耳右邊牙疼放在右耳內良久痛止取出藥丸可治數人亦皆治之

一方 治一切牙痛

川升麻

當歸

川欒金

細辛

萹撥

白芷

荊芥

各等分

右為末用尾合子貯之緊閉合口勿令泄氣每用少許搯在牙痛處以溫荊芥湯送漱立効

一方 治牙疼

鶴虱

細辛

白芷

甘松

各等分

右為末拭牙上或煎湯嚥漱立効

方 治風牙疼

防風

麻黃

生地黄

各一兩

羌花

蜂窠

各五錢

花椒

三錢

浮麥

一把

右為粗末入葱白三根同水煎熟漱不可嚥下

一方 治虫牙疼不可忍

用漢椒為末以巴豆一粒研成膏飯丸如蛀孔大綿裹安於

蛀孔內立効

草揆散 治風虫牙疼

草揆

二錢

蝎稍

良姜

各一錢

草烏

去皮尖五分

右為末以指蘸藥擦於患處

一方 取疼牙落不犯手

草烏

草揆

各半兩

川椒

細辛

各一兩

右為末每用少許擦於患牙處其牙自落

○已上諸方外散治標之劑

獨活散

御藥院方

清頭目發散風熱治陽明經不利邪毒攻注

牙齒斷肉虛浮宣露根下動搖發痛又治偏頭痛漸漸攻注

眼目或發疼痛視物不明其藥功效不可具述

川芎

獨活

羌活

防風

各一錢六分半

細辛 七分

薄荷

生地黄

荊芥

各一錢

右粗末作一服水二鍾煎一鍾去滓溫服食後日進三兩服愈

上清防風散

御藥院方

治上焦不利風熱攻衝氣血鬱滯牙疔

悶痛斷肉虛腫鼻塞聲重頭目昏眩並皆治之

防風

細辛

去苗葉

薄荷葉

各二錢半

川芎

一錢七分

獨活 去頭蘆

天麻

荊芥穗

甘草 炙

白檀

白芷

各二錢
二分半

片腦

一分五厘

右同為細末入腦子再研勻細每服二錢淡茶清調勻稍熱
漱冷吐不拘時如竟頭昏目痛牙齒腫悶用熱茶清調三錢
食後服

甘露飲子

御藥院方

治男子婦人胃中客熱口氣齒斷腫悶宣

露心中多煩飢不欲食嗜卧及咽喉中有瘡並皆治之

黃芩

天門冬

枇杷葉

甘草

枳殼

麥門冬

生乾地黄

山茵陳

石斛

熟地黄

各等分

右為粗末每服五錢水一大鍾煎至七分去滓溫服食後若

齒斷宣露腫悶煎藥熱漱之極驗

敗毒散 御藥院方 治風熱攻注牙齒疼痛久而不愈

細辛 五分 薄荷葉 一錢半 地骨皮 五錢 荆芥穗 三錢半

右為粗末每服七錢水二鍾煎至一鍾去滓溫漱冷吐煎服

尤服

地骨皮散 應驗 治牙齒虛熱氣毒攻衝斷肉腫痛口舌生瘡此

藥如神

柴胡 四錢 地骨皮 三錢 薄荷 二錢

右吹咀作一服水一鍾半煎至一鍾去滓熱漱冷吐煎服愈好

升麻散 御藥院方 治牙齒疼痛生斷肉去熱毒解外風寒

防風 去苗 當歸 升麻 各二錢 藥本 去苗土

甘草炙

白芷

細辛

芍藥各一錢

木香半分

右件搗羅為散於乳鉢中研細塗點齒斷粗者以水二鍾藥

五錢煎至七沸去滓執漱冷吐秋冬牙痛用此煎服解嚴妙

地黃散御藥院方治風熱攻注陽明牙痛斷腫或血出宣露

生地黄半錢防風

細辛

薄荷葉

地骨皮

藁本各一錢

茵草葉

當歸

荊芥穗各半錢

右同為粗末作一服水一鍾半煎至一鍾去滓微執漱口冷

吐之煎服尤妙

至池散

御藥院方

治牙痛或動搖不牢

丹藥

五

地骨皮

白芷

升麻

防風

細辛

川芎

槐花

當歸

去薑頭

藁本

去土

甘草 生各一錢

右為粗末作一服水一鍾半煎至二鍾去滓溫熱漱口冷則

吐之前服尤妙 張龍圖去地骨皮加獨活治牙流膿血變

骨槽風者及骨已出者俱效

○已上諸方內消治木之劑宜於火類風熱類選用

血竭散 應驗 治牙疳并惡瘡不差如神

寒水石

燒熟四兩細研

龍骨 一兩

蒲黃 二兩

血竭 五錢

枯白礬 一兩

右為末每用少許貼在瘡口上紙封貼

應驗 治牙齒疳蝕口生瘡立效

寒水石 燒熟一兩細研 蒲黃 五錢 黃丹 五錢

右為末每用少許乾貼瘡上噙多時吐出

一方 治走馬牙疳

黃栢 藜蘆 石膏 銅青 膽礬

射香 少許 龍骨 病急多用病輕少用

右以火焙存性為末每用五分擦於患處

一方 治牙疳

青黛 三錢 銅綠 晉礬 黃栢 藜蘆

枯礬 人言 用紅棗十枚去核各分入內以火煨作灰用

芒硝 各二錢 射香 半錢 輕粉 九點 黃連 二錢

右為末後入輕粉射香研勻少許擦患處

一方

五倍子妙焦一兩 銅青 明礬各一兩 射香少許

右研末先以鹽醋湯洗患處拭乾摻藥於上

○已上諸方治疳之劑

固齒茯苓散應驗牢牙固齒固密不生疳疾

龍骨 寒水石燒熟升麻 香白芷

茯苓各一兩 細辛 青塩各三錢 石膏四兩

射香半錢 石燕子大者半對火燒醋淬七次

右為末每日早晨以指蘸藥擦牙後用溫水漱口吐出

白牙藥御藥院方治牙齒黃黑不瑩淨

零陵香

白芷

青鹽

升麻

各二錢半

石膏

細末一兩

細辛

一錢

射香

半兩

砂鍋

細末一兩

右除砂鍋膏香三味外五味同為細末加上前三味共八味

調勻再研每日早晨以指蘸藥擦牙後用溫水漱口吐出

土蒺藜散

御藥院方

治牙齒疼痛斷腫搥動常用擦漱固齒

土蒺藜

去角生用不以多少

右為粗末每服五錢淡漿水半碗煎至七八沸去滓入鹽末

一捻帶熱時時漱之別無所忌然雖藥味不衆蓋單方之藥

取效急遠兼神仙秘旨云若人服蒺藜一年已後冬不寒夏

不熱服之二年老若復少髮白復黑齒落重生服之三年

身長生今雖不作湯散服餌入而漱之其驗亦同

沉香白牙散 御藥院方 搗齒堂淨令白及治口臭

沉香 射香各五分 細辛 升麻

藁本 藿香葉 其松 白芷 各一錢二分

石膏 一兩 寒水石 一兩

右為末 每日早晚揩牙

齒藥方 三因 西嶺蓮花峯神傳

猪牙皂角及生姜 西國升麻熟地黄

木律旱蓮槐角子 細辛荷葉要相當

青藍等分同燒燬 研細將來使最良

揩齒牙 牙髭髮黑 誰知世上有仙方

用新瓦罐盛藥合口以麻縛定 塩泥固濟日乾穿一地

先放新磚後放藥以鐵口
下層炭火燒令青烟出稍存性
去火經宿取為末每用擦
牙溫水漱之一夫早連作黃連

方 固齒烏鬣髮

丁香 沉香各半兩 石燕子 一雙火煨醋淬七次

龍骨 一錢 海馬 一雙酥炒 茴香 一兩 生地黃 三兩

射香 二錢 青盐 半兩

右為末每用一撮空心擦牙縫嚼片時溫水漱去


羌活散 應驗 漱牙藥去風止痛

薄荷 羌活 二錢 大黃 一錢

右用水二鍾煎至一鍾去滓溫漱冷吐之藥亦無妨

以上諸方固齒之劑

○廣按牙痛之証其人服藥以治其濕熱上出於牙齦之間適
被風寒或冷飲所傷則寒熱不得外達故作痛也其病情
有標本之分所用藥有溫涼之異何則牙痛之証寒是標
故外擦漱之藥宜辛溫以散寒開鬱熱是本故內服餌之
藥宜辛涼以散熱清中如此則內外交攻標本兩治其病
豈有不愈者乎



Handwritten notes in black ink on a small, torn piece of paper. The characters are written vertically and appear to be '子' and '少'.

Faded printed text in vertical columns, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is difficult to read due to fading and includes characters such as '証其入脈', '出於牙齦之間', '不得外達故作痛也', '其病備', '牙痛之証寒是', '本故內服餌之'.

Handwritten Chinese characters in a vertical column, likely a signature or a note. The characters are written in a cursive style. The text is partially obscured by a large tear in the paper at the top left.

