


v. 26 - v. 30

利
乙

增
廣
本
草
綱
目



本草綱目菜部目錄第二十六卷

李時珍曰凡草木之可茹者謂之菜。韭薤葱蒜藟素蘭三穀為養菜。為充所以輔佐穀氣。疏通壅滯也。古者三農生九穀。場圃

藝草木以備飢饉。菜固不止于五而已。我國初周憲王圖草木之可濟生者四百餘種。為救荒本草。厥有言哉。夫陰之所生。本在五味

陰之五宮。傷在五味。謹和五味。臟腑以通氣血。以流骨正筋。榮膝理以密。可以長之。是以內則有訓食醫。有方菜之于人。補非小也。但五

菜之良毒。各不同。五味之所入。有偏勝。民生日用而不知。乃搜可茹草九百五種。為菜部分為五類。曰薑辛曰菜滑曰蔬曰水曰芝栢

舊本草部三品共六十五種。今併入五種。移十三種入草部。六種入果部。自草部移入及併二十三種。自穀部移入一種。果部移入一種。外類有名未用移入三種。

神農本草經二十三種

梁陶弘景註

名醫別錄二十七種

梁陶弘景註

唐本草七種

唐蘇恭

千金食治三種

唐孫思邈

本草拾遺一十三種

唐陳藏器

倉療本草三種

唐孟詵張鼎

食性本草一種

南唐陳士良

蜀本草二種

蜀韓保昇

日華本草二種

宋人大明

開寶本草七種

宋馬志

嘉祐本草十種

宋掌禹錫

圖經本草四種

宋蘇頌

證類本草一種

宋唐慎微

日用本草三種

元吳瑞

食物本草二種

明汪頌

食鑑本草一種

明竇原

救荒本草一種

明周王

本草綱目一十七種

明李時珍

附註

魏李壹之藥錄
唐甄權藥性

齊徐之才藥對
楊損之刪繁

元李杲法象
明原嘉謨蒙全

吳普本草
蕭炳四聲

元朱震亨補遺
宋寇宗奭衍義

王好古湯液

宋雷斅炮炙
唐李珣海藥

金張元素珍珠囊
明汪機會編

菜之一

葷辛類三十二種

韭 別錄

山韭 千金
李文非附

葱 別錄

蒼葱 千金

胡葱 開寶

薤 別錄 即藟
子 薤為附

蒜 別錄

山蒜 拾遺

葫 別錄
即大蒜

五臺菜 拾遺

薑 唐本
即油菜

蒜 別錄
即白菜

芥 別錄

白芥 開寶

蕪菁 別錄
即蔓菁

菜菔 唐本
即蘿蔔

生薑 別錄

乾薑 本經 天
三乾薑附

筒蒿 嘉祐

邪蒿 嘉祐

胡荽 嘉祐

胡蘿蔔 綱目

水蘄 本經
即芹菜

莖 唐本
即旱芹

紫葢 圖經

馬薺 唐本

蘘香 唐本
即茴香

蔞蘿 開寶
池得勒

蜀胡
馬思答吉附

藥
綱目

數低

葦鼓
拾遺

羅勒
嘉祐
即蘭香

白花菜
食物

右附方舊一百五十新二百九十二

本草綱目菜部第二十六卷

菜之一 萱菜類三十二種

非別錄中品錄多錄鐘乳拾起陽侯氏藥譜○頌曰案許慎說文非字象葉出地上形一種而久生故謂之非一歲三四割其根不傷至冬莖

名非善禮記謂非為豐本言其美在根也集解時珍曰非叢生豐本長葉青翠可以根分可以子種其性內生不得外長葉高三寸便剪

薺之美在白非之美在黃黃乃未出土者集解時珍曰非叢生豐本長葉青翠可以根分可以子種其性內生不得外長葉高三寸便剪

言剪而復生久而不乏也九月收子其子黑色而扁須風處陰乾勿令沓鬱北人至冬移根于土窖中培以馬屎暖則即長高可尺許不

見風日其葉黃嫩謂之非黃嫩貴皆珍之非之為菜可生可熟可漬可久乃菜中最有益者也羅願爾雅翼云物久必變故老非為莧頌

曰鄭玄言政道得利陰物變為陽氣味辛微酸溫無毒時珍曰生辛溫熟甘酸天明曰熟宗頌曰春食則香夏食則臭多食則能昏神

故慈愛為非可驗葱冷而非溫時珍曰生辛溫熟甘酸天明曰熟宗頌曰春食則香夏食則臭多食則能昏神

宿飲吐水不可與主治歸心安五臟陰胃中熱利病人可久食別錄時珍曰案千金方作可久食不利病人黃鯽魚鮓食斷空下利根入生髮膏用弘景根蒸

煮食溫中下氣補虛益陽調和臟腑令人能食止洩血膿腹中冷痛生搗汁服主胸痺骨痛不可觸者又解藥毒療狂狗咬人數發者亦

塗諸蛇虺蠍蟲毒藏器煮食充肺氣除心腹痼冷瘰癧搗汁服治肥白人中風失音日華煮食歸腎壯陽止洩精暖腰膝海原燒熟以鹽醋

空心喫十疳治胸膈噎氣搗汁服治胸痺刺痛如錐即吐出胸中惡血甚驗又灌初生小兒吐去惡水惡血永無諸病說主吐血唾血衄

血尿血婦人經脈逆行打撲傷損及膈噎搗汁澄清和童尿飲之能消散胃脘痰血甚效震亨飲生汁主上氣喘息欲絕解肉脯毒煮汁

飲止消渴益汗重蓮婦血運洗腸痔脫肛時珍發明弘景曰此菜味辛臭雖煮食之便出猶熏灼不如葱薺熟即無氣最是養生所忌頌曰

菜中此物最溫而益人宜常食之昔人正月節食五辛以辟癘氣謂非薺葱蒜薑也宗

腫曰疔黃未出糞土最不宜入食之滯氣益含抑鬱未申之氣故也孔子曰不時不食正謂此類花食之亦動風思適曰非味酸肝病宜食之大益人心時珍曰非葉根根溫功用相同生則辛而散血熟則甘而補中入足厥陰經乃肝之菜也素問言心病宜食非葉食鐵本

草言歸腎文雖異而理則相貫蓋心乃肝之子腎乃肝之母母能令子實虛則補其母也道家曰為五臟之一謂其能昏人神而動虛陽也有一貧叟病疔膈食入即吐胸中刺痛或令取韭汁入鹹梅肉汁少許細呷得入漸加忽吐稠涎數升而愈此亦依仲景治胸痺用韭

白皆取其辛溫能散胃脘痰飲惡血之義也懷亨曰心痛有食熱物及怒鬱致死血留于胃口作痛者宜用韭汁桔梗加入藥中開提氣血有腎氣上攻以致心痛者宜用韭汁和五苓散為丸空心茴香湯下蓋韭性急能散胃口血滯也又反胃宜用韭汁二盃入薑汁牛乳

各一盃細細溫服蓋韭汁消血薑汁下氣消痰和胃牛乳能解熱潤燥補虛也一人臘月飲到酒三盃自后食必屈曲下

一胸痺急痛 賦曰胸脾痛如錐刺不得俯仰白汗出或微背不上治 陰陽易病 男子陰腫小腹絞痛頭重眼花宜猴鼠尿湯煮之用猴鼠

服得汗愈未汗再 南陽活人書傷寒發復上方同 卒然中惡 搗韭汁灌鼻中使 臥忽不寤 勿以火照之但痛齒指甲際而唾其面則活

烏梅十四個吳茱萸炒半升水一斗煮之仍以病人櫛內入 煮三沸柳浮者生沉者死者至三升分三服 金匱要畧 喘急欲絕 韭汁飲 夜出盜汗 韭根四十九根水二升淘渴引飲 韭苗日用三

作羹勿入鹽入醬無妨喫至十斤即住極效過清明 勿喫有人病此引飲无度得此方而愈 秦憲副方 喉腫難食 韭一把搗熟傅之 食之良 食醫心鏡 脫肛不收 以酥拌炒熟

綿裹作二包更互熨 疔瘡作痛 用盆盛沸湯以器蓋之留一孔用洗淨韭菜一把泡湯 袖珍方 小兒胎毒 初生時以韭汁少許灌之即吐出

腹脹 韭根搗汁和猪肋煎服一 小兒患黃 韭根搗汁日滴鼻中 疔瘡不發 韭根煎湯服 產後嘔水 產後因怒哭傷肝嘔青綠水用韭葉一

方 產後血暈 韭菜切安瓶中沃以熟醋令 氣入鼻中即省 丹溪心法 赤白帶下 韭根搗汁和童尿露一夜空 鼻衄不止 韭根葱根同搗大塞入鼻中

炒存性搗末以猪脂和 塗之數度愈 經驗方 金瘡出血 韭汁和風化石灰日乾每用 腫痛者煎熱 漆瘡作痒 韭葉桿傅 斗門方 獠狗咬傷 七日當一發三七

為末傅之效 頰湖集簡方 刺傷中水 搗之 十金 漆瘡作痒 韭葉桿傅 斗門方 獠狗咬傷 七日當一發三七

心溫服取效 海上仙方 鼻衄不止 韭根葱根同搗大塞入鼻中 頻易兩三度自止 十金方 五般瘡癬 韭

斤取汁入薑汁少許和飲遂愈 摘玄 根

根

根

根

根

根

根

子無風處以冷水洗淨即服進汁一盤隔七日又一盤四十九日共服七盤須百日忌食酸鹹一年忌食魚腥終身忌食狗肉方得保全否則十有九死徐本齋云此法出肘後方有風犬一日咬三人止一人用此得活親見有效簡便百虫入耳進汁灌之即出

十享耳出汁 進汁日滴三牙齒靈非葉連根洗搗同人家地板上泥和傅痛處臍上以紙蓋住一時取下有細虫在泥上可除根 方非根十個川椒二十粒香油少許以水桶上泥同搗傅病牙頰上良久有虫出數次即愈也

解肉脯毒 凡肉罌器蓋過夜者為醬肉屋漏沾者為食生非汁服數升良千金 張文仲備急方

非子 大明曰入藥揀淨蒸熟氣味辛甘溫無毒 時珍曰陽也伏石鍾乳乳香 治夢中洩精溺血別錄 暖腰膝治鬼交甚效日華補肝及命門治

小便頻數遺尿 女白淫白帶時珍曰 非子得龍骨桑螵蛸主漏精補中萬洪孫思邈諸方多用之私景曰 非子入棘刺諸丸主漏龍骨一兩高末空心酒服方寸匕千金方治遺尿小便數用非子二兩桑螵蛸一兩微炒研末每旦酒服二錢三因方治下元虛冷小便不禁或成白濁有家非子丸益非乃肝之葉入足厥陰經腎主閉藏肝主疎洩素問曰足厥陰病則遺尿思想無窮入房太甚發為筋痿及為白淫男隨漫而下女子綿綿而下非子之治遺精漏泄小便頻數女人

帶下者能入厥陰補下焦肝及命門之不足命門者藏精之府故同治云附方 舊三新四 夢遺溺白藏器曰 非子每日空心生吞一二十粒鹹湯下 聖惠湯虛勞傷腎夢中洩精

用非子二兩微炒為末虛勞弱精 用新非子二升十月霜後米之好酒八合漬一宿以晴明日重夢遺遺尿 非子一升稻米二斗水一斗食前溫酒服二錢匕子向南搗一萬杵平旦溫酒服方寸匕日再服之 外臺祕要

玉莖強中 玉莖強硬不痿精流不住時時如針刺控之則痛其病名強中乃腎滯漏疾非子一升 棘刺蒸兩炊又暴乾金方 玉莖強中也 用非子破故紙各一兩為末每服三錢水一盞煎服日三即住經驗方 月脚無力去 黑皮炒黃粉安息香二大兩

水煮一二百沸慢火炒赤色和搗為丸梧子大如乾入少蜜每日空腹酒下三十九丸以飯三五匙壓之 大佳崔元亭海上方 女人帶下及 男子腎虛冷夢遺用非子七升醋煮千沸焙研末

用瓦片煨紅安非子數粒清油數點待烟起以筒吸引至痛處良久以溫水嗽吐有小虫出為初未盡再煮 救急易方

山非子 音纖並音纖並 山非子也山中往往有之而人多不識形性亦與家進相類但根白葉如燈心苗耳韓詩云六月食

山非子音纖並 山非子也山中往往有之而人多不識形性亦與家進相類但根白葉如燈心苗耳韓詩云六月食

山非子音纖並 山非子也山中往往有之而人多不識形性亦與家進相類但根白葉如燈心苗耳韓詩云六月食

野韭沙葱人皆采而食之即此也蘇氏以詩之簡即此未知是否又呂忱字林云登重嚴氣味鹹寒瀉無毒主治胃腎主大小便數去煩

水韭也野生水涯葉如韭而細長可食觀此則知野韭又有山水二種氣味或不相遠也

熱治毛髮子發明時珍曰霍腎之菜也醫病宜食之諸家本草不載而孫思邈千金方收之他書霍字多誤作藿字蓋乃豆葉也陳直奉

五日一作之附錄文非拾遺錄器曰平溫無毒主腹內冷脹滿洩痢腸辟溫中補虛令人能行主塞北山谷壯如匪人多食之云

云極補益是後魏孝文帝所種又有諸葛匪孔明所種此韭更長彼人食之時珍曰此亦山韭也但因人命名耳

葱別錄中品釋名孔穎達和事草鹿胎時珍曰葱從忽外直中空有忽通之象也孔者草中有孔也故字從孔孔棘參之葱初

山葱曰蒼葱療病以胡葱其人間食葱有二種一種凍葱經冬不死分莖栽時而無子一種漢葱冬即葉枯食用入藥凍葱最毒氣味亦

佳也傳昇曰葱凡四種冬葱即凍葱也夏冬盛莖葉俱軟美山南江左有之漢葱莖實硬而味薄冬即葉枯胡葱莖葉粗硬根若金燈

赤每莖上出岐如八角故云端曰龍角即龍爪葱又名羊角葱莖上生根移下時之時珍曰冬葱即葱葱或名大官葱謂其莖柔細而香

可以經冬太官上供宜之故有數名漢葱一名木葱其莖粗硬故有木名冬葱無子漢葱

葱莖白氣味辛平薑根鬚汁並無毒和事草時珍曰葱有寒熱白冷香熱傷寒湯中不得用青也宗奭曰葱主發散多食昏人神說曰

回正月食生葱令人面上起遊風生葱同蜜食作下利燒葱同蜜食藥毒氣殺人張仲景治作湯治傷寒熱中風面浮腫能出汗本經

傷

傷

傷

傷

傷

傷

傷

傷

傷

傷

傷

傷

傷

傷

傷

傷

野韭沙葱人皆采而食之即此也蘇氏以詩之簡即此未知是否又呂忱字林云登重嚴

水韭也野生水涯葉如韭而細長可食觀此則知野韭又有山水二種氣味或不相遠也

熱治毛髮子發明時珍曰霍腎之菜也醫病宜食之諸家本草不載而孫思邈千金方收之他書霍字多誤作藿字蓋乃豆葉也陳直奉

五日一作之附錄文非拾遺錄器曰平溫無毒主腹內冷脹滿洩痢腸辟溫中補虛令人能行主塞北山谷壯如匪人多食之云

云極補益是後魏孝文帝所種又有諸葛匪孔明所種此韭更長彼人食之時珍曰此亦山韭也但因人命名耳

葱別錄中品釋名孔穎達和事草鹿胎時珍曰葱從忽外直中空有忽通之象也孔者草中有孔也故字從孔孔棘參之葱初

山葱曰蒼葱療病以胡葱其人間食葱有二種一種凍葱經冬不死分莖栽時而無子一種漢葱冬即葉枯食用入藥凍葱最毒氣味亦

佳也傳昇曰葱凡四種冬葱即凍葱也夏冬盛莖葉俱軟美山南江左有之漢葱莖實硬而味薄冬即葉枯胡葱莖葉粗硬根若金燈

赤每莖上出岐如八角故云端曰龍角即龍爪葱又名羊角葱莖上生根移下時之時珍曰冬葱即葱葱或名大官葱謂其莖柔細而香

可以經冬太官上供宜之故有數名漢葱一名木葱其莖粗硬故有木名冬葱無子漢葱

葱莖白氣味辛平薑根鬚汁並無毒和事草時珍曰葱有寒熱白冷香熱傷寒湯中不得用青也宗奭曰葱主發散多食昏人神說曰

回正月食生葱令人面上起遊風生葱同蜜食作下利燒葱同蜜食藥毒氣殺人張仲景治作湯治傷寒熱中風面浮腫能出汗本經

傷

傷

傷

傷

傷

傷

傷

傷

傷

傷

傷

傷

傷

傷

傷

傷

傷

傷

傷

傷

平氣厚味薄升也陽也入手太陰足陽明經專主發散以通上下陽氣故活人書治傷寒頭痛如破用連鬚葱白湯主之張仲景治少陰病下利清穀裏寒外熱厥逆脉微者白通湯主之內用葱白若面色赤者四逆湯加葱白腹中痛者去葱白成無已解之云腎惡燥急食辛以潤之葱白辛溫以通陽氣也時珍曰葱乃釋家五葷之一生辛散熱甘溫外實中空肺之菜也肺病宜食之肺主氣外應皮毛其合陽明故所治之症多屬太陰陽明皆取其發散通氣之功通氣故能解毒及理血病氣者血之帥也氣通則血活矣金瘡破損折傷血出疼痛不止者王璆百一方用葱白砂糖等分研封之云痛立止更無痕癩也葱葉亦可

汗 頻湖 傷寒頭痛 如破者連鬚葱白半斤生薑 發熱者以連根葱白二十根和米煮粥 初起一二日不能分 傷寒 集簡方 二兩水煮溫服 活人書 時疾頭痛 入醋少許熱食取汗即解 濟生秘覽 數種傷寒 別者用上法取汗

勞復 因交接者腹痛卵腫用葱白搗爛苦酒一盞和服之 千金方 風溼身痛 生葱搗爛入香油數點水煎調川芎 丹溪心法 妊娠傷寒 赤斑變為黑斑尿血者以葱白一把水三

六月孕動 因驚難救者葱白一大握水三升 煎一升去滓頓服 楊氏產乳 胎動下血 病痛擔心用葱白煮濃汁飲之未死即安已死即出未效再 卒中惡死 或先病或 奄忽而死皆是中惡急取葱心黃刺入鼻孔中男女左右入七八寸鼻自血出即甦○又法用 小兒卒死 鼻孔中氣通或噴即活 陳氏 葱刺入耳中五寸以鼻中血出即活也如無血出即不可治矣相傳此病鵲秘方也 崔氏纂要 小兒卒死 鼻孔中氣通或噴即活 陳氏

經驗 小兒盤腸 內釣腹痛用葱湯洗兒腹仍以炒葱搗貼 陰毒腹痛 厥逆昏昏卵縮六脉欲絕者用葱一束去根及青留白二寸烘熱安 臍上良久尿出痛止 湯氏嬰孩寶鑑 臍上以慰斗火熨之葱環則易長久熱氣透入手足溫有汗即瘥乃 服四逆湯若熱而手足不溫 脫陽危症 凡人大吐大泄之後四肢厥冷不省人事或與女子交後小腹腎痛外腎搖縮冷汗出厥逆須臾 不可治 朱眩南陽活人書 脫陽危症 不救先以葱白炒熱耐臍後以葱白三七莖搗爛用酒煮灌之陽氣即回此華佗救卒病方也

卒心急痛 牙關緊閉欲絕以老葱白五莖去皮鬚搗膏以匙送入咽中灌以麻油四兩 霍亂煩躁 坐臥不安葱白二十莖大棗二十 但得下咽即甦少頃虫積皆化黃水而下永不再發果得救人 瑞竹堂方 霍亂煩躁 取水三升煎二升分服 深師方 蚘虫

心痛 用葱莖白二寸鉛粉二錢搗丸服之即止 腹皮麻痺 不仁者多煮葱白食 危氏方 小便閉脹 不洽殺人葱白三斤剉炒怕盛二個更互 葱能通氣粉能殺虫也 楊氏經驗方 腹皮麻痺 之即自愈 危氏方 小便閉脹 煎小腹氣透即通也 許學士本事方 大小

便閉 搗葱白和酢封小腹上 大腸虛閉 勻氣散用連鬚葱一根薑一塊鹽一捻淡豉三七粒搗作餅 小兒虛閉 葱白三根煎湯調生薑阿 仍灸七壯 外臺秘要 烘揅臍中禁定良久氣通即通不通再作 楊氏直指方 膠末服仍以葱頭染塞插

菜部

菜部

菜部

菜部

菜部

入肝門少項即通全幼心鑑急淋陰腫沈葱半斤煨熟杵爛貼臍上外壺小便淋澀或有白者以赤棍搗葱近根截一寸許安臍中以艾灸七壯經驗方小兒不尿乃胎熱也用大葱白切四片用乳

不飲乳者服之即飲乳若膈四旁有青黑色及口撮者不可救也全幼心鑑毒屎閉因腫毒未潰小便不通用葱切入麻油煎至黑色去葱取油時塗腫處即通普濟水腫病腫葱根白皮煮汁服一盞當下水出

自下陰囊腫痛葱白乳香搗塗即時痛止腫消又方用煨葱入鹽杵如泥塗之小便溺血葱白一握鬱金一兩水一升煎二合溫服一日三次普濟方腸痔有血葱白三斤煮湯重洗立效外壺赤白下痢一握

細切和米煮粥日日便毒初起葱白炒熟布包腫數次乃用傅藥即消永類方難疽腫硬為金散治癰腫腫硬無頭不變色者米粉四食之食醫心鏡用葱根和蜜搗傅以紙密護之外服通氣藥即愈難疽腫硬兩葱白一兩同炒黑研末醋調貼一伏時又

換以消為度一切腫毒葱汁漬之外科精義葱汁一升頓服即散並千金疔瘡惡腫刺破以老葱生蜜杵貼兩時疔小兒禿瘡冷泔洗淨以羊角葱搗

楊氏刺瘡金瘡百治不效葱煎濃汁漬之甚良金瘡瘀血在腹者大葱白二十枚麻子三升杵碎水九升煮一升半頓服當吐出膿血而痛未盡再服並于金方血癰怪病人偏身忽然肉出如錐既拜且痛不能飲食名血壅不速治必潰膿

血以赤皮葱燒灰淋洗飲鼓湯解毒自安夏子益怪病奇方解毒自安夏子益怪病奇方解毒自安夏子益怪病奇方

蒜生薑研傳金瘡水入鞍腫鹽研傳蛇虫傷及中射工溪毒日水病足腫蘇頌利五臟益自精發黃疸思發明隨曰煨葱治打撲損

得于崔給事取葱新折者燒火煨熟剝皮其間有涕便將搗損處仍多煨續續易熟者崔云頃在澤潞與李抱真作判官李相方以毬杖按毬子其軍將以杖相格因傷李相指指并小甲臂製遮索金創藥裏之強索酒飲而面色愈青忍痛不止有軍吏言此方遂用之三易

面色却赤斯須云已不痛凡十數度用葱并涕纏裹其指遂舉席笑語解珍曰按張氏經驗方云金創折傷血出用葱白連葉煨熟或錫烙炒熱搗爛傅之冷即再易石城對戴克臣試馬損大指血出淋漓余用此方再易而痛止翌日洗面不見痕跡宋崔官鮑縣尹皆得

此方每有殺傷氣未絕者亟食用此活人甚眾又凡人頭目重悶附方舊三水病足痛葱葉煮湯漬之曰三小便不通葱白連葉搗爛

即通水腫毒取葱青葉和乾薑黃芩等分煮湯浸洗立愈金瘡蜘蛛咬瘡偏身生瘡青葱葉一莖去尖入蠟一條在內代指毒痛取薑黃葱葉煮汁

汁 氣味辛溫滑無毒 治瀉血飲之解熱虛及桂毒 別錄 散瘀血止衄止痛治頭痛耳聾消痔漏解藥毒 時珍 能消玉為水化五石仙方

所用 時珍曰葱汁即葱涕切同葱白古方多用葱涎丸藥亦取其通散上焦風氣也勝金方取汁入酒少許滴鼻中治衄血不止 云即覺血從腦散下也又唐珣經驗方以葱汁和蜜少許服之亦佳云隣媪用此甚效老僕試之亦驗二物同食害人向以

能治此疾恐人脾胃不同非甚急不可輕試也順微曰三洞要錄云葱者菜之伯也能消金錫玉石神仙消金玉漿法于冬至日 以空虛盛葱汁及根埋庭中次年直至發出盡化高水以法清金玉銀青石各三分自消矣暴乾如飴食之可休糧亦曰金漿也 附方 四

新 衄血不止 方見 金瘡益 不止取葱炙熟接汁 從頭起者生 痔瘻作痛 葱涎白蜜和塗之先以木鑿子煎湯重洗其冷如水 即效一人苦此早間用之午刻即安也 唐仲舉方

解鉤吻毒 面青口噤欲死以葱 涕啖之即解 千金 葱汁塗之

彭蠡塗治通氣 孟 瘰癧飽食房勞滲入大腸便血腸癖成痔口乾研末每服二錢溫酒下 時 附方 舊 一喉中腫塞 氣不通者葱豉煎乾為末 每用二錢入蒲州膽礬末

一錢和勻每用一 字吹之 杜士方

花 主治 疔痛如錐刀刺腹脹用一升同吳茱萸一升水八合煎七合去滓分三服立效 頌 出崔 實氣味辛大溫無毒 治明目補

中氣不足 本 經 溫中益精 日 宜肺歸頭 附方 舊 一眼暗補中 葱子半升為末每取一匙煎湯一升半去滓入米煮粥食之亦可 為末蜜丸梧子大食後米湯服一二十九日三服 食醫心鏡

茗 葱 音 格 釋名 葱 條 昇曰 茗 葱 生山谷不入藥用 頌曰 爾雅云 茗 山葱也 說文云 茗 葱 生山中 細 莖 大 葉 食之香 美 於 常 葱 宜 入藥用 時珍曰 茗 葱 野 葱 也 山 原 平 地 皆 有 之 生 沙 地 者 名 沙 葱 生 水 澤 者 名 水 葱 野 人 皆 食 之 開 白 花 結

子如小葱頭世俗不容胡葱即蒜葱誤指此為胡葱詳見胡葱下保丹言不入藥用 緣 頌言入藥宜用山葱胡葱今攷思邈千金食性自有茗葱功用而諸本失收今採補之 氣味 微溫 無毒 時珍曰 佛家以 茗 葱 為 五 葷 之 一 見 蒜 下 王 治 除 瘡

氣 惡 毒 食 強 志 益 膽 氣 思 主 諸 莖 狐 尿 刺 毒 山 溪 中 沙 藪 射 毒 毒 煮 汁 浸 或 搗 傳 大 効 亦 兼 小 蒜 蒜 輩 不 獨 用 也 蘇 恭

本草綱目 卷三十六 菜部

野薤俗名天薤生麥原中葉似薤而小味益辛亦可供食但不多有即爾雅山薤是也

薤白

氣味辛溫滑 好古曰入手陽明經 曰薤且去青留白白冷而青熱也 說曰發熱病不宜 多食三月勿食生者大明曰生食引涕唾不可與牛肉同食令人作癰疽 **主治** 金瘡瘡敗輕身不飢耐老

歸骨除寒熱去水氣溫中散結氣作養食利病人諸瘡中風寒水氣腫痛瘻之別 錄 養食耐寒調中補不足止久痢瀉肥健人 日治洩

痢下重龍泄下佳陽明氣滯 李晃好古曰下重者氣滯也四逆散加此以泄氣滯 治陰病厥逆洩痢及胸痺刺痛下氣散血安胎 時 心病宜食之利產婦 思 治女

人帶下赤白作養食之高噎在咽不去者食之即下 五 說補虛解毒 頌 白者補益柔者養食及風生臙肉 蘇 與蜜同搗湯火傷甚遠

溫補助陽道 時 弘景曰薤性溫補仙方及服食家皆須之偏入諸音用不可生噉葷辛為忌 說曰薤白色者最好雖有辛不葷五臟

曰薤味辛氣溫諸家言其溫補而蘇頌圖經獨謂其冷補按杜甫詩云東比青芻色圓齋王筋頭衰年關膈冷味暖併無憂亦言其溫

補與經文相合則冷補之說益不然也又按王禛云薤生則氣辛熱則甘美種之不蠹食之有益故學道人資之老人宜之然道家以

薤為五葷之一而諸氏言其不葷何即薛用弱齊諧志云安陸郭坦兒得天行病後遂能大餐每日食至一斛五年家貧行乞一日大饑

至一園食薤一畦大蒜一畦便悶極倒地吐一物如龍漸漸縮小有入懷飯於上即消成水而病尋瘳也按此亦薤散結蒜消癥之驗也

附方 舊十五 **胸痺刺痛** 張仲景桂枝湯薤白湯治胸痺痛徹心高喘息欬唾短氣喉中燥痒寸脈沉

氣喘急方中用之亦取其滑泄之義 **附方** 新八 **胸痺刺痛** 邊關脈弦數不治殺人用栝樓實一枚薤白半升白酒七升煮二升分二

服○千金治胸痺半夏薤白湯用薤白四兩半夏一合枳實半兩生薑一兩栝樓實半枚以白 碎死或先病或平居癆臥 截漿三升煮一升溫服日三○時後治胸痛症而後發薤根五升搗汁飲之立瘥○截音在酢漿也 奄忽而死皆是中惡以薤 汁灌入鼻中 不止者以薤一虎口以水三升煮取一 奔豚氣痛 薤白搗汁飲 赤薤不止 薤同黃蘗煮汁 赤白薤下 薤白一握同 便省 時後 霍亂乾嘔 半頓服不過三作即已 韋宙獨行方 時後方 服之 陳藏器 赤白薤下 米煮粥日食 之 食 薤白生搗如泥以搜米粉和蜜作餅 多煮薤白食仍以羊腎 膩內冷痛薤白一升當歸四兩水 醫心鏡 小兒疳積 薤白生搗如泥以搜米粉和蜜作餅 炙熟與食不過三兩服 楊氏產乳 產後諸病 脂同炒食之 范汪方 女妖胎動 腹內冷痛薤白一升當歸四兩水 五

肉腫毒

科雜汁服二三

其毒殺人雖白搗爛以帛裹煨熟去帛傳之冷即易換亦

手指赤色

隨月生死以生雞一把苦酒煮

瘡癩

煮雞糞搗爛

白一升猪脂一斤切以苦酒浸一宿

手足癩瘡

以封瘡上取效

千金毒蛇驚

雞白搗傳

徐玉方虎大咬傷

三服瘡乃止

諸魚骨哽

白嚼柔以繩繫中吞到

誤吞釵環

取雞白曝蒸煮熟切食一

日中風發

作痛取雞白截斷安膜上

今徧痛作復為之

范汪

方咽喉腫痛

雞根醋搗傳腫處

拾遺藏器曰味辛溫無毒

主霍亂腹冷脹滿冷氣攻擊

腹滿冷脹滿不調產後血攻

此亦山雞之類方名不同耳

蒜

別錄蒜

時珍曰蒜字從蒜音諧聲也

又象蒜根之形中國初惟有此後因漢人得胡蒜於西域呼此為小蒜

以別之故伏候古今注云蒜胡蒜也俗謂之小蒜胡國有蒜十子一株名曰胡蒜俗謂之大蒜是矣蒜乃

五葷之一故許氏說文謂之葷菜五葷即五辛謂其辛臭昏神伐性也鍊形家以小蒜大蒜非葷薑胡荽為五葷道家以韭薤蒜芸薑胡

荽為五葷佛家以大蒜小蒜與葱慈蔥茗葱為五葷與蒜即阿魏也雖各不同然皆辛寒之物生食增毒熟食發燥有損性靈故絕之也

集解

別錄曰蒜小蒜也五月五日採之弘景曰小蒜生葉時可者和食至五月葉枯取根名亂子正爾噉之亦甚重臭得昇曰小蒜野生

處處有之小者一名亂音亂一名萬音力苗葉根子皆似胡而細數倍也爾雅云萬山蒜也說文云蒜葷菜也菜之美者雲夢之董

生山中者名萬嶺曰本草謂大蒜為胡小蒜為蒜而說文所謂葷菜者乃大蒜也萬即小蒜也書傳載物之別名不同如此用藥不可不

審宗頤曰小蒜即萬也苗如蔥針根白大者如萬芋子兼根煮食謂之宅蒜時珍曰家蒜有二種根莖俱小而瓣少辣甚者蒜也小蒜也

根莖俱大而瓣多辛而帶甘者胡也大蒜也按孫炎爾雅正義云帝登萬山遭穉子毒將死得蒜啗食乃解遂收植之能殺腥羶蟲魚之

毒又孫愐唐韻云張騫使西域始得大蒜種歸據此則小蒜之種自萬移徙從古已有故爾雅必萬為山蒜所以別家蒜也大蒜之種自

胡地移來至漢始有故別錄以胡為大蒜所以見中國之蒜小也又王禎農書云一種澤蒜最易滋蔓隨翻隨合熟時採子漫撒種之吳

人調鼎多用此根作道更勝葱韭也按此正別錄所謂小蒜是也其始自野澤移來故有澤名而冠氏誤作宅字參諸家皆以野生山蒜

澤蒜解家時之小蒜皆失於詳攷小蒜雖出於萬

既經人力栽培則性氣不能不移故不得不辨

蒜

小蒜

氣味辛溫有小毒弘景曰味辛性熱損人不可長食愈選曰無毒三月勿久食傷人志性黃帝書云同生魚食令人奪氣陰核疫瘧曰腳氣風病人及時病後忌食之

主治歸腎主霍亂腹中不安消

殺理胃中除邪痺毒氣別錄主漆毒私氣蠱毒傳蠱蛇沙虱瘡日華恭曰此蒜與胡葱相得主惡載壽山淫疔腫甚良孟

世世治心煩解諸毒小兒丹疹思發明頌曰古方多用小蒜治中冷霍亂煮汁飲之南齊褚澄治李道念雜病使孺示曰華位用

是食白淘雞子過多也取蒜一升煮食吐出一物涎裏視之乃雞雜翅足俱全登曰未盡也更吐之凡十二枚而愈或以蒜字作蘇字者

誤矣范曄後漢書云華佗見一人病噎食不得下令取餅店家蒜齋大可二升飲之立吐一蛇病者懸蛇于車造他家見壁北縣蛇數十

乃知其奇又夏子益奇疾方云人頭面上有光他人手近之如火熾者此中蠱也用蒜附方新七時氣濕病初得頭痛壯熱脈大即以

汁半兩和酒服之當吐出如蛇狀觀三書所載則蒜乃吐蠱要藥而後人鮮有知者蒜一升杵汁三合頓服不過

再作便愈時後方霍亂脹滿不得吐下名乾霍亂小蒜一升霍亂轉筋入腹殺人以小蒜鹽各一兩搗積年心痛不可忍不拘十年五年者隨手

曾用之有效再不發也兵部手集水毒中人一名中溪一名中溼一名水病似射工而無物初得惡寒頭目微疼旦醒暮劇手足逆冷三日則生虫食下

他病治之也射工中人成瘡者取蒜切片貼瘡上灸七壯千金止截瘡疾小蒜不拘多少研泥入黃丹少許丸如芥子汗出者小蒜一升並根一

沸漿熱薰之永類方惡核腫結小蒜吳茱萸等分搗傳即散射後五色丹毒無常及發足躁者杵小兒白毛頭上團白色以蒜切蛇蟻螫人小蒜搗汁服以

山蒜拾遺澤澤蒜頌曰江南一種山蒜似大蒜而臭穢器曰澤蒜根如小蒜葉如韭又生石間者名石蒜與蒜無異時珍曰山

云嵩山蒜也今京口有蒜山產蒜是也處處有之不獨江南又呂忱字林云冷水中山蒜也則蒜不但產于山而又產于水也別有山慈姑水仙花老鴉蒜石蒜之類根莖皆似蒜而不可食其花亦異並見草部下氣味辛溫無毒主治山蒜治積

塊及婦人血瘕用苦醋磨傳多效頌曰澤蒜石蒜並溫補下氣滑水源

胡別錄

下品釋名天蒜

景

弘景曰今人謂胡為大蒜蒜為小蒜以其氣類相似也薛珍曰按徐愐唐韻云張翥使西域始得

大蒜也五

月五日採獨子者入藥尤佳保昇曰胡出梁州者大徑二寸最美少半涇陽者皮亦甚嫩須曰今處處園圃種之每顆六七瓣初種一瓣當年便成獨子胡至明年則復其本矣其花中有實亦作胡瓣狀而極小亦可種之薛珍曰大小二蒜皆八月種春食治夏初食薑五月食根秋月收種北人

不可一日無者也

氣味辛溫有毒久食損人目

弘景曰性最重莫不可食俗人作齋以散鱸肉損性伐命莫此之甚惟可生食不中煮也恭曰此物煮羹臠為饌中之後而陶云不中煮當是未經試耳藏器曰初食不利目

多食却明久食令人血清使毛髮白時珍曰久食傷肝損眼故稽康養生論云葷辛言目此為甚耳今北人嗜蒜宿炕故百醫最多陳氏乃云多食明目與別錄相左何耶震亨曰大蒜屬火性熱喜散快腸善化肉暑月人多食之傷氣之禍積久自見養生者忌之化肉之功不足論也頌曰多食傷肺傷脾傷肝膽生痰助火昏神思遲曰四月八月食胡傷神令人喘悸口味多夢多食生胡行房傷肝氣令人面無色生胡合青魚鮮食令人腹内生瘻腸中腫又成疝瘕發黃疾合蜜食殺人凡服一切補藥不可食之

癰腫瘰癧除風邪殺毒氣

別錄

下氣消穀化肉

蘇恭

去水惡瘴氣除風溼破冷氣爛痲痺伏邪惡營通溫補瘰癧瘡殺鬼去痛

藏器

氣止霍亂轉筋腹痛除邪毒瘰癧勞瘵冷風傳風損冷痛惡瘡蛇蟲毒瘰癧毒沙蟲並搗貼之熟醋浸經年者良日溫水搗爛服治

中暑不醒搗貼足心止鼻衄不止和豆豉丸服治暴下血通水道

宗

搗汁飲治吐血心痛煮汁飲治角弓反張同鯽魚丸治腸氣同蛤粉

丸治水腫同黃丹丸治痢瘧疔疔同乳香丸治腹痛搗薑散能達下佳消水利大小便貼足心能引熱下行治泄瀉暴痢及乾溼霍亂

止衄血納肛中能通幽門治關格不通

時珍發明

宗奭曰胡氣極筆置臬肉中反能掩臬凡中暑毒人爛嚼三兩瓣溫水送之下咽即知但

通五臟達諸竅去寒溼辟邪惡消癰腫化癥積肉食此其功也故王禎稱之云味久不變可以資生可以致遠化臭腐為神奇調鼎俎代

醢醬搗之旅塗則矣風瘴雨不能加食餽腊毒不能害夏月食之解暑氣北方食肉麪尤不可無乃食經之上品日用之多助者也蓋不

知其辛能散氣熱能助火傷肺損目昏神伐性之害在再受之而不悟也嘗有一婦衄血一晝夜不止諸治不効時珍令以蒜傳足心即時血止真奇方也又葉石林避暑錄云一僕暑月馳馬忽仆地欲絕同食王相教用大蒜及道上執土各一握研爛以新汲水一瓊和取

汁決齒灌之少頃即甦相傳徐州市門忽有版書此方成以為神仙救人云儲器曰昔有患疔瘡者夢人教每日食大蒜三顆初服逆上

瞑眩吐逆下部如火後有人被取數片合皮截却兩頭吞之名曰內灸果獲大效也頌曰經言胡散癰腫按李絳兵部手集方云毒瘡便

毒號叫即眠不得人不能別者取獨頭蒜兩顆搗爛蘇油和厚傅瘡上乾即易之屢用救人無不神效盧坦侍郎肩上瘡作連心痛悶用

此便瘻又李僕射患腦癰久不瘥盧與此方亦瘥又葛洪時後方云凡背腫取獨頭蒜橫截一分安腫頭上炷艾如梧子大艾蒜百壯不

覺漸消多灸為善勿令大熱若覺痛即舉起蒜蒜更換新者勿令損皮肉洪憲苦小腹下患一大腫灸之亦瘥數用艾人無不應效又

江甯府紫極宮刻石記其事云但是發背及癰疽惡瘡腫核初起有異皆可灸之不計壯數惟要痛者灸至不痛不痛者灸至痛極而止

死發之類灸之亦便成亦自脫其効如神乃知方書無空言者但人不能以意詳審則不得盡應耳時珍曰按李迅論蒜灸法云癰疽

之發着交勝于用藥緣熱毒中昂上下不通必得毒氣發洩然後解散凡初發一日之內使用大獨頭蒜切如小錢厚貼頂上灸之三壯

一易大槩以百壯為率一便瘻不開大二便內肉不壞三瘡口易合一舉而三得之但頭及項以上切不可用此恐引氣上更生大禍也

又史源記蒜灸之功云母氏背脾作痒有赤壘半寸白粒如黍艾二七壯其亦隨消信宿有赤流下長二寸舉家歸咎于艾外醫用膏護

之日增一暈二十二日橫斜約六七寸痛楚不勝或言一尼病此得灸而愈于奔問之尼云劇時昏不知人但聞范奉議坐守灸八百餘

壯方甦約艾一節于亟歸以炷如銀杏大艾十數殊不覺乃灸四旁亦處皆痛每一壯爐則亦隨縮入三十餘壯亦甦收退蓋艾遲則初

發處肉已壞故不痛直待灸到好肉方痛也至夜則火城滿背瘡高卓而熱夜得安寢矣至曉如覆一甌高三四寸上有百數小窠色正

黑調理而安蓋高卓者每外出也小窠多毒不聚也色正黑皮肉壞也非艾火出其毒於壞肉之裏則內通五臟而危矣虞醫傳貼涼冷

消散之說附方舊十六新 瘡灸法 凡背脊上腫硬疼痛用濕紙貼尋瘡頭用大蒜十顆浸鼓半合乳香一錢細研隨瘡頭大小用竹片
何可信哉附方三十一 瘡灸法 作圍圍定填藥於內二分厚着艾灸之痛灸至痒痒灸至痛以百壯為率與蒜錢灸法同功 外科

五色丹毒

無常色及發足躁者搗蒜厚傅乾即易之 肘後方 關格脹滿 大小便不通獨頭

山嵐瘴氣

生熟大 蒜各七

疔腫毒

用門白灰一撮羅細以獨蒜或新蒜薑蔥皮擦瘡口候瘻要 自然出少汗再擦少頃即消散也雖發背癰腫亦可擦之

乾溼霍亂

轉筋用大蒜搗塗足 心立愈 永類鈴方 水氣腫滿 大蒜田螺車前子等分熬膏攤貼臍中水從便洩而下數日

瘰癧瘻

肘後用獨頭蒜炭上燒之酒服方寸匕○簡便用桃仁半片攷內關穴上將獨蒜搗爛卷之縛

寒瘧冷劑

端午日以獨頭蒜十個黃丹二錢搗丸梧 子大每服九丸長流水下甚妙 普濟方 泄瀉暴痢 大蒜搗貼兩足心亦

腸毒下血

蒜連 丸用

血 時珍曰：血者，菜子葉同功。其味辛，氣溫，能散其用。長於行血，滯破結氣。故古方消腫散結，治產後一切心腹氣血痛。諸

珍發明 遊風丹毒熱腫瘡疥，諸藥咸用之。經水行後，加入四物湯服之。云能斷產。又治小兒驚風，貼其頂額，則引氣上出也。婦人方

治產難，歌云：黃金花結泉木實，細研酒下。五粒靈丹功効妙，如神難產之時能救急。**附方** 新十 **靈藥散** 治產後惡露不下，血結衝心，刺痛將來。緩過胃寒，踏冷其血必往來。心腹

善子炒當歸，桂心，赤芍藥等分。母酒服二錢，趕下惡物。楊氏產乳 **產後血暈** 善子生地黃等分，為末。每服三錢，薑七片，酒水各

氣塊甚効。用善子微炒，桂心各一兩，高良薑半兩，為末。醋糊丸。梧子大，每淡醋湯下五丸。沈存中：善死方 **腸風臟毒** 下血，善子生用甘草炙為末。每服二錢，水煎服之。普濟方 **頭風作痛** 善子一分，大黃

善子白芥子角茴香等分。不嗜鼻左嗜右，嗜左 聖惠 **小兒天釣** 善子生高頭去皮尖，各一錢，為末。每用一錢，水調塗頂上。名塗頂散。聖濟總錄 **風瘡不愈** 善子油同穿山甲末，熬成

子狗頭骨等分為末。醋和傅之。千金方 **傷損樟膏** 善子一兩，小黃米炒二合，龍骨少許，為末。醋調成膏，攤紙上貼之。乾坤秘韞 **湯火傷灼** 菜子油調蚯蚓屎，搽之。楊起簡便單方 **蜈蚣蠶湯** 菜子油傾地上，搽地

四眼人見 陸氏積德堂方 **松** 別錄 時珍曰：按陸佃埤雅云：松性凌冬，晚凋，四時常見。葉如蕪菁，綠色，差淡，其味微苦。葉嫩稍闊，曰揚州一種。

上品釋名 有松之操，故曰松。今俗謂之白菜，其色青白也。 陸佃曰：松葉如蕪菁，綠色，差淡，其味微苦。葉嫩稍闊，曰揚州一種。松葉圓而大，或若蓬咳之，無渣絕勝。他土者，疑即牛肚松也。時珍曰：松即今人呼為白菜者有二：一種葉圓而微青，一種葉扁薄而白。

其葉皆淡青，白色燕趙遼陽揚州所種者，最肥大而厚。一本有重十餘斤者。南方之松，畦內過久，北方者多入窖內，燕京園人又以馬糞入窖，壅培不見風，日長出苗，葉皆嫩黃色，脫美無滓，謂之黃芽菜。貴以為壽品，蓋亦倣韭黃之法也。松子如

善子而色灰黑，八月以後種之。二月開黃花，如芥花，四瓣，三月結角，亦如芥。其菜作葷食，尤良，不宜蒸晒。 **正誤** 松曰松，有三種：牛肚松、葉薄細味少苦，白松似蕪菁也。松菜不生北土，有人將子北種，初一年即半為蕪菁，二年松種都絕。將蕪菁子南種，亦二年都變土地。所宜如此，須曰松南北皆有之。蕪菁香相類，種長葉不光者為蕪菁，短葉闊厚而肥痺者為松。舊說北土無松，今京洛種松都類南種。

但肥厚差不及蕪菁，曰蕪菁松，恐是一種。但在南土葉高而大者為松，秋冬有之。在北土葉短而小者為蕪菁，春夏有之。時珍曰：白松即白菜也。牛肚松即最肥大者。紫松即蘆服也。開紫花，故曰紫松。糖漿謂白松似蕪菁者，誤矣。根葉俱不同，而白松根堅小，不可食。

言南北變種者蓋指蔓菁也松而言紫松根似蔓菁而葉不同種類亦別又言北土無松者自唐以前或然近則白松紫松南北通有惟南土不種蔓菁種之亦易生也蘇頌漫為兩可之言注機兵起臆斷之辨俱屬揆誤今悉正之

苜蓿菜 氣味甘溫無毒 大明曰涼微毒多食發皮膚風癩非說曰發風冷內虛人不可食有熱人食亦不發病性冷可知本草言性溫未解其意弘景曰性和利人多食似小冷張仲景藥中有甘草食松即令病不除也頌曰有小毒不可食多

多則以生薑解之頌曰夏至前食發氣動疾有足疾者忌 **主治** 通利腸胃除胸中煩解酒渴 別錄 消食下氣治瘴氣止熱氣嗽汁尤佳 庸

之時珍曰氣虛胃冷人多食惡心吐沫氣壯人則相宜 **和中利大小便** 源附方 舊一 **小兒赤遊** 行於上下至心即死松葉搗 **漆毒瘡** 爛塗之 **飛絲入目** 白菜搗爛帕包滴汁三二 **子氣味甘**

平無毒 治油塗頭長髮刀劍不鏽 音秀 附方 舊 **酒醉不醒** 一蓋調為二服 聖惠方

芥 別錄 時珍曰按王安石字說云芥者界也發汗散氣界我者也王楙農 **集解** 弘景曰芥似松而有毛味辣可生食及作菹其子可以 上品釋名 書云其氣味辛烈菜中之介然者食之有剛介之象故字從介 藏冬瓜又有菘音郎作菹甚辣菜曰芥有三種葉大子

麤者葉可食子入藥用葉小子細者葉不堪食子但作菹又有白芥子粗大白色如白梁米甚辛美從西戎來頌曰芥處處有之有青芥似松有毛味極辣紫芥莖葉純紫可愛作菹最美味有白芥見本條其餘南芥旋芥花芥芥石芥之類皆菜茹之美者不能悉錄大抵南土多

芥相傳嶺南無蕪菁有人搗種至彼種之皆變作芥地氣使然耳時珍曰芥有數種青芥又名刺芥似白菘有柔毛有大芥亦名皺葉芥大葉皺紋色元深綠味更辛辣二芥宜入藥用有馬芥葉如青芥有花芥葉多缺刻如蘿蔔莖英有紫芥莖葉皆紫如蘇有石芥低小皆以

八九月下種冬月食者俗呼臘菜春月食者俗呼春菜四月食者謂之夏芥芥心嫩薑謂之芥藍瀟食脆美其花三月開黃色四出結莢一二寸子大如蘇子而色紫味辛研末泡過為芥醬以脩肉食辛香可愛劉恂嶺南異物志云南土芥高五六尺子大如雞子此又芥之

也 異者

蒸子菘菜 氣味辛溫無毒 說曰煮食動氣與風生食發丹石不可多食大葉者良細葉有毛者害人 **主治** 歸胃除腎經邪氣利九竅 時珍曰芥性辛熱而散故能通

明目安中久食溫中 別錄 **止咳嗽上氣除冷氣** 日 **主效逆下氣去頭面風** 孟 **通肺豁痰利膈開胃** 時 **發明** 時珍曰芥性辛熱而散故能通 肺開胃利氣豁痰久食則積溫

成熱辛散大盛耗人真元肝不受病昏人眼目發人瘡痔而別錄謂其能明耳目者蓋知暫時之快而不知積久之害也素問云辛走氣承氣病無多食辛多則肉脈而唇萎此類是矣陸佃云望梅生津食芥墮淚五液之自外至也蕪而涎垂塊而汗出五液之自內生也解

方新 牙齦腫爛 出臭水者芥菜桿燒存 飛絲入目 青菜汁點之如神 摘下方 漆瘡搔痒 芥菜煎湯洗之 十全方 痔瘡腫痛 芥菜搗餅頻坐之 該翁經效方

子氣味辛熱無毒 時珍曰多食昏目 動火泄氣傷精 **主治** 歸胃去一切邪惡疔氣喉痺 疔 疔氣發無常處及射工毒丸服之或搗末醋和塗之隨手有

驗蘇 治風毒腫及麻痺醋研傅之撲搗瘀血腰痛腎冷和生薑研塗貼之又治心痛酒調服之 日研末作醬食香美通利五臟 研末水

調塗頂顯止衄血 吳瑞 溫中散寒豁痰利發治胃寒吐食肺寒欬風急氣痛口噤唇緊消散癰腫瘰癧 時珍曰 芥子功與萊同其

通經絡治口噤耳聾鼻衄之證消瘀血癰腫痛痺之邪其性熱而溫中故又 舊五新 感寒無汗 水調芥子末填臍內以熱物隔衣

能利氣豁痰治嗽止吐主心腹諸痛白芥子辛烈更甚治病尤良見後本條 **附方** 十八 感寒無汗 水調芥子末填臍內以熱物隔衣

體麻木 芥菜子末醋調塗 濟生秘覽 中風口噤 舌本縮者用芥菜子一升研入醋二升煎一升傅頰頰下效 聖惠方 小兒唇緊 用馬芥子搗汁曝濃搗破 喉痺腫痛 芥子末水和傅

○又用辣芥子研末醋調取汁點入喉內待咳 內鳴却用陳麻骨燒烟吸入立愈 並聖惠方 耳聾龍頭 菜子末入乳汁和以綿 雀子不見 真菜芥子炒黑為末用羊肝一具分作八

食以汁送下 聖濟總錄 目中翳膜 芥子一粒輕手投入眼中少頃 眉毛不生 芥菜子半真等分為末生薑自然 鬼淫勞氣 芥子三升研末絹袋盛入

三次 廣濟方 熱痰煩運 方見 霍亂吐瀉 芥子搗細水和傅 反胃吐食 芥子末酒服方寸匕 上氣嘔吐 芥子末蜜丸梧子大井華水實 臍下絞痛 芥子末調酒貼之 走注風毒 作痛用小芥子末和一切癰腫 猪膽汁和芥子末貼之曰 癰腫熱毒 家芥子末同柏葉搗塗

更妙 執毒癰癧 小芥子末醋和貼之看 五種瘰癧 芥子末以水蜜和傅 有瘡用芥子末和酒厚塗 不行至一年者 千金翼 消即止恐損肉 肘後 乾即易之 廣濟方 射工中人 之半日痛即止 千金方 婦人經閉 臍腹痛腰腿沉

重寒熱往來用芥子二兩為末每服二錢熱酒食前服
仁存方 陰證傷寒 腹痛厥逆芥子研末水調貼臍上 生生編

白芥

宋開寶附釋名 白芥 實附 釋名 芥 單 買本

時珍曰其種來自胡戎而盛於蜀故名

集解 芥曰白芥子粗大白色如白梁米甚辛美從戎中來藏器曰白芥生太原河東

咬最佳而人間未多用之時珍曰白芥處處可種但人知時之者少爾以八九月下種冬生可食至春深莖高二三尺其葉花而有一花芥葉青白色莖易起而中空性脆最畏狂風大雪須護之乃免折損三月開黃花香郁結固如芥角其子大如梁米黃白色又有一種莖大而中實者尤高其子亦大此菜雖是芥類迥然別種也然入藥勝於芥子

莖葉氣味辛溫無毒 時珍曰耐後方言熱病人不可食胡芥為其性暖也 主治 冷氣 藏器 安五臟 功強芥同 日 華

子氣味辛溫無毒 治發汗主胸膈痰冷上氣面黃赤又醋研傅射毒 別錄 禦惡氣通口飛口及暴風毒腫流四肢疼痛木脚氣筋骨

服辟邪魅 日華藏器曰 入鎮宅方用 欬嗽胸脇支滿上氣多唾者每用溫酒吞下七粒 思邈 利氣豁痰除寒暖中散腫止痛治喘嗽及胃痺木脚氣筋骨

腰節諸痛 時珍曰 痰在胸下及皮裏膜外非白芥子莫能通古方控涎丹用白芥子正此義也時珍曰白芥子辛能入肺溫能發散故有利氣豁痰溫中開胃散積消腫辟惡之功按韓愈醫通云凡老人苦於痰氣喘嗽胸滿懶食不可妄投燥利之藥反耗真氣志因人求治其親靜中處三子養親湯治之隨試隨效蓋白芥子白色主痰下氣寬中紫蘇子紫色主氣定喘止咳蘿藦子白種者主食閉痞降氣各微炒研破看所主為君每劑不過三四錢用生絹袋盛入煮湯飲之勿煎太過則味苦辣若大便素實者入蜜一匙冬月加薑一片尤良

附方 舊一 反胃上氣 白芥子末酒服一熱痰煩運 白芥子黑芥子大戟甘遂芒消硃砂等分高末糊

南陵米齋子有辭餐之 新八 反胃上氣 二錢 普濟方 熱痰煩運 丸梧子大每服二十丸薑湯下名白芥丸 普濟 冷痰痞滿

黑芥子白芥子大戟甘遂胡椒桂心等分為末糊 腹冷氣起 白芥子一升微炒研末湯浸蒸餅丸小 腳氣作痛 方見 小兒乳癖 白芥子研丸梧子大每服十九丸薑湯下名黑芥丸 普濟方 腹冷氣起 豆大每薑湯各十九丸甚妙 續傳信方 腳氣作痛 白芷 小兒乳癖 末水調攤

膏貼之以平為 疔瘰入目 白芥子末水調塗足心引毒歸 腫毒初起 白芥子末醋調塗 胸脇痰飲 白芥子五錢白木一兩為末棗肉和搗

本草權度 疔瘰入目 下令瘡疹不入目 全効心鑑 腫毒初起 白芥子末醋調塗 胸脇痰飲 丸梧子大每白湯服五十丸 楠玄方

蕪菁

別錄上品釋名蕪菁唐本九英松食

療諸瘰癧

稱也塞北河西種者名九英蕪菁亦曰九英松根莖長大而味不美人以為軍糧禹錫曰爾雅

云須莖無詩谷風云采葑采菲毛萇註云葑須也孫炎云葑一名葑從禮坊記云葑蕪菁也陳宋之間謂之葑陸機云葑蕪菁也幽州人謂之芥郭璞云蕪菁似羊蹄葉細味醋可食揚雄方言蕪菁蕪菁也陳楚謂之蕪蕪菁謂之美蘭西謂之蕪蕪菁謂之大芥然則葑也須也蕪菁也蕪菁也蕪菁也蕪菁也七者一物也時珍曰按孫愐云蕪菁蕪菁也其說甚通字禹錫以蕪蕪菁謂蕪菁以蕪菁謂蕪菁是酸棧當以陳說為優詳見草部酸棧下劉禹錫嘉話錄云諸蕪菁所止令兵士獨種蕪菁者取其纒出甲可生啖一也蕪菁可煮食二也又居則隨以滋長三也葉不令惜四也則則易尋而採五也冬有根可食六也比諸蕪菁其利甚溥至今蜀人呼為諸蕪菁江陵亦

然又宋輔山溪雜叢話云貓獠狍狍地方產馬王菜味澀多刺即諸蕪菁也相傳馬殷所遺故名又蒙古人呼其根為沙吉木兒

弘景曰別錄蕪菁蕪菁同條蕪菁是今溫松其根可食葉不中啖蕪菁根細於溫松而葉似松好食西川惟種此其子與溫松甚相似而俗方無用惟服食家鍊餌之而不言蕪菁子恐不用也俗人蒸其根及作菹食但小蕪菁蕪菁曰蕪菁北人名蕪菁根莖及子皆是松類與蕪菁全別體用亦殊陶言蕪菁似蕪菁蕪菁不堪食是江表不產二物理喪其真也松子黑色蕪菁子紫赤色大小相似蕪菁子黃赤色而大數倍且不圓也大明曰蕪菁比蕪菁梗短而細葉大連地上生厚潤短肥而痺其色紅頰曰蕪菁南北皆有北土尤多四時常有春食由夏食心亦謂之蕪菁子秋食蕪菁食根河朔多種以備飢歲中之最有益者惟此爾其子夏秋熟時採之宗奭曰蕪菁夏月則枯當此之時蔬圃復種謂之雞王菜食心正在春時諸菜之中有益無損於世有功采擷之餘收子為油燃燈甚明西人食之河東太原

所出其根極大他處不及也又出西番吐谷渾地機曰葉見蕪菁根是蕪菁時珍曰別錄以蕪菁蕪菁同條遂致諸說猜度或以二物為一種或謂二物全別或謂在南為蕪菁在北為蕪菁殊無定見今按二物根莖花子都別非一類也蕪菁是芥屬根長而白其味辛苦而短莖粗葉大而厚闊夏初起蕪菁開黃花四出如芥結角亦如芥其子均圓宛似芥子而紫赤色蕪菁是松屬根圓亦有長者有紅白二色其味辛甘而永葉不甚大而糙亦有花葉者夏初起蕪菁開淡紫花結角如蕪狀腹大尾尖子似胡盧巴不均不圓黃赤色如此分之自明

白矣其蕪菁六月種者根大而蕪菁八月種者葉美而根小惟七月初種者根葉俱良擬賣者純種九次九英根大而味短削淨為道甚佳今燕京人以瓶醃藏謂之開齋菜

根並氣味苦溫無毒時珍曰辛甘苦寒

主治利五臟輕身益壽可長食之

別錄常食通中令人肥健

消食下氣治嗽止消渴去心腹

冷痛及熱毒風腫乳癰妬乳寒熱

附方舊八預穰時疾

立春後過庚子日溫薑膏汁合家大小並服
之不限多少一年可免時疫 神仙教子法 鼻中衄血 諸葛菜生搗汁 大醉不堪 連日病困者薑菜入少米煮 飲酒辟氣 乾薑青根二
不限多少一年可免時疫 神仙教子法 鼻中衄血 諸葛菜生搗汁 大醉不堪 連日病困者薑菜入少米煮 飲酒辟氣 乾薑青根二
不限多少一年可免時疫 神仙教子法 鼻中衄血 諸葛菜生搗汁 大醉不堪 連日病困者薑菜入少米煮 飲酒辟氣 乾薑青根二

破末酒後水服二錢 一切腫毒 生薑青根一握入鹽花少許同搗封之日三易之 丁腫有根 用大鐵刺作孔削薑青根如鐵大染鐵生衣
即無酒氣也 千金 腫毒 生薑青根一握入鹽花少許同搗封之日三易之 丁腫有根 用大鐵刺作孔削薑青根如鐵大染鐵生衣
即無酒氣也 千金 腫毒 生薑青根一握入鹽花少許同搗封之日三易之 丁腫有根 用大鐵刺作孔削薑青根如鐵大染鐵生衣

上有膿出即易須臾根出立瘥忌 時後乳癰 薑青根并葉去上不用水洗以鹽和搗塗之熱即換不過三五次 女子石乳 生薑青根搗和
油膩生冷五辛粘滑陳臭 時後乳癰 薑青根并葉去上不用水洗以鹽和搗塗之熱即換不過三五次 女子石乳 生薑青根搗和
油膩生冷五辛粘滑陳臭 時後乳癰 薑青根并葉去上不用水洗以鹽和搗塗之熱即換不過三五次 女子石乳 生薑青根搗和

洗之五六度良又方和雞 陰腫如斗 生薑青根搗封之治人 豌豆斑瘡 薑青根搗汁挑瘡破塗之 大咬傷瘡 重發者用薑青根搗
子白封之亦妙 食瘡 陰腫如斗 生薑青根搗封之治人 豌豆斑瘡 薑青根搗汁挑瘡破塗之 大咬傷瘡 重發者用薑青根搗
子白封之亦妙 食瘡 陰腫如斗 生薑青根搗封之治人 豌豆斑瘡 薑青根搗汁挑瘡破塗之 大咬傷瘡 重發者用薑青根搗

充 飛絲入眼 兩點即出也 普濟方
脂傳之 千金 飛絲入眼 兩點即出也 普濟方
脂傳之 千金 飛絲入眼 兩點即出也 普濟方

子氣味辛平無毒主治明目 療黃疸利小便水煮汁服 疔瘰癧積聚少飲汁治霍亂心腹脹末服之主目暗為油入面膏去黑
子氣味辛平無毒主治明目 療黃疸利小便水煮汁服 疔瘰癧積聚少飲汁治霍亂心腹脹末服之主目暗為油入面膏去黑
子氣味辛平無毒主治明目 療黃疸利小便水煮汁服 疔瘰癧積聚少飲汁治霍亂心腹脹末服之主目暗為油入面膏去黑

點皺文 蘇恭和油傳蜘蛛咬 蘇恭和油傳蜘蛛咬 蘇恭和油傳蜘蛛咬
點皺文 蘇恭和油傳蜘蛛咬 蘇恭和油傳蜘蛛咬 蘇恭和油傳蜘蛛咬
點皺文 蘇恭和油傳蜘蛛咬 蘇恭和油傳蜘蛛咬 蘇恭和油傳蜘蛛咬

亦以油和傳之薑青園中無蜘蛛是其相異也時珍曰薑青子可升可降能汗能吐能下能利小便又能明目解毒其功甚偉而世罕知
亦以油和傳之薑青園中無蜘蛛是其相異也時珍曰薑青子可升可降能汗能吐能下能利小便又能明目解毒其功甚偉而世罕知
亦以油和傳之薑青園中無蜘蛛是其相異也時珍曰薑青子可升可降能汗能吐能下能利小便又能明目解毒其功甚偉而世罕知

用之何哉夏初米子炒過榨油同麻油鍊熟一色無異西人多食之點燈甚明但烟亦損目北魏祖璉因地窖中因薑青子油燈傷明即
用之何哉夏初米子炒過榨油同麻油鍊熟一色無異西人多食之點燈甚明但烟亦損目北魏祖璉因地窖中因薑青子油燈傷明即
用之何哉夏初米子炒過榨油同麻油鍊熟一色無異西人多食之點燈甚明但烟亦損目北魏祖璉因地窖中因薑青子油燈傷明即

此附方 舊四新 明目氣 薑青子一升水九升煮汁盡日乾如此三度研細水 使人洞視腸腑用薑青子三升以苦酒三升煮
也 十八 明目氣 薑青子一升水九升煮汁盡日乾如此三度研細水 使人洞視腸腑用薑青子三升以苦酒三升煮
也 十八 明目氣 薑青子一升水九升煮汁盡日乾如此三度研細水 使人洞視腸腑用薑青子三升以苦酒三升煮

忌抱朴子云服盡一斗能 夜視有所見物 千金方 青眼障 但腫子不壞者十得九愈用薑青子六升蒸之氣過合飯取下列下以釜中執湯淋之乃
忌抱朴子云服盡一斗能 夜視有所見物 千金方 青眼障 但腫子不壞者十得九愈用薑青子六升蒸之氣過合飯取下列下以釜中執湯淋之乃
忌抱朴子云服盡一斗能 夜視有所見物 千金方 青眼障 但腫子不壞者十得九愈用薑青子六升蒸之氣過合飯取下列下以釜中執湯淋之乃

普南肝明目 薑青子淘過一斤黃精二斤同和九蒸九晒為末每空心米飲服二錢日再服○又方蔓 風邪攻目 視物不明肝氣虛者
普南肝明目 薑青子淘過一斤黃精二斤同和九蒸九晒為末每空心米飲服二錢日再服○又方蔓 風邪攻目 視物不明肝氣虛者
普南肝明目 薑青子淘過一斤黃精二斤同和九蒸九晒為末每空心米飲服二錢日再服○又方蔓 風邪攻目 視物不明肝氣虛者

瓶中燒黑無聲取出入蛇蛇二兩又燒成灰為 服食 聖濟總錄 服食 聖濟總錄 服食 聖濟總錄
瓶中燒黑無聲取出入蛇蛇二兩又燒成灰為 服食 聖濟總錄 服食 聖濟總錄 服食 聖濟總錄
瓶中燒黑無聲取出入蛇蛇二兩又燒成灰為 服食 聖濟總錄 服食 聖濟總錄 服食 聖濟總錄

末每服半錢食後酒下日三服 聖濟總錄 服食 聖濟總錄 服食 聖濟總錄
末每服半錢食後酒下日三服 聖濟總錄 服食 聖濟總錄 服食 聖濟總錄
末每服半錢食後酒下日三服 聖濟總錄 服食 聖濟總錄 服食 聖濟總錄

不深詳之豈因其賤而說曰性冷慳醜曰平不可與地黃同食令人髮白蓋其潤營
忍之即抑未諳其利耶氣味根辛甘苦辛苦溫無毒
衛也時珍曰多食氣脈動氣惟生薑能制其毒又伏咽砂主治散服及炮煮服食

大下氣消穀和中去痰癖肥健人生搗汁服止消渴試大有驗唐本利關節理顏色練五臟惡氣制麩毒行風氣去邪熱氣
炳利五臟輕身

令人白淨肌細孟詵消痰止咳治肺痿吐血溫中積不足同羊肉銀魚煮食治勞瘵欬嗽華同猪肉食益人生搗服治禁口痢汪穎搗汁服治

吐血衄血吳瑞寬胸膈利大小便生食止渴寬中煮食化痰消導實原殺魚鯨氣治豆腐積注主吞酸化積滯解酒毒散瘀血甚效末服治五

淋丸服治白濁煎湯洗腳氣飲汁治下痢及失音并烟熏欲生瘡塗打撲湯火傷時珍調方亦用其根燒熟入藥尤能制麩毒昔有婆

羅門僧東來見食麥麩者驚云此大熱何以食之又見食中有蘆根乃云賴有此以解其性自此相傳食麩必啖蘆根曰搗爛制麩作

餅飢食之最佳飽食亦不發熱蘇煎食之下氣凡人飲食過度生嚼嚙之便消慎微曰按楊僂談苑云江東居民言種芋三十畝計首米

三十斛種蘿蔔三十畝計益米三十斛則知蘿蔔果能消食也宗師曰服地黃何首烏人食菜服則令人髮白世皆以為此物味辛下

氣速也然生薑芥子更辛何止能散而已蓋菜脆辛而又甘故能散緩而又下氣速也所以散氣用生薑下氣用菜服李曰菜服屬土

有金與水冠氏言其下氣速人往往煮食過多停滯成溢飲豈非甘多而辛少乎時珍曰來根葉同功生食升氣熱食降氣蘇冠二氏

止言其下氣速孫真人言久食潤營衛亦不知其生則噫氣熱則洩氣升降之不同也大抵入太陰陽明少陽滯分故所主皆肺脾腸胃

三焦之病李九華云萊蕪多食滲人血則其白人鬚髮蓋亦由此非獨因其下氣潤營衛也按同微志云齊州有人病狂云蕪中見紅棠

女子引入宮殿中小姑令歌每日遂歌云五靈樓閣曉玲瓏天府由來是此中惆悵問懷言不盡一丸蘿蔔火吾宮有一道士云此犯大

麥毒也少女心神小姑脾神驚經言蘿蔔制麩毒故曰火吾宮大者毀也遂以藥并蘿蔔治之果愈又按張果嘗說云饒民李七病鼻衄

甚危醫以蘿蔔自然汁和無反酒飲之即止蓋血隨氣運氣滯故血妄行蘿蔔下氣而酒導之故也又云有人好食豆腐中毒醫治不效

忽見賣豆腐人言其妻誤以蘿蔔湯入鍋中遂致不成其人心悟乃以蘿蔔湯飲之而瘳物理之妙如此附方舊二新食物作愛蘿蔔生

或生菜嚼之亦佳絕妙乾者煮者鹽醃蘿蔔蜜煎浸細細飲水獨勝散用出了子蘿蔔三枚淨洗切片日乾煮末每服二

者及人胃冷者皆不効瀕湖集簡方胃噴痰蘿蔔蜜煎浸細細飲水獨勝散用出了子蘿蔔三枚淨洗切片日乾煮末每服二

錢煎猪肉湯澄清調下日三服漸增至三錢生者搗汁亦

菜部

十三

可或以汁煮粥食
肺痿效血 蘿藦和羊肉或鯽魚
煮熟頓食 普濟方
鼻衄不止 蘿藦搗汁半盞入酒少許熱服并以汁注鼻中皆
良或以酒煎沸入蘿藦再煎飲之 衛生易簡方
下痢禁口 蘿藦搗汁一小
盞同煎早一服午一服日哺米飲吞阿膠丸百粒如無蘿藦以子搗汁亦可一方加枯礬七分同煎一方只用蘿
藦煎湯日日飲之○普濟方用蘿藦片不拘新舊染毒噉之嘔汁味淡再換覺思食以肉煮粥與食不可過多
痢後腸痛方同 大腸便
血 大蘿藦皮燒存性荷葉燒存性蒲黃生 案又蘿藦任意食之昔一婦
人服此有效 百一選方
酒痰下血 連旬不止用大蘿藦二十枚留青葉寸餘以
用等分為末每服一錢米飲下 普濟方

善親養 生萊服搗實腦中束之
大腸脫肛 生萊服搗實腦中束之
覺有瘡即除 摘方方
小便白濁 生蘿藦刺空留蓋入吳茱萸填滿益定發往糯米飯上蒸熟取去米
糞以蘿藦搗研末糊九梧子大每服五十九鹽湯下日三服 普濟方
沙石諸淋 痰不
用蘿藦切片蜜浸少時炙乾數次不可過
焦細嚼鹽湯下日三服名眩眩膏 普濟方
遍身浮腫 出子蘿藦浮麥等分
浸湯飲之 聖濟總錄
腳氣走痛 蘿藦煎湯洗之仍以蘿藦曬
乾為末鋪襪內 聖濟總錄
偏正頭痛 生蘿藦汁
臥隨左右注鼻中神效王荆公病頭腫有道人傳此
方移時遂愈也以此治人不可勝數 如宜方
失音不語 蘿藦生搗汁入薑
汁同服 普濟方
喉痺腫痛 服取吐 同上
滿口爛瘡 蘿藦自然汁頻
湖集因重斃方見發
湯火傷灼 生蘿藦搗塗于子
亦可 聖濟總錄
花火傷肌 方同
打撲血聚 皮不破者用蘿藦或
葉搗封之 邵氏方

子氣 草無毒治研汁服吐風痰同醋研消腫毒日
下氣定治痰消食除脹利大小便止氣瘡下痢後重發疹
時珍發明

曰萊服子治痰有推牆倒壁之功時珍曰萊服子之功長于利氣生能升熱能降升則吐風方舊二新
痰散風寒發瘡疹降則定痰喘嗽調下痢後重止內痛皆是利氣之效子曾用果有殊績方十四
上服之○**肺痰效嗽** 萊服子半升淘淨焙乾炒黃為末以糖和
齧喘痰促 遇厚味即發者蘿藦子淘淨蒸熟晒研薑汁浸蒸餅九綠豆
食醫心鏡
肺痰效嗽 丸芡子大罽果舍之嚙汁甚妙 勝金方
久嗽痰喘 蘿藦子炒杏仁去皮尖炒等分蒸餅九麻
丸梧子大每服五七十九丸白湯下 簡便單方
高年氣喘 蘿藦子炒研末蜜
氣喘 蘿藦子炒皂莢燒存性等分為末薑汁和煉蜜
丸梧子大每服五七十九丸白湯下 簡便單方
久嗽痰喘 蘿藦子炒杏仁去皮尖炒等分蒸餅九麻
丸梧子大每服五七十九丸白湯下 簡便單方
高年氣喘 蘿藦子炒研末蜜
濟生秘覽
宣吐風痰 勝金方用蘿藦子末温水調服三錢良久吐出涎沫如是攤緩風者以此吐後用緊蹀蹀蹀蹀和氣散取瘡
○丹溪吐法用蘿藦子半升搗細以水一椀瀝取汁入香油及蜜些須溫服後以桐油浸過晒乾蒸銅探吐 中

上服之○**肺痰效嗽** 萊服子半升淘淨焙乾炒黃為末以糖和
齧喘痰促 遇厚味即發者蘿藦子淘淨蒸熟晒研薑汁浸蒸餅九綠豆
食醫心鏡
肺痰效嗽 丸芡子大罽果舍之嚙汁甚妙 勝金方
久嗽痰喘 蘿藦子炒杏仁去皮尖炒等分蒸餅九麻
丸梧子大每服五七十九丸白湯下 簡便單方
高年氣喘 蘿藦子炒研末蜜
丸梧子大每服五七十九丸白湯下 簡便單方
久嗽痰喘 蘿藦子炒杏仁去皮尖炒等分蒸餅九麻
丸梧子大每服五七十九丸白湯下 簡便單方
高年氣喘 蘿藦子炒研末蜜
丸梧子大每服五七十九丸白湯下 簡便單方

上服之○**肺痰效嗽** 萊服子半升淘淨焙乾炒黃為末以糖和
齧喘痰促 遇厚味即發者蘿藦子淘淨蒸熟晒研薑汁浸蒸餅九綠豆
食醫心鏡
肺痰效嗽 丸芡子大罽果舍之嚙汁甚妙 勝金方
久嗽痰喘 蘿藦子炒杏仁去皮尖炒等分蒸餅九麻
丸梧子大每服五七十九丸白湯下 簡便單方
高年氣喘 蘿藦子炒研末蜜
丸梧子大每服五七十九丸白湯下 簡便單方
久嗽痰喘 蘿藦子炒杏仁去皮尖炒等分蒸餅九麻
丸梧子大每服五七十九丸白湯下 簡便單方
高年氣喘 蘿藦子炒研末蜜
丸梧子大每服五七十九丸白湯下 簡便單方

上服之○**肺痰效嗽** 萊服子半升淘淨焙乾炒黃為末以糖和
齧喘痰促 遇厚味即發者蘿藦子淘淨蒸熟晒研薑汁浸蒸餅九綠豆
食醫心鏡
肺痰效嗽 丸芡子大罽果舍之嚙汁甚妙 勝金方
久嗽痰喘 蘿藦子炒杏仁去皮尖炒等分蒸餅九麻
丸梧子大每服五七十九丸白湯下 簡便單方
高年氣喘 蘿藦子炒研末蜜
丸梧子大每服五七十九丸白湯下 簡便單方
久嗽痰喘 蘿藦子炒杏仁去皮尖炒等分蒸餅九麻
丸梧子大每服五七十九丸白湯下 簡便單方
高年氣喘 蘿藦子炒研末蜜
丸梧子大每服五七十九丸白湯下 簡便單方

上服之○**肺痰效嗽** 萊服子半升淘淨焙乾炒黃為末以糖和
齧喘痰促 遇厚味即發者蘿藦子淘淨蒸熟晒研薑汁浸蒸餅九綠豆
食醫心鏡
肺痰效嗽 丸芡子大罽果舍之嚙汁甚妙 勝金方
久嗽痰喘 蘿藦子炒杏仁去皮尖炒等分蒸餅九麻
丸梧子大每服五七十九丸白湯下 簡便單方
高年氣喘 蘿藦子炒研末蜜
丸梧子大每服五七十九丸白湯下 簡便單方
久嗽痰喘 蘿藦子炒杏仁去皮尖炒等分蒸餅九麻
丸梧子大每服五七十九丸白湯下 簡便單方
高年氣喘 蘿藦子炒研末蜜
丸梧子大每服五七十九丸白湯下 簡便單方

上服之○**肺痰效嗽** 萊服子半升淘淨焙乾炒黃為末以糖和
齧喘痰促 遇厚味即發者蘿藦子淘淨蒸熟晒研薑汁浸蒸餅九綠豆
食醫心鏡
肺痰效嗽 丸芡子大罽果舍之嚙汁甚妙 勝金方
久嗽痰喘 蘿藦子炒杏仁去皮尖炒等分蒸餅九麻
丸梧子大每服五七十九丸白湯下 簡便單方
高年氣喘 蘿藦子炒研末蜜
丸梧子大每服五七十九丸白湯下 簡便單方
久嗽痰喘 蘿藦子炒杏仁去皮尖炒等分蒸餅九麻
丸梧子大每服五七十九丸白湯下 簡便單方
高年氣喘 蘿藦子炒研末蜜
丸梧子大每服五七十九丸白湯下 簡便單方

上服之○**肺痰效嗽** 萊服子半升淘淨焙乾炒黃為末以糖和
齧喘痰促 遇厚味即發者蘿藦子淘淨蒸熟晒研薑汁浸蒸餅九綠豆
食醫心鏡
肺痰效嗽 丸芡子大罽果舍之嚙汁甚妙 勝金方
久嗽痰喘 蘿藦子炒杏仁去皮尖炒等分蒸餅九麻
丸梧子大每服五七十九丸白湯下 簡便單方
高年氣喘 蘿藦子炒研末蜜
丸梧子大每服五七十九丸白湯下 簡便單方
久嗽痰喘 蘿藦子炒杏仁去皮尖炒等分蒸餅九麻
丸梧子大每服五七十九丸白湯下 簡便單方
高年氣喘 蘿藦子炒研末蜜
丸梧子大每服五七十九丸白湯下 簡便單方

上服之○**肺痰效嗽** 萊服子半升淘淨焙乾炒黃為末以糖和
齧喘痰促 遇厚味即發者蘿藦子淘淨蒸熟晒研薑汁浸蒸餅九綠豆
食醫心鏡
肺痰效嗽 丸芡子大罽果舍之嚙汁甚妙 勝金方
久嗽痰喘 蘿藦子炒杏仁去皮尖炒等分蒸餅九麻
丸梧子大每服五七十九丸白湯下 簡便單方
高年氣喘 蘿藦子炒研末蜜
丸梧子大每服五七十九丸白湯下 簡便單方
久嗽痰喘 蘿藦子炒杏仁去皮尖炒等分蒸餅九麻
丸梧子大每服五七十九丸白湯下 簡便單方
高年氣喘 蘿藦子炒研末蜜
丸梧子大每服五七十九丸白湯下 簡便單方

上服之○**肺痰效嗽** 萊服子半升淘淨焙乾炒黃為末以糖和
齧喘痰促 遇厚味即發者蘿藦子淘淨蒸熟晒研薑汁浸蒸餅九綠豆
食醫心鏡
肺痰效嗽 丸芡子大罽果舍之嚙汁甚妙 勝金方
久嗽痰喘 蘿藦子炒杏仁去皮尖炒等分蒸餅九麻
丸梧子大每服五七十九丸白湯下 簡便單方
高年氣喘 蘿藦子炒研末蜜
丸梧子大每服五七十九丸白湯下 簡便單方
久嗽痰喘 蘿藦子炒杏仁去皮尖炒等分蒸餅九麻
丸梧子大每服五七十九丸白湯下 簡便單方
高年氣喘 蘿藦子炒研末蜜
丸梧子大每服五七十九丸白湯下 簡便單方

風口禁

籬藟子牙皂英各二錢以水煎服取吐丹溪方

小兒風寒

籬藟子生研末一錢溫葱酒服之取微汗大效衛生易簡方

風秘氣秘

籬藟子炒一合搗水和皂英末二錢服立通壽域神方

氣脹壅壅

籬藟子研以水濾汁

浸宿砂一兩一夜炒乾又浸又炒凡七次

為末每米飲服一錢如神朱氏集驗方

小兒盤腸

氣痛用籬藟子炒黃研末乳香湯服半錢楊仁齋直指方

年久頭風

籬藟子生薑等分搗取汁入麝香少許搗入鼻中立止普濟方

牙齒疼

籬藟子生研末米飲服二錢良衛生易簡方

痛

籬藟子十四粒生研以人乳和之左疼點右鼻右疼點左鼻

瘡疹不出

籬藟子生研末米飲服二錢良衛生易簡方

花

生薑治用糟下酒藏食之甚美明目良

生薑

別錄原附乾薑下今分出

中品校正今自草部移入此

釋名

時珍曰按許慎說文薑作疆云禦濕之菜也王安石字說云薑能疆禦百邪故謂之薑初生嫩者其尖紫微名紫薑或作子薑宿根謂之母薑也

集解

別錄曰生薑乾薑生健為山谷

及荆州揚州九月采之領曰處處有之以漢溫池州者為良苗高二三尺葉似箭竹葉而長兩兩相對苗有根黃無花實秋時米根時珍曰薑宜原濕沙地四月取母薑種之五月生苗如初生嫩蘆而葉稍潤似竹葉對生葉亦辛香秋社前後新芽頓長如列指狀米食無筋謂之子薑秋分後者次之霜後則老矣性惡濕洳而畏日故秋熱則無薑呂氏春

秋云和之美者有楊樸之薑楊樸地名在西蜀春秋運斗樞云璇星散而為薑

氣味辛微溫無毒臟器曰生薑溫要熱則去皮要冷則留皮元素曰辛而甘溫氣味俱厚浮而升

陽也○之才曰秦椒為之使殺半夏藜蘆毒惡黃芩黃連天鼠糞飲景曰久服少志少智傷心氣今人噉辛辣物惟此最常故論語云每食不撤薑言可常食但不可多備有病者是所宜忌恭曰本經言薑久服通神明主痰氣即可常噉陶氏謬為此說檢無所據思邈曰八

九月多食薑至春多患眼損壽減筋力孕婦食之令兒盈指果曰古人言秋不食薑令人瀉氣蓋夏月火旺宜汗散之故食薑不忌辛走

氣瀉肺故秋月則禁之晦菴語錄亦有秋薑天人天年之語時珍曰食薑久積執患目珍慮試有准凡病疴人多食兼酒立發甚速癰瘡人多食則生惡肉此皆昔人所未言者也相感志云

糟薑瓶內入蟬蛻雖老薑無妨亦物性有所伏耶

主治服去臭氣通神明

本經歸五臟除風邪寒熱傷寒頭痛鼻塞逆上氣止嘔吐

去痰下氣

別錄去水氣滿癆欬嗽時疾和半薑主心下急痛和杏仁作煎下急痛壅心胸擁隔冷熱氣神效搗汁和蜜服治中熱嘔逆不能下食

散煩悶開胃氣汁作煎服下一切結實衝胸膈驚神驗

孟破血調中去冷氣汁解鬱毒

藏除壯熱治痰喘脹滿冷痢腹痛轉

筋心滿去胸中臭氣狐臭腹內長蟲張鼎益脾胃散風寒元解菌毒諸物毒吳生用發散熟用和中解食野禽中毒成喉瘖漫汁點赤眼

搗汁和黃明膠熬貼風溼痛甚妙時珍

乾生薑性溫中治腹瀉霍亂不止腹痛冷痢血閉病人虛而冷宜加之甄權薑屑和酒服治偏風孟詵肺經氣分之藥能益肺

好發目成無已曰薑秉味辛甘專行脾之津液而和營衛藥中用之不獨專於發散也稟曰生薑之用有四制半夏厚朴之毒一也發散

氣逆不散此藥行陽而散氣也或問生薑辛溫入肺何以云入胃曰俗以心下為胃口者非矣咽門之下受有形之物及胃之系便是

胃口與肺系同行故能入肺而開胃口也曰人云夜間勿食生薑令人閉氣何也曰生薑辛溫主開發夜則氣本收斂反開發之則違天

道矣若有病人則不然也生薑香比之乾薑則不熱比之生薑則不溫以乾生薑代乾薑者以其不僭故也俗言上牀蘿蔔下牀薑能

開胃蘿蔔消食也時珍曰薑辛而不瀉去邪辟惡生啖熟食醋醬糟醢薑煎調和無不宜之可蔬可和可果可藥其利溥矣凡早行山行

宜含一塊不犯霧露清溼之氣及山嵐不正之邪案方廣心法附餘云凡中風中暑中氣中惡乾霍亂一切卒暴之病用薑汁與童

尿服立可解散蓋薑能開痰下氣重降火也須曰崔元亮集驗方載救賜薑茶治痢方以生薑切細和好茶一兩盞任意呷之便瘥若

是熱痢留薑皮冷痢去皮大妙楊士廉曰薑能助陽茶能助陰二物皆消散惡氣調附方舊二十新三十痰癆卒風生薑二兩附子一兩水五升

和陰陽且解溼熱及酒食暑氣之毒不閉亦白通宜用之蘇東坡治文潞公有效煮取二分再服忌猪肉冷

水 千金 胃虛風熱 不能食用薑汁半盃生地黃汁少許 脾胃聚痰發為寒熱生薑四兩搗自然汁一酒盃露 易簡 寒熱痰嗽 初起者燒

咽之 本 效嗽不止 生薑五兩錫半升大煎熟食盡愈段 侍御用之有效 初虞世必効方 久患效噫 生薑汁半合蜜一匙煎溫 外臺秘要方 小兒效嗽 生薑四兩煎湯 嚼薑

草行義 欬嗽不止 頻嚼生薑 嘔吐不止 生薑二兩醋漿二合銀器煎取四合連 心痞嘔噦 心下痞堅生薑八兩水三升煮一升半夏

片屢効 乾嘔厥逆 家聖藥也 嘔吐不止 生薑二兩醋漿二合銀器煎取四合連 心痞嘔噦 心下痞堅生薑八兩水三升煮一升半夏

寇氏行義 乾嘔厥逆 家聖藥也 嘔吐不止 生薑二兩醋漿二合銀器煎取四合連 心痞嘔噦 心下痞堅生薑八兩水三升煮一升半夏

分再服 反胃風氣 兵部手集用母薑一斤搗汁作粥食之傳信通用 霍亂欲死 生薑五兩牛兒屎一升水四升 霍亂轉筋 入腹欲死生薑

千金 反胃風氣 兵部手集用母薑一斤搗汁作粥食之傳信通用 霍亂欲死 生薑五兩牛兒屎一升水四升 霍亂轉筋 入腹欲死生薑

煮三兩沸服仍以薑搗
霍亂腹脹 不得吐下用生薑一斤水七
腹中脹滿 綿裏煨薑內下部
胸脇滿痛 凡心胸脇下有邪氣結實硬痛脹
貼痛處 外臺秘要

潤以絹包于患處敷熨之冷再以汁炒
大便不通 生薑削長二寸塗鹽
冷痢不止 生薑煨研為末共乾薑末等分以醋和麩作餅鈍先
再製良久豁然覺快也 陶華傷寒秘法
內下部不通 外臺
以水煮又以清飲者過停冷吞二七枚以粥送下日

一度 消渴飲水 乾生薑末一兩以鯽魚膽汁和丸
梧子大每服七丸水飲下 聖惠
溼熱發黃 生薑時時周身擦之其黃自退也
傷寒秘法 暴赤眼腫 陰頭曰用古銅錢刮薑取汁
食療 日愈勿疑 一治暴風各熱目赤睛痛腫者臘月取生薑搗絞汁
陰乾取粉入銅青末等分每以少許沸湯泡澄清溫洗淡出妙
吉上生胎 諸病古胎以布染井水抹後用
滿口爛瘡 生薑自然汁頻頻

之甚 牙齒疼痛 老生薑瓦焙入枯礬末同搗之有喉痺毒氣 生薑二斤搗汁罌五合
人日夜呻吟用之即愈 普濟方 喉痺毒氣 生薑二斤搗汁罌五合
食鴉中毒 食竹雞毒 食鴉鴉毒 方並見禽
部本條 中萬

毒 中諸藥毒 獺犬傷人 並飲生薑汁
即解 小品 虎傷人瘡 內服生薑汁外以汁洗之
秘覽 蛇咬人 薑末傅之乾
千金蜘蛛咬人 之良 千金 刀斧金

瘡 生薑膏傅勿動次日即 閃拗手足 生薑葱白搗爛 跌撲傷損 薑汁和酒調
生肉甚妙 扶壽方 和麩炒熱食之 生麩貼之
百虫入耳 薑汁少
腋下狐臭 薑汁頻
赤白癩風 生薑頻搽之
並易簡

兩耳凍瘡 生薑自然汁熬 眼日記 發背初起 生薑一塊炭火炙一層刮一層
為末以猪膽汁調塗 海上方 疥瘡腫毒 方見白
諸瘡痔漏 久不結痂用生薑連皮切大片塗白
普濟產

後血滯 沖心不下生薑五 產後肉線 一婦產後用力垂出肉線長三四尺觸之痛引心腹欲絕 一道人令買老薑連皮三斤搗爛入蒜油
兩水八升煮服 二斤拌勻炒乾先以熟絹五尺折作方結令人輕輕盛起肉線使之屈曲作三團納入產戶乃以絹

袋盛薑就近熏之冷則更換熏一日夜縮入大半二日盡入也云 脉溢怪症 有人毛竅舒次血出不止皮脹如鼓須臾自鼻口被氣脹合
此乃魏夫人秘傳怪病方也但不可使線斷斷則不可治之矣 此名脉溢生薑自然汁和水各半蓋服即安○並夏于益奇

疾 方 薑皮氣味辛溫無毒主消浮腫腹脹痞滿和脾胃去醫 時珍方 一拔白換黑 刮老生薑皮一大升于久用油膩鍋內不須洗刷固
濟勿令通氣令精細人守之文武火煎之不得火急

大生薑皮 一拔白換黑 濟勿令通氣令精細人守之文武火煎之不得火急

大生薑皮 一拔白換黑 濟勿令通氣令精細人守之文武火煎之不得火急

大生薑皮 一拔白換黑 濟勿令通氣令精細人守之文武火煎之不得火急

自巳至夕即成矣研為末按白後先以小物點麻子大人孔中或先點額下然
後按之以指擦入三日後當生黑者神効李卿用之有驗 蘇頌圖經本草

苜蓿菜 性溫無毒 主治食飽成癥搗汁飲即消 附方 一打傷瘀血 服方寸匕日三 范汪東陽方

乾薑 本經 中品 校正 自草部 移至此 釋名 薑 景曰乾薑本惟出臨海章安數村作之蜀漢舊美荆州有好薑而不能作乾者凡作乾薑
于長流水洗過日晒為乾薑以漢溫池州者為良陶說乃漢州乾薑法也時珍曰乾薑以母 氣味辛溫無毒 稽曰苦辛辟古曰大熱辟昇
薑造之今江西襄均皆造以白淨結實者為良故人呼為白薑又曰均薑凡人藥並宜炮用 曰久服令人目暗餘同生薑

時珍曰天清外術言孕婦不可食乾 薑令胎內消益其性熱而辛散故也 主治胸滿效逆上氣溫中止血出汗逐風溼痺腸癖下痢生者尤良 經寒冷腹痛中惡霍亂脹滿風

邪諸毒皮膚閉結氣止唾血別治腰腎間疼冷冷氣破血去風通四肢關節開五臟六腑宣諸絡脉去風毒冷痺夜多小便 權消痰下氣

治轉筋吐瀉腹臑反胃乾嘔痰血撲損止薑紅解熱毒開胃消宿食 明主心下寒痞目睛赤 好發明 元素曰乾薑氣味厚半沉半

大辛大熱陽中之陽其用有四通心助陽一也去臟腑沉寒痼冷二也發諸經之寒氣三也治感寒腹痛四也腎中無陽脉氣欲絕黑附

子為引水煎服之名薑附湯亦治中焦寒邪寒淫所勝以辛散之也又能補下焦故四逆湯用之乾薑本辛炮之稍苦故止而不移所以

能治裏寒非若附子行而不止也理中湯用之者以其回陽也李杲曰乾薑生辛炮苦陽也生則逐寒邪而發表炮則除胃冷而守中多

用則耗散元氣辛以散之是壯火食氣故也須以生甘草緩之辛熱以散裏寒同五味子用以溫肺同人參用以溫胃也好古曰乾薑心

脾二經氣分藥也故補心氣不足或言乾薑辛熱而言補脾今理中湯用之言泄不言補何也蓋辛熱燥淫泄脾中寒溼邪氣非泄正氣

也又云服乾薑以治中者必僭上不可不知震亨曰乾薑入肺中利肺氣入腎中燥下溼入肝經引血藥生血同補陰藥亦能引血藥入
氣分生血故血虛發熱後大熱者用之止吐血崩血須以黑厚之有血脈色白而大才薄肌體者此大寒也宜乾薑之辛溫以益血大
熱以溫經時珍曰乾薑能引血藥入血分氣藥入氣分又能去惡養新有陽生陰長之意故血虛者用之凡人吐血衄血下血有陰無陽
者亦宜用之乃熱因 附方 舊十六 脾胃虛冷 不下食傾久羸弱成瘵者用温州白乾薑藥水煮透取出焙乾搗末陳 飲食減少
熱用從治之法也 新十二 脾胃虛冷 原米煮粥飲丸梧子大每服三五丸白湯下其効如神 蘇頌圖經 脾胃虛弱 易傷難化

苦實子最易繁茂此菜自古已有孫思邈數在千金方米類至宋嘉祐中始補入本草今人常食者而注機乃不能識孰敢擅自修纂誠可笑慨

氣味甘辛平無毒禹錫曰多食動風氣重人心令人氣滿

主治安心氣養脾胃消

痰飲利腸胃思邈

邪蒿

宋嘉祐時珍曰此蒿葉似青蒿而細軟時珍曰三月

氣味辛溫平無毒說曰生食微動風作羹食良不與胡女同食令人汗臭氣

主治胸膈中臭爛惡疔腸胃通血脈續不足氣

隔中臭爛惡疔腸胃通血脈續不足氣孟詵

說煮熟和醬醋食治五臟惡邪氣厥殺者治脾胃腸癖大渴熱中暴發瘰癧

胡荽

宋嘉祐時珍曰胡荽處處種之八月下種時曰胡荽今俗呼為廣荽乃莖葉布散之兒俗作先花之荽非荽

種胡荽今俗呼為廣荽乃莖葉布散之兒俗作先花之荽非荽

人呼胡荽集解時珍曰胡荽處處種之八月下種時曰胡荽今俗呼為廣荽乃莖葉布散之兒俗作先花之荽非荽

竟冬食春月按子沃水生芽種者小小供食而已王復思書云胡荽於蔬菜中子葉皆可用主熱俱可食甚有益於世者宜肥地種之

根苦氣味辛溫微毒

說曰平微寒無毒可和生菜食此是葷菜損人精神華陀云胡荽口臭臭齒及脚氣金瘡人皆不可食病更加甚

丹者不可食主治消殺治五臟補不足利大小腸通小腹氣拔四肢熱止頭痛瘰癧沙瘰脫豆瘡不出作酒飲之立出通心竅

人能食治腸風用熱餅裹食甚良孟詵諸菜食氣香令人口爽辟飛尸鬼疰毒

瘡瘡出不爽快者能發之諸瘡皆屬心火營血內攝于脾心脾之氣得芳者則運行得臭惡則壅滯故爾按楊士龜直指方云瘡疹不快宜用胡荽酒飲之以辟惡氣床帳上下左右皆宜掛之以禦汗氣胡荽天葵淫佚之氣一應穢惡所不可無若兒虛弱及天時陰寒用此

最妙如兒壯實及春夏晴暖陽氣發越之時加以酒麴助產

以火益火胃中熱熾毒血聚蓄則變成黑陷矣不可不頂

經臨熱氣結滯經年數發者胡荽半斤五月五日米陰乾水七升煮取一升後方必効方孩子赤丹胡荽汁塗之面上黑子胡荽煎湯日日洗之產後無

乳乾胡荽煎湯飲胡荽二兩荜根一握水二升煎一升入小使不通胡荽二兩荜根一握水二升煎一升入肚門脫出胡荽切一升燒煙熏解中蠱毒胡荽根搗汁半升和酒吃服立下神驗必効方蛇

虺螫傷胡荽苗合口椒等分搗塗之千金方

子氣味辛酸平無毒炒主治消穀能食思避毒五痔及食肉中毒吐下血煮汁冷服又以油煎塗小兒禿瘡藏發瘡殺魚腥時附方

舊三新四食諸肉毒吐下血不止瘡黃者胡荽子一升煮令發裂取汁冷服半升日夜各一服即止食療本草腸風下血胡荽子和生菜以熱餅裹食之普濟方痢及瀉血胡荽子一合炒搗末每服二錢

血白湯下日二普濟方五痔作痛胡荽子炒為末每服二錢空心痔漏脫肛胡荽子一升粟糠一升乳香少許腸頭挺出秋久搗胡荽子醋煮尉之甚効孟說食療本草

牙齦痛胡荽子即胡荽子五升以水五升煮取一升含漱外臺秘要

胡蘿蔔綱釋名時珍曰元時始自胡地時珍曰胡蘿蔔今北土山東多蒔之淮楚亦有種者八月下種生苗如邪蒿肥莖有白毛目釋名辛臭如蒿不可食冬月掘根生熟皆可啖兼果蔬之用根有黃赤二種微帶苦氣長五六寸大者盈握狀似鮮掘地黃及羊蹄根三四月莖高二三尺開碎白花攢簇如傘狀似蛇牀花子亦如蛇牀子稍長而有毛褐色又如蒔蘿子亦可調和食料按周憲王救荒本草云野胡蘿蔔苗葉花實皆同家胡蘿蔔但根細小味甘生食蒸食皆宜花子皆大於蛇牀又金

幼孩北征錄云交河北有沙蘿蔔根長二尺許大者徑寸下支生小者如筋其色黃白氣味辛而微苦亦似蘿蔔氣此皆胡蘿蔔之類也

根氣味甘辛微溫無毒治下氣補中利胸膈腸胃安五臟令人健食有益無損時

子治及痢時

子珍

菜氣味甘寒毒主治擣汁洗馬毒瘡并服之又塗蛇蝎毒及癰腫本
久食除心下煩熱主寒熱鼠瘻癰瘡生瘡結核聚氣下瘀血止

霍亂及生擣汁半升服能殺鬼毒即吐也
蘇明說曰葉葉止霍亂與香附方
蘇明說曰葉葉止霍亂與香附方
蘇明說曰葉葉止霍亂與香附方

乾為末糊凡梧子大每服四十九空
心溫酒下大越百毒毒域神方
生料薑汁塗之萬畢術

紫堇 音片 綱目 經 楚 葵 上 菜 同 水 菹 菜
時珍曰薑蕪片折 蘇明說曰葉葉止霍亂與香附方
蘇明說曰葉葉止霍亂與香附方

出於唐玄宗天寶單方中不具紫堇形狀今按軒轅通寶藏論云赤片即紫片也
生水漬蕪形如赤片藥青長三寸許葉上黃斑味苦
濕其汁可以煮雌制果伏砒砂礠三黃號為起食單又土宿真君本草云赤片生陰崖
陁澤近水石間狀類赤芍藥其葉深綠而背甚赤
莖葉似蕎麥花紅可愛結實亦如薊薈其根似蜘蛛蟬之極酸苦
涇江准人三四月采苗當蔬食之南方頗少太行王屋諸山最多也

苗氣味擊微毒

花氣味酸微溫無毒主治大人小兒脫肛
蘇明說曰凡大人小兒脫肛每天冷及喫冷食即暴痢不止肛則下脫久瘥不瘥者春
一脫肛間收紫堇花二斤曝乾為散加磁末末七兩相和研細塗肛上納入即使人
再服漸加至二方寸匕以瘥為度若五歲以下小兒即以半杏子許和酒服之忌生冷陳倉米等物
天寶單方

馬 音片 綱目 經 楚 葵 上 菜 同 水 菹 菜
時珍曰薑蕪片折 蘇明說曰葉葉止霍亂與香附方
蘇明說曰葉葉止霍亂與香附方

食花青白色子黃黑色似防風子調食味用之香似橘皮而無苦味得昇曰花若片花子如防風子而扁大爾雅云莢牛薺也孫炎釋云
似片而葉似銳可食菜也一名莢一名馬薺子入藥用時珍曰馬薺與芥子同類而異種處卑濕地有之三四月生苗一本叢生如蒿白
毛蒙茸嫩時可茹葉似水芹而微小似苦蕒葉而色深五六月開碎花攢簇如蛇牀及時藟花青白色結實亦似時藟子但色黑
而重爾其根白色長者尺許氣亦香而堅硬不可食蘇恭所謂鬼針即鬼針草也方莖極葉子似杖腳着人衣如針與此稍異

而重爾其根白色長者尺許氣亦香而堅硬不可食蘇恭所謂鬼針即鬼針草也方莖極葉子似杖腳着人衣如針與此稍異

苗氣味甘溫無毒治霍亂胸膈去食作如食時

子氣味甘溫無毒治心腹脹滿調胃下氣消食調味用之唐本抄研醋服治卒心痛令人得睡孟時附方新慢脾

驚風馬片子丁香白僵蠶等分為末每服一錢文橘皮煎湯下名醒脾散 普濟方

懷香 唐本草 校正 移入此釋名當八月珠 懷香北人呼為茴香聲相近也弘景曰葉臭肉下少許即無臭氣吳普曰今文廣

皆有之入藥多用者船者或云不及近處者有力三月生葉似老胡荽極細細作叢至五月莖粗高三四尺七月生花頭如金盞蓋色結實如麥而小青也北人呼為土茴香八月九月采實陰乾今近道人家園圃種之甚多川人多養食其葉葉紫莖曰云似老胡荽者誤矣胡荽葉如蛇牀雖有葉之名但散如絲髮特異諸草也時珍曰茴香宿根深冬生苗作叢肥莖紫葉五六月開花如蛇牀花而色黃結子大如豆黃褐色有仁味更甜俗呼船茴香又曰八角茴香廣西左右江峒中亦有之形色與中國茴香迥別但氣味同爾北人得之咀嚼薦酒

子氣味辛平無毒 恩逸曰辛平微寒瀉權曰苦辛得酒良炒黃 用好古曰陽也浮也入手足少陰太陽經 主治諸瘧亂及蛇傷 唐本勝脾胃冷氣及香腸氣調中止痛嘔吐 馬志

治乾乾脚氣腎癩疔陰疔開胃下氣 補命門不足 景 暖丹田 吳 緩發明 說曰茴香國人重之云有助陽道未得其方法也好古曰茴香

丙至壬又手足少陰二藥以開上下經之通道所以壬與丙交也時珍曰小茴香性平理氣開胃夏月祛濕辟臭食料宜之大茴香性熱多食傷目發瘡食料不宜通用古方有去餘丸用茴香二兩連皮生薑四兩同入坩器內淹一伏時慢火炒之入鹽一兩為末糊丸梧子大每服三五十九空心益酒下此方本治脾胃虛弱病後得益則 附方 舊四新 開胃進食 茴香二兩生薑四兩同搗勻入淨器內溼紙引入腎經發出邪氣腎不受邪病自不生也亦治小腸疝氣有效 十六 鼓脹氣促八角茴香七個大麻仁半兩為末生葱白酒糊丸梧子大每服十九至 二十五丸溫酒下 經方 瘧瘵瘵 連背項者茴香子搗 孫真人方 大小便閉 三七根同研前湯調五苓散末服之日一服 普濟 小便頻數 茴香

二至壬又手足少陰二藥以開上下經之通道所以壬與丙交也時珍曰小茴香性平理氣開胃夏月祛濕辟臭食料宜之大茴香性熱多食傷目發瘡食料不宜通用古方有去餘丸用茴香二兩連皮生薑四兩同入坩器內淹一伏時慢火炒之入鹽一兩為末糊丸梧子大每服三五十九空心益酒下此方本治脾胃虛弱病後得益則 附方 舊四新 開胃進食 茴香二兩生薑四兩同搗勻入淨器內溼紙引入腎經發出邪氣腎不受邪病自不生也亦治小腸疝氣有效 十六 鼓脹氣促八角茴香七個大麻仁半兩為末生葱白酒糊丸梧子大每服十九至 二十五丸溫酒下 經方 瘧瘵瘵 連背項者茴香子搗 孫真人方 大小便閉 三七根同研前湯調五苓散末服之日一服 普濟 小便頻數 茴香

子氣味溫無毒主小兒氣脹霍亂逆腹冷不下食兩肋疼滿藏健脾開胃氣溫腸殺魚肉毒補水臟日腎氣壯筋骨主膈氣

消食滋食味李附方新二肉控腰痛詩難作末酒服二錢七永類鈴方牙痛船上時難掌子白芥子等分研末口聖患方附錄胡胡爛拾遺藏器曰子味辛

服滿補腎除婦人血氣下痢殺牙數低拾遺藏器曰子味甘溫無毒主冷風冷氣下宿食不消池得勒拾遺藏器曰根辛溫無毒破冷氣腹

苗蟲生安南似棗香子可和食消脹滿生西番北土兼似懷香胡人以作羹食之馬思答言時珍曰味苦溫無毒去邪惡氣溫中利膈順氣止痛生津解渴令人口香元時飲膳用之云極香料也不知何狀故附之

羅勒宋嘉祐附釋名蘭香嘉香菜綱目字草禹錫曰北人避石勒諱呼羅勒為蘭香時珍曰按郡中記云石集解禹錫曰羅勒處處有之有三

二十步內即聞香一種堪作生茶冬月用乾者子可安入目中去翳少頃溼脹與物俱出也時珍曰香菜須三月葉生時種之乃生否則不生常以魚腥水米泔水泥潭水澆之則香而茂不宜薰水耀仙神隱書言園邊水側宜廣種之飢年亦可濟用其子大如蠶褐色而不光七月收之弘景曰術家取羊角馬蹄燒作灰撒氣味辛溫微毒禹錫曰不可多食壅關節溫營衛

濕地遍踏之即生羅勒俗呼為西王母菜食之益人氣味辛溫微毒禹錫曰不可多食壅關節溫營衛主治調中消食去惡氣消水氣

宜生食療薑根爛瘡為使用之甚良噁嘔者取汁服半合冬月用乾者煮汁其根燒灰傳小兒黃爛瘡禹錫曰辟飛尸鬼疰毒吳瑤發明

時珍曰按羅天益云蘭香味辛氣溫能和血潤燥而掌禹錫言多食澀營衛血脈不行何耶又東垣李氏治牙疼口臭神功丸中用蘭香云無則以霍香代之此但取其去惡淨而已故飲膳正要云與諸菜同食味辛香能辟腥氣皆此意也附方新鼻疳赤

爛蘭香葉燒灰二錢銅青五分輕粉二錢起為末日傳三次錢乙小兒方反胃欬生薑四兩檳榔入蘭香葉一兩椒末一錢鹽和麩四兩裏作燒餅燥熱空心喫不過兩三度効反胃入甘蔗汁和之普濟方

子主治目昏及塵物入目以三五顆安目中少頃當溼脹與物俱出又主風赤眇淚嘉發明時珍曰按普濟方云昔廬州知錄彭大辨

洗晒每納一粒入背內閉目少頃連膜而出也一方為末點之時珍常取子試之水中亦脹大益此附方新目昏溼蘭香子每用七個子得溼即脹故能溼惹眇淚浮膜爾然目中不可看一塵而此子可納三五顆亦不妨碍益一異也

久有効也
海上名方

走馬牙疳

小兒食肥甘腎受虛熱口作臭息次第齒黑名曰崩砂漸至齲爛名曰潰槽又或血出名曰宣露重則齒落名曰腐根用蘭香子末輕粉各一錢蜜陀僧醋淬研末半兩和勻每以少許傅齒及齲上立効內服甘露飲活幼口

白花菜

食羣 物類 多角菜 集解 時珍曰白花菜三月種之柔莖莖蔓一枝五葉葉大如拇指秋間開小白花長蓋結小角長二三寸其子黑色而細狀如初眠蠶沙不光澤氣羶臭惟宜鹽茹食之類曰一種黃花者名黃花菜形狀相同但花

黃氣味辛微毒 類曰多食動風氣滯臟腑令人胃中悶滿傷脾

主治下氣 煎水洗痔瘡 敷風濕痺痛 搗酒飲 止瘡 時珍

焯菜

音空 併入草部 拾遺 焯菜 釋名 焯菜 音辣 焯菜 時珍曰焯味辛辣如火焯人故名亦作焯陳藏器本草有焯菜云辛菜也南人食之不着形狀今攷唐韻玉篇並無焯字止有焯字云辛菜也則焯乃焯字之訛爾 集解 時

曰焯菜生南地田園間小草也冬月布地叢生長二三寸柔梗細葉二月開細花黃色結細角長一二分角內有細子野人連根葉拔而食之味極辛辣呼為辣米菜沙地生者尤伶竹故洪舜俞老圃賦云焯有拂士之風林洪山家清供云米文公飲後輒以焯菜供蔬品蓋

肝江建陽嚴陵人皆喜食之也

氣味辛溫無毒 李廷飛曰焯菜細切以生蜜洗伴或暑

主治去冷氣腹內久寒飲食不消令人能食 藏器 利胸膈 豁冷痰 心

草豉

拾遺 草豉 移入此 集解 藏器曰生巴西諸國草似 氣味辛平無毒 主治 醫氣調中益五臟開胃令人能食 藏器

本草綱目

卷三十六

菜部

十一

本草綱目
卷之六

本草綱目菜部第二十六卷終

六

本草綱目菜部目錄第二十七卷

菜之二

喬滑類四十一種

菠薐嘉祐
即赤根

薤菜嘉祐

荼菜嘉祐
即薺蓮

東風菜開寶

薺別錄

薺黃本經
即大薺

繁縷別錄

雞腸別錄

苜蓿別錄

苜本經

馬薺蜀本

苦菜本經
即苦蕒

白苣嘉祐
即生菜

蒿苣食療

水苦圖經

翻白草綱目

仙人杖草拾遺

蒲公英唐本
即地丁

黃瓜菜食物

生瓜菜圖經

落葵別錄
即藤菜

蕺菜別錄
即魚腥草

蕨拾遺

水蕨綱目

薇拾遺

翹搖拾遺
即巢菜

鹿藿本經
即野綠豆

灰藿嘉祐

藜綱目

秦狄藜唐本

醍醐菜證類
芽青菜 雞侯菜
孟娘菜 優殿附

芋別錄
野芋附

土芋拾遺
即土卵

薯蕷本經
即山藥

零餘子拾遺

甘藷綱目

百合本經

山丹日華
即紅花草

草石蠶拾遺
即甘露子

竹筍 蜀木

筍 網目

右附方舊三十四新一百一十

本草綱目菜部第二十七卷

菜之二 柔滑類四十一種

菠薐菜 宋嘉祐種名 波薐菜 綱目波斯草 綱目赤根菜 慎微曰按劉禹錫嘉話錄云波薐種出自西國有僧將其子來云本是順陵國之種語訛為波

此也方士隱名 集解時珍曰波薐八月九月種者可備冬食正月二月種者可備春蔬其莖柔脆中空且葉綠脈赤厚直出一大旁出兩

為波斯草云 不顯雌者結實有刺狀如蒺藜子種時須

研開易浸脹必過月朔乃生亦一異也 菜及根氣味甘冷滑無毒 士良曰微毒多食令人脚弱發腰痛動冷氣先患腹冷者必 主治利五臟通腸胃熱解酒毒服丹

食之佳 孟 說通血脈開胸膈下氣調中止渴潤燥根尤良 珍發明 說曰北人食肉麪食之即平南人食魚鱉水米食之即冷故多食必冷

痔漏之人宜常食波薐及菜 附方 新 一滴湯引飲 日至一石者波薐根雞內金等分 為末米飲服一錢日三 經驗方

薤菜 薤去聲 時珍曰薤與薤同此菜 集解 藏器曰薤菜嶺南種之蔓生開白花堪如時珍曰薤菜今金陵及江夏人多時之性宜濕

如蔓而中空葉似波薐及薤頭形味短須同猪肉煮令肉色紫乃佳段公路北戶錄言其葉如柳者誤矣按松含草木狀云薤菜葉如落

葵而小南人編葦為筏作小孔浮水上種子於水中則如萍根浮水面及長成莖葉皆出於葦筏孔中隨水上下南方之苣蔬也則此菜

水陸皆可 氣味甘平無毒 治解胡蔓草毒野葛毒食之亦生搗服 藏 搗汁和酒服治產難 時珍曰 發明 藏器曰南人先食薤菜

然無苦取汁滴野葛苗當時萎死相殺如此張華博物志云魏武帝畷野葛至一尺應是先食此菜也

茶菜

茶音甜。校正。研入嘉祐。別錄中品。校正。茗草菜。釋名。茗蓬菜。

時珍曰。茶菜即茗蓬也。茶與甜。通因其味也。茗蓬之義未詳。

集解。景曰。茶菜即今以作鮮燕者。茶曰。茶菜葉似升麻。苗南人蒸在食之大香。姜徐丹曰。苗高三四尺。莖若

莢。有細稜。夏歲冬枯。其莖灰淋汁。洗衣白如玉。色似白松菜葉。而短莖亦相類。但差小耳。生熟皆可食。微作土氣。四月開細白花。結實狀如茱萸。球而輕。虛土黃色。內有細子。根白。氣

味甘苦。大寒滑無毒。禹錫曰。平微毒。冷氣人不可多食。動氣先患腹冷人食之必破腹。

主治。時行壯熱。解風熱。毒搗汁飲之。便瘥。別錄。夏月以菜作粥。食解熱止熱。毒劇搗

爛。傳灸瘡。止痛易瘥。蘇搗汁服。主冷熱。又止血生肌。及諸禽獸傷。傳之立愈。藏器。煎湯飲。開胃通心。膈宜。婦人明補。中下氣。理脾氣。去頭

風利五臟。嘉祐。

根氣味甘平無毒。治通經脈下氣。開胸膈。正。

子。治。煮羊生搗汁服。治小兒熱。說醋浸。搗面去粉。滓潤澤。有光。藏器。附方。一。痔瘻下血。茗蓬子。苦。莖子。荆芥子。芫荽子。高荳子。蔓菁子。蘿藦子。等分。以大鯽魚一個。去腸。裝藥

在內。縫合入銀石器內。上下用大煉熟。放冷。為末。每服二錢。米飲下。日二服。

東風菜

宋開寶。釋名。復風。志曰。此菜先春而生。故有東風。之號。一作冬風。言得冬氣也。

集解。志曰。東風菜生嶺南。平澤。莖高二三尺。葉似杏葉。而長極厚。軟上有細毛。煮食甚美。時珍曰。據裴淵廣州記云。東風菜。花葉似落。妊娠宜。紫肥。因

作羹。食香。氣似馬蘭。味如酪。

氣味甘寒無毒。治風毒。壅熱。頭痛。目眩。肝熱。眼赤。堪入羹。臠。食。實。

薺

別錄。釋名。護葦。時珍曰。薺生濟濟。故謂之薺。釋家取其莖作挑。燈杖。可辟蚊蠅。謂之護生草。云能護眾生也。

集解。晉曰。薺生野中。景曰。薺類甚多。此是今人所食者。葉作瓊美。六寸開細白花。整整如一結。莢如小萍。而有三角。莢內細子如葶。鹿子。其子名差。音差。四月收之。師曠云。歲欲甘。甘草先生。薺是也。新

薺。花莖扁。味美。其最細小者名沙薺也。大薺科葉皆大而味不及其莖。硬有毛者名析。與味不甚佳。並以冬至後生。苗二三月起。莖五六寸開細白花。整整如一結。莢如小萍。而有三角。莢內細子如葶。鹿子。其子名差。音差。四月收之。師曠云。歲欲甘。甘草先生。薺是也。新

葶藶皆是齋類等
慈見草部濕草類

氣味甘溫無毒 治利肝和中 別錄利五臟根治目痛 明目目曾

時珍 根葉燒灰治赤白痢極效

舊一 暴赤眼痛 四肢枯瘦永濕用甜葶藶炒齋菜根等分 為末煉蜜丸彈子大每服一丸陳皮湯下

只二三丸小便清十
餘丸腹如故 二因

眼生翳膜

齋菜和根葉葉洗淨焙乾為細末每夜臥時先洗眼挑末 米許安兩大背頭澀痛忍之久久膜自落也

聖濟總錄

腫滿腹大

四枝枯瘦永濕用甜葶藶炒齋菜根等分 為末煉蜜丸彈子大每服一丸陳皮湯下

只二三丸小便清十
餘丸腹如故 二因

葶藶

普曰三月三日米陰乾土良曰亦名祈葶子四月八日 收之良周王曰幾歲米子水調成塊食粥作餅甚粘滑

氣味甘平無毒

權曰葶藶人食之動冷氣既目不與 趨同食令人背悶服丹石人不可食

治明目目痛

青晝不見物補五臟不足

治腹脹

去風毒邪氣治瘧去醫解熱毒久服視物鮮明

花聖 治席下辟蟲又辟蚊蠶

陰乾研末棗湯日服二錢治久痢

祈黃

音錫黃。本經上品。校正。移入此。藥名。大齋。別錄。本經。馬辛。時珍曰諸名不可解吳音本草又集解

別錄曰祈黃生咸陽山澤及道旁四月五 月采暴乾日景曰今處處有之是大齋子 云一名祈目一名祭目一名馬駒

也方用其希少保異曰似蒼葉而細俗呼為老齋恭曰爾雅云祈黃大齋也註云似蒼俗呼為老齋然其味甘而不辛也藏器曰本經祈 實一名大齋蘇氏引爾雅為註蒼大齋即葶藶也祈黃大而扁葶藶細而圓二物殊別也頌曰爾雅葶藶謂之輩音典子葉皆似 蒼一名狗蒼祈黃即大齋大抵二物皆齊類故人多不能細分乃爾致疑也古今眼目方多用之時珍曰齊與祈黃一物也但分大小二 種耳小者為齋大者為祈黃祈黃有毛故其子功用相同而陳士良之本草亦謂齊實一名祈黃也葶藶與祈黃同類但祈黃味甘花白 葶藶味甘苦花黃為異耳或 言祈黃即甜葶藶亦通

言祈黃即甜葶藶亦通

言祈黃即甜葶藶亦通

甘子無毒 治和中氣和肝明目

時珍

祈黃子 氣味辛微溫無毒

恭曰甘而不辛蓋曰神農雷公辛李雷之小溫。之才 曰得是則實細辛良惡訛苦參一云古參為之使

主治明目目痛淚出除痺補五臟益精光久服

食之乃勝而拉冷利被霜乃熟故云十一月米又有赤莧莖純紫不堪食馬莧列一種布地生實至微細俗呼馬齒莧恐非莧實也恭曰赤莧一名蘆音置經言莧實一名莧實疑莫字誤矣存耳曰莧凡六種赤莧白莧人莧紫莧五色莧馬莧也惟人白一莧實可入藥用赤莧味辛利有功用頌曰人莧白莧俱大寒亦謂之棟莧又謂之胡莧或謂之細莧其實一也但大者為白莧小者為人莧耳其子霜後方熟細而色黑紫莧莖葉通紫吳人用染爪者諸莧中惟此無毒不寒赤莧亦謂之花莧莖葉深赤根莖亦可糟藏食之甚美味辛五色莧今亦稀有細莧俗謂之野莧莧好食之又名猪莧時珍曰莧並三月撒種六月以後不堪食老則抽莖如人長闊細花成穗穗中細子扁而光黑與青相子雞冠子無別九月收之細莧即野莧也北人呼為棟莧柔莖細葉生即結子味比家莧更勝俗呼青箱苗為雞冠莧亦可食見

菜氣味甘冷利無毒

恭曰赤莧辛寒謂曰莧動氣令人煩悶冷中損腹不可與蠶同食生蠶癩久取蠶肉如豆大以莧菜封裹置土坑內以土蓋之一宿盡變成小蠶也機曰此說屢試不驗

主治白莧補氣降熱通九竅

赤莧主赤痢射工沙虱

蘇恭紫莧殺蟲毒治氣痢藏器六莧並利大小腸治初痢滑胎時珍發明弘景曰人莧細莧蚊冷利亦莧療赤下而不分與妊娠人常服令易產也康亨曰紅莧入血分善走故與馬莧同服能下胎或養食之令人易產附方舊三新四產後下痢亦白者用紫莧入粳米三合煮粥食之亦莧搗汁洗立瘡也 壽親養老書小兒驚風之良 聖惠漆瘡搔痒 見菜煎吳公蚊傷取皮莧葉擦之即止 談野菊方 蜂蟻螫傷野莧按諸虫螫人紫莧搗汁飲之 集射工中人 狀如傷寒寒熱發瘡偏在一處有異於常者取赤莧合葱葉搗汁飲一升日再服之 集驗方

莧實氣味甘寒無毒

治晝昏明目除邪利大小便去寒熱久服益氣力不饑輕身本經治白腎殺蛇蟲列錄益精大明肝風客熱醫目異

花時發明

時珍曰莧實與青箱子同類異種故其治目之功亦彷彿也

附方

新利大小便 莧實為末半兩分二服新汲水下 聖惠

根主

治陰下冷痛入腹則腫滿殺人搗爛傅之 時珍附方新牙痛 莧根晒乾燒存性為末指之再以紅燈籠草根煎湯漱之 孫氏集效方

馬齒莧

蜀本草 釋名馬莧 別錄 五行草 綱目 長命菜 上 九頭獅子草

有長命之稱實藏論及八草靈變禽鳥並名馬齒龍牙又名五方草亦五行之義頌曰馬齒莧雖名莧類而苗葉與

莧都不相似一名五行草以其葉青梗赤花黃根白子黑也藏器曰別錄以馬齒與莧同類二物既殊今從別名 集解曰馬齒莧莧實至微細俗呼馬齒莧亦可食小酸得昇曰此有二種葉大者不堪用葉小者節葉間有水銀每十斤有八兩至十兩已來然至難燥當以槐木槌碎向日東作架晒之三日即乾如隔年矣入藥須去莖其莖無效數曰凡使勿用大葉者不是馬齒莧亦無水銀時珍曰馬齒莧處處園野生之柔莖布地細細對生六七月開細花結小實實中細子如葶藶子狀人多采苗莖為蔬方士米取伏砒結赤養丹砂伏硫黃元雄雞雌別有法度一種水馬齒莧生水中形狀相類亦可均食見王西樓采譜

菜氣味酸寒無毒 養曰辛溫崇輿曰人 主治諸腫癭疔疔疔疔之破瘡癩止消渴 藏器能肥腸令人不思食治女人赤白帶下 蘇頌飲汁治

胃諸淋

養曰辛溫崇輿曰人

胃諸淋金瘡流血破血癰癥瘰癧小兒尤良用汁治緊唇面皴解馬汗射工毒塗之瘡 蘇頌治白脚陰腫 保昇作膏塗濕癬白疔杖瘡又主

十六種風毒癩止痢及瘡痢治腸痛 益服之長年不白治癰瘡殺諸蟲生搗汁服當利下惡物去白蟲和梳垢封丁腫又燒灰和陳醋

滓先灸後封之即根出 關寶散血消腫利腸滑胎解毒通淋治產後虛汗 時珍曰馬齒莧所主諸病皆只取其散血消腫之功也頌曰多年惡瘡百方不瘳或痛癢不已者搗爛馬齒傳上

不過三兩遍此方出於武元衡相國武在西川自苦腰瘡癢痒不可堪百 附方 舊十五新 三十六風 結瘡馬齒莧一碩水一碩煮取汁入

醫無效及到京有廳吏上此方用之使瘡也李絳記其事於兵部手集 附方 二十三 三十六風 家蠟三兩重煎成膏塗之 食療

諸氣不調 馬齒莧煮粥食 禳解毒氣 六月六日米馬齒莧曬乾元日煮熟同 助骨疼痛 不拘風濕氣楊梅瘡及女人月家病先用此藥止

皮半斤蒼朮四兩蒼朮碎以水煎湯洗滌急用葱薑搗爛 腳氣浮腫 心腹脹滿小便澀少馬齒莧和少 男女瘡疾 馬齒莧搗扎手

沖熱湯三稅服之暖處取汁立時痛止也 海上名方 腳氣浮腫 心腹脹滿小便澀少馬齒莧和少 男女瘡疾 馬齒莧搗扎手

馬齒莧研汁三合服如無 產後血痢 小便不通臍腹痛生馬齒莧菜秆汁 小兒血痢 方同 肛門腫痛 馬齒莧葉三葉酸草等分煎湯

以乾者煮汁 婦人良方 三合煎沸入蜜一合和服 產寶 上 肛門腫痛 馬齒莧葉三葉酸草等分煎湯 瀕湖方 痔瘡

菜部

本草言嶺南與人植苦菜供饌名苦菜集解劉錄曰苦菜生益州山谷陵道旁凌冬不死三月三日米陰乾桐君醫錄曰苦菜三月生扶而又重出苦菜及苦買條今並併之集解陳六月花從葉出莖直花黃八月實黑實落根復生冬不枯茶曰爾雅云茶苦菜也易通卦驗苦菜非此茶也保昇曰春花夏實至秋復生花而不實經冬不凋宗奭曰此月令四月小滿節後苦菜亦者也四方皆有在北道者則冬方周生南方者冬夏常青葉如苦菜而狹綠色差淡析之白乳汁出味苦花似野菊春夏秋皆發開時珍曰苦菜即苦蕒也家裁者呼為苦蕒實一物也春初生苗有赤莖白莖二種莖中空而脆折之有白汁其葉似花蘿蔔葉而色綠帶碧上葉抱莖稍采似鶴嘴每葉分入攪揆如穿葉狀開黃花如初綻野菊一花結子一莖如茼蒿子及鶴虱子花罷則收斂子上有白毛茸茸隨風飄揚落處即生士良曰蠶蛾出時不可折取令蛾子青爛蠶婦亦忌食之然野苦菜若五六回拗後味反甘滑勝於家苦蕒也

正誤 景曰苦菜一名茶凌冬不凋作飲能令人不眠蔡曰詩云誰謂荼苦即苦菜異名也陶氏謂茶為苦菜乃木類按爾雅釋草云茶苦菜也音途釋木云檟苦茶也音遲遐切二物全別不得比例陶說誤矣

菜氣味苦寒無毒張機曰野苦菜不可共寒食令人作肉痔時珍曰脾胃虛寒人不可食**主治**五臟邪氣厭伏也**穀胃痺久服安心益氣聰察少臥輕身耐老**本經腸澼渴

熱中疾惡瘡久服耐饑寒氣不老別錄**調十二經脈霍亂後胃氣煩逆久服強力雖冷甚益人**嘉祐**搗汁飲除面目及舌下黃其白汁塗于**

腫拔根滴燈上立潰藏器**點瘰子自落**行傳**蛇咬明明目主諸痢**汪機**血淋痔瘻**時珍**發明**宗奭曰苦蕒搗汁傳丁瘡殊驗青苗陰乾以備冬月為末水調傳之時珍曰按洞天保生錄云夏三月宜

食苦蕒能益心和血通氣也又陸文量蔬園雜記云凡病痔者宜用苦蕒菜或鮮或干附方新**血淋尿血**苦蕒菜一把酒水各半煎服資生經**血脈不調**苦蕒

乾煮至熟爛連湯置器中橫安一板坐之先重後洗冷即止日洗數次屢用有奇附方六**血淋尿血**苦蕒菜一把酒水各半煎服資生經**血脈不調**苦蕒

菜晒乾為末每服二錢**喉痺腫痛**野苦蕒搗汁半盞燈心以湯浸寸**口惡瘡**野苦蕒搗汁一鍾入薑汁一匙和酒服**中沙虱毒**沙虱在水溫酒下衛生易簡方**喉痺腫痛**檢汁半盞和勻服普濟方**口惡瘡**以渣傳一二次即愈唐珪經驗方

則着人身鑽入皮裏初得皮上正赤如小豆黍粟摩之痛如刺三日後寒熱發瘡盡若入骨殺人嶺南多此即以茅葉刮去以苦菜汁塗之佳肘后方**壹蜂口螫**苦蕒汁塗之良摘玄方

根主治赤白痢及骨蒸並煮服之嘉祐**治血淋利小便**時珍

花子氣昏平無毒治中熱安心神宗

黃疸疾連花子研細二錢水煎服日三次良注

白苣宋嘉祐

釋名苣菜

時珍曰白苣苦苣莖俱不可食皆宜生投去汁鹽醋拌食通名曰生菜而白苣稍美故獨得專稱也王氏農書謂之石苣陸機詩疏云青州謂之苣可生食亦可蒸如

集解藏器曰白苣似高苣葉有白毛

時珍曰處處有之似高苣而葉色白折之有白汁正二月下種四月開黃花如苦苣結子亦同八月十月可再種故諺云生菜不離園按合璧事類云苣有數種色白者為白苣色紫者為紫苣味苦者為苦苣

菜氣味苦寒無毒

炳曰平患冷氣人食之即腹冷亦不至苦損人產後不可食令人寒中小腸痛意選曰不可共酪食生蟲蠱

主治補筋骨利五臟開胸膈擁氣通經脈上脾氣令齒白

聰明少睡可煮食之

孟詵解熱毒酒毒止消渴利大小腸

原附方一魚臍瘡其類白似腫痛不可忍先以針刺破頭及四畔以白苣滴孔中良外臺秘要

高苣合衆釋高菜千金菜

時珍曰按彭乘雲春揮犀云高菜自高國來故名

集解藏器曰高苣有白者紫者紫者入燒煉藥用時珍曰高苣正二月下種最宜肥如胡瓜糟食亦良江東人鹽晒壓實以備方物謂之高苣也花子並與白苣同

菜氣味苦冷微毒

李延飛曰久食昏人目患冷人不宜食時珍曰按彭乘云高苣有毒百毒不敢近蛇虺觸之則目瞑不見物人中其毒以薑汁解之藏器曰紫高苣有毒入燒煉用丹房鐵源曰高苣用硫黃種結砂子制硃砂又曰紫色高苣和土作

器火煨

如銅也

主治利五臟通經脈開胸膈功同白苣

藏器利氣堅筋骨去口氣白齒牙明眼目附方新五乳汁不

通服

萬苣菜煎酒海上方

小便不通通衛生易簡方

小便尿血同上方甚効

沙蠶水毒萬苣菜搗汁塗由

蠶入耳萬苣葉乾者一分雄黃一分為末糊丸棗核大蘸生油塞

耳中引出

百蟲入耳萬苣搗汁滴入自出也

聖惠方

楊氏方

聖惠方

蠶入耳

子入藥

主治下乳汁通小便治陰腫痔漏下血傷損作痛

時珍附方

新五乳汁不行

萬苣子三十枚研細酒服

又方萬苣子一合小使

生甘草三錢糯米各半合煮粥頻食之

不通 高巨子搗餅貼臍中 **腎黃如金** 高巨子一合細研水一盞 **陰囊癰腫** 萬巨子一合搗末水一盞煎五沸溫服 **閃損腰痛** 越痛丸用白萬巨子炒三兩白粟米炒一撮乳香沒藥烏梅肉

各半兩為末煉蜜丸彈子大 **巨髮不生** 瘡瘡疤上不生髮髮先以竹刀刮損以萬巨子打糊繼薑末頻擦之 摘玄方

水苦黃

宋圖經 **校正** 自外類 **名謝婆菜** 圖經 **半邊山集解** 頌曰水苦黃生宜州溪澗側葉似苦苣而厚移入此

根 氣味微苦辛寒無毒 **治風熱上壅咽喉腫痛及項上風癭以酒磨服** 蘇頌

翻白草

欽定釋名雞腿根 天藕野菜譜時珍曰翻白以葉之形名雞腿天藕以集解 周憲王曰翻白草高七八寸葉硬而厚有鋸齒背赤肉白兩頭犬峭生食者熟皆宜時珍曰雞腿兒生近澤田地高不盈尺春生弱莖一莖三葉犬長而厚有皺紋鋸齒面青背白四月開小黃花結子如胡荽子中有細子其根狀如小白米頭刺去亦皮其內白色如雞肉食之有粉小兒生食之荒年人掘以和飯食

根 氣味甘微苦平無毒 **治吐血下血崩中瘧瘧瘡** 時珍附方 **新** **崩中下血** 用湖雞腿根一兩搗碎酒二瓊煎一瓊服 **頻湖集簡方** **吐血不止** 翻白草每用五七

一鍾空 **瘡瘻寒熱** 翻白草根五七 **無名腫毒** 方同 **疔毒初起** 不拘已成未成用翻白草 **渾身疥癩** 端午日午時米翻白草 **瘰癧潰爛** 端午日

心服 **翻白草** 洗收每用一握煎湯盪盆 **圍住重洗** 劉松石保壽堂方

仙人杖草

拾遺 **校正** 自草部 **集解** 藏器曰仙人杖生劔南平澤葉似苦苣叢生陳子昂觀玉篇序云子從補闕喬公北征夏四月次於張掖河洲草木無他異者惟有仙人杖往往叢生予家世代服食者昔常餌之因為喬公言其功甘

心食之人或謂喬公曰此白棘也公乃訊予因作觀玉篇鳥頭曰仙人杖有三物同名一種是菜類一種是枯死竹筍之色黑者枸杞一名仙人杖是也此仙人杖乃作菜茹者白棘木類何因相似或曰喬公所謂白棘乃枸杞之有針者本經枸杞無白棘之名又其味苦此菜味甘乃知草木之類多而難識使人惑疑似之言以真為偽宜乎子昂論者之詳也時珍曰別有仙人草生階除間高二三寸又有仙人掌草生於石壁上皆與此名同物異不可不審竝見石草類

氣味甘小温無毒 **治作如食**

去痰癥除風冷大明久服長生堅筋骨令人不老藏器

蒲公英

唐本 稜正 自草部 移入此 穉穉草 音構 穉穉草 音構

金穉草 綱 目 黃花地丁

時珍曰名義未詳孫思邈千金方作見公英蘇頌圖經作僕公嬰庚辛玉冊作鴉鳩英俗呼蒲公丁又呼黃花地丁淮人謂之白鼓釘蜀

人謂之耳癩草關中謂之狗乳草案土宿本草云全集解徐昇曰蒲公英草生平澤田園中莖葉似苦苣斷之有白汁堪生嫩花如草薺

薺草一名地丁花如金鸞頭獨脚如丁故以名之而大四五月采之頌曰處處有之春初生苗葉如苦苣有細刺中心抽一莖莖

端出一花色黃如金錢俗訛為僕公嬰是也宗奭曰即今地丁也四時常有花花飛絮絮中有子落處即生所以庭院間皆有因風

而來時珍曰地丁江之南北頗多他處亦有之嶺南絕無小科布地四散而生莖葉花絮並似苦苣但小耳嫩苗可食庚辛玉冊云地丁

葉似小蒿莖花似大旋蕾一莖聳上三四寸斷之有白汁二月采花三月采根可制赤伏三黃有紫花者名

大丁草出太行王屋諸山陳州亦有名燒金草能磨硃砂一種相類而無花者名地膽草亦可伏三黃砒霜

以氣味甘平無毒主治婦人乳癰水腫煮汁飲及封之立消恭解毒散滯氣化熱毒消惡腫結核丁腫震搽牙烏鬚髮壯筋骨時白

汁塗惡刺狐尿刺瘡即愈頌某曰蒲公英苦寒足少陰腎經君藥也本經必用之震曰此草屬土開黃花味甘解食毒散滯氣可

微汗病即安矣頌曰治惡刺方出孫思邈千金方其序云選以貞觀五年七月十五日夜以左手中指背觸着庭木至曉遂患痛不可忍

經十日痛日深瘡日高大色如熟小豆色常聞長者論有此方遂用治之手下則愈痛亦除瘡亦即瘥未十日而平復如故楊炎南行方

亦著其効云時珍曰薩謙齋瑞竹堂方有擦牙烏鬚髮還少丹甚言此草之功蓋附方新還少丹昔日越王曾遇異人得此方極能固齒

取其能通腎也故東垣李氏言其為少陰本經必用之藥而著本草者不知此義附方五還少丹牙壯筋骨生腎水凡年未及八十者服

之鬚髮返黑蓋落更生年少服之至老不衰得遇此者宿有仙緣當珍重之不可輕泄用蒲公英一斤一名構穉草又名蒲公嬰生平澤

中三四月甚有之秋後亦有放花者連根帶葉取一斤洗淨勿令見天日曬乾入斗子解鹽一兩香附子五錢二味為細末入蒲公草內

淹一宿分為二十團用皮紙三四層裹扎定用六一泥即蚯蚓糞如法固濟入甕內焙乾乃乳癰紅腫蒲公英一兩忍冬藤二兩搗爛水

以武火煨通紅為度冷定取出去泥為末早晚擦牙漱之吐涎任便久久方効瑞竹堂方乳癰紅腫蒲公英一兩忍冬藤二兩搗爛水

矣積疔瘡疔毒蒲公英搗爛覆之即黃花地丁也別多年惡瘡蒲公英搗爛蛇螫腫痛方同

德堂方疔瘡疔毒更搗汁和酒更服取汗唐氏方貼救急方蛇螫腫痛上

黃瓜菜

物釋名黃花菜

時珍曰其花黃

集解

韻曰黃瓜菜野生田澤形似油菜但味少苦取為菜如莖香者時珍曰此菜二月生苗田

其無如瓜故名

野備有小科如薺三四五月開黃花與莖葉並同地丁但差小耳一科數花結細子不

似地丁之花成絮也野

氣味甘微苦微寒無毒主治通結氣利腸胃

人始之亦米以飼鵝兒

生瓜菜

宋圖經曰生瓜菜生資州平田陰畦間春生苗長三四寸作叢生葉青而

經釋解

韻曰生瓜菜生資州平田陰畦間春生苗長三四寸作叢生葉青而

氣味甘微寒無毒主治走攻頭面四肢及陽

毒傷寒壯熱頭痛心神煩躁利胸膈擣汁飲之又生擣貼腫

落葵

別錄

下品釋名落葵

雅藤菜

御菜

燕脂菜

志曰落葵一名藤葵俗呼為胡燕脂時珍曰落葵菜冷滑如葵故

露其葉最能承露其子垂垂亦如綴露故得露名而落葵二字相似疑落字乃葵字之訛也案考工

記云大圭終葵首也註云齊人謂椎曰終葵圭首六寸為椎然則此菜亦以其葉似椎頭而名之乎集解

紫色女人以漬粉傅面為假色少入藥用條昇曰蔓生葉圓厚如杏葉子似五味子生青熟黑所在有之時珍曰落葵三月種之嫩苗可食五月蔓延其葉似杏葉而肥厚軟滑作蔬和肉皆宜八九月間細紫花累累結實大如五味子熟則紫黑色揉取汁紅如燕脂女人飾

面點唇及染布物謂之胡燕脂亦曰燕絲子但久則色易變耳

莖

氣味酸寒滑無毒時珍曰甘微酸冷滑脾冷人不可食

主治滑中散熱

別錄利大小腸時珍

子圭

悅澤人面

別錄可作面脂

蘇頌說曰取子蒸過烈日中暴乾按去

莖

音莖

別錄名瓠菜

魚鯉草

時珍曰莖字段公路北戶錄作莖音莖秦人謂之集解

韻曰莖菜生濕地山谷陰處亦能蔓生葉似蒼葵

而肥莖菜亦色山南江左人好生食之關中謂之

莖菜條昇曰莖菜俱紫赤莖有臭氣時珍曰莖菜大醫方云魚鯉草即莖菜似行其

狀三角一邊紅一邊青可以養猪人有五莖即五毒草花葉相似但根似狗脊見草部

葉氣味辛微温有小毒

別錄曰多食令人氣喘引景曰俗傳食戟不利人脚恐由閉氣故也今小兒食之便覺脚痛

主治蜈蚣瘡

淡竹筒內煨熟搗傳惡瘡白痢

明大散毒瘰癧瘡脫肛疝疔疾解疔毒

時珍

附方 新六 背瘡熱腫

戴萊搗汁塗之留孔以洩

痔瘡腫痛

單一握煎湯重洗仍以草把痔即愈一方

疔瘡作痛

魚腥草持爛傳之痛一二時不可去草痛後一日即愈

陸氏積德堂方

小兒脫肛

魚腥草搗如泥先以朴首水洗過用芭蕉葉托住藥

坐之自愈

永類方 虫牙作痛

魚腥草花椒菜子油等分搗勻入泥少許和作小丸如豆大隨牙左右塞耳

內兩邊輪換不可一齊用恐閉耳氣塞一日夜取看有細虫為効

簡便方

魚腥草瘡

瘡一握搗爛絹包周身產

時作之

救急易方 惡虫傷

魚腥草皺面草槐樹葉草決明一處件爛傳之甚効 同上

蕨拾釋名

時珍曰爾雅云蕨藍也菜名陸佃埤雅云蕨初生無葉狀如雀足之拳又如人足之蹶故謂之蕨周秦曰蕨齊魯曰鼈初生亦類鼈脚故也其苗謂之蕨其

集錄藏器曰厥生山間根如紫草人米如食之

曲狀如小兒拳長則展開如鳳尾高三四尺其莖嫩時米取以灰湯煮去涎滑曬乾作蔬味甘滑亦可嗜食其根紫色皮內有白粉搗爛再三洗澄取粉作糗救邊皮作線食之淡紫而甚滑美也楚人飢年掘取治造不精聊以救荒味即不佳耳詩曰陟彼南山言采其蓂陸機謂其可以供祭故采之然則蕨之為用不獨救荒而已一種紫其似蕨有花而味苦謂之迷蕨初生亦可食爾雅謂之月爾三蒼謂之紫蕨郭璞云花紫月爾紫蕨曲擊厥故有月爾之名

蕨及根

氣味甘寒滑無毒

說曰又食令人目暗鼻塞髮落又冷氣人食多

主治暴熱利水道令人睡

筋骨間毒氣

說曰根燒灰油調傅

時珍曰

藏器曰多食消陽氣故令人睡弱人脚四暗食之而壽乘齊魯歲而天固非良物

器補五臟不足氣壅經絡

後吐一小蛇懸屋前漸乾成蕨

也四皓采芝而心逸夷齊采蕨而心憂其壽其天於蕨何與高陳公之言可謂迂哉然識人類死賴蕨延活又不無濟世之功

腸風熱毒

蕨菜花焙為末每服二錢米飲下 聖惠

附方 新

葉氣味甘平微毒
時珍曰按唐辛玉冊云鶴頂陰草也搗汁煮粉霜燒灰
淋汁煎粉霜伏礬石結單砂制硫伏采及雌黃砒石
主治殺蟲
煎湯洗瘡瘡澀萬毒搗爛塗諸瘡傷去癩風

時珍新附方
白癩風
紅皮覆五斤茄子根莖三斤蒼耳根莖五斤並曬乾燒灰以水一斗煎湯淋汁熬成膏別以好乳香半兩鉛霜一分膩粉一分鍊成牛脂二兩和勻每日塗三次 聖惠

莖
治燒灰和狄灰高灰等分水煎取汁煎膏點疣贅黑子蝨惡肉
時珍

秦狄藜
唐本草名時珍曰按山海經云秦山有草名曰藜如狄可以
草附藜名爲藜此即秦狄藜也蓋亦藜類其名亦由此得之
集解
秦曰秦狄藜生下濕地所在有之人
所噉者說曰此物於生采中最香美
氣味辛溫無毒
主治心

腹冷脹下氣消食和醋醋食之
唐本
破氣甚良
又末之和酒服療心痛悒悒塞滿氣
孟說

子
治腫毒搗末和醋封之
孟說

醍醐菜
發集解時珍曰唐慎微證類本草收此而形狀莫考惟雷斅炮炙論云形似牛皮蔓搗之有乳汁出
類香甜入頂采得以苦竹刀細切入砂盆中研如膏用生絹按汁出暖飲然亦不云治何病也
氣味甘溫無毒
主治月水

不利搏蕪絞汁和酒煮服一盞
千金方
傷中崩赤
醍醐汁拌酒與沸空
心服一盞 千金方
附錄茅膏菜
拾遺藏器曰味甘平無毒煮服主赤白久痢生
茅中高一尺有毛如油膩粘人手子作角生

雞儂菜
又曰味辛溫無毒火食溫中益氣頗微廣州記
云生嶺南似艾二月生苗宜雞儂食之故名
益娘菜
又曰味苦小溫無毒主婦人腹中血結羸瘦男子陰囊濕痒強湯道令人
健行不睡補虛去痔瘻癰瘰癧瘡生四明諸山冬夏常有葉似芥麻方草

山人采
優殿
又曰味辛溫無毒溫中去惡氣消食生安南人種爲茹南
方草木狀云合浦有優殿人種之以豆醬食之芳香好味

芋
別錄自果部時珍曰按徐鉉註說文云芋猶芋也大葉實根駁叶人也叶音芋疑怪貌又史記單文君云岷山之
中品校正移入此釋名
芋
別錄時珍曰按徐鉉註說文云芋猶芋也大葉實根駁叶人也叶音芋疑怪貌又史記單文君云岷山之
中品校正移入此釋名
錄
時珍曰按徐鉉註說文云芋猶芋也大葉實根駁叶人也叶音芋疑怪貌又史記單文君云岷山之
中品校正移入此釋名

集解
芋景曰芋錢塘最多生別有毒味發不可食種芋三年不采則成枵芋又別有野芋名老芋形葉相似如一根並殺人
種青芋紫芋真芋白芋連禪芋野芋也其類雖多苗竝相似莖高尺餘葉大如扇似荷葉而長根類薯蕷而圓其青芋多子細長而

本草綱目 卷二十七

黍多初煮頭灰汁更易水煮熟乃堪食爾白芋真芋連根紫芋並毒少正可煮啖之兼肉作羹甚佳謹鴉之說蓋謂此也野芋大毒不可
啖之關陝諸芋遍有山南江左惟有青白紫三芋而已須曰今處處有之閩蜀淮楚尤多植之種類雖多天賦性効相近蜀川出者形圓
而大狀若踴鵝謂之芋魁彼人種以當糧食而度歲年江西閩中出者形長而大其細者如卵生於魁旁食之尤美凡食芋並須裁時者
其野芋有大毒不可食宗奭曰江浙二川者最大而長京洛者差圓小然味佳他處不及也當心出苗者為芋頭四邊附之而生者為芋
子八九月已後採食之時珍曰芋屬雖多有水旱二種旱芋山地可種水芋水田時之葉皆相似但水芋味勝並亦可食芋不開花時或
七八月間有開者抽莖生花黃色旁有長莖護之如半邊蓮花之狀也按郭義恭廣志云芋凡十四種君子芋魁大如斗亦鸚芋即連釋
芋魁大子少百果芋魁大子繁收百斛青邊芋旁巨芋車穀芋三種並魁大子少葉長丈餘長味芋味甚佳亦可食
雞子芋色黃九面芋大而不美青芋曹芋象芋皆不可食惟莖可作道旱芋九月熟蔓芋綠枝生大者如二三升也

芋子氣味辛平滑有小毒伏明曰冷景曰生則有毒味酸不可食性滑下石服餌家所忌茶曰多食動宿冷宗奭曰多食難化滯氣困脾主治覺腸胃充肌膚滑中別錄冷啖瘡煩熱止渴

蘇令人肥白開胃通腸閉產婦食之破血飲汁止血渴藏破宿血去死肌和魚煮食甚下氣調中補虛大發明說曰芋白色者無味紫色者破氣黃汁啖之止渴

月後晒乾收之冬月食不發病他時月不可食又和鯽魚鱧魚作醃良久食治人附方舊二腹中癖氣生芋子一斤壓破酒五斤漬二七虛勞無力又煮汁洗臍衣白如玉也大明曰芋以薑同煮過換水再煮方可食之新二腹中癖氣生芋子一斤壓破酒五斤漬二七日空腹每飲一升神效 韋宙唱

行身上浮風 芋煮汁浴之慎風 瘡冒風邪 腫痛用白芋燒灰傅宜上軟筋 用大芋搗傅之 半日 孟詵食療 之乾即易 千金方 豆乾 簡便方

葉莖氣味辛冷滑無毒主治陰煩止瀉瘡婦心煩迷悶胎動不安又鹽研傅蛇蝎咬疥癰腫毒痛及普毒前大明梗擦瘡螫

汁塗蜘蛛傷時慎微曰沈括筆談云處士劉陽隱居王屋山見一蜘蛛為蜂所螫隊地腹鼓欲裂附方新黃水瘡 芋苗曬乾 徐行入草嚙破芋梗以瘡就螫處處之良久腹消如故自後用治蜂螫有驗由此

方附錄野芋 弘景曰野芋形葉與芋相似芋種三年不采成栝芋昔呂並能殺人誤食之煩悶垂死者惟以土漿及糞汁大豆 活差藏器曰野芋生溪澗則非人所種者根葉相似又有天荷亦相似而大時珍曰小者為野芋大者為天荷

見草部毒草類野芋根芋冷有大毒醋摩傳單蝨瘡毒藥 且芋搗塗瘡腫初起無名者即消亦治蜂螫瘡毒之良

土芋

拾遺

自草部

移入此

釋名

皇卵

拾遺

黃獨

綱目

土茯苓

藏器

目土芋

蔓生葉如豆

其根圓如卵

過煑食後

根氣味甘辛寒有小毒

治解諸藥毒生研水服當吐出惡物便止

煮熟食之甘美不肌厚人腸胃去熱嗽

藏

薯蕷

本經

上品

校正

目草部

移入此

釋名

音諸

土藟

音諸

山藟

音諸

山芋

音諸

藥師

亦曰山藟山海經云景山北望少澤其草多諸蕷音同薯蕷則是一種但字或音殊或音諸不一或語有輕重或相傳之訛耳

宗奭曰薯蕷因唐代宗名預避諱改為薯蕷又因宋英宗諱著改為山藟蓋失當日本名恐歲久以山藟為別物故詳著之

預生嵩高山谷二月八月根葉乾薯蕷曰亦生臨胸鍾山始生亦莖細蔓五月開白花七月結實青黃八月熟落其根內白外黃類芋

景曰近道處處有之東山南江皆多掘取食之以充糧南康間最大而美服食亦用之恭曰此有二種一者白而且佳日乾搗粉食大美

且愈疾而補一者青黑味殊不美薯蕷者尤良頌曰處處有以北都四明者為佳春生苗蔓延離披莖紫葉青有三尖似白牽牛葉更厚

而光澤夏開細白花大類葵花秋生實於葉間狀如鈴令人久春米根剉之白色者為上青黑者不堪近汴洛人種之極有思春敗宿根

頭以黃沙和牛糞作畦種之苗生似竹稍作援高一二尺夏月頌澆之當年可食極肥美南中一種生山中根細如指極實剉磨入湯

煮之作塊不散味更真美云食之尤益入過於家園種者又江湖間中一種根如薯芋之類而皮紫極有大者一枚可重數斤削去皮煎

煮食俱美但性冷於北地者耳彼土人呼為諸南北之產或有不同故形類差別也甄權曰按劉敞叔異兒云薯蕷野人謂之土藟根既

入藥又復可食入植之者隨所種之物而像之也時珍曰薯蕷入藥野生者為勝若供饌則家種者為良四月生苗莖蔓紫葉綠葉葉有

三天似白牽牛葉而光潤五六月開花成穗淡紅色結莢成簇莢凡三棱合成堅而無仁其子別結於一旁狀似雷丸大小不一皮色土

黃而肉白食甘滑與其根同王是山居錄云嘗得山芋子如荊棘子者食之更愈於根即此也霜後收子留種或春月米根截種皆生

修治 頌曰米白根剉去黃皮以水浸之穉白礬末少許入水中經宿淨洗去涎焙乾用宗奭曰入藥貴生乾之故古方皆用乾山藟生

則性滑不可入藥熟則滯氣口堪咬耳其法冬月以布裹子用竹刀刮去皮竹師鐵置簷風處不得見日一夕乾五分候全乾收之

或置焙籠中微火烘乾亦佳敷曰凡使勿用平田生二三紀者須要山中生

經十紀者皮赤四面有鬚者妙采得以銅刀刮去赤皮洗去涎蒸過暴乾用

根氣味甘溫平無毒

善曰神農甘小温桐君雷公甘涼無毒之才曰紫芝為之使惡甘遂

主治傷中補虛羸除寒熱邪氣補中益氣力長肌肉強陰久服耳目聰明輕身

菜部

三二二

菜部

菜部

菜部

菜部

不饑延年本經主頭面遊風頭風眩下氣止腰痛治虛勞羸瘦亮五臟降煩熱別錄補五勞七傷去冷風鎮心神安魂魄補心氣不足開

心孔多記事甄權強筋骨主泄精健忘大明益腎氣健脾胃止洩痢化痰涎潤皮膚時珍生搗貼腫硬毒能消散震發明權曰凡患人體虛羸者宜加而用之說曰利文

夫助陰力熱灸和寒或為湯煎或為粉並佳乾之入藥更妙惟和麩作餅託則動氣為不能制麩毒也李杲曰山藥入手大陰張仲景入味丸用乾山藥以其涼而能補也亦治皮膚乾燥以此潤之時珍曰按吳綬云山藥入手足大陰二經補其不足清其虛熱又按王履源

洞集云山藥雖入手大陰然肺為腎之上源源既有滋流豈無益此附方舊一補益虛損益顏色補下焦虛冷小便頻數瘦損無力用味丸所以用其強陰也又按曹毗杜蘭香傳云食薯蕷可以辟露新十補益虛損薯蕷於沙盆中研細入鉢中以酒一大匙熬

令香旋添酒一盞攪令勻空心腹虛脹手足厥逆或飲苦寒之劑多未食食嘔不思飲食山藥半生半炒小便數多山藥以麩水煮過白心飲之每旦一服聖惠方心腹虛脹為未米飲服二錢一日二服大有功效忌鐵器生冷普濟方茯苓等分為末每水

飲服二錢。下痢禁口山藥半生半炒為末每服二錢痰氣喘急生山藥搗爛羊椀入甘蔗汁半椀不思飲食山藥白朮一兩人飲服二錢錢米飲下衛生易簡方和勻頓熱飲之立止簡便單方脾胃虛弱參七錢半為末水糊丸小豆

大每米飲下四五濕熱虛泄山藥蒼朮等分飯丸米飲服大腫毒初起帶泥山藥蓖麻子糯米等分水普濟方脾胃虛弱參七錢半為末水糊丸小豆

此簡項後結核或赤腫硬痛以生山藥一挺去皮並麻手足凍瘡山藥一截磨泥傅便單方子二個同研貼之如神救急易方之儒門事親

零餘子拾校正自草部織器曰零餘子大者如雞子小者如彈丸在葉下生曬乾功用強於薯蕷積有數種此其一也時珍曰道移入此集解織器曰零餘子大者如雞子小者如彈丸在葉下生曬乾功用強於薯蕷積有數種此其一也時珍曰

者亦易生根氣味甘溫無毒主治補虛損強腰脚益腎食之不饑藏器

甘諸綱目集解時珍曰按陳祈暢異物志云甘諸出交廣南方民家以二月種十月收之其根似芋亦有巨魁大者如鵝卵小者如雞鴨卵

類或云芋類也根葉亦如芋根大如拳頭蒸煮食之味同薯蕷積不甚冷味庄之不葉耕氣味甘平無毒主治補虛之益氣力健脾胃強

腎陰功同著損時

百合

本經 中品 移入此

釋名 離

音強 離

別錄 一名摩羅

一名重箱

一名蓮花

一名重邁

一名中庭

一名景

一名景

一名景

一名景

故名亦通其根如大蒜其味如山藟故俗稱蒜腦諸野王玉篇亦云離乃

乃云是蚯蚓相纏結變作之亦堪服食恭曰此有二種一種葉大莖長根粗花白者宜入藥一種細葉花紅色

三尺葉粗如箭四面有葉如雞距又似柳葉青色近莖處微紫莖端碧白四五月開紅白花如石榴噴而大根如葫蘆重疊生二十瓣

又一種花紅黃有黑斑點細葉葉間有黑子者不堪入藥按徐錯時廣記二月種百合法宜雞糞或云百合是蚯蚓化成而反好雞糞

理不可知也時珍曰百合一莖直上四向生葉葉似短竹葉不似柳葉五六月莖端開大白花長五寸六出紅藍四垂向下色亦不紅

者葉似柳乃山丹也百合結實卷似馬兜鈴其內子亦似之其瓣種之如種蒜法山中

者宿根年年自生未必盡是蚯蚓化成也蚯蚓多處不聞盡有百合其說恐亦浪傳耳

長養化心有禮色每一枝顛頭五六花子紫色圓如梔子生於枝葉間每葉一子不在花中亦一異也根即百合白色其形如松子四向

攢生中間出苗時珍曰冠氏所說乃卷丹非百合也蘇頌所得不堪入藥者今正其誤葉短而潤微似竹葉白花四垂者百合也葉長而

狹尖如柳葉紅花不四垂者山丹也莖葉似山丹而高紅花帶黃而四垂上有黑斑點其子先結在枝葉間者卷丹也卷丹以四月

根氣味甘平無毒

羅曰有

主治邪氣腹脹心痛利大小便補中益氣

本經

除浮腫腹脹痞滿寒熱通身疼痛及乳難喉痺止涕淚

別錄

鬼魅涕泣不止除心下急滿痛治腳氣熱欬

甄權 安心定膽寧志養五臟治顛邪狂

驚悸產後血狂運殺蠱毒氣勝乳癰發背諸瘡

腫

大心

急

宜

蒸

食

治

百

合

病

溫

肺

上

嗽

發

明

黃

湯

凡

四

方

病

名

百

合

本草綱目

卷之二十一

菜部

十一

肉更佳乾者作粉食最益人時珍曰按王維詩云宜搜到百合真

使當重肉果堪止痰無欲縱望江目益取本草百合止涕淚之說

附方 百三 百合病 有鬼神狀已發汗者用百合七枚以泉水浸一宿

明且更以泉水煮取一升却以知母三兩用泉水二升煮一升同百合汁再者取一升半分服。百合難子湯治百合病已經吐後者用
百合七枚泉水浸一宿明且更以泉水二升煮取一升入雞子黃一個分再服。百合代豬湯治百合病已經下後者用百合七枚泉水
浸一宿明且更以泉水二升煮取一升却以代豬石一兩滑石三兩水二升者取一升同百合汁再煮取一升半分再服。百合地黃湯
治百合病未經汗吐下者用百合七枚泉水浸一宿明且更以泉水二升煮取一升入生地黃汁一升同煮取一升半分再服。竝仲景
金匱要
畧方 百合變湯 病已經月變成消渴者百合一升水一斗漬一宿 百合變熱 者用百合一兩滑石三兩為末飲
取汁溫浴病人浴畢食白湯餅 陳延之小品方 百合變熱 服方寸七微利乃良 小品方 百合腹滿 作痛者用百
飲服方寸七 百合養濃汁服一升 市臟難熱 煩悶欬嗽者新百合四兩家白麥 肺病吐血 新百合搗汁和水飲之
日二 小品 陰毒傷寒 良 孫真人食忌 月臟難熱 軟時時含一片吞津 聖惠方 肺病吐血 亦可煮食 衛生易簡 耳聾耳痛 乾
合為末溫水服二錢 拔白換黑 七月七日取百合熟搗用新煮瓶盛之密封掛門上陰 遊風陰疹 以楮葉搗動用鹽泥二兩百合半兩黃
日二服 千金方 乾百日每拔去白者摻之即生黑者也 使氏圖纂 遊風陰疹 丹二錢醋一分唾四分搗和貼之 摘
玄方 瘡腫不穿 野百合同鹽搗泥 天泡濕瘡 生百合搗塗一二日 魚骨哽咽 百合五兩研末蜜水調團頸項
傳之良 應驗方 頻湖集簡方 包住不過三五次即下 聖濟

子 主 瀉炒微赤研末湯服治腸風下血 思 選
花 主 治 兒 天 泡 濕 瘡 暴 乾 研 末 菜 子 油 塗 良 時 珍
花 主 治 血 其 惡 傳 疔 瘡 惡 腫 時 珍

山 丹 日 華 名 紅 百 合 日 華 連 珠 同 川 強 瞿 通 志 紅 花 葉 集 解 既 曰 百 合 花 紅 者 名 山 丹 其 根 食 之 不 甚 良 不 及 白 花 者 時 珍 曰 山 丹 根 似 百 合
四 垂 亦 結 小 子 燕 齊 人 采 其 花 附 未 開 者 乾 而 貨 之 名 紅 花 葉 卷 丹 並 葉 雖 同 而 稍 長 大 其 花 六 瓣 四
垂 大 於 山 丹 四 月 結 子 在 枝 葉 間 入 秋 開 花 在 顛 頂 誠 一 異 也 其 根 有 瓣 似 百 合 不 堪 食 別 一 種 也

根 氣 味 甘 涼 無 毒 正 要 云 平 主 治 瘡 腫 驚 邪 明 女 公 崩 中 時 珍

花 氣 味 根 同 主 治 活 血 其 惡 傳 疔 瘡 惡 腫 時 珍

草石錄

拾正 自草部 移入此 錄

甘露子 食物 綱目 地瓜兒

時珍曰蠶蛹皆以根形而名甘露以根味而名或言葉上滴露則生珍常時之無此說也其根長大者殺荒本草謂之地

集解 藏器曰陶氏註東部石蠶生今俗用草根黑色按草石蠶生高山石上根如薯上有毛節如蠶葉似卷柏山人取食之須曰草根之似蠶者亦名石蠶出福州今信州山石上四時常有其苗青亦有節三月米根用機曰草石蠶徽州甚多土人呼為地蠶肥白

而促節大如三眼蠶生下濕地及砂磧間秋時耕犁遍地皆是收取以醋淹作菹食冬月亦掘取之韻曰地蠶生郊野麥地中葉如薄荷少狹而尖微皺光澤根白色狀如蠶四月米根水澆和鹽為菜茹之時珍曰草石蠶即今甘露子也荆湘江淮以南野中有之人亦

截時二月生苗長者近尺方葉對節狹葉有齒竝如雞蘇但葉皺有毛耳四月開小花成穗一如紫蘇花穗結子如荊芥子其根連珠狀如老蠶五月掘根蒸食之味如百合或以蘿蔔酒及鹽追水收之則不黑亦可醬漬密藏既可為菜又可充果陳藏器言石蠶葉似卷柏者若與此不同也

根氣味平無毒

時珍曰不宜生食及多食生寸白蠶與諸魚同食令人吐

主治 漫酒除風破血養食治溪毒 焙乾走走風散血止痛其節亦可搗末酒服

和五臟下氣清神

竹筍

蜀本草 稜正 併入木部拾 遺桃竹筍

一名籜一名籜一名玉一名 集解 引景曰竹類甚多筍以實中竹筍竹者為佳於藥無用 頌曰竹筍諸家惟以苦竹筍為最貴然苦竹有

初筍皆會意也俗作笋者非 二種 一種出江西者本極粗大筍味殊苦不可啖 一種出江浙及近道者厚肉而葉長闊筍味微苦俗呼甜苦筍食品所宜亦不聞入藥用也 時珍曰晉武昌戴凱之宋僧贊寧皆著竹譜凡六十餘種其所產之地發筍之時各各不同詳見木部竹下其筍亦有可食不可食者大抵北土鮮竹惟秦蜀吳楚以南則多有之竹有雌雄但看根上第一枝雙生者必雌也乃有筍土

人於竹根行鞭時掘取者謂之鞭筍江南湖南人冬月掘大竹根下未出土者謂之筍東觀漢記謂之苞筍並可鮮食為珍品其他則南人淡乾者為玉版筍明筍大筍鹽曝者為鹽筍並可為蔬食也按贊寧云凡食筍者譬如治藥得法則益人反是則有損米之宜避風日見風則本堅入水則肉硬脫殼則失味生着刀則失柔煮之宜久生必損人苦筍宜久煮乾筍宜取汁為羹如蒸之最美煨之亦佳味香者戟人咽先以灰湯煮過再煮乃食或漢荷數片同煮亦去酸味詩云其藪伊何惟筍及蒲禮云加豆之實筍蘆魚醢則筍之為

本草綱目 卷二十七

蔬尚之

久矣

諸竹筍氣味甘寒無毒

藏器曰諸筍皆發冷血及氣
端目筍同羊肝食令人目盲

主治清渴利水道益氣可久食

列
錄利膈下氣化熱消痰爽胃

苦竹筍氣味甘寒

主治不睡去面目赤舌上熱黃消渴明目解酒毒除熱氣健人

藏器
器理心煩悶益氣力利水道下氣化痰理風

熱脚氣疔蒸煮食之

鏡

治出汗中風失音

汪

乾者燒研入鹽擦牙疳

時

發明時珍曰四川敘州宜賓長寧所出苦竹彼人重之宋黃山谷

潤維多啖而不消食者以之啓
迪酒客為之流涎蓋許之也如此

篔竹筍

主治消渴風熱益氣力消腹脹蒸炒食宜

甯

淡竹筍氣味甘寒

主治消痰降熱狂壯熱頭痛頭風并妊婦頭旋頭小驚悸溫疫迷悶小兒驚癇天吊

汪

冬筍筍氣味甘寒

主治小兒痘疹不出黃粥食之解毒有發生之義

汪

發明統曰淡竹筍即中母筍雖美然發背悶脚氣前

發冷癩惟苦竹筍主逆氣不發痰頰曰筍與竹滌功近有人素患疫疠病食筍而愈也端曰淡竹筍甘苦筍冬筍鞭筍皆可久食其他雖

竹筍性味不一不宜多食宗爽曰筍難化不益人脾病不宜食之一小兒食乾筍三寸許噎於喉中壯熱喘粗如驚服驚藥不効後吐

出筍諸證乃定其難化也如此時珍曰齊宣筍譜云筍雖甘美而滑利大腸無益於脾俗謂之刮腸脆性生薑及麻油能殺其毒人以

桃竹筍

拾遺藏器曰南人謂之黃筍灰汁煮之可食不爾戰人啖其竹叢生醜類
非一時珍曰桃枝竹出川廣中皮滑而黃犀紋度骨四寸有節可以為席

氣味苦有小毒主治公魯瘡中蛆擣碎納之蛆

盡出
藏器

刺竹筍

時珍曰生交廣中叢生大者圍三尺枝節皆有刺
夷人種以為城伐竹為弓根大如車輪一名苦竹
氣味甘苦有小毒食之落人髮
竹譜

酸筍

綱目集解時珍曰酸筍出粵南顧玠海槎錄云筍大如臂摘至用沸湯泡去苦水投冷
井水中浸二三日取出縷如絲繩醋煮可食好事者投入中州成字物云
氣味酸涼無毒主滯湯食止渴解醜利腸
時珍

本草綱目菜部第二十七卷終

本草綱目菜部目錄二十八卷

菜之三 蔬菜類一十一種

茄開寶

嘉拾遺

壺盧日華

苦瓠本經

敗瓢綱目

冬瓜本經

南瓜綱目

越瓜開寶 即栝瓜

胡嘉祐 即黃瓜

絲瓜綱目 天羅勒附

蕒救荒

右附方舊二十五新一百零八

菜之四 水菜類六種

紫菜食療

石蓴拾遺

石花菜食鑑

鹿角菜食性

龍鬚菜綱目

睡菜綱目

菜之五 芝栢類一十五種

芝本經

查本經

杉菌圖經

皂角蕈綱目

香蕈日用

葛花菜綱目

天花蕈日用

麝蒜蕈綱目

雞楨 綱目

舵菜 綱目

土菌 拾遺

鬼蓋 地岑 鬼筆附 竹蓐 食療

藟菌 本經 蜀格附

地耳 別錄

耳 日用

右附方舊七新二十六

彘蛄菜

香齋 紫蘇 紫苑 整菜 諸葵 蕪菜 酸模 葛蒲 萱草 蘆筍 芥苳 蘋 牛膝苗 防風苗 青柏苗

昆布 地松 菱芽 海藻 王瓜 豆蔻 豆芽 豆莢 豆腐 榆芽 櫻筍 牛蒡苗 海苔菜 獨帚苗 百部 罌粟苗

藕絲 藜藿 藟頭 茨莖 菱莖 椿芽 槐芽 蕪莢 枸杞 槿芽 五加 紅花苗 齊頭蒿 昆布苗 良莢苗

薄荷 桂蘇 馬蘭 萋蒿 龍葵 決明 甘藍 蘿摩 羊蹄 蒲筍 蕪菜 筍 澤蘭根 地黃苗 車前苗

昆布 地松 菱芽 海藻 王瓜 豆蔻 豆芽 豆莢 豆腐 榆芽 櫻筍 牛蒡苗 海苔菜 獨帚苗 百部 罌粟苗

藕絲 藜藿 藟頭 茨莖 菱莖 椿芽 槐芽 蕪莢 枸杞 槿芽 五加 紅花苗 齊頭蒿 昆布苗 良莢苗

昆布 地松 菱芽 海藻 王瓜 豆蔻 豆芽 豆莢 豆腐 榆芽 櫻筍 牛蒡苗 海苔菜 獨帚苗 百部 罌粟苗

藕絲 藜藿 藟頭 茨莖 菱莖 椿芽 槐芽 蕪莢 枸杞 槿芽 五加 紅花苗 齊頭蒿 昆布苗 良莢苗

昆布 地松 菱芽 海藻 王瓜 豆蔻 豆芽 豆莢 豆腐 榆芽 櫻筍 牛蒡苗 海苔菜 獨帚苗 百部 罌粟苗

本草綱目菜部第二十八卷

菜之三 蔬菜類一十一種

茄音伽 釋名落蘇 遺名落茄 瓜 薯蕷

頌曰按段成式云茄音伽乃蓮莖之名今呼茄其音若伽未知所自也時珍曰陳藏器本草云

煬帝改茄曰崑崙紫瓜又王隱若養生主論治瘧方用乾茄一名落蘇名義未詳按五代貽子錄作酪酥蓋以其味如酥酪也於義似通杜實拾遺錄云隋

似壺蘆亦不聞中華宗奩曰新羅國出一種茄形如雞子淡光微紫色蒂長味甘今中國已遍有之時珍曰茄種宜於九月黃熟時收取

洗淨曝乾至二月下種移栽株高二三尺葉大如掌自夏至秋開紫花五瓣相連五稜如縷黃蕊綠蒂蒂已其茄茄中有籽如脂麻其茄有圍如括樓者長四五寸者有青茄紫茄白茄白茄亦名銀茄更勝青者諸茄至老皆黃蘇頌以黃茄為一種似未深究也

王禎農書云一種勃海茄白色而堅實一種番茄白而扁甘脆不濕生熟可食一種紫茄形紫蒂蒂長味甘一種水茄形長味甘可以止渴

洪容齋隨筆云浙西常茄皆皮紫其白者為水茄江西常茄皆皮白其紫者為水茄亦一異也劉珣嶺表錄云交嶺茄樹經冬不凋有二三漸成大樹者其實如瓜也茄葉摘布路上以反圍之則子必繁謂之嫁茄

茄子氣味甘寒無毒 忌曰凡久冷人不可多食損人動氣發瘧及痲疾等症飛曰秋後食多損 王治寒熱五臟勞 孟 治溫疾傳尸勞

氣醋醱傳腫毒 明老裂者燒灰治乳裂 散血止痛消腫實腸 時珍發明 宗奩曰蔬園中惟此無益開寶本草並無主治說損人後人雖

滿前後求賣價以售既不以時損人益多不時不食為可忽也震亨曰茄屬土故甘而喜降大腸易動者忌之老實治乳頭裂茄根煮湯

漬凍瘡折蒂燒灰治口瘡俱獲奇效皆甘以緩火之意也時珍曰段成式酉陽雜俎言茄厚腸胃動氣發疾蓋不知茄之性滑不厚腸胃

也 舊五 新十 婦人血黃 黃茄子竹刀切除乾為末每 服二錢溫酒調下 摘玄方 腸風下血 經需茄連蒂燒存性為末每日 空心溫酒服二錢也 靈苑方 久患下血 大茄種三枚每用一枚濕紙包 沃之蠟紙封閉三日 腹內盤瘕 陳醬加芫燒存性入麝香輕口 用雙茄子懸于房門上出入用眼視之茄蕪所患亦蕪茄乾亦 去如暖飲 普濟方 粉少許脂調貼之 壽域方 乾矣又法用雙茄懸門上每日抱兒視之二三次釘鍼于上十餘

日消矣 劉松 大風熱痰 用黃老茄子大者不計多少以新瓶盛埋土中經一年盡化為水取出入苦參末石保壽堂方 同凡梧子大食已及卧時酒下三十九甚效此方出江南人傳 蘇頌國經本草 腰脚拘攣 腰脚風血積冷筋

茄子五十斤切洗以水五斗煮取濃汁漉去滓更入小鑪中煎至一升以來即入生粟粉同煎今稀稠得所取出搜和 更入麝香朱砂末同凡如梧子大每日用林米酒送下三十九近暮再服一月乃瘳男子女人通用皆驗 圖經本草 破撲膏 腫老苦茄

切片如一指厚新瓦焙研為末欲卧時溫酒 調服二錢也一夜消盡無痕迹也 勝金 墜損跌撲 散血止痛重陽日收老茄子百枚去蒂四破切之消石十二兩搗碎以不津器先

磚承覆勿犯地氣至正月後取出去紙兩重日中曝之逐日如此至二三月度茄已爛開瓶傾出漉去滓別入新器中以薄綿蓋 頭又曝至成膏乃可用每以酒調半匙空腹飲之日再惡血散則痛止而愈矣若膏久乾硬即以飯飲化動用之 圖經本草 發背惡

瘡用上方以酒服半匙更以膏塗瘡口四圍覺冷如水 乾毒瘡 生茄子一枚割去二分去瓢二分似錐子形合于 瘡乾便瘳其有根本在膚腰者亦可內消 同上 乾毒瘡 瘡上即消也如已出膿再用取理 聖濟總錄 牙齒腫痛 隔年糟茄

乾擦立効 齒牙疼痛 苦茄種燒反擦 同上 齶痺腫痛 糟茄或醬茄細嚼 瘡上即消也如已出膿再用取理 聖濟總錄 牙齒腫痛 隔年糟茄

海上名方 帶生治燒灰米飲服二錢治腸風下血不止及血痔 吳瑞 燒灰治口齒瘡 羸生切擦癢風 時珍 發明 時珍曰治癩風用苦蒂離硫附木搗之

從其類耳 附方 新 風蛙牙痛 茄蒂燒反搽之或加細辛 未等分日用之 仁存方 花玉治金瘡牙痛 時珍 附方 新 牙痛 秋茄花乾之旋燒研塗 痛處立止 海上名方

根及枯莖 葉生治瘡癢 裂裂羹湯清之良 開 散血消腫治血淋下血痢陰挺齒口疔 時珍 附方 新 血淋疼痛 茄蒂煎乾為

溫酒或鹽湯下隔年 者尤佳 經驗良方 腸風下血 方同上 久痢不止 茄根燒灰石榴皮等分為末 簡便單方 女陰挺出 茄根燒存性為末油調在紙上捲

漱口以茄母燒反飛鹽等分米 醋調稀時時擦之 摘玄方 牙齒痛 茄根搗汁頻塗之 陳茄樹燒反傳之 牙痛取牙 茄科以馬屎浸三日晒炒為末 每用點牙即落真妙 鮑氏方 骨節腫不

能 醋調稀時時擦之 摘玄方 牙齒痛 先以露蜂房煎湯漱過 海上名方 牙痛取牙 茄科以馬屎浸三日晒炒為末 每用點牙即落真妙 鮑氏方 骨節腫不

行走者九月收拓根懸簷下逐日煎湯洗之簡便

苦茄拾遺集藏器曰苦茄野生嶺南樹小有刺

子主治醋摩塗癰腫核亦可作湯洗之主瘡氣

壺盧日說論語時珍曰壺酒器也虛飲器也此物各象其形又可為酒飯之器因以名之俗作胡蘆者非矣胡乃絲名蘆

名皆可通稱初無分別故孫愐唐韻云瓠音壺又音護瓠臚瓠也陶隱居本草作瓠瓠云是瓠類也許慎說文云瓠瓠也又云瓠瓠也瓠

大腹瓠也陸機詩疏云瓠瓠也又云瓠瓠也莊子云有五石之瓠諸書所言其字皆當與壺同音而後世以長如瓠瓜首尾如一者為瓠

音護瓠之一頭有腹長柄者為懸瓠無柄而圓大形扁者為瓠瓠之有短柄大腹者為壺壺之細腰者為蒲蘆各分名色迥異於古以今

參詳其形狀雖各不同而苗葉皮子性味則一故茲不復分條焉懸瓠今人所謂茶酒瓠者是也蒲蘆今之藥壺是也郭義恭廣志謂

之約腹壺以其腹有約束也亦有大小二種也集解弘景曰瓠與冬瓜氣類同葦又有瓠瓠亦是瓠類小者名瓢食之乃勝瓠此等皆利水道所以夏月食之

似夏中便孰秋木便枯瓠瓠形狀大小非一夏末始實秋中方熟取其為器經霜乃堪瓠與甜瓠瓠體性相類啖之俱勝冬瓜陶言不及

是未悉此等原種各別也時珍曰長瓠懸瓠壺瓠瓠蒲蘆虛名狀不一其實一類各色也處處有之但有遲早之殊陶氏言瓠與冬瓜氣

類同葦蘇氏言瓠與瓠瓠全非類例皆未可憑數種並以正二月下種生苗引蔓延緣其葉似冬瓜葉而稍圓有柔毛嫩時可食故詩云

幡幡瓠葉采之烹之五六月開白花結實白色大小長短各有種色瓠中之子齒列而長謂之瓠犀竊謂壺瓠之屬既可烹晒又可為器

大者可為甕盈小者可為瓢禮為要舟可以浮水為笙可以奏樂膚瓠可以養秀犀瓣可以澆燭其利博矣

壺瓠氣香甘滑無毒案曰甘冷多食令人吐利偏鵲曰患

煩治心熱小腸潤肺治石淋時珍曰按名醫錄云浙人食瓠瓜多吐瀉謂之發暴

治清渴惡瘡鼻中肉爛痛思利水道弘景消熱服丹石入冥孟詵

附方新一腹脹黃腫用亞腰壺盧連子燒存性每服一個食前溫酒

下不飲酒者白湯下十餘日見效 簡便方

葉氣味甘平無毒治為耐饑思

蔓鬚花玉治解毒時附方新預緣胎毒七八月或三伏日或中秋日剪壹盧癩如環子脚者除乾於除夜煎湯浴小兒則可免出痘 唐珣經驗方

子圭治齒齬或腫或癢齒痛用八兩同生膠四兩每服五錢煎水含漱日三四次 御藥院方

苦瓠 本經下品釋名苦瓠國語苦盧雀解別錄曰苦瓠生晉地弘景曰今瓠忽有苦者如膽不可食非別生一種也又有瓠瓠亦是瓠類然曰與瓠瓠原種各別非甘者變為苦也保昇曰瓠即瓠也有甘苦二種甘者大苦者小機曰瓠瓠有原種是甘忽變為苦者俗謂以雞糞壅之或牛馬踐踏則變為苦陶說亦有所見未可蓋非也時珍曰詩云瓠有苦葉國語云苦瓠不材於人共濟而已皆指苦瓠而言即苦瓠也瓠壺同音陶氏以瓠作瓠音釋之所以不穩也應劭風俗通云燒瓠可以殺瓠或云苦瓠之家不燒瓠種瓜之家不焚漆物性相畏也蘇恭言服苦瓠過分吐利不止者以黍稷灰汁解之蓋取乎此凡有苦瓠須細理葉淨無腐質者乃佳不爾有毒

瓠及子氣味苦寒有毒治大水面目四肢浮腫下水令人吐利石淋吐啞嗽癆瘵淫蠱飲煮汁漬陰瘰小使不通

汁瀉中出黃水去傷冷鼻塞壅毒吐蛇蟲大治癰疽惡瘡疥癬齒齬有蠱蠱者可制永附方舊八新急善病苦瓠一枚開孔以入鼻中云黃

陳藏器蒼蒼腫滿苦壹盧瓠如大棗許以童子小便二合浸之一時取兩酸漿大納兩鼻中深吸氣待黃水出良又方宜用瓠瓠於黃末每服半錢日一服十日愈然有吐者當詳之傷寒類要

大瘦乃瘥二年內忌鹹物 聖惠用苦壹盧瓠一兩微炒為末每日粥飯服一錢 通身水腫苦瓠膜炒二兩苦葶歷五分搗合凡小豆大

大衆七枚搗丸一服三丸如人行十里許 石水腹腫四肢皆瘦削用苦瓠膜炒一兩杏仁兩兩炒去皮尖為水蠱洪腫苦瓠瓠一枚水二又服三丸水出更服一丸即止並千金方 聖濟總錄水蠱洪腫升煮至一升煎至

可丸如小豆大每米飲下十九
待小便利作小豆羹食勿飲水
小便不通 脹急者用苦瓠子三十枚炒蠅蛇三個
焙為末每冷水服一錢 並聖濟總錄
小兒疳癖 取苦瓠未破者煮令熟解
開熨之 陳藏器本草
風痰頭痛 取汁以

莖管灌入鼻中其氣上衝腦門須臾惡涎流下其病立愈除根勿以昏
運為疑乾者浸汁亦効具子為末吹入亦効年久頭風皆愈 普濟方
鼻塞氣塞 苦瓠子為末醇酒浸之夏一日
冬七日日日少少點之 聖惠方
眼目昏暗 取苦瓠白

煎絞汁一合以酢二升古錢七文同以微
火煎減半每日取沫納管中神効 千金方
肉腎 秋間取小柄壺盧或小藥壺陰乾於繫小處錐斷內它一小孔如眼孔大過有此
病將眼皮上下用手掙開將壺盧孔合定初雖甚痛苦然痰肉血皆漸下不傷睛

也 對松 苦瓠子為末蜜丸半棗大每旦漱口了含
石經驗方 齒齲臭 一丸仍塗齒斷上涎出吐去妙 聖惠方
風牙痛 壺盧子半升水五升煎三升合漱
之莖葉亦可不過三度 聖惠方
惡瘡癩癩 十年不癒者苦瓠
一杖煮汁捺之日

三度○ 九瘻乳 苦瓠四枚大如蓋者穿一孔如指大湯煮十數沸取一竹筒長各一
肘后方 尺一頭插瓠乳中一頭注瘻乳上冷則易之用遍乃止 千金方
痔瘡腫痛 苦瓠盧苦實煎湯先重覆洗乃貼熊
膽蜜陀僧膽藥片腦末良 橘玄方

下部惡癰 擇人神不在日空心用井華水調百樂煎末一椀服之微利後却用秋壺盧一名苦不
老生在架上而苦者切片置瘡上灸二七壯蕭端式病此連年一灸遂愈 永類鈴方
卒中蠱 或吐血或下血皆如爛肝者
苦瓠一枚水二升煮一升服

立吐即愈又方用苦酒一升煮
令消服之取吐神驗 肘後方
死胎不下 苦壺盧燒存性研末每服一
錢空心熱酒下 海上名方
聾耳出膿 取瓠子一分黃連半錢為末以綿先
繳淨吹入半字日二次 聖惠方
鼻中臭肉 苦壺盧
子苦下

末欲燥煎之 聖惠方
花玉治一切瘰癧霜後曝研末傳之時
珍

蔓生治瘰癧煎湯之聖愈 時珍 出珍
仇遠釋史 附方 新
小兒疳積 瓠藤同裏鹽荷葉煎濃
汁洗三五次愈 總錄

敗瓢 綱 時珍曰瓢乃匏壺破開為之者近世方藥
目 亦時用之當以苦瓠者為佳年久者尤妙
氣味辛平無毒 治消脹殺蟲治痔漏下血崩中帶下赤白
時珍 附方 新
六中滿鼓脹

用三五年陳壺盧一個以糯米一斗作酒待熟以敷於炭火上炙熟入酒
浸之如此三五次將瓢燒存性研末每服三錢酒下神効○余居士選奇方
大便下血 取瓢燒存性黃連等分研末每
空心溫酒服二錢 簡便方
赤白帶中 苦壺盧
瓢炒存

糠兩大籬入瓜在內煨至火盡取出切片同豆燉乾為水水糊丸梧子
大每服七十丸煎冬瓜子湯下日三服小便利為度 楊氏家藏方 發背欲死 冬瓜截去頭合瘡上瓜爛截去更合之瓜 疔瘡腫痛 瓜

煎湯洗之 馬汗入瘡 乾冬瓜燒研 食魚中毒 冬瓜汁飲之 小品方 面裏雪白 冬瓜一個竹刀去皮切片酒一升半水一升煎 爛濾去渣敷成膏瓶收每夜塗之 聖濟總錄

瓜練瓜 氣味甘平無毒 治絞汗服止煩躁熱渴利小腸治五淋壓丹石毒 甄權 洗面澤身去黧令入悅澤白哲 時珍 附方 新消渴煩

亂瓜瓢乾者一兩 水腫煩渴 小便少者冬瓜白瓢水煮 聖濟總錄 汁淡飲之 聖濟總錄

白瓜子 別錄曰冬瓜仁 正誤 恭曰此瓜子也 甘字似白字後人誤寫耳當改從甘字志曰本草註白瓜子冬瓜仁也 蘇氏所言味 為益液且甘瓜即甜瓜亦有青白二種其子色黃主療與冬瓜全異但冬瓜經霜有白衣其子亦白

白瓜之號因斯而得况諸方惟用冬瓜 氣味甘平無毒 別錄曰寒 治令人悅澤好顏色益氣不饑久服輕身耐老 本經 除煩滿不樂可作

子不見用 瓜瓜子者蘇說不可也 治腸癰 時珍 頌曰冬瓜仁亦堪單作服餌又研末作湯飲及作面脂藥並令人好顏色光澤宗標

用附方 舊服食法 取冬瓜仁七升以絹袋盛投三沸湯中須臾取曝乾如此三度又與清苦漬之二宿曝乾為末日服方寸 補肝明目 治男子五勞七傷明目用冬 悅澤容 白瓜仁五兩桃花四兩白楊皮二兩為末食後飲服方寸匕日三服飲白加瓜 多年損傷不瘥者

瓜仁方同上 外臺秘要 用溫酒服之 消渴不止 小便多用乾冬瓜子麥門冬黃連各二兩水煎 男子白濁 陳冬瓜仁炒為末每空心 米飲服五錢 救急易方 女子白帶 方同上

瓜皮至治作丸服亦入面脂 蘇頌 主驢馬汗瘡腫痛陰乾為末多主折傷損痛 時珍 附方 跌撲傷損 用乾冬瓜皮一兩真牛 皮膠一兩對入鍋內炒

存性研末每服五錢好酒煎服仍飲酒一飯厚 負傷腰痛 冬瓜皮燒研酒服 蓋取微汗其痛即止一宿如初極効 摘方方寸傷腰痛一錢 生牛編

瓜皮至治作丸服亦入面脂 蘇頌 主驢馬汗瘡腫痛陰乾為末多主折傷損痛 時珍 附方 跌撲傷損 用乾冬瓜皮一兩真牛 皮膠一兩對入鍋內炒

存性研末每服五錢好酒煎服仍飲酒一飯厚 負傷腰痛 冬瓜皮燒研酒服 蓋取微汗其痛即止一宿如初極効 摘方方寸傷腰痛一錢 生牛編

存性研末每服五錢好酒煎服仍飲酒一飯厚 負傷腰痛 冬瓜皮燒研酒服 蓋取微汗其痛即止一宿如初極効 摘方方寸傷腰痛一錢 生牛編

存性研末每服五錢好酒煎服仍飲酒一飯厚 負傷腰痛 冬瓜皮燒研酒服 蓋取微汗其痛即止一宿如初極効 摘方方寸傷腰痛一錢 生牛編

葉美治治腫毒殺蜂瘡時珍曰去清湯瘧疾寒熱之瘧研傅多年惡瘡時珍曰積熱瀉痢冬瓜葉嫩心拖鹽煎餅食之海上名方

藤美治燒灰可出繡黥湯洗黑疔瘡疥大搗汁服解木耳毒前水洗脫肛燒灰可淬銅鐵伏砒石時珍

南瓜綱目時珍曰南瓜種出南番轉入閩浙今燕京諸處亦有之矣二月下種宜沙沃地四月生苗引蔓甚繁一蔓可延十餘丈節本可結數十顆其色或綠或黃或紅經霜收置暖處可留至春其子如冬瓜子其肉厚色黃不可生食惟去皮穢淘食味如山藥同猪肉煮食更良亦可蜜煎按王禎農書云浙中一種陰瓜宜陰地種之秋熟色黃如全皮膚稍厚可藏至春食之如新疑此即南瓜也

味甘無毒時珍曰多食發脚氣黃疸不可同羊肉食令人氣壅主治疝氣時珍

越瓜宋開寶釋名稻瓜時珍曰越瓜以地名也俗名稻瓜南人呼為菜瓜北皆有三月下種生苗就地引蔓青葉黃花並如冬瓜花葉而小夏秋之間結瓜有青白二色大如瓠子一種長者至一尺許俗呼羊角瓜其子狀如胡瓜子大如麥粒其瓜生食可充果蔬醬醃糖醋藏浸皆宜亦可作瓠氣味甘寒無毒諸瘡又令人虛弱不能行不益小兒天行病後不可食又不得與牛乳酪及鮮同食時珍曰按蕭子真云菜瓜能暗人耳目觀驢馬食之即眼爛可知矣主治利腸胃止煩渴開利小便去煩熱解酒毒熱氣燒灰傅口吻瘡及陰莖熱

瘡藏和飯作魚食益腸胃心鏡

胡瓜宋嘉祐釋名瓠瓜藏器曰北人避石勒諱改呼黃瓜至今因之時珍曰張騫使西域得種故名胡瓜按杜寶拾遺錄云隋大業四年避諱改胡瓜為黃瓜與陳氏之說微異今俗以月令王瓜生即此誤矣王瓜土瓜也見草部時珍曰處有之正二月下種三月生苗引蔓葉如冬瓜葉亦有毛四五月開黃花結瓜圓二三寸長者至尺許青也皮上有瘡癩如疣子至老則黃赤色其子與菜瓜子同一種五月種者霜時結瓜白色而短並生熟可食兼蔬蔬之用醬醋不及菜瓜也氣味甘寒有小毒說曰不可多食動寒熱多瘧病積聚熱發症氣令人虛熱上逆少氣損陰血發瘡疥脚氣虛腫百病天行病後不可食之小兒切忌滑中生疳蟲不可多用主治清熱解渴利水道附方舊二小兒熱痢瓜同

小毒 瘡疥脚氣虛腫百病天行病後不可食之小兒切忌滑中生疳蟲不可多用

蜜食十餘枚良 **水病肚脹** 四肢浮腫用胡瓜一個破開連子以醋煮一

海上名方 半至爛空心俱食之瀆更下水也 千金方 **小兒出汁** 香瓜凡用黃連胡黃連黃蘗川大黃煨熟罈甲醋炙紫

填藥至滿蓋定發佳慢火煨熟同搗爛入麩糊丸綠豆大每 **咽嗝腫痛** 老黃瓜一枚去子入硝填滿陰乾

服二三大者五七丸至十九丸食後新水下 錢乙小兒方 為末每以少許吹之 醫林集要 **杖瘡** 六月六日取黃瓜入

水桶於瘡上立 **火眼赤痛** 五月取老黃瓜一條上開小孔去瓢入芒硝令滿 **湯火傷** 五月五日搗黃瓜入瓶內封掛

效 醫林集要 懸陰處待硝透出刮下留點眼甚效 毒域神方 火傷 煎下取水刷之良 醫方摘要

葉氣味苦有小毒 **治兒疳積** 一歲用一葉生攪攪汁服得吐下良 藏

根 **治瘰癧** 狐刺毒腫大 明

絲瓜 **綱目釋名** 絲瓜 本 天羅 事類 布瓜 同 鱗瓜 本 魚鱗 時珍曰此瓜老則筋絲羅織故有絲羅之名昔 集解 時珍曰絲瓜唐宋以前無聞

月下種生苗引蔓延樹竹或作棚架其葉大如蜀葵而多子尖有細毛刺取汁可染綠其莖有枝六七月開黃花五出微似胡瓜花莖

俱黃其瓜大寸許長一二尺甚則三四尺深綠色有皺點瓜頭如繁首嫩時去皮可烹可曝點茶充蔬老則大如杆筋絡纏紐如織成經

霜乃枯惟可搗履履滌金器故村人呼為洗鍋羅瓜內有隔子 在隔中狀如苦蔓子黑色而扁其花苞及嫩葉卷皆可食也

瓜氣味甘平無毒 入藥用 **治瘡瘡不快** 枯者燒存性入朱砂研末蜜水調服甚妙 震 養食除熱利腸者燒存性服去風化痰涼血

解毒殺蟲通經絡行血脈下乳汁治大小便下血痔漏癩中黃積疔腫疔腫血氣作痛癰疽瘡腫齒齕胎毒 時 暖胃補陽固氣和胎

生主 綱目絲瓜本草諸書無考惟痘瘡及腳癰方中燒灰用之亦取其性冷解毒耳時珍曰絲瓜老本 新二 瘡瘡不快 初出或未

編 發明 者筋絡貫串房隔聯屬故能通入脈絡臟腑而去風解毒消腫化痰祛痛殺蟲及治諸血病也 附方 十八 瘡瘡不快 出多者令

少少者令稀老絲瓜近蒂三十連 瘡口太深用絲瓜搗 風熱腮腫 絲瓜燒存性研末水月熱高瘡 苦絲瓜牙皂英並燒灰

皮燒存性研末砂糖水服 直指 瘡口太深用絲瓜搗 風熱腮腫 絲瓜燒存性研末水月熱高瘡 苦絲瓜牙皂英並燒灰

本草綱目

卷二十八

五

瘡

綠瓜連子搗汁和五倍子末頗搽之

丹溪方

坐板瘡疥 絲瓜皮焙乾為末燒酒調搽之

撮生肌妙方

天泡濕瘡 絲瓜汁調辰粉頗搽之

手足凍瘡

老絲瓜燒存性和臘脂搽之

海上方

末酒服二錢

痔漏脫肛

絲瓜燒灰多年石灰雄黃各五錢為末以猪膽雞子清及香油和調貼之收上乃止

孫氏集效方

腸風下血

霜後乾絲瓜燒存性為末空心酒服二錢一名蠻瓜一名天羅一名天絲瓜是矣 許叔微本事方

血危篤

不可救者絲瓜即天羅一個燒存性槐花減半為末每空心米飲服二錢

普濟方

酒痢便血

腹痛或如魚腦五色者乾絲瓜一枚連皮燒研空心酒服二錢一方煨食之俗名魚鱗是也

經驗良方

分鹽酒或鹽湯

經脈不通

乾絲瓜一個為末用白鴿血調成餅日乾研末每服二錢空心酒下先服四物湯三服

海上名方

汁不通

絲瓜連子燒存性研酒服一二錢被覆取汗即通

上衝心膈變為乾血氣者用絲瓜一枚燒存性空心溫酒服

毒域神方

小腸氣痛

繞臍衝心連蒂老絲瓜燒存性研末每服三錢熱酒調下甚者不過二三服即消

卵腫偏墜

絲瓜架上初結者留下待瓜結盡葉落取下燒存性為末煉蜜調成膏每

晚好酒服一匙如在左左睡在右右睡

劉松石保壽堂方

腰痛不止

天羅布瓜子仁炒焦搗酒服以渣傳之

天羅瓜研汁

普濟

突然中風

防風荆芥一兩升麻半兩薑三片水一錢煎半錢以絲瓜子研取漿

半錢和勻灌之如手足麻痒以羌活煎湯洗之

唐鑑經驗方

化痰止咳

天羅即絲瓜燒存性為末棗肉和丸彈子大每服一丸溫酒化下

攝生妙用方

風蟲牙痛

經霜乾絲瓜燒存性為末搽之

能去風惟蛀牙不效天羅即生絲瓜一個擦鹽火燒存性研末頻擦涎盡即愈

肥腫以水調貼之馬敏叔云此乃嚴月軒家傳屢効之方一試即便可睡也

食積瘡

絲瓜連子燒存性為末每服二錢因覺得病起湯下因酒得病溫酒下連進數服愈

簡方

小兒浮腫

天羅燈草葱白等分煎濃汁服并洗之

普濟方

水蠱瘡

老絲瓜去皮一枚剪碎已豆十四粒同炒豆黃去豆以瓜同陳倉米再炒熟去瓜研米

引之也此乃元時杭州名醫宋會之方

鮮于樞鈞主

甚重

治癬瘡癩瘰之瘰癧疔腫卵癩

附方

新六蠱瘡

清晨米露水絲瓜葉七片逐片擦之

陰子偏墜

絲瓜葉燒存性三錢雞子殼燒灰二錢酒溫調服

士選

頭瘡生蛆

頭皮內時有蛆出以刀切破擠絲瓜葉汁搽之蛆出盡絕根

湯火傷灼

絲瓜葉焙研入辰粉一錢蜜調搽之

魚臍疔瘡

絲瓜葉即虞刺葉也連

奇方

頭瘡生蛆

頭皮內時有蛆出以刀切破擠絲瓜葉汁搽之蛆出盡絕根

湯火傷灼

絲瓜葉焙研入辰粉一錢蜜調搽之

魚臍疔瘡

絲瓜葉即虞刺葉也連

殖食之好睡郭憲洞冥記有却睡草之食令人不睡與此相
反也珍按苦菜龍葵皆能使人不睡却睡之草其此類乎

氣味皆微苦寒無毒治心膈邪熱得眠時

菜之五

芝栴類一十五種

芝

本經上品

音因時珍曰芝本作之篆文象草生地上之形後人借之字為語辭遂加草以別之也爾雅云茵芝也

故移入集解別錄曰青芝生泰山亦芝生霍山黃芝生嵩山白芝生華山黑芝生常山紫芝生高夏山台六芝皆六月八日采弘景曰南

類甚多形色環異並載芝草圖中今俗所用紫芝乃是朽木株上所生狀如木槩名為紫芝止瘡痔不宜合諸補丸藥也凡得芝草便正

爾食之無餘節度故皆不云服法也恭曰五芝經云皆以五色生於五嶽諸方所獻白芝未必華山黑芝又非常微且多黃白稀有黑青

者然紫芝最多非五芝類但芝自難得縱獲一二豈得終久服耶禹錫曰王充論衡云芝生於土土氣和故芝草生瑞命禮云王者仁慈

則芝草生是也時珍曰芝類甚多亦有花實者本草惟以六芝標名然其種屬不可不識神農經云山川雲雨四時五行陰陽晝夜之精

以生五色神芝為聖王休祥瑞應圖云芝草常以六月生春夏紫秋白冬黑葛洪抱朴子云芝有石芝木芝肉芝菌芝凡數百種也石

芝石象生於海隅石山島嶼之涯肉芝狀如肉附於大石頭尾具有乃生物也赤者如珊瑚白者如截肪黑者如澤漆青者如翠羽黃者

如紫金皆光明洞徹如堅冰也大者十餘斤小者三四斤凡求芝草入名山必以三月九月乃山開出神藥之月必以三輔時出二奇吉

門到山頂六陰之日明堂之時帶靈寶符臺白大袍白雞包白鹽一斗及開山符檄着大石上執吳唐草一把入山山神喜必得見芝須
禹步往采以王相專和支子相生之時刻以骨刀陰乾為末服乃有功效若人不至精久齊行穢德薄又不曉入山之術雖得其圖鬼神
不以與人終不可得見也曰菌芝生深山之中大木之上泉水之側其狀或如宮室如龍虎如車馬如飛鳥五色無常凡百二十種自有
圖也曰木威喜芝乃松脂淪地千年化為茯苓萬歲其上生小木狀似蓮花夜有光現持之甚滑燒之不焦帶之辟兵服之神仙曰飛節
芝生千歲老松上皮中有脂狀如飛形服之長生曰木渠芝寄生大木上狀如蓮花九莖一叢甘味而辛曰黃蘗芝生於十歲黃蘗根下
有細根如纓服之地仙曰建木芝生於都廣其皮如纓其實如鸞曰卷成芝赤色有光扣其枝葉如金石之音曰樊桃芝其木如籠其花
如丹籬其實如翠鳥並可服食曰千歲芝生枯木下根如坐人刻之有血血塗二足可行水隱形又可治病已上皆木芝也曰獨搖芝無
風自動其莖大如手指葉似覓根有大魁如斗周遠有細子十二枚繞之相去又許生高山深谷服之神仙曰牛角芝生虎壽山及吳陵
上狀似葱而特出如牛角長三四尺青色曰龍仙芝似昇龍相負之形曰案珠芝莖黃葉赤實如李而紫色曰白符芝似梅大雪而花雪白

冬而實曰朱草芝九曲三葉莖有實也其莖如針曰五德芝狀似樓殿五色各異方莖莖氣已上皆草芝也有百二十種人得服之神仙
曰玉暗芝生於有玉之山狀似鳥獸色無常彩多似山水蒼玉亦如鮮明水晶曰七孔九光芝生於臨水石崖之門狀如盤蓋有莖葉此
芝葉有七孔夜見其光食至七枚七孔洞徹一名螢火芝曰石室芝生少室石戶中石上終難得曰桂芝生石穴中似桂樹乃石也光明
味辛曰石腦芝石中黃昏石芝類也干歲熟干歲縮千歲縮萬歲縮蛛山中見小人皆肉芝類也凡百二十種又按採芝圖云鳳凰芝
生名山金玉間服食一年與鳳凰俱也曰燕胎芝形如燕紫色有燕象曰黑雲芝生山谷之陰黑蓋赤理黑莖味鹹苦又有五色龍芝五
方芝天地芝人芝山芝下芝石芝金芝水芝火芝雷芝甘露芝青雲芝雲氣芝白虎芝車馬芝大一芝等名狀不一張華博物志云名
山生神芝不死之草上芝為車馬中芝人形下芝六畜形又按段成式酉陽雜俎云屋柱無故生芝者白土袋亦主血累主賊黃主喜形
如人面者凶財如牛馬者遠役如龜蛇者蠶耗時珍嘗疑芝乃腐朽餘氣所生正如人生燭費而古今皆以為瑞草又云服食可仙誠為
迂談近讀成式之言始知先得我所欲言其揆一也又方士以木積蒸處用樂
傳之即生五色芝嘉靖中王金當生以獻 世宗此昔人所未言者不可不知

青芝一名龍芝

別氣味酸平無毒

時珍曰五色之芝配以五行之味蓋亦據理而已未必其味便隨五色也即如五畜以羊屬火五果以杏配心皆云味苦之義○之才曰青亦黃白黑紫六芝並以著損為之

使得髮良得麻子仁白瓜子杜桂
甚益人惡常山畏扁青茵陳蒿

主治明目補肝氣安精魂仁智食輕身不老延年神仙本 不忘強志唐本

赤芝一名丹芝

氣味益無毒

主治胸中結益心氣補中增智慧不忘食輕身不老延年神仙本

黃芝一名金芝

氣味甘平無毒

主治腹中邪氣安神忠信和樂久食輕身不老延年神仙本

白芝一名玉芝

素芝氣味辛平無毒

治痰逆上氣益肺氣通利口鼻強志意勇悍安魂久食輕身不老延年神

仙本

黑芝一名玄芝

氣味鹹平無毒

主治瘧利水道益腎氣通九竅聰察輕身不老延年神仙本

榆木八月治令人不飢時珍附方新服膏淮南萬里術云八月榆櫛以美酒漬曝同青梁米紫

柳耳治補胃理氣附方新會吐痰柳樹葉五七個煎湯服即愈活人心統

柘耳經名柘葉治肺癆咳嗽膿血不閉膿成采成用一兩研末同百齒霜二錢糊丸梧子米飲下三十九丸效甚時珍

楊樸耳藏器曰出南山氣味辛微溫無毒治老血結塊破血止血者服之藏器

杉菌宋園集韻曰杉菌出宜州生積年氣味甘辛微溫無毒治心脾氣瘕及氣心痛蘇頌

皂莢綱目集韻曰生皂莢樹上木耳氣味辛有毒治積痞疔痛泡湯飲之微泄效未已再服又治腫毒初起磨醋塗之良時珍

新方一腸瀉血皂莢樹上莖元焙為末每服一錢酒溫下許學士本事方

香薷日華時珍曰薷從草莖延也集韻曰薷生桐柳枳椇木上紫色者名香薷白色者名肉薷皆因濕氣薰蒸而成生山僻處者有

一宋人陳仁王著菌譜甚詳錄其畧於此云芝菌皆氣茁也自商山茹芝而五臺天花亦甲摩靈仙居介乎天台括蒼之間蓋山入天

仙靈所宮爰產異菌林居巖極者左右芝之乃藜苒之至朕近或以羞玉公登玉食矣一日合薷又名台薷生台之薷羌山寒極雪收春

氣欲動土鬆芽活此菌候也其質外褐色肌理玉潔芳香韻味一發全南閩於百步山人曝乾以售香味減於生者他山雖產其柄高而

香劣不及矣二曰稠膏薷生孟溪諸山中雨零靈醴山膏水浸發為菌花生絕頂樹抄初如慈珠圓瑩類輕酥滴乳淺黃白色味尤

甘已乃張傘大若掌味頗渝矣春時亦生而膏液少食之之法下鼎似沸澆起參和眾味而持全於酒切勿攪動則延腥不可食矣亦可

蒸熟致遠三曰松茸生松陰采無時凡物松出無不可愛者四曰麥薷生溪邊沙壤中味殊美絕類磨菰五曰玉薷初寒時生潔皙可愛

作羹微韌俗名寒浦薷六曰黃薷叢生山中黃色俗名黃纒薷又名黃七曰紫薷藉紫色產山中為下品八曰四季薷生林水

菜部

平無毒 治益氣不飢治風破血 瑞松茸治瀉瀉不禁食之有功 諸

葛花菜

綱目 時珍曰 諸名山皆有之 惟太和山米取云 乃葛之精華 也 秋霜浮空 如芝菌涌生 地上其色赤 脆莖莖類也

氣味甘無毒 治醒酒治酒積 時珍 太和志

天花菴

綱目 時珍曰 諸名山皆有之 惟太和山米取云 乃葛之精華 也 秋霜浮空 如芝菌涌生 地上其色赤 脆莖莖類也 用釋名 天花菴 菴 瑞曰 天花菜 出山西五臺山 形如松花 而大香 氣如菴白色 食之甚美 時珍曰 五臺多蛇 菴感其氣 而生 故味美而無益 其價頗珍 段成式 酉陽雜俎 云 代北有樹 難如 柘 捲 俗呼 胡孫 眼 其此類與

草無毒

綱目 時珍曰 按 止 要云 有毒 瑞

蔞菰菴

綱目 時珍曰 蔞菰 出山東 淮北 諸處 埋桑 楮 諸木 於土中 澆以米泔 待菰 生米之長 二三寸 本小 木大白 色赤 氣 軟 其中 空虛 狀如 未開 玉簪 花 俗名 雞 腿 蔞 菰 謂其 味如 雞也 一種 狀如 羊肚 有 蜂窠 眼者 名 羊肚 菜

味甘無毒

正 要曰 有毒 動氣 發病 不可 多食 主治 益腸 胃 化 痰 理 氣 時珍 出 生 生 編

雞墩

綱目 時珍曰 南人 謂為 雞 墩 皆言 其味 似之 也 氣味 皆似 香菴 而不及 其風 韻也 又 廣西 橫州 出 雷 菌 遇 雷 過 即 生 須 疾 采 之 稍 遲 則 腐 或 老 故 名 作 美 甚 美 亦 如 雞 墩 之 屬 此 數 種 其 價 並 珍 氣 味 甘 平 無 毒 治 胃 清 神 治 痔 時 珍

舵菜

綱目 時珍曰 此 即 海 船 舵 上 所 生 菌 也 亦 不 多 得 氣 味 甘 寒 無 毒 治 癩 結 氣 痰 飲 時 珍

土菌

拾 遺 記 曰 此 菌 生 於 地 中 出 者 皆 主 瘡 疥 牛 糞 上 黑 菌 尤 佳 若 燒 灰 地 上 經 秋 雨 生 菌 重 臺 者 名 仙 人 帽 大 主 血 病 時 珍 曰 中 脘 神 名 又 舵 名 也 此 菌 釘 上 若 織 其 狀 如 舵 及 中 脘 之 帽 故 以 名 之 氣 味 甘 寒 有 毒 者 良 野 田 中 者 有 毒 殺 人 也 夜 中 有 光 者 欲 爛 無 虫 者 煮 之 不 熟 者 煮 訖 照 人 無 影 者 上 有 毛 下 無 紋 者 仰 卷 亦 色 者 並 有 毒 殺 人 中 其 毒 者 地 漿 及 糞 汁 鮮 之 類

菌可咬凡菌從地中出者皆主瘡疥牛糞上黑菌尤佳若燒灰地上經秋雨生菌重臺者名仙人帽大主血病時珍曰中脘神名又舵名也此菌釘上若織其狀如舵及中脘之帽故以名之氣味甘寒有毒者良野田中者有毒殺人

也夜中有光者欲爛無虫者煮之不熟者煮訖照人無影者上有毛下無紋者仰卷亦色者並有毒殺人中其毒者地漿及糞汁鮮之類

曰凡煮菌投以薑骨飯粒若色黑者殺人否則無毒時珍曰按菌譜云杜蘆生土中與山中菴蒿草相亂俗言毒蕈之氣所成食之殺人甚美有惡食肉不食馬肝未為不知味也凡中其毒者必笑不止解之以苦茗白礬勺新水併咽之無不立愈又被楊士瀛直指方云廣南人殺毒蛇覆之以草以水酒之數日菌生米乾為末入酒毒人遇再飲酒毒發立死又陳氏拾遺云南夷以胡蔓草毒人至死懸尸于樹汁滴地上生菌子收之名菌藥毒人至烈此皆不可不知故併記之 馬勃亦菌類見草部 **毒燒灰傳瘰癧** 器

新疔腫 黑牯牛地窠石上待生菌子焙乾研發等分為末以竹筒去兩頭繫縛合住疔 **附錄鬼毒** 別錄有名未用曰味甘平無毒至小兒寒熱瀉蓋生垣墻下亦

色日生暮死一名地蓋私景曰一名朝生即今鬼蠍也藏器曰一名鬼屋生陰濕處如菌其蓋黑而莖赤和醋傳腫毒惡瘡馬脊腫疔正倫曰鬼蠍有小毒夏日得雨聚生窠堆見日即消黑時珍曰此亦土菌之類朝生夕死者燒灰治疔腫以鍼刺破四邊納灰入內經宿出

根 **地** 別錄曰味甘無毒主小兒癩除邪養胎風痺洗洗寒熱日中青誓女子帶下生腐水積 **鬼筆** 拾遺藏器曰鬼筆生窠穢處頭如筆草處大雨生蓋如朝生黃白色四月采之時珍曰此即鬼蓋之色黃白者其功亦相近 紫色朝生暮死名朝生暮落花小兒

呼為狗溺臺主治瘡疽腫疥癩癧並日乾研末和油塗之凡菌從地出者皆主瘡疥牛糞上黑菌尤佳時珍曰此亦鬼蓋之類而無纖者紅紫鬆虛如花之狀故得花名研末傳下疔瘡

竹筴 食 併入拾鑿 **名竹肉** 拾 網 附珍曰草更主曰得得海濕之氣而 **集解** 曰慈竹林夏月逢雨滴汁着地生筴似鹿角瘡 **遺竹肉** 遺竹根 網 成也陳藏器本草作竹肉因其味也 **集解** 曰慈竹林夏月逢雨滴汁着地生筴似鹿角

肉甕有大毒以及汁煮三度煉訖然後依常藥如食之煉不熟者或人喚出血手爪盡脫應別有功力未盡識之時珍曰此即竹菰也生朽竹根節上狀如木耳紅色段成式酉陽雜俎云江淮有竹肉大如彈丸味如白樹難即此物也惟苦竹生者有毒耳 **氣味甘**

鹹寒無毒 藏器曰苦竹 **主治一切赤白痢和薑醬食之** 孟 **苦肉及汁鍊過食殺三蟲毒疔氣破老血** 藏

藿菌 音桓郡 **校正** 自草部 **藿蘆** 本經時珍曰藿當作菴乃藿藿之屬此菌生於 **集解** 別錄曰藿菌生東海池澤及勃海章武八月本經下品 **移入此** **藿蘆** 其下故名也若藿音觀乃為名與菴藿無關 **集解** 采陰乾私景曰出北來此亦無有形狀似菌

云鶴尿所化生一名鶴菌單末之猪肉腫和食可以遺坑垂恭曰藿菌今出勃海蘆葦澤中鹹鹵地自然有此菌爾非鶴尿所化生也其菌色白輕虛表裏相似與成菌不同療效有驗錄昇曰今出滄州秋雨以時即有天旱久霖即稀日乾者良 **氣味鹹平有**

小毒 別錄曰甘微溫權曰 **主治痛溫中去長蟲白癩蛇蝎螫毒瘰癧諸毒** 本 **疔蝎去虻毒守白癩瘡除腹內冷痛治白禿** 附方 昔得酒良是雞子

舊如刺吐清汁者萑菌一兩杆末羊肉腫和食之日一頓大効外臺秘要附錄葛格別錄曰味甘平無毒主寒熱瘧瘵女

地耳別正自有名未錄用移人此地踏綱目佳餅別錄曰地耳生丘陵如碧石青也時珍曰地耳亦石耳之屬生於地者也氣味甘寒無毒

論貝益氣令人有子別錄

石耳日釋名靈靈苑靈耳名耳生天台四明河南宣州黄山巴西邊徽諸山石崖上遠望如烟餅氣味甘平無毒綱目治

久食色至老不改令人不飢大小便少吳明目益精時珍附方新瀉血脫肛石耳五兩炒白枯礬一兩蜜陀僧半兩為末蒸餅丸梧子大每米飲下二十九普濟方

本草綱目菜部第二十八卷終

本草綱目果部目錄第二十九

李時珍曰木實曰果實實曰蔬蔬則可食乾則可脯豐儉可以濟時疾香可以備藥輔助粒食以養生故素問云五果為助五果者以五味

五色應五臟李杏桃李栗棗是矣古書欲知五穀之收否但看五果之盛衰李主小豆杏主大麥桃主小麥栗主稻棗主禾禮記內則列果曰菱椹榛瓜之類周官職方

以辨五也之物山林宜草物梓栗之屬川澤宜膏物菱芡之屬邱陵宜核物梅李之屬甸師掌野果疏場人樹果疏珍異物以時藏之觀此則果疏之產

常異性味良善豈可縱嗜欲而不知物理乎於是集草木之實號為果疏者為果部凡二百二十七種分為六類曰五果曰山曰表曰味曰蔬

曰水舊本果部三品共五十三種今移一種入菜部四種入草部自本部移入併附三十一種草部移入四種菜部移入一種外類移入四種

神農本草經十二種梁陶弘景註

名醫別錄十七種同上

唐本草十一種唐蘇恭

本草拾遺二十種唐陳藏器

海藥本草一種唐李珣

食性本草一種唐陳士良

食療本草一種唐孟詵

開寶本草十九種宋馬志

嘉祐本草一種宋掌禹錫

圖經本草五種宋蘇頌

日華本草一種宋人大明

食物本草一種明汪穎

日用本草一種元吳瑞

本草會編一種明汪機

本草綱目三十三種明李時珍

附註

魏吳普本草

齊徐之才藥對

唐蕭炳四聲

宋寇宗奭衍義

元李杲注蒙

明寧原食鑑

李當之本草

唐甄權藥性

楊損之剛繁

唐慎微證類

王好古湯液

周憲王救荒

宋雷效炮炙論

孫思邈千金

蜀韓保丹重註

金張元素珍珠囊

朱震亨補遺

陳嘉謨蒙釜

果之一

五果類一十一種

李別錄

榲每綱目

杏別錄

桃本經

巴暑綱目

栗別錄

梅本經

天師栗綱目

棗本經

仲思棗蘭寶

董蘘食性

右附方舊一百一十三新一百零八

本草綱目果部第二十九卷

果之一

五果類一十二種

李

別錄 時珍曰按羅頤爾雅翼云李乃木之多子者故字從木于竊謂木之多子者多矣向獨李稱木于即按素問言李味鹹屬肝東方之果也則李於五果屬木故獨專稱耳今人呼乾李為嘉慶子按韋述兩京記云東都嘉慶坊有美李人稱

為嘉慶子久之稱謂既熟不復知其所以自矣兒書名李曰居陵也 集解 弘景曰李類甚多京口有麥李麥秀時熟小而肥甜核不入藥姑熟有南居李解核如杏子形者

其所自矣兒書名李曰居陵也 集解 弘景曰李類甚多京口有麥李麥秀時熟小而肥甜核不入藥姑熟有南居李解核如杏子形者

居李今不復識醫家但用核若杏核者宗輿曰李樹大者高大許一種御李于大如櫻桃紅黃色先諸李熟醫家用者亦少時珍曰李綠

日李處處有之郭璞註爾雅休乃無實李也一名趙李瘞音嗟乃接應李也一名麥李細熟有溝道與麥同熟取乃赤李也陶氏所謂南

日李處處有之郭璞註爾雅休乃無實李也一名趙李瘞音嗟乃接應李也一名麥李細熟有溝道與麥同熟取乃赤李也陶氏所謂南

日李處處有之郭璞註爾雅休乃無實李也一名趙李瘞音嗟乃接應李也一名麥李細熟有溝道與麥同熟取乃赤李也陶氏所謂南

日李處處有之郭璞註爾雅休乃無實李也一名趙李瘞音嗟乃接應李也一名麥李細熟有溝道與麥同熟取乃赤李也陶氏所謂南

日李處處有之郭璞註爾雅休乃無實李也一名趙李瘞音嗟乃接應李也一名麥李細熟有溝道與麥同熟取乃赤李也陶氏所謂南

日李處處有之郭璞註爾雅休乃無實李也一名趙李瘞音嗟乃接應李也一名麥李細熟有溝道與麥同熟取乃赤李也陶氏所謂南

果部

實氣味苦酸微溫無毒

時珍曰李味甘酸其苦澁者不可食不沉水者有毒不可食大明曰多食令人臃脹發虛熱說曰臨水食之令發瘰癧不可合雀肉食合蜜食損五臟宗輿曰不可合漿水食發霍亂濕氣而然服木人忌之

食去煩熱調中別去膏節間勞熱

說肝病宜食之 思 魏

核仁氣味苦無毒治僵仆痿折痰骨痛別令人好顏色 吳普治婦人少腹腫滿利小腸下水氣除浮腫 甄權治面黧 蘇頌附方

搗一女人面野 用李核仁去皮細研以雞子白和如稀餡塗之至旦以漿水 洗去後塗胡粉不過五六日效忘見風 崔元亮海上方 蠟黃聲痛 苦杏仁 爵塗之 良 古今錄驗

新

本草綱目 卷二十九

根白皮

時珍曰李根及取東行者刮去黷皮炙黃入藥用別錄不言用何等李根亦不言其味但藥性論氣味大寒無毒大明云入藥用苦李根皮味鹹而張仲景治奔豚氣奔豚湯中用甘草根白皮則甘苦二種皆可用與

玉滑石 治滑瀉止心煩逆奔豚氣 別錄治瘡 煎水含漱治齒痛 煎汁飲主赤白痢 大黃煎湯日再飲之 治女人卒赤白下有驗 孟詵

小兒暴熱解毒 時珍 葶藶根皮味鹹治腳下氣主執毒煩躁煮汁服止消渴 甄附方 新 小兒丹毒 從兩股走及陰頭用李根燒為因喉卒末以田中流水和塗之 千金

寒 無藥處以皂角末吹鼻取嚏仍以李樹近根皮磨水塗喉外良驗 菽園雜記

花氣味苦無毒 治令人面澤去粉澤野豔 時珍 附方 新 面粉澤 用李花梨花櫻桃花白葵花白蓮花紅蓮花旋復花秦椒各六兩桃花木瓜花丁香沉香青木香鍾乳粉各三兩珍珠玉屑各二兩

蜀水花 一兩大豆末七合為細末瓶收每日盥鱗用洗手面百日光潔如玉也 普濟方

葉氣味甘酸平無毒 主涼兒壯熱疔疾驚癇煎湯治之良 附方 新 惡刺瘡 李葉裏葉搗汁點之效 千金

樹膠氣味苦寒無毒 治目翳疔痛消腫 時珍 附錄 徐 身益氣延年時珍曰此即無核李也唐崔奉國家有之乃異種也謬言龍耳

血墮地 所生

杏

別錄曰杏字篆文象子在木枝之形或云從口及 漢武帝上苑之種也今近汴洛皆種之熟最早其扁而青黃者名木杏味酢不及之山杏不堪入藥杏仁今已從東來人家種者為勝宗

收仁用耳時珍曰諸杏葉皆圓而有去一月開紅花亦有十葉者不結實甘而有沙者為沙杏黃而帶酢者為梅杏青而帶黃者為棠杏其金杏大如梨黃如橘西京雜記載蓬萊杏花五色蓋異種也按王禎農書云北方肉杏甚佳亦大而扁謂之金剛拳凡杏熟時皆濃汁

漢武帝上苑之種也今近汴洛皆種之熟最早其扁而青黃者名木杏味酢不及之山杏不堪入藥杏仁今已從東來人家種者為勝宗收仁用耳時珍曰諸杏葉皆圓而有去一月開紅花亦有十葉者不結實甘而有沙者為沙杏黃而帶酢者為梅杏青而帶黃者為棠杏其金杏大如梨黃如橘西京雜記載蓬萊杏花五色蓋異種也按王禎農書云北方肉杏甚佳亦大而扁謂之金剛拳凡杏熟時皆濃汁

塗盤中晒乾以手摩刮收之可和水調妙食亦五果為助之義也

實氣味酸熱有小毒生食多傷筋骨
別錄曰杏之類梅者味酢類桃者味甘宗奭曰凡杏性皆熱小兒多食致瘡癩癩熱為鵲曰多食動宿疾令人目盲鬚眉落源曰多食生痰熱昏精神產婦尤忌之
主治曝肺食

止瀉去冷熱善心之果心病宜食
思

核仁脩治
別錄曰五月米之乳景曰凡用杏仁以湯浸去皮去炒黃或用麩炒過數日凡用以湯浸去皮去每斤入白火石一斤烏豆三合以東流水同煮從己至午取出晒乾用時珍曰治風寒肺病藥中亦有連皮共用者取其發散也
氣味

甘苦溫冷利有小毒兩仁者殺人可以毒狗
德亨曰杏仁性熱因寒者可用恩選曰杏仁作湯如白沫不解者食之令氣壅身熱湯經宿者動冷氣時珍曰凡杏桃諸花皆五出若六出必雙仁為其反常故有毒也 徐之才曰得

火良惡黃父黃 或葛根黃葉草
主治 救逆上氣雷鳴喉痺下氣產乳金瘡寒心膏豚 本 驚癇心下煩熱風氣往來時行頭痛解肌消心下急滿痛殺狗毒

別錄錫毒之
治腹痺不通發汗主濕病脚氣欬嗽上氣喘促入天門冬煎潤心肺和酪作湯潤聲氣
甄權 除肺熱治上焦風燥利胸膈氣逆

潤大腸氣秘
素 殺蟲治諸瘡疥消腫去頭面諸風氣瘡癩 時珍發明 素曰杏仁氣薄味厚濁而沉墜也陰也入手太陰經其用有三潤

下端治氣也桃仁瘡狂治血也俱治大便秘當分氣血書則便難行陽氣也夜則便難行陰血也故虛人便閉不可過泄肺浮者屬氣用杏仁陳皮脉沉者屬血用桃仁陳皮手陽明與手太陰為表裏黃門主往來魄門主收閉為氣之通道故並用陳皮佐之好古曰張仲景

麻黃湯及王朝奉治傷寒氣上喘逆並用杏仁者為其利氣瀉肺解肌也時珍曰杏仁能散能降故解肌散風降氣潤燥消積治傷損藥中用之治瘡殺虫用其毒也按醫餘云凡索麩豆粉近杏仁則爛頃一兵官食粉成積醫師以積氣丸杏仁相半研為丸熟水下數服愈

又野人閑話云翰林學士辛士遜在青城山道院中夢皇姑謂曰可服杏仁今汝聰明老而健壯心力不倦求其方則用杏仁一味母盤盪漱畢以七枚納口中良久脫去皮細嚼和津液頓嚥日日食之一年必換血令人輕健此申天師方也又楊士瀛直指方云凡人以水浸杏仁五枚五更端坐逐粒細嚼至盡和津吞下久則能潤五臟去塵滓驅風明目治肝腎風虛腫人帶青眼翳風痒之病珍按杏仁性熱降氣亦非久服之藥此特其咀嚼吞納津液以消積穢則可耳古有服杏丹法云是左慈之方唐慎微收入本草云久服壽至千萬其說

本草綱目 卷三十九 果部

妄誕可鄙今刪其杜撰之辭存
之於下使讀者毋信其誑也
附方 舊三十五
新十八 **杏金丹** 左慈秘訣云亦名草金丹方山渾皇子服之長年不死夏姬服之壽年七百乃仙
去也世人不信皆由不肯精心修治故也其法須入罕到處夏月鑽斷杏樹地下

通陽氣二月除樹下草三月離樹五步作畦壟以通水亢旱則引泉灌溉有霜雪則燒火樹下以救花苞至五月杏熟自落收仁六斗以
湯浸去皮及雙仁者用南流水三石和研取汁兩石八斗去滓以新鐵釜用酥三斤以糠火及炭燃釜少磨酥至盡乃內汁入釜釜上
安盆盆上鑽孔用弦懸車轄至釜底以紙塞孔勿令泄氣初着糠火一日三動車轄以窰其汁五日有露液生十日白霜起又二日白霜
盡即金花出丹乃成也開盆炙乾以綑掃下棗肉和丸梧子大每服三九空心燒酒下至七日宿疾皆除瘡疔癰癩瘡腫萬病
皆愈久服通靈不死云云衍文不錄

頤 曰去方用杏仁修治如法自朝蒸至午便以慢火微炒至七日乃收之每旦空腹噉之久久不
止駐顏延年云是夏姬之法然杏仁能使人血溢少誤必出血不已或至萎頓故近人少有服者或云服至二三年往往或瀉或臍中出
物皆不可治也

杏酥法 頤曰去風虛除百病搗爛杏仁一石以好酒二石研濾取汁一石五斗入白蜜一斗五升攪勻封於新甕中勿洩氣三十
器曰香酪服之潤五臟去痰嗽生
熟喫俱可若半生半熟服之殺人 **又法** 宗奭曰治肺燥喘熱大腸秘潤五臟用杏仁去皮研細每一升入水一升半搗稠汁入生

治男婦五勞七傷一切諸疾杏仁一斗二升童子小便者七次以蜜四兩 **補肺丸** 治咳嗽用杏仁二大升山中者不用去雙仁者以童子
拌勻再以童便五升於椀內重蒸取出日曬夜露數日任意嚼食即愈 **小便** 二斗浸之春夏七日期久二七日連皮去於砂盆

中研濾取汁煮令魚眼沸候軟如麪糊即成以粗布攤曝之可丸即丸 **嗽寒熱** 旦夕加重少喜多嗔面色不潤或進退精少食脈
服之食前後總須服三五丸茶酒任下忌白水粥 **劉禹錫傳信方** 嗽寒熱 弦緊者杏仁半兩去皮尖童子小便浸七日漉出溫水
淘洗砂盆內研如泥以小便三升煎如膏每服

一錢熟水下婦人室女服之尤妙 千金方 **久患肺氣** 喘急至效甚者不過二劑永羅杏仁去皮尖二兩童子小便浸一日一換夏月
七分食後溫服忌 **效逆上氣** 不拘大人小兒以杏仁三升去皮尖炒黃研 **三四換** 滿半月取出焙乾研細每服一棗大薄荷一葉蜜一雞子大水一鐘煎
腥物 勝金方 膏入蜜一升杵熟每食前含之噉汁 千金 **上氣喘急** 杏仁桃仁各半兩去皮尖炒研用水調生麪和丸梧

喘促浮腫 小便淋瀝用杏仁一兩去皮尖炒研 **頭面風腫** 杏仁搗膏雞子黃和杵塗帛上厚裹之 **風虛頭痛** 欲破者杏仁去皮尖晒乾研
和米煮粥空心喫二合妙 心鏡 乾則又塗不過七八次愈也 千金方 **風虛頭痛** 末水九升研濾汁煎如麻腐

狀取和羹粥食七日後大汗出諸風漸減此法 **頭面諸風** 眼瞶鼻塞眼出冷淚用杏仁三升研細水 **偏風不遂** 失音不語生吞杏仁七枚
神妙可深秘之慎風冷豬雞魚蒜醋 千金方 煮四五沸洗頭待冷汗盡三度愈 千金

不去皮尖逐日加至七七

枚周而復始食後仍飲竹
瀝以瘥為度 外臺秘要 破傷風腫 杏仁杵膏厚塗上然 金瘡中風 角弓及張用杏仁杵碎蒸令氣潤絞
脂服一小升兼厚磨上良 必效方 溫病食勞 杏仁五兩酢二升煎
取一升服之取汗瘥

類心腹結氣 杏仁桂枝橘皮訶黎勒皮等分為丸每 喉痺痰嗽 杏仁去皮熬黃三分和桂末一分 喉熱生瘡 方同上 文
服三十九白湯下無忌 孟詵食療 研泥燙含之噴汁 陳藏器本草 卒失會聲 方同上 路公樂準

肺病咯血 杏仁四十個以黃蠟炒黃研入青黛一錢作餅用柿 卒不小便 杏仁二十七枚去皮尖炒黃研 血崩不止 請藥不效服此立止用
餅一個破開包藥紙裏煨熟食之取效 丹溪方 未米飲服之 古今錄驗方 甜杏仁上黃皮燒存性

為末每服三錢空心 五痔下血 杏仁去皮尖及雙仁者水三升研濾 瘡道膿痛 腫痒杏仁取膏類 瘡門瘻
熱酒服 保壽堂方 汁煎減半同米煮粥食之食醫心鏡 瘡道膿痛 瘡道膿痛 瘡道膿痛 瘡道膿痛 瘡道膿痛
痛痒不可忍用杏仁去皮燒存性杵爛 身面疣目 杏仁燒黑研膏擦破 面上疔胞 杏仁去皮搗和雞子白夜塗之 兩頰赤痒 其狀如痛名
綿裹納入陰中取効 孟詵食療本草 日日塗之 千金方 瘡道膿痛 瘡道膿痛 瘡道膿痛 瘡道膿痛 瘡道膿痛

仁頻頻搗之內服消 耳卒聾閉 杏仁七枚去皮拍碎分作三分以綿裹之着盞如小豆許以器盛於飯上 耳出膿汁 杏仁炒黑搗膏綿裹
風散 證治要訣 蒸熟令病人側臥以一果捻油滿耳中良久又以一果滴之取効 外臺 耳出膿汁 杏仁炒黑搗膏綿裹
師方 梅 杏仁研末乳汁 瘡瘡鱗鼻 杏仁燒壓取油 牙齒蟲 杏仁燒存性研膏髮裏納出孔中殺虫 牙斷痒痛 杏仁一百枚去皮
和傳 千金方 瘡瘡鱗鼻 傳之 千金方 牙齒蟲 去風其痛便止重者不過再上 食療 牙斷痒痛 以鹽方寸七水一

升者令汁出含漱吐 鳳鼻牙痛 杏仁鍼刺於燈上燒烟乘熱搭病牙上又復燒 目中赤脈 痒痛時見黑花用初生杏子仁一升古五銖錢
之三度愈 千金方 搗七次絕不疼病牙逐時斷落也 善濟方 目中赤脈 七支入瓶內密封埋門限下一百日化為水每
夕點之聖 胎赤眼疾 杏仁壓油半雞子殼食鹽一錢入石器中以柳枝一握緊束研至色黑以熟 目中警遮 但腫子不破者用杏仁二升
酒總錄 艾一團安碗內燒烘之令氣透火盡即成每點少許入兩管甚妙聖藥總錄 去皮麩果作三包燻火煨熟

去麩研爛壓去油每用一錢入 目生弩肉 或痒或痛漸覺腫人用杏仁去皮二錢半 傷目生弩 廣利方用生杏仁七枚去皮細嚼吐於掌
銅綠一錢研勻點之 同上 膩粉半錢研勻綿裹頭點之 同上 傷目生弩 中乘熱以綿裹頭點弩肉上不過四五
度愈 總錄用杏仁研 小兒血眼 兒初生艱難血瘀毗睡遂瀝漆其睛不見腫人輕則外胞赤腫上下弦爛用杏仁二枚去
膏入乳化開日點三次 皮尖嚼乳汁三五匙入膩粉少許蒸熟絹包頻點重者加黃連朴消盡良 全幼心鑑 小兒臍爛 成

杏仁去皮研傳 小兒咽腫 杏仁炒黑研爛入肉內 不出者雙杏仁搗爛以車脂 箭鏑在咽 或刀刀在咽膈諸隱處
子母秘錄 金燕 善濟方 鍼入肉內 調貼其鍼自出 瑞竹堂方 箭鏑在咽 杏仁仁傳之 肘後方 狐尿瘡 杏仁研爛

不出者雙杏仁搗爛以車脂 箭鏑在咽 或刀刀在咽膈諸隱處 杏仁仁傳之 肘後方 狐尿瘡 杏仁研爛
子母秘錄 金燕 善濟方 鍼入肉內 調貼其鍼自出 瑞竹堂方 箭鏑在咽 杏仁仁傳之 肘後方 狐尿瘡 杏仁研爛

不出者雙杏仁搗爛以車脂 箭鏑在咽 或刀刀在咽膈諸隱處 杏仁仁傳之 肘後方 狐尿瘡 杏仁研爛
子母秘錄 金燕 善濟方 鍼入肉內 調貼其鍼自出 瑞竹堂方 箭鏑在咽 杏仁仁傳之 肘後方 狐尿瘡 杏仁研爛

不出者雙杏仁搗爛以車脂 箭鏑在咽 或刀刀在咽膈諸隱處 杏仁仁傳之 肘後方 狐尿瘡 杏仁研爛
子母秘錄 金燕 善濟方 鍼入肉內 調貼其鍼自出 瑞竹堂方 箭鏑在咽 杏仁仁傳之 肘後方 狐尿瘡 杏仁研爛

不出者雙杏仁搗爛以車脂 箭鏑在咽 或刀刀在咽膈諸隱處 杏仁仁傳之 肘後方 狐尿瘡 杏仁研爛
子母秘錄 金燕 善濟方 鍼入肉內 調貼其鍼自出 瑞竹堂方 箭鏑在咽 杏仁仁傳之 肘後方 狐尿瘡 杏仁研爛

不出者雙杏仁搗爛以車脂 箭鏑在咽 或刀刀在咽膈諸隱處 杏仁仁傳之 肘後方 狐尿瘡 杏仁研爛
子母秘錄 金燕 善濟方 鍼入肉內 調貼其鍼自出 瑞竹堂方 箭鏑在咽 杏仁仁傳之 肘後方 狐尿瘡 杏仁研爛

不出者雙杏仁搗爛以車脂 箭鏑在咽 或刀刀在咽膈諸隱處 杏仁仁傳之 肘後方 狐尿瘡 杏仁研爛
子母秘錄 金燕 善濟方 鍼入肉內 調貼其鍼自出 瑞竹堂方 箭鏑在咽 杏仁仁傳之 肘後方 狐尿瘡 杏仁研爛

及熟浸之冷即
狗咬傷瘡爛香仁
食狗不消心下堅脹口乾發熱安語杏仁一升去皮共水三升煎沸去渣取汁分三服下肉為度梅師方
解狼犬毒杏仁搗爛水和服之千金方
一切食停氣

易必效方
形脹用紅杏仁三百粒巴豆二十粒同炒色變去
豆不用研杏為末橘皮湯調下楊氏家藏方
白癩風杏仁連皮共每早嚼二七粒指諸瘡腫痛杏仁去皮研濾取膏入輕粉麻油調搽神效不拘大人小兒鮑氏

小兒頭瘡杏仁燒研傅之
蛆入耳杏仁搗泥取油滴入非出即死扶壽精方

花氣味苦溫無毒**治補不足****李傷中寒熱痺厥逆**別附**新婦人學**二月丁亥日取杏花桃花陰乾為末戊子日
粉澤面花

桃花各一升東流水浸七日
洗面三七遍極妙聖濟總錄

葉**治入卒腫滿身面洪大者濃汁熱漬亦少服之**肘後

枝**治瀉****取一握水一升煮減半入酒三合和勻分服大效**蘇頌**附方**一墜撲瘀血在內煩悶者用東引杏樹枝三兩細剉微
根**治食杏仁多致迷亂將死切碎煎湯服即解**時珍

巴旦杏綱目**釋名****擔杏**正**忍厘****焦蘇**時珍曰巴旦杏出回回舊地今關西諸土亦有樹如杏而葉差小實亦去小
氣味甘平溫無毒

主治**止欬下氣消心腹逆悶**時珍出飲

梅本經**時珍曰**梅古文作臬象子在水上之形梅乃杏類故反杏為臬書家訛為甘木後作梅從每聲也或云梅者媒也媒合眾味
中品釋名故書云若作和姜爾惟監梅而梅字亦從某也陸佃埋雅言梅入北方變為杏郭璞註爾雅以柎為梅皆誤矣柎即柎木荆人
呼為梅見陸機草木疏**集解**別錄曰梅實生溪中山谷五月米實大氣頌曰今襄漢川蜀江湖淮嶺皆有之時珍曰按陸機詩疏云梅杏類也樹葉
皆暑似杏葉有長尖先眾木而花其實酢曝乾為脯入羹臠羞中又含之可以香口于赤者材堅于白者材脆范成大

呼為梅見陸
機草木疏
皆暑似杏葉有長尖先眾木而花其實酢曝乾為脯入羹臠羞中又含之可以香口于赤者材堅于白者材脆范成大

梅譜云江梅野生者不經栽接花小而香子小而硬消梅實圓鬆脆多液無滓惟可生噉不入夏造綠苔梅枝附皆綠重葉梅花葉重疊結實多雙紅梅花色如杏杏梅色淡紅實扁而斑味全似杏鶯鶯梅即多葉紅梅也一蒂雙實一云苦棟接梅則花帶黑色譚子化書云李接桃而本強者其實毛梅接杏而本強者其實甘梅實采羊黃者以烟薰之為烏梅青者鹽海曝乾為白梅亦可蜜煎糖藏以充果飢熟者榨汁晒收為梅醬惟烏梅白梅可入藥梅醬夏月可調渴水飲之

實氣味酸平無毒大明曰多食損齒傷筋蝕脾胃令人發膈上痰熱服黃精人忌食之食梅**發明**宗奭曰食梅則津液泄者水生水也
齒巖者嚼胡桃肉解之 物類相感志云梅子同韶粉食則不酸不軟牙
薛珍曰梅花開於冬而實熟於夏得水之全氣故其味最酸所謂曲直作酸也肝為乙木膽為甲木人之舌下有四竅而發通脬液故食梅則津生者類相感應也故素問云味過於酸肝氣以津又云酸走筋筋病無多食酸不然物之味酸者多矣何獨梅能生津耶

烏梅治弘景曰用須去核微炒之時珍曰造法取青梅籃盛於突上重熏若以稻灰淋汁潤濕蒸過則肥澤不毒**氣味酸溫平滑無毒**景曰實忌猪肉**主治**下氣除熱煩滿安心止肢體痛偏

枯不仁死肌去青黑慈蝕惡肉經本**去痺利筋脈止下痢好唾口乾**別錄**水清汁飲治傷寒煩熱**弘景**止渴調中去痰治瘧瘧止吐逆霍亂除冷**

熱痢載器**治虛勞骨蒸消酒毒令人得睡和建茶乾薑丸服止休息痢大驗**大明**欬肺瀉腸止久嗽瀉痢反胃噎膈吐利消腫滿痰殺**

蟲解魚毒馬汗毒硫黃毒時珍
白梅釋名**蠶梅霜梅**治取大青梅以鹽汁漬之日晒夜漬十日成矣久乃上霜**氣味酸鹹平無毒**主治**和藥點慈蝕惡肉**弘景**刺在肉中者嚼傅之即出**說**治**

刀箭傷止血研爛傅之大明**乳癰腫毒杵爛貼之**江**除痰**蘇頌**治中風驚癇痰痺厥僵仆牙關緊閉者取梅肉搗搯牙齦涎出即開又治**

瀉痢煩渴霍亂吐下血血崩功同烏梅時珍**發明**弘景曰生梅烏梅白梅功應相似好古曰烏梅脾肺二經血分藥也能收肺氣治燥嗽肺欲收急食酸以收之時珍曰烏梅白梅所主諸病皆取其酸收之義惟張仲景治吐

厥烏梅丸及重暈方中用者取虫得酸即止之義稍有不同耳醫說戴曾魯公痢血百餘日國醫不能療陳應之用鹽水梅肉一枚研爛含臘茶入醋服之一啜而安大丞梁莊肅公亦痢血應之用烏梅胡黃連薑土土等分為末茶調服亦效蓋血得酸即斂得寒則止得苦

則潰故也其蝕惡瘡肉雖是酸收却有物理之妙說出本經其法載於劉涓子鬼遺方用烏梅肉燒存性研俾惡肉上一夜立盡聖惠
用烏梅和蜜作餅貼者其方緩按楊起簡便方云起臂生一疔膿潰百日方愈中有惡肉突起如蠶豆大月餘不消醫治不效因問本草
得此方試之一日夜去其大半再上一日而平乃知 **附方** 舊十三 **諸瘡** 為方見 **癰疽瘡** 已潰未潰皆可用鹽白梅燒存性為末入
世有奇方如此遂留心搜刻諸方始基於此方也 **新二十** 諸瘡 為方見 **癰疽瘡** 輕粉少許香油調塗四圍王氏簡易方
瘰癧 水梅丸用青梅二十枚鹽十二兩淹五日取梅汁入明礬三兩桔梗白芷防風各二兩猪牙皂角三十條俱為細末拌汁和
瘰癧 梅入瓶收之每用一枚嚼嚙津液凡中風痰厥牙關不開用此擦之尤佳 總錄用白梅已生瘰癧未作丸含嚙或納吞之 **濕消**

煩渴 烏梅肉二兩微炒為末每服二錢水二盞煎一盞煎 **泄痢口渴** 烏梅煎湯日飲代 **產後痢渴** 烏梅肉二十箇麥門冬十二分每
火煎去滓入鼓二百粒煎至半盞溫服 簡要濟眾方 **扶善精方** 烏梅一兩去核燒過為末每服 **久痢不止** 腸垢已出射後用
痛 直指用陳白梅同真茶蜜水各半煎飲之 聖惠用烏梅肉炒 **便痢膿血** 烏梅一兩去核燒過為末每服 **久痢不止** 腸垢已出射後用
黃連各四兩為末煉蜜丸梧子大每米飲服二十九日三服 **大便下血** 及酒痢久痢不止用烏梅三兩燒存性為末醋煮米糊
一盞煎六分食前分二服 袖珍用烏梅肉白梅肉各七箇搗 **大便下血** 和丸梧子大每空心米飲服二十九日三 濟生方 **小便尿**

血 烏梅燒存性研末醋糊丸 **血崩不止** 烏梅肉七枚燒存性 **大便不通** 氣奔欲死者烏梅十顆湯浸去核丸棗 **霍亂吐** 鹽梅煎湯細細
梧子大每服四十九酒下 研末米飲服之日三 **大便不通** 大納入下部少時即通 食療本草 **霍亂吐** 鹽梅煎湯細細
虬蠱上行 出於口鼻烏梅煎湯頓飲 **水氣瀉急** 烏梅大棗各三枚水四分煮二升 **梅核痛氣** 取半青半黃梅子每個用鹽一兩淹一日夜
并含之即安 食鑑本草 納蜜和勻含嚙之 聖濟總錄

二梅麻線縛定通裝磁罐內封埋地下百日取出每用一枚含之嚙汁 **心腹脹痛** 短氣欲絕者烏梅二七枚水五升煮一沸
入喉即消收一年者治一人二年者治二人其妙絕倫 甄氏經驗方 **心腹脹痛** 納大錢二七枚煮二升半頓服之 射後 **勞瘵** 烏
十四枚豆豉二合桃柳枝各一虎口甘草三寸生薑 **久熱不已** 烏梅肉微炒粟殼去筋膜蜜炒等 **瘰癧頭痛** 如破者烏梅肉三十個鹽
一塊以童子小便二升煎一半溫服即止 經本方 **久熱不已** 分為末每服二錢睡時蜜湯調下 **瘰癧頭痛** 三搗酒三升煮一升頓服
取吐即愈 **傷寒頭痛** 壯熱胸中煩痛四五日不解烏梅十四枚鹽五合 **折傷金瘡** 乾梅燒存性傳之 **馬牙入瘡** 作痛用烏梅連核搗爛以
肘後方 **傷寒頭痛** 水一升煎半升溫服取吐吐後避風良 梅師方 **折傷金瘡** 一宿瘡 千金方 **馬牙入瘡** 頭醋和敷仍先刺瘡出去

紫血乃傳之繫 **獐犬傷毒** 烏梅末酒服 **指頭腫毒** 痛甚者烏梅肉和魚鮓 **傷寒瘰癧** 生下部者烏梅肉三兩炒為末煉蜜丸梧子大
定 經驗方 **獐犬傷毒** 二錢 千金 **打頭腫毒** 搗封之妙 李樓奇方 **傷寒瘰癧** 以石榴根皮煎湯食前下三十丸 聖惠方 **小兒**

小兒 傷寒頭痛 壯熱胸中煩痛四五日不解烏梅十四枚鹽五合 折傷金瘡 乾梅燒存性傳之 馬牙入瘡 作痛用烏梅連核搗爛以
肘後方 傷寒頭痛 水一升煎半升溫服取吐吐後避風良 梅師方 折傷金瘡 一宿瘡 千金方 馬牙入瘡 頭醋和敷仍先刺瘡出去

紫血乃傳之繫 獐犬傷毒 烏梅末酒服 指頭腫毒 痛甚者烏梅肉和魚鮓 傷寒瘰癧 生下部者烏梅肉三兩炒為末煉蜜丸梧子大
定 經驗方 獐犬傷毒 二錢 千金 打頭腫毒 搗封之妙 李樓奇方 傷寒瘰癧 以石榴根皮煎湯食前下三十丸 聖惠方 小兒

紫血乃傳之繫 獐犬傷毒 烏梅末酒服 指頭腫毒 痛甚者烏梅肉和魚鮓 傷寒瘰癧 生下部者烏梅肉三兩炒為末煉蜜丸梧子大
定 經驗方 獐犬傷毒 二錢 千金 打頭腫毒 搗封之妙 李樓奇方 傷寒瘰癧 以石榴根皮煎湯食前下三十丸 聖惠方 小兒

紫血乃傳之繫 獐犬傷毒 烏梅末酒服 指頭腫毒 痛甚者烏梅肉和魚鮓 傷寒瘰癧 生下部者烏梅肉三兩炒為末煉蜜丸梧子大
定 經驗方 獐犬傷毒 二錢 千金 打頭腫毒 搗封之妙 李樓奇方 傷寒瘰癧 以石榴根皮煎湯食前下三十丸 聖惠方 小兒

紫血乃傳之繫 獐犬傷毒 烏梅末酒服 指頭腫毒 痛甚者烏梅肉和魚鮓 傷寒瘰癧 生下部者烏梅肉三兩炒為末煉蜜丸梧子大
定 經驗方 獐犬傷毒 二錢 千金 打頭腫毒 搗封之妙 李樓奇方 傷寒瘰癧 以石榴根皮煎湯食前下三十丸 聖惠方 小兒

紫血乃傳之繫 獐犬傷毒 烏梅末酒服 指頭腫毒 痛甚者烏梅肉和魚鮓 傷寒瘰癧 生下部者烏梅肉三兩炒為末煉蜜丸梧子大
定 經驗方 獐犬傷毒 二錢 千金 打頭腫毒 搗封之妙 李樓奇方 傷寒瘰癧 以石榴根皮煎湯食前下三十丸 聖惠方 小兒

紫血乃傳之繫 獐犬傷毒 烏梅末酒服 指頭腫毒 痛甚者烏梅肉和魚鮓 傷寒瘰癧 生下部者烏梅肉三兩炒為末煉蜜丸梧子大
定 經驗方 獐犬傷毒 二錢 千金 打頭腫毒 搗封之妙 李樓奇方 傷寒瘰癧 以石榴根皮煎湯食前下三十丸 聖惠方 小兒

紫血乃傳之繫 獐犬傷毒 烏梅末酒服 指頭腫毒 痛甚者烏梅肉和魚鮓 傷寒瘰癧 生下部者烏梅肉三兩炒為末煉蜜丸梧子大
定 經驗方 獐犬傷毒 二錢 千金 打頭腫毒 搗封之妙 李樓奇方 傷寒瘰癧 以石榴根皮煎湯食前下三十丸 聖惠方 小兒

頭瘡烏梅燒末生油 曝乾梅脯 令人背膈疼胸目暗漠漠烏梅肉焙一兩沙
調塗 聖濟錄 香口真 常時含之 硫黃毒 糖半兩漿水一大盞黃七分呷之 總錄

核仁氣味酸平無毒主治明目益氣不饑 吳普除煩熱 孟詵治指忽然腫痛搗爛和醋浸之 時珍 肘後方

花氣味微酸渣無毒發明 時珍曰白梅花古方未見用者近時有梅花湯用半開花溶蠟封花口投密罐中過時以一兩茶同蜜一起
點沸湯服又有蜜漬梅花法用白梅肉少許浸雪水潤花露一宿蜜浸薦酒又梅花粥法用落英入熟米粥
再煮食之故楊誠齋有蜜點梅花帶露餐及脫蕊
收將熬粥喫之白皆取其助雅致清神思而已

葉氣味酸平無毒治休息痢及霍亂者瀝汁飲之 大明藏器曰嵩陽子言清水揉梅葉洗復葛衣經夏不腐 舊一
脆有驗時珍曰夏衣生黴點梅葉煎湯洗之即去甚妙 新 中水毒病 初起
惡寒心煩拘急巨醒暮劇梅 葉搗汁三升飲之良 肘後 下部蟲 隔布坐蒸之虫盡死也 外臺秘要 月水不止 梅葉焙棕櫚皮灰各等分為末
每服二錢酒調下 聖濟總錄

根主治風痺 別錄 出 初生小兒取根同桃李根煮湯浴之無瘡熱之患 崔氏 煎湯飲治霍亂止休息痢 大
土者殺人 梅葉桃葉一斛杵爛蒸極熟納小器中 每服二錢酒調下 聖濟總錄

樹梅 綱目 時珍曰樹梅出均州大和山相傳真武折梅枝插於樹樹誓曰吾道若成開花結果後果如其
言今樹尚在五龍宮北樹木梅實杏形桃核道士每歲采而蜜煎以充貢獻馬棚乃榆樹也

實氣味甘酸平無毒主治生津止渴清神下氣消酒 時珍

桃 本經 木部有拾遺桃 釋名 時珍曰桃性早花易植而子繁數字從水 佳 鮮 別錄曰桃生太山川谷弘景曰今處處有之核仁入藥當
下品 核今併入此 釋名 兆十億曰兆言其多也或云從兆諧聲也 佳 鮮 取解核者種之為佳山桃仁不堪用頌曰汴東陝西者尤
大而美大抵佳果肥美者皆圃人以他木接成殊失本性入藥當用本生者為佳今市肆賣者多雜接核之仁為不堪也 宗奭曰山中一
種桃正合月令桃始華者花多子少不堪啗惟堪取仁入藥汁中有油桃小於眾桃光如塗油不益脾胃太原有金桃色深黃洛中有豈
崙桃肉深紅紫色又有餅子桃狀如香餅子其味皆甘時珍曰桃品甚多易於栽種且早結實五年宜以刀剗其皮凶其脂液則多延數
年其花有紅紫白千葉一色之殊其實有紅桃緋桃碧桃細桃白桃烏桃金桃銀桃胭脂桃皆以色名者也有緋桃油桃御桃方桃匾桃

果部

本草綱目 卷三十九

果部

五

偏核桃皆以形名者也有五月早桃十月冬桃秋桃霜桃皆以時名者也並可供食惟山中毛桃即爾雅所謂桃小而多毛核粘味惡其仁充滿多脂可入藥用蓋外不足者內有餘也冬桃一名西王母桃一名仙人桃即寃倫桃形如苦蕒裏微赤得霜始熟方桃形微方區桃出南番形區肉澀核狀如金其仁甘美番人珍之名波淡樹樹甚高大偏核桃出波斯形薄而尖頭偏狀如半月其仁酷似新羅桃子可食性熱又楊維禎宋濂集中並載元朝御庫蟠桃核大如盃以為神異按王子年拾遺記載漢明帝時常山獻巨核桃露下始花隆暑方熟玄中記載積石之桃大如斗斜器酉陽雜俎載丸疑有桃核半扇可容米一升及蜀後主有桃核杯半扇容水五升良久如酒味可飲此皆桃之極大者昔人謂桃為仙果殆此類歟生桃切片淪過曝乾為脯可充果食又桃酢法取爛熟桃納甕中蓋口七日漉去皮核密封二七日酢成香美可食種樹書云柿接桃則為金桃李接桃則為李桃梅接桃則脫桃樹生虫者諸頭汁漉之即止皆物性之微妙也

實氣味辛酸甘熱微毒多食令人有熱
說曰能發丹石毒生者尤損人思慮曰黃帝書云食桃飽入水浴令人成淋及寒熱病時珍曰生桃多食令人膨脹及生癰癤有損無益五果列桃為下以此
瑞曰桃與藍同食患心痛服

王棗補食益顏色
大肺病宜食之

冬桃食之解勞熱
時珍出

核仁
別錄曰七月採取仁陰乾數日凡使須去皮用白朮烏豆二味同於坩鍋中煮二伏時漉出劈開心黃如金色乃用時珍曰桃仁行血宜連皮尖生用潤燥活血宜湯浸去皮尖炒黃用或麥麩同炒或燒存性各隨本方便仁者有毒不可食說

氣味甘平無毒
思慮曰苦甘平平說曰溫弘景曰
主治 療血血閉癥瘕邪氣殺小蟲
經本
止效 逆上氣消心下堅硬除卒暴擊血通

月水止心腹痛
別錄曰
治血結血秘血燥通瀉大便破畜血
元
殺三蟲 每夜嚼一枚和蜜塗手面
蓋
主 血滯風痺骨蒸肝瘧寒熱鬼注瘰

痛瘰癧血病
時珍發明
景曰桃仁苦重於甘氣薄味厚沉而降陰中之陽手足厥陰經血分藥也若以泄滯血甘以生新血故破凝血者用

之源血聚則肝氣燥肝若急急食甘以緩之桃仁之甘以緩肝散血故張仲景抵當湯用之以治傷寒八九日內有畜血發熱如狂小腹痛滿痛小便自利者又有當汗失汗熱毒深入吐血及血結胸煩燥語者亦以此湯主之與宜虫水蛭大黃同用
附方
舊十
九新

十聖膏 今人光潤用桃仁五合去皮用糯米飯漿同研絞汁令盡溫溫洗面極妙 千金翼 偏風不遂 反癖疾用桃仁二十七百枚去皮去雙仁以好酒一斗三升浸二十一

風勞毒腫 變痛或牽引小腹及腰痛桃仁一升去皮尖髮令黑烟出熱研 瘰癧寒熱 桃仁一百枚去皮尖乳體內研成膏不得犯生水

酒吞下五月五日午時合之 骨蒸作熱 桃仁一百二十枚留尖去皮及雙仁杵為丸并花水頓服之令盡 上氣欬嗽 杏仁

胸滿氣喘桃仁三兩去皮尖以水一大升研汁和梗米二合煮粥食之 心鏡 卒得欬嗽 桃仁三升去皮杵着器中密封蒸熱日乾細

種大畧使人寒熱淋瀝沉沉默默不知所苦而無處不惡累年積月以至於死死後復 傳尸鬼氣 咳嗽痔瘡注氣血氣不通日漸消瘦桃

米作粥空 星淫心痛 桃仁一合爛研更 卒然心痛 桃仁七枚去皮尖研爛 人好麤錄 桃仁雙去皮共三七枚 下部蠱 病人齒無色舌上

痛痒處或下痢乃下部生虫食肛也桃仁十五 常瀉下 不止者桃核燒存性研細 婦人難產 數日不出桃仁一個劈開一片書可

百病 千金桃仁前治婦人產後百病諸氣取桃仁一二百枚去皮尖雙仁麥搗極細以清酒一 產後身熱 如如火皮如栗粒者桃仁研泥

方 產後血閉 桃仁二十枚去皮尖藕一塊 產後陰腫 桃仁燒 婦人陰癢 桃仁杵爛綿裹 男子陰腫 作瘻用桃仁炒香為末酒服方

癩方同 小兒爛瘡 初起腫爛似火瘡桃 秘錄小兒聾耳 桃仁炒研綿裹日 風鼻牙痛 鐵刺桃仁燈上燒烟出吹滅安痛當上 唇乾裂痛 桃仁搗

傳 海上大便不快 裏急後重用桃仁三兩去皮尖吳茱萸二兩食鹽 急勞欬嗽 煩熱用桃仁三兩去皮尖猪肝一枚童子小便五升同煮乾於

冷湯減食 漸至黑瘦用桃仁五百顆吳茱萸三兩同入鐵鑊中微火炒一炊久將桃仁去皮微黃色即漸加火待微烟出即乘 預辟瘡癩

桃仁一斤吳茱萸青蓋各四兩同炒熟以新瓶密封一七取出揀去
菜豔將桃仁去皮去母嚼一二十枚山居尤宜之 余居士選奇方

桃毛 毛桃實上毛
也則取用之 **氣味辛平無毒主治破血閉下血瘕寒熱積聚無子帶下諸疾**
別錄 **痔瘡中破辟氣** 大治惡鬼邪氣
孟

桃臬 釋名桃奴 別錄曰此是桃實着樹經冬不落者正月來之中實者良時珍曰桃子乾懸如鼻首礫木之狀故名
神桃 奴者言其不能成實也家齊方謂之神桃言其辟惡也千葉桃花結子在樹不落者名鬼鬮雷斅
月米得以酒拌蒸之從己至未焙乾以銅刀切焙取肉用 **氣味苦微温有小毒治殺百鬼精物**
本 **經殺精魅五毒不祥瘡中惡腹痛** 別錄

回胡洽治中惡毒 **治肺氣腰痛破血療心痛酒磨服之** 大 **主治吐血諸藥不效燒存性研末次湯調服有驗**
汪 **治小兒虛汗婦人妊娠下**

血破伏梁結氣止邪瘧燒烟膏瘡瘻黑油調傅小兒頭上肥瘡軟癬 時 **附方** 舊三 **伏梁結氣** 在心上不散桃奴三兩為末
聖惠 **鬼瘧寒熱** 樹

自乾桃子二十七枚為末滴水丸梧子大朱砂為衣每服一丸侵晨面東并華水下良聖濟總錄 **五種瘧疾** 家寶通神丸用神桃即桃奴十四枚巴豆七粒黑豆一兩研勻以冷水和丸梧
子大朱砂為衣發日五更念藥王菩薩七遍并華水下 一丸立瘥不過二次妙

不可言 王隱 **妊娠下血** 不止用桃臬燒存性研 **盜汗不止** 樹上乾桃子一個霜梅二個葱根七個燈心二莖陳
皮一錢稻根大麥芽各一撮水二鍾煎服 **白堊頭瘡** 乾桃一兩黑

臘猪脂調 **小兒頭瘡** 樹上乾桃燒研入膩 **食桃成病** 桃最燒灰二錢水服取吐即愈陸光祿說有人食桃不消化作病時
於林間得橋桃燒服登時吐出即愈此以類相攻也張文仲備急方

花修治 別錄曰三月三日米陰乾之散回桃花勿用千葉者 **氣味苦平無毒主治殺惡鬼令人好顏色**
本 **悅澤人面除水氣破石**

淋利大小便下三蟲 別錄曰三月三日米陰乾之散回桃花勿用千葉者 **氣味苦平無毒主治殺惡鬼令人好顏色**
本 **悅澤人面除水氣破石**

三樹桃花 盡則面色紅潤悅澤如桃花也頌曰太清草木方言酒漬桃花飲之除百疾益顏色時珍曰按歐陽詢初學記載北齊崔氏以
桃花白雪與兒醋面云令面妍華光悅蓋得本草令人好顏色悅澤人面之義而陶蘇二氏乃引服桃花法則因本草之言而謬用者也

三樹桃花 盡則面色紅潤悅澤如桃花也頌曰太清草木方言酒漬桃花飲之除百疾益顏色時珍曰按歐陽詢初學記載北齊崔氏以
桃花白雪與兒醋面云令面妍華光悅蓋得本草令人好顏色悅澤人面之義而陶蘇二氏乃引服桃花法則因本草之言而謬用者也

三樹桃花 盡則面色紅潤悅澤如桃花也頌曰太清草木方言酒漬桃花飲之除百疾益顏色時珍曰按歐陽詢初學記載北齊崔氏以
桃花白雪與兒醋面云令面妍華光悅蓋得本草令人好顏色悅澤人面之義而陶蘇二氏乃引服桃花法則因本草之言而謬用者也

桃性走泄下降利大腸甚快用以治氣實人病水飲腫滿積滯大小便閉塞者則有功無害若久服即耗入陰血損元氣豈能悅澤顏色耶按張從正儒門事親載一婦滑泄數年百治不效或言此傷飲有積也桃花落時以棘鍼刺取數十管勿犯人手以麩和作餅煨熟食之米飲送下不一二時瀉下如傾六七日行至數百行皆困惟飲凉水而平觀此則桃花之峻利可徵矣又蘇軾杜陽編載鮑佑女喪夫發狂閉之室中夜斷窗櫺登桃樹上食桃花幾盡及旦家人接下自是遂愈也珍按此亦驚怒傷肝痰夾敗血遂致發狂偶得桃花利痰散滯帶血之功與張仲景治積熱發狂用承氣湯者血發狂用桃仁承氣湯之意相同而陳藏器乃言桃花食之患淋何耶

附方 舊三新十三 大便艱難 桃花為末水服方寸七即通 千金 產後秘塞 大小便不通用桃花葵子滑石楮

等分為末每空心葱白湯服二錢即利 集驗方 **心脹積痛** 三月三日采桃花晒乾杵末以水服二錢七良 孟詵食療本草 瘧疾不已 桃花為末酒服方寸七良 梅師方 **痰飲宿水** 桃花散收桃花陰乾為末

少粥不似轉下藥也 崔行功纂要方 **腳氣腫痛** 桃花一升陰乾為末每溫酒細細服之 一宿即消 外臺秘要 **腰脊作痛** 三月三日取桃花一斗一升并華水三斗翹六升末六斗收熟如常釀酒每服一升日三服神效 千金 **臙屎不止**

桃花為末豬脂和 三月三日收未開桃花陰乾與桑椹赤者等分作餅 頭上肥瘡 一百五日寒食節收桃花為末食後以水半

水而瘡 方同 **足上瘡** 桃花食鹽等分杵勻 崔卵面 桃花冬瓜仁研末等 乾葉塞腸 脹痛不通用毛桃花濕者一兩和麩三兩作餅 醋和傳之 肘後方 皮分蜜調傳之 聖惠 乾葉塞腸 煮熱空心食之日午腹鳴如雷當下惡物也 聖

惠 **方** 惠 **面** 粉 刺 癩子如米粉用桃花丹砂各三兩為末每服一錢空心井水下 令面光華 三月三日收桃花七月七日收雞血和塗面 日三服十日知二十日小便當出黑汁面色皚白也 聖惠方 上三二日後脫下則光華顏色也 聖濟總錄

葉 頌曰采嫩者名 氣味苦辛無毒 治除尸蟲出瘡小蟲 治惡氣 兜寒熱 客忤 大瘡 傷寒 時氣 風痺 無汗 治頭風 通大小便止 桃心入藥尤勝

霍亂腹痛 時珍發明 頌曰桃葉蒸汗法張文仲備急方治天行病有支太醫桃葉湯重法用水二石煮桃葉取七斗安林蓋下厚被蓋卧床 上乘熱重之少時當雨汗汗過去湯速粉之并灸大椎穴則愈又陳廩且小品方有阮河南桃葉蒸法云連發汗汗不出者死可蒸之如中風法燒地令熱去火以少水洒之布乾桃葉於上厚二三寸安席葉上卧之溫覆得大汗被中傅粉極燥便瘥也凡

相葉麥麩露沙皆可如此法用張苗言曾有人疲極汗出卧薑受冷但苦寒倦四日凡人發汗汗不出用此法而瘥也時珍曰按許叔微

本事方云傷寒病醫者須顧表裏循次第昔范雲為梁武帝屬官得時疫熱疾召徐文伯診之是時武帝有九錫之命期在旦夕雲恐不預求速愈文伯曰此甚易效恐二年後不坐起兩雲曰朝聞道夕死可矣况二年乎文伯乃以火殿地布桃栢葉於上令雲卧之少頃汗

出粉之翌日遂愈後二年雲果卒取汗先期尚能促壽况不顧表裏時日便欲速愈者乎夫桃葉發汗妙法也猶有此戒可不慎與附方舊十風變項強不得顧視穿地作坑殿赤以水洒之令冷鋪生桃葉於內卧席上以項着坑上蒸至汗出良久即蹇

千金方小兒傷寒時氣用桃葉三兩水五升煮十沸取汁日五六遍淋之後燒雄鼠晝二枚服之妙傷寒類要二便不通用桃葉汁半升服冬霍亂腹痛桃葉三升切水五升者除三

蟲桃葉取汁服一腸痔出血桃葉一斛杵納小口器中坐蒸之有空自出肘後方女人陰瘡如虫咬痒痛者生搗桃葉綿裹納之日三四易食療本草足上瘡瘡傳之肘後方鼻內生瘡桃

嫩心杵爛塞之無汁塗之千金諸蟲入耳桃葉按熟塞之或搗汁滴之或黃用枝簡便方身面癬瘡日午搗桃葉取汁塗之千金諸蟲入耳作枕枕一夕自出梅師方

芭蕉及白皮修治時珍白樹皮根皮皆可用根皮尤良氣味辛無毒主治除邪鬼中惡腹痛去曹中熱別治痺忤心腹痛解毒辟疫癘瘴蓋身目如金殺諸瘡蟲附方舊十四天行疫癘常以東行桃枝煎發煎如金時明時清晨勿令於雞夫婦人見取東引桃

煎二小升空腹頓服後三五日其黃離離如薄雲散開百日方平復也苦散後可時時飲清酒市執常急集驗治肺熱喘急客熱往來欲一盃則服中易散否則散遲忌食穀菜猪魚等物此是徐之才家秘方也初虞世必效方

升以水四升者取一升以故布納汁中取薄胸口溫四肢盈數刻即止圖經喉痺寒痛桃皮煮汁三升心虛憶忘令耳目聰明用戊子日取東引桃枝三子枕之又方五月

之千金卒得心痛東引桃枝一把切以酒一升煎後方鬼疰心痛東引桃枝一握去粗皮切水煎中蠱毒用東引桃白皮烘乾大戟斑蝥去足翅煎半升頓服大效肘後方

即出不出更服或因酒得以酒服因食得以食服初虞世云此乃李鏡州法也亦可以米泔丸服蘇頌圖經卒得惡瘡人不識者取桃皮作煎三物等分為末以冷水服羊方寸七

成蠱桃枝煎濃汁含之下下部蠱瘡桃白皮煮取濃汁如稀錫入能騰少五痔作痛桃根水煎汁浸小兒濕癬桃樹青皮為末和醋頻傳之子母秘錄狂狗

咬傷桃白皮一握水三升水腫尿管皮三斤去內外皮搗米一斗女麴一升以水二斗煮桃皮取汁一斗以一半漬麴一半漬飯飯

如常釀成酒每服一合日三次以體中有熱為候小便多是病去忌生冷一切毒物聖濟總錄女

人經閉數年不通面色萎黃唇口青白腹內成塊肚上筋起腿腫或腫桃根煎者之用桃樹根牛蒡根馬鞭草
根牛膝蓬蘽各一斤剉以水三斗煎一斗去滓更以慢火煎如錫狀收之每以熱酒調服一匙 聖惠牙疔疔腫桃白皮柳白皮
酒熱飲冷則吐 小兒白禿 桃皮五兩煎汁入白 髮沐之并服 同上

桃膠膠治 時珍曰桃皮成時以刀割樹皮久則膠溢出果收 氣味苦平無毒主治錄服保中不飢忍風寒 別下后淋破血治中惡產
以桑灰湯浸過曝乾用如服食當依本方修鍊

忤蘇 毒鬼氣 益和血益氣治下痢止痛 時珍曰本草言桃膠錄服保中不飢按仙方服膠法取膠二十斤絹袋盛於標水灰汁
酒服二十九久服身輕不老時珍曰按抱朴子云桃膠以桑灰汁漬過服之除百病數月斷穀久則睡有夜光 附方 舊二
如月又列仙傳云高丘公服桃膠得仙古方以桃膠為仙藥而後人不復用之豈其功亦未必如是之殊耶 新三 虛熱作渴 桃膠
丸大含之 石淋作痛 桃木膠如棗大夏以冷水三合冬以湯三合 煎七分食後服 楊氏家藏方 產後下痢 赤白裏急後重
佳 外臺 和服日三服當下后石盡即止 古方錄驗 血淋作痛 桃膠炒木通石膏各一錢水一盞

乾沉香蒲黃炒各等分為末每服 痘癘發 黑陷者用桃膠煎湯飲之或水煎 二錢食前米飲下 婦人良方 成膏酒化服之大效 總微論

桃符 主治 中惡精邪氣水煮汁服之 孟詵曰時珍曰典術云桃乃西方之木五木之精仙木也味辛氣惡故能壓伏邪氣制百鬼
蟠樹樹下主領眾鬼之義許慎云昇死於桃梧梧杖也故鬼畏桃而今人用桃梗作杖厭以辟鬼也禮記云王季則巫祝以桃茹前引以
辟不祥茹者桃枝作帚也博物志云桃根為印可以召鬼甄異傳云鬼但畏東南枝術據此諸說則本草桃之枝葉根核桃棗桃板皆辟
鬼崇產辟蓋有由來矣錢乙小兒方疏取積熱及結胸 用巴豆砲炙之藥以桃符煎湯下亦是厭之義也

桃板 拾遺 時珍曰板音插即代也人 王季心腹痛鬼建破血辟邪惡氣脹滿煮汁服之與桃符同功 蘇附方 新 一風鼻牙痛 門下
燒取汁少少納孔中 以蠟固之 聖惠方

本草綱目 卷二十九 果部

桃板 拾遺 時珍曰板音插即代也人 王季心腹痛鬼建破血辟邪惡氣脹滿煮汁服之與桃符同功 蘇附方 新 一風鼻牙痛 門下
燒取汁少少納孔中 以蠟固之 聖惠方

桃板 拾遺 時珍曰板音插即代也人 王季心腹痛鬼建破血辟邪惡氣脹滿煮汁服之與桃符同功 蘇附方 新 一風鼻牙痛 門下
燒取汁少少納孔中 以蠟固之 聖惠方

桃板 拾遺 時珍曰板音插即代也人 王季心腹痛鬼建破血辟邪惡氣脹滿煮汁服之與桃符同功 蘇附方 新 一風鼻牙痛 門下
燒取汁少少納孔中 以蠟固之 聖惠方

桃板 拾遺 時珍曰板音插即代也人 王季心腹痛鬼建破血辟邪惡氣脹滿煮汁服之與桃符同功 蘇附方 新 一風鼻牙痛 門下
燒取汁少少納孔中 以蠟固之 聖惠方

桃板 拾遺 時珍曰板音插即代也人 王季心腹痛鬼建破血辟邪惡氣脹滿煮汁服之與桃符同功 蘇附方 新 一風鼻牙痛 門下
燒取汁少少納孔中 以蠟固之 聖惠方

桃寄生 見木部

桃蠹蟲 移入 蠹部

栗

別錄

時珍曰栗說文作桌從肉音條麥上品名花實下垂之狀也梵書名篤迦

佳釀曰錄曰栗生山陰九月采紅景曰今會稽諸暨栗形大皮厚不美刺及始豐栗皮薄而色長條似胡桃花實有房最大者若拳中子三四小者若桃李中子惟一二將熟則鐮折子出栗類亦多按陸機詩疏云栗五方皆有之周秦吳揚特饒惟濮陽及范陽栗甜美味長他方者不及也倭韓國諸島上栗大如雞子味短不美桂陽有華栗黃生實大如杏仁皮子形色與栗無異但小耳又有與栗皆與栗同子圓而細惟江湖有之或云即華也華音榛詩云樹之華栗是也然曰板栗錐栗一樹皆大茅栗似板栗而細如椽子其樹雖小葉亦不殊但春生夏花秋實又枯為異耳宗顛曰湖北一種旋栗頂圓末尖即榛栗象榛子形也栗欲乾收莫如曝之欲生收莫如潤沙藏之至夏初尚如新也時珍曰栗但可種成不可移栽按事類合璧云栗木高二三丈莖生多刺如蝟毛每枝不下四五個莖有青黃赤三色中子或單或雙或三或四其殼生黃熟紫殼內有膜栗仁九月霜降乃熟其苞自裂而子墜者乃可久藏苞未裂者易腐也其花作條大如筋頭長四五寸可以點燈栗之大者為板栗中心扁子為栗楔稍小者為山栗山栗之闊而未尖者為錐栗圓小如椽子者為華栗小如指頂者為茅栗即爾雅所謂栲栗也一名栲栗可炒食之劉向嶺表錄云廣中無栗惟新州山中有石栗一年方熟圓如彈子皮厚而味如胡桃得非栗乃水果不宜於炎方耶

實氣味鹹溫無毒 鏡曰吳栗雖大味短不如北栗凡栗日中曝乾食即下氣補益不爾猶有木氣不補益也火煨去汗亦殺水氣生食則發氣者蒸炒熱食則壅氣凡患風水人不宜食味鹹生水也茶曰栗作粉食勝於菱芡但以飼孩兒令齒不生宗顛曰小兒不可多食生則難化
主治 益氣厚腸胃補腎氣令人耐飢 別錄 生食治腰脚不遂 思 療筋骨斷碎腫痛瘀血生嚼之有效 蘇
栗楔 音屑 時珍曰一棗三 **主治** 骨風痛 士 活血充效 頌曰今衡山合 每日生食七枚破冷疔瘰癧又生嚼置刺出前頭瘰癧

腫毒 大明 恩遠曰栗腎之果也腎病宜食之紅景曰相傳有人患腰脚弱往栗樹下食數升便能起行此是補腎之善然應生敬若服餌則宜蒸曝之宗顛曰栗之補腎為其味鹹又滯其氣也時珍曰栗於五果屬水水滯之年則栗不熟類相應也

腫毒 大明 恩遠曰栗腎之果也腎病宜食之紅景曰相傳有人患腰脚弱往栗樹下食數升便能起行此是補腎之善然應生敬若服餌則宜蒸曝之宗顛曰栗之補腎為其味鹹又滯其氣也時珍曰栗於五果屬水水滯之年則栗不熟類相應也

內寒暴洩如注令食煨粟二三十枚頓愈腎王大便秘能通腎於此可驗經驗方治腎虛腰脚無力以袋盛生栗懸乾每旦喫十餘顆次喫諸腎粥助之久必強健益風乾之粟勝於日曝而火煨油炒勝於煮蒸仍須細嚼連液吞嚥則有益若頓食至飽反致傷脾矣按蘇子由詩云老去自添腰脚病山翁服栗舊傳方客來為說晨興晚三咽徐收白玉漿此得食粟之訣也王_{附方}舊三小兒疔瘡_{主嚼栗子傳}補農書云史記載秦飢應候請發五苑粟粟則本草栗厚腸胃補腎氣令人耐飢之說殆非虛語矣_{新五小兒疔瘡}外臺

葦刺入肉_{方同}馬汗入肉_{成瘡者方同}馬咬成瘡_{獨顯粟子燒研}熊虎爪傷_{方同}小兒口瘡_{大栗煮熟日日與}衄血不止_{宣州大栗七枚刺破連皮燒存}

性出火毒入麝香少許研勻每服二錢溫水下_{聖濟總錄}金刀斧傷_{用獨殼大栗研傳或倉卒嚼傳亦可}集簡方

栗北扶_{音芽茶曰栗}氣味甘滑無毒_{治搗散和蜜塗面令光急去皺文}_蘇附方_新一骨鯁在咽_{粟子內薄皮燒存性研末吹入咽中即下}聖濟總錄用栗子肉上皮半

兩為末鮎魚肝一個乳香二錢半同搗丸梧子大者_{鮎遠近以線繫綿裹一丸水潤吞之提線釣出也}

栗殼_{栗之黑殼也}氣味同_主浸胃消渴煮汁飲之_孟煮汁飲止瀉血_大附方_新一鼻衄不止_{累醫不效栗殼燒存性研末粥飲服二錢}聖惠方

毛毬_{栗外刺包也}主_治煮汁洗火丹毒腫_蘇

花玉_治瘰癧_吳

樹皮_主治_煮汁洗沙蟲毒_蘇瘡毒_蘇治丹毒五色無常刺皮有刺煮煎水洗之_孟說_出肘後方

根_主治_偏腎氣酒煎服之_汪

天師栗_綱時珍曰按宋祁益州方物記云天師栗惟西蜀青城山中有之他處無有也云張天師夢_{氣味甘溫無毒}主_治食已

道於此所遺故名似栗而味美惟獨房若椽為異耳今武當山所賣麥羅子恐即此物也

本草綱目 卷三十九 果部

學時珍出
益州記

棗

本經上品

時珍曰按陸仲埤雅云大曰棗小曰棘棘酸棗也棗性高

集解別錄曰棗生河東平澤弘景曰世傳河東猗氏縣棗特異今青

州肉厚也江南出者堅燥少脂今園圃種時者其種甚多美者有水菱棗御棗之類皆不堪入藥蓋肌肉輕虛故也南郡人煮而曝乾皮

薄而皺味更甘於他棗謂之天蒸棗亦不入藥按郭璞註爾雅云壹棗大而銳猶壹瓠也邊腰棗也細腰今謂之轆轤棗白棗也子白

乃熟洗大棗也出河東猗氏縣大如雞卵連羊棗也實小紫黑俗名羊矢棗酸棗也水小而實酢還味棗也其味短蹶池苦棗也其

味皆苦無實棗也宗奭曰大棗先青州次晉州皆可晒曝入藥益脾胃餘者止可充食用耳青州人以棗去皮核焙乾為棗圈以為奇果

有御棗甘美輕脆後眾棗熟而易生蟲今人所謂撲落酥者是也又有牙棗先眾棗熟亦甘美微酸而尖長二棗皆可噉不堪收曝時珍

曰棗木赤心有刺四月生小葉尖銳光澤五月開小花白色微青南北皆有惟青晉所出者肥大甘美入藥為良其類甚繁爾雅所載之

外郭義恭廣志有狗牙雞心牛頭羊角獼猴細腰赤心三星駢白之名又有木棗氏棗桂棗夕棗灑棗墟棗蒸棗白棗丹棗棠棗及安邑

信都諸棗穀城紫棗長一寸羊角棗長三寸雲雲所出小棗脆潤核細味亦甘美皆可充果食不堪入藥入藥須用青州及晉地晒乾大

棗為良按賈思勰齊民要術云凡棗全亦時日日撼而收曝則紅皺若羊亦收者肉未充滿乾即色苦赤收者味亦不佳食經作乾棗法

須治淨地鋪撒箔之類承棗日晒夜露擇去胖爛曝乾收之切而晒乾者為棗脯煮熱榨出者為棗膏亦曰棗飴蒸熟者為膠棗加以糖

蜜拌蒸則更甜以麻油葉同蒸則色更潤澤搗棗膠晒乾者為棗油其法取紅軟乾棗入釜以水僅淹平者沸漉出沙盆研細生布絞取

汁塗盤上晒乾其形如油以手摩刮為末收之每以一匙投湯盃中酸甜味

足即成美饌用和米炒最止飢渴益脾胃也盧誼祭法云春祀用棗油即此

生棗氣味甘辛熱無毒多食令人寒熱凡羸瘦者不可食

恩選曰多食令人熱渴膨脹動臟腑損脾元助濕熱

大棗釋名乾棗

別錄曰八月采曝乾瑞曰此即晒乾大棗也

氣味甘平無毒

恩選曰甘辛熱滑無毒采曰温天明

兒尤不宜食又忌與葱同食令人五臟不和與魚同食令人腰腹痛時珍曰今人蒸棗多用糖蜜

拌過久食最損脾助濕熱也咳嗽多令人齒黃生蟲故栝棗養生論云齒虛昏而黃齒處頭而黑

主治心腹邪氣安養脾氣平胃氣通

九竅助十二經補少氣少津液身不足大驚四肢重和百藥久服輕身延年本經 補中益氣散志強力除煩悶瘵心下懸

除腸辟久服不饑神仙別潤心肺止救補五臟治虛損除腸胃癖氣和光粉燒治瘡痢 小兒患秋痢與蛙裏食之良孟說殺烏頭附子天

雄毒才和陰陽調榮衛生津液李景回道家方藥以棗為佳餌其皮利肉補虛所以合湯皆擊之也 棗曰大棗氣味俱厚陽也溫

之氣張仲景治奔豚用大棗滋脾土以平腎氣也治水飲脇痛有十棗湯益土而勝水也震亨曰棗屬土而有火味甘性緩甘先入脾

補脾者未常用甘故令人食甘多者脾必受病也時珍曰素問言棗為脾之果脾病宜食之謂治病和藥棗為脾經血分藥也若無故類

食則生蟲損齒貽言多矣按王好古云中滿者勿食甘甘令人滿故張仲景建中湯心下痞者減棗與甘草同例此得用棗之方矣又

按許叔微本事方云一婦病臟燥悲泣不止祈禱備至予憶古方治此證用大棗湯遂治與服盡劑而愈古人識病治方妙絕如此又陳

自明婦人良方云程虎卿內人妊娠四五箇月遇畫則慘戚悲傷淚下數欠如有所憑醫巫兼治皆無益管伯周說先人曾附方 舊七新

語此治須大棗湯乃愈虎卿借方治樂一投而愈方見下條又摘玄方治此證用紅棗燒存性酒服三錢亦大棗湯變法也附方 十二

調和胃氣以乾棗去核緩火逼燥為末量多少入少 反胃吐食大棗一枚去核用班蝥一枚去頭翅入 小腸氣痛大棗一枚去核用班蝥

包煨熟去殼食棗以桂後口乾咽痛喜唾大棗二十枚烏梅十枚婦人臟氣悲傷欲哭象若神靈數欠者大棗湯主之大棗十

心畢澄茄湯下直指傷寒病 搗入蜜丸含一杏仁嚥汁甚效千金方 女臟氣悲傷欲哭象若神靈數欠者大棗湯主之大棗十

脾壬辰腹痛大紅棗十四枚燒焦為 大便燥塞大棗一枚去核入輕粉半錢縛定 執棗一枚呪曰吾有棗一枚一心歸大道便

氣支女腹痛末以小便服之 梅師煨熟食之仍以棗湯送下 直指呪棗治瘧 他或優降或劈火燒之念七遍吹棗上與病

人食之即愈買悶不眠 大棗十四枚葱白七莖水上氣致嗽 治傷中筋脉急上氣致嗽者用棗二十枚去核以酥四兩微火煎

因咬辛辣熱物致傷者用紅棗連核燒存性百不問音聲香臭者取大棗十五枚去皮核莖麻子三百枚去皮和搗綿裹塞耳

藥煎煨過等分為末每服二錢米飲下三因 暈暈暈日一度三十餘日間聲反香臭也 先治耳後治鼻不可並塞孟說食療

久服香身用大棗肉和桂心白瓜仁松樹 走馬牙疳新棗肉一枚同黃蘗燒焦為末油和 諸瘡久壞不愈者棗膏三升煎 瘡瘻疔痛大肥

皮為丸久服之食療本草 傳之若加砒許更妙王氏博濟 瘡瘻疔痛水頻洗取愈 千金瘡瘻疔痛 棗一

果部

枚剝去皮取水銀掌中以唾研令極熟傅菓瓢上納入下部良外臺下部菓大棗取膏以水銀和捻長二寸以綿裹夜納下部中明日盡皆出也肘後卒急心迷海上方訣云一個烏梅二個棗七枚杏仁一處搗男酒女醋送下之不害心疼

直到食椒開氣京菓食之即解老也 百一選方

三歲陳棗核中仁氣味燻之苦無毒治腹痛邪氣別錄惡氣卒痺孟詵核燒研搽臍瘡良時珍曰按劉根別錄痴人江夏袁仲陽敬事之攻曰今春當有疾可服棗核中仁二十七枚後果大病服之而愈又云常服棗仁百邪不復于也仲陽服之有效則棗果有治邪之說矣又道書云常含棗核治氣令口行津液嚥之佳謝承後漢書亦云孟詵能含棗核不食可至十年也此皆藉棗以生津受氣而嚥之又能達黃宮以交離坎之義耳

葉氣味甘溫微毒別錄曰散服使人瘦久則嘔吐王治覆麻龍令出汗本經和葛粉指執癩瘡良別錄治小兒壯熱煎湯浴之大附方新五日

熱不退用棗葉半搗麻黃半兩葱白豆豉各一合童子小便二鍾煎一鍾分二服取汁 總錄 反胃嘔噦 乾棗葉一兩薑香半兩丁香二錢半每服二錢薑三片水一盞煎服 聖惠方

木心氣味甘溫有小毒王治蠱腹痛胃青黃淋露骨剉取一斛水淹三寸煮至二斗澄清煎五升旦服五合取吐即愈又

煎紅水服之能通經脈時珍 出 小品方

根王治小兒赤丹從脚跌起煎湯頻浴之時珍 出千金附方舊令髮易長取東行棗根三又橫安甌上蒸之兩頭汗出收取傅髮即易長 聖惠方

皮王治高者桑樹皮並取此高者等分燒研每用一合并水煎澄取清洗目一月三洗皆者復明忌葷酒房事時珍

仲思棗宋開釋急棗志曰北齊時有仙人仲思集解大業拾遺記云隋時信都郡獻仲思棗長四寸圍五寸肉肥核小有味勝於

青州棗亦名仙棗觀此則廣志之西王母棗殺城棗皆此類也氣味甘溫無毒治補虛益氣潤五去痰嗽冷氣久服令人肥健好顏色神仙不飢開寶

苦棗食釋名躒世爾雅義未詳真解任良曰苦棗處處有之色青而小味苦不堪人多不能食

實氣味苦大寒無毒治傷寒熱伏在臟腑狂瀉煩滿大小便閉澀取肉炙研和蜜丸服士良

本草綱目果部第二十九卷終

本草綱目果部目錄第三十卷

果之二 山果類三十四種

梨 別錄

鹿梨 圖經

棠梨 綱目

海紅 綱目

木瓜 別錄

檳子 食療

檳榔 圖經

檳榔 開寶

山楂 唐本
即山查

蒼羅果 開寶

柰 別錄

林檎 開寶

柿 別錄

枰柿 開寶

君遷子 拾遺即
牛奶柿

安石榴 別錄

橘 本經

柑 開寶

橙 開寶

柚 日華

枸櫞 圖經
即香緣

金橘 綱目

枇杷 別錄

楊梅 開寶

櫻桃 別錄

山嬰桃 別錄

銀杏 日用
即白果

胡桃 開寶

榛子 開寶

阿月渾子 拾遺

櫛子 拾遺

鈎栗 拾遺

橡實 唐本
即櫛子

榲實 唐本
即榲若

右附方舊五十二新一百七十四

本草綱目

卷三十一

本草綱目果部第三十卷

本草綱目果部第三十卷

果之二 山果類三十四種

梨

別錄名 棠 果宗 乳 蜜

實享曰梨者利也其性下行流利也

景曰梨種味多並皆冷利多食損人故俗人謂之快果不入藥用

集解 頌曰梨處處皆有而種類殊別醫方相承用梨乳為梨乳出宣城皮厚

而肉實其味極長鶯梨河之南北州郡皆有之皮薄而漿多味差短其香則過之其餘水梨消梨紫麻梨亦梨青梨甘棠梨櫻梨梨之類甚多俱不入藥也一種烏梨惟堪靈煮食之止口乾生食不益人冷中又有紫花梨瘰心熱唐武宗有此疾百藥不效青城山那道人以此梨絞汁進之帝疾遂愈復求之不可得常山郡忽有一株因緘封以進帝多食之解煩燥殊效歲久木枯不復有種今人不得而用之矣時珍曰梨樹高二三丈葉光膩有細齒二月開白花如雪六出上已無風則結實必嘉故古語云上已有風梨有靈中秋無月蚌無胎黃思鵬言梨核每顆有十餘子種之惟一子生子梨餘皆生杜此亦一異也杜即棠梨也梨品甚多必須常梨桑樹接過者則結子卑而佳梨有青黃紅紫四色乳梨即雪梨鶯梨即錦梨消梨即香水梨也俱為上品可以治病禦兒梨即玉乳梨之訛或云禦兒一作語兒地名也在蘇州嘉興縣見漢書注其他青皮早殼半斤沙麻諸梨皆粗濇不堪止可蒸煮及切烘為脯爾一種醋梨易水者熟則甜美不損人也昔人言梨皆以常山真定山陽鉅野梁國睢陽臨淄鉅鹿弘農京兆鄴都洛陽為稱蓋好梨多產於北土南方惟宣城者為勝故司馬遷史記云淮北榮南河濟之間十株梨其人與千戶侯等也又魏文帝詔云真定御梨大如拳甘如蜜脆如菱可以解煩釋宿辛氏三秦記云含消梨大如五升器墜地則破須以囊承取之漢武帝常種於上苑此又梨之奇品也物類相感志言梨與蘿蔔相間收藏或剖梨蒂種於蘿蔔上藏之皆可經年不爛今北人每於樹上包置過冬乃摘亦妙

實氣味甘酸寒無毒多食令人寒中養困全瘡乳婦血虛者尤不可食

志曰別本云梨甘寒多食成冷刺桑梨生食冷中不益人

主治 嗽止渴切片貼湯火傷

止痛不爛

蘇 治客熱中風不語治傷寒熱發解丹石熱氣驚邪利大小便

開 除賊風止心煩氣喘狂作疑吐風痰明平暗風不語者生

搗汁頻服胸中痞塞熱結者宜多食之

孟 潤肺涼心消痰降火解瘡毒瘡毒時 珍 發明 宗 輿 曰 梨 多 食 動 脾 少 則 不 及 病 用 梨 者 當 斟酌 惟 病 酒 煩 渴 人 食 之 甚 佳 終 不 能 卻 疾 慎 微 曰 孫 光

惠氣積鬱言人有熱從膈左右起上衝胸滿氣促鬱胃厥者用梨木灰伏出雞卵殼中白皮紫苑麻黃去節等分為末糊丸梧子大每服十九酒下亦可為末服方寸匕或煮湯服 總錄結氣欬逆 三十年者服之

鹿梨 原附梨下 鑿名氣梨詩 毛陽樞爾 時珍曰爾雅云樞羅也其木有紋如羅故名詩云隰有樹樞毛萇注云樞一名 經校正 今分出 亦羅一名山梨一名樹梨今人謂之陽樞陸機詩疏云樞即鹿梨也一名鼠梨 集

解頌曰江寧府信州一種小梨名鹿梨葉如茶根如小梅指彼人取皮治瘡八月采之近處亦有但米實作乾不知入藥也時珍曰山梨 野梨也處處有之梨大如杏可食其本文細密赤者又急白者文緩按陸機云鹿梨齊郡堯山魯國河內皆有人亦種之實似梨而酢 亦有美脆者

實氣味酸溫寒無毒 治瘰疬疔瘡 蘇頌

根皮氣味同 實 治瘡疥煎汁洗之 蘇頌附方 新 一切瘡 鹿梨散用鹿梨根蛇牀子各半斤真剪草四兩硫黃三錢輕粉一錢 為末麻油調傅之小兒塗於絹衣上着之七日不解自愈 仁存方 一切癩疥

根刮皮搗爛醋和麻布包擦之乾者為末以水和搗 唐陸經驗方

棠梨 網釋名 時珍曰爾雅云杜甘棠也赤者棠或云北曰杜杜曰棠 集 時珍曰棠梨野梨也處處山林有之樹似梨而小 或云澀者杜甘者棠杜者澀也棠者館也三說具通末說近是 棠似蒼米葉亦有圓者三義者葉邊皆有鋸齒也 頗黝白二月開白花結實如小楝子大霜後可食其樹接梨甚佳有甘酢亦白二種按陸機詩疏云白棠甘棠也子多酸美而滑亦棠子 濕而酢木理亦亦可作弓材救荒本草云其葉味微苦嫩時燂熟水浸淘淨油益調食或蒸晒代茶其花亦可燂食或晒乾磨麩作燒餅 食以濟飢又楊慎丹鉛錄言尹伯奇采棹花以濟飢注者言棹即山梨乃今棠梨也未知是否

實氣味甘溫寒無毒 治燒食止滑痢 時珍

枝葉氣味同 實 治霍亂吐瀉不止 轉筋腹痛 取一握同木瓜二兩煎汁細呷之 時珍 附方 新 反胃吐食 棠梨葉油炒去刺為末每 旦酒服一錢 山居四要

本草綱目 卷三十 果部

二

一

一

酸溫無毒 思逸曰酸鹹溫滑說曰不可多食損齒及骨

主治濕痺脚氣霍亂大吐下轉筋不止 別錄 治脚氣衝心取嫩者一顆子煎服佳惡節骨下冷氣止嘔

逆心膈痰唾消食止水利後滑不止作飲服之 氣

止吐瀉奔豚及水腫冷熱痢心腹痛 大調營衛助數氣 去濕和胃滋脾益治腹脹

善心下煩痞 發明

原曰木瓜入手足太陰血分氣脫能收氣滯能和引景曰木瓜最善轉筋如轉筋時但呼其名及書上作木瓜字皆愈此理亦不可解俗人柱木瓜杖云利筋脈也宗更曰木瓜得木之正酸能入肝故益筋與血病腰腎脚膝無力皆不可缺也人以鉛霜或胡粉塗之則失酢味且無渣蓋安全之制也時珍曰木瓜所主霍亂吐利轉筋脚氣皆脾胃肝病也肝雖主筋而轉筋則由濕熱寒濕之邪傷脾胃所致故筋轉必起於足胠脚及宗筋皆屬陽明木瓜治轉筋非益筋也理脾而伐肝也土病則全衰而木盛故用酸溫以收脾肺之耗散而藉其先筋以平肝邪乃土中瀉木以助金也木平則土得令而金受陰矣素問云酸走筋筋病無多食酸孟說云多食木瓜損齒及骨皆伐肝之明驗而木瓜入手足太陰為脾肺藥非肝善益可徵矣又鍼經云多食酸令人癢酸入於胃其氣滯以收兩焦之氣不能出入流入胃中下去膀胱胞薄以軟得酸則縮卷約而不通故水道不利而癢滑也羅天益寶鑑云太保劉仲海日食蜜煎木瓜三五枚同伴數人皆病淋疾以問天益天益曰此食酸所致也但登食則已陰之所生本在五味陰之所營傷在五味太過皆能傷人不獨酸也又陸佃埤雅云俗

言梨百損一益楮百益一損故詩云授我以木瓜取其有益也 附方 舊二項強筋急 蓋去瓢沒藥二兩乳香二錢半二味入木瓜內縛

定飯上蒸三四次爛研成膏每用三錢入生地黃汁半盞無灰酒二盞煖化溫服 許叔微云有人患此自午後發發昏時定予謂此必先從足起少陰之筋自足至項前者肝之合今日中至黃昏陽中之陰脈也自離至兌陰旺陽弱之時故靈寶軍法云離至乾腎氣絕而肝氣弱肝腎二臟受邪故發於此時 廣德顧安中患脚氣筋急腫因附丹以足闊一袋上新

子授此及都梁丸服之而愈 本事 脚氣急 用木瓜切片裹盛踏之 覺小痛乃問舟子袋中何物曰宣州木瓜也及歸製木瓜袋用之頓愈 名醫錄 脚筋

攣痛 用木瓜數枚以酒水各半煮爛搗膏乘熱貼於痛處 腳下絞痛 木瓜三片桑葉七片大棗三枚水 小兒疳積 木瓜搗汁服 霍亂轉筋 木瓜

一兩酒一升煎服不飲酒者煮湯 聖惠 霍亂腹痛 木瓜五錢桑皮三片棗肉 四蒸木瓜 治肝腎脾三經氣虛為風寒暑濕相搏流注經絡凡

服仍煎湯浸布裹其足 聖惠 寒壯熱嘔吐自汗霍亂吐利用宣州大木瓜四箇切蓋剝空聽用一箇入黃芪續斷末各半兩于內一箇入蒼朮橘皮末各半兩于內一箇入烏藥黃松節末各半兩于內黃松節即伏神中心木也一箇入威靈仙苦苣蕒末各半兩于內以原蓋封定用酒浸透入甌內蒸熟

本草綱目 卷三十

晒三浸三蒸三晒搗末以榆皮末水和糊丸如梧
子太每服五十九溫酒鹽湯任下 御藥院方 腎臟靈
氣攻腹脇脹滿疼痛用大木瓜三十枚去皮核剝空以甘菊花末青鹽末各
一斤填滿置籠內蒸熟搗成膏入新艾茸二斤搜和丸如梧子大每米飲下

二十九日二髮稿不澤 木瓜浸油梳 木瓜為末以鱗魚身上涎調
聖濟總錄 髮稿不澤 頭 聖惠方 反花瘡瘡 貼之以紙護住 醫林集要 辟除壁虱 以木瓜切片鋪于
席下 懼仙神隱

木瓜核 玉治霍亂煩躁氣急每嚼七粒溫水嚥之 時珍 出聖惠

枝葉皮根 氣味酸澁溫無毒 治著汁飲並止霍亂吐下轉筋癢脚氣 別錄 枝作杖利筋脈根葉著湯淋足可以已屨木材作

桶濯足其益大 蘇頌 枝葉著汁飲治熱痢 時珍 出千金

花玉治面黑粉澤 方見 李花

榧子 音渣 原附木瓜 稗 時珍曰木瓜酸香而性脆木桃酢澀而多 集解 藏器曰榧子生中都似楨梓而小江外
食療 校正 下今分出 釋名 桃和圓子 渣故謂之榧雷公炮炙論和圓子即此也 集解 常為果食北土無之頌曰處處有之孟

州特多弘景曰禮云榧梨鑽之謂鑽去核也鄭玄不識以為梨之不藏者郭璞以為似梨而酢澀古以為果今不入例矣時珍曰榧子乃
木瓜之酢澀者小於木瓜色微黃蒂核皆粗核中之子小圓也按王楙農書云榧似小梨西唐節間多種之味劣於梨與木瓜而入蜜

煮湯則香美過之莊子云榧梨橘柚皆可於口准 氣味酸澁平無毒 說曰多食傷 氣損齒及筋 玉治斷痢 弘景 去惡心咽酸止酒痰黃水 藏
南子云榧梨橘食之則美嗅之則香皆指此也

亂轉弱功與木瓜相近 孟 說

榧榧 音莫渣 原附木瓜 稗 時珍曰本李生於吳越故鄭種通志謂 集解 頌曰榧榧木葉花
宋圖經 校正 下今分出 釋名 榧榧通 榧榧遺 木李 稗 榧榧云俗呼為木梨則榧榧蓋榧榧之訛也 集解 實酷類木瓜但此

木瓜大而黃色辨之惟看蒂間別有重蒂如乳者為木瓜无此則榧榧也可以進酒去痰道家生壓取汁和甘松玄麥末作濕香云甚爽
神也說曰榧榧氣辛香致衣箱中殺蟲辟珍曰榧榧乃木瓜之大而黃色無重蒂者也榧子乃木瓜之短小而味酢澁者也榧榧則榧

類之生於北土者也三物與木瓜皆是一類各種故其形狀功用不甚相遠但木瓜得木之正氣為可貴耳

頭髮白髮赤明 煮汁服治霍亂轉筋吳瑞

椴棹

音溫字。宋開寶

時珍曰椴棹性溫而氣平。釋故名。音字香氣也。

志曰椴棹生北土似椴子而小。頌曰今關陝有之。沙苑出者更佳。其實大抵類椴但膏

須淨去浮毛不爾損人肺花白色亦香最多生蟲少有不蛀者時珍曰椴棹蓋椴椴之類生於北土者故其形狀功用皆相仿佛李珣南海藥錄言關中謂林檎為椴椴按述征記云林檎佳美椴椴微大而狀醜有毛其味香關輔乃有江南甚希觀比則林檎椴椴蓋相似而

二物也李氣味酸甘微溫無毒 十良曰發毒熱秘大小腸聚胸中痰壅濕血脈不宜多食 瑞曰同車養食發疝氣 **主治** 溫中下氣消食除心間酸水去臭辟疫魚開 去胸膈積食實

止渴除煩將卧時噉一兩枚生熟皆宜

蘇頌曰宗爽曰卧時噉此太多亦痞塞胃脫也

主水瀉腸虛煩熱散酒氣並宜生食

李珣

木皮

治楊朱傳瘡

山楮

音渣。唐本草

校正 唐本草木部赤爪木宋圖經外類棗椴子丹溪補遺山楮皆一物也今併於一但以山楮標題

赤爪 則攷切鼠楮唐危本猴楮氏羊楮日

唐本

楮子 音計。並爾雅

求糞梅

本棠椴子圖 山菓食鑑 時珍曰山楮味似楮子故亦名楮世俗皆作查字誤矣查音槎乃水中浮木與楮何關瑛郭註爾雅云杓者爾雅自晉宋以來不知其原但用查杓耳此物生于山原牙林中猴風喜食之故又有諸名也唐本草赤爪木當作赤菓美

菓爪音訛也楮狀似赤菓故爾雅成大虞衡志有赤菓子王琢百選方云山菓紅菓俗名酸棗又名菓漆園正合此義矣

出山南南安陸諸州小樹高五六尺葉似香葉子似虎掌大如小林楨赤色鐵器曰赤爪草即鼠楮楮也生高原棗似小楮而亦人食之

頌曰棠椴子生潞州二月開白花隨便結實采無時彼人用治下痢及腰疼有效他處亦有不入藥用時珍曰赤爪棠椴山楮一物也古方罕用故唐本雖有赤爪後人不知即此也自丹溪朱氏始著山楮之功而後遂為要藥其類有二種皆生山中一種小者山人呼為棠杓子茅楮猴楮可入藥用樹高數尺葉有五尖楸間有刺三月開五出小白花實有赤黃二色肥者如小林楨小者如指頭九月乃熟小

本草綱目 卷三十

兒采而費之聞人取熟者去皮核搗和糖蜜作為糕糕以充果物其核狀如牽牛子黑色甚堅一種大者山人呼為羊
杓子樹高丈餘花葉皆同但實稍大而色黃綠皮澀肉虛為異耳初其酸澀經霜乃可食功應相同而采藥者不收

實修治 時珍曰九月霜後取帶熟者去核曝乾或蒸熟去皮核搗作餅子日乾用氣味酸冷無毒 時珍曰酸甘微溫生食多令人嗜 煩易飢損齒益人尤不宜也 **主治** 煮汁服止水痢沐頭洗身治瘡癩

唐本 **煮汁洗漆瘡多瘰** 治腫痛有效 頌 消食積補脾治小腸疝氣 蘇 兒疳疹 健胃行結氣治婦人產後乾枕痛 靈不盡煎汁入砂

糖服之立效 震 化飲食消肉積瘦瘵飲酒滿吞酸滯血痛脹 時 化血塊氣塊活血 實 發明 震亨曰山楂大能剋化飲食若胃中無食積

脾胃生發之氣也時珍曰凡脾弱食物不化化胸腹酸刺脹悶者於每食後嚼二三枚絕佳但不可多用恐反剋伐也按物類相感志云
煮老雞硬肉入山楂數顆即易爛則其消肉積之功蓋可推矣珍鄰家一小兒因食積黃腫脹腹如鼓偶往羊枕樹下取食之至飽歸而

大吐痰水其病遂愈羊棟乃山楂同類 附方 新 偏墜疝氣 山棠棣肉回香炒各一兩為末糊丸梧子大 每服一百丸空心白湯下 衛生易簡方 老人腰痛 及腿痛用棠棣子鹿茸
醫家不用而有此效則其功應相同矣 附方 六偏墜疝氣 每服一百丸空心白湯下 衛生易簡方 老人腰痛 及腿痛用棠棣子鹿茸

大母服百 丸日二服 腸風下血 用寒藥熱藥及脾弱藥俱不效者獨用山裏果俗名酸棗 每服一百丸空心白湯下 衛生易簡方 老人腰痛 及腿痛用棠棣子鹿茸
珍乾果 危困者用棠棣子為末紫草煎酒調服一錢 全効心鑑 食肉不消 山楂內四兩水煮食之 并飲其汁 簡便方

核 治春之化食腐積治癩 附方 新 難產 山棗核七七粒百草霜 陰賢癩腫 方見 椒欖 為丸酒吞下 海上方

赤爪木 氣味苦寒無毒 治利頭風身痒 唐 本

根 治消積治疔 時 珍

莖葉 治煮汁洗漆瘡 時 珍 出肘後

時珍曰

時珍曰

菴羅果

宋開

釋名摩羅菓

出佛書

香

時珍曰菴羅兒音二合者也菴摩

羅兒音三合者也華言清淨是也

集解

志曰菴羅果樹生若林檎而極大宗晚曰西洛其石

梨之類也其狀似梨先諸熟七夕前後已堪噉

色黃如梨熟透便鬆軟入藥亦布時珍曰按一統志云菴羅果俗名香蓋乃果中極品

種出西域亦奈類也葉似茶葉實似北梨五六月熟多食亦無害今安南諸番亦有之

氣味甘無毒

士良曰酸微寒志曰動風疾凡

大棘子物食

今人患黃病

主治食之止瀉

婦人經脈不通丈夫營衛中血脈不行久令人不飢

士良

天行病及食飽後俱不可食

同

良

良

良

良

良

良

良

良

良

葉主瀉疾煎湯飲

柰

別錄

下品

釋名頻婆

音波

時珍曰蒙文奈字象子綴於木之形

林言謂之平婆今北人亦呼之猶云端好也

集解

不益人士良曰此有三種大而長者為奈圍者為林檎皆夏熟小者味

濕蒸枵秋熟一名楸子時珍曰奈與林檎一類二種也樹實皆似林檎而大西土最多可裁可壓有白亦青三色白者為素奈赤者為丹

奈亦曰朱奈青者為綠奈皆夏熟涼州有冬奈冬熟子帶碧色孔氏六帖言涼州白奈大如兔頭西京雜言記上林苑奈奈大如升枝紫

花青其汁如漆著衣不可洗名脂衣奈此皆異種也郭義恭廣志云西方例多奈家家收切曝乾為脯數十百斛以為蓄積謂之頻婆梨

亦取奈汁為鼓用其法取熟奈納瓮中勿令蠲入六七日待爛以酒醃痛拌令如粥狀下水更拌濾去皮子良久去清汁傾布上以灰在

下引汁盡割開日乾為末調物甘酸得所也劉熙釋名載奈油以奈搗汁塗繒上曝燥取下色如油也今關西人以赤奈楸子取汁塗器

中果乾名果單是矣味甘酸可以饋遠杜恕篤論云日給之花似奈奈實而日給零落虛偽與真實相似也則日給乃奈之不實者而王

義之帖云來禽日給皆囊盛為佳果則又似

指奈為日給矣木槿花亦名日及或同名耳

實氣味苦寒有小毒令人肺癰臃脹有病入尤甚

別錄

○思邈曰酸苦寒瀉無毒

主

治補中焦諸不足氣和脾胃食飽氣壅不通

時珍曰按正要云頻婆甘無毒

主

治補中焦諸不足氣和脾胃食飽氣壅不通

時珍曰按正要云頻婆甘無毒

主

治補中焦諸不足氣和脾胃食飽氣壅不通

時珍曰按正要云頻婆甘無毒

主

治補中焦諸不足氣和脾胃食飽氣壅不通

時珍曰按正要云頻婆甘無毒

主

治補中焦諸不足氣和脾胃食飽氣壅不通

時珍曰按正要云頻婆甘無毒

首擣汁服

孟

益心氣耐飢

生津止渴

正

要

林檎

宋開

實

校正

釋名

文林郎果

林檎

林檎

林檎

林檎

林檎

林檎

林檎

林檎

林檎

林檎

林檎

林檎

林檎

林檎

林檎

林檎

林檎

林檎

林檎

林檎

林檎

林檎

林檎

林檎

林檎

林檎

林檎

林檎

林檎

林檎

林檎

林檎

林檎

林檎

本草綱目 卷三十

禽之名又唐高宗時紀王李謹得五色林禽似朱赤以貢帝大悅賜謹為文林郎人因呼林檎為文林郎果又法

征記云林檎實佳美其椹椹微大而狀醜有毛而香闊輔乃有江南甚布據此則林檎是文林郎非椹椹明矣

開粉紅花子亦如奈而差圓六月七月熟頃曰亦有甘酢二種白者早熟而味脆美酢者差晚須爛熟乃堪噉令醫家乾之入治傷寒藥

謂之林檎散時珍曰林禽即奈之小而圓者其味酢者即檉子也其類有全林檎紅林檎水林檎蜜林檎黑林檎皆以色味之名黑者色

似紫奈有冬月再實者林檎熟時晒乾研末點湯服其美謂之林檎勉僧贊靈物

類相感志云林檎樹生毛虫埋蠶蟻於下或以洗魚水澆之即止皆物性之妙也

氣味甘溫無毒 思邈曰酸苦平溫無毒多食令人百

人好理或生瘡癩閉百 服其子食之令人煩心

煎一升并林檎食 小兒下痢 林檎搗子同杵汁任

之 食醫心鏡 小兒下痢 意服之 子母秘錄 小兒疳癖 頭髮豐黃瘰癧瘦弱者乾林

東行根 治白蠹 蠹蟲消渴好睡 說 五

柿 音士 別 時珍曰柿以弟音澤諧聲也俗作柿 錄中品 釋名 非矣柿音肺削木片也胡名鎮頭迦 似紅柿而圓小皮薄可愛味更甘珍柿色青可生或諸柿食之皆美而益人

集解 志曰林檎隨處有

之樹似奈皆二月

思邈曰酸苦平溫無毒多食令人百

服其子食之令人煩心

小兒疳癖 頭髮豐黃瘰癧瘦弱者乾林

小兒下痢 意服之 子母秘錄 小兒疳癖 頭髮豐黃瘰癧瘦弱者乾林

小兒疳癖 頭髮豐黃瘰癧瘦弱者乾林

小兒疳癖 頭髮豐黃瘰癧瘦弱者乾林

小兒疳癖 頭髮豐黃瘰癧瘦弱者乾林

小兒疳癖 頭髮豐黃瘰癧瘦弱者乾林

小兒疳癖 頭髮豐黃瘰癧瘦弱者乾林

小兒疳癖 頭髮豐黃瘰癧瘦弱者乾林

小兒疳癖 頭髮豐黃瘰癧瘦弱者乾林

酥柿

者曰水藏者性冷益藏者有毒時珍曰酥藏柿也水收益浸之外又有

以熟柿用灰汁漂三四度令汁盡着器中經十餘日即可食治病非宜

柿餅

時珍曰按季氏食經云用糯米洗淨一斗大乾

柿五十箇同搗粉蒸食如乾人煮棗泥和祥之

主治餅及餅與小兒食治秋痢

黃柿和米粉作糗蒸與小兒食止下

痢下血有效

柿蒂氣味澹平無毒治欬逆噦氣煮汁服

發明震亨曰人之陰氣依胃為養土傷則木挾相火直冲清道而土作欬逆古人以

而已時珍曰欬逆者氣自膈下冲脈直上至咽喉作呃忒逆之聲也未眩南陽書以噦為欬逆王履源回集以欬噦為欬逆皆誤矣噦者乾嘔有聲也欬逆有傷寒吐下后及久病產後老人虛人陰氣太虧陽氣暴逆自下焦逆至上焦而不能出者有傷寒失下及平人痰氣抑遏而然者當視其虛實陰陽或溫或補或泄熱或降氣或吐或下可也古方單用柿蒂煮汁飲之取其苦溫能降逆氣也濟生柿蒂散加以丁香生薑之辛熱以開痰散鬱蓋從治之法而昔人亦常用之收効至易水張氏又益以人參治病後虛人欬逆亦有功積丹陳氏三因又加以良薑之類是真以為胃寒而助其邪火者也

木皮至治下血

時

錢兩服可止 湯火瘡燒灰油調傳

根至治崩血

時

枳椇

音單士

釋名漆柿

華

青枳椇

廣

烏枳椇

日

赤枳椇

時珍曰枳椇乃柿之小

而里者故謂之枳椇

他枳椇至熟則黃亦惟此雖熟

亦青黑色搗碎浸汁謂之枳椇

漆可以染扇扇諸物故有漆枳之名

之不入藥用不可與鱗同食

集解

志曰枳椇生江淮以南似柿而青黃潘岳居賦所謂梁侯為枳之枳是也

氣味甘寒澹無毒

時珍曰枳椇生吸性冷服石家宜

主治

壓

壓

壓

壓

丹石藥熱利水解毒膏中熱久食令人寒中
實止煩渴心除腹臙冷熱日華

君遷子

拾遺名極棗千金作棗音牛奶柿名

丁香柿日工監藥

齊民要術○時珍曰君遷之名始見於左肅吳都賦而著其狀于

君遷子似馬奶即今牛奶柿也以形得名崔豹古今注云牛奶柿即極棗葉

如柿子亦如柿而小唐宋諸家不知君遷極棗牛奶柿皆一物故詳證之

柿而葉長但結實小而長狀如牛奶乾熱則紫黑色一種小圓如指頭大者名丁香柿味尤美裁

荒本草以為羊矢兼誤矣其樹接大柿最佳唐志云極棗小柿也服細而厚少核可以供御即此

安石榴

別錄下品釋名著榴唐丹若古今金靈

時珍曰榴者榴也丹實垂垂如整榴也博物志云漢張騫出使西域得塗林安石榴種以

之名義或取此也若木乃扶桑之名榴花丹顏似之故亦有丹若之稱傳玄榴賦所謂灼若旭日栢扶桑者是矣章衡云五代吳越王錢

俶改榴為金靈西陽雜俎言榴甜者名天駝道家書謂榴為三尸酒言三尸虫得此果則醉也故范成大詩云玉池咽清肥三彭迺如掃

集解曰景曰石榴花亦可愛故人多植之尤為外國所重有甘酢二種醫家惟用酢者之根壳榴子乃服食者所忌須曰安石榴本生西

酢者入藥又一種山石榴形類相類而絕小不作房生實青間甚多不入藥但蜜漬以當果甚美亦觀曰石榴有酸淡二種旋開單葉花

旋結實實中紅絲枝甚多秋後經霜則自圻裂一種子白蜜嫩如水晶者味亦甘謂之水乃佳時珍曰榴五月開花有紅黃白三色單葉

者結實千葉者不結實或結亦無子也實有甜酸苦三種抱朴子言苦者出積石山或云即山石榴也西陽雜俎言南詔石榴皮薄如紙

瑣碎錄言河陰石榴名三十八者其中只有三十八子也又南中有四季榴四時開花秋月結實實老綻隨復開花有火石榴赤色如火

海石榴高一二尺即結實皆異種也按事類合璧云榴大如盃赤色有黑斑點皮中如蜂窠有黃膜隔之子形如人齒淺紅色亦有潔白如雪者潘岳賦云榴者天下之奇樹九州之名果千房同牒千子如一櫛亂奏海解醒止醉

甘石榴

氣味甘酸溫無毒多食損人肺

別錄○說曰多食損齒令黑凡服食藥物人忌食之亦宜曰榴者留也其汁酸性滑凝成痰

主治咽喉燥渴

別錄能理乳石毒五說制三

酸榴東行根氣味同治乾白別錄青者入漆鬚治口治齒止瀉帶下功與皮同時珍附方舊三金靈靈味白嚼

黑豆不腥者即是中蠱也石榴根皮煎濃汁服即吐出活蠱光不愈者丹溪摘下方
十白蛇虫酥石榴東引根屋洗判用水三升煎取半盞五更溫服盡至明取下虫一大

子經顯蓋濃煎一盞空心服之未通再服斗門赤白下痢方同

榴花至治隆乾為菜和鐵丹服一年變白髮如漆藏器鐵丹飛鐵為丹也亦鐵粉之屬
子葉者治心熱吐血又研末吹鼻立效亦傳金瘡出

血蘇頰舊一新二金瘡出榴花半斤石灰一升搗和陰乾每鼻出盤酢榴花二錢半黃蜀葵花一錢為末每九竅出血石榴花樣靈之

橘本經志曰有木釋時珍曰橘從商音讀諸聲也又雲五色為慶二色為壽高雲外赤內黃非烟非霧郁集解別錄曰橘柚生江南

恭曰柚之皮厚味甘不似橘皮味辛苦其肉亦如橘有甘有酸酸者名胡柑俗謂橙為柚非矣按郭璞云柚似橙而實酢大於橘孔安

國云小曰橘大曰柚香為柑也頰曰橘柚今江浙荆襄湖嶺皆有之木高一二丈與枳無辨刺出莖間夏初生白花六七月成實至冬黃

熟舊說小為橘大為柚今醫家乃用黃橘膏橘不言柚豈青橘是柚之類乎宗輿曰橘柚自是兩種本草云一名橘皮後人誤加柚字妄

生分別且青橘黃橘治瘰高殊况柚為別種乎惟郭璞所言乃真識橘柚者若不如此分別誤以柚皮為橘皮是貽笑窮之患矣時珍曰

橘柚蘇恭所說甚是蘇頌不知青橘即橘之未黃者乃以為柚誤矣夫橘柚柑三者相類而不同橘實小其瓣味微酢其皮薄而紅味辛

而苦柑大於橘其瓣味甘其皮稍厚而黃味辛而甘柚大小皆如橙其瓣味酢其皮最厚而黃味甘而不甚辛如此分之即不誤矣按事

類合璧云橘樹高丈許枝多生刺其葉兩頭尖綠色光面大寸餘長二寸許四月著小白花甚香結實至冬黃熟大者如盃包中有瓣瓣

中有核也宋翰彥直著橘譜三卷甚詳其畧云柑橘出蘇州台州西出荊州南出閩廣撫州皆不如温州者為上也柑品有八橘品十有四多是接成淮種成者氣味尤勝黃橘扁小而多香露乃橘之上品也朱橘小而色赤如火綠橘細碧不待霜後色味已佳陸冬采之生

橘見氣其果實多周禮言橘踰淮而自變為枳地氣然也餘見柑下

橘實氣味甘酸溫無毒

弘景曰食之多痰恐非益也原曰多食戀腸生痰滯肺氣 瑞曰同榜蟬食令人患軟瘰

主治甘者潤肺酸者聚痰

止消渴開胃除胸中脹氣大明發明

時珍曰橘皮下氣消痰其肉生痰飲飲表裏之真如此凡物皆然今人以蜜煎橘充果食甚佳亦可醬漬也

黃橘皮

釋名紅皮

陳皮

食療曰橘皮療氣大勝以東橘為好西江者不如須陳久者為良好古曰橘皮以色紅日久者為佳故曰紅皮陳皮去白者曰橘紅也

修治饒白凡使勿用桔皮皺子皮二件用不得凡修事須

去白膜一重到細以鯉魚皮裹宿至明取用字乘曰本草橘柚作一條蓋傳誤也後世不知以柚皮為橘皮是貽無窮之患矣此乃六陳之一天下日用所須今人又多以乳柑皮亂之不可不擇也相皮不甚苦橘皮極苦至熟亦苦或以皮之繁瘦分別又因方土不同亦互有繁瘦也時珍曰橘皮紋細色紅而薄內多筋脈其味苦辛柑皮紋粗色黃而厚內多白膜其味辛甘柚皮最厚而虛紋更粗色黃內多膜無筋其味甘多辛少但以此別之則不差矣橘皮性溫柑皮性冷不可不知今天下多以廣中來者為勝江西者次之然亦多以相皮雜之相皮猶可用柚皮則懸絕矣凡橘皮入和中理胃藥則留白入下氣消痰藥則去白且說出於聖濟經去白者以白湯入盪洗潤透刮去筋膜晒乾用亦有者焙者各隨本方

穀久服去真下氣通神

本經

下氣止嘔效治衝胸中吐逆霍亂療脾不能消穀止洩除勝脫留熱停水起淋利小便去寸白蟲別錄清痰涎

治上氣欬嗽開胃主氣痢破癥瘕瘰癧

甄權

權療瘰癧噦反胃噎雜時吐清水痰痞瘕瘻大腸閉塞婦人乳癰入食料解魚腥毒時珍發明

味厚陽中之陰也可升可降為脾肺二經氣分藥留白則補脾胃去白則理肺氣同白木則補脾胃同甘草則補肺獨用則瀉肺損脾其體輕浮一能導胸中塞邪二破滯氣三益脾胃如青皮減半用之去滯氣推陳致新但多用久服能損元氣也原曰橘皮能散能瀉能溫能補能和化痰治嗽順氣理中調脾快膈通五淋療酒病其功當在諸藥之上時珍曰橘皮若能泄能燥辛能散溫能和其治百病總是取其理氣燥濕之功同補藥則補同瀉藥則瀉同升藥則升同降藥則降脾乃元氣之母肺乃攝氣之藩故橘皮為二經氣分之藥但隨所配而補瀉升降也潔古張氏云陳皮枳殼利其氣而致自下蓋此義也同杏仁治大腸氣悶同桃仁治大腸血悶皆取其通義也詳見杏仁下按方勺泊宅編云橘皮寬膈降氣消痰飲極有殊功他藥貴新惟此貴陳外莫莫強中令豐城時得疾只食已軀胸滿不下百方

不效偶家人合橘紅湯因取膏之似相宜連日飲之一日忽覺胸中有物墜下大驚目瞪自汗如雨須臾腹痛下數塊如鐵彈子莫不可聞自此胸次廓然其疾頓愈蓋脾之冷積也其方用橘皮去穢一斤甘草鹽花各四兩水五椀慢火煮乾焙研為末白湯點服名二賢散治一切痰氣特驗世醫徒知半夏南星之屬何足以語此哉珍按二賢散丹溪附方舊七新週下九治濕痰因火泛上停滯胸膈欬唾稠變之為潤下丸用治痰氣有效惟氣實人服之相宜氣不足者不宜用之也

化水淹過煮乾粉甘草二兩去皮蜜炙各取淨末煎中丸治脾氣不和冷氣客於中壅遏不通是為脹滿用橘皮四兩白木二兩煎餅和丸梧桐子大每服百丸白湯下丹溪方

治男女傷寒并一切雜病嘔噦手足逆冷者用橘皮四兩生薑一兩水二升煎一升徐徐呷之即止仲景方

服之再生廣陳皮去白五錢真檀香五錢水二盞煎一盞時時溫服出百一選方

聖惠用陳橘皮末二錢湯點服不醒者灌之仍燒磚沃醋布裹磚安心下熨之便活反胃吐食真橘皮以日照西壁土炒香為末每服二服

服直卒然食噎橘皮一兩湯浸去瓢焙為末以水諸氣呃噎橘皮二兩去瓢水一升煎五合頓服或加口殼尤良孫尚藥方痰膈氣脹陳皮三錢水煎熱服楊氏簡便方卒然失聲

橘皮半兩水煎經年氣嗽橘皮神翅生薑焙乾等分為末蒸餅和丸梧子大每服三五十九食化食消痰胸中熱氣用橘皮半兩微煎下徐呷肘後方

焦冷氣乾陳橘皮一斤為末蜜丸梧子大每食前溫酒下三十九食療本草脚氣衝心或心下結硬腹中虛冷陳皮一斤和杏仁五兩去皮共熬少為末水煎代茶細呷心鏡

腸闕塞陳皮連白酒煮焙研末每以途中心痛橘皮去白煎湯飲之甚良談望翁方食魚鱗毒方同上

渣再煮至一盞頓服取吐乃吐痰脾寒諸瘧不拘老少婦孺只兩服便止真橘皮去白切生薑自然汁浸過一指銀器內重湯煮乾聖藥也不吐加瓜蒂末摘立方

瘡瘦久服消食和氣長肌肉用陳橘皮一兩黃連以米泔水浸一日一兩半研末入麝三分用猪膽威藥以漿水煮熟取出用粟米飯和丸綠豆大每服一二十九米飲下錢氏小兒方

通此張不愚方產後吹奶陳皮一兩甘草一錢水煎服即散婦人乳瘻未成者即散已成者即潰痛不可忍者即不疼神驗不可云喻也用真陳橘皮湯也

張氏
許為末日慘名立効散
即下
聖惠方
破甲作病
不能行履者
漫而陳皮湯浸良久
肉內自離
輕手剪去
以虎骨末傅之
即安
醫林集要

青橘皮時珍曰青橘皮乃橘之未黃而青色者薄而光其氣方烈今人多以小柑小柚小橙為之不可不慎辨之入藥以湯浸去麩切片醋拌瓦炒過用
氣味苦溫無毒
治氣滯下食破積結

及膈氣頌曰破堅癖散滯氣下焦諸濕治左脇肝經積氣
治胸膈氣逆脇痛小腹疝氣消乳腫疏肝胆滯肺氣時珍曰青橘皮
降陰也入厥陰少陽經治肝膽之病
果曰青皮及足厥陰引經之藥能引食入太陰之倉破滯削堅昏治在下之病有滯氣則破滯死滯

氣則損真氣好古曰陳皮治高青皮治低與枳壳治胸膈枳實治心下同意
震亨曰青皮乃肝膽二經氣分藥故人多怒有滯氣脇下有鬱積或小腹疝疾用之以疏通二經行其氣也若二經實者當先補而後用之又云疏肝氣如青皮炒黑則入血分也
時珍曰青橘皮古死用者至宋時醫家始用之
其色青氣烈味苦而辛治之以醋所謂肝欲散急食辛以散之以酸泄之以苦降之也
陳皮浮而升入脾肺氣分青皮沈而降入肝膽氣分一體二用物理自然也
小兒消積多用青皮最能發汗有汗者不可用說出
附方
舊一快膈湯治冷膈氣楊仁齋直指方人罕知之
嘉謨曰久瘧熱甚必結癖塊宜多服清脾湯內有青皮疏利肝邪則癖自不結也
新七快膈湯及酒食後飽滿用青橘皮一斤作四分四兩用益湯浸四兩用白沸湯浸四兩用醋浸四兩用酒浸各三日取出去白切絲以益一兩炒微焦研末每用二錢以茶末五分水煎溫服亦可點服
理脾快氣
青橘皮一斤日乾焙研末甘草末一二錢入益少
常服安神調氣消食解酒益胃不拘老人小兒宋仁宗每食後嚼數片乃邢和璞真人所獻名萬年草劉跂改許曰湯點服
名延年草仁宗以賜呂丞相用青皮一斤浸去苦味去瓢煉淨白益花五兩炙甘草六兩船茴香四兩甜水一斗者之不住攪勿令著底候水盡慢火焙乾勿令焦去甘草茴香只取青皮密收用
王氏易簡方瘧疾寒熱酒服一錢隨時再服
聖惠方傷寒呃逆
盤聞四鄰四花青皮全者研末後氣逆
青橘皮為末葱白童子小兒乳高
因久積憂鬱乳房內有核如指頭不痛不痒五七年成瘻名乳高不可治
時耳出汁
青皮燒研末綿包塞
唇燥生瘡
青皮燒研末豬脂調塗

橘瓢上筋膜至治渴吐酒炒熟煎湯飲甚効
大明

包塞
唇燥生瘡
青皮燒研末豬脂調塗

後氣逆
青橘皮為末葱白童子小兒乳高
因久積憂鬱乳房內有核如指頭不痛不痒五七年成瘻名乳高不可治
時耳出汁
青皮燒研末綿包塞
唇燥生瘡
青皮燒研末豬脂調塗

後氣逆
青橘皮為末葱白童子小兒乳高
因久積憂鬱乳房內有核如指頭不痛不痒五七年成瘻名乳高不可治
時耳出汁
青皮燒研末綿包塞
唇燥生瘡
青皮燒研末豬脂調塗

後氣逆
青橘皮為末葱白童子小兒乳高
因久積憂鬱乳房內有核如指頭不痛不痒五七年成瘻名乳高不可治
時耳出汁
青皮燒研末綿包塞
唇燥生瘡
青皮燒研末豬脂調塗

後氣逆
青橘皮為末葱白童子小兒乳高
因久積憂鬱乳房內有核如指頭不痛不痒五七年成瘻名乳高不可治
時耳出汁
青皮燒研末綿包塞
唇燥生瘡
青皮燒研末豬脂調塗

後氣逆
青橘皮為末葱白童子小兒乳高
因久積憂鬱乳房內有核如指頭不痛不痒五七年成瘻名乳高不可治
時耳出汁
青皮燒研末綿包塞
唇燥生瘡
青皮燒研末豬脂調塗

後氣逆
青橘皮為末葱白童子小兒乳高
因久積憂鬱乳房內有核如指頭不痛不痒五七年成瘻名乳高不可治
時耳出汁
青皮燒研末綿包塞
唇燥生瘡
青皮燒研末豬脂調塗

後氣逆
青橘皮為末葱白童子小兒乳高
因久積憂鬱乳房內有核如指頭不痛不痒五七年成瘻名乳高不可治
時耳出汁
青皮燒研末綿包塞
唇燥生瘡
青皮燒研末豬脂調塗

後氣逆
青橘皮為末葱白童子小兒乳高
因久積憂鬱乳房內有核如指頭不痛不痒五七年成瘻名乳高不可治
時耳出汁
青皮燒研末綿包塞
唇燥生瘡
青皮燒研末豬脂調塗

橘核 修治時珍曰凡用須以新瓦焙香去殼取仁研碎入藥 **氣味辛無毒** 治腎痠腰痛膀胱氣痛腎冷炒研每溫酒服一錢或酒煎服之 明治酒瘰風

梟炒研每服一錢胡桃肉一箇 搗酒服以知為度宗 **小腸疝氣及陰核腫痛** 炒研五錢老酒煎服或酒糊丸服甚效時珍曰橘核入足厥

陰與青皮同功故治腰痛瘰疔在下之病不獨取象於核也和劑局方治諸疝痛附方 新發疝痛 橘核杜仲各二兩炒研末每及內癢卵腫偏墜或硬如石或腫至潰有橘核丸用之有效品味頗多詳見本方 **附方** 一腰痛 橘核杜仲各二兩炒研末每

葉氣味苦平無毒 治遺精逆氣入厥陰行肝氣消腫散毒乳癰腸痛用之行經附方 新發疝痛 吐血服血即愈 經驗良方

柑 采蘭 **釋名** 朱奴志曰柑未經霜時酸霜後甚甜故名柑子時珍曰漢李衡種柑于武陵洲上號為木奴馬 **集解** 頌曰乳柑出西戎者佳志曰柑生嶺南及江南樹似橘實亦似橘而有沙柑青柑體性相類 蘇器曰柑有朱柑黃柑乳柑石柑沙柑橘有朱橘乳橘橘山橘黃淡於此輩皮皆去氣調中實俱堪食就中以乳柑為上也時珍曰柑南方果也而閩廣溫台蘇撫荆州為盛川蜀雖有不及之其樹無異於橘但刺少耳柑皮比橘色黃而稍厚理稍粗而味不苦橘可久留柑易腐敗柑樹畏冰雪橘樹喜可此柑橘之異也柑橘皮今人多混用不可不辨詳見橘下按韓彥植橘譜云乳柑出温州諸邑惟泥山者為最以其味似乳酪故名彼人呼為真柑似以他柑為假矣其木婆娑其葉纖長其花香韻其實圓正膚理如澤蠟其大六七寸其皮薄而味珍脈不粘瓣食不留滓一顆僅二三核亦有全无者譬之香霧噴人為柑中絕品也生枝柑形不圓色青

膚相味帶微酸留之枝間可耐久也俟味變甘乃帶葉折故名海紅柑樹小而顆粒大有圓及尺者皮厚色紅可久藏今獅頭柑亦是其類也洞庭柑種出洞庭山皮細味美其熟最早也甜柑類洞庭而大每顆必八瓣不待霜而黃也木柑類洞庭膚粗碩瓣大而少液故謂之木也宋柑類洞庭而大色絕嬌紅其味酸人不重之饅頭柑近蒂起如饅頭味甜美也

氣味甘大寒無毒 日

治利腸胃中熱毒解丹石止暴瀉利小便 開 **附方** 一難產 柑橘陰乾燒存性研末溫酒服二錢 集效

皮氣味辛其無毒 時珍曰橘皮若辛溫柑皮辛甘寒外形雖似而氣味不同說曰多食令肺燥 **治下氣調中** 藏 **解酒毒及酒渴去白焙研末點湯入盞飲之** 大 **治產後**

肌浮為菜酒服 需 **傷寒飲食復者濃煎汁服** 時 **山柑皮治咽喉痛** 開

本堂綱目 卷三十 果部

核圭治疔毒高藥

蘇頌

葉圭治聾耳流水或膿血取嫩頭七箇入水數滴杵取汁滴之即愈

顏氏

橙

宋開寶

釋名金穰

鵝殼

時珍曰按陸佃埋雅云橙柚屬也

集解

志曰橙樹似橘而葉大其形圓大於橘而香皮厚而皺八月熟時珍曰橙之大者早黃難留橙乃橘屬之大者晚熟耐久皆有大小二種按事類合璧云橙樹高不其類橘亦有刺其實大者如盤頗似朱欒經霜

早熟色黃皮厚感如沸香氣郁其皮可以熏衣可以皂鮮可以和道鹽可以為醬蜜可以蜜煎可以糖製為橙丁可以蜜制為橙膏喫之則香食之則美誠佳果也宗鏡曰橙皮今以此為果或合湯待賓未見入藥宿酒未解者食之速醒
氣味酸寒無毒
王良曰暖多食傷肝氣發虛熱與豬肉同食發頭旋惡
時珍曰積乃水蠶之屬也諸家本草皆作檳榔誤矣
主治洗去酸

汁切和鹽蜜煎成能食止惡心能去胃中浮風惡氣
開寶行風氣療癰氣發瘰癧殺魚蠅毒

良

皮氣味苦辛溫無毒
治醬醋香美助腸胃氣消食下氣香中浮風氣
開寶和鹽貯食止惡心解酒病
糖作橙丁甘美消痰下

氣利腸寬中解酒
時珍附方
香橙湯
寬中快氣消酒用橙皮二斤切片生薑五兩切焙搗爛入炙草甘末一兩檀香末半兩和作小餅每嚼一餅沸湯入鹽送下
奇效良方
痔瘡腫痛
隔年風乾橙子桶內燒煙熏之神効

方摘

核圭治面黧粉刺濕研夜塗之
時珍附方
閃挫腰痛
橙子核炒研酒服三錢即愈
攝生方

柚

音又

釋名

檨條

與柚同

雅

壹柑

唐本

其性

朱欒

時珍曰柚色油然其狀如白故名壹亦象形今人呼其黃而小者為蜜甯正此意也其大

者謂之朱欒亦取團欒之象最大者謂之香欒爾雅謂之檨音廢又曰檨音賈廣雅謂之

集解

為柚非矣按呂氏春秋云果之美者江浦之橘雲夢之柚郭璞云柚出江南似橙而實酢大

錫柚錫亦壺也桂海志謂之臭柚皆一物但以大小古今方言稱呼不同耳

如橘為貢云揚州厥包橘柚孔安國云小曰橘大曰柚皆為柑也嶺南中外嶺外江南皆有柚比橘黃白色而大襄唐間柚色青黃而實小其味皆酢皮厚不堪入藥時珍曰柚樹葉皆似橙其實有大小二種小者如柑如橙大者如瓜如升有圍及尺餘者亦橙之類也今人呼為朱欒形色圓正都類柑橙但皮厚而粗其味甘其氣臭其瓣堅而酸惡不可食其花甚香南人種其核長成以接柑橘云其良也蓋橙乃橘屬故其皮皺厚而香味苦而辛柚乃柑屬故其皮粗厚而臭味甘而辛如此分柚與橙橘自明矣郭璞云檮大柚也實大如蓋皮厚二三寸子似枳食之少味范成大云廣南菓柚大如瓜可食其皮其厚染墨打碑可代篋刷且不損紙也列子云吳越之間有木焉其名為櫟碧樹而冬青實丹而味酸食其皮汁已慎厥之疾波淮而北化而為枳此言地氣之不同如此

主治消食解酒毒治飲酒人口氣去腸胃中惡氣瘴疔婦不思食口淡

皮氣味甘辛平無毒

時珍曰按沈括筆談云本草言橘皮苦柚皮甘誤矣柚皮極苦不可入口甘者乃橙也此說似與今柚不同乃沈氏自誤也不可為據

主治下氣寬食不入藥

慎之氣化痰

時珍

附方新 一疲氣欬嗽用香藥去核切砂餅內浸酒封固一夜煮爛蜜拌勻時時含咽

葉主治頭風痛同葱白搗貼太陽

時珍

花主治蒸麻油作香澤脂長髮潤燥

時珍

枸櫞

音短員。宋圖經

椀

原附其意。下今分此。釋名香椀。俗作

佛手柑

時珍曰義未詳。佛手取象也。

集解

藏器曰枸櫞生嶺南柑橘之屬也其葉大其蓋實大如盂味辛。今閩廣江南皆有之彼人呼為香椀子形長如小瓜。

狀其皮若橙而光澤可愛肉甚厚白如蘿蔔而鬆虛雖味短而香芬芳大勝置衣箱中則數日香不散奇至北方人其貴重古作五和稱用之時珍曰枸櫞產閩廣間木似朱欒而葉長枝間有刺植之近水乃生其實狀如人手有指俗呼為佛手柑有長一尺四五寸者皮如橙袖而厚皺而光澤其色如瓜生綠熟黃其核細其味不甚佳而清香製人南人雕鏤花鳥蜜煎果食置之几案亦可供玩實若安半片於蒂而以濕紙圍護經久不腐或搗蒜卷其蒂上則香更充溢異物忘云浸汁浣葛紀勝似酸漿也

皮氣味辛酸無毒

弘景曰性溫熱曰性冷。說誤矣藏器曰性溫不冷。

主治下氣除心頭痰水

藏器 煮酒飲治痰氣欬前湯治心氣痛

時珍

本草綱目 卷三十一

根葉(三)治高皮橘

金橘釋名金柑橘盧橘漢夏橘廣州山橘北戶給客橙魏王花木志時珍曰此橘生時青盧色黃熟則如金故有金橘盧橘之名盧

馬相如上林賦云盧橘夏熟枇杷然柿以二物並列則非一物明矣此橘夏冬集解時珍曰金橘生吳越江浙川廣間或言出營造者為相繼故云夏熟而裝淵廣州志謂之夏橘給客橙者其芬香如橙可供給客也

月開白花結實秋冬黃熟大者徑寸小者如指頭形長而皮堅肌理細瑩生則深綠色熟乃黃如金其味酸甘而芳香可愛穠茂蜜刺皆佳按魏王花木志云蜀之成都臨邛江源諸處有給客橙一名盧橘以橘而非若柚而香夏冬花實常相繼或如彈丸或如櫻桃通歲食之又劉桐嶺表錄云山橘子大如土瓜次如彈丸小樹綠葉夏結冬熟金色薄皮而味酸偏能破氣容廣人連枝藏之入醃醋尤加香美

聲彥相橘譜云金柑出江西北人不識景枯中始至汴都因溫成皇后嗜之價遂貴重藏綠豆中可經時不變蓋橘性熱豆性涼也又有山金柑一名山金橘俗名金豆木高尺許實如櫻桃內止一核俱可氣味甘溫無毒治下氣快膈止渴解醒辟臭皮尤佳時珍

蜜清香味清美已上諸說皆指今之金橘但有一類數種之異耳

枇杷別錄深奧曰其葉形似琵琶故名集解頌曰琵琶舊不着所出州土今襄漢吳蜀嶺南江西湖南北皆有之木高大餘肥枝長葉大如鹽杏微有毛皮肉甚薄核大如茅栗黃褐色四月采葉葉乾用時珍曰按郭義恭廣志云枇杷易種葉微似栗冬花春實其子簇結有毛四月款大者如雞子小者如龍眼白者為上黃者次之無核者名焦子出廣州又楊萬里詩云大葉盤長耳一枝堪滿盃筋支分與核金橘

部無酸頗盡其狀注又選者以枇杷為盧橘誤矣詳金橘

實氣味甘酸平無毒志曰然說曰溫多食發痰熱傷脾同又肉及熟剋食令人患軟黃疾主治渴下氣利肺氣止吐逆止瘧潤五臟明

葉修治恭曰凡用須火炙以布拭去毛不爾射人肺令咳不已或以粟科作刷刷之尤易潔淨數日只果得秤溼葉重一兩乾者三葉重一兩乃為氣足堪用粗布拭去毛以甘草湯洗一遍用綿再拭乾每一兩以酥二錢半塗上更過用時珍曰治胃病以薑汁

塗麥治肺病以氣味葶藶權曰甘微辛弘景曰主治卒嘔不止下氣煮汁服別錄曰弘景曰若不治嘔噦不止婦人產後口乾

蜜水塗足乃良煮汁飲之則小冷

大 明煮汁飲主渴疾治肺氣熱嗽及肺風瘡面上瘡說和胃降氣清熱解毒瘰癧脚氣時珍曰枇杷葉氣薄味厚陽中之陰治肺

降痰順而逆者不逆嘔者不嘔渴者不渴飲者不飲矣索喚曰治肺熱嗽甚有功一婦人患肺熱久嗽身如火炙肌瘦將成勞以
枇杷葉木通欬冬花紫莞杏仁桑白皮各等分大黃減半如常治訖為末蜜丸櫻桃大食後夜臥各含化一丸末終劑而愈矣附方
新

溫病發噤因飲水多者枇杷葉去毛炙丁香根各半
斤水四升煎二升稍飲之 麗安常方 反胃嘔噦枇杷葉去毛炙丁香各一兩二人參二兩聖惠 吐血不止枇杷葉去毛焙研末茶
服一二錢日二 同上

酒瘡毒鼻枇杷葉危子仁等分為末每服面上風瘡方同痔瘡腫痛枇杷葉蜜炙高梅肉焙為末 疔瘡潰爛枇杷葉煎湯
二錢溫酒調下日三服 本草 先以高梅湯洗貼之 集要 洗之 摘玄

花玉治頭風鼻流涕清辛夷等分研末酒服二錢日二服時珍

木白皮主治生嚼咽汁吐逆不下食煮汁冷服尤佳思

楊梅宋開釋名音求枳子時珍曰其形如水楊子而味似梅故名集解志曰楊梅生江南嶺南山谷樹若荔支樹而葉細陰青子形似
藏為果寄至北方時珍曰楊梅樹葉如龍眼及紫瑞香冬月不凋二月開花結實形如枳實子五月熟有紅白紫三種紅勝於白紫勝於
紅顆大而核細益藏蜜漬餠收皆佳東方朔林邑記云邑有楊梅其大如盃盃青時極酸熟則如蜜用以釀酒號為梅香耐甚珍重之寶
靈物類相感志云桑上接楊梅則不酸楊梅樹生癩以甘草釘釘之則
尤管物理之妙也藏器曰張華博物志言地瘴處多生楊梅驗之信然

實氣味酸甘溫毒說曰熱微毒久食令人發熱損齒 及筋忌生葱同食瑞曰發瘡致痰 主治益藏食去痰止嘔噦消食下酒裏作屑臨飲酒時服亦止吐酒開
止

渴和五臟能滌腸胃除煩憤惡氣燒灰服斷下痢甚驗益者常含一枚咽汁利五臟下氣說附方舊一 下痢不止楊梅燒研每米飲服頭
二錢日二服 善濟 豆

瘰癧止楊梅為末以少頭風作痛楊梅為末每食後薄荷茶服二錢或以消風散同煎服或同搗一切損傷止血生肌令無癩痕用益藏
許嘔鼻取嚏妙 末以白梅肉和九彈子大每食後葱茶嚼下一丸 朱氏集驗 楊梅和核搗如泥做成挺子

本草綱目 卷三十 果部

以竹筒收之凡遇破傷研末傳之神聖絕妙經驗方

核仁

治脚氣 時珍曰按王性之揮塵錄云會稽楊梅為天下冠童貫苦脚氣或云楊梅仁可治之即守王癡鏡五十石貴用之而愈取仁法以枋漆拌核暴之則自裂出也

樹皮及根

主治 煎湯洗惡瘡疥癬煎水漱牙痛服之解砒毒燒灰油調塗湯火傷

附方 新中砒毒 心腹絞痛欲吐不吐面青肢冷用楊梅樹皮煎

湯二三盞服之即愈 王頌易簡方

風鼻痛

普濟方用楊梅根皮厚者焙一兩川芎錢麝香少許研末每用半錢鼻內噴之口中含水涎出痛止○摘要方用楊梅根皮非菜根厨案上油泥等分搗勻貼於兩腮上半時長其虫從眼角出也屢用有效之方

櫻桃

別錄 上品釋名 櫻桃 禮注 合桃 月并桃 類皆取其形相似耳禮記春天子以合桃薦宗廟即此故王維詩云總是癡園春薦後非關御苑

鳥銜殘葉中不甚用時珍曰其類如櫻珠故謂之櫻而許慎作鶯桃云鶯所食故又陰先百果熟故古人多貴之其實熟時深紅色者謂之朱櫻紫色皮裏有細黃點者謂之紫櫻味最珍重又有正黃明者謂之蠟櫻小而紅者謂之櫻珠味皆不及極大者有若彈丸核細而肉厚尤難得時珍曰櫻桃樹不甚高春初開白花繁華如雪葉圍有火及細齒結子一枝數十顆三月熟時須守護否則鳥食無遺也益藏藥煎皆可或同蜜搗作餅食唐人以酪薦食之林洪山家清供云櫻桃經雨則蠹自内生人莫之見用水浸良久則蠹皆出乃可食也試之果然

之立發李廷飛曰傷筋骨取血氣有寒熱病人不可食 **主治** 調中益脾氣令人好顏色美志 別錄 止洩精水殺痢 發明 宗奭曰小兒食之過多无不作熱此果三月也 震亨曰櫻桃屬火性大熱而發淫盛有熱病及喘嗽者得之立病且有死者也時珍曰按張子和儒門事親云舞水一富家有二子好食紫櫻每日咳一二升半月後長者發肺痿幼者發肺癰相繼而死嗚呼百果之生所以養人非欲害人富貴之家縱其嗜欲取死是何天耶命耶邵堯夫詩云爽口物多終作疾真格言哉觀此則寇家二氏之言益可證矣王維詩云飽食不須愁內熱大官還有應聚寒蓋謂寒物同食猶可解其熱也

氣味甘熱瀆無毒 大明曰平微毒多食令人吐說曰食多先損但發虛熱且有暗風人不可食食

葉氣味甘平無毒 煮老後 易軟熟 **主治** 咬搗汁飲并傳之 錄

錄 末四月初熟得正陽之氣先諸果熟故性熱

一富家有二子好

食紫櫻每日咳一二升半月後長者發肺痿幼者發肺癰相繼而死嗚呼百果之生所以養人非欲害人富貴之家縱其嗜欲取死是何

天耶命耶邵堯夫詩云爽口物多終作疾真格言哉觀此則寇家二氏之言益可證矣王維詩云飽食不須愁內熱大官還有應聚寒蓋謂寒物同食猶可解其熱也

易軟熟 **主治** 咬搗汁飲并傳之 錄

東行根主治煮汁服下寸白 虬蟲大

枝主治雀卵斑野同紫萍牙皂梅肉研和日用洗面時珍

花主治面黑粉澤方見李花

山嬰桃

別錄 唐本退入有名

釋名 朱桃 別錄

麥櫻 音

苦 苦 錄

李桃 說曰此嬰桃俗名李桃又名

奈桃前櫻桃名櫻非桃也

集解

別錄曰嬰桃實大如桃多毛四

月米陰乾江景曰櫻桃即今朱

櫻可煮食者嬰桃形相似而實飛真山間時有之方藥不同時珍曰樹如朱嬰但葉長共不圍子小而共生青熟黃亦不光澤而味惡不堪食

實氣味辛平無毒主治洩腸解熱調中益脾氣令人好顏色孟 別錄 止洩精 孟

銀杏

釋名 白果 用鴨脚子

時珍 曰原生江南葉似鴨掌因名鴨脚宋初始入貢改呼銀杏因其形似小杏而核色白也

今名白果梅堯臣詩鴨脚類錄李且名因葉高歐陽修詩綠囊初入貢銀杏貴中州是矣

集解

時珍曰銀杏生江南

以宣城者為勝樹高二三丈葉蓬縱理儼如鴨掌形有刻缺面綠背淡二月開花成簇青白色二更開花隨即知落人罕見之一枝結子

百十狀如棗子經霜乃熟爛去肉取核為果其核兩頭共三核為雄二核為雌其仁嫩時綠色久則黃須雌雄同種其樹相望乃結實或

雌樹臨水亦可或鑿一孔內雄木一塊泥之亦結陰陽相感之妙如此其樹耐久肌理

白膩術家取刻符印云能召使也文選吳都賦注平仲果其實如銀未知即此果否

時珍曰銀杏宋初始

核仁氣味甘平治無毒時珍曰熟食小苦微甘性溫有小毒多食令人臃脹喘日多

肺氣喘嗽縮小便止白濁

食壅氣動風小兒多食昏霍發驚引疳同鱧魚食患軟風

去

去

去

去

去

去

去

收近時方藥亦時用之其飛薄味性溫而收色白屬金故能入肺經益肺氣定喘嗽縮小便主搗能浣油膩則去痰瀉之功可類推矣其夜夜開人不得見蓋陰毒之物故又能殺蟲消毒然食多則收令大過令人氣壅臃脹昏頓故物類相感言銀杏能醉人而三元延

壽書言白果食滿千箇者死又云昔有
餓者同以白果代飯飽次日皆死也附方新十
寒嗽痰喘白果七箇煨熟以熟艾作七丸每果八
錢半煎八分卧時服 又金陵一鋪治哮喘白果定喘湯服之無不効者其人以此起家其方用白果二十一箇炒黃麻黃三錢蘇子二
錢款冬花法制半夏桑白皮蜜炙各二錢杏仁去皮共黃芩微炒各一錢甘草一錢水三鍾煎二鍾隨時分作二服不用薑 並攝生
方 白果仁四兩白伏苓桑白皮二兩烏豆半升沙蜜半斤煮熟日乾為末以乳汁
效嗽失聲 半盞拌溼九蒸丸晒丸如綠豆大每服三五丸白湯下神効 余居士方 小便頻數 白果十四枚七生
十枚槓水飲日 赤白帶下 元虛僂白果蓮肉江米各五錢胡椒一錢羊為末用腸風下血 銀杏煨熟出火腸風腫毒 銀杏四十九枚去
一服取効止 高骨雞一隻去腸風藥瓦器煮爛空心食之 集解方 腸風下血 氣食之米飲下 腸風腫毒 壳生研入百藥煎
末和丸彈子大每服二三丸空心細嚼米飲送下 戴原禮證治要訣 牙齒齲 生銀杏每食後嚼一
生白果仁切斷頻擦 下部疔瘡 生白果杵塗 手足皸裂 生白果嚼爛 鼻面酒瘡 銀杏酒醉糟同嚼爛夜
取効 邵氏經驗方 趙原陽陰風作痒 者白果仁嚼細頻擦之取効 劉長春方 狗咬成瘡 白果仁嚼 乳瘡潰爛 銀杏
以四兩研酒服之以四 水疔色黃麻木不痛暗疔瘡凸色紅使人昏任並先刺 普濟方

胡桃 宋開 釋名 桃 名物 桃 頌曰此果本出羌胡漢時張騫使西域始得種還植之秦中漸及東土故名之時珍曰此果 集解 頌曰胡
土今陝洛間甚多大株厚葉多陰實亦有房秋久熟時米之出陳倉者薄皮多肌出陰平者大而皮肥急捉則碎汴州雖有而實不佳江
表亦時有之南方則無時珍曰胡桃樹高丈許春初生葉長四五寸微似大青葉兩兩相對頗作惡氣三月開花如栗花穗蒼黃色結實
至秋如青桃狀熟時溫爛皮肉取核為果人多以樺柳接之按劉向嶺表錄云南方有山胡
桃底平如檳榔皮厚而大堅多肉少穰其壳甚厚須椎之方破然則南方亦有但不佳耳

核仁氣味平溫無毒 頌曰性熱不可多食魚翅曰甘冷滑多食動痰飲令人惡心吐水吐食 發明 震亨曰胡桃屬土而有火性熱
動風脫人眉非熱何以傷肺耶時珍曰胡桃仁味甘氣熱皮瀋肉潤孫真人言其冷滑誤矣近世醫方用治痰氣喘嗽醋心及癘風諸病
而酒家住住醉後嗜之則食多吐水吐食脫眉及酒同食咯血之說亦未必盡然也但胡桃性熱能入腎肺性虛寒者宜之而痰水積熱

胡桃 宋開 釋名 桃 名物 桃 頌曰此果本出羌胡漢時張騫使西域始得種還植之秦中漸及東土故名之時珍曰此果 集解 頌曰胡
土今陝洛間甚多大株厚葉多陰實亦有房秋久熟時米之出陳倉者薄皮多肌出陰平者大而皮肥急捉則碎汴州雖有而實不佳江
表亦時有之南方則無時珍曰胡桃樹高丈許春初生葉長四五寸微似大青葉兩兩相對頗作惡氣三月開花如栗花穗蒼黃色結實
至秋如青桃狀熟時溫爛皮肉取核為果人多以樺柳接之按劉向嶺表錄云南方有山胡
桃底平如檳榔皮厚而大堅多肉少穰其壳甚厚須椎之方破然則南方亦有但不佳耳

核仁氣味平溫無毒 頌曰性熱不可多食魚翅曰甘冷滑多食動痰飲令人惡心吐水吐食 發明 震亨曰胡桃屬土而有火性熱
動風脫人眉非熱何以傷肺耶時珍曰胡桃仁味甘氣熱皮瀋肉潤孫真人言其冷滑誤矣近世醫方用治痰氣喘嗽醋心及癘風諸病
而酒家住住醉後嗜之則食多吐水吐食脫眉及酒同食咯血之說亦未必盡然也但胡桃性熱能入腎肺性虛寒者宜之而痰水積熱

核仁氣味平溫無毒 頌曰性熱不可多食魚翅曰甘冷滑多食動痰飲令人惡心吐水吐食 發明 震亨曰胡桃屬土而有火性熱
動風脫人眉非熱何以傷肺耶時珍曰胡桃仁味甘氣熱皮瀋肉潤孫真人言其冷滑誤矣近世醫方用治痰氣喘嗽醋心及癘風諸病
而酒家住住醉後嗜之則食多吐水吐食脫眉及酒同食咯血之說亦未必盡然也但胡桃性熱能入腎肺性虛寒者宜之而痰水積熱

核仁氣味平溫無毒 頌曰性熱不可多食魚翅曰甘冷滑多食動痰飲令人惡心吐水吐食 發明 震亨曰胡桃屬土而有火性熱
動風脫人眉非熱何以傷肺耶時珍曰胡桃仁味甘氣熱皮瀋肉潤孫真人言其冷滑誤矣近世醫方用治痰氣喘嗽醋心及癘風諸病
而酒家住住醉後嗜之則食多吐水吐食脫眉及酒同食咯血之說亦未必盡然也但胡桃性熱能入腎肺性虛寒者宜之而痰水積熱

核仁氣味平溫無毒 頌曰性熱不可多食魚翅曰甘冷滑多食動痰飲令人惡心吐水吐食 發明 震亨曰胡桃屬土而有火性熱
動風脫人眉非熱何以傷肺耶時珍曰胡桃仁味甘氣熱皮瀋肉潤孫真人言其冷滑誤矣近世醫方用治痰氣喘嗽醋心及癘風諸病
而酒家住住醉後嗜之則食多吐水吐食脫眉及酒同食咯血之說亦未必盡然也但胡桃性熱能入腎肺性虛寒者宜之而痰水積熱

核仁氣味平溫無毒 頌曰性熱不可多食魚翅曰甘冷滑多食動痰飲令人惡心吐水吐食 發明 震亨曰胡桃屬土而有火性熱
動風脫人眉非熱何以傷肺耶時珍曰胡桃仁味甘氣熱皮瀋肉潤孫真人言其冷滑誤矣近世醫方用治痰氣喘嗽醋心及癘風諸病
而酒家住住醉後嗜之則食多吐水吐食脫眉及酒同食咯血之說亦未必盡然也但胡桃性熱能入腎肺性虛寒者宜之而痰水積熱

核仁氣味平溫無毒 頌曰性熱不可多食魚翅曰甘冷滑多食動痰飲令人惡心吐水吐食 發明 震亨曰胡桃屬土而有火性熱
動風脫人眉非熱何以傷肺耶時珍曰胡桃仁味甘氣熱皮瀋肉潤孫真人言其冷滑誤矣近世醫方用治痰氣喘嗽醋心及癘風諸病
而酒家住住醉後嗜之則食多吐水吐食脫眉及酒同食咯血之說亦未必盡然也但胡桃性熱能入腎肺性虛寒者宜之而痰水積熱

者不宜多食耳
主治食之令人肥健潤肌豐鬢多食利小便去五痔搗和胡粉搗白鬚鬚孔中則生黑毛煖存性和松脂研傳癩瘡瘡開食

之令人能食通潤血脈骨肉細膩說方治損傷石淋同破故紙蜜丸服補下焦頌補氣養血潤燥化痰益命門利三焦溫肺潤腸治虛

寒喘嗽腰脚重痛心腹疝痛血痢腸風散腫毒發痘瘡制銅毒時

油胡桃氣味辛熱有毒治殺蟲攻毒治瘡腫癩風疥癬楊梅白禿諸瘡潤鬚髮時韓愈曰破故紙屬火能使心包與命門

陰陰惡燥故油以潤之佐破故紙有木火相生之妙故古有云黃藥無知母破故紙無胡桃桃猶水母之無蝦也許珍曰三焦者元氣之別使命門者元氣之本原蓋一原一委也命門指所居之府而名為藏精係胎之物三焦指分治之部而名為出納腐熟之司蓋一以體名

一以用名其體非脂非肉白膜裹之在七節之旁兩腎之間二系者脊下通二腎上通心肺貫屬於腦為生命之原相火之主精氣之府人物皆有之生人生物皆由此出靈樞本臟論已著其厚薄緩結之狀而扁鵲難經不知原委體用之分以右腎為命門謂三焦有名無

狀而高陽生偽撰脉訣永其謬說以誤後人至宋肱南陽活人書陳言三因方論戴起宗脉訣刊誤始著說關之而知之者尚數胡桃仁頗類其狀而外皮水汁皆青黑故能入北方通命門利三焦益氣養血與破故紙同為補下焦腎命之藥夫命門氣與腎通藏精血而惡

燥若腎命不燥精氣內充則飲食自健肌膚光澤腸腑潤而血脈通此胡桃佐補藥有令人肥健能食潤肌豐鬢固精治燥調血之功也命門既通則三焦利故上通于肺而虛寒喘嗽者宜之下通于腎而腰脚虛痛者宜之內而心腹諸痛可止外而瘡腫之毒可散矣洪氏

夷堅志止言胡桃治痰嗽能斂肺蓋不知其為命門三焦之藥也油胡桃有毒傷人咽喉而瘡科取之用其毒也胡桃制銅此又物理之不可曉者洪邁云邁有痰疾因晚對上遣使諭令以胡桃肉三顆生薑三片卧時嚼服即飲湯兩三呷又再嚼桃蓋如前數即卧必愈

邁還玉堂如言服之及日而痰消嗽止又溲陽洪輟幼子病痰喘尺五晝夜不乳食醫以危苦其妻夜夢觀音授方令服人家胡桃湯輕急取新羅人參寸許胡桃肉一枚煎湯一蜺壳許灌之喘即定明日以馮刺去胡桃皮用之喘復作仍連皮用信宿而瘳此方不載書冊

蓋人參定喘胡桃附方舊五新二十八月古法說曰服胡桃不得併食須漸漸食之初日服一顆每五日加一顆至二十顆連皮能斂肺故也

胡桃丸益血補髓強筋壯骨延年明目悅心潤肌能除百病用胡桃仁四兩搗膏入破故紙時胡桃丸治消腎病因房慾無節及

強口舌乾精自溢出或小便赤黃大便燥實或小便大利而不甚渴用胡桃肉白伏苓各四兩附子一枚去皮切片薑汁蛤粉同焙為末蜜丸梧子大每服三十九丸米飲下 普濟方

胡桃肉一升細米煮漿粥一升相和頓服即瘥 崔元亮海上方 風寒無汗 發熱頭痛胡桃肉葱白細茶生薑等分搗爛水一鍾煎七分熱服覆衣取汗 談笠翁方 痰喘咳嗽 方見 老人喘嗽 氣促睡臥不得服此立定胡桃肉去皮杏

仁去皮去生薑各一兩研膏入煉蜜少許和心細嚼一丸人參湯下 普濟方 產後氣喘 胡桃肉人參各一錢 久嗽不止 核桃仁五十箇煮熟去皮人參五兩杏仁三百五九彈子大每臥時嚼一丸薑湯下 普濟方 食物醋心 胡桃爛嚼以生薑湯下 立止 傳信適用方 食酸蕪酸 細嚼胡桃即解 日華子本草 誤吞銅錢 多食胡桃自化出也胡桃與銅錢

臨臥再服 齋大尹方 髮 胡桃仁燒過貝母各等分為散日用之 聖惠 眼目暗昏 四月內取風落小胡桃每日午時食飽以無根水吞下偃臥覺鼻孔中有泥腥氣為度 衛生易簡方 赤痢不止 胡桃仁杵完各七箇皂角不蛀者一服每臨臥時一服二更一服 五更一服荆芥茶下 總錄 鼻崩不止 胡桃肉五十枚燈上燒存性研 急心氣痛 核桃一箇裹于一枚去核夾桃紙裹煨熟以生薑

氣痛 胡桃一枚燒及研末熟酒服之 奇効良方 便毒初起 子和儒門事親用胡桃七箇燒研酒服不過三服見効 楊氏經驗用胡桃三枚夾銅錢一箇食之即愈 魚口毒瘡 端午日午時取樹上青胡桃筐內

一二次有膿自大便出無膿即消二三服平 楊試經驗 一切瘡腫 背癢附骨疽未成膿者胡桃十箇煨熟去壳 內含在瘡上頻換甚効 普濟 痘瘡倒陷 胡桃肉一枚燒存性乾胭脂半錢 研勻胡荽酒調服 儒門事親 小兒頭瘡 久不愈胡桃和皮燈上燒存性益蓋出火毒入 輕粉少許生油調塗一二次愈 保幼大全 酒鼓鼻赤 方見 櫻核 耳出汁 胡桃仁燒研狗膽

塞之 普濟方 傷耳成瘡 出汁者用胡桃杵取油納入 同上 火燒成瘡 胡桃仁燒黑研得 壓撲損 胡桃仁搗和溫酒頭 服便瘥 圖經本草 疥瘡瘡痒 油胡桃一箇雄黃一錢艾葉杵熟一錢搗勻綿包夜臥裏陰裏惡効勿洗

簡方 集

胡桃青皮 氣味苦溫無毒 澀能及烏鼠 志曰仙方取青皮壓油和 唐楊香塗毛髮色如漆也 附方 新 烏鼠髮 胡桃皮科蚪等分搗泥塗之一梁即

黑 總錄用青胡桃三枚和皮搗細

胡桃青皮 氣味苦溫無毒 澀能及烏鼠 志曰仙方取青皮壓油和 唐楊香塗毛髮色如漆也 附方 新 烏鼠髮 胡桃皮科蚪等分搗泥塗之一梁即

入乳汁三盞于銀石器內調勻搽額
髮三五次每日用胡桃油潤之良

瘡瘍風
許合勻先以泔洗後傳之

外臺 **白癩風**

青胡桃皮一箇硫黃一匙
子大研勻日日搽之取効
散甲
胡桃皮

皮至治疥癩春月所皮汁沐頭至黑煎水可搽

開方

新法

胡桃根皮一秤蓮子草十斤切以盛之入水五斗浸一月去渣
淨熬至五斤入芸臺子油一斗慢火煎取五升收之凡用先以

炭及汗洗用油塗之外以牛枹葉包住
絹裹一夜洗云用七日即黑也 總錄

殺至治燒存性入下血崩中藥

榛

宋開 **釋名** 古榛字時珍曰按羅氏爾雅翼云禮記鄭玄注言關中甚多此果關中秦地也榛之從秦蓋取此意左傳云女
實 贊不過榛栗裹修以告虔也則榛有臻至之義以其名告己之虔也古作業從辛從木俗作幸誤矣華音說

集解 志曰榛
生遼東

山谷樹高丈許子如小栗軍行食之當糧中土亦有鄭玄云關中鄜坊甚多類曰桂楊有業業生實大如杏子中仁皮子形色與栗無
異但小耳大明曰新羅榛子肥白最良時珍曰榛樹低小如荆叢生冬末開花如梨花成條下垂長二三寸二月生葉如初生櫻桃葉多
皺大而有細齒及共其實作苞三五相粘一苞一實實如標實下壯上銳生青熟褐其壳厚而堅其仁白而圓大如杏仁亦有皮共然多
空者故顏云十榛九空按陸機詩風云榛有兩種一種大小枝葉皮樹皆如栗而子小形如椰子味亦如栗枝莖可以為燭詩所謂樹之
林栗者也一種高丈餘枝葉如水栗子作胡
桃味遠代上黨其多入留亦易油壞者也

仁氣味平無毒治益氣力實腸胃令人不飢健行

開 **止飢調中開胃甚驗**
大

阿月渾子

拾 **校正**
自木部移入此併
遺 入海藥無名木皮

釋名 胡榛子

拾 **遺無名子**

海 **集解**

賦器曰阿月渾子生西國諸番與胡榛子同樹一歲胡榛子二
歲阿月渾子也補曰按徐表南州記云無名木生嶺南山谷其

實狀若榛子號無名子波
斯家呼為阿月渾子也

仁氣味溫澁無毒治諸痢去冷氣令人肥健

器 **治腰冷陰腎虛痿弱房中術多用之得木香山菜葉良**

李 頌

果部

無名木皮海氣味辛大溫無毒治陰囊濕癢並蘇汁小浴極妙珂

楮子拾原附鈎栗今折出藏器曰楮子生江南皮樹如栗冬月不凋子小於椹子穎曰楮子有苦甜二種治作粉食饑食褐色甚佳時

三四月開白花成穗如粟花結實大如榲子外有小苞霜後苞裂子墜子圓褐而有六大多如菩提子內仁如杏仁生食苦溫煮炒乃帶甘亦可磨粉甜楮子粒小木文細白俗名麩楮苦楮子木大而文粗赤俗名血楮其色黑者名鐵楮按山海經云前山有木其名曰楮郭璞註曰楮子似柞子可食冬月采之木作屋柱棺材難腐也

仁氣味苦溫平無毒時珍曰按正要云酸甘微寒不可多食王治食之不飢令人健行止澹痢破惡血止渴藏

皮葉主治煮汁飲止產婦血藏嫩葉貼腫瘡一日三換良吳

鈎栗拾遺釋名菓蓰拾甜楮子藏瑞曰鈎栗即甜楮子時珍曰鈎楮二集解藏器曰鈎栗生江南山谷木大數圍冬月不凋其子似

仁氣味苦平無毒治食之不飢厚腸胃令人肥健藏

椹實音象唐本草校正移入釋名椹斗說皂斗音應椹杵音許禹錫曰按爾雅云椹杵也又曰椹其實椹杵交註

有椹葉自裏之詩唐風云集子已樹秦風云山有苜椹陸機注云即椹杵也秦人謂之椹徐人謂之杵或謂之椹其子謂之皂亦曰皂斗其壳煮汁可染皂也今京洛河內亦謂之杵蓋五方通語皆一物也時珍曰椹杵木也實名椹斗皂斗謂其斗剝皂斗可以染皂也南人呼皂如杵集解嶺曰椹實椹木子也所在山谷皆有木高二三丈三四月開花黃色八九月結實其實為皂斗椹杵皆有斗而以椹為音相近也集解嶺曰椹實椹木子也所在山谷皆有木高二三丈三四月開花黃色八九月結實其實為皂斗椹杵皆有斗而以椹為

其色淡紫亦有壳但小而不及椹也時珍曰椹有二種一種不結實者其名曰椹其木心赤詩云瑟彼椹杵是也一種結實者其名曰椹其實為椹二者樹小則椹枝大則椹葉其葉如椹葉而文理皆斜向四五月開花如栗花黃色結實如荔枝核而有尖其蒂有斗包其半

不及檉木時珍曰檉有二種一種叢生小者名袍音李見爾雅一種高者名大葉檉樹葉俱似栗長大粗厚冬月凋落三四月開花亦如栗八九月結實似椽子而稍短小其蒂亦有斗其實儂澀味惡荒歲人亦食之其不理粗不及椽木所謂檉櫟之材者指此

仁氣苦溫平無毒治蒸氣作粉溫腸止痢功同椽子時珍

檉若修治頌曰若即葉之名也入藥須微炙令焦**氣味甘苦平無毒**治療痔止血及血痢止渴時珍**活血利小便除面上皴赤**時珍**附方**舊五新三**卒然吐血**

檉葉為末每服二錢水一盞煎七分和滓服簡要濟眾**鼻衄不止**檉葉搗汁一小盞頓服即止**聖惠方****腸風血痔**熱多者尤佳檉葉微炙研末一錢槐花炒研末一錢米飲調服未止再服**寇氏衍義****冷淋莖痛**檉葉研末每服三錢

水一盞葱白七寸煎六分去滓食前溫服日二孩子淋疾檉葉三片煎湯服一雞子壳**螺蛳漏疾**檉葉燒存性研以米泔別浸檉葉取汁洗瘡後及納尿少許於瘡中**聖惠方****鼻上皴皸**出膿血者以泔水煮檉葉取汁洗之拭乾納檉葉後用辛夷細辛杜衡末醋浸一夜傳之千金方


木皮俗名赤龍皮**氣味苦溫無毒**治前服除變漏甚効恭**煎湯洗惡瘡良**能吐瘰癧濕五臟**明止赤白痢腸風下血**時珍**附方**舊四新五**赤**

龍皮湯治諸散爛瘡乳瘡用檉皮乃三升水一斗煮五升升斗煮**肘後肘骨疽瘡**檉皮燒研米飲每服方寸匕**千金方****下部生瘡**檉皮擗皮煮汁熬如飴糖以導下部**肘后方****一切瘰癧**千金

用檉樹北陰白皮三十斤剉以水一石煮一斗去滓煎如飴又取通都廂上雄鼠屎雜罌屎各十四枚燒汁盡研和之納溫酒一升和勻瘦人食五合當有蟲出也崔氏纂要用檉白皮切五升水八升煮令沫盡去滓再煎或膏日服棗許并塗瘡上宜食苜蓿鹽飴以助之

以瘰癧為度**小兒瘰癧**檉樹皮去粗皮切煎湯頻洗之**聖惠方****蠱毒下血**檉木北陰白皮一大握長五寸以水三升煮取一升空腹分服即吐毒出也**赤白久痢**不拘大人小兒用新檉皮一斤去黑皮切以水一斗煎取五升去滓煎膏和酒

久痢不止檉白皮薑汁炙五度一兩乾薑炮羊兩為末每服二錢米飲酒下**聖濟總錄****久瘡不已**檉木皮一尺闊六寸切以水一斗煮取五升八白沙鶴十挺煎取一升分三服即吐而愈肘后方



子
三
五
念
學
法
文

L 6931-6

1888

v. 26-30