

V. 2

劉河間傷寒三書

上海千頃堂
書局發行

2

Treatment of Pulmonary
Tuberculosis etc.

By Liu Ho Kan.

Copy of an ancient
work in Chinese,
ca 1340 A.D.

Shanghai, 1968.

Vol. II

[D.]

1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

黃帝素問宣明論方卷之六

傷寒方

河間 劉守真撰集 新安 吳勉學同校

抵當湯

治傷寒日深。表證乃其蓄熱下焦。脉微沉不結胸。發狂者。小腹痛而硬。小便自和者。瘀血證也。小便不和無血也。或陽明蓄熱內甚而喜忘。或狂大便雖硬而反易其色黑者。有蓄血也。無表裏證。但發熱日深。脉雖浮者。亦可下之。或已下後。脉數胃熱消穀善飢。數日不大便。有瘀血也。

桃仁七箇

大黃一分

水蛭炒 蠶蟲各十箇去翅足炒

右剉如麻豆大。分作二服。水一盞。煮半盞。絞去滓。溫服。未下再服。

抵當丸

治傷寒有熱。小腹滿。小便不利者。為有血也。當下之。不可餘藥。

桃仁八箇

大黃一分

水蛭炒 蠶蟲各七箇依前炒

右為末。蜜和作二丸。用水一小盞。煮一丸。至六分。溫服。醉時血未下再服。

大承氣湯

治表裏俱熱。病勢更甚者。陽明脉遲。汗出不惡寒。身重頭眩。半睡半醒。謂如見鬼狀。劇者。發則不識人。循衣摸牀。惕而不安。微喘。直視。陽明裏熱極甚。或吐下後不解。大便五六日。至十餘日。日晡潮熱。心胃燥熱。而懊惱。復如瘧狀。脉沉實。或小便不利。大便乍難乍易。喘冒不能卧。或腹滿實痛。煩渴譫妄。脉實數而沉。裏熱燥甚。腸胃悞鬱。留飲不散。胸腹高起。痛不可忍。但嘔冷液。

大渴反不能飲。強飲不能止。喘急悶者。

大黃半兩

芒硝半兩 厚朴半兩 枳實半兩

右剉如麻豆大。分半水一盞。半生薑三片。煎至六分內。縮硝煎去滓服。

小承氣湯

治傷寒日深。恐有燥屎。腹中轉矢。乃可攻之。不轉矢者。必初硬後溏。未可攻之。攻之則腹滿不能食。飲水而噤。其後發熱。大便復硬。若腹大滿不通。或陽明多汗。津液外出。腸胃躁熱。大

便必硬而謔語。脉滑吐下微煩。小便數。大便結。或下利謔語。自得病二三日。脉弱無太陽證。柴胡證煩心。心下結至四五日。雖能食。少少與承氣湯和之。今小安。

大黃 半兩 厚朴 三錢 枳實 三錢

右剉如麻豆大分作二服水一盞生薑三片煎至半盞絞汁服未利再服

調胃承氣湯

治諸發汗和解不惡寒但發熱者或日深心下溫溫欲吐胸中痛大便溼。腹滿鬱鬱微煩。先此時吐下者。或日深裏熱謔語。法當下之。以銀粉巴豆燥熱大毒丸藥下之。致真陰損虛邪熱轉甚因而協熱下利不止及表裏熱下之太早乘虛而入不成結胸。但為熱利不止滿鞭或痛煩渴咽乾脉滑數而實諸腹滿實痛者煩渴謔妄小便赤大便鞭脉滑實駁。

大黃 芒硝 甘草 各等

右剉如麻豆大分一半水一大盞煎至半盞絞去滓內硝煎不利再煎服

三一承氣湯

治傷寒雜病內外所傷日數遠近腹滿咽乾煩渴謔妄心下按之硬痛小便赤澀大便結滯或濕熱內甚而為滑泄熱甚喘咳悶亂驚悸狂顛目疼口瘡舌腫喉痺癰瘍陽明胃熱發斑脉沉可下者小兒熱極風驚門搖須喘昏塞并斑疹黑陷小便不通腹滿欲死或斑疹後熱不退久不作痲或作斑紋瘡癬久不已者怫熱內成疹癰堅積黃瘦痛疾久新卒暴心痛風痰酒隔腸垢精滯久壅風熱暴傷酒食煩心悶亂脉數沉實或腎水陰虛陽熱獨甚而僵仆卒中一切暴音不語失名蓄熱內甚陽厥極深脉反沉細欲絕或表之冲和正氣與邪熱并之於裏則裏熱亢極陽極似陰反為寒戰脉微而絕或風熱燥甚客於下焦而大小便澀滯不通者或產婦死胎不下及兩感表裏熱其須可下者。

大黃 半兩 芒硝 半兩 厚朴 半兩 枳實 半兩 甘草 一兩

右剉如麻豆大水一盞半生薑三片煎至七分內硝煎二服去滓服

十棗湯 治太陽中風下利嘔逆短氣不惡寒熱熱汗出發作有時頭痛心下痞硬引下痛兼下水腫腹脹并酒食積脹垢積滯疔癖堅積畜熱暴痛瘧氣久不已或表之正氣與邪熱并甚於裏熱極似陰反寒戰表氣入裏陽厥極深脉微而絕并風熱燥甚結於下焦大小便不通實熱腰痛及小兒熱結乳癖積熱作發驚風潮搐斑疹熱毒不能了絕者

大戟

芫花 慢火炒變色仲景鄉俗異語云甘遂各等炒作煎下凡言然者皆乾炒也

右為末水一大盞棗十枚切開煮取汁半盞調半錢已實人每一錢

茵陳湯 治陽明裏熱極甚煩渴熱鬱留飲不散以致濕熱相搏而身發黃疸但頭汗出身無汗小便不利渴引水漿身心發黃宜茵陳湯謂黃利大小便

茵陳蒿 一名茵陳 大黃 半兩 大梔子 七箇色深堅實好者稍小者用十箇

右剉如麻豆大水二盞半慢火煮至一盞絞汁溫服以利為度甚者再作當下如爛魚肚及膿血膠膠等物及小便多出金色如兒莢汁或見證將發黃此一劑分作四服調五苓散三錢凡治發黃者無越此法妙

桂苓甘露散 一名桂苓白朮散 治傷寒中暑胃風飲食中外一切所傷傳受濕熱內甚頭痛口乾吐瀉煩渴不利間小便赤澀大便秘急痛濕熱霍亂吐下腹滿痛悶及小兒吐瀉驚風

茯苓 去皮 甘草 炙 白朮 半兩澤瀉一兩 官桂 半兩 石膏 二兩 寒水石 二兩 滑石 四兩 猪苓 半兩

右為末每服三錢溫湯調下新水亦得生薑湯尤良小兒每服一錢同上法 此藥下神金丸止瀉痢無不驗也并

解內外諸邪所傷濕熱又一方却 不用猪苓或曰三服不計時候

梔子蘘皮湯 治頭微汗小便利而微發黃者濕熱相搏微者宜服

黃蘗 半兩 甘草 一分 大梔子 十五個

右剉如麻豆大水三盞煎至一盞絞汁分次作一日溫服之

宣月論方 卷六

二

梔子湯 治懊懷煩心反傷不得眠燥熱怫鬱於內而氣不宣通胸滿痛頭微汗虛煩

大梔子 鈔七箇豆豉半合俗言鹽豉少氣者加甘草一分嘔者誤以丸藥下之者加生薑半兩或用溫湯濯手足使心胸結熱宣通而已

右剉如麻豆大或先以水二盞煮梔子至一盞半內豉煮至半盞絞汁溫服凡加者皆用梔子

凡用梔子湯皆非吐人之藥以其燥熱鬱結之甚而藥頓攻之不能開通則發熱而又吐發開鬱結則氣通津液宣行而已故不道再服也

大陷胸湯 治汗下之後不大便五六日舌乾而渴日晡潮熱從心至小腹脹滿而痛不可近脉當

沉緊滑數或但胸結則無大段熱頭微汗出脉沉滲者水結也

大黃 三錢 芒硝 三錢 甘遂末 三錢

右剉如麻豆大分作二服每服水一盞煎大黃至六分內硝一二沸絞汁調甘遂一字半七溫

服未快利再服執惡不能利以意加服

小陷胸湯 治小結胸心下按之痛脉浮而滑無大段熱表未罷不可下之下之即死小結胸宜服

半夏四錢湯洗全用不剉生薑二錢切黃連二錢栝樓實大者半兩惟剉其殼子則

右以水三盞煮栝樓汁一盞半內藥至一盞絞汁兩次溫服即效

大陷胸丸 治發熱而下之太早熟入因作結胸者項亦強如柔痙狀下之則和也

大黃 半兩 芒硝 一分 杏仁 十二個去皮尖雙仁草灰炒變色 葶藶 三錢微炒

右大黃為末下葶藶杵羅研杏仁硝如泥和彈子大每服一丸入甘遂末三字白蜜半匙水一

盞煮至半盞溫服當一宿許乃下未利再服

梔子厚朴湯 治傷寒下後心煩腹滿坐卧不安者

大梔子 七個 枳實 二錢 厚朴 半兩去皮炙

右剉如麻豆大以水一盞半煮絞汁半盞溫服

檳榔散 治傷寒陰病下之太早成痞心下痞滿而不痛按之軟虛也

檳榔 枳殼 等分

右為末每服三錢煎黃連湯調下不計時候溫服

大黃黃連瀉心湯 治傷寒成病痞不已心腹亦實熱煩滿或譫妄而脉沉無他證者

大黃 黃連 黃芩 生薑 各一分 枳 各一分 法加

右剉如麻豆大水二盞煎至一盞絞汁分三次溫服

黃連解毒湯 治傷寒雜病躁熱毒煩悶乾嘔口燥冷呻喘滿陽厥極深畜熱內甚俗妄傳為陰毒

者及汗下吐後寒涼諸藥不能退熱勢兩感證同法

黃連 去鬚黃蘗 黃芩 大梔子 各半兩

右剉如麻豆大每服秤半兩水一茶盞煎至四分絞去滓溫服或腹滿嘔吐或欲作利者每服

加半夏三箇生厚朴二錢茯苓二錢去用水一盞半生薑三片煎至半盞絞汁溫服名半夏黃

連解毒湯

白虎湯 治傷風自汗桂枝證表未解半斑於裏中暑自汗脉虛弱傷寒自汗脉滑數而實

表裏俱熱三陽合病腹滿身重口燥面垢譫語發黃厥逆自汗和解兩感解頭痛止自汗雜病時

疫未瀉發斑兼豆疱瘡疹伏熱

知母 半兩 甘草 一兩 粳米 一合 石膏 四兩

右剉如麻豆大抄五錢水一盞煎至六分去滓溫服無時候日三四服或眩效嘔者加半夏半

兩紅皮半兩每服生薑三片煎服傷寒發汗不解脉浮者加蒼朮半兩名蒼朮白虎湯 汗吐

下後煩渴口乾脉洪大加人參半兩名人參白虎湯

賈同知已效方

石膏 四兩 知母 一兩 甘草 一兩

劉庭瑞已效方

知母半兩 石膏四兩 粳米一合

崔宣武已效方

知母一兩 石膏三兩 甘草半兩

右為末每服三錢水一盞入粳米二十五粒煎至六分未曾下胃熱發斑兼豆蔻如液虛瘦加人參半兩白朮半兩頭痛加川芎荆芥各三錢咳嗽加半夏三錢桔梗一兩恍惚加人參三錢

茯苓半兩

涼膈散一名連翹散治傷寒表不解半入於裏下證未全下後燥熱佛結於內煩心慎懼不得眠亦有加減法

藏府積熱煩渴頭昏唇焦咽燥喉閉口亦煩渴口舌生瘡欬唾稠粘謔語狂妄陽胃燥溢便溺澀

結風熱壅滯瘡癬發斑驚風熱極黑陷將死

連翹一兩 山梔子半兩 大黃半兩 薄荷葉半兩 黃芩半兩 甘草一兩 半朴硝一分

右為末每服二錢水一盞蜜少許同煎至七分去滓溫服虛實加減咽喉痛涎嗽加桔梗一兩

芥穗半兩而嘔者加半夏半兩薑三片同煎血衄嘔血加當歸兩半藥兩半生地黃兩半淋者加滑石兩

茯苓一兩風眩加芎兩半石膏三兩防風兩半酒毒加葛根一兩芥穗兩半赤芍藥兩半川芎兩半防風兩半桔梗半兩三歲兒可服七八錢或無熱甚黑陷腹滿喘急小便赤

梗半兩而將死者狀○服更加大防風湯為以下之得和者直效凡言加者皆自本方加也以上

之減退表裏熱加益元散效速

人參石膏湯 治傷寒咳嗽不已心煩及風熱頭痛精神不利愒憤宜服

人參半錢 石膏三兩 芎半兩 半夏二錢 白朮半兩 茯苓半兩 甘草一兩 大梔子錢 知母半兩

黃芩三錢

右為末每服一錢水一盞生薑三片煎至六分去滓溫服

崔宣明人參石膏湯 治傷寒頭痛心煩悶風熱并汗後餘熱自汗多清頭目定喘嗽

人參半錢 石膏 一兩 川芎 一兩 黃芩 二錢 茯苓 三錢 甘草 半兩 防風 三錢

右為細末每服五錢水一盞半煎至六分去滓溫服不計時候

雙解散 治風寒暑濕飢飽勞役內外諸邪所傷無問自汗汗後雜病但覺不快便可通解得愈小

兒生瘡疹使利出快亦能氣通宣而愈

益元散七兩 防風通聖散七兩

右二藥一處相和名為雙解散益元散方在痢門通聖散方在風門各七兩攪勻每服三錢水

一盞半入葱白五寸鹽豉五十粒生薑三片煎至一盞溫服

白朮散 治傷寒雜病一切吐瀉吐瀉煩渴霍亂虛損氣弱保養衰老及治酒積嘔噦

白朮 茯苓去皮 人參各半兩 甘草半兩 木香 一分 藿香半兩 葛根 一兩

右為末白湯調下二錢煩渴者加滑石二兩甚者加薑汁續飲之

四逆湯 治傷寒表熱未入裏誤以寒藥下之太早表熱不已入裏寒下利不止因表熱裏寒自利

急以溫裏利止又治少陰病脉沉下利厥逆煩渴嘔吐

甘草一錢 乾薑 一分 附子半箇生去皮臍附子以半兩者佳小者力弱大者性惡非古方之宜也不但以美其大者要知古人之有則也

右剉如麻豆大水二盞煎至一盞絞汁溫服或畜熱深極而手足厥冷者不宜此方當以下之

茯苓半夏湯 治傷寒雜病一切嘔吐或喘咳痰痞痞滿頭痛者

茯苓去皮 半夏一分 生薑一分 取汁

一方加 黃芩去蘗 甘草一分 紅皮去穢

治風痰 右剉如麻豆大水一盞煎至四分絞勻下生薑汁溫服不計時候

黃帝素問宣明論方卷之七

積聚論

河間 劉守真撰集 新安 吳勉學校正

素問曰積聚留飲。痞隔中滿。濕積霍亂吐下。痠癥堅硬。腹滿皆太陰濕土乃脾胃之氣積聚之根也。
積者不聚者不化留者不行飲者停滯痞者不通隔者阻斯疾迺五臟六腑陰陽變化興衰之制也。元則害承迺極則反矣。

謂水得燥則消散而得濕則不消乃為積飲也。謂人形精神與榮衛血氣津液出入流通謂夫腠理閉密乃為痞也。謂腸胃隔絕傳化失常而乃滯也。土主形體腹滿於中央乃曰中滿以傳化失度故甚則霍亂吐瀉也。癥者腹中主硬按之應手然水體柔順而今乃堅硬如此者元則害承乃制也。瘕者中雖硬而忽聚忽散無其常故其病未及癥也。經曰血不流而滯故血內凝而乃瘕也。

小腸移熱於大腸乃為虛瘕。大腸移熱於小腸謂兩熱相搏則血溢而為伏瘕。血溢不利月事沉滯結不行故行為虛瘕。謂虛與伏同。瘕與疝同為傳寫誤也。世傳冷病然瘕病亦有熱或陽氣鬱結怫熱壅滯而堅硬不消者世傳為寒瘕瘕也。或堅痞腹滿急痛。寒主筋縮故急主痛寒極血凝泣而反兼土化制之故堅痞之腹滿或熱鬱於內而腹滿堅結痛不可忍者皆可為寒誤矣。誤矣。

何不以脈證辨之。凡諸疾病皆有陰陽寒熱宜推詳之。五臟六腑四季皆有積聚。心之積名曰伏梁在於臍上大如臂。上至於心橫於心下。如屋梁故曰伏梁。肝之積名曰貫。音貫氣在左脇下。覆如杯有頭足久不愈令人疼癢。脾之積名曰痞氣在胃脘。覆大如杯久不愈令人四肢不收發黃。疸食不為膚肌。肺之積名曰息貫結在右脇下。覆大如杯久不愈令人灑淅寒熱喘咳發為肺癰。腎之積名曰贛。音軌在於小腹。上至心下如狹贛走往來無定久不愈令人喘逆發為骨痿少氣之力。

此為五藏之積也常究斯義未可悉也。

傳其所勝者死傳不勝者可治假令肺病傳肝肝病傳脾脾病傳腎腎病傳心心病傳肺皆傳所勝
五藏之氣虛而內外諸邪所侵故留稽不行遂成積聚其脉沉細而微者是也

木香三稜丸 治一切氣悶胸膈痞滿榮衛不和口吐酸水嘔逆惡心飲食不化肋脇疼痛無問久新

青木香 破故紙 茴香 黑牽牛 甘遂 芫花 大戟 荆三稜 蓬莪朮 川練子

胡蘆薈 芫戟已上各 芭豆油皮不出 陳米三合將芭豆 縮砂仁半兩

右件一十五味用好醋二升除縮砂木香餘藥入醋中浸一宿入鍋煮盡為度乾為細末醋麩

糊和丸如棗豆大每服五七丸食後加減者虛實隨湯水下

導氣枳殼丸 治氣結不散心胸痞痛逆氣上攻分氣逐風功不可述

枳殼去穢 木通剉炒 青皮去皮 陳皮去白 桑白皮炒 蘿蔔子炒 白牽牛炒 黑牽牛炒 莪朮煨

茴香炒 荆三稜煨各

右為末生薑汁打麩糊為丸如桐子大每服二十丸煎橘皮湯下不計時候

透膈寬腸散 治腸上壅實膈熱難行者

白牽牛一兩 芒硝三兩 川大黃二兩 甘遂半兩

右為細末食後溫蜜水調下一錢虛實加減疎動止

密補固真丸 治脾腎真元損虛泄痢痰嗽噦痞水穀酸臭飲食無味臍腹疼痛肢體麻痺下虛痰

厥上實壅滯腎虛耳鳴脾虛困憊耳焦齒槁面鰲身悴目黃口燥髮墮爪退風虛偏枯中滿膈氣

一切脾胃虛證常服補養宣通氣血

天南星半兩 半夏製 神麩 麥蘖 茴香炒 荆三稜炮各一兩 白附子 乾生薑

川烏頭生各一兩 芭豆七箇 牽牛三兩 代赭石二兩 官桂一分

右為末水和丸小豆大每服十丸加至五十丸溫水下除泄瀉外並加大黃一兩

木香丸 治和脾胃。寬胃膈。消痰逆。止嘔吐。進益美飲食。

官桂 乾薑各半 木香 一分 大黃 蓬莪茂 芫花 醋拌濕炒 芫 枳殼 去穢 陳皮各半 半夏二兩

牽牛 半斤 取末 四兩 茴香 炒 兩 芭豆 四箇

右為末。滴水為丸。如小豆大。每服二三十丸。溫水下。

軟金丸 治心胸腰腹急痛。或淋瀝。生產後經病。血刺痛。

當歸 半兩 乾漆 二錢 紅花 一錢 半用 輕粉 硃砂 粉霜各一錢 三稜 二錢

右同研勻。棗肉為膏。和丸。菜豆大。新水下。一丸。病甚者。加得利後減。

泥金丸 治心腹急痛。取久新沉垢積滯。推陳致新。

黃蘗 大黃 芭豆 五靈脂各半 猪牙皂角 一分 輕粉 粉霜 硃砂各一分 乾漆 一分

右研勻。煉蜜拌得所。杵千下。丸。菜豆大。新水下。一丸。未利更加服。

狀元丸 治膈氣。酒膈。酒積。涎嗽。腹痛。吐逆。痞滿。

芭豆五十各 神麩半兩 半夏一兩 雄黃 白麩炒一兩

右研勻。酒水丸。小豆大。細米糠炒。變赤色。食後溫澆汁下。止嘔吐。生薑湯下。

玄胡丸 治積聚癥瘕。解中外諸邪所傷。

玄胡索 青皮去白 陳皮去白 當歸 木香 雄黃別研 荆三稜 生薑各一兩

右為末。酒麩糊為丸。如小豆大。每服五七丸。生薑湯下。

又一方 無陳皮 生薑 有黃芪一兩 檳榔分兩

大延胡索散 治婦人經病。產後腹痛。腹滿喘悶。癥瘕癖塊。及一切心腹暴痛。

延胡索 當歸 芍藥 京三稜 川苦練 蓬莪茂 官桂 厚朴 木香 川芎各一兩

桔梗 黃芩 大黃各半 甘草 一兩 檳榔 二錢

右為麓末每服三錢水一盞煎至六分去滓熱服食前如惡物過多去大黃官桂加黃藥子染槐子龍骨各半兩如前法煎服平人心急痛加本方得利尤良後常服

三稜湯 治癥瘕疔瘕積聚不散堅滿痞膈食不下腹脹

荆三稜 二兩白木一兩蓬莪朮半兩當歸半兩培檳榔 木香三錢

右為末每服三錢沸湯點服食後每日三服

消飲丸 治一切積聚疔瘕氣塊及大小便結胸痛不能仰

天南星 半夏 芫花 自然銅等分生用

右為末醋煮麩糊為丸如桐子大每服五七丸食前溫水下良久葱粥投之相虛實加減

除濕丹 治諸濕客搏腰膝重痛足脛浮腫筋脉緊急津液凝溢便溺不利赤癢疹疽癰發背疥癬

走注脚氣無首尾瘡癩功效不可盡述

檳榔 甘遂 葳靈仙 赤芍藥 澤瀉 葶藶二兩 乳香 沒藥一兩 黑牽牛半兩 大戟二兩 陳皮四兩 白

炒右為末麩糊為丸

如桐子大每服五十丸至七八十丸溫水下後食如服藥前後忌酒一日藥後忌濕麩食溫粥補暖

保安丸 治癥積心腹內結如拳漸上不止捨心疼痛及遠臍腹痛不可忍者

川大黃三兩新水浸一宿 乾薑一兩 大附子半兩去鱗甲一兩半好醋一升

右為末取三年米醋一大升先煎四五合然後和藥丸如桐子大每服十丸至二十九空心醋

或酒米飲下後取積如魚腸膿血爛肉汁青泥當下

開結妙功丸 治佛熱內盛疔瘕堅積腸結癥瘕積聚疼痛脹悶作發有時三焦壅滯二腸閉結胸

悶煩心不得眠咳嗽喘逆不能食或風濕氣兩腿為腫脹黃瘦眼澁昏暗一切所傷心腹暴熱肝

腎燥鬱偏正頭疼筋脉拘攣肢體麻痺走注疼痛頭目昏眩中風偏枯邪氣上逆上實下虛脚膝麻木不通氣血

荆三稜炮茵香各一兩川烏頭四兩神麩 麥芽 大黃各一兩好醋半升熬成稠膏 乾薑 二錢

巴豆二箇破堅半夏半兩桂 二錢 牽牛 三兩

右為末膏丸小豆大生薑湯下十九十五丸溫水冷水亦得或心胃間稍覺藥力煖性却減尤

數以加至快利三五行以意消息病去為度

木香分氣丸 治積滯癖塊不消心腹痞結疼痛搶刺如覆杯狀

陳皮去白檳榔各一兩破故紙炒二兩木香半兩黑牽牛末二兩炒香熟取

右為末滴水為丸如桐子大每服二三十丸生薑湯下食後臨卧服

開胃生薑丸 治中焦不和胃口氣塞水穀不化噎氣不通噎塞痞滿口淡吞酸食時膨脹噉逆惡

心嘔吐痰水宿食不消咳嗽儲肋刺痛寬中開胃進飲食

桂心 一兩 生姜 一斤切作片子鹽 三兩 青皮去白陳皮去白甘草炙各縮砂仁 四十九箇 廣茂

當歸各半

右為末煉蜜為丸如彈子大每服一丸食前細嚼沸湯化下

導滯定功丸 治一切心腹卒暴疼痛及胸中不利消食止逆定疼痛

大椒 木香各一錢蝎硝 三錢 芭豆八個出

右為末後入芭豆霜研勻醋麩糊和丸如菘豆大朱砂為衣每服五丸至十九丸淡醋湯下

積氣丹 治一切新久沉積氣塊面黃黑瘦諸氣無力癥瘕積聚百吐酸水

檳榔去節芫花 一兩 礪砂 二錢 芭豆 二錢 青皮去白陳皮各三錢蓬莪茂 雞爪黃連 京三稜

章柳根 牛膝各一兩肉豆蔻 三錢 大戟 川大黃 甘遂 白牽牛 乾薑 青礪石 乾漆

各半 木香二錢 石菖蒲三錢

右為末。醋麩糊和丸。如桐子大。每服一丸。臨卧燒棗湯下。每夜丸服後。有肚內作聲。病退為度。

金露紫苑丸

治一切脾積。兩肋虛脹。臍疼痛。

草烏頭去皮尖 黃連半兩 官桂 桔梗 乾地黄 乾生姜 川椒 蕪荑 紫苑去皮柴胡

防風 厚朴 甘草 人參 川芎 鱉甲酒浸 貝母 枳殼 甘遂各一 芭豆半兩酒煮

入硃砂三生

右為末。水煮麩糊為丸。如桐子大。每服五丸。空心臨卧。米飲湯下。或微疎動。詳虛實加減。

信香十方青金膏

灌頂法。王子所傳。十二上願云。藥師瑠璃光如來。應當供養。正偏知。明行足喜。

游世間。解無上土。調御丈夫。天人師。

佛世尊。方境授。治周身。中外陰陽不調。氣血壅滯。變生百病。乃至虛羸困倦。偏攻酒食。內傷心腹。

滿。寒急痛。或酒積。食積。癥瘕。瘕積。聚。痲痺。堅積。中滿。膈氣。食臭。酸醋。嘔吐。翻胃。或膈瘳。消中。善食而

瘦。或消渴。多飲而數嘔也。小便利。或腸風下血。痔瘻。冷痛。或胃癰。疹。或偏身癱疽。惡瘡。或瘡毒已

入於裏。腹滿。嘔吐。或成瀉痢。或出惡瘡。疔肉。或下痢。腹痛。或一切風氣。肢體疼痛。及中風偏枯。或

痰逆。生風。痰涎。嗽。兼產後腹痛。及小兒疳疾。諸風潮搖。但平人常服。補養宜行。榮衛調。飲食。

信砒

乳香 輕粉 粉霜 芭豆以上各一 龍腦半字 麝香半字 青黛二錢 同研 黃蠟三錢

右研細末。鎔蠟入蜜。半錢。就搓勻。旋丸。菜豆兩同研。至小豆大。先服小丸。病在上。食後。在下。食前。在中。

不計時候。面東頂禮一丸。淨器盛水送下。如合藥。即淨處面東。每一丸念密呪三遍。或病人不

能呪。請人呪。

或師氏呪過 呪曰

信香十方青金膏。

藥師圓成蜜遍批。

普濟有緣除百病。

仰吞一粒體堅牢。

密呪曰

但言八金剛。莫說十方佛。五蘊六根俱不道。十二上願自然成。

金黃丸

治酒積食積。諸積。面黃疽積。硬塊。

荆三稜

香附子 半兩 澤瀉 半錢 芭豆 四十九粒 出油 黍米粉 牽牛 二錢 半

右為末。用梔子煎湯和丸。如菜豆大。每服三丸。至五丸。如心痛艾醋湯下。七丸。

逆氣丸

治心胸滿悶。脇肋刺痛。不思飲食。常服寬膈。進美飲食。

薑黃 四兩

香附子 四兩

縮砂

甘草 廣茂 各二兩

丁香皮

甘松

木香 荆三稜 各一兩

白檀

半兩 藿香葉 半兩

右為末。入菜豆粉二兩。用湯浸。蒸餅為丸。如桐子大。每服二三十丸。細嚼白湯下。食後日進三服。

丁香散

治疰癖。氣膈下痞滿。息而不消。積而不散。元氣在胃。不妨食者。

好丁香

二十五個

白丁香 七十箇

密陀僧

船上硫黃

黃鶯調 各五分

右為細末。每服一字。梔子煎湯調下。不計時候。治肚内生硬物。黑瘦如柴。嘔吐積滯。日服食後。

聖餅子

治一切沉積。氣脹兩脇。氣滿無問久新者。

大黃 三兩

黑牽牛頭末 一兩

礪砂 三錢

山梔子 半兩

輕粉 二錢

右為末。煉蜜和丸。捻作餅子。如小錢大。厚棹食。後每服三餅子。細嚼溫酒下。臨卧如行粥補之。

虛實加減

無憂散

一名萬病散

治風痰瘡腫。疥癬。或臟腑積冷。壅滯氣結。風勞。膀胱宿冷。臟腑虛衰。面色痿黃。內有

癥癖氣并常者。疳蟲蛻蟲。攻心腹俱痛。忍中傷寒。頭痛不忍。狀若山嵐。時氣瘟疫之疾。並宜急服。

此藥宣通三五。行立瘥。或中風口喎。語多寒澁。睡後口中涎出。不限時節。不問男子女人。但五日

一服。不過三服。永瘥。人患腰膝疼痛。脚氣腫滿。運動艱難。飲食無味。并小兒疳痢。胎胎者。量大小

與服。和三五行自瘥。大人久泄氣痢。狀若休息痢。症有時俱一服取下。冷脹一二升。當日見效。藥無四時冷熱。老幼衣弱病患。悉皆除之。任服他藥無妨。若常服時。蓋緣搜出臟腑中。積滯蟲膿。故也。無孕婦人久患血虛氣弱。痿黃無力者。亦可依方服。宣通氣候。殊不困倦。無妨此藥。凡有百病。並皆治之。其功不可具載。有孕婦人。或遇陰晦時。即不可服。天道晴朗。可進。雖若復疾而未愈者。可再服。

黃耆 木通 桑白皮 陳皮 各一兩 胡椒 白木 木香 合半兩 白牽牛 四兩 炒別

右七味為細末。每服二錢。牽牛末二錢。生薑二錢。切作片子。煎生薑湯一大盞。調藥須臾。又用生薑湯。或溫湯送下。平明可行三五次。快利無妨。如病瘥後。以白粥補之。痊矣。

五積丹 治心腹痞滿嘔吐不止破積聚者

白芩一銖之四尺二寸火燒存性淨盆合 芭豆錢十二箇白麩一兩五
右為末。醋麩糊為丸。菜豆大。每服十九。鹽湯下。食後加減。

黃帝素問宣明論方卷之八

水濕門

河間 劉守真 撰集
新安 吳勉學 校

夫諸濕者。濕為土氣。火熱能土濕也。故夏熱則萬物濕潤。秋涼則濕物燥乾也。濕病本不自生。因生於大熱。沸鬱水液不能宣通。即停滯而生水濕也。凡病濕者。多自熱生。而熱氣尚多。以為兼證云。濕熱亦猶風熱義同。雖病水寒不得宣行。亦能為濕。雖有此異。亦以鮮矣。或跗腫體寒。而有水者。以畜熱入裏極深。非病寒也。

三花神祐丸

治中滿腹脹喘嗽淋悶。一切水濕腫滿。濕熱腸垢。沉積變生疾病。久病不已。黃瘦因倦。氣血壅滯。不得宣通。或風熱燥鬱。肢體麻痺。走注疼痛。風痰涎嗽。頭目旋運。瘧疾不已。癥瘕積聚。堅滿痞悶。酒積食積。一切痰飲嘔逆。及婦人經病不快。帶下淋瀝。無問赤白。并男子婦人傷寒。濕熱腹滿。實痛。久新瘦弱。俗不能辨。別。或汎常只為轉動之藥。兼瀉久新腰痛。并一切下痢。及小兒驚疳積熱。乳癖滿並宜服之。

甘遂

大戟

芫花

醋拌濕炒

牽牛二兩

大黃一兩

為細末

輕粉一錢

右為末。滴水為丸。如小豆大。初服五丸。每服加五丸。溫水下。每日三服。加至快利。利後却常服。病去為度。設病愈後。老弱虛人。平人常服。保養宜通氣血。消進酒食。病癖悶極。甚者便多服。則頓攻不開。轉加痛悶。則初服兩丸。每服加兩丸。至快利為度。以意消息。小兒丸如麻子大。隨強弱增損。三四歲者。三五丸。依前法。

崔宣武神祐丸

加黃柏兩

牽牛四兩

大黃二兩

輕粉二錢

甘遂

大戟

芫花

各一分

依前法

劉庭瑞神祐丸 用此藥治水氣當得効。賈同知稱之不已。乃神仙奇絕之藥也。

葶藶木香散 治濕熱內外甚水腫腹脹小便赤澀大便滑洩。

葶藶 茯苓皮去猪苓皮去白朮各一分木香錢半澤瀉 木通 甘草各半辣桂一分滑石三兩

右為末每服三錢白湯調下食前。此藥下水濕消腫脹止洩瀉利小便。若小便不得通利而

反轉泄者此乃濕熱痞悶極熱而攻之不開是能反為注泄此正氣已衰而多難救也慎不可

攻之而無益耳。

白木木香散 治喘嗽腫滿欲變成水病者不能卧不敢食小便閉者。

白木 木猪苓皮去赤茯苓 甘草 澤瀉各半木香 檳榔錢三陳皮二兩官桂二兩滑石三兩

右為末每服五錢水一盞生薑三片同煎至六分食後去滓溫服。

大橘皮湯 治濕熱內甚心腹脹滿水腫小便不利大便滑洩。

橘皮一兩木香分滑荔枝錢三茯苓去皮木猪苓去皮澤瀉 白朮 官桂各半甘草二錢

右為末每服五錢水一盞生薑五片煎至六分去滓溫服二三日後再服此藥湯

葶藶膏 治水腫腹脹。

牛黃 麝香 龍腦各一昆布 海藻上同二牽牛 桂心各八椒目三分葶藶六分

右為末別搗葶藶熬成膏丸如桐子大每服十丸日再服稍利小便為度詳虛實加減。

茯苓散 治諸般氣腫等疾。

芫花炒澤瀉 郁李仁 甜葶藶 漢防己各二錢陳皮去白白檳榔 瞿麥各半藜蘆二錢

滑石三分大戟分炒三 右為細末每服一錢取桑白皮濃煎湯空心調下。取下碧淥水如爛羊脂即瘥。如未盡隔日又

服腫消如故不用服忌鹽百日。

調胃散 治胸膈痞悶不思飲食脇肋硬痛消腹脹

半夏製 甘草炙 厚朴去皮 陳皮去白 藿香各等

右為末每服一錢生薑三片棗二枚水一盞同煎溫服食前

一氣散 治水氣蠱脹滿

白牽牛 黑牽牛各二錢

右為末用大麥麩四兩同一處為燒餅臨卧用茶湯一杯下降氣為驗

雄黃神金散

雄黃

葶藶一兩用糯米和 澤瀉二兩 椒目二兩 大戟

芫戟去心 茯苓去皮 芫花醋五分 沙

甘遂

桑白皮已上各

右為末從發時加減一分空心用井花水調下每服一錢加至五錢以利為度忌鹽醋生冷毒

物油膩血

從腳腫根在心加葶藶 從肚腫根在腹加目椒 從陰腫根在胸加澤瀉 從膝腫根在肝加芫

花 從面腫根在肺加桑白 從心腫根在肋加雄黃 從肢腫根在脾加甘遂 從口腫根在小

腸加芫戟 從腰腫根在腎加大戟 從四肢腫根在肋加茯苓

萬勝散 治十種水氣不可愈者

海帶 海藻 海蛤 芫花醋浸 甘遂 大戟 甜葶藶 樟柳根 續隨子

芫戟各等分

右為末每服三錢至五錢溫酒調下臨卧問其再服

牽牛丸 治一切濕熱腫滿等疾

黑牽牛 黃苓 大黃 大椒 滑石各等

右為細末酒煮麩糊和丸如桐子大每服五丸至七丸生薑湯下食後虛實加減
梔子蘘皮湯 治頭微汗小便利而微發黃者濕熱相搏微者宜服

大梔子筒十五 黃蘗半兩 甘草一分

右判如麻豆大。水三盞煮至一盞。緩十分三次。作一日服。溫喫。不計時候。

大戰丸 治十腫水氣腫脹喘滿熱寒咳嗽心胸痞悶背項拘急膀胱緊腫於小腹小便不通反轉

大便澹泄不能坐卧

大戟 芫花炒醋 甘遂 海帶 海藻 郁李仁 續隨子各半兩 樟柳根一兩已

為末每料抄藥末十 輕粉錢各一 粉霜錢各一 水銀砂子一皂子大 龍腦半錢

右八味已下同研勻用棗肉為丸如菜豆大每服五丸至七丸龍腦臘茶送下食後臨卧虛實

加減

粉霜丸 治病水鼓滿不食四肢浮腫大小便閉不進飲食

粉霜 硃砂 海蛤 寒水石煨 玄精石 白丁香 頭白麩各一錢 輕粉三錢 海金沙錢一

右研勻着紙裹數重上使麩裹又紙裹冷酒煎了桑柴火燒麩熟為度宿餛餅和丸如桐子大

每服三丸生薑湯下一日三服二日加一丸至六日不加即止以補之妙

苦葶藶丸 治一切水濕氣通身腫滿不可當者

人參二兩 苦葶藶四兩 於鍋內紙上炒黃色為度

右二味同為細末用棗肉和丸如桐子大每服十五丸煎桑白皮湯下日進三服空心食前

此藥恐君子不信試驗之

肉豆蔻丸 治水濕脹如鼓不食者病可下

肉豆蔻 檳榔 輕粉各一黑頭牛一兩半
右為末 麩糊為丸 如菜豆大 每服十丸至一十丸 煎連翹湯下 食後日三服

宣明論方
卷八

黃帝素問宣明論方卷之九

河間 劉守真 撰集
新安 吳勉學 校

痰飲門

痰飲論

夫嗽者五臟皆有嗽皆因內傷脾胃外感風邪皮毛屬肺風寒隨玄府而入湊理開張內外相合先傳腑而入遂成咳嗽迺肺熱也寒化熱熱則生痰喘滿也經云喉中介介如梗狀甚則嗽血也胸滿氣喘痰盛稠粘皆肺氣熱也

大人參半夏丸 治化痰墜涎止咳定喘諸痰不可盡述嘔吐痰逆痰厥頭痛風氣偏正頭疼風壅

頭目昏眩耳鳴鼻塞咽膈不利心腹痞滿筋脉拘倦肢體麻痺疼痛中風偏枯咳唾稠粘肺痿勞

虛人保養宜通氣血調和臟腑進飲食

人參 茯苓去土 天南星 薄荷葉各半兩 半夏 乾生薑 白礬生 寒水石各一兩

蛤粉一兩 藿香葉分

右為末麵糊為丸如小豆大生薑湯下二三十丸食後溫水亦得一法加黃連半兩黃蘗二兩

米丸取効愈妙治病酒調和藏尤宜服之

新添半夏瓜蒌丸 治遠近痰嗽煩喘不止者

半夏製生薑 瓜蒌 杏仁去皮 麻黃 白礬枯 款冬花各等分

右為末生薑汁打麵糊為丸如梧子大每服二十丸煎生薑湯下不計時候

白朮厚朴湯 治痰嘔不散利胸膈除寒熱美飲食

白朮 甘草炙 葛根各錢 厚朴半兩

右件為末。每服一二錢。水一大盞。生薑五片。煎至六分。去滓。食前服。顯仁丸。仙術芎散。大人參

半夏丸

橘皮半夏湯 治痰壅涎嗽。久不已者。常服養液潤燥。解肌熱。止咳嗽。

橘皮半兩 半夏二錢 洗七次

右為末。分作二服。每服水一盞半。入生薑十片。同煎至七分。去滓。溫服。

知母茯苓湯 治肺痿。喘咳不已。往來寒熱。自汗。

茯苓去 甘草略 知母 五味子 人參 薄荷 半夏洗 柴胡 白木 欬冬花

桔梗 麥門冬 黃芩兩 川芎錢 阿膠炒 三錢

右為末。每服三錢。水一盞半。生薑十片。同煎至七分。去滓。稍熱服。

人參潤肺湯 治肺氣不足。喘急咳嗽不已。并傷寒。一頭疼。增寒。增壯熱。四肢疼痛。

人參 桔梗 白芷 麻黃去節 乾葛 白朮 甘草兩 各一 白薑半兩

右為末。每服二錢。水一大盞。生薑三片。葱白二寸。煎至八分。如出汗。連進二服。通口溫服。

杏仁半夏湯 治肺痿。涎喘不定。咳嗽不已。及甚者。往來寒暑。

杏仁去 桔梗 陳皮去 茯苓去 漢防己 白礬桑白皮錢 三薄荷錢 甘草二錢 猪牙皂角錢

右為末。作二服。水二盞。生薑三片。煎至六分。去滓。食後溫服。

防己丸 治肺不足。喘嗽。久不已者。調順氣血。消化痰涎。

防己二錢 杏仁三錢 木香二錢

右為末。煉蜜為丸。如小豆大。每服二十丸。前桑白皮湯下。如大便閉。加葶藶一兩。食後服。

葶藶散 治肺氣喘滿。痰嗽。眠叶不安。不思飲食。

苦葶藶 蛤粉錢 三桑白皮 山梔子 人參 荊芥穗 薄荷葉 赤茯苓去 陳皮 桔梗

杏仁 甘草各半兩

右為末每服三錢水一大盞入生姜三片煎至六分去滓溫服食後

保安半夏丸

治久新諸嗽止上逆涎喘短氣痰鳴咽乾煩渴大小便澀滯肺痿勞劣心腹痞滿急

痛中膈氣上竇下虛酒食積聚不消補養氣血宣行榮衛

半夏兩 天南星各半兩 牽牛兩 大黃半兩 黃藥半兩 蛤粉兩 芭豆四箇

右為末水為丸如小豆大每服十九十五丸溫水下食後日三服孕婦不可服又方無芭豆有

乾薑一錢半

人參保肺湯 治五勞七傷喘氣不接涎痰稠粘骨蒸潮熱

人參 柴胡 當歸 芍藥 桑白皮 知母 白朮 川芎 黃耆 紫苑 荆芥

地骨皮各一分 茯苓去皮 黃芩 連翹 大黃 薄荷各半兩 山 甘草 桔梗各一分 石膏

滑石 寒水石兩半

右為末每服三錢水一盞生薑三片煎至七分去滓溫服泄者去大黃同人參半夏丸服

神應丹 治涎嗽喘滿上攻心腹卒痛及利下血兼婦人帶下病一切肋脇痛滿

薄荷葉 甘草錢四 芭豆燈燒 盆硝各二錢 輕粉二錢 豆豉一兩 五靈脂二兩

右為末煉蜜為丸如桐子大每服一丸溫酒汁下續後空曠律三五次禁飲食少時覺咽喉微

暖効心腹急痛溫酒下二丸末効再服得利尤良帶下以溫酒下二丸或大便流利再服

人參散 治身熱頭痛積熱黃瘦肌熱惡寒畜熱發戰膈熱嘔吐煩渴濕熱瀉利或目赤口瘡咽喉

腫痛或風昏眩虛汗肺痿勞嗽不已者

石膏 甘草各兩 滑石四兩 寒水石二兩 人參半兩

右為末每服二錢溫水調下早晚食後兼服梔子金花丸 一名既濟解毒丸

寧神散 治一切痰嗽不已者。諸藥無效。世傳極驗。

御米囊 一斤生 烏梅 兩四

右為末。每服二三錢。沸湯點常服。食後日三服。

賈同知方 御米殼炒 兩 烏梅肉 兩 依前法服之。康少尹傳。煎烏梅湯尤妙。

桂林白朮丸 治消痰逆。止咳嗽。散痞滿。壅塞。開堅結。痛悶。推進飲食。調和臧腑。無問寒濕。濕熱。嘔吐瀉痢。皆能開發。以令遍身流濕。潤燥。氣液宣平而愈。解酒毒。療肺痿勞嗽。水腫腹漲。泄瀉不能

者。服之。利止為度。隨證調之。

揀桂 乾生薑 各 茯苓 半夏 兩 白朮 紅皮 白澤瀉 各半

右為末。麵糊為丸。如小豆大。生薑湯下。二三十丸。日三服。病在膈上。食後。在下。食前。在中。不計

時候。或一法。更加黃連半兩。黃蘗二兩。水丸。取効愈妙。

潤肺散 治小兒膈熱。咳嗽。痰喘。甚者。久不瘳者。

瓜蔓實 一枚。去子用。

右為末。以寒食麵和為餅子。灸黃為末。每服一錢。溫水化。乳糖下。日三服。効乃止。

又方 治寒嗽 麻黃 四兩 官桂 一兩 蠟 二錢

右為末。以蠟同煎。每服一二錢。溫服。

寧肺散 治一切寒熱。痰盛。久新咳嗽不止者。

御米殼 四兩 木瓜 三兩 御米殼 一處 用蜜 五味子 一兩 人參 一兩 皂角 二兩

右為末。每服二錢。烏梅同煎。臨臥食服。大効。

蟹甲丸 治吐血咳嗽神効。

蟹甲 一箇 九助 柴胡 一兩 酒 杏仁 一兩 童子 甘遂 一兩 人參 半

者 醋炙 黃 浸 一宿 小 便 浸 炒

右為末。煉蜜為丸。如桐子大。每服十九至十五丸。煎生薑湯下。

石膏散 治熱嗽喘甚者

石膏一兩 甘草半兩 炙

右為末。每服三錢。新汲水下。入生薑汁蜜調下。

人參半夏丸 治一切痰飲喘嗽不已

白礬 天南星 半夏各半兩 甘草二錢 人參二錢 赤小豆四十粒 杏仁四十粒 猪牙兒角一錢

右為末。秫米三升。醋一升。熬粥和丸。如桐子大。每服十五丸。炒蘿卜子湯臨卧下。

仙人肢丸 治遠年勞嗽不問寒熱痰涎喘滿。先服松花膏。下過多服此藥無不効。

人參 沙參 玄參 紫團參 丹參 白朮 牡礪 知母 甘草各二錢 蛤蚧一對 頭尾全用河水淨洗

文武火炎 右為末。用麻黃十五斤 去銀枸杞子三斤 熬成膏。丸如彈子大。磁盒子內。威臨卧煎。生薑自然汁化下。丸小兒量數加減。

松花膏 治二三十年勞嗽。預九月間。宣利一切痰涎。肺積喘嗽不効。

防風 乾生薑 野菊花 芫花 枸杞子 甘草 蒼朮 黃精

右為末。取黃精根熬成膏子。和藥末。丸如彈子大。每服細嚼一丸。冷水化下。臨卧不喫夜飯。服藥一粒。

辰砂半夏丸 治小兒肺壅痰竇。咳喘喘急。胸膈痞滿。公煩悶。涎痰不利。呀呷有聲。

半夏半兩 葶藶水研 杏仁各半兩 朱砂五靈脂 微少一兩

右為末。更研勻。生薑汁煮。麪糊為丸。如桐子大。每服十五丸。生薑湯下。

大百勞散 治一切勞疾。肌劣喘息。不卧痰涎不食。

蛤蚧一對 元州鱉甲一箇 附子兩 人參 柴胡 川乾薑 白茯苓去皮 白朮 茴香 青皮

右為末每服二錢水一盞用生薑三片棗二枚烏梅二枚同煎空心稍熱服有汗加小麥二十粒不用鐵煎

小百勞散 治勞喘嗽不已自汗者

御米穀少炒多

右為末每服二錢入烏梅同煎水一盞溫服食後有汗加小麥三十粒同煎溫服

五味子湯 治胸膈痞滿心腹刺痛短氣壅悶咳嗽痰唾嘔逆惡心不思飲食溫中益氣

五味子兩九 良薑半兩 紅皮白茴香各兩 乾薑兩 甘草七兩 鹽一斤

右為細末每服一錢百沸湯點空心食前甚者自進三服

安神散 治遠年近日喘嗽不已

御米穀一兩人參 陳皮去白甘一兩

右為末每服一錢煎烏梅湯調下臨臥服

勞門

白水黃耆散 治五心煩自汗四肢疲劣飲食減少肌瘦昏昧

白木 黃耆 當歸 黃芩 芍藥 石膏 甘草 茯苓 寒水石 酪 官桂 一分

人參 川芎 各三分

右為末每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服食前一日三服

人參白水湯方 在消渴門第一方是也此乃為同不復錄耳

黃連丸 治濕熱流運氣血不通壅滯不散清爽頭目

黃連好者不拘多少

右為末。酒麪糊為丸。如小豆大。每服二十丸。溫水下。不計時候。日三服。必効散。治五勞七傷。勞役肌瘦。不思飲食。喘嗽不已。

川烏頭一兩生 天南星半兩生

右為末。每服二錢。蘿廬八地。如母指大。以水煮熟。去滓。食後服。嚼。

當歸地黃湯。治嗽血。衄血。大小便血。或婦人經候不調。月水過多。喘嗽者。

當歸 芍藥 川芎 白朮 桑槐子 黃藥子各半兩 生地黃 茯苓去皮 黃芩 白龍骨各

一兩 甘草兩

右為末。每服三錢。水一盞。煎至七分。去滓。溫服。食前。

紫苑散。治勞體熱。心寒。脉滑。短咳。嗽。婦人多有此疾。口乾。眼淚。骨疼。短氣。皆因腸胃燥滯。榮衛不

能開發。玄府閉塞。熱鬱內餘。可以開發陰陽。宣通濕滯。和榮衛。順三焦。煎服人參白朮湯。

紫苑 桑白皮 桔梗 續斷 甘草 五味子各一兩 赤小豆一合

右為末。水一大盞。藥末五錢。青竹茹。彈子大。同煎至七分。溫服。去滓。

枳實飲子。治婦人手足煩熱。夜卧多汗。肌肉黃瘁。經候不調。四肢煩倦。心腹滿悶。狀似勞氣。

枳壳一兩 吳半夏夏浸一兩 湯洗七次以生薑汁 紅芍藥柴胡各一兩 黃芩半兩

右為末。每服二錢。水一盞。生薑三片。棗二枚。同煎至八分。去滓。溫服。及治五心煩熱。及身體壯

執潮熱。續服桃仁煎丸。又治月經不調。阻滯不通。

桃仁二兩 湯洗各二錢 蟲起頭足 川大黃 川朴硝各二錢 蟲起頭足

右為末。用醋五升。入金銀鑊內。以慢火熬成膏。可丸如桐子大。當日晚不食。夜飯。溫酒下一丸。

不嚼。破午際取下。赤小豆汁似雞肝小蝦。暮衣末。再服。候鮮紅。即住服。

盧同散。治男子婦人一切咳嗽喘急。

欵冬花 井泉石 鵝管石 鍾乳石 官桂 甘草 白礬 佛耳草各等分

右為末。每服一錢。竹筒子吸喫。日三服。立効。

焚香透膈散 治一切勞咳。嗽壅滯胸膈痞滿。

雄黃 佛耳草 鵝管石 欵冬花各等分

右為末。每服用藥一錢。安在香爐子上。焚着。以開口吸烟。在喉中立効。

黨粟神聖散 治男子婦人久新日夜咳嗽不止者。

御米殼一兩用 蜜炒 烏梅肉 揀人參 呵子肉 葶藶 桑白皮 各半兩

右為細末。每服二三錢。百沸湯潑。臨卧調下。

新添三黃丸 治五勞七傷。流濕潤燥。消渴煩熱甚者。

大黃 黃芩 黃連 各等

右為末。煉蜜為丸。如桐子大。每服三三十九。加至五十九。生薑湯下。不計時候。日三服。妙。

當歸木香湯 治婦人血氣虛勞。令人頭目昏眩。讞語聲沉重。舌根強硬。言語蹇澁。口苦不思飲食。

白日閒睡。夜發虛汗。神思恍惚。夢寐狂言。面色痿黃。頻發喘咳。遍身疼痛。骨節氣走。注四肢沉重。

背脾拘急。發寒熱。五心煩燥。唇乾多渴。胸膈不利。咽喉噎塞。疰羸瘦弱。經曰脉大為勞。宜服此藥。

青皮 五加皮 海桐皮 桑白皮 陳皮地骨皮 丁香皮 牡丹皮 棕蘭皮已上諸藥全燒

為灰末用 當歸 一兩 木香 紅芍藥 半兩

右為細末。每服一錢。水一盞。入小油二點。錢一文。同煎至七分。温服。如婦人血臟臍下冷痛。似

刀攪。遍身腫滿。室女經脉不通。用斑猫一兩。大黃一兩。炒判二味。為末。用黃狗膽汁。以温酒調。下一錢。如臍下痛止。心間痰未止。不服二味。

燥門

消渴論

燥乾者。今肺之本。燥金受熱。化以成燥。溢也。兼火熱。致金衰。耗液而損血。鬱而成燥者。由風能勝濕。熱能耗液。故經云。風熱火同陽也。寒濕燥同陰也。又燥濕小異也。金燥雖屬秋陰。而其性異於寒濕。而反同於風熱火也。又加大便乾。濕乃大腸受熱。化成燥。溢經云。諸溢枯渴。又如癰瘡。中風皆因火熱。耗損血液。玄府閉塞。不能浸潤。金受火鬱。不能發聲。經云。肺主聲。肢痛。痲疾者。風熱濕相致。而遂以偏枯。語音溢。手足不隨也。然中寒吐瀉。亡液而成燥。亦以鮮矣。亦有寒濕相鬱。榮衛不能開發。貫注多成偏枯。經曰。諸溢枯涸。乾勁。皴揭。屬於燥也。又加胃膈痺熱。煩滿。饑不欲食。或痺成消中。善食而瘦。或燥熱鬱甚。而成消渴。多飲而數。或燥熱鬱甚。而成消渴。多飲而數。小便。或因熱病。或恣酒。欲誤服熱藥。以狂陽心火。燥其三焦。陽胃燥。澀。悞鬱。而水液不能宣行也。則周身不得潤澤。故痺痺。苦里也。而燥熱消渴。然雖多飲。亦其水液不能浸潤於腸胃之外。湯不能止。而使注為小便多出。俗未明妄。為下焦虛冷。誤人多矣。又如周身熱燥鬱。故變為雀目。或內障。癰疽。瘡瘍。止為咳嗽喘。下為痔痢。或停積而濕熱。內不甚能傳化者。變為水腫。濕脹也。世傳消渴病。及消瘦弱。或小便有脂液者。為消腎也。此為三消病也。消渴。消中。消腎。經意。但皆熱之所致也。

人參白朮湯。治胃膈痺熱。煩滿。飢不欲食。痺成消中。善食而瘦。燥熱鬱甚。而成消渴。多飲而數。小便。兼療一切。陽實陰虛。風熱燥鬱。頭目昏眩。中風偏枯。酒過積毒。一切腸胃燥溢。倦悶壅塞。瘡疥。痿痺。并傷寒雜病。產後煩渴。氣液不得宣通。

人參 白朮 當歸 芍藥 大黃 山梔子 荊芥穗 薄荷 桔梗 知母 澤瀉各半

茯苓去皮 連翹 瓜蒌根 乾葛各二兩 甘草二兩 藿香葉 青木香 官桂各一分

石膏四兩 寒水石二兩 滑石半斤 右為細末每服抄五錢水一茶盞入盆硝半兩生薑三片煎至半盞絞汁入蜜少許溫服漸加

至十餘錢得臟腑流利眼効如常服以意加減兼服消痞丸散以散腸胃結滯濕熱內甚自利者去了大黃芒硝

絳雪散 治消渴飲水無度小便數者大有神効

黃芩 黃丹 漢防己 括婁實各半分

右為細末每服二錢湯漿水調下臨卧併進三二服即止

人參散 治消腎善飲而食後數小便溺者

人參 三錢 白朮 澤瀉 瓜蒌 桔梗 梔子 連翹各半 葛根 黃芩 大黃

薄荷 白茯苓各一兩 甘草半兩 石膏二兩 滑石 寒水石各三兩

右為末入宿砂仁三錢每服五錢水一盞煎至七分入蜜少許再煎二三沸去滓食前食後服

消痞丸

大黃甘草子 治男子婦人一切消渴不能止者

大豆五升先煮三沸出淘若水再煮 大黃半兩 甘草大窰者四兩長四指打碎

右三味用井水一桶將前藥同者三五時如稠糲水少更于豆軟盛于盆中故冷令病人食豆

渴食不論無時時食食後消渴如若不止再煮 藥不三

痢門

總論

痢者五臟窘毒而不散者感冷物或胃寒暑失不能開發久傷冷熱等食更或服暖藥過極鬱

化成利自古入三口白利為寒赤利乃熱其三口悞也亭入瘡節初發刺開乃血多日成膿何為先熱而後寒也

叔和云濕多成五泄腸走若雷奔愚醫不悟三口黃者乃熱青利是寒大素曰五泄有漉泄驚泄殄泄濡泄滑泄也此乃五泄五泄者青是感肝木之象其色青赤者受心火之氣其色赤白者得西方金肺之氣色白黃者脾土之色蒼者土氣之下與水隨之其色蒼也三口蒼曰寒黃赤熱其三口非也若下利熱極頻并若痛或久不愈諸藥不能止者須下之以開除濕熱痞閉積滯而使氣液宣行者宜以逐之兼宣利積熱也

益元散 治身熱吐痢泄瀉腸癖下痢赤白瘖閉淋痛利小便偏主石淋乃服金石熱藥多待為腸胃中積聚寒熱宣積氣通九竅六府生津液去留結消蓄水止渴寬中除煩熱心躁腹脹痛悶補

益五藏大養脾腎之氣比腎木之藏非理內傷陰痿安魂定魄補五勞七傷一切虛損主癩屋驚悸其季初驚動健忘止煩滿短氣藏傷咳嗽飲食不下肌肉疼痛并口瘡牙齒疳蝕明耳目壯筋骨通

經脈和血氣消水穀保元真解百藥酒食邪毒耐勞役饑渴宣熱辟中外諸邪所傷久服強志輕身注顏延壽及解中暑傷寒疫癘饑飽勞損憂愁思慮恚怒驚恐傳染并汗後遺熱勞復諸疾并

解兩感傷寒能令遍身結滯宣通氣和而愈及婦人下乳催生產後損益血衰陰虛熱甚一切熱證兼吹妳乳癰此神驗之仙藥也惟孕婦不宜服滑胎也

柱府臑白滑石六兩甘茨一兩文

右為末每服三錢許溫水調下無靈日三服欲令飲者新汲水調下解利傷寒發汗煎豆白湯調下四錢每服水一盞葱白五枚得三服效為度此藥是寒涼解散鬱熱若病甚不解

多服此藥無害但有益而無損俗惡性寒兼易得之賤物而不明素問造化之理故不取本草神驗之言而多不用焉若以隨證驗之此凡人之仙藥也不可闕之傷寒當汗而不可下當下而不可汗者且如誤服此

而不可汗者且如誤服此

藥則汗出白愈裏熱便得宣通而愈或半右裏半在表可和解而不可涼膈散和解為佳或
 發汗吐下者若服上藥多愈亦難服滑石麻黃桂枝要發汗甚者小加減二兩同為半更入葱
 加蒼朮末甚良同葱煎湯服之宜服去滓為度溫毒散非孕婦即發汗加蒼朮末二兩同為半更入葱
 白豆豉溫五服分三服取微汗為度溫毒散非孕婦即發汗加蒼朮末二兩同為半更入葱
 與麻黃蒼朮去節分三服取微汗為度溫毒散非孕婦即發汗加蒼朮末二兩同為半更入葱
 服之則轉加大通毒散或解利兩感更加滑石與蒼朮倍最為發汗之妙藥也唯正用此
 粥催產用溫油漿調下三錢煎服三服一承氣湯下四錢或下計用指肉麴藥或酒肉麴藥
 不下皆由溫熱或死胎不帶下者煎服三服一承氣湯下四錢或下計用指肉麴藥或酒肉麴藥
 產矣慎不可用溫熱藥反致結滯不舒是致產後血痛之憂也
 臨熱太甚而為諸證由反生燥熱也
 之常時審其藏府為大氣虛實明其標本如法為治之
 青黛碧色名碧玉散加薄荷葉同所名雞蘇散愚俗之妄每慢耳
 玄青丸 治下痢勢惡頻并窘痛久不愈諸藥不能止須可下之以開除濕熱痞悶積滯而使液氣
 宣行者宣以逐之兼宣利積熱酒食積黃瘦中滿水脹腹脹兼療小兒散疳積熱乳癖諸證唯泄
 瀉者勿服

黃連

黃蘗

大黃

甘遂

芫花

大戟

牽牛

輕粉

青黛

薄荷

蘇合

蘇合

蘇合

蘇合

蘇合

蘇合

蘇合

蘇合

蘇合

蘇合

右為末勻水丸小豆大初服十丸每服加十丸空腹日午臨卧三服以快利為度後常服十五
 二十九數日後得食久病未痊除者再加取利後却常服以意消息病去為度後隨證止之
 小兒丸如黍米或麻子大退驚疳積不下者須常服十丸
 阿膠梅花丸 治下痢無問久新赤白青黑疼痛諸證
 金丹阿膠 淨草天炒透明白別烏梅肉炒去核黃蘗剉抄黃連 當歸 照赤芍藥 乾薑 炮

金丹阿膠

淨草

天炒

透明

白別

烏梅肉

炒去核

黃蘗

剉抄

黃連

當歸

照赤芍藥 乾薑 炮

赤茯苓半兩各

右為末入阿膠研勻。水丸桐子大。溫米飲下十九。食前兼夜五六服。小兒丸如菘豆。忌油膩。脂肥諸物也。

牛黃神金丸 治大人小兒嘔吐瀉痢。無問久新。赤白諸色。或瀉或不瀉。小便澀或不澀。并小兒驚疳積。疔癰。兼積腹滿。硬痛作發。往來亦能寬膈消食。

輕粉

粉霜

硃砂

雄黃

信砂

芭豆

黃丹

蠟

三錢

右先研粉霜。次旋入硃砂。研細。下雄黃朱砂。信砂。再研下丹粉。研勻。別研芭豆爛為油。與前藥研勻。近火上炙。控熱。別研蠟。軟入藥。勻。搓作劑。旋丸小豆大。新水下一丸。小兒食米麻子大。或止吐瀉痢疾。調甘露散。是桂苓或益元散。亦得。

芍藥藥皮丸 治一切濕熱惡痢。頻年窘痛。無問膿血。並宜服之。

芍藥

黃藥

當歸

黃連

兩

各半

右為末。水丸如小豆大。溫水下三四十九。無時。兼夜五六服。忌油膩。脂發熱等物。

二勝丸

鹽豉

紫蘇

等分

各

腹滿腸痛更

與杏仁丸

杏仁丸 治一切赤白瀉痢。腹痛裏急後重者。

杏仁

九

筒芭豆

去皮

四十九

右以藥同燒存性。研細如泥。用蠟鎔和。旋丸如桐子大。每服一二丸。煎大黃湯。間日一服。

白朮聖散子

治一切瀉痢久不瘥。并婦人產後痢亦治。

肉豆蔻

縮砂仁

石榴皮

訶子

乾薑炮

陳皮

白去

白朮

御米殼

炒當歸

甘草

芍藥

各等

勝金膏 右為細末每服二錢。水一大盞入乳香同煎和滓服。治一切泄瀉痢。不己胃脉洪浮者。反多日不己者。微小者。立止。

芭豆皮 楮實葉同燒存性

右為末。鎔蠟丸。如菜豆。大每服五丸。煎甘草湯下。

大聖金真散 治一切寒熱赤白澹泄等痢疾。

御米殼炒半斤 甘草一兩 乾薑炮半兩 當歸 醋石榴皮炒一兩 陳皮白去 白茯苓去皮一兩

右為末每服二錢。水一盞小兒半盞。乳香同煎至七分。食前忌油膩生冷毒物等。

車前子散 一名斷痢散。能治一切痢不止。

車前子不以多

右為末每服二錢。米飲調下。食前空心。

象骨散 治脾胃虛熱。心腹脹滿。水穀不消。噯氣不消。食輒嘔吐。霍亂泄瀉。膿血。四肢沈重。臍腹疼

痛。裏夜起頻併。不思飲食。皆可治之。

象骨四兩 訶子取肉二兩 肉豆蔻一兩 枳殼一兩 甘草二兩 乾薑半兩

右為末每服三錢。水一盞半。煎至八分。和滓熱服。食前日三服。

海蛤玉粉散 治血痢解。藏中積毒熱。

海蛤不以多少

右為末每服二錢。入蜜少許。冷水調下。不計時候。

河間 劉守真 撰集
安 吳學勉 人校

婦人門

總論

素問曰。目得血而能視。耳得血而能聽。指得血而能攝。掌得血而能握。足得血而能步。藏得血而能液。腑得血而能氣。然血所通流。則氣亦然也。氣血宣行。其中神自清利。而應機能用矣。故素問血氣人之神也。不可不謹調護。然婦人以血藏為基本也。夫婦人之病。手太陽足少陰。小腸之經絡為裏表。起自任衝之脉。於經脉之下。以上毛際循腹裏關元。上至咽喉頤循面目。過帶脉。貫臍而止。以婦人月水一月一來。如期謂之月信。其不來則風熱傷於經血。故血在內不通。或內受邪熱。脾胃虛損。以能飲食。食既不克。滯衛凝滯。肌膚黃燥。而不光澤。或大腸虛變為下痢。流入關元。致絕子嗣。為子藏冷。虛勞頹而病帶下。起與胞內。夫帶下之造化。但分經絡。釋本殊異。為病之本氣也。其病所發。正在過帶之分。而淋瀝以下。故曰帶下也。亦白之說無定也。法曰頭目昏眩。口若舌乾。咽喉不利。小便赤色。夫小便秘澀。滯脉實而數者。皆熱證也。凡白帶下者。亦多有之。為病寒豈能然。素問亢則害承。迺制。謂亢過極而反。兼已勝之化。制其勝也。則如火煉金。熱極則反化為水。及六月熱極則物反出液。而濕潤林木流津。故肝熱則出泣。脾熱則出涎。肺熱則出涕。腎熱甚則唾。大庄俗論。已煎熱湯者。極則沸。熱甚。熱氣重蒸於物。而生津液也。故下部任脉。濕甚熱者。津液涌而溢。已為帶下。見俗醫白帶下者。但依方論。而用辛熱之藥。雖有誤中。致令鬱結熱聚。不能宣通。普病轉加。世傳誤之久矣。

人參白朮散 治徧身燥濕相搏。玄府緻密。遂令俗悖發渴。飲食減少。不為肌膚。

宣明論方 卷十一

人參三錢 白朮七錢 薄荷半兩 砂仁三錢 生地黄 茯苓去皮 甘草各半兩 黃芩一錢 滑石三兩 藿香三錢

石膏兩

右為末每服三錢。水一盞煎至六分。去滓溫服。食前。日進二三服。

白朮湯 治妊娠血液虛衰。痿弱難以運動。氣帶連。痺麻榮衛不能通宣。常服養液潤燥。開通結滯。

令血 昌威

白朮兩 寒水石 當歸

黃芩

芍藥

人參

石膏

乾薑

防風

縮砂

藿香 甘草 茯苓兩 木香兩

崔宣武方用白朮一兩

右為末每服三錢。水一盞。生薑三片。同煎五六分。去滓溫服。食前日三服。

二氣湯 治月水不調。斷絕不產。面黃肌瘦。虛弱不美食。有燥熱。以柴胡飲子相參服之。

大黃四兩 別為末。醋一兩 當歸二兩 白芍二兩

右為末。以膏子和丸。如桐子大。每服二十九丸。淡醋湯下。食前日進三服。如月水不通。加入乾膝三錢。炒大。

沒藥半兩 硃砂三錢 官桂二錢 斑蝥三錢 此用熱不可生用。則吐瀉。

當歸龍骨丸 治月事失常。經水過多。及帶下淋瀝。無問久新。赤白諸證。并產後惡物不止。或孕婦

惡露胎痛不安。及大小兒痢瀉。並宜服之。

當歸 芍藥 黃連 染槐子 艾葉炒 龍骨 黃蘗各一兩 茯苓半兩 木香一分

右末滴水為丸。如小豆大。溫米飲下。三四十九食前日三四服。

當歸人參散 治產後虛損痿弱。難以運動。疼痛胸滿。不思飲食。

當歸 白朮 黃芩 芍藥 大黃 茯苓去皮 陳皮各半兩 人參 黃耆 劉川芎

厚朴去皮 官桂各三錢 甘草一兩 枳殼四錢 麩炒

右為末。每服三錢。水一盞。生薑三片。煎至六分。去滓。不計時服。溫服。如大便閉。以此散下。和中丸。

增損四物湯 治月經不調。心腹疼痛。補血臟。溫經注顏。

川芎 當歸 芍藥 熟地黃 白朮 牡丹皮 各半兩 地骨皮 一兩

右為末。每服五錢。水一盞。煎至六分。去滓。溫服。食前。

當歸川芎散 治風壅頭目昏眩。痛悶。筋脉拘倦。肢體麻痺。保護胎氣。調和榮衛。

當歸 川芎 甘草 黃芩 薄荷 縮砂仁

右為末。溫水調下。香一錢。漸加至二錢。食後日進三服。

辰砂大紅丸 治產後寒熱。運悶。血氣塊硬。疼痛立止。

朱砂 藥一兩 附子 地沒藥 海馬 乳香 茯苓 肉桂 玄胡 薑黃

右為末。酒煮麵糊為丸。如酸棗大。每服一丸。煎當歸酒下。放溫經水不行。煎紅花酒下。

三聖散 治產後下血。痢不止。

烏魚骨 炒 燒綿灰 血餘灰 汗脂者

右為細末。每服前石榴皮湯調下。熱服一錢。

沒藥丹 治產後惡血不下。月候不行。血刺腰腹急痛。或一切腸垢沈積。堅滿。痞痛作發。往來或燥

熱煩渴。喘急。悶亂。肢體痛倦。大小人心腹暴痛。孕婦自利。惡物過多。不宜服。燥熱極甚。血液衰竭。

不可強行。宜調氣養血。細詳證用。

沒藥 一錢 當歸 大黃 一兩 牽牛 二兩 輕粉 一錢 官桂 一分 已上 硃砂 一錢

右研勻。錯麵糊為丸。如小豆大。每服五丸。至十丸。溫服下。以快利取積。病下為度。雖利後病未

痊者。後再加取利。止心腹急痛。煎乳香下。未止取大便利。

黃藥子散 治月事不止煩渴胸亂心腹急痛肢體困倦不美飲食

黃藥子 當歸 芍藥 生地黃 黃芩 人參 白朮 知母 石膏各一 川芎

桔梗各一 甘草一 紫苑 槐花子 柴胡

右為麩末炒三錢水一盞煎至七分濾汁食前但一服

大延胡索散 治婦人經病并產後腹痛或心中煩悶或癥瘕癖塊及一切心腹暴痛

延胡索 當歸 赤芍藥 京三稜 川練子 蓬莪茂 官桂 厚朴 木香 川芎各一

桔梗 黃芩 大黃各半 甘草一 檳榔錢

右為末每服三錢水一盞煎至六分去滓熱服食前日三服惡物過多去大黃官桂加入黃藥

子染槐子龍骨各半兩如前法或平人心胃急痛如本方煎服得利尤好

枳實檳榔丸 治安養胎氣調和經候癥瘕痞塊有似妊孕可以久服血氣通和兼寬膈美食

枳實 檳榔 黃連 黃蘗 黃芩 當歸 阿膠研炒 木香各半

右為末小和丸如小豆大溫米飲下三十九不計時候日進三服

軟金花丸 治心胸腹腰急痛或淋痛并產前後經病刺痛乾嘔氣勞往來寒熱四肢困倦夜多盜汗兼治血積食積

當歸煨 乾漆生 輕粉 斑猫生全用 硃砂 粉霜各一 芭豆二錢

右為末同研細粟肉為膏旋丸如菉豆大每服一九新水下病甚者加服看虛實

大紅花丸 治婦人血積聚癥瘕經絡注滯

川大黃 紅花各二 蟲蟲十 疔疔去

右取大黃七錢醋熬成膏和藥丸如桐子大每服五七丸溫酒下食後日三服

黃芩湯 治婦人孕胎不安

白朮

黃芩各等分

右為末每服三錢水二盞當歸一根同煎至一盞稍溫服

海蛤丸

治婦人小便濁敗赤白帶下五淋臍股疼痛寒熱口乾舌澀不思飲食

海蛤

半夏

芫花醋炒

紅娘子去翅

訶子炒玄胡索

川練子去皮膜

茴香炒各

乳香錢三

硃砂半兩

沒藥各一兩

當歸半兩

右為末醋煮麵糊為丸如小豆大每服五丸至十丸醋湯下量入病虛實加減

烏金散

治婦人諸疾寒熱頭痛一切等疾

烏金子

肉桂

蒲黃

當歸 蝨蟲

血餘灰

小蛭

鯉魚灰

木香

青皮

皂角大者炙

芍藥半兩

芫花三兩

沒藥各一兩

當歸半兩

芭豆一錢

朱砂少

棕皮灰

紅花一兩

川頭半兩

右為末每服半錢如至三錢煎生姜湯調下空心食前忌油膩物

伏龍肝散

治婦人血崩不止者或結作片者

芫蕒一兩

生地黃一分

阿膠八錢

當歸兩斷續一分地榆

刺薊根兩

伏龍肝錢七

青竹茹八錢

右為末每服三錢水一盞半煎至一盞溫服日五服不計時候後服補藥

阿膠丸

阿膠

蠶甲六分

續斷五分

龍骨一兩

芫蕒六分

地膽四分

鹿茸五分

烏魚骨錢八

丹參六錢

龜甲一錢

右為末醋麵糊為丸如桐子大每服三十九丸湯下日進三四服

麝香杏仁散

治婦人陰瘡

麝香少許

杏仁燒存性

右為細末如瘡口深用小有袋子二箇盛藥滿繫口臨上藥火臨安在陰內立愈

硃砂斑猫丸

治婦人產後喫硬食變作血氣食塊無問久新

宣明論方 卷十一

皂角末二錢 色豆四箇 朱砂一錢 硃砂一錢 塊一 子一 乾場一 斑一 貓十 酒下 初更喫平明取下 血化水十年
右為細末蜜和丸分作十五丸每服一丸至二丸三丸温酒下初更喫平明取下 血化水十年
之病皆治之或大便或小便不多出也

黃帝素問宣明論方卷之十二

河間問 劉守真 撰集
新安 吳勉學 校

補養門

補養寒論

素問云。諸寒收引。皆屬於腎。腎者少陰也。少陰者。至陰也。至者為極也。少陰者。冬脈所旺。居比而屬水為寒。為歸藏為周密。寒中。收引拘縮。寒之用也。其病上下所生水澄徹。冷清者。不濁。其氣寒。冷水穀不消化。吐利。清冷為病。則如天氣寒而水自清也。

素問云。太陽受寒。血凝為癥。太陰受寒。氣聚為疝。但脉急而寒之象也。急主於痛。故緊急也。又內經云。數則為熱。遲則為寒。諸陽為熱。諸陰為寒。脉當遲緩。寒毒內鬱。洪數為熱。所養心之脉也。寒氣生清水。清就於濕。故以下利清白。此乃腸胃寒化。物失常熱。則壅滯不通。寒勝則火衰。火衰金旺。吐利腥穢。腥者金肺之屬也。熱則喜酸。寒則水腥。只如四肢逆冷。堅痞腹滿。屈伸不便。禁固戰慄。謂陰水主之。舒。倦。不便。診其脉沈伏。而遲病之證也。若身涼不渴。而寒。膝足而卧。惡聞人聲。不欲言。皆陰證也。陰陽停。則和。偏則病。如陽氣暴絕。陰氣獨勝。則為寒證。陰氣暴絕。陽氣獨勝。則為熱證。經曰。陽盛陰虛。汗之而死。陰勝陽虛。下之而死。若陽實外熱。陰虛內寒。陰實內熱。陽虛外寒。陽實伐其陽。當涼膈散。承氣湯主之。陰實伐其陰。當白水散。四逆湯主之。

論曰

大凡治病。必求標本。受先者為本。次者為標。此為兼證。故知逆與從上行。無問知標本者。萬舉萬當。不知標本者。是謂妄行也。本病相傳。先以治其急。六氣為本。三陰三陽為標。故病氣為本。受病經絡藏府謂之標也。

補養類

防風當歸飲子

治脾腎真陰損虛。肝心風熱鬱甚。陽勝陰衰。邪氣上逆。上實下虛。怯弱不耐。或表

熱而身熱惡寒。或裏熱而燥熱煩渴。或邪熱半在表半在裏。進退出入不已。而為寒熱往來。或表多則惡寒。裏多則發熱。或表之陽分。陽和正氣與邪相助。并甚於裏。畜熱極深。而外無陽氣。裏熱極甚。陽極似陰。而寒戰腹滿煩渴者。或裏之陰分。正氣反助。邪氣并甚於表。則躁熱煩渴。而汗出也。或邪熱壅塞者。或煩熱痛者。或熱結極甚。陽氣不通。而反覺冷痛。或中外熱鬱。煩躁甚。喜涼畏熱者。或熱極閉塞。不得宣通。陽極似陰。中外喜熱。而反畏寒者。或躁熱煩渴者。或濕熱極甚。而腹滿不渴者。或一切風熱壅滯。頭目昏眩。暗風眼黑。偏正頭疼。口乾鼻塞。耳鳴及聾。咽嗑不利。或目赤腫痛。口瘡舌痺。或上氣痰嗽。心脇鬱痞。腸胃燥澀。小便溺淋。或是皮膚瘙癢。手足麻痺。又或筋脈拘急。肢體倦怠。或渾身肌肉跳動。心忪驚悸。或口眼喎斜。語言蹇澀。或狂妄昏惑。健忘失志。及或腸胃燥熱。佛鬱而飢不欲食。或濕熱內餘。而消穀善飢。然能食而反瘦弱。或誤服燥熱毒藥。及妄食熱物過多。而耗損脾腎。則風熱鬱甚。而多有如此。不必全見也。無問自病。及中燥熱毒藥所使者。並宜宣通氣血。調順飲食。久服之。舊病除去。新病不生。設虛人常服。補益功驗。自可知矣。

當歸

大黃

柴胡

人參

黃芩

甘草

芍藥

滑石

右停每服三錢至五錢。水一大盞。生薑三片。同煎至七分。去渣溫服。補校此方末為至當思當守傳寫之誤

雙芝丸

治補精氣。填骨髓。壯筋骨。助五臟。調六腑。久服注顏不老。

熟地黃后取末

石斛祛根

五味子焙黃者到

肉苁蓉酒浸

牛膝酒浸

杜仲鹽水

兔絲子酒浸

煨鹿角霜

鹿角霜三片

沉香三錢

麝香研錢

人參

白茯苓祛

覆盆子

乾山藥

木瓜

天麻酒浸

秦朮已上各一兩

薏苡仁炒

二兩

右為末。煉蜜為丸。如桐子大。每服二十九丸。至三四十丸。溫酒下。鹽湯米飲亦可。凡年五卅入黑

附子以青鹽湯泡鹿角二大指去硫黃淨用以上用些油釜中以水同煮令微沸勿大急甚水耗只旋添溫火須用以備添也凍令角膠汁出盡其角如霜以手捻如膩粉乃或之取用勿令穢污也

內固丹 治諸補養腎氣調和脾臟壽高者常服筋骨勁健渾如壯士

肉苁蓉酒浸茴香兩二破故紙 胡蘆芭炒芭戟去心黑附子炮川練子 胡桃仁各四兩

右為和研桃仁為膏餘藥末和勻酒麩糊為丸如桐子大每服十丸至三十丸溫酒鹽湯下食

前虛者加至五七十丸此藥明目補腎烏鬚進美食空心

大補丸 治男子脾腎不足不間久新者

陳蓮子 陳蘿蔔子已上炒 蕤仁去破各兩 川山甲七片用酒炙 麝香少許

右為細末用蜜和丸如櫻桃大每服一丸溫酒送下食前空心

蛤蚧散 治脾胃氣攻心刺痛者

蛤蚧一對 乳香 木香 白茯苓 丁香 茴香各一 川山甲錢

右為細末每服一錢好溫酒調下空心食前

金縷丹 治男子本藏虛冷夜夢鬼交者

龍骨水飛 兎絲子兩 破故紙 蓮子 澤瀉 牡蠣各半 麝香少許

右為末酒麩糊為丸如桐子大每服三十丸溫酒下空心食前日三服

調中丸 治脾胃虛止嘔吐寬利胸膈

青皮 紅皮各一兩 大黃一兩 牽牛三兩

右為細末滴水和丸如桐子大每服三二十丸溫水空心食前下

水中金丹 治元藏氣虛不足夢寐陰人走失精氣

陽起石研 木香 乳香研 青鹽各一 茴香炒 骨碎補少 杜仲各半 兩去皮 白龍骨兩

擊者碎碎細袋成入 黃戊腎一對 酒一升 煮入白茯苓腎為末 右為細末 酒麩糊和丸如皂子每服二丸 温酒下 空心忌房室

和氣地黃湯 治沉積氣結不散 調養禁衛 補順陰陽 常服以代湯茶酒果

木香 棟桂去皮 茯苓去皮 白芥子炒 丁香一錢 白木 乾山藥 川芎 當歸各焙

桂花 縮砂仁各半錢 甘草半兩

右為細末入麝香少許 研勻 用數重油紙或簍器內密封起 每用蜜二斤 錫鉛一斤 温好甜水五升 化勻開 炒前藥 并杏仁十枚 去皮尖 洗淨 炒香 煨 槌碎 濕地黃根 許切長寸 約取汁半盞 温服

白朮調中湯 治中寒痞悶 急痛寒濕相搏 吐瀉腹痛 上下所出水液 澄澈清冷 殺不化 小便清白

至者是也 此因飲食冷物過多 陰勝陽衰 而為中寒也 或冷熱相擊 而反陽氣 拂鬱不能宣散 厥熱內作 以成熱證 者不可亦言為冷 當以脈證別之 夫濕熱上瀉 常見陽脈若上液 氣虛亦能反 乾薑官 朮調中 湯 温藥亦能開發 陽氣一通而愈 別無加害 無問寒熱 久新 並宜服之 婦等吐瀉者 以畏

白朮 茯苓去皮 紅皮去白 澤瀉各半 乾薑炮 官桂去皮 縮砂仁 藿香各一 甘草一兩

右為末 白湯化密少許 調下二錢 每日三服 煉蜜和就 每兩作十丸 名白朮調中丸 小兒一服 分三服

人參白朮散 此方證同 調中湯治法

人參 白朮 茯苓 甘草 橘皮 葛根 澤瀉 滑石 藿香各半

右為末 每服三錢 水一盞 煎至六分 温服 妊婦加蒼朮三五片 熱服

白朮散 治傷寒下後 餘熱以藥下之大過 胃中虛熱 飲水無力也 當生胃中津液 多服此藥

人參 白朮 木香 白茯苓 甘草劉炎 藿香葉 乾葛劉各

右為末每服一錢至二錢水一盞煎至五分溫服如飲水者多煎與之無時也

丁香附子散 治脾胃虛弱胸膈痞結吐逆不止

附子一兩 母丁香四十九個 生薑半斤取自然汁半碗

右用附子鑽孔四十九以丁香刺上面填內將生薑汁用文武火熬盡又用大蘿蔔一個取一

穴子入附子又填內將蘿蔔蓋之又用文武桑柴火燒香熟為度取出切附子作片子焙乾搗

為細末每服一錢米湯一盞調下日進三服

何首烏丸 治男子元氣虛損髮白再黑填精

何首烏辟肉從蓉六兩牛膝四兩

右將何首烏半斤用棗一層何首烏飯內蒸棗軟用切焙同為末棗肉和丸如桐子大每服五

七丸嚼馬練子服酒送食前一服加一丸日三服至四十九丸即止却減至數劫如神妙

煨腎丸 治男子腰膝痠夜多小便者

川練子 馬練花 破故紙 胡蘆芭 茴香炒各等分

右除茴香外四味酒浸同為末煮麩糊為丸如桐子大每服十丸至二十九丸溫酒下空心食前

神仙楮實丸 治積冷氣衝心胸及背有蛇蟲皮膚痛痔瘻疔癰氣塊心腹脹滿兩肋氣急食不消化

上逆氣奔於心并疝氣下墜飲食不得吐水嘔逆上上氣咳嗽眼花少力心虛健忘冷風偏風等

疾坐則思睡起則頭眩男子冷氣腰痠膝痛冷痺風頑陰汗盜汗夜多小便洩利陽道衰弱婦人

月水不通小便冷痛赤白帶下一切冷疾無問大小能明目益力輕身補髓益精

楮實子沈油去沈微炒 官桂四兩 牛膝半斤酒浸三日 乾薑三兩

右為末酒麩糊為丸如桐子大每服二十九丸溫酒空心食前鹽湯亦得

補中丸 治一切氣疾心腹疴痛嘔吐氣逆不思美食

厚朴生薑製香乾薑炮 陳皮去白 白茯苓去皮 甘草炙各

右為末煉蜜為丸如櫻桃大每服一丸空心白湯化下細嚼亦得

華澄茄丸 治中焦痞塞氣逆上攻心腹疴痛土逆湯下南美飲食

華澄茄半兩 良薑二兩 神麴炒 青皮去白 官桂去皮各

右為末醋麴糊為丸如桐子大每服二十九生薑湯下不計時候

阿魏半兩 硃砂熟

諸痛門

總論

夫痛者。經脉流行不止。環周不休。寒氣入經而稽遲。血泣凝而不行。客於脉外。血少客脉中。氣不通。故卒然而痛。其痛者。卒然而止。或痛甚而不休。或痛甚而可按。或按之而痛止。或按之而無益。或喘痛動應手。或與心背相引。而痛。或脇肋與少腹相引而痛。或腹痛。或引陰股。宿昔而成積。或卒然而痛。死不知人。而少間復生。或痛而閉不通者。諸痛各不同形。經曰。寒氣客於脉外。則脉寒。脉寒則蹇。縮。踏。縮。則脉絀。蹇。踏。縮。則脉急。則外引小腹。衝氣不得通流。故卒然而痛。得炅則痛止。寒氣客於經脉之中。相薄則脉滿。滿則血氣亂。故痛而不可按。寒氣客於腸胃之間。膜原之下。血不得散。小腹急引。故痛。按之血氣散。痛乃止也。脇肋痛者。寒氣客於厥陰之絡脉也。背與心相引。痛者。寒氣客於背俞之脉。注於心相引。痛。寒氣客於陰股。血泣在小腹相引痛。卒然而痛死者。寒氣客於五臟。厥逆上壅。陰氣竭。陽氣未入。故卒然痛死。氣復反則生矣。視其色。色黃赤為熱。白青則為寒。青黑為痛。經曰。感虛也。不可一例傷寒。凡治痛者。先察本。次明經絡皮部虛實。用藥無誤矣。

神砂一粒丹

治一切厥心痛。小腸膀胱痛。不可止者。

附子

兩鬱金

橘紅

等附子停用

右為末。醋麪糊為丸。如酸棗大。以硃砂為衣。每服一丸。男子酒下。婦人醋湯下。服罷又服散子。神聖代鍼散。

河間 劉守真 撰集
新安 吳勉學 校

乳香 沒藥 當歸 香白芷 川芎各半兩 元青兩去

右為細末更研每服一字病甚者半錢先點好茶一盞次摻藥末在茶上不得吹攪立地細細急之心驚欲死者小腸氣痛得如角弓膀胱腫硬一切氣刺虛痛并婦人血癖血迷血暈血刺血衝心胎衣不下難產一切痛疾服之大有神效只是要詳疾證用藥

茴香丸 治男子婦人臍腹疼痛刺胸膈不止者

茴香炒 良薑 官桂各半兩 蒼木十兩

右為末酒煮芎朮和丸如桐子大每服十丸生薑湯止痛溫酒下空心食後

經痛丸 治一切走注疼痛婦人經脉住滯水腫腹脹

甘遂 大戟 芫花 黑牽牛各等

右為末以蕎麥同末和作餅子并切為棋子煮熟服之得利為度每服一錢加減相虛實

六合散 治一切燥結汗後餘熱宣轉不通亦名金鑰匙散并治小腸氣結心腹滿胸中結痞走疰

疰痛 大黃一兩紙裏煨 白牽牛半兩生 黑牽牛微炒 甘遂各半兩 檳榔生 輕粉一錢

右為細末每服一錢密水調下服量虛實加減

定痛丸 治打撲損傷筋骨疼痛等如打撲骨損者先整骨定用竹夾然後先用好酒下麻黃三錢

然後服藥大效

乳香一分川椒 當歸 沒藥 赤芍藥 川芎 自然銅 玄胡

右為末鎔蠟為丸如彈子大細嚼酒下一丸骨碎者先用竹夾夾定三五日依舊小可與服

香鼓散 治小腸氣臍腹攪痛急陰股中疼悶不省人事

舶上茴香 川鹽炒 枳殼各一兩 沒藥半兩

右為末每服一錢。溫熱酒下。不計時候。併二三服。
金鉞丸亦名陸神丸 治陽絕痞氣。心腹不忍者。

丁香 木香 乳香 阿魏 輕粉 骨碎補 毛檳榔 官桂 桂心

芭豆 去皮 杏仁 去皮 不灰木 肉豆蔻 陽起石 硃砂各等

右為細末。水麪糊為丸。如小豆大。每服一丸。針穿作孔子。小油內裏。過燈焰內焙。遍於油中。煎死。嚼生薑下。不計時候。日三服。虛實加減。

一粒金丹 治腰膝走注疼痛如虎噬。

草烏頭 五靈脂 各一斤 木鱉子四兩 白膠 香泮 地龍四兩 去土炒 細墨 一兩 乳香 一兩

當歸二兩 沒藥二兩 麝香 一錢

右為末再研一十下。糯米麪糊和丸。如桐子大。每服一丸。至二丸。溫酒下。喫藥罷。遍身微汗。有

沒藥散 治一切心肚疼痛。不可忍者。

沒藥別研 乳香各三錢 川山甲五錢 炙 木鱉子四錢

右為細末。每服半錢。一錢。酒大半盞。同煎。溫服。不計時候。

痔門

痔瘻總論

夫腸風痔病者。所發手太陰。手陽明經。以應動脈。謂肺與大腸。為表裏。主為傳道。以行糟粕。腸風痔病有五種。其證亦異。蓋因陽氣虛。而玄腑疎。風邪乘而熱自。三風濕邪熱。攻於腸中。致使大便澁。而燥熱鬱。血熱散而流溢。衝浸浚腸裏。故以先血後便。熱在下。先便後血。熱在上。血後便久而不愈。乃作痔。

素問云。因而飽食。筋脉橫解。房室勞傷。腸癖為痔。風熱不散。穀氣流溢。傳於下部。故令肛門腫滿。結如梅。半核。甚者而變成瘻也。五臟切宜保養。勿令受邪。

香鼓丸 治濕熱內甚。因而飽食。腸癖成痔。久而成瘻。速服悉愈之。

木香 黃蘗各三 枳殼炒 檀厚朴略 半黃連一兩 蠟皮燒 當歸四錢 荆芥穗三錢

右為末。麩糊為丸。如桐子大。每服二三十丸。溫水食前。日三服。

槭藤子丸 治腸風瀉血。濕熱內甚。因為諸痔。久而不治。乃變成瘻。

黃著 枳實 槐花 荆芥穗 鳳眼草二兩 各 槭藤子一對 炙 皂子三百

右為細末。麩糊為丸。如桐子大。每服二三十丸。空心酒下。米飲亦得。忌油膩冷。猪魚臭血物等。

烏荆丸 治腸風痔疾。大腸悶澀。

川烏頭二兩 炮 荆芥穗四兩

右為末。醋麩糊為丸。每服二三十丸。如桐子大。溫水下。日三服。

黃者葛花丸 治腸中久積。熱痔瘻。下血疼痛。

黃者 葛花 黃赤小豆花 各一 大黃 赤芍藥 黃芩 當歸各三 蛇皮一

檳榔 白蒺梨 皂角子仁 半炒 各 生地黃兩 焙一

右為末。煉蜜和丸。如桐子大。每服二十丸。至三十丸。煎桑白皮湯下。食前槐子煎湯下亦得。

黃連散 一治腸風下血。疼痛不止。

雞冠花 黃連 貫眾 川大黃 烏梅各一 甘草三分

乳香沒藥散 治五種腸風痔瘻。無問久新。

宣黃連 白礬略 一穀精草 研石榴 將黃連白礬碎內入石榴內。用元蓋子合用。

右為末。每服二錢。用溫米飲調下。日三服。不計時候。

右以濕紙一張裹了後用膠溼拍作餅子裏石榴以炭火燒通赤為度取出溼紙次將穀精草於銚子內炒焦黃為度與石榴研細後入麝香一錢乳香二錢沒藥一錢研細拌勻每服一錢熱酒小半盞調下日三服

木香厚朴湯

治痔瘻脫肛腸胃間冷腹脇虛脹不思飲食

木香

桂心

桃仁

陳皮

厚朴

肉豆蔻

赤石脂

各半兩

皂角子

兩去皮

大附

三分

右為末每服二錢溫粥飲調下食前

瘧門

瘧疾總論

素問云瘧疾皆生於風其蓄作有時何氣使然夫陰陽上下交爭虛實相移也陽併於陰陰實陽虛寒慄鼓頷此皆夏傷於暑熱氣藏於皮膚之內腸胃之外腠理開得秋氣汗出遇風得之與衛氣併衛氣盡行陽夜行陰氣得陽外出得陰內薄外內相薄是以日作也其有間日者氣深內薄於陰陽氣獨發陰邪內著陰與陽爭不得出是以間日作也其作晏與早者邪氣客於風府循脊而下衛氣一日一夜大會於風府其日下一節先客於脊背每至風府則腠理開腠理開邪氣入邪氣入則病作晏也

夫寒者陰氣也風者陽氣也先傷寒而後傷風故曰先寒而後熱名曰寒瘧先傷於風後傷寒故曰先熱而後寒名曰溫瘧其熱而不寒者陰氣先絕陽氣獨勝少氣煩冤手足熱欲吐名曰虛瘧有餘則瀉不足補熱為有餘寒為不足已得火不能溫熱已冰水不涼氣陰勝併於陽陽勝併於陰陰勝則寒陽勝則熱故瘧者陰陽風寒虛實邪氣不常之所作也

辟邪丹 治嵐瘴鬼瘧食瘧併月煩日者

萊豆

雄黑豆九各四十

信砒半錢 研黃丹一錢 硃砂二粒

右為末。同入乳鉢內。滴水為丸。分作三十粒。每服一粒。已用東南桃心。取七枚。研汁。將井花水。早辰日。欲出不出。向日吞之。醋湯亦得。已發日服。

斬邪丹

治諸般瘧疾。無時不止者。

萊豆

小豆三十粒

硃砂 信砒各一錢

右為末。同研細。滴水。和丸。勻分作十丸。每服一丸。已早辰服。夜間於北斗下。香水獻。至早晨用。新倒流水送下。

斷魔如聖丹

信砒一錢 蜘蛛夫者 雄黑豆四粒

右為末。滴水。和丸。如豌豆大。如來日發。於今晚夜北斗下。獻於早晨。已紙裹於耳內。扎一丸立見愈。神聖一粒。可醫三人。

辰砂丸

治一切脾胃虛瘧。邪熱毒者。

信砒 甘草各一錢 硃砂二錢 大豆四十粒

右為末。滴水。和丸。勻分作四十九丸。服發日早晨。日欲出。煎桃心湯下。忌熱物。

瘧神丹

治諸般瘧疾。

信砒一兩 雄黃一錢

右以於五月。重五日。用餃子尖拌勻。研三千下。日未出。不令雞犬婦人見。丸如桐子大。未發前。

越鬼丹

治一切瘧疾神効。

信砒一錢 大豆七錢 雄黃

輕粉

荷葉各半 甘草一寸

右為末滴水為丸。如小豆大。重午日未出。不見雞犬婦人。脩合。每服一九。無根水下。平日夜視
北斗。來日服忌熱物。

刀下五七頁

黃帝素問宣明論方卷之十四

眼目門

眼科總論

素問云。目得血而能視。手得血而能握。其證足厥陰之經絡所主。肝臟受虛。而即補腎。實而即瀉心。夫人之眼目者。似天地之日月也。若人無雙目。豈能別辨賢愚。天無日月。萬物安能照耀。是以眼通五臟。氣貫五輪。外應肝候。肝臟虛而風邪鬱。風邪鬱而熱蘊。衝火炎上行。故攻目昏。滲溢疼痛。赤絲皆發。榮衛實。則能視。榮衛虛。則昏暗。凡人多食熱物。或嗜五辛坐濕。當風凌寒。冒暑。將息失度。皆喪目之源也。

黃連膏 治一切眼目。瘵肉攀睛。風痒淚落不止。

朴硝 入土以水半升。淨去土陰。乾用。

黃連 半斤 白丁香 五升以水一斗。淨去土。攪細用。

右取水入硝香釜內。熬至七分。淘出。令經宿水面浮牙者。取出。挖乾。以紙袋。于盛風中懸至風化。將黃連細末。熬清汁。曬乾。硝用豬羊膽。和氣蜜。妙點之。效矣。

滌昏膏 治一切風眼。疼痛不可忍者。洗之妙矣。

好崖蜜 斤 黃連 一兩 沒藥 半兩 黃丹 一兩。紫色。炒。

右入蜜。同熬黑。前黃連成稠汁。入二味藥內。煎熬稠。更入沒藥末。同熬數沸。濾去滓。洗甚妙。後

更用通天散。噴鼻。

通天散 治偏正頭疼。并夾腦風通。一切壅滯。明目。

赤芍藥 川芎

黃連

黃芩

玄胡索 草烏頭

當歸

河間 劉守真 撰集
新安 吳勉學 校

乳香別研各等分

右為細末。每服少許。紙撚子蘸藥任之。鼻嗜神効。

神言散 治風熱上攻。頭目眩痛。上壅。鼻塞眼昏。并牙齒悶痛。

川芎 鬱金各二錢 荆芥穗分薄 荷葉分盆 硝二錢 紅豆一錢已上為細末後入盆硝

右研勻。鼻內嗜三兩刻。耳力慢加藥。病甚者。兼夜嗜之。凡熱多風少。隨證選用諸藥。

金絲膏 治一切目疾。昏暗如紗。羅所遮。或痰或痛。
宣黃連半兩對碎水一盞浸一宿取汁再添水半盞蜜一兩 白礬一字 井鹽一分如無以青礬代之

山梔子二錢尹者梔碎取汁與前汁煮再用水半盞 右用銀簪器同熬十餘沸。用生絹上細紙數重。再濾過。用時常點。

白藥子散 治一切疔眼赤爛。目生翳膜。內外瘡疾。并小兒吐痢。

白藥子兩甘草半兩 右為末。用豬肝一葉。批開後。藥五錢。水一大盞。煮熟食後服。

胡黃連散 治一切久新赤目。疫痛不能坐卧。并大小人口瘡。

胡黃連 檳榔各半兩 麝香少許 右為細末。研細點之。如口瘡。每服半錢。麝香一字。勻口瘡大小。貼之。忌食魚猪油膩物。

碧霞丹 點一切惡眼。風赤者。
龍腦 麝香 硃砂各二錢 沒藥 乳香 銅青各一錢 鵬砂 三錢

右為末。滴水。和丸。如桐子大。每服一丸。新水化開。點之。立効。

菩薩散 治遠年近日。一切眼疾。
菩薩石 金精石 銀精石 太陰石 大陽石 雨餘石 河洛石 礬礦石 雲母石

盧甘石 井泉石 白滑石 紫英石 寒水石 陽起石 猪牙石 代赭石 碧霞石

烏魚骨 青鹽各一兩 硃砂半兩 蜜陀僧兩 銅青一兩 黃丹四兩 麝香 腦子一錢

輕粉半錢 鵬砂三錢 乳香二錢 雄膽一斤 白砂蜜二力

右為細末以井花水九碗熬就作四碗點水內落下錢許大不散可如散者再熬濾淨過露

旋點

石膏羌活散 治久患雙目不覩光明遠年近日內外氣障風昏暗拳毛倒睫一切眼疾

羌活 治腦熱跟風 蜜蒙花 治羞明 木賊 退翳障 香白芷 清利頭目 細辛

乾菜子 二味起 蘇子 起拳 川芎 治頭蒼朮 明目稷 甘菊花

荊芥穗 治目中 黃芩 洗心石膏 二味 藁本 治偏正 甘草 解諸藥毒

右為末每服一錢至二錢食後臨卧用蜜水一盞調下或清茶或淘米第二遍泔亦得日進三

服至十日漸明服至二十日大驗此方醫數十餘人矣

重明散 治一切風熱內外障氣眼疾

川獨活 川羌活 川芎 吳射干 仙苓脾 防風 甘草 井泉石 蒼朮各半

丹參 白朮 石決明 草決明 各三分

右為末每服二錢水一盞半煎至一盞溫服日進三服食後

雷巖丸 治男子婦人肝經不足風邪內乘上攻眼暗淚出羞明怕日多見黑花生障翳膜遮睛臉

生風粟或痒或痛隱澁難開兼久患偏正頭疼牽引兩目漸覺細小視物不明皆因腎水不能澆

濟於肝水此藥久服大補腎藏添目力

肉苁蓉一兩 牛膝一兩 芭豆一兩 浸一宿 菊花二兩 黑附子 同煮為二錢以河水三升 枸杞子 兩 川椒 三兩 去目

宣明論方 卷十四

右為末元浸藥酒煮麩糊為丸如桐子大每服十丸空心酒下世人服藥不知多少根源往往不効耳。

丁香復光丸

治一切遠近目疾。

丁香二錢

芭豆一錢

去皮油

半夏二兩

烏梅半兩

南鵬砂三錢

腦子二百

盆硝半兩

縮砂仁二錢半

甘草半兩

荆芥穗二錢

右為末醋者麩糊為丸如菜豆大每服十丸至十五丸米泔下食後日三服

已上諸方係先生親驗可錄

小兒門

小兒科論

素問云身熱惡寒戰慄驚惑皆屬熱證為少陰君火暴強直支綆戾裏急筋縮也皆屬風證為厥陰風木大小兒六歲之上為小兒十八歲已上為少年其六歲已下者諸經不載是以乳下嬰兒有病難治無可定也然小兒與大人不可一例各異治之雖小兒誕生襁褓之後骨肉脆軟腸胃細微可以乳食調和臟腑乃得平安肌膚滋潤筋骨輕嫩以綿衣之故生壅滯內有積熱熱乘於心心受乃發為驚驚不止返為潮搖則為病也大藥小小病者純陽熱多冷少故引○素問少陰厥陰證以小兒病驚風熱多矣小兒驚風者皆由心火暴甚而制金不能平木故風火相搏而昏冒驚悸潮熱此證皆謂熱甚而風生○素問驚駭驚愕少陰君火也小兒脾疳痢瀉者皆熱甚急驚瀉痢色多青為熱證明矣痢色黃者何為火甚則水衰而脾土旺故痢色黃也痢色紅赤者為心火熱甚深也痢色黑者為火熱過極則反兼水化制之故色黑也五臟皆言熱證無寒冷證亦有謂瀉痢小便青白不澁為寒水穀不化而色不變吐痢腥穢澄澈清冷白不澁身涼不渴脉遲細而微者寒證也

穀雖不化而色變。非白煩渴。小便赤黃而澁者。為之熱證。世傳大人小兒吐痢霍亂。乳食未及消化。而痢尚白。便言論為寒證。誤矣。向不脈候別之仲景邪熱不化穀。豈為寒也。大人亦同。

小兒方類

龍腦地黃膏○治小兒急慢驚風。痰涎上潮心胸。天吊驚。纏喉風。小兒胸膈不利。一切熱毒。大有神效。如病不已。與分肢散一二服。吐利得快。常服此藥。

川大黃

別搗甘草橫文者別搗麝香

別二錢

雄黃水蜜者一別研

生腦子

別研

右五味各修製了。再入乳鉢白同研細。煉蜜為膏。油單裏。如有前病煎薄荷湯下。旋丸如皂子大。化下。如小兒大人睡驚。及精神恍惚。煎金銀湯下一丸。常服新汲水下。大解暑毒。如孕婦人常服。新生男女。永無疾病。如有大人陽毒傷寒。加輕粉二。龍腦少許。水化下一丸。杏核大小兒看年紀大小。加減服。立效。

分肢散○治小兒卒風。大人眼喎斜。風涎畏心。驚癇天吊。走馬喉閉。急驚。一切風熱等疾。

芭豆

半兩不出油

川大黃

一朴硝半兩

右大黃為末。後入芭豆霜。朴硝。一處細研。用油貼起。如有前患。每服半錢。熱茶下。吐下煩涎立愈。如小兒胃喉驚吊等。先服龍腦地黃膏一服。次服此藥。一字。茶下時。上吐下瀉。以吐利得快為效。大人半錢。小兒一字。看虛實加減。只是一兩服見效。不宜頻服。如吐瀉不定。以葱白湯立止。

珍珠丸○治小兒虛中積熱。驚癇等疾。

芭豆霜

膩粉

二錢

滑石

二錢

天南星

一錢半

蝎梢

二十箇

續隨子

二十四箇

粉霜

右為末。研令極細。以糯米粥為丸。如黃米大。小兒一歲已下。每服三丸。至一丸。十五歲。每服五丸。至十丸。點茶湯下。荊芥湯亦得。虛實加減。

牛黃散○治小兒上焦壅熱諸眼疾。

肉桂

鬱金各一兩

馬牙硝兩

甘草半兩

右為末。如患眼三五年。喫三五兩便瘥。每服一錢。新汲水調下。垂枕卧片時。若是小兒十歲服

半錢。五歲已下。服一字。永無驚疳癩風患。服之立効。

硃砂丸○治小兒急慢驚風及風熱生涎咽喉不利。取驚積。

硃砂

天南星

芭豆霜各一錢

右為末。麪糊和丸。如黍粒大。看病虛實。大小。每服二丸。或天吊戴上眼。每服四五丸。薄荷水下

立愈。

鬱金散○治小兒急慢驚風等疾。

鬱金一枚

芭豆七箇

去皮不出油

右研為細末。每服一字。煎竹葉湯。放温下。把藥抄蓋唇上。放以湯充下喉咽為妙。

澤瀉散○治小兒勦胎膈上壅熱涎潮。

澤瀉分蟬殼十一者二

黃明膠手掌大一

片炙令焦

右為細末。每服一錢。温米湯調下。日進二服。未愈再服。

鎮庭散○治小兒一切驚喘肚脹咳嗽。

鬱金

大黃各半兩

甘草三錢

輕粉一錢

右為末。每服半錢。用薄荷汁。硃砂細研。冷水以木匙漉下。

定命散○治小兒天吊驚風不能哭泣。

梨蘆

川芎

蔚金各等分

右研為細末。鼻嚔。嚔之如哭可醫。

金肺散○治小兒諸般喘嗽急驚風神効。

錫灰一錢漢防己二錢鬱金半錢砒黃二錢半夏一錢半湯洗七次

右為細末每服半錢加一錢小兒加減煎豬肉湯下日進二服食後。

厚朴散○治小兒虛滑瀉痢不止。

厚朴 呵子皮 研史君子 箇揀丁香 榭茯苓 吳白朮 青皮 絡二甘草 炒

右為末每服一字一歲加減用清米湯下。

人參散○治小兒虛熱煩渴因吐瀉煩渴不止及疎轉後服之。

人參半兩 茯苓半兩 半犀半錢 甘草半兩 乾葛半兩 桔梗半錢

右為末每服三錢水一大盞入燈心五莖同煎至六分放溫不計時候煩渴者以新竹湯下量年紀加減。

碧雲散○治小兒驚風有涎。

膽礬研兩 銅青研分 粉霜 輕粉各一

右為細末每服一字薄荷湯下中風將水下如吐多不定煎葱白湯投之立止効。

桃符丸○治小兒風熱。

大黃 郁李仁 黃栢 宣連 蔚金各一 芭豆二七個去皮 輕粉

右為細末滴水為丸如菉豆大以硃砂為衣每服二丸用桃符煎湯下看大人小兒加減。

黃帝素問宣明論方卷之十五

雜病門

雜論

素問云。痛痒瘡瘍。癰疽痘疹。瘤氣結核。佛鬱甚者。皆熱。五臟不和。九竅不通。六腑不和。留結為癰。近於火氣微熱則痒。熱甚則痛。附近則灼而為瘡。皆火之用也。

人之瘡腫。因內熱外虛所生也。為風濕之所乘。則生瘡腫。然肺主氣候於皮毛。脾主肌肉。氣虛則膚腠開。為風濕所乘。脾氣溫而內熱。即生瘡也。腫者皆由寒熱毒氣客於經絡。使血溢而不通。壅結成腫。風邪內作。即無頭無根。氣血相搏。作者即有頭有根。結壅盛則為膿。赤核腫則風氣流滑也。瘡以痛痒。痛則為實。痒則為虛。非謂虛為寒也。正謂熱之微甚也。痒者美疾也。故火旺於夏。而萬物蕃鮮。榮美也。灸之以火。漬之以湯。而其痒轉甚者。微熱之所使也。痒去者謂熱。今皮膚縱緩。腠理開通。陽氣得泄。熱散而去。或夏熱皮膚。痒而以冷水沃之。其痒不去。謂寒收斂。腠理閉密。陽氣鬱結。不能散越。沸熱內作故也。瘡痒皆為火熱。而反腐出膿水者。猶穀肉果榮熱極。則腐爛而潰。為污水也。潰而腐爛者。水之化也。癰淺而大。疽深而惡。熱勝血則為癰。膿也。瘍有頭。小瘡也。疹浮而小。癩疹也。瘤氣赤瘤。丹燥熱。勝氣火之色也。

如意散 治疥癬無時。痛痒愈發。有時不問久新者。
吳茱萸 牛蒡子 荊芥 各一 牡蠣 半兩 輕粉 半錢 信石 二錢
右為細末。研勻。每臥抄一錢。油調。徧身搓摩。上一半。如後有痒不止。更少許塗之。股臂之間。聞香悉愈。

河間 劉守真 撰集
新安 吳勉學 校

信効散 治風熱上客陽明之經。牙齒疳蝕。斷宣腐臭出血。色黃氣腐。注悶。動搖疼痛。作發有時。兼解。中金石一切毒藥。

信砒 一錢 黃丹 二錢 千古石灰如無但以陳久者炒細研四錢

右研細末。入青鹽一分。麝少許。如無此二味亦得。每上抄三兩大豆許。先洗漱淨。以手指蘸藥。搽上下牙齒。斷滲。涎勿嚥之。須臾漱淨。或已蝕處。再上少許。二三四次。常用如意。一上以為妙。或服金石藥致病。便一日三四上。更不上牙齒如神。或已上牙齒者。傳之即愈。或平人常用。頗能清利頭目。寬膈美食。使髮鬚遲白。久用亦能固牙齒。便遲。老人氣於面。而手足陽明經絡。貫注憂思。則氣結。而血液不行。燥。佛鬱而血衰。不能榮養臟府。故早蒼黃而斑白也。此藥能使陽明氣血宣通。故効能然也。又方使龍骨不用石灰。

神聖餅子 治一切打撲傷損。金石刀刃。血出不止者。立効。此藥上無膿。退加便愈。

烏魚骨 一兩 五月五日 前先准備下 高荳菜 握青薊草 一握約一虎口人 石灰 四兩

右以五月五日。日未出。本人不語。將取三味。同杵爛。次後下餘藥味。杵得所搏。作餅子。曬乾。用時旋刮敷之。

芙蓉膏 治徧滿頭面。大小諸蟹子。或身體者。

料炭灰 桑柴灰 蕎麥麩灰 各半升

右灰。用熱湯淋取二升。熬至五分。又用

獨角仙 一個 不紅娘子 半錢 糯米 四十 石灰 一兩 風

右為末。將前項灰。汆調如麪糊。相似。在甕合子內。於土底埋五七日。取出使用。取癰痕蟹子。同刺

破。用細竹簽子。點之。放藥。用濕紙措藥。再點至三上。見癰痕時。冷水淋洗。忌薑醋。魚。馬肉。

鉛白霜散 治大小人口瘡。牙齒腐蝕。氣臭血出者。

鈔白雷錢銅錄二錢白礬一錢

右為末以翎羽埽上瘡以溫漿水救之

麝香散 治大小人口齒蝕腐出血斷根宣爛者

上好鹹土不以多 麝香真好者

右熱湯淋取汁去滓用清汁銀石器中熬乾刮下再與麝香同研勻捺於瘡上以紙貼神効

乳香散 治一切瘰癧瘡新久遠近不已者

乳香一錢砒霜一錢硃砂一錢紅娘子二十四個 黃丹半錢

右為末糯米糊和作餅子如折三錢厚小銅錢裏搽大破瘡上白麩糊如不破者灸柴炷大者

不過一月其瘰癧核自下

後斂瘡生肌藥 黃蘗不以多少

為細末麩糊塗患處甚妙

五香丸 治一切惡瘡瘰癧結核無首尾及諸瘡腫

沉香 木香 雞古香 各一兩 黃陸香 麝香 各三錢 連翹 半兩

右研為細末每服二錢水一盞煎至六分不拘時

紫參丸 治熱毒瘰癧腫痛已內消瘡已破出膿水服此藥

紫參 苦參 各一兩 連翹 二兩 丹參 一兩 膩粉 三錢 麝香 三錢 滑石 二兩

右為末別用玄參一斤搗碎以酒三碗浸三日採取汁去滓用皂角子三伯枚煨熟搗為末用

玄參酒熬皂子末成膏和前藥如桐子大每服一丸以黃耆湯下一日加一丸至患人歲數即

止如四十則二十每日却減一丸瘡自乾有結內消

麝香雄黃散 治十七般惡蟲咬傷人及瘡腫者

麝香 雄黃

乳香

硃砂 絡石 土峰高

露蜂窩 燒灰

右研為細末以醋調少許塗咬處或不辨認得多疑是惡瘡三五日不瘳即毒入心難瘳忌

硃砂散

治一切疥瘡

硃砂

雄黃

天南星

砒霜

各等麝香少許

右研為細末用竹針針開用藥到黃水出瘡已

聖力散

治諸疥瘡腫

草烏頭 白及

白斂

木鱉子 地龍

金毛狗脊各二錢半麝香三錢黃丹少許

川山甲散

治一切通氣破瘡腫行膿血如神妙

川山甲

木鱉子

烏龍角

燒存性

守瘻丸

治瘻癰結硬

通草二兩

杏仁一大合去

皮尖研

牛蒡子一合出

吳射干

昆布去鹹 呵梨勒

海藻各四兩去

鬼代丹

治打着不痛

右為末煉蜜為丸如彈子大含化咽津下日進三服

無名異 研沒藥 研

乳杏 研

自然銅 醋洋研

地龍 去土

木鱉子 去殼各

右為末煉蜜為丸如彈子大溫酒下一丸打不痛

龍腦潤肌散

治杖瘡熱毒疼痛

龍腦

潤肌散

治杖瘡熱毒疼痛

香藥丸 治瘰癧瘡
黃丹 一兩 蜜陀僧 半兩 輕粉 一錢 麝香 半兩 龍腦 一字
右為細末。搽藥在瘡上。用青白子。塗之內。留一服子。

礪砂 乳香 沒藥 半夏 輕粉 赤石脂 各等

紅玉挺子 治一切牙疔
右為末。糯米粉為丸。如桐子大。每服十丸。加至二十丸。皂角子臨臥

砒霜 一塊 皂角子 大 黃丹 煨過 魯土

桃花散 治一切瘡生肌藥
右為細末。餉餅。和作劑子。任牙。

白及 白斂 黃柏 黃連 乳香 別研 麝香 別研 黃丹 各等

追毒散 治生瘡發悶吐逆霍亂
右為細末。搽於瘡上。二三日。生肌肉滿。

螺兒青 棟甘草 各一兩 白礬 二錢 半

膽礬丸 治男子年少而髮髮斑白
土馬騾 燒存性 石馬騾 燒存性 半夏 各一兩 生薑 一兩 胡桃 十個 真膽礬 半兩

川五倍子 一兩 右為末。和作一塊。絹袋子盛。如彈子大。熱酒水各少許。浸下。藥汁淋洗。頭髮一月神效。

伏神散 治膽熱多睡神思不安昏悶
伏神 去皮 麥門冬 地骨皮 茯苓 各一兩 白蘚皮 酸棗仁 沙參 甘草 各半

伏神 去皮 麥門冬 地骨皮 茯苓 各一兩 白蘚皮 酸棗仁 沙參 甘草 各半

伏神 去皮 麥門冬 地骨皮 茯苓 各一兩 白蘚皮 酸棗仁 沙參 甘草 各半

伏神 去皮 麥門冬 地骨皮 茯苓 各一兩 白蘚皮 酸棗仁 沙參 甘草 各半

伏神 去皮 麥門冬 地骨皮 茯苓 各一兩 白蘚皮 酸棗仁 沙參 甘草 各半

伏神 去皮 麥門冬 地骨皮 茯苓 各一兩 白蘚皮 酸棗仁 沙參 甘草 各半

伏神 去皮 麥門冬 地骨皮 茯苓 各一兩 白蘚皮 酸棗仁 沙參 甘草 各半

鐵脚丸 治大小便不通
右為末每服三錢水一盞煎至六分去滓食後服

皂角炙去皮不以多少去却于

全聖散 治小腸膀胱氣痛不忍者
右為末酒麪糊為丸如桐子大每服三十丸酒服

地膽半兩去足 起微炒 滑石一兩 硃砂半錢

琥珀散 治五淋
右為末每服二錢用苦杖酒調下食前服

滑石二兩 木通 當歸 木香 尉金 扁竹略一 琥珀二兩

葵子散 治小便不通
右為末每服三五錢用蘆葦葉同煎食後日三服

葵子 茯苓去黑皮 各等分

倒換散 治無問久新癰悶不通小腹急痛肛門腫疼
右為末每服四錢水一盞煎三沸食前

大黃通便半 荆芥穗大便不通減半 各等分

敗毒散 治男子往來寒熱婦人產後骨蒸血運
右併藥味各別為末每服一二錢溫水調下臨時加減服

大黃 黃藥子 紫何車 赤芍藥 甘草各等

補真丹 治男子元藏虛冷興陽固腎不虛
右為末每服一錢如發熱冷水下如發寒煎生薑菴蓂湯同調下此藥偏治婦人

黑附子 一兩煨

陽起石 煨酒

海馬 二錢 乳香

雄黃 為衣 血竭 各三錢

石蓮子 去殼皮心

黑錫 炒去砂子半兩 石鸞子 燒以醋淬

右為細末。麝糊為丸。每服二十九丸。用五香湯空心下。

五香湯

沉香 箋香 麝香 檀香 各等

右為細末。每服半錢。煎湯下。

新添

醉烏法。治頭鬢白。再黑方。

訶藜勒 十個不 醋石榴 三個大

硃礬 五分 生地黃汁 一升

硃砂 研 硫黃 研各

右藥同入瓷瓶內。用二味汁浸密封。勿令透氣。至四十九日後取出。其訶子狀若黑梅。至夜臨

卧含一枚。嚥津到曉爛嚼。以酒一盞下之。三二日後再服。忌葱大蒜蘿蔔。

千頂堂書局出版廣告

▲脈學指南▼

吾國醫學為世界最古之哲學亦最切實用之藝術奈政景之書理極深奧後人著述蕪雜居多欲求闡發奧旨洞明虛實之作實不多觀本局有鑒於此不惜重金多方搜求印行濟世茲復得山左盧敬之先生所著脈學指南一書遍請著名醫家評閱僉謂精微透徹發前人所未發足為後學津梁著作權歸於本局爰亟付印並略撮是書優點以告有志斯道者諒當先觀為快也 是書專取內經難經及傷寒論金匱要略等書融會貫通發為議論所謂以經解經洵非學有根底者不能與徒逞臆說者有霄壤之判 是書詳言脈之形象及病之所以然以及種種變化熟讀之臨診辨症自能確有把握非板滯不靈之脈訣書可比 是書雖祇八萬餘言然詳略適宜於脈互勘處晰疑辨難已屬無微不至彰以少勝多足稱字字珠璣 是書經大文豪章太炎先生序之篇首其價值如何概可想見書用本國連史紙精印裝訂四冊清朗悅目猶其餘事定價壹圓


羅茂亭輯

中西醫粹

附唐容川痢症三字訣
張子培
春溫三字訣
每部四冊
定價六角

○退思廬醫書四種○

本書四種為慈谿名醫嚴痲孫先生所新輯曰感證輯要四卷六經感證莫不概括名論良方無乎不備曰女科精華三卷曰女科醫案選粹四卷曰女科證治約旨四卷慨女科之盲治而會集前說擷其精華詳述醫案之由來刺取古方之良要蓋女科之完書焉先生溝通中西蜚聲醫界本其心得輯為此書卷首有嚴範孫先生一序具言臨症二十餘年既以經驗筆之於書又兼中西國名論以資旁證以範孫先生之舉望豈肯阿私所好者則此書之價值可知矣今由本局精印趕行出版不特醫界之宜購即各界之居家旅行者均應各置一編以備遇證揀方之用矣精裝八冊連史紙定價洋二元五角有光紙定價洋壹元六角



E783L

1909

v. 2