

V. 6

D. vol. VI.
Chinese.

劉河間傷寒六書

上海十頃堂
書局發行

也

木
系

素問病機宜保命集卷下

欬論第二十一

論曰。欬謂無痰而有聲。肺氣傷而不清也。嗽是無聲而有痰。脾濕動而為痰也。欬嗽謂有痰而有聲。蓋因傷於肺。氣動於脾。濕效而為嗽也。脾濕者。秋傷於濕。積於脾也。故內經曰。秋傷於濕。冬必欬。嗽大抵素秋之氣。宜清。須反動之。氣必上衝而為效。甚則動於脾。濕發而為痰焉。是知脾無留濕。雖傷肺氣而不為痰也。有痰寒少而熱多。故效嗽者。非專主於肺而為病。以肺主皮毛。而司於外。故風寒先能傷之也。內經曰。五臟上府皆能令人效。非獨肺也。各以其時主之而受病焉。非其時。各傳而與之也。所病不等。寒暑燥濕風火六氣。皆令人效。嗽唯濕病痰飲入胃。留之而不行。上入於肺。則為效。嗽假令濕在於心經。謂之熱痰。濕在肺經。謂之風痰。濕在脾經。謂之氣痰。濕在腎經。謂之寒痰。所治不同。宜隨證而治之。若效而無痰者。以辛甘潤其肺。故效嗽者。治痰為先。治痰者。下氣為上。是以南星半夏勝其痰。而效嗽自愈。枳殼陳皮利其氣。而痰自下。痰而能食者。大承氣湯微下之。少利為度。痰而不能食者。厚朴湯治之。夏月嗽而發熱者。謂之熱痰。嗽小柴胡四兩。加石膏一兩。知母半兩。用之。冬月嗽而發寒。熱謂之寒嗽。小青龙加杏仁服之。然此為大例。更當隨証隨時加減之。量其虛實。此治法之大體也。

蜜煎生薑湯

蜜煎橘皮湯

燒生薑糊桃

此者皆治無痰而嗽者。當以辛甘潤其肺故也。如但用青陳皮藥。皆當去白。本草云。陳皮味辛。理上氣。去痰氣。滯塞青皮味苦。理下氣。二味俱用。散三焦之氣也。故聖濟云。陳皮去痰。穰不除。即生痰。麻黃發汗。節不去而止汗。

河間處士 劉完素守真述
明 新安 吳勉學師古校

治風痰熱咳嗽其脉弦面青四肢滿悶便溺秘溢心多燥怒水煮金花丸

南星 半夏各一兩 天麻 雄黃錢 白麵 三 寒水石 一兩燒

右為細末滴水為丸每服五七十丸至百丸煎漿水沸下藥煮令沸浮為度漉出淡漿水浸另用

生薑湯下或通聖加半夏及局方中川芎丸防風丸皆可用也

小黃丸治熱痰效嗽脉洪面赤煩熱心痛唇口乾燥多喜笑宜小黃丸

南星 湯 半夏 洗各一兩 黃芩 半兩

右為細末生薑汁浸蒸餅為桐子大每服五十九至七十九食後薑湯下及小柴胡湯中加半夏亦可

白朮丸治痰濕效嗽脉緩面黃肢體沉重嗜卧不收腹脹而食不消宜白朮丸

南星 半夏各一兩 白朮 半兩

右為細末糊為丸桐子大每服五七十丸生薑湯下及局方中防己丸亦可用

玉粉丸治氣痰效嗽脉溢面白上喘氣促洒淅惡寒慙不樂宜服之

南星 半夏各一兩 官桂 去皮

右為細末薄糊為丸如桐子大每服五七十丸生薑湯下食後及局方中防己丸亦可玉粉丸加

減在後心下否者加枳實伍錢身熱甚者加黃連五錢體重者加茯苓一兩氣上逆者加苦亭應

五錢喘促者加人參桔梗各五錢浮腫者加郁李仁杏仁各五錢大便秘者加黃連五錢

雙玉散治痰熱而喘痰湧如泉

寒水石 石膏各等

右為細末煎人參湯調下三錢食後服

治痰干縉湯

半夏 生味 大皂角 去皮子

二兩 半兩對

右同於絹袋中盛之。用水三升。生薑七大片。同煎至一半。以手操洗之。取清汁。分作二服。食後併服二服効。

防風丸治痰嗽胸中氣不清利者。枳朮丸亦妙。

防風兩 枳殼兩 麩兩 炒 白朮兩

右細末燒餅為丸。每服五七十丸。生薑湯下。

天麻丸

天麻兩 半夏兩 南星兩 雄黃兩 炒

右以白麵二兩。滴水為丸。如桐子大。每服五十九丸。至百丸。煎滾水令沸。下藥煮十餘沸。漉出。食前生薑湯下。

利膈丸主胸中不利。痰嗽喘促。利脾胃壅滯。調秘瀉藏。推陳致新。消進飲食。治利膈氣之勝藥也。

木香一錢 檳榔半錢 人參三錢 當歸二錢 藿香一錢 大黃酒浸焙 厚朴薑制

枳實炒 甘草三錢 當歸二錢 藿香一錢 大黃酒浸焙 厚朴薑制

右為細末滴水。和丸如桐子大。每服三五十丸。食後諸飲皆下。

欬氣丸 治久嗽痰喘。肺氣浮腫。

青皮錢 陳皮錢 檳榔 木香 杏仁去皮 郁李仁炒 茯苓

澤瀉 當歸 茂炮 馬兜零 苦亭三兩 人參 防己各五

右為細末。生薑汁麵糊為丸。如梧子大。每服一二十九丸。加至五七十丸。生薑湯下。食後服。

玉粉丸治痰結咽喉不利。語音不出。

半夏錢 草烏炒 桂一字

右同為末生薑汁浸蒸餅為丸如雞頭大每服一九至夜含化多歲不愈者亦効
枳殼湯治久痰胸高不利者多上焦發熱

枳殼麩炒去三兩 桔梗兩 黃芩半兩

右同剉每日早用二兩半水三盞煎至二盞勻作三服早時一服中時一服臨卧時一服三日七
兩半藥盡服生半夏湯

生半夏湯

半夏不以多少洗七

右每服秤三錢水一盞半入生薑五大片同煎至一盞和滓食後服一日三二服服三日畢再服
枳木丸盡其痰為度論曰先消胸中氣後去膈上痰再服枳木丸謂首尾合盡消其氣謂令痰不
復作也

清鎮丸治熱嗽

小柴胡湯內加人參一倍 青黛兩

右為細末麵糊丸如桐子大每服五十九丸生薑湯下

半夏丸治因傷風而痰作喘逆兀兀欲吐惡心欲倒已吐加檳榔三錢

半夏洗切兩湯 雄黃研三錢

右同為末生薑汁浸蒸餅為丸桐子大每服三十九丸生薑湯下

白朮散治夏暑大熱或醉飲冷痰濕不止膈不利

白朮 茯苓 半夏洗 黃芩各等

右為籠末每服五錢至七錢水二盞入生薑十片煎至一盞去滓調陳皮末一錢神麩末一錢食
後服

法曰大熱大飲蓋酒味熱而引飲冷冷與熱凝於胸中不散而成濕故痰作矣甚者宜吐之吐後服五苓甘露膠濕去痰之劑

白朮湯治痰潮上如湧泉久不可治者

右為末每服半兩病大者一兩水二盞生薑七片煎至一盞取清調神麴末二錢頓服之病甚者

下玉壺丸一百丸大効永除根

天門冬丸治婦人喘手足煩熱骨蒸寢汗口乾引飲面目浮腫

天門冬汁稱去 麥門冬法兩 生地黃為膏子

右二味為末膏子和丸如梧子大每服五十丸煎逍遙散送逍遙散中去甘草加入參或服王氏博濟方中人參荊芥散亦可如面腫不已經曰面腫曰風故宜汗麻黃桂枝可發其汗後服柴胡

飲子去大黃故論曰治藏者治其俞治府者治其合浮腫者治其經治俞者治其土也治合者亦

治其土也如兵家圍魏救趙之法也

虛損論第二十二

論曰虛損之疾寒熱因虛而感也感寒則損陽陽虛則陰感自上而下治之宜以辛甘淡過於胃則不可治也感熱則損陰陰虛則陽盛故損自下而上治之宜以苦酸鹹過於脾則不可治也自上而損者一損於肺皮聚而毛落二損損於心血脈虛少不能榮養藏府婦人月水不通三損損于胃飲食不為肌肉自下而損者一損于腎骨痿不能起于床二損損于肝筋緩不能自收持三損損于脾飲食不能消尅論曰心肺損而色滯腎肝損而形痿穀不能化而脾損感此病者皆損之病也漸漬之深皆虛勞之疾也故四君子湯治肺損而皮聚毛落益氣可也

白朮 人參 黃耆 茯苓 各

右為麓末。每服五六錢。七錢水一盞煎至七分去滓。食後溫服。
八物湯治心肺虛損。皮聚而毛落。血脈虛損。婦人月水愆期。宜益氣和血。

白木 人參 黃耆 茯苓 川芎 熟地黄 當歸

芍藥各等分

右麓末服五七錢。水一盞煎至七分去滓。食後溫服。

十全散治心肺損及胃。飲食不為。肥膚宜益氣和血調飲食。

白木 人參 黃耆 伏神 桂枝 熟地黄 當歸

芍藥 川芎 甘草

右為末。加生薑棗同煎。水一大盞。藥五錢煎至七分。食前日三服。

金剛丸治腎損骨痿不能起于床。宜益精。

草薢 杜仲炒去 菴菴酒浸 兔絲子酒浸

右為細末。酒煮猪腰子為丸。每服五七十九。空心酒下。

牛膝丸治腎肝損骨痿不能起于床。筋緩不能收持。宜益精緩中。

牛膝酒浸 草薢 杜仲炒去 菴菴酒浸 防風 兔絲子酒浸 白茯苓各等分

桂枝半減

右細末。酒煮猪腰子。搗丸。桐子大。空心酒下五七十九。

煨腎丸治腎肝損及脾。損穀不化。宜益精緩中消穀。

牛膝酒浸 草薢 杜仲 菴菴 防風 兔絲子 白茯苓

胡蘆巴 破故紙分 桂枝錢

右和劑服餌。如金剛丸法。腰痛不起者甚効。

黑地黃丸加五味子名腎氣丸。治陽盛陰虛脾腎不足房室虛損形瘦無力面多青黃而無常色宜此藥養血益腎。

蒼朮泔洗熟地黃斤川薑冬一兩夏五錢春七錢五味子半

右為細末。棗肉為丸。如梧子大。每服一百丸至二百丸。食前米飲下。或酒治血虛又痔甚効。經曰腎苦燥急食辛以潤之。開腠理致津液通氣。五味子味酸故酸以收之。此雖陽盛不燥熱乃是五藏虛損於內故可益血收氣也。此藥類象神品藥也。

治陽虛陰盛心肺不足宜八味丸。若形體瘦弱無力多困未知陰陽先損夏月地黃丸春秋宜腎氣丸冬月宜八味丸。

消渴論第二十三

論曰消渴之疾三焦受病也。有上消中消腎消。上消者上焦受病又謂之高消病也。多飲水而少食大便如常。或小便清利。知其燥在上焦也。治宜流濕潤燥。中消者胃也。渴而飲食多。小便黃。經曰熱能消穀。知熱在中。法云宜下之。至不欲飲食則愈。腎消者病在下焦。初發為膏淋。下如膏油之狀。至病成而面色黧黑形瘦而耳焦小便濁而有脂。治法宜養血以肅清。分其清濁而自愈也。法曰燥上而渴。辛甘而祛。用潤肺故可用蜜煎生薑湯。大器頓之。時時呷之。法云心肺之病莫厭煩而少飲。內經云補上治宜以緩。又曰辛以潤之。開腠致津液通則肺氣下流。故氣下火降而燥衰矣。其渴乃止。又經曰二陽結為消。王注曰二陽結於胃及大腸俱熱也。腸胃藏熱則善消水穀。甘辛降火之劑。黃連末一斤。生地黃白然汁。白蓮花藕自然汁。牛乳汁各一斤。熬成膏。子黃連末為丸。如梧桐子。每服三十丸。少呷溫水送下。日進十服。渴病立止。

治上焦高消而不欲多食。小便清利。宜小柴胡湯。或加白虎湯。或錢氏方中地骨皮散。內加芍藥黃耆石膏黃芩桔梗之類是也。

人參石膏湯治高消上焦煩渴不欲多食

人參

石膏一兩

知母七錢 甘草四錢

右為麓末每服五錢至七錢水煎食後溫服

順氣散治消中熱在胃而能食小便赤黃微利之為効不可多利服此藥漸漸利之不欲多食則愈

厚朴薑制一兩

大黃兩

枳實二錢

右剉每服五錢水煎食遠服

茴香散治腎消病下焦初證小便如膏油

茴香炒

苦練炒

右細末酒調二錢食前服

八味丸治腎消大病加減法

本方內倍加山藥外桂附從四時加減假令方內桂附一兩春各用三錢夏用一錢秋用五錢冬全用一兩

珍珠粉丸治白淫夢泄遺精及滑出而不收

黃栢一斤

於新瓦上燒令通赤為度

真蛤粉一斤

右為細末滴水丸如桐子大每服一百丸空心酒下法曰盛陽乘陽故精泄也黃栢降火蛤粉鹹而補腎陰也又治思想無窮所願不得之證

竹籠散治消渴

五靈脂

黑豆法皮

右等為細末每服三錢冬瓜湯調下無冬瓜苗葉皆可日二服小渴二三服効渴定不可服熱藥唯服八味丸去附子加五味子

腫脹論第二十四小兒

靈樞脹論云。帝問岐伯。脹形何如。岐伯曰。夫心脹者。煩心氣短。卧不安。肺脹者。虛滿而喘。欬。肝脹者。脇下滿而痛。引少腹。脾脹者。善噦。四肢煩惋。體重不能勝衣。卧不安。腎脹者。引背。央央然。腰髀痛。六府脹。胃脹者。腹滿。胃脘痛。鼻聞焦臭。妨于食。大便難。大腸脹者。腸鳴。痛而濯濯。久日重。于寒則飧泄。食不化。小腸脹者。小腹臞滿。引腰而痛。膀胱脹者。少腹氣滿。而氣癢。三焦脹者。氣滿于皮膚中。硜硜然而不堅。膽脹者。脇下痛。脹口苦。善太息。又水脹篇云。帝問岐伯。水脹何如。答曰。水始起也。目窠上微腫。如新卧起之狀。其頸脈動。發陰股間寒。足脛脹。腹乃大。其水已成矣。以手按其腹。隨手而起。如裹水之狀。此其候也。帝曰。膚脹何如。岐伯曰。膚者。寒氣客于皮中。鼓空空然。不堅。腹身大。盡腫。皮厚。按其腹。窅而不起。腹色不變。此其候也。鼓脹何如。答曰。鼓腹身皆大。大與膚脹等也。色蒼黃。腹筋起。此其候也。腸覃何如。答曰。寒氣客于腸外。與衛相搏。氣不得榮。因有所繫。癰而內着。惡氣乃起。瘕肉生。其始大也。大如雞子。稍以益大。至其成。如懷子狀。久者離歲。按之則堅。推之則移。月事不以時下。此其候也。石瘕何如。答曰。石瘕生于胞中。寒氣客于子門。閉塞氣不通。惡血當瀉。不瀉。因以留止。以益大。壯如懷子。月事不時。皆生于女子。可導而下。帝曰。膚脹鼓脹。可刺耶。曰。先瀉其脹之血絡。復調其經。刺去其血絡也。

經云。平治權衡。去苑陳。剋開鬼門。潔淨府。平治權衡者。察脈之浮沉也。去苑陳剋者。疎滌腸胃也。開鬼門。潔淨府者。發汗利小便也。又鼓脹之病。治以雞屎醴。名醫云。其腫有短氣。不得卧。為心水。兩脇痛。為肝水。大便鴨溇。為肺水。四肢皆腫。為脾水。腰痛足冷。為腎水。口苦咽乾。為胆水。乍虛乍實。為大腸水。各隨其經絡。分其內外。審其脈證。而別之。大有風水。皮水。石水。黃汗。歸各藏以論之。風合歸肝。皮合歸肺。黃汗歸脾。石合歸腎。風水脈浮。必惡風。皮水脈亦浮。按下沒指。石水脈沉。腹滿不喘。黃汗脈沉遲。發熱而多涎。久而不愈。必致癰膿。水腫脈浮。帶數。即是虛寒。潛止其間。久必沉伏。沉伏則陽

虛陰實為水必矣。要知水脉必沉是也。論者脉出者死與病不相應也。諸唇黑則傷肝，缺盆盈平則傷心，臍出則傷脾，足平則傷腎，背平則傷肺。此五者必不可療也。治法云：腰以上宜發汗，腰以下利小便。錢氏論虛實腹脹實則不因吐瀉，又病之後亦不因下利，脹而喘急悶亂更有痰有熱，及有宿食不化而脹者，宜服大黃丸、白餅子、紫霜丸下之。更詳認大小便如俱不通，先利小便，後利大便，虛則久病吐瀉後其脉微細，肺主目胞，胞虛腫，手足冷，當先服壅氣丸，後服異功散及和中丸，益黃散溫其氣。因于氣腫者，藟皮煎丸。因于濕為腫，煎防己黃耆湯調五苓散。因于熱為腫者，服八正散。

又一法：燥熱于肺為腫者，乃絕水之源也。當清肺除燥水自生矣。于破梳湯中加黃芩，如熱在下焦陰消，使氣不得化者，當益陰則陽氣自化也。黃蘗黃連是也。

五脉論五水灸法

青水灸肝井。赤水灸心榮。黃水灸脾俞。白水灸肺經。黑水灸腎入。

婦人蠱脹無脉，燒青丸。五皮散亦是。

論諸蠱脹者，有二。脹若從胃，則旦食而不能夜食，旦則不脹，夜則脹是也。若水腫証濡泄者是也。內經曰：蠱脹之病，治以雞屎醴酒調服。水脹之病，當開鬼門，潔淨府也。

白茯苓湯名變水

白茯苓 澤瀉各二兩 郁李仁錢

右以咀作一服水一椀，煎至一半，常服無時。從少至多服，或煎得澄入生薑自然汁在內，和麴或做粥飭作常食。五七日後覺脹下再中，以白朮散。

白朮 澤瀉各半兩

右為細末，每服三錢，煎茯苓湯調下。或丸亦可，服三十丸。

末治之藥。服黃耆芍藥建中之類。以調養之。平復後忌房室猪魚鹽麪等物。

治水氣蠱脹。潔淨府楮實子丸。

楮實子一斗水二斗

白丁香一兩

茯苓三兩

右三味為細末。用楮實膏為丸。如桐子大。不計丸數。從少至多。服至小便清利。及腹脹減為度。後

服中治藥末。治藥調養藥。疎啓其中。忌甘苦酸補。其下五補七宣。

取穴法

治腫治其經。治金火也。并榮俞經陰經金也。金水水火陽經火也。

治腫水香散

水香

大戟

白牽牛各等

右為細末。每用三錢。楮腰子一對。批開。搽藥在內。燒熟。空心服之。如左則塌左。右則塌右。如水腫不能全去。於腹上塗甘遂末。在遠臍。滿腹少飲甘草水。其腫便去也。

治水腫

螻蛄去頭尾。與葡萄心同研。露七日。曝乾。為細末。淡酒調下。暑月濕用尤佳。

又方

棗一斗。鍋內入水。上有四指。用大戟并根苗。蓋之。遍盆。合之。煮熟為度。去大戟不用。旋旋喫。無時

盡棗決愈神効。

眼目論第二十五

論曰。眼之為病。在府則為表。當除風散熱。在藏則為裏。宜養血安神。暴發者為表而易治。久病者在裏而難愈。陰風散熱者。瀉青丸主之。養血安神者。定志丸。婦人熟乾地黃丸是也。或有體肥氣盛。風熱上行。目昏溢者。槐子散主之。此由胸中氣濁上行也。重則為痰。厥亦能損目。常使胸中氣清。無此

病也。又有因目疾服藥多而損氣者。久之眼漸昏弱。乍明乍暗。不欲視物。此目少血之驗也。氣乾地黃丸消風散定志丸相預而養之。或有視物不明。見黑花者。此謂之腎氣弱也。宜補腎水。駐景丸是也。或有暴失明者。謂眼居諸陽交之會也。而陰及閉之。此風邪內滿。當有不測之疾也。翳膜者。風熱重而有之。或癡入眼。此肝氣盛而發在表也。醫膜已生在表明矣。當發散而去之。反疎利則邪氣內播。為翳則深也。邪氣未定。謂之熱翳。而浮邪氣已定。謂之冰翳。而沉邪氣。牢而深者。謂之陷翳。當以煖發之物。使其邪氣再動。翳膜乃浮。輔之退翳之藥。則能自去也。病久者不能速効。當以歲月除之。治眼赤暴發腫散熱飲子。

防風

羌活

黃芩

黃連略一

右剉。每服半兩。水二盞。煎至一盞。食後溫服。如大便秘澀。加大黃一兩。如痛甚者。加當歸地黃。如煩燥不能眠。睡加施子一兩。

川芎散治風熱上衝。頭目眩熱。腫及胸中不利。

川芎

槐子略

右細末。三錢。如胸中氣滯不利。生薑湯調。日疾茶調。風熱上攻。咳嗽一兩。水煎。食後服。治眼久病昏澀。因發而久不愈。地黃湯。

防風

羌活

黃芩

黃連

地黃

當歸

人參

扶神略

右為麤末。每服五七錢。水一盞半。煎至一盞。去滓。溫服。食後。

槐子散

槐子

黃芩

木賊

蒼朮略

右細末。茶清調下。食後。

治眼生翳膜及癍入眼嫩赤已過者。瀉青丸主之。當半減。大黃如大便秘。嫩氣未定。依方服之。
治水翳久不去者。羚羊角散主之。

羚羊角 升麻 細辛 各等 甘草 半

右為細末。一半為散。一半蜜為丸。如桐子大。每服五七十九。以羚羊角散下之。食後卧。米泔水煎服。

治太陽經銜虛血實。腫人臉重。頭中濕淫。膚脉睛痛。肝風盛。眼黑腎虛。桔梗丸。

桔梗 斤 牽牛 頭末

右二味為末。煉蜜為丸。如桐子大。每服四五十九。加至百丸。食前溫水下。日二服。
金絲膏 點眼藥

生薑 四兩 白沙蜜 去漸煉 豬猪胆汁 三錢 黃連 四兩 槌用水一

右先煎黃連水。後入薑汁。次入蜜。同煎去沫。淨次入下項藥末。

腦子 鈿 麝香 錢 礞砂 鈿 鵬砂 錢 輕粉 鈿 熊胆 鈿 青鹽 錢

右極細攪勻。熬令稀膏點用。

治眼暴赤發。噴痛不可忍者。救苦丸。

黃連 兩 當歸 錢 甘草 一錢

右同剉細。新水半碗。浸一宿。以慢火熬。約至一半。以綿濾去滓。以淨為妙。用火再熬。作稠膏子。為度。攤在枕上。倒合。以物蓋之。用熟艾一大彈子許。底下燃之。用艾煙膏子。艾盡為度。再入下項藥。

朱砂 飛 錢 腦子 錢 乳香 沒藥 碎

右同研極細。入黃連膏內。攪和丸如米大。每用二丸。點眼大角內。仰面卧。藥化則起。

治眼發赤腫。毒氣侵睛。脹痛。宣毒散。

生藥 用 兩 錢

盆硝 雄黃 乳香 沒藥各等

右為極細末以少許鼻內嚙之

治眼風毒發腫鼻中欲嚏多大損而生瘡宣風散

川芎 甘菊銘二 乳香 沒藥銘一

右和勻再研極細少許鼻內嚙之

能遠視不能近視局方中定志丸目能近視不能遠視

萬壽地芝丸

生薑四兩 天門冬四兩 枳殼棗兩去 甘菊二兩

右為細末煉蜜丸如桐子大茶清或溫酒下一百丸食後此藥能愈大風熱

洗眼藥 呵子二兩 黃丹四兩 蜜八兩 柳枝四十

右以河水二椀熬至半椀用一錢熱水化洗之石器內熬

治眼赤瞎以青塗蛆不以多少淘淨晒乾末之令害眼人仰卧合目用藥一錢散在眼上須臾藥行

持少時去藥赤瞎亦無

治倒睫 無名異末之揅捲在紙中作捻子點着到藥處吹殺以烟熏睫目自起

瘡瘍論第二十六

論曰瘡瘍者火之屬須分內外以治其本內經云膏梁之變足生大丁其原在裏發于表也受持如

虛言內結而發諸外未知從何道而出皆是從虛而出也假令太陽經虛從背而出少陽經虛從鬢

而出陽明經虛從髭而出督脈經虛從腦而出又經曰地之濕氣感則害人皮膚筋脈其在外感則內

行若其脉沉實當先疎其內以絕其原也其脉浮大當先托裏恐氣傷於內有內外之中者邪氣至

甚遏絕經絡。故發癰腫。經曰榮氣不從道于肉理。乃生癰疽。此因失托裏及失疎通。又失和榮衛也。治瘡之大要。須明托裏。疎通行榮衛三法。托裏者。治其外之內。疎通者。治其內之外。行榮衛者。治其中也。內之外者。其脈沉實。發熱煩燥。內無焮赤痛。其邪氣深于內也。故先疎通以絕其原。外之內者。其脈浮數。焮腫在外。形證外顯。恐邪氣極而內行。故先托裏。內外之中者。外無焮惡之氣。內亦藏府諸痛痒瘡瘍。皆屬心火。又曰。知其要者。一言而終。不知其要。流散無窮。

鍼灸法曰。凡瘡瘍可灸刺者。須分經絡部分。血氣多少。俞穴遠近。若從背而出。當從太陽五穴隨證選用。或刺或灸。泄其邪氣。

至陰 通谷

束骨

崑崙

委中

從鬢而出者。當從少陽五穴選用。少陽少血多氣。

竅陰

夾谿

臨泣

陽輔

陽凌泉

從髀而出者。當從陽明五穴選用。陽明多血少氣。

蕤兌

內庭

陷谷

衝陽

解谿

從腦而出者。初覺腦痛不可忍。且欲生瘡也。腦者髓之海。當灸刺絕骨。以泄邪氣。髓者舍也。故脈浮者。從太陽經依前選用。脈長者。從陽明經依前選用。脈絃者。從少陽經依前選用。論曰。諸經各有井榮俞經合。并主心下滿。及瘡色青。榮主身熱。及瘡赤色。俞主體重。節痛瘡黃色。經主欬寒熱瘡白色。合主氣逆而泄。瘡黑色。隨經病而有此證者。或宜灸宜鍼。以泄邪氣。經曰。邪氣內播。則腫熱宜破射之也。內經曰。夫瘡瘍之息者。宜以鍼開除之。氣勝血聚者。宜石而泄之。王注曰。石砭也。可以破大癰出膿。今以排鍼代之。凡瘡瘍之覺微。設腫硬皮血不變色。脈沉不痛者。當外灸之。引邪氣出而方止。如以有膿水者。不可灸。當刺之。淺者亦不灸。經曰。陷者灸之。如外微覺木硬而不痛者。當急灸之。

右細末每服二錢溫酒調下

治惡瘡有死肉者及追膿

白丁香

輕粉

粉霜

雄黃

麝香錢一

已豆五升

右同研細新飯和作餅子用之

治諸癩大疥痛不辨白皮名曰附骨癩加神三生散

露蜂房

蛇退皮

頭髮洗淨等分

三味燒灰存性研細酒調三錢

治膀胱移熱于小腸上為口糜好飲食人多有此疾當用導赤散五苓散各半兩煎服

治少陰口瘡半夏散若聲絕不出者是風寒逼絕陽氣不伸也

半夏製一兩

桂子

草烏頭字

右同煎一盞水作二服其效如神

治太陰口瘡甘馨散

生甘草一

白馨子一人

右嚙化嚙津

治赤口瘡乳香散

乳香

沒藥錢一

白馨飛半

銅綠鈔

為細末搽用

諸瘡瘍痛色變紫黑者回瘡金銀花湯

金銀花連枝

黃耆兩四

甘草兩一右三味剉細酒一升

入瓶內閉口重湯內煮三二時取出去滓放溫服之

諸瘡腫已破未破嫩腫甚當歸散主之

當歸

黃耆

括婁

木香

黃連各右為粗末煎一兩

如痛而大便秘加大黃錢

乳香散 治瘡口痛大者寒水石兩一 滑石兩 乳香 沒藥各五 腦子抄

右各研細同和勻少搽瘡口上

雄黃散 治諸瘡有惡肉不能去者雄黃研錢 巴豆一個去皮研

石二味同研如泥入乳香沒藥少許再研細少上惡肉自去也

木香散 治瘡口久不斂

木香 檳榔各一錢連錢

右為細末搽上如痛加當歸一錢貼之自收斂

又方 小椒一錢炒黑色 定粉兩一 風化灰錢五 白礬二錢半 乳香 沒藥各一

右為細末搽瘡口上

鐵頭歲 治瘡瘍嫩腫木硬 蟾酥 麝香各一

各同研極細以兒乳汁調和泥入合磁內盛乾不妨每用以唾津調撥少許于腫處更以膏藥傅

之毒氣自出不能為瘡雖有瘡亦輕

治白口瘡沒藥散

沒藥 乳香 雄黃各一錢 輕粉錢一 巴豆霜抄

右細末乾搽

瘰癧論第二十七

夫瘰癧者經所謂結核是也或在耳前後連及頤頷下連缺盆皆為瘰癧或在胸及胸之側下連兩脇皆為馬刀手足少陽主之此經多氣少血故多堅而少軟膿白而稀如泔水狀治者求水清可也如瘰癧生去別經臨時于銅入內隨其所屬經絡部分對証之穴灸之并依經內藥用之獨形而小

者為結核。續數連結者為瘰癧。形表如馬者為馬刀。治馬刀連翹湯。

連翹斤

瞿麥斤

大黃兩

甘草兩

右父咀一兩水兩碗煎至一盞半。早食後已時服。在項兩邊是屬少陽經。服藥十餘日後可于臨泣穴灸二七壯。服藥不可住了。至六十日決効。有一方加大黃不用甘草。更加貝母五兩雄黃七分。檳榔半兩。同末煎水調下三五錢。

治瘰癧文武膏秦愷也

文武膏熟者

右以布袋取汁。銀石器中熬成薄膏。白湯點一匙。日三服。

痔疾論第二十八

論曰。手陽明大腸名曰害蜚。蜚虫也六元正祀論陽明。又曰司殺府。手陽明屬金大腸名害蜚。謂金能害五

虫。又曰司殺府。謂金主殺。既有此二名。何以自生虫。蓋謂三焦相火盛而能制陽明金。故木來相侮。

內經曰。侮謂勝己也。木主生五虫。叔和云。氣主生于脾藏傍。大腸疼痛脾難當。漸覺稍瀉。三焦熱莫

謾多方立紀綱。此言飲酒多食熱物。脾生大熱。而助三焦氣盛。火能生土也。當瀉三焦火熱。退使金

得氣而反制木。木受制則五虫不生。病自愈矣。

蒼水澤瀉丸

蒼水四兩

澤瀉兩

枳實兩

地榆兩

皂子兩

存性

右為細末。燒飯為丸。桐子大。每服三十丸。食前酒或米飲下。

又方。川烏炮。古石反。燔分。依前丸服。

淋洗藥。天仙子。荊芥。小椒。蔓荊子分。

右以水煎洗

黑地黃丸治痔之聖藥也在虛損門下有方

婦人胎產論第二十九

論曰婦人童幼天癸未行之間皆屬少陰天癸既行皆從厥陰論之天癸既絕乃屬太陰經也治胎產之病從厥陰經者是祖生化之源也厥陰與少陽相為表裏故治法無犯胃氣及上二焦為三禁不可汗不可下不可利小便發汗者同傷寒下早之證利大便則脈數而已動于脾利小便則內亡津液胃中枯燥製藥之法能不犯三禁則榮衛自和榮衛和而寒熱止矣外則和于榮衛內則調于清便先將此法為之初治次後詳而論之見證消息同壞証傷寒為之緩治或小便不利或大便秘結或積熱于腸胃之間或以成痿或散血氣而為浮腫蓋產理多門故同傷寒壞證如發渴用白虎氣弱則黃耆血刺痛而用以當歸腹中痛而加以芍藥以上例証不犯三禁皆產後之久病也凡產後暴病禁犯不可拘也如產後熱入血室者桃仁承氣抵當湯之類是也胃堅燥者大承氣不可以泄藥言之產後世人多用烏金四物是不知四時之寒熱不明血氣之虛與實盲然一緊用藥如此而愈加增劇是醫人誤之耳大抵產病天行從增損柴胡雜証從加添四物然春夏雖從柴胡秋冬約同四物藥性寒熱病証虛實不可不察也四物湯常病服餌四時各有增損今具增損于后

春倍川芎一日春二日脈夏倍芍藥脈一日夏二日秋倍地黃一日秋二日脈冬倍當歸脈一日冬二日

春倍川芎一日春二日脈夏倍芍藥脈一日夏二日秋倍地黃一日秋二日脈冬倍當歸脈一日冬二日

而不此常服順四時之氣而有對証不愈者謂失其輔也

春防風四物加防風夏黃芩四物加黃芩秋天門冬四物加天門冬冬桂枝四物加桂枝此四時常服隨證用之也如血虛而腹痛微汗而惡風四物加茂桂謂之腹痛六合如風虛眩暈加秦芫羌活謂之風六合如氣虛弱起則無力匡然而倒加厚朴陳皮謂之氣六合如發熱而煩不能安卧者加黃連梔子謂之熱六合如虛寒脈微氣難布息不渴清便自調加乾薑附子謂之寒六合如中濕身

沉重無力身涼微汗加白木茯苓謂之濕六合此婦人常病及產後病通用之藥也治婦人虛勞局方中謂之首尾六合大聖散下熱乾地黄丸是治無熱虛勞專其養也中道藥也牡丹煎丸空心食前人參荆芥散臨臥食後是治有熱虛勞藥也

枳殼三兩 黃芩兩

右為籠末每服半兩水一盞半煎一盞去滓溫服

治產前脹滿身體沉重枳殼湯中加白木一兩

治產前寒熱小柴胡湯中去半夏謂之黃龍湯

生地黄各等 熟地黄各等

右為細末加白木枳殼湯調下一兩日二服

治有孕胎痛地黄當歸湯

當歸兩 熟地黄兩

右為籠末作一服水三升煎至升半去滓頓服

束胎丸

白木 枳殼去穢炒

右為末燒飯為丸如桐子大又月一日食前服三五十九溫熱水下胎瘦易生也服至產則已

產間藥

治胎衣不下或子死腹中或血衝上昏悶或血暴下及胞乾而不能產者宜服半夏湯

半夏二兩 桂錢半 大黃銖 桃仁三十個

右為細末先服四物湯三兩服次服半夏湯三錢生薑三片水一盞煎去三分食後如未効次服下胎丸

下胎丸

半夏生

白斂各半兩

右為細末。滴水為丸。如桐子大。食後用半夏湯下三二丸。續續加至五七丸。如有未効者。須廣大其藥。榆白皮散主之。又不効。大聖散主之。有宿熱。人宜服人參荊芥散。

產後藥
治產後經水適斷。感于異証。手足牽搐。咬牙昏冒。宜增損柴胡湯。

柴胡四錢

黃芩細錢

人參錢

半夏錢

石膏四錢

知母錢

黃耆錢

甘草四錢

右為籠末。每服半兩。生薑五片。棗四個。水一盞半。煎至一盞。溫服。清無時。

前証已去。次服秦芫湯。去其風邪。

秦芫錢

人參錢

防風半錢

芍藥兩

柴胡錢

黃芩半錢

半夏錢

甘草四錢

右為籠末。每服五七錢。水一盞。煎至七分。溫服。清無時。二三日。經水復行。前證退。宜服荊芥散。小柴胡小料中。加荊芥穗五錢。枳殼五錢。麩炒。去穢。同小柴胡湯煎服。三二日後。宜正脾胃之氣。兼除風邪。宜服防風湯。

蒼朮兩

防風兩

當歸半兩

羌活半兩

右為粗末。每服一二兩水。三盞。煎至一盞半。取清。續續常服。無時。

凡胎前之藥。無犯胎氣。產後變化。並同傷寒。壞証盡從。加減四物湯調治。

治產後腹大。堅滿。喘不能卧。白聖散。

樟柳根兩

大戟半兩

甘遂炒一兩

右為極細末。每服二三錢。熱湯調下。取大便宣利為度。此藥王水氣之勝藥也。

治產後風氣在表面目四支浮腫宜加減局方中七聖丸每服二十九丸白湯下日加三四丸以利為度如浮腫喘嗽加水香檳榔倍之謂氣多浮則腫如頭目昏冒加羌活川芎謂多風也止口浮腫依七聖丸本方服之

治產後日久虛勞雖日久而脘浮疾者宜服三元湯

柴胡錢 黃芩 人參 半夏洗 甘草各三錢 芍藥

當歸錢半 川芎三分

右為籠末同小柴胡湯煎服

治日久勞虛微有寒熱脈沉而浮宜柴胡四物湯

川芎 熟地黃 當歸 芍藥各半 柴胡 人參 黃芩

甘草 半夏麴以上各

右為籠末同四物煎服

如日久虛勞鍼灸小藥俱不効者宜服三分散

白朮 茯苓 黃耆 川芎 芍藥 熟地黃 當歸各一

柴胡六錢 黃芩六錢 半夏錢 甘草錢

右為籠末每服一兩水一盞煎至半盞溫服清日一服

治產後虛勞不能食宜十全散

白朮 茯苓 黃耆各二 人參 川芎 芍藥 熟地黃

當歸各一 桂半兩 甘草半兩

右判如麻豆每服半兩水一盞半入生薑五片棗三枚同煎至七分空心食前溫服清

凡虛損病者淺深治有次第虛損論中詳論之

治產後諸風痿攣無力血風湯。

秦艽 羌活 防風 白芷 川芎 芍藥 當歸

地黃 白木 茯苓各等 右為細末一半煉蜜丸如桐子大一半散溫酒調下九子五七十九甚妙。

治產後諸積不可攻當養陰去熱其病自退宜服芍藥湯。

芍藥斤 黃芩 茯苓各六

右三味為籠末每服半兩水煎日三服去滓溫服。

治產後兜枕大痛黑白散 烏金石燒紅醋七通 寒水石燒存

石二味各等分另頓放臨服各抄末一錢半粥飲湯下痛止便不可服未止再服大効。

治產後不煩而渴桃花散

新石灰兩 黃丹錢

右細末渴時冷漿水調一錢服。

治產後衝脹胸中有物狀是噎氣不降紫金丹

代赭石 磁礪石各等

右為細末醋糊為丸如桐子大每服三五十丸

下胸中痛加當歸湯下久服治血癖

又方

代赭石兩 桃仁三錢炒 大黃錢五

右為末薄荷水為糊丸如桐子大每服三五十丸溫水下無時。

治臍腹痛不可忍四物湯一兩加玄胡三錢半

治血癖腹痛及血刺腰痛四物湯細末二兩加酒煮玄胡細末三兩每服三錢酒調下

治血運血結血聚於胸中或偏于少腹或連于肋脇四物湯四兩倍當歸川芎加鬼箭紅花玄胡各一兩同為末如四物湯煎服取清調沒藥散服之

沒藥散

蝨虫一錢足羽炒水蛭一錢炒麝香一錢 沒藥三錢

右為細末煎前藥調服血下痛止只服前藥

治產後頭痛血虛痰癖寒厥皆令頭痛加減四物湯

羌活 川芎 防風 香附子炒 白芷已酥 石膏二兩 細辛錢

當歸錢五 熟地黃兩 甘草錢五 蒼朮錢一兩六

右為籠末每服一兩水煎服無時如有汗者是氣時頭痛也方中加芍藥三兩桂一兩半加生薑煎如痰癖頭疼加半夏三兩茯苓一兩半加生薑煎如熱厥頭痛又加白芷三兩石膏三兩知母一兩半寒厥頭痛如天麻三兩附子一兩半生薑煎

治產後風虛血眩精神昏昧荆芥散

荆芥穗三錢 桃仁皮五錢去尖炒

右為細末溫水調服三錢微喘加杏仁去皮尖炒甘草各三錢

治產前證胎不動如重物下墜腹冷如冰立効散

川芎 當歸各等

右為籠末每服秤三錢水三盞煎至一盞去滓食前服

治婦人胎滿及因事下血枳殼湯

枳殼

枳殼兩

黃芩兩

白朮兩

右為菴末每服五七錢水一盞煎至七分食前空心服

治婦人筋骨痛及頭痛脉弦增寒如瘧宜服風六合湯四物湯四兩加羌活防風各一兩

治婦人血氣上衝心腹肋下悶宜服治氣六合湯

四物四兩加木香檳榔各半兩

治婦人臍下冷腹痛腰脊痛宜服玄胡六合湯

四物內加玄胡苦煉炒各一兩

治婦人氣充經脉月事頻併臍下痛宜芍藥六合湯

四物內倍加芍藥

治婦人經事故行臍腹絞痛宜服八物湯

四物內加玄胡苦煉各一兩檳榔木香各半兩

治婦人經水過多別無餘證

四物內加黃芩白朮各一兩

治婦人經水溢少

四物內加葵花煎

治婦人虛勞氣弱喘嗽胸滿宜氣六合湯

四物內加厚朴一兩製枳實半兩炒

已上煎法並同四物服之

四物主治法

熟地黃 補血如臍下痛非熟地黃不能除此通腎經之藥也

川芎治風瀉肝木如血虛頭痛非芎不能除去此通肝經之藥也
芍藥和血理脾治腹痛非芍藥不能除此通脾經之藥也

當歸和血如血刺痛非當歸不能除如刀刺狀此通心經之藥也

以上四味治法如前一證于四物湯中各加二味用之如少腹痛四物湯四兩加玄胡苦練各一兩
經水暴多四物四兩加黃芩一兩如腹痛者只加黃連如夏月用不去黃芩經水如黑豆水加黃連
黃芩各一兩如經水少而色血和者四物四兩加熟地黃當歸各一兩如經水適斷往來寒熱者先
服小柴胡以去其寒熱後以四物湯調治之如寒熱不退勿服四物是謂變証表邪猶存不能効也
依前論中變証隨証用藥調治之

治婦人血積增損四物湯

四物內加廣茂京三稜桂乾漆皆依法製各加一兩如四物煎服

治婦人產後血昏血崩月事不調達年乾血氣皆治之名曰紅花散

乾荷葉

牡丹花

當歸

紅花

蒲黃炒

右各等分為細末每服半兩酒煎和滓溫服如衣不下另末榆白皮煎湯調半兩立効

治婦人惡物不下

當歸炒

芫花炒

右細末酒調三錢又好墨醋碎末之小便酒調下炒

又治胎衣不下蛇退皮炒焦細末二錢酒調下 諸見血無寒衄血下血吐血溺血皆屬于熱但

血家證皆宜服此藥生地黃散

生地黃

熟地黃

枸杞子

地骨皮

天門冬

黃耆

芍藥

甘草

黃芩

右各等分同判。每服一兩。水一盞半。煎至一盞。去滓。溫服。脈微身涼。惡風。每一兩加桂半錢。吐血者多有此證。

治衄血不止。麥門冬飲子。

麥門冬

生地黄

右等分判。每服一兩。煎服。又衄血先。硃砂。蛤粉。次木香。黃連。大便結下之。大黃。芒硝。甘草。生地黄。溼軟。梔子。黃芩。黃連。可選用。

帶下論附

論曰。赤者熱入小腸。白者熱入大腸。原其本也。皆濕熱結于脈。故津液湧溢。是為赤白帶下。本不病。緣五脈經虛結熱。屈滯于帶。故女子臍下疝痛。而綿綿陰氣中時下也。故經曰。任脈為病。男子內結。七疝。女子帶下。瘕聚。王注曰。任脈自臍上過。帶脈貫于臍上。故男子內結七疝。女子帶下。帶脈起于季脇。章門。如束帶狀。令濕熱寬結不散。故為病也。經曰。脾傳之腎。病名曰瘕疝。小腹寬熱而痛。出白一名曰蠱。所以為帶下。寬屈也。寬結也。屈滯而病熱不散。先以十棗湯下之。後服苦練丸。大玄胡散。調下之。熱去濕除。病自愈也。如女子不月。先瀉心。火血自下也。內經云。二陽之病。發心脾。有不得隱曲。故女子不月。其傳為風消。王注曰。大腸胃發病也。心脾受之心主血。心病則血不流。脾主味。脾病則味不化。味不化則精不足。血不足。故其證不能已。虧則風邪勝。而真氣愈消也。又經曰。月事不來者。胞脈閉也。胞脈屬于心。而絡于胞中。令氣上迫。肺氣不得上通。故月事不來。先服降心火之劑。後服局方中五補丸。後以衛生湯治脾養血氣也。

苦練丸治婦人赤白帶下。

苦練浸酒

茴香炒

當歸

右等分為細末。酒糊丸。如桐子大。每服三五十丸。空心酒下。腰腿疼痛。四物四兩。加羌活防風各

一兩。

衛生湯

當歸

白芍藥各三兩

黃耆三兩

甘草一兩

右為庵末。每服半兩。水二盞煎至一盞。去滓。溫服。空心。如虛者。加入參一兩。

大頭論第三十

夫大頭病者。是陽明邪熱太甚。資實少陽相火而為之也。多在少陽。或在陽明。或傳太陽。視其腫勢。在何部分。隨經取之。濕熱為腫。木盛為痛。此邪見于頭。多在兩耳前後。先出皆主其病也。治之大。不宜藥。速則過其病所。謂上熱未除。中寒腹生。必傷人命。此病是自外而之內者。是血病。况頭部分受邪。見于無邪迹之部。當先緩而後急。先緩者。謂邪氣在上。着無形之分部。既着無形。無所不至。若重劑速下。過其病難已。雖用緩藥。若急服之。或食前或頓服。皆失緩體。則藥不能得除。當徐徐浸漬。無形之邪也。或藥性水形體擬象。皆要不離緩體是也。後急者。謂緩劑已。瀉邪氣入于中。是到陰部。染于有形質之所。若不速去。則損陰也。此終治却為客邪。當急去之。是治客以急也。且治主當緩者。謂陽邪在上。陰邪在下。各本家病也。若急治之。不能解紛而益亂也。此故治主當緩。治客以急者。謂陽分受陰邪。陰分受陽邪。此客氣急。除去之也。假令少陽陽明為病。少陽為邪出于耳之前後也。陽明為邪者。首大腫是也。先以黃芩黃連甘草湯。通炒過煎。少少不住服。或劑畢。再用大黃煨鼠粘子。新瓦上炒香煎藥。成去滓。內芒硝俱各等分。亦時時呷之。無令飲食在前。得微利及邪氣已。只服前藥。如不已。再同前次第服之。取大便利。邪氣即止。如陽明渴者。加石膏。如少陽渴者。加瓜蒌根。陽明行經。升麻芍藥葛根甘草。太陽行經。羌活防風之類。

雷頭風附

夫治雷頭者。諸藥不効。為與證不相對也。夫雷頭者。震卦主之。震仰盂。故子製藥內加荷葉。謂象其

震之形。其色又青。乃述類象形也。當煎局方中升麻湯。

升麻湯

蒼朮

荷葉一个全者

右為細末。每服五錢。水一盞。煎七分。溫服。食後或燒全荷葉一个。研細調煎藥服亦妙。

耳論附

論曰。耳者蓋非一也。以竅言之是水也。以聲言之是金也。以經言之。手足少陽俱會其中也。有從內不能聽者。主也。有從外不能入者。經也。有若蟬鳴者。有若鐘聲者。有若火熾熾狀者。各隨經見之。其間虛實不可不察也。假令耳聾者。腎也。何謂治肺。肺主聲。鼻塞者。肺也。何謂治心。心主真。如推此法。皆從受氣為始。腎受氣于己。心受氣于亥。肝受氣于甲。肺受氣于寅。脾正四季。此法皆長生之道也。

小兒斑疹論第三十一

論曰。斑疹之病。其狀各異。瘡發焮腫于外。屬少陽三焦相火。謂之斑。小兒靨行于皮膚之中。不出者。屬少陰君火也。謂之疹。凡顯斑證者。若自吐瀉者。慎勿治則多吉。謂邪氣上下皆出也。大凡瘡疹首尾皆不可下。恐妄動而生變。此謂少陽通表宣和之也。當先安其裏。以解毒。次微發之。安裏解毒者。謂能安和五臟。防風湯是也。如大便不秘。次微發之。微發之藥。錢氏方甚多。宜選用之。如大便過秘。宜微利之。當歸丸。棗藥。百祥丸是也。初知是斑疹。若便發之。令斑併出。小兒難禁。是使別生他證也。首尾不可下者。首曰上焦。方曰下焦。若已吐利不可下也。便宜安裏藥三五服。不能食大便秘者。內實宜微疎利之。若內虛而利者。宜安裏藥三五服。末後一服。調微發之藥服之。大抵用安裏之藥多。發表之藥少。秘則微疎之。邪氣不併出。能作番次。使小兒易禁也。身溫者順。身涼者逆。則宜服防風湯以和之。

防風湯

防風

地骨皮

黃耆

芍藥

枳殼

荊芥穗

牛旁子 乾兩

右為細末溫水調下。或為麤末煎服二三錢更妙。

治大便秘而內實能食當歸丸

當歸五錢

黃連半錢

大黃錢

甘草錢

先將當歸熬作膏子入藥三味為丸漸次服十九

治癍疹大便秘結棗變百祥丸

大戟去骨

棗三個

右二味用水一椀煎至水盡為度。去大戟不用。將棗焙乾可和剉旋丸。從少至多。以利為度。

五臟病各有所見證

熱則從心寒則從腎嗽而氣上則為肺風從肝瀉從脾假令瀉見嗽而氣上脾肺病也瀉白益黃散合而服之又宜黃芩厚朴湯白木厚朴湯謂脾苦濕肺苦燥氣則上逆也其證先瀉又兼面色黃腸鳴啞啞者是也如見渴熱多者當服厚朴湯不渴熱少者當服白木厚朴湯其他五臟若有兼證皆如此類然更詳後說四時經移用藥

假令春分前風寒也宜用地黃羌活防風或地黃丸及瀉青相間服之春分後風熱也宜用羌活防風黃芩或瀉青丸用導赤散下之立夏之後熱也用三黃丸導赤散夏至後濕熱也宜導赤瀉黃散合而服之或黃芩甘草白木茯苓之類為勝熱之藥立秋後宜用益黃散瀉白散陳皮厚朴人參木香之類秋分後用瀉白散立冬之後地黃丸主之謂腎不受瀉也大凡小兒斑疹已發有瘡有聲音者乃形病氣不病也無瘡無聲音者乃氣病形不病也有瘡而無聲音者是形氣俱病也後一證當清利肺氣八風湯或涼隔散大黃芒硝亦可或如聖湯加大黃或八味羌活湯加大黃此是春時發斑謂之曰風斑耳瘡疹者內經云痛痒瘡瘍皆屬心火斑子者是相君行命三焦真陽氣之所作也若氣入肺變膿胞入肝為水胞自病為斑心乃君火入于皮作癩疹為肺主皮毛心不害肺金此乃

君之德也未瘡而發播而外感風邪內發心熱而發播用茶粉下解毒丸或犀角地黃湯主之已發便稠密形勢如針頭者當輕發其表涼其內連翹麻黃湯主之若斑已發稠密甚而微喘飲水有熱證當以去風藥微下之若出不快清便自調知為在表不在裏當微發之升麻葛根湯主之若有乾黑陷身不大熱大小便澁則知熱在內當煎大黃湯下宣風散身表大熱者表證未罷不可利大便若斑疹已出見小熱小便不利者當利小便已發後有餘毒不散為復有身熱癰瘡之類當用解毒之藥

藥畧第三十二針法附

- | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 牛膝 | 川芎 | 附子 | 荊芥 | 大黃 | 黃連 | 白朮 | 草烏 | 瓜蒂 | 半夏 | 雄黃 | 桂枝 | 羌活 |
| 益補頭大 | 補頭大 | 補頭大 | 清熱利 | 熱實 | 泄心 | 蒼朮同功 | 頭熱行 | 痰治濕 | 痰去 | 風去 | 和表 | 治支節 |
| 脾痛陽火 | 痛陽火 | 痛陽火 | 及 | 實 | 心 | 功 | 行 | 在上 | | | | 太 |
| 茯苓 | 地黃 | 朴硝 | 烏梅 | 厚朴 | 白茯苓 | 陳皮 | 南星 | 赤豆 | 柴胡 | 白芷 | 麻黃 | 防風 |
| 命益足補 | 補去燥 | 寒助胃 | 肉助脾 | 治脹滿 | 治渴利 | 氣治風 | 治風痰 | 治熱往 | 治少陽 | 治頭痛 | 治經汗 | 治通風 |
| 門火道衰 | 下真陰 | 飲食 | 飲食 | 滿 | 利 | 痰 | 痰 | 來 | 厥陰 | 大 | 大 | 大 |
| 沙 | 草解 | 梔子 | 沉香 | 黃耆 | 亭慮 | 枳實 | 天麻 | 杏仁 | 芍藥 | 知母 | 桃仁 | 甘草 |
| 疾梨 | 補腎 | 補行小 | 和氣 | 止肝 | 火瀉肺 | 下治心 | 治風頭 | 潤除燥 | 止脾痛 | 助泄腎 | 破血 | 和中 |
| 真補陰 | 腎 | 便氣 | 氣 | 治 | 治 | 治 | 治 | 治 | 治 | 治 | 治 | 治 |
| 破故紙 | 杜仲 | 當歸 | 肉豆蔻 | 檳榔 | 桔梗 | 枳殼 | 神麴 | 蒼朮 | 人參 | 石膏 | 黃芩 | 肉桂 |
| 補命門 | 壯骨 | 補三陰 | 治大腸 | 破行氣 | 利治喉痛 | 氣治胸痞 | 強消食 | 溫中 | 補氣 | 明大涼 | 瀉火 | 通氣 |
| 足命門 | 骨 | 陰 | 腸 | 痛 | 痛 | 痞 | 胃 | 濕 | 氣 | 藥 | 是 | 氣 |

五味子補五臟氣不足

蛟蛇去風燥

乾薑和中氣

澤瀉利少陰及膀胱中有留垢

巴豆去濕之過藥

茴香去濕寒助陽

生地黄去濕寒助陽

細辛少陰頭痛不足

苦練子去小腹痛和血

沒藥除勝藥也

井麻陽明經去積藥

廣茂去積藥

地榆治下部有血

形色性味體
形色性味體
輕枯虛薄緩淡假宜上厚重實潤深真急宜下其中平者宜
中餘形色性味皆隨藏府所宜此處方用藥之大醫耳知者
用心則思過半矣

流注鍼法

心痛沉腎經原穴 弦肝經原穴 溢肺經原穴 浮心經原穴 緩脾經原穴
腰痛身之前足陽明原穴 衝陽身之後足太陽原穴 京骨身之側足少陽原穴 丘墟

針之最要

兩脇痛針少陽經丘墟。心痛鍼少陰經太谿湧泉及足厥陰原穴。腰痛不可忍針崑崙及刺委中出血太陰喘滿痰實口中如膠鍼太谿穴。噦嘔無度針手厥陰太陵穴。頭痛不可忍針足厥陰太陽經原穴。熱無度不可止刺陷骨穴出血。骨熱不可治前板齒乾燥當灸骨會大椎。小腹痛當刺足厥陰肝經太衝穴。血不止鼻衄大小便皆血崩當刺足太陰并隱白。喉閉刺少陽手足并刺少商及足太陰并。大煩熱晝夜不息刺十指間出血謂之八關大刺。目疾睛痛欲出亦大刺八關。百節疼痛實無所知。三稜針刺絕骨出血。

眼大背痛刺手太陽并冗少澤

小背痛刺少陽并冗闕衝

陰頭中痛不可忍者卒疝也婦人陰中痛皆刺足厥陰并大敦冗

緊問元氣五行稽考

珞珠子云天元一氣定侯伯之遷榮蓋論元氣也許員曰水瘦金方火尖水肥土厚蓋論五行以元氣為根富貴壽夭係之由有厄羸而壽考亦有壯盛而暴亡元氣固藏則厄羸而無害及其散慢則壯盛而愈危是以元氣為根本五行為枝葉夫元氣者冗之位也元始之祖先天地生圓而無隙寂而不動感而遂通虛而生神乾體成焉乾為天一生水故一水二火三木四金五土五行形焉四方之民均受元氣一也及其生焉各類五行形體殊異是故西方之民金水象金方水肥人方正肥厚東南之人木火象木瘦火尖人多瘦長尖小北人肥南人瘦理宜然也北人賦性沉厚體貌肥上長下短頭骨大腰骨小此本體也若光明磊落落機見疾速腰背豐隆者氣氣固藏富貴壽考坎中藏真火升真水而為雨露也南人賦性急暴體貌尖瘦下長上短頭骨偏腰骨輒此本體也若寬大度機謀詳緩腦額圓聳元氣固藏富貴壽考離中藏真水降真火而為利氣也又有南人似北人北人似南人不富則貴以此推之要在察元氣觀五行分南北定壽夭則故守有方調養有法不妄藥人似亦猶有刑漕總其權使執法者不私巡禁者申具禁使出塗者不擾朝廷在于上明賞罰于百官施利氣於萬民故君得以尊無為而治天下和平災害不生君臣和于上百官和于朝萬民和于下庶物和于野馴而行之子萬年計也醫者明方術制法度以療民病養性之藥防其漸也猶巡尉也治病之藥誠其毒猶守令也保命之藥濟其弱猶漕憲也延年之藥防其危猶朝廷也良工總其要明虛實于三部調和氣于百骸故心得以寧神得以清則四大和平疾患不生神氣和于上五藏和于中步履和于下脉絡和于體馴而行之不死之道也人之生也自幼而至壯自壯而老血氣盛衰

其各不同不可一槩治之六歲至十六歲者和氣如春日漸滋長內無思想之患外無愛慕之勞血氣未成不勝寒暑和之違也膚腠疏薄易無感冒和之傷也父母愛之食飲過傷其治之道節飲食適寒暑宜防微杜漸行巡尉之法用養性之藥以全其真二十歲至五十歲和氣如夏精神鼎盛內有思想之患外有愛慕之勞血氣方剛不畏寒暑和之違也勞傷筋骨官犯八邪和之傷也以酒為漿醉以八房其治之道辯八邪八勞使行守令之法宜治病之藥當敵其毒以全其真五十歲至七十歲者和氣如秋精耗血衰血氣凝泣思慮無窮形體傷憊和之違也百骸疎漏風邪易乘和之傷也風雨晦明飲食遲進其治之道順神養精腑和臟行憲漕之權施賑濟之法守令內恤巡尉外護宜保命之藥以全其真七十歲至百歲者和氣如冬五臟空洞猶蛻之蟬精神浮蕩筋骨沮弛和之違也觸物易傷衣飲厚薄和之傷也大寒振慄大暑煎燔其治之道餐精華處奧庭行相傳之道變理陰陽周流和氣宜延年之藥以全其真天如是則調御中節治瘡得陰陽協和榮衛流暢凡厥有生同躋壽域矣乎

諸吐方法三十四

仲景云傷寒三四日邪氣未傳于裏其邪氣在上用瓜蒂散吐而差豈可俟其汗又云傷寒六七日胸中微痞不能言懊憹昏眩無下證仲景用梔子豉湯吐之立可又忽然中風不知人事亦不須汗喉中呬呬之聲用稀涎散吐之亦可又有小兒驚風潮搐手足掣縮用驗命散吐之又云風頭痛經云若不吐涎久則瞽目而不治用瓜蒂散吐之三吐而差又暴嗽風涎上壅咽噎不利用茶調散吐之

又陽癇久不愈未成痼瘕用導涎散吐之

又陰癇用二聖散吐之

又膏粱之人食物多食生膾胸中不下化蟲伏于胸中胸膈不快噎食不下用藜蘆散吐之

又久病患脇痛諸藥莫能治用獨聖散加蝎稍半錢吐之

諸癩不時發作不知人事用半生半熟湯吐之

暗風病久不差發過如故用礬金散吐之

痰瘧久不差發寒熱無時用常山散吐之

蛟龍瘻痛腹脹如虫用棗糖散吐之

人初患傷食或用冷身腹悶亂身熱見食則嘔用赤小豆散吐之

婦人筋攣骨痛用神應散吐之

或曰筋病吐之為何答曰木鬱達之所謂達者令其條達也或又有打撲墜墮先吐之用金花散後

下之用承氣湯蓋承者順也

偏枯證半身不遂是也用追風散吐之須風後有自疾眼有半明可救之用防風湯吐之

小兒上喘朝熱先用蔚金散吐之後用鎮亭散下之立効

治癩狂病久不用三聖散吐之後大下之

風掉搖強直不知人事便可懸豆膏涎出立効

胸膈滿悶皆痛或臂痛可先用祛風湯吐之後服烏藥散厲風或瘡瘍惡瘡使用三聖散吐之後服

苦參丸

諸厥氣厥中風不省人事使用神聖散膏鼻內灌之吐出涎立効

破傷風牙關緊急角弓反張便與神聖散吐之後汗之下之効三法俱用之

又有人患蛟龍瘻痛久不愈故死用棗糖膏吐之吐出其物形如蜥蜴長七八寸立可吐法者上古高醫用之今庸下之流止看諸方不知治法不識病源即不行聖人之法去聖遠矣可不恐歟

治黃腫詩曰

白酒煎飛麵。青礬百草霜。依方泡製作。消却幾多黃。

綠礬四兩 五倍子 百草霜一兩 木香 二錢

右為細末。用酒煎飛麵為丸。如梧桐子大。每服五丸。空心酒下。二三服。

又方。平胃散四兩。青礬二兩。醋糊為丸。米飲下。

又方。平胃散烏沉湯。四兩。青礬二兩。酒糊為丸。

又方。好川當歸四兩。用浮子酒浸七日。青礬四兩。製煨赤色。成朱子為細末。百草霜一兩。同研。

細用當歸酒同研細。為丸。如梧桐子大。每服五丸。至七丸。服後一月。黃去立効。此方祖傳七世。

治諸氣腫茯苓散

芫元醋水 澤瀉 郁李仁 甜亭力 漢防己 藜本各二錢半 陳皮去白

右為細末。每服一錢。濃煎雙白皮湯。空心調下。取下碧綠水。如烟羊脂即効。如未盡。隔日又服。

腫消不服。忌食鹽一百日。

治癰瘡方。爛至胸前兩腋下有塊。如茄子大。或牽至兩肩上。四五年不能痊者。並皆治之。其驗如神。

常州府武進縣朱守仁傳。其項不能回顧。數日。或可減。可始看瘡爛破胸前者。用荊芥根。

一段。鋪碎煎沸。待溫洗瘡。良久。看瘡爛破處。紫黑。用鍼刺。一出血。再洗。三四次洗。

臭芝麻油。將章腦和雄黃為細末。用油調雞翎掃瘡上。以出水。下次日再洗。仍用煎藥掃。三。

用韭菜地上。蚯蚓糞。五更早晨。收作員虎口大。用炭火上燒。煨紅。取出淨碾為末。每一丸。

百沒藥。輕粉各半錢。少些。穿山甲九片。煨紅色為末。今用芝麻油調敷患處。其妙如神。

蘆湯加心檳榔。

點眼神效紫金膏

輕粉

雄黃

銅青

川芎

龍腦

射香

黃連

硃砂

明砂各三錢

沒藥錢

爐干石兩

童便製七次

黃丹兩

白丁香分

青鹽

海漂錢

當歸

乳香

血竭以上各五錢

硃砂三錢

先將十九味乳製極細無聲

白砂密一斤。先將黃連末熬後。下爐干石黃丹前日用槐枝攪不住手。煎如紫色。用磁器盛。用油紙七片封口。置上。內去火十日。方用神効。

Last page

素問病機

卷下

圍棋新譜

布局詳解

上海三馬路

我國有名棋譜雖多而最新出版者甚罕此書本係日本圍棋大名
家八段先生所評經我國現廬上
海吳祥麟名手照日本原書譯成
華文新譜一切攻守救劫諸法至
周至密而又翻空出奇足與我國
桃花泉寄青霞館諸名譜相仲伯
誠弈界不可不備之寶笈也上等
中國連泗紙精印每部裝訂二大
冊外加錦套定價洋貳元五角

千頃堂發行

二十

桃花泉

每部二本
定價四角

四子譜


每部二本
定價四角

官子譜

每部一本
定價二角

弈萃官子

每部二本
定價四角



L7832

1909

v. 6