


千金要方

附衍義
江左書林印

10




Chinese

Vol X

V. 17 - V. 18

10



孫真人備急千金要方卷十七

長洲張潞路玉衍義
南沙席世柱郢客校

肺臟方凡八類

肺臟脈論第一論一首

論曰肺主魄魄藏者任物之精也為上將軍使在上行所以肺為五臟之華蓋並精出入謂之魄魄者肺之臟也鼻者肺之官肺氣通於鼻鼻和則能知香臭矣循環紫宮上出於頰候於鼻下迴肺中榮華於髮外主氣內主胸與乳相當左乳房右乳辛肺重三斤三兩六葉兩耳凡八葉有十四童子七女子守之神名鴻鵠主藏魄號為魄藏隨節應會故云肺藏氣氣舍魄在氣為效在液為涕肺氣虛則鼻息利少氣實則喘喝胸憑仰息肺氣虛則夢見白物見人斬血藉藉得其時則夢見兵戰肺氣盛則夢恐懼哭泣厥氣客於肺則夢飛揚見金鐵之器及奇物凡肺藏象金與大腸合為腑其經手太陰與陽明為表裏其脈浮相於季夏王於秋秋時萬物之所終宿葉落柯萎枝條兀然獨在其脈為微浮衛氣遲榮氣數數則在上遲則在下故名曰毛陽當陽而不陷陰當昇而不昇為邪所中二氣感激故為風寒所中陽中邪則捲陰中邪則緊捲則惡寒緊則為慄寒慄相搏故名曰瘡弱則發熱浮乃來出旦中發暮中暮發藏有遠近脈有遲疾周有度數行有漏刻遲在上傷毛采數在下傷下焦中焦有惡則見有善則匿陽氣下陷陰氣則溫陽反在下陰反在顛故名曰長而且留秋脈如浮秋脈肺也西方金也萬物之所以收成也故其氣來輕虛而浮來急去散故曰浮反此者病何如而反其氣來毛而中央堅兩傍虛此謂太過病在外其氣來毛而微此謂不及病在中太過則令人氣逆而脊痛悶悶然不及則令人喘呼吸少氣而效上氣見血下聞病音肺脈來廉廉聾聾如落榆英曰肺平秋以胃氣為本肺脈來不上不下如循雞羽曰肺病巢源無肺字脈來如物之浮如風吹毛曰肺死真肺脈至大而虛如以毛羽中人膚色白亦不澤毛折乃死秋胃微毛曰平毛多胃少曰肺病但毛無胃曰死毛而有弦曰春病弦甚曰今病肺藏氣氣舍魄喜樂無極

則傷魄魄傷則狂狂者意不存人皮革焦毛憚色大死於夏 手太陰氣絕則皮毛焦太陰者行氣溫皮毛者也氣弗營則皮毛焦皮毛焦則津液去津液去則皮節傷皮節傷則爪一作枯毛折毛折則氣先死丙爲丁死火勝金也 肺死藏浮之虛按之弱如葱葉下無根者死秋金肺王其脈微溫而短曰平反得大而緩者是脾之乘肺母之歸子為虛邪雖病易治反得沉濡而滑者是腎之乘肺子之乘母為實邪雖病自愈反得浮大而洪者是心之乘肺火之旺金為賊邪大逆十死不治反得弦細而長者是肝之乘肺木之陵金為微邪雖病卽瘥肝乘肺必作虛 右手關前寸口陰絶者無肺脈也苦短氣欬逆喉中塞噫逆刺手陽明治陽 左手關前寸口陰實者肺實也苦少氣胸中滿膨脹與肩相引刺手太陰治陰肺脈來泛泛輕如微風吹鳥背上毛再至曰平三至曰離經病四至曰脫精五至死六至命盡手太陰脈也 肺脈急甚為癲疾微急為肺寒熱急惰欬唾血引腰背胸苦裏息肉不通緩甚為多汗微緩為痿漏風偏風頭已下汗出不可止大甚為脰腫微大為肺痺引胸背起腰內小甚為飧泄微小為消痺滑甚為息晝上氣微滑為上下出血清甚為嘔血微濁為鼠瘻在頸腋腋之間下不勝其上其能喜酸 肺脈搏堅而長當病唾血其濡而散者當病漏一作灌汗至今不復發散白脈之至也喘而浮上虛下實繁有積氣在胸中喘而虛名曰肺痺寒熱得之醉而使之內也 黃帝問曰經脈十二而手太陰之脈獨動不休何也手太陰本在寸口中岐伯對曰足陽明胃脈也胃者五臟六腑之海胃脈在足趺上大趾間上行三寸骨解中是也其精氣上清注於肺肺氣從太陰而行之其行之也以息往來故人一呼脈再動一吸脈亦再動呼吸不已脈動不止黃帝問曰氣口何以獨為五臟王岐伯對曰胃者水穀之海六腑胃居其大五味入於口藏於胃以養五臟氣氣口者太陰是也臟腑之氣味皆出於胃變見於氣口氣口屬腑臟王卽呼寸口者也 扁鵲曰肺有病則鼻口張實熱則喘逆胸懶仰息其陽氣壯則夢恐懼等虛寒則欬息下利少氣其陰氣壯則夢涉水等 肺在聲為哭在變動為欬在志為憂憂傷肺精氣并於肺則悲也 味主秋結滿而血者病在胸及以飲食不節得病者取之合故命曰味主合 病先發於肺喘欬三日之肝腸痛支滿一日之

脾閉塞不通身痛體重五日之胃腹脹十日不已死冬日入夏日出 痘在肺下 暑慧日中甚夜半靜
假令肺病南行若食馬肉及麋肉得之不者當以夏時發得病以丙丁日也宜亦藥 凡肺病之狀必喘
欬逆氣肩息背痛汗出尻陰股膝繫髀脛肺足皆痛虛則少氣不能報息耳聲嗌乾取其經手太陰足太
陽之外厥陰內少陰血者 肺脈沉之而數浮之而喘苦洗洗寒熱腹滿腸中熱小便赤肩背痛從腰以上
汗出得之房內汗出當風 肺病其色白身體但寒無熱時時欬其脈微遲為可治宜服五味子大補
肺湯瀉肺散春當刺少商夏刺魚際皆瀉之季夏刺大淵秋刺經渠冬刺尺澤皆補之又當灸膻中百壯
第三椎二十五壯 邪在肺則皮膚痛發寒熱上氣氣喘汗出欬動肩背取之膺中外腧背第三椎之傍
以手重按之快然乃刺之取之缺盆中以越之 形寒寒飲則傷肺以其兩寒相感中外皆傷故氣逆而上
便如鳴塘 肺脹者虛而滿喘欬目如脫狀其脈浮大 太陽脈浮緩少陽脈微緊緩為血虛緊為微寒
行肺氣傷其人勞倦則欬唾血其脈細緊浮數皆吐血此為躁擾嗔怒欬逆肺傷氣擁所致也 肺中風
者口燥而喘身運而重冒而腫脹 肺中寒者其人身體腫而小便難時時大便如鳴塘 此為鼠乳 診得肺積脈浮而毛按之辟易脇下時時痛逆背相引痛少氣善忘目瞑結癰皮膚寒秋愈
夏劇至皮中時痛如蟲緣之狀甚者如鍼刺之狀時癢色白也 肺之積名曰息竇在右脇下覆大如杯
久久不愈病灑灑寒熱氣逆喘欬發肺癰以春甲乙日得之何也心病傳肺肺當傳肝肝適以春王王者
不受邪肺復破還心心不肯受因留結為積故知息竇以春得之 肺病身當有熱欬嗽短氣唾出膿血
不受邪肺復破還心心不肯受因留結為積故知息竇以春得之 商音人者王肺聲也肺
其脈當短濶今反浮大其色當白而反赤者此是火之魁金為大逆十死不治 麻黃續命湯主之 方見第八卷
賊風篇 又言音喘急短氣好唾此為火魁金陽擊陰陰氣沉陽氣升升則實實則虛則厲風所中噓吸戰掉語聲嘶塞而散下氣息短促四肢辟弱面色少華遺失便利甚則不可治依源
熱執則狂狂則閉眼悖言非常所說口亦而張飲無時度此熱傷肺肺化為血不治若面赤而鼻不欹可

千金要方

卷十七

二

治也。肺病為瘧者令人心寒寒甚則熱熱間善驚如有所見者恒山湯主之方見第十卷溫瘧篇若其人本來語聲雄烈忽爾不亮御氣用力方得出言而及於常人呼共語直視不應雖曰未病勢當不久此則肺病聲之候也察觀疾病表裏相應依原審治乃不失也。白為肺肺令皮白如豕膏者吉肺主鼻鼻是肺之餘其人金形相比於上商白色小頭方面小肩背小腹小手足發動身輕精瘦急心靜悍性毒為吏治秋冬不耐春夏春夏感而生病主手太陰廉廉然肩膺厚薄正殊則肺應之正白色小理者則肺小小則少飲不病喘喝粗理者則肺大大則虛虛則寒喘鳴多飲善病胸喉痹逆氣巨肩反膺陷喉者則肺高高則實實則熱上氣肩急欬逆合腋張脇者則肺下下則逼竚迫肝善脇下痛鼻塞或壅而涕生息肉好肩背厚者則肺堅堅則不病欬上氣肩背薄者則肺脆脆則易傷於熱喘息臭劖肩膺好者則肺端正端正則和利難傷膺偏欹者則肺偏傾偏傾則病胸偏痛鼻亦偏疾凡人分部陷起者必有病生大腸陽明為肺之部而藏氣通於外部亦隨而應之沉濁為內浮清為外若外病內入則所部起內病裏出則所部陷外入前治陽後治陰內出前治陰後治陽實瀉虛補陽主外陰主內凡人死生休否則藏神前變形於外人肺前病鼻則為之孔閉焦枯若肺前死鼻則為之梁折孔閉青黑色若天中等分墓色應之必死不治看色深淺斟酌賸促遠不出一年促不延時月肺疾少愈而卒死何以知之曰赤黑如母指蹙點見頰頰上此必卒死肺絕三日死何以知之口張但氣出而不還面白目青是謂亂經飲酒當風入肺經膽氣妄泄目則為青雖有天救不可復生面白黃目白如枯骨死吉凶之色在於分部順順而見赤白入鼻必病不出其年若年上不應三年之中禍必應也。秋金肺脈色白主手太陰脈也秋取經輸秋者金始治肺將收殺金將勝火陽氣在合陰氣初勝濕氣及體陰氣未盛未能深入故取肺以瀉陰邪取合以虛陽邪陽氣始衰故取於合其脈本在寸口之中掌後兩筋間二寸中應在腋下動脈其脈根於太倉太倉在臍上三寸一分是也。其筋起於手太指之上循指上行結於魚後行寸口外側上循臂結肘中上臑內廉入腋下上出缺盆結肩髃前上結缺盆下結胸裏散貫膏下抵季脇其脈起於中焦下絡大腸還循胃口上

膈屬肺從肺系橫出腋下循臑內行少陰心主之前下肘中後循臂內上骨下廉入寸口上魚循魚際出大指之端其支者從腕後直次指內廉出其端合手陽明為表裏陽明之本在肘骨中同會於手太陰太陰之別名列缺起於腋下分間並太陰之經直入掌中散入於魚際別走手陽明主肺生病病實則大腸熱熱則手兑掌起起則陽病陽脈反逆大於寸口三倍病則欬上氣喘渴煩心胸滿膕臂內前廉痛掌中熱氣盛有餘則肩背痛風汗出中風虛則大腸寒寒則久欬小便遺數數則陰病陰脈反小於寸口一倍病則肩背寒痛少氣不足以息季脇空痛尿色變卒遺失無度秋三月者主肺大腸白氣裡病也其源從太陽擊手太陰太陰受淫邪之氣則經絡壅滯毛皮緊豎發泄邪生則臟腑傷溫隨秋受驚其病相反若腑虛則為陰邪所傷乍寒乍熱損肺傷氣暴噦嘔逆若臟實則為陽毒所損體熱生斑氣喘引飲故曰白氣裡病也扁鵲曰灸心肝二腧主治丹毒白裡病當依源為療調其陽理其陰則臟腑之病不生矣

肺虛實第二

灸法三首 方二十首

肺實熱右手寸口氣口以前脈陰實者手太陰經也病苦肺脹汗出若露上氣喘咽中塞如欬嘔狀名曰肺實熱也

治肺實熱胸懶仰息泄氣除熱方 石膏八兩白前 杏仁研三白朮 橘皮研五枸杞根皮研二赤蜜七合右七味㕮咀以水七升煮取二升去滓下蜜煮三沸分三服

行義

肺為天一生水之上源脾為厚土生金之肺母令因肺過熱燥不能施白露下降之令故用石膏白前赤蜜滋降秋燥杏仁橘皮枸杞根皮泄其逆滿尤妙在白朮一味培土安金填塞壯火遊行之路庶幾全不受鑠水能承制而無陰火土協心包逆乘母氣之虛設不預為籌度專力耗氣泄火未免熱去寒起則與時師奚擇哉

治肺熱悶不止胸中喘急驚悸客熱來去欲死不堪服藥泄胸中喘氣方 桃皮 芫元研一右二味㕮咀以水四斗煮取一斗五升去滓以故布手巾內汁中薄膈溫四肢不盈數日即歇

衍義 肺合皮毛肺氣內壅已極不堪更以湯藥助滿故用破血導水之味瀆布搭胸使藥氣內通濁氣外泄乃奇兵解圍之策從十三篇中悟出

橘皮湯 治肺熱氣上欬息奔喘方 橘皮 麻黃 柴胡 紫蘇

刪繁作乾
藍各三兩

杏仁

宿薑各四兩

石膏

八兩

橘皮

右七味㕮咀以水九升煮麻黃兩沸去沫下藥煮取三升去滓分三服不瘥與兩劑

衍義

肺滿上氣喘欬本當用麻黃越婢麻杏甘石等方慮其甘草大棗助滿故易橘皮紫蘇以散

上奔之氣膽欲大而心欲小之作用略見一斑

治肺熱喘息鼻衄血方

羚羊角 元參 射干

雞蘇

芍藥

升麻

柏皮

各三兩

生地

切一

梔子仁

四兩

淡竹茹

雜子大一枝

右十味㕮咀以水九升煮取三升分三服須利者下芒硝

三兩

更煮三沸

衍義

肺熱喘効良由龍雷煽虐反侮肺金之象故用羚羊入肝散血射干入肺散氣梔子柏皮分解

於內升麻雞蘇開提於內芍藥地黃順血下注元參竹茹抑火前通若勢劇須利者下芒硝以急奪之

自然龍火潛蹤金不受侮烏有喘効之患乎

治肺熱飲酒當風風入肺膽氣妄泄目青氣喘者方

麻黃

四兩

甘草

五味子

各三兩

杏仁

五十粒

母薑

五兩

橘皮

淡竹葉

半升

右六味㕮咀以水七升先煮麻黃去沫下諸藥者取三升去滓分三服

衍義

前方以梔子柏皮佐羚羊散上溢之血升麻雞蘇佐射干散上盛之氣此方以竹茹杏仁佐脈

開發肺氣五味甘草佐母薑收攝膽泄膽寧則目青自除風息則氣喘自己二方所宗總不出梔子柏

皮湯麻黃連翹赤小豆湯射干麻黃湯等方之變法

瀉肺散

治酒客勞倦或出當風喜怒氣舍於肺而目黃腫起卽頭眩欬逆上氣時忽欲絕心下絃急不能飲食或吐膿血胸痛引背支滿欲嘔方

五味子

百部

各二兩

茯苓

附子

肉蔻

石斛

當歸

遠志

川續斷

各一細辛

甘草

各七分

防風

川椒

菖蒲

桂心

乾薑

欵冬

各一兩

桃仁

六十枚

杏仁

三十枚

右十九味治下篩酒服方寸匕日三後稍加至二匕

行義 濡肺而用紫菀款冬，葵苓專為酒客湊肺而設，防風細辛杏仁專為風客於肺而設，五味子部石斛專為不盛生風而設，當歸續斷桃仁專為勞倦傷血胸痛引背而設，甘草乾薑川椒專為飲食欲吐面目黃腫而設，桂附遠志旋覆苓專為起卽頭眩忽忽欲絕上盛下虛而設，苟非固脾胃之根本安能任肺氣之疎泄歟

灸法

肺脹氣滯脇下熱痛灸陰都隨年壯穴在俠胃脘兩邊相去一寸，胃脘在心下三寸。肺脹脇滿嘔吐上氣等病灸大椎，并兩乳上第三肋間各七壯。肺與大腸俱實，右手寸口氣口以前脈陰陽俱實者手太陰與陽明經俱實也。病苦頭痛目眩驚狂喉痹痛手臂捲脣吻不收名曰肺與大腸俱實也。煮散治肺與大腸俱實令人氣憇方：麻黃、葵苓各六分，黃芪、大青、桂心各三分，細辛、杏仁各三分，石膏二兩，丹參半兩，五味子、甘草、橘皮、貝母、川芎各兩分，枳實二枚，右十五味治下篩為粗散，帛裹一方寸匕半以井花水一升五合煮取七合為三服。日再

衍義

邪之所湊其氣必虛故治肺與大腸俱受客邪而實用麻黃湯及麻杏甘石湯之製以解風從火化之熱必兼五味以收肺氣之逆，黃芪以斂麻黃之散其餘等味皆疎泄耗氣之品耳。

肺虛冷 右手寸口氣口以前脈陰虛者手太陰經也。病苦少氣不足以息，嗌乾不津液名曰肺虛冷也。治肺虛冷聲嘶傷語言用力戰掉緩弱虛寒風入肺方：防風、獨活、川芎、秦椒、乾薑、黃芪各四分，天雄、麻黃、山萸肉、五味子各三分，甘草三十六分，秦艽、桂心、山藥、杜仲、人參、細辛各一錢，菊花、紫菀各二十錢，防己一錢，甘草六分，共二錢。貫眾二枝，附子七分，右二十二味治下篩以酒服方寸匕日二服。一方有石膏六分當歸五分。

衍義

風入肺絡而致聲嘶語難用力戰掉故用麻黃附子細辛開發肺寒，防己貫眾通行經脈，參芪甘草保護肺氣，雄桂椒薑協濟附子之雄，防獨芳秦助力麻辛之散，萸味薯桂匡扶參芪之補，甘菊紫

菀專化雄附之烈其方似乎龐雜而實井井有條各具相制之妙非洗心求之不能得其奧義
酥蜜膏酒治肺氣虛寒虧風所傷語聲嘶塞氣息喘欬欬唾上氣通聲方 酥 崖蜜 餘糖 生薑

汁 生百部汁 藉肉 杏仁酪一柑皮五具右八味合和微火煎常攪三上三下約一炊久取薑汁等各減半止溫酒一升服方寸匕細細咽之日二夜一〇又方 猪脰三具大棗一百枚右二味以酒五升漬之秋冬七日春夏五日出布絞去滓七日服盡二七日忌鹽羊脰亦得治欬嗽胸膈支滿多喘上

氣尤良附后方治久欬上氣二十年諸治十痊者

治肺寒損傷氣嗽及涕唾鼻塞方

棗肉

二斤研

杏仁

二升研為脂酥

千金要方

卷十七

五

摩子湯 治肺氣不足欬唾膿血氣短不得卧方 麻子一升桑皮

錫各一斤桂枝

人參各二兩阿膠

紫菀各一兩

生薑三兩

乾地黃四兩

右九味㕮咀以水一斗五升合煮取四升分五服

行義

此灸甘草湯之變方因欬唾血膿肺中津傷故用人參阿膠地黃麻仁以滋津血之燥生薑桂

枝以散肺氣之結紫菀卽甘草之變味桑皮卽麥冬之變味錫糖則大棗之變味耳

錫煎 治肺氣不足咽喉苦乾方 作錫任多少取乾棗一升去核熟搗水五升和使相得絞去滓澄去

上清取濁者內飴中攬火上煎勿令堅令連服如雞子大漸漸服之日三夜二

行義

肺胃一氣貫通肺氣不足實由胃中津枯不能上滋於肺所以咽喉苦乾但取建中湯中之二

以資胃氣而助蒸化之力也

治肺風氣萎絕四肢滿脹喘逆胸滿方 灸肺腧各二壯肺腧對乳引繩度之在第三椎下兩傍相去

各一寸五分

肺與大腸俱虛

右手寸口氣口以前脈陰陽俱虛者手太陰與陽明經俱虛也病苦耳鳴嘈嘈時妄見

光明情中不樂或 恐怖名曰肺與大腸俱虛也

小建中湯 治肺與大腸俱不足虛寒乏氣小腹拘急腰痛羸瘠百病方 大棗十二枚生薑

桂心各二兩

甘草二兩

芍藥六兩

右五味㕮咀以水八升煮取三升去滓合飴糖八兩煮三沸分三服

附後用黃芪人參各二兩

名黃芪

建中湯

行義

桂木血藥而辛溫散邪恐其動血故以芍藥護持榮氣不使隨桂外泄得甘草之甘溫而和寒

熱諸邪薑棗之辛甘而和榮衛諸氣為風傷衛之首方參入膠飴一味取稼穡之甘便為建中專藥所

以寒傷榮之天中脈微虛寒之裏氣不足咸賴乎此充為虛羸和解中外之聖

肺勞第三

灸法一首

方三首

論曰凡肺勞病者補腎氣以益之腎主則感於肺矣人逆秋氣則手太陰不收肺氣焦滿順之則生逆之

則死順之則治逆之則亂反順為逆是為關格病則生矣

麻黃引氣湯 治肺勞實氣喘鼻張面目苦腫方 麻黃 杏仁 生薑 半夏各五分 紫蘇四分 白前

細辛

桂心各三分 橘皮二分 石膏八兩 竹葉切一升 十一味㕮咀以水一斗煮取三升去滓分三服

衍義 勞役而邪升於肺故用金匱厚朴麻黃湯中麻黃石膏杏仁細辛以泄肺滿澤漆湯中半夏生薑白前桂心以滌痰垢參入紫蘇橘皮竹葉以助麻黃半夏石膏之力引清氣上升濁氣下降喘息面腫隨手可瘥矣

半夏湯 治肺勞虛寒心腹冷氣逆氣胸脇氣滿從胸達背痛飲食卽吐虛乏不足方

半夏一升生薑一斤桂心四兩甘草 厚朴各二分 人参 橘皮 大棗三兩 右八味㕮咀以水一斗煮取四升分四服

腹痛加當歸二兩

衍義

勞乏而胸中陽氣不布濁陰上攻逆滿原非本虛之謂故用參桂薑半溫中麥冬甘草滋肺卽兼厚朴橘皮開泄滯氣胸中陽氣得人參薑桂守護之力則濁陰不復上僭矣

厚朴湯 治肺勞風虛令痰澼水氣晝夜不得卧頭不得近枕上氣胸滿喘息氣絕此痰水盛溢方 厚

朴 麻黃 桂心 黃芩 石膏 大棗

橘皮各二分 杏仁 甘草 秦艽 杏仁 茯苓各三分 細辛

衍義

痰澼水氣積於胸中不能眠卧故彙採金匱射干麻黃湯厚朴麻黃湯澤漆湯中泄肺諸味參入大戟與射干澤漆味雖變而功用不殊其餘枳橘茯苓秦艽不過為麻朴薑半之佐輔苟不知金匱

之淵源無以推千金之發派

治喉痺氣逆欬口中唾涎方 灸肺俞七壯亦可隨年至百壯

氣極第四

論一首 痥法二首 方六首

論曰凡氣極者主肺也肺應氣氣與肺合又曰以秋遇病為皮痺皮痺不已復感於邪內舍於肺則寒溫

之氣客於六腑也若肺有病則先發氣氣上衝胸常欲自憇以秋庚辛日傷風邪之氣為肺風肺風之狀多汗若陰傷則寒寒則虛虛則氣逆欬欬則短氣暮則甚陰氣至濕氣生故甚陰畏陽氣晝日則瘥若陽傷則熱熱則實實則氣喘息上胸臆甚則唾血然陽病治陰陰是其裏陰病治陽陽是其表是以陰陽表裏乘王之源故知以陽調陰以陰調陽陽氣實則決陰氣虛則引善治病者初入皮毛肌膚筋脉則治之若至六腑五臟半死矣扁鵲曰氣絕不治奔而冷汗出二日死氣應手太陰太陽氣絕則皮毛焦氣先死矣

鍾乳散

治氣極虛寒陰畏陽氣晝瘥暮甚氣短息塞亦治百病令人力強能飲食去風冷方

鍾乳

乾薑

桔梗

茯苓

細辛

桂心附子

人參各一兩

白朮一兩

防風

桔梗根

杜鵑各半兩

十二味

治下篩酒服方寸匕日三漸加至二匕五十以上可數服得力乃止

行義

氣極虛寒而用鍾附薑桂細辛參苓白朮世所共能反用桔防之耗氣桔蔓之化熱牡蠣之

陰人所共昧曷知耗氣專為救本化熱專為散標皴陰專為復陽能達此義則鍾乳白朮之反激大

從此聆悟矣腎臟門中寒食鍾乳散卽此

黃芪湯

治氣極虛寒皮毛焦津液不通虛勞百病虛損力乏方

黃芪四兩

人參一兩

白朮一兩

桂枝一兩

生薑八兩

大棗十枚附子三十銖

方不用

右七味㕮咀以水八升煮取二升去滓分四服

行義

前方兼治標熱故須耗氣斂陰此方專力救本所以純用溫補但加薑棗以和榮

大露宿丸

治氣極寒癥不已內含於肺寒氣入客於六腑腹脹喘滿寒冷積聚百病方

乾薑

桂心

皂莢

桔梗附子各三兩

右六味為末蜜丸如梧子大酒服十九日三

火等

行義

行義見前第十六卷痼冷積熱門

硫黃丸

治氣極虛寒澼飲胸中痰滿心腹痛氣急不下飲食方

硫黃一兩

譽石

桂心 細辛 白朮 桔梗 茯苓 各二味為末蜜丸如梧子酒服十九日三漸加之以知為度

附後無白朮桔梗茯苓用吳茱萸川椒人參皂莢各半錢歸十二味為丸用治人天冷夏月溫飲食不解衣者

行義 疏黃專化陰毒 石專攻堅癥餘皆草熱破積峻味惟桔梗茯苓為化熱毒之用

大前胡湯 治氣極傷熱喘息衝胸常欲自憇心腹滿痛內外有熱煩嘔不安方 前胡八兩半夏

麻黃 芎藥各四兩 生薑五兩 黃芩三兩 枳實四枚 大棗枝十二右八味㕮咀以水九升煮取三升去滓分三服

行義 氣極傷熱而用前胡麻黃開發於外半夏枳實消豁於內芍藥黃芩清解於中生薑大棗兼和中外也

竹葉湯 治氣極傷熱氣喘甚則唾血短乏不欲食口燥咽乾方 竹葉二升麥冬 小麥 生地各一

生薑 石膏各六兩黃三兩甘草一兩 大棗十枚

右九味㕮咀以水一斗煮取三升去滓分三服

行義 氣極傷肺而至喘乏唾血用越婢全方以治旺氣惟恐津血愈傷故加竹葉以清喘之冬地以滋津血小麥以除臟燥然小麥入於越婢方中則與厚朴麻黃湯中匡佐麻黃石膏發越內動肝風異無

灸法 嘔吐上氣炎足澤不三壯則七壯足澤在腕後肘中橫文 腹中雷鳴相逐食不化逆氣炎上腕下一寸

名太倉七壯

積氣第五論 二十一首 方五十一首

論曰七氣者寒氣熱氣怒氣喜氣憂氣愁氣凡七種氣積聚堅大如杯若積在心下腹中疾痛不能飲食時來時去每發欲死如有禍祟此皆七氣所生寒氣卽嘔逆惡心熱氣卽說物不竟而追怒氣卽上氣不可忍故痛上搶心短氣欲死不得息喜氣卽積聚在心下不得飲食喜氣卽不可疾行不能久立憂氣卽不可劇作暮卧不安愁氣卽善忘不識人語置物四方還取不得去處若聞急卽四肢脛腫手足拘攣不能舉如得病此是七氣所生男子卒得飲食不時所致婦人卽產後中風諸疾也

千金要方

卷十六

七

七氣丸

烏頭

大黃

分七

紫菀

半夏

前胡

細辛

丹參

桔梗

川芎

桃仁

胡洽作

葛蒲

作

芍药

石膏

吳茱萸

桂心

桔梗

各三

人參

甘草

防葵

各一

乾薑

川椒

各半

右二十味

為末蜜

丸如梧子大酒服三丸日三加至十九

一方去半夏加甘遂三分

胡洽無丹

參甘草

柴胡

乾薑

細辛

桔梗

菖蒲

分二

桔梗

川芎

甘草

川椒

桂心

石膏

桃仁

分三

右十五

七氣丸主七氣七氣者寒氣熱氣怒氣喜氣憂氣愁氣此之為病皆生積聚堅牢如杯心腹絞痛不能飲食時去時來發則欲死凡寒氣狀吐逆心滿熱氣狀恍惚眩冒失精慾氣狀不可當熱痛上蓋心短氣欲絕不得息恚氣狀積聚心滿不得飲食喜氣狀不可疾行久立憂氣狀不可苦作卧不安席愁氣狀平故如怒喜忘四肢附腫不得舉止亦治產後中風餘疾方大黃半兩人參半夏吳萸柴胡乾薑細辛桔梗菖蒲分二桔梗川芎甘草川椒桂心石膏桃仁分三右十五味為末蜜丸如梧子大每服酒下三丸日三服漸加至十九翼方無疾參川芎甘草石膏桃仁

七氣丸

行義

七氣丸首方雖用參桂薑半甘草之屬以治憂愁喜耗諸氣猶恐辛溫之力不逮不能治寒熱恚怒諸氣所以更加烏萸椒辛助大黃防葵以破結桃芳丹芫以和血前結菖苓以散氣石膏一味專泄旺氣耳其第二方較前用法稍緩不用烏頭防葵之峻力破結裁去紫菀丹參之紓緩粉龐又以柴胡之升散易前胡之降泄設見筋攣不舉而無大吐嘔逆不妨以桂心之溫血易川椒之下氣未為不可

七氣湯治寒氣熱氣憂氣勞氣愁氣或飲食為膈氣或勞氣內傷五臟不調氣衰少力方乾薑黃芩厚朴深師作桂心半夏甘草地黃芍藥桔梗根深師作橘皮川椒師作桔梗枳實五枚人參一兩吳萸五合右十二味㕮咀以水一斗煮取三升分三服日二又方治虛冷上氣勞氣等方半夏一升人參生薑桂心甘草各一兩右五味㕮咀以水一斗煮取三升分三服日二

七氣丸

行義

湯丸主治有暴久微甚之分久而劇者非丸無以克應暴而虛者湯液便可宣通七氣湯首

方用椒薑蔓半散結人參甘草助氣則與丸方無異若其人素羸血熱則兼芍地以化薑椒之燥火蔓以清肺胃之熱枳朴以滌內積之氣也其第二方不用椒萸而用桂心不用乾薑而用生薑以助半

夏人參甘草之力以無標熱濁積故不用餘藥所以和劑局方取此以為七氣之法

五膈丸治憂惱食膈飲膈勞膈五病同藥服以憂恚思慮飲食得之若冷食及生菜便發其病苦心滿不得氣息引背痛如刺之狀食則心下堅大如粉絮大痛欲吐卽瘥飲食不得下甚者及手足

冷上氣欬逆喘息短氣方麥冬甘草各一兩川椒遠志桂心細辛附子半兩

乾薑一兩右九味為末蜜丸微使淖先食含如彈丸一枚細細咽之喉中胸中當熱藥力稍盡復含一

丸日三夜二服藥十日自愈延年方若不能含者可分一大丸作十小丸盡服之夏月宜增麥冬甘草入參胡治云亦可作梧子大小丸酒服之經心錄以吳萸代桂心酒下如少者

梧子五十九空腹服之如寒冷則心痛咽中有物吐之不出咽之不下飲食少者

行義

噎之與膈本同一氣膈病之始靡不由噎而成原其大槩不外半鬱故張雞峯以為神思間病其受病之源非止一端嘗攷五噎之中獨多思噎五膈之中獨多飲膈每見多思慮人每患氣噎經謂

思則氣結是也好熱飲人每患酒膈丹溪謂之死血是也然血膈亦非止一端往往有勇力過甚血菀於胃阻礙飲食成膈者卽如靈樞蟲為下膈亦不過言下膈有此一證若夫命門火衰不能溫養土藏食寐時乃噏者得非下膈之證乎而素問又有三陽結謂之膈言小腸大腸膀胱之津血俱結如廁澀難下不通而上逆勢所必然所以五膈丸中不用萸木苓橘之燥而用麥冬上滋肺氣甘草中安胃氣遠志下通腎氣上下交通何有阻隔之患乎其方雖列肺臟而飲食不下膈塞不通邪在胃脘其間所用椒辛薑桂附子人參等味却與五噎丸中不異也

治結氣冷癥積在脇下及脚氣上入小腹腹中脹滿百病方大蒜去心皮三升搗令極熟以水三升和令調絞取汁更搗餘滓令熟更以水三升和令調絞取汁更搗餘滓令熟更以水三升和令調絞取汁合得九升所得滓可桃顆大棄之以微火煎取三升下牛乳三升合煮取三升旦起空腹一頓溫服令盡至申時食三日服一劑三十日服十劑止

大蒜煎治癰瘕積聚冷澼痰飲心腹脹滿上氣咳嗽刺風風癲偏風半身不遂腰痺膝冷氣息不塞百

病方

蒜

六斤四兩去皮切水冰一升內

牛乳二升

華葷

胡椒

乾薑

三石蜜

阿魏

戎鹽

各二石菖蒲

木香

各一兩

乾胡桃

四兩

右十二味為末內

蒜汁中以銅器微火煎取一斗空腹酒下一兩五日已上稍

加至三兩二十日覺四體安和更加至六兩此治一切冷氣甚良

行義

蒜氣穢濁用以治穢濁之疾同氣相感之用然在藜藿之人為當若素稟清癯者用之反傷清

純之氣良非所宜

其大蒜煎治諸冷癥否塞百病用椒薑華魏木香菖蒲胡蒜之烈以破積結牛乳

乳酥石蜜戎鹽佐胡桃之潤以化辛烈也

桔梗

破氣丸

治氣

上下否塞不能息方

桔梗

橘皮

乾薑

厚朴

枳實

細辛

華葷

各三吳

萸

白朮

各六分

胡椒

川椒

烏頭

各七

華芨

十分

人參

桂心

附子

茯苓

前胡

防葵

川

芎各五

甘草

大黃

檳榔

當歸

各八

右二十四味為末蜜丸如梧子大每服酒下十九日三有熱

者空腹服之

行義

上下否塞不能布息故用桔梗橘皮前胡以散痞防葵華芨大黃以蕩實檳榔枳實厚朴以泄

滯烏頭附子細辛以破結川椒吳萸胡椒華芨以下氣乾薑桂心以溫中川芎當歸以和血人參白朮

茯苓甘草以安正氣而助藥力也

桔梗湯

治氣實苦積

聚不得食息方

檳榔

附子一枚

半夏一升

細辛一兩

乾薑八兩

大黃

紫蘇

各三

橘皮

甘草

紫蘇子

各二兩

右十二味咬咀以水一斗煮取三升分三服相公

如人行十里久若有癥結堅實如石加鱉甲三兩防葵二兩氣上加桑皮切二升枳實厚朴各二兩消

息氣力強弱進二劑後隔十日更服前桔梗破氣丸

行義

金匱大黃附子湯本治寒積脇下偏痛發熱脈緊弦半金參入半夏生薑茯苓甘草橘皮紫蘇

紫菀柴胡檳榔等味總皆大黃附子細辛三味之輔佐耳

治積年患氣發作有時心腹絞痛忽然氣絕腹中堅實醫所不治復謂是蠱方

檳榔

大者一枚

附子一枚

半夏一升

細辛一兩

乾薑八兩

大黃

紫蘇

各三兩

橘皮

甘草

紫蘇子

各二兩

右十二味咬咀以水一斗煮取三升分三服相公

半夏一升 柴胡三兩 生薑八兩 橘皮 甘草 桂心 當歸 枳實各二右十味㕮咀以水一斗煮取

三升分三服五日一劑服三劑永除根本

衍義 患氣者積氣也 方用薑半橘皮以散氣附桂當歸以破血檳榔枳實以泄滿柴胡甘草以和諸藥之性也

半夏湯 治逆氣心腹滿氣上衝胸膈痛寒冷心腹痛嘔逆及吐不下食憂氣結聚方 半夏一升 生薑桂心各五兩 橘皮四兩 右四味㕮咀以水七斗煮取三升分四服日三夜一人強者作三服亦治霍亂後吐逆腹痛

衍義 此方專以破氣為主 故於七氣湯中除去人參甘草易入橘皮以破滯氣卽前治積年患氣中四味專破血結痰積也

貝母湯 治上氣咽喉塞短氣不得卧腰背痛胸滿不得食面色黃萎方 貝母一兩 生薑五兩 桂心

麻黃 石膏 甘草各二 杏仁一枚 半夏 右八味㕮咀以水一斗煮取三升分三服日三

衍義 咽喉窒塞胸滿必是寒鬱熱邪不得發越故用麻杏甘石加薑半以滌痰涎桂心以通血脈貝母以清肺氣雖云輔佐實緩麻黃石膏之性耳

麻黃湯 治上氣脹浮欬逆喉中水難聲喘息不通呼吸欲死方 麻黃八兩 甘草四兩 大棗三十枚 射干

如博碁子二枚 右四味㕮咀以井泉水一斗煮麻黃三沸去沫內藥煮取四升分四服日三夜一

衍義 於射干麻黃湯中除去生薑半夏細辛五味紫菀欬久但加甘草一味以和中氣也

奔瀉湯 治太氣上奔胸膈中諸病發時迫滿短氣不得卧劇者便渴欲死腹中冷濕氣脢鳴相逐成結

氣方 生薑一斤 半夏 吳萸各一 桂心五兩 人參 甘草各三右六味㕮咀以水一斗煮取三升分四服

衍義 此卽五味七氣湯加吳萸以降逆氣也

枳實湯

下氣治胸中滿悶方

枳實三枚附子一枚太棗一枚半夏五兩

人參半兩橘皮三兩

甘草白朮乾薑

厚朴

各二兩左九味㕮咀以水七升煮取二升半每服八合日三

衍義

於附子理中湯加枳實厚朴以祛濁痰大棗以通津液

下氣湯

治氣滿腹脹方

半夏一升生薑一斤人參半兩橘皮三兩

右四味㕮咀以水七升煮取三升

去滓分三服

日三一方無人參止三味

衍義

此卽大半夏湯去桂心之溫散加人參以助藥力

治氣兩脇滿急風冷方

杏仁 苓芩 防葵

各八兩茱萸 橘皮 桂心 防風 澤瀉

各五分白朮

射干

芍藥 蘇子 桔梗

枳實各六兩十四味為末蜜丸如梧子大酒服十丸日二加至三十丸

衍義 風冷攻注兩脇故用杏仁桔梗防風開發於上防葵射干枳實芍藥降泄於下茱萸桂心溫散

於中茯苓澤瀉白朮橘皮分清於內也

藜勒丸

治氣滿閉塞不能食喘息方

訶藜勒十枚為末蜜丸如梧子大食服三丸不忘得利卽止

衍義

金匱治氣痢失氣用訶藜勒粥飲澀以收之千金治氣需喘息用訶藜勒蜜丸潤以斂之蓋得粥則引入脾經以治痢下氣泄得蜜則引入肺經以治喘息氣上各得引經之妙用耳

治上氣欬逆方

蘇子一升五味子五合麻黃

細辛 紫菀 人參 黃芩 甘草

各二兩桂心 當歸

各一兩

生薑五兩半夏三兩

右十二味㕮咀以水一斗煮取三升分三服

衍義

於小青龍湯中用當歸以易芍藥生薑以易乾薑加人參以助半夏之運痰蘇子以輔麻黃之泄氣紫菀以佐細辛之散結黃芩斂生薑之辛散也

治氣上不得卧神祕方

橘皮 生薑 紫蘇

人參 五味子

各五兩一升右五味㕮咀以水七升煮取

三升分三服

衍義

橘皮生薑紫蘇皆散氣之品得人參五味之固斂不使津隨氣泄乃散中用斂之捷法惟千金

得之

治熱發氣上衝不得息欲死不得卧方 桂心半兩 白石英 麥冬 枳實 白蘚皮 貝母 茯神

檳榔仁 天冬各二兩 車前子二兩 人參 前胡 橘皮 白薇 杏仁各一兩 半郁李仁三兩 桃仁五分右

十七味為末蜜丸如梧子大以竹葉飲服十九日三加至三十九

竹葉飲子 竹葉 蘇子各一兩 紫菀 白前各二兩 百部 甘草 生薑各三兩 右七味㕮咀以水八升煮取

三升溫服下前丸藥盡更合

衍義 本虛邪實故用桂心石英人參旋神天麥二冬固本滋津前杏橘貝白薇白蘚疏肺泄氣檳榔車前郁李桃仁分調血氣而順下之 更以竹葉飲子清潤諸味但加生薑之辛散而下前丸上下開泄其氣也

人參湯 安食下氣理胸膈并治客熱方 人參 麥冬 乾薑 當歸 茯苓 甘草 五味子 黃芪 茯藥 枳實各二兩 桂心三兩半夏一升 大棗十五枚 右十三味㕮咀以水九升煮取三升去滓每服九合從旦至晡令盡皆熱服慎勿冷

衍義 方中參芪甘草麥冬五味保元生脈之製也更兼乾薑桂苓枳半大棗理中運痰當歸芍藥以

和榮血也

海藻橘皮丸 下氣治風虛支滿膀胱虛冷氣上衝肺息奔令咽喉氣悶徃來方 海藻 橘皮 白前
杏仁 茯苓 茯藥 桂心各五分 蘇子五合 豆蔻肉 桑白皮 昆布各二兩 吳萸 人參 白朮

草薢各一兩

右十五味為末蜜丸如梧子大飲服十九日二加至十五丸以小便利為度

衍義

海藻昆布萆薢皆破水滌痰伐腎之猛劑佐以蘇子杏仁橘皮白前桑皮泄肺諸品不得不以

參木萸桂苓芍藥肉安中氣之崩迫也

治氣上方 研砂 細辛 牛膝等分右三味為末氣發酒服方寸匕後三日忌酒餘禁如藥法

千金要方

卷十七

十

行義 氣上而用細辛半膝從陰引陽病在上取之下也其砢砂雖有破積攻堅噎膈反胃之治然毒烈不減砢譽當是砢砂之誤字蹟相類性味相彷同為柔五金去垢膩噎膈積聚之用但性稍遯而無化人心為血之利害也

治上氣方 上酥一升獨頭蒜五顆右二味先以酥煎蒜黃出之用生薑汁一合共煎令熟空腹溫服一方寸

衍義 前治結氣冷癥在肠下用蒜汁牛乳此用獨頭蒜乳酥加薑汁以辟臭氣通神明似勝於前與大蒜方中用乳酥乾薑同意

治上氣嘔吐方 芥子二升為末蜜丸寅時以井花水服如梧子七丸日二亦可作散空腹服之及有酒

浸服并治臍下絞痛

治勞氣方 小芥子三升搗末絹袋盛酒三斗浸蜜封七日去滓溫服半升漸至一升半酒盡更合忌如

藥法

衍義 芥子辛溫專治肠下及皮裏膜外之疾恐其性暴易散故以蜜丸酒服緩行其勢 或搗末酒浸但取氣味不用其滓尤得峻味緩攻之妙

治上氣三十年不瘥方 大棗 杏仁各百粒或十一粒 川椒二百粒右四味先搗杏仁豉令熟後內棗椒更搗為丸如棗核大含稍稍咽之日三夜一

藥法

衍義 川椒散冷氣杏仁散結氣壅歧去惡氣大棗和中氣邪氣散而正氣安矣

治積年上氣不瘥垂死者方 茴若子熬令色變熟羊肝薄切曝乾右二味各搗等分以七月七日神醉拌令相著夜勿食空腹服二方寸匕須臾拾鍼兩食頃以冷漿白粥二匕止之隔日一服永瘥四十日內得煮飯汁作蕪菁羹食之已外一切禁斷

藥法

今世以萸若根治噎膈反胃取其性走以劫痰垢宿滯然性稟陰毒煮熟尚能生芽能使痰遂

心竅令人狂惑見鬼不可不慎用羊肝者取其引入血分用酢拌者恐其惑亂神識故取酸收之義

下氣方 生薑五兩 小麥二升右二味以水三升煮取一升頓服○又方

大棗枝十四
紫蘇莖葉末升右
雨各三
年腎一具去
年肚一具去
皮治如食法

右十三味治下篩內羊肚中合腎縫塞肚口蒸極熟為度乘熱木臼

二味以酒三升煮取一升半分再服水煮亦得

一方加橘皮半兩
用橘皮

衍義 生薑散氣小麥安中不使木邪反干肺氣 又方以紫蘇散氣大棗安中與生薑小麥同具散安之用

治氣方 桃皮二升去黃者㕮咀以水五升煮取三升每服一升瘥止○又方 驚脂二合酒服日二瘥止○又方黃牛乳二升煎取一升和生乳一升空腹服之日二○又方 驚乳初服三合三日後服五合後至七合七日後至一升忌葵茶猪魚油等○又方 尿空腹服百日卽止治一切病○又方 烏牛屎空腹服日再至三升止

衍義

桃根皮辟邪散皿

驚脂動風以為祛風之嚮導 黃牛乳補虛止渴治噎膈反胃大便燥結

驚乳與牛乳同類兼能滋化風熱

童尿治噎膈火逆上嘔下結

烏牛屎專治垢膩噎膈脹閉者宜

補氣虛逆方 大棗升三相皮去膜十具

乾薑二兩

地黃八兩右四味治下篩酒四升漬棗三宿濾出棗取酒為

炊汁將棗內齶中微火蒸令棗膏入釜中酒裏煎酒令至二升許候棗口存皮核乃止火貯器中將前散及熱下攬令調大略與糖相似酒服二合日再此方非止補氣亦通治一切短氣并形骸羸瘦神良

衍義

大棗滋運脾津柑皮利腸中熱毒乾薑治胸滿欬逆地黃治傷中血癥再取柑皮以行大棗之

滯地黃以滋乾薑之烈

大補氣方 地黃五兩秦椒

甘草各一

骨皮 乾薑 昆布各四

白朮 桂心 人參 厚朴 海藻

各三
年腎一具去
年肚一具去
皮治如食法

右十三味治下篩內羊肚中合腎縫塞肚口蒸極熟為度乘熱木臼

合搗取肚腎與藥為一處曝乾更搗為散酒服方寸匕日二

衍義 陽根於陰補氣必先 血故首取地黃以滋薑桂秦椒之燥以濟參朮甘草厚朴之溫以助羊

千金要方

卷十七

十一

肚年腎之補以化海藻昆布之毒以佐骨皮清解標熱旺氣也

白石英散

明目利小便治風及補五勞七傷無所不治方

煉成白石英十兩

白石英無多少以鍼子搘

上細燒向明還去屢翳色

暗黑黃赤者惟取白淨者為佳搗節研器中研令極細熟以生絹袋於銅器中水飛盡如作粉法如此

暗黑黃赤者惟取白淨者為佳搗節研器中研令極細熟以生絹袋於銅器中水飛盡如作粉法如此

三度研蕪澄之漸漸去水水盡至石英服者中有粗惡不淨者去之堪用者更研使熟白絹袋盛著

熟訖出取懸之使乾更於研器中研之為成

研器中研令相得重篩酒服方寸匕日二不得過服慎猪魚鵝鴨蒜冷醉滑

右七味治下篩總於研器中研令相得重篩酒服方寸匕日二不得過服慎猪魚鵝鴨蒜冷醉滑

行義

肺氣虛寒已極必需白石英為君佐以蕤蕤兔絲引領虛陽歸宿下元不使上浮喘

其餘石

解澤瀉茯苓橘皮通解石英之性耳

白石英丸

補養肺氣方

白石英

陽起石

磁石

菟絲子

蕤蕤

地黃

兩半

枯萎根

石斛

酒下十五丸加至三十丸日二服

白木

五味子

兩各一

防風

巴戟

各五分

桂心

人參

兩各一

蛇牀子

半兩

右十五味為末蜜丸如梧子大

酒下十五丸加至三十丸日二服

行義

方中磁石專解石英陽起石之慄悍地黃專助兔絲蕤蕤之滋精防風專鼓人參白木之益氣

石斛專輔巴戟之強陰枯萎根專化桂心之辛熱五味子專收蛇牀之燥烈用藥之奧全在配合得宜

不可拘於藥性或隨佐使或相反激或用和解或寒因寒用熱因熱用或補中寓瀉寓補或寒熱

交錯補瀉雜陳種種各具至理非熟擅金匱千金之法者難以語此

補傷散

治肺傷善泄欬善驚恐不能動筋不可遠行膝不可久立汗出鼻乾少氣喜悲心下急痛痛引

胸中卧不安席忽忽喜夢寒熱小便赤黃目不能遠視唾血方

天冬一升

防風

澤瀉

人參

阿

膠各一

枯萎根

前胡

芍藥

石膏

乾薑

大豆卷

各二

紫菀

白蘚

各一

桂心

白木

兩各四

地

黃甘草山藥當歸各二兩半右十九味治下篩食前酒服方寸匕日三

行義

此金匱薯蕷丸之變方除一十三味相同外其天冬乃麥冬之變味柴胡乃前胡之變味澤瀉

乃茯苓之變味枯萎根乃杏仁之變味石膏乃桔梗之變味紫菀乃川芎之變味惟蕤蕤二味無可變

味裁汰未為不可

理氣丸 治氣不足方 杏仁 桂心 酸一乾薑 益智仁 酸二右四味為末蜜丸如梧子末食服三丸以知為度

衍義 理者補不足而損有餘也杏仁散肺氣桂心助肝氣乾薑溫脾氣益智收腎氣補火以生土也治冷氣氣短方 蜀椒五兩絹袋盛酒一斗浸二七日服之任意多少

衍義 蜀椒溫中下氣能使遊火下達命門而本經治欬逆不獨主下氣也以其性稟五行氣辛能升味厚能降周身上下無所不至一切虛寒逆乏無不宜之

治讀誦勞極疲乏困頓方 酥油 酒 白蜜各二合銅器中微火煎二十沸下之為準七日七夜服令令盡宜慎生冷○又方 人參 甘草 茯苓 當歸各二川芎 芍藥 地黃 黃芪 骨皮各兩

大棗 於二十 右十味㕮咀以水一斗煮取三升分三服 一方桂心三兩

衍義 誦讀過勞氣傷聲瘡但需滋其氣道聲音自復方後垂戒宜慎生冷者恐其閉遏清陽之氣耳若其人本元素虧又當從事參芪甘草以保元芪歸芍地以滋血茯苓骨皮以清火大棗以滋脾家之津液也

治平短氣方 捣韭汁服一升立瘥附後方治卒上氣喘息便欲死

治乏氣方 生薑 枸杞葉各二右二味㕮咀以水三升煮取一升頓服

治年少房多短氣方 歧七合 桔子一枚十四 右二味以水二升煮取八合服半升

不瘥更服

衍義 止血留泊於肺胃而卒然短氣者用生韭汁之辛以散之 暴寒襲於會膚而卒然氣乏聲啞者生薑汁之辛兼枸杞葉之苦以散之 少年房多短氣虛火上浮者取歧下通腎氣橘子上散虛陽若病人舊有微瘡者則長沙有不可用之之戒設或腎中真陽素虧而喘息短氣又當從事辛溫納氣

歸元之法矣

灸法

凡上氣冷發腹中雷鳴轉叫嘔逆不食灸太衝不限壯數從痛至不痛從不痛至痛止○上氣厥逆灸胸

膻百壯穴在兩乳間

胸膈中氣灸關脈百壯

扁鵲云第四椎下兩

旁各一寸半名關脈

太倉穴一名胃募在心下

四十乃胃脫下一寸是

結氣囊裹鍼藥所不及灸

冷霍亂心痛吐下食不消腸鳴泄利灸太倉百壯

太倉穴一名胃募在心下

四十乃胃脫下一寸是

結氣囊裹鍼藥所不及灸

胃募隨年壯胃募二穴從乳頭度至臍中屈去半從乳下行度頭是穴

下氣灸肺腧百壯

又灸太衝

五十壯

臍下絞痛流入陰中發作無時此冷氣也灸關元百壯穴在臍下三十

短氣不得語灸天井

百壯穴在肘後兩筋間

又灸大椎隨年壯

又灸肝腧百壯

又灸尺澤百壯

又灸小指第四指間

交脈上七壯

又灸手十指頭合十壯

少年房多短氣灸鳩尾五十壯

又鹽灸臍孔中二七壯

乏氣灸第五椎下隨年壯

論曰凡卒厥逆上氣氣攻兩脇心下痛滿淹澆欲絕此為奔純氣急作湯以

浸兩手足數數易之

奔純灸氣海百壯穴在臍下一寸半

又灸關元百壯穴在臍下三寸

奔純灸

浸兩手足數數易之

奔豚灸氣海百壯穴在臍下一寸半

又灸關元百壯穴在臍下三寸

奔豚灸

奔豚腹腫不得息灸中極五十壯中極二名玉泉穴在臍下四十

奔豚上下腹中與腰相

引痛灸中府百壯穴在乳下三肋間

奔豚上下灸四滿二七壯穴使丹田兩傍相去三十卽心下八寸

臍下橫文是也

肺痿第六論一首 方四首

論曰寸口脈數其人病欲口中反有濁唾涎沫出何也師曰此為肺痿之病何從得之師曰病熱在上焦因欲為肺痿或從汗出或從嘔吐或從消渴小便利數或從便難數被駁藥下重亡津液故得肺痿又寸口脈不出而反發汗陽脈早索陰脈不潤三焦踟躕入而不出陰脈不潤身體反冷其內反煩多唾脣燥小便反難此為肺痿傷於津液便如爛瓜下如豚腦但坐發汗故也其病欲數不得數欲出乾沫久久小

便不利其脈平弱肺痿唾涎沫而不欬者其人不渴心遺漏小便數所以然者上虛不能制下故也此為肺中冷必眩師曰肺痿欬唾咽燥欲飲者自愈自張口者短氣也

甘草乾薑湯 溫臟治肺痿多涎唾小便數肺中冷必眩不渴若渴者屬不欬上虛下不能制溲方 甘草四兩 乾薑二兩 右二味㕮咀以水三升煮取一升半去滓分二服服此湯已小溫覆之集驗肘後有

太棗十二枚

甘草湯 治肺痿涎唾多出血心中溫溫液液方 翼方名溫液湯 甘草二兩㕮咀以水三升煮取一升半去滓分三服

金匱云熱在上焦因欬而為肺痿又云肺痿吐涎沫而欬痞其人不渴必遺尿小便數所以然者上虛不能制下故也此為肺中冷必眩多涎唾甘草乾薑湯溫之方用炙甘草溫肺兼乾薑以搜逐寒涎也若心下溫溫液液欲吐不吐單用甘草一味溫補肺絡寒涎不煩乾薑搜逐之力服甘草乾薑湯渴者屬消渴又當從白虎加人參例治也

生薑甘草湯 治肺痿欬吐涎沫不止咽燥而渴方 生薑五兩 甘草四兩 人參三兩 太棗十二枚 右四味㕮咀以水七升煮取三升去滓分三服

衍義 肺痿日久胃氣并虛雖用甘草不得人參協助之力無以建溫肺之功且津氣既衰不能勝乾薑之燥故易生薑散肺之結佐以大棗運脾之津土沃金生虛則補其母上皆屬寒主治若屬熱者則有火甘草湯麥門冬湯白虎加人參湯等法在三隅之反智者自能領悟也

麻黃湯

治肺脹欬而上氣咽燥而喘脈浮者心下有水方 麻黃

芍藥

生薑

仲景用
乾薑

細辛

桂心

各三兩

牛夏

五味子

各半兩

石膏

四兩

右八味

㕮咀以水一斗煮取三升分三服

沖景名
甘草二兩為九味

衍義 肺脹皆屬邪實非若肺痿雖有寒熱之分從無實熱之例金匱有云上氣而燥者屬肺脹欲作風水發汗則愈其治原有越婢加半夏湯小青龍加石膏湯兩方千金麻黃湯卽小青龍加石膏湯因集

方時偶失遺甘草一味後世不敢擅補庸師不知誤失相傳至今不改如初蓋小青龍石膏中藏越婢之法越婢加半夏中藏小青龍之法方中甘草皆不可缺乃治風水之的方不獨發汗并祛肺中涎水
蘊熱全在半夏石膏輔佐麻芍桂辛之分耳

肺癰第七論一首

方六首

論曰病欬吐膿血其脈數實者屬肺癰虛者屬肺痿欬而口中自有津液舌上胎滑此為肺寒非肺痿若口中辟辟燥欬卽胸中隱隱痛脈反滑數此為肺癰也問曰病者欬逆師脈之何以知為肺癰當有膿血吐之則死後竟吐膿死其脈何以別之師曰寸口脉微而數微則為風數則為熱微則汗出數則惡寒風中於衛呼氣不入熱過於榮吸而不出風傷皮毛熱傷血脉風舍於肺其人則欬口乾喘滿咽喉不渴多唾濁沫時時振寒熱之所過血為凝滯蓄結癰膿吐如米粥始萌可救膿已成則難治寸口脈數趺陽脉緊寒熱相搏故振寒而欬趺陽脈浮緩胃氣如經此為肺癰師曰振寒發熱寸口脈滑而數其人飲食起居如故此為癰腫病醫所不知而以傷寒治之不應愈也何以知有膿膿之所在何以別知其處師曰假令膿在胸中者為肺癰其脉數欬唾有膿血設膿未成其脈自緊數緊去但數膿為已成也

桔梗湯 治欬胸中滿而振寒脈數咽乾而不渴時時出濁唾腥臭久吐膿如米粥是為肺癰方 桔梗三兩 某驗方用二兩古令錄驗方用一兩 右二味㕮咀以水三升煮取一升去滓分二服必吐膿血也 一方有
欬冬花一兩半

衍義

肺癰初起欬唾臭痰用桔梗以清肺氣利咽喉甘草去咽痛解熱毒金匱始萌可救之法也

瀉肺湯

治肺癰喘不得卧方 莖蘆 三兩大棗廿十 右二味㕮咀以水三升先煮棗取二升去棗內草

蘆二方可匕煮取七合頓服令盡三日服一劑可至三四劑治肺癰胸脇脹一身面目浮腫鼻塞清涕

出不聞香臭欬逆上氣喘鳴迫塞宜先進小青龍湯却服前藥

其小青龍湯方見前第九卷傷寒門

行義

肺癰已成吐如米粥濁垢壅遏清氣之道所以喘不得卧鼻塞不聞香臭故用草蘆破水瀉肺

大棗發脾通津乃潤肺而不傷脾之法保全母氣以為向後復長肺葉之根本然肺胃素虛者葢虛亦難輕試不可不慎

皂莢丸 治肺癰初起欬逆上氣時時渴睡但坐不得卧方 皂莢八兩為末蜜丸如梧子大以棗膏和湯服三丸日三服夜一服必效方以
酥是皂莢

行義 此肺癰潰除殘垢之方皂莢辛鹹力專去風拔毒通關利竅破積攻擊之峻藥酥蜜丸潤其燥烈服用棗膏和湯通達脾津然惟肥盛之人肥痰支塞於竅絡始萌可救者為宜若潰後膿過泄血及元氣瘠薄之人難勝搜剔者未可輕試所以千金更立葦莖湯黃昏湯等方以補全匱之未逮黃昏湯 治欬有微熱煩滿胸心甲錯是為肺癰者方 黃昏手掌大一塊是合歡皮也咬咀以三升煮取一升分二服

行義 合歡屬土與水補陰之功最捷其幹相著卽粘合不解故治肺癰潰後長肺之要藥一名合昏又名黃昏靈無顧名思義之意存焉

葦莖湯方 葦苡仁 瓜瓣各半桃仁五十枝 葦莖切二升水二斗 煮取五升去滓右四味咬咀內葦汁煮取二升服一升當有所見吐膿血

行義

葦苡下氣利水本經治筋急拘攣不可屈伸能清脾濕祛肺熱所以虛勞欬嗽肺痿肺癰虛火上乘皆取以為下引之味但性專利水津氣受傷者服之每致燥渴不若取其根一味搗汁熱飲三合連飲三五次不拘癰之已潰未潰服之最捷甜瓜瓣專於開痰別錄治腹內結聚破潰膿血善逐垢膿而不傷伐正氣為腸胃內癰要藥桃仁治瘀血血閉性專下走而無上逆之虞葦莖專通肺胃結氣能使熱毒從小便泄去以其中空善達諸竅用莖而不用根本乎天者親上也

桂枝去芍藥加皂莢湯 治肺癰吐涎沫不止方 桂枝 生薑各三 甘草二兩 皂莢一兩 大棗十五枚 右五味㕮咀以水七升煮取三升去滓分三服

衍義 桂枝湯和榮衛藥十全去芍藥之酸收參入皂莢一味卽全匱皂莢丸不用蜜丸而入湯液然不若用湯送丸不使皂莢之味棘喉尤為得宜此惟肥盛多濕濁垢支塞肺胃者方為合劑若瘦人津液素槁雖有痰血亦難勝皂莢之蕩滌也此方向列肺痿例中因世本方中刊作肺痿吐涎沫乃魯魚之誤今力正之

飛尸鬼疰第八

灸法十四首 方四十二首

論曰凡諸心腹痛服眾方熱藥入腹寂然不動但益氣息急者此尸疰病也宜先服甘草汁一升消息少時服瞿麥湯盡一劑得下便覺稍寬并暴癥堅結宿食及女人血堅痛發作無定者神良

五症湯 治卒中賊風道尸鬼邪心腹刺痛大脹急方

大黃

甘草各三兩當歸芍藥各二兩烏頭十枚

桂心四兩生薑

蜜各一兩右八味㕮咀別瀆大黃以水九升煮取三升烏頭別內蜜中煎令得一升和

湯中去滓分服三合如人行三十里久更進一服日三不知加至四合

衍義 賊風五症之邪心腹刺痛急服熱藥寂然不動但氣息反急者以其氣逆上衝必干于肺所以千金類附此門宜先服甘草湯者取其解毒也少噴服瞿麥湯者取其利小便也本經謂瞿麥能出刺極言逐邪拔毒之速也五症湯中用烏頭薑桂辛烈祛辟陰邪卽兼歸芍護持營血甘草蜂蜜解毒安中除邪養正之大略也

蜈蚣湯 治惡疰邪氣往来心痛徹背或走入皮膚移動不定苦熱四肢煩痛羸乏短氣方 蜈蚣一枚

牛黃一分丹砂

人參各三分 大黃二兩鬼臼 細辛 當歸 桂心 乾薑各一兩 黃芩 膜香各半附

子四枚 右十三味㕮咀以水一斗煮取三升去滓下牛黃麝香末分三服

衍義

方中丹砂牛黃麝香鬼臼辟邪卽用參附薑桂安正大黃黃芩開泄熱毒之去路也

治卒中惡疰風寒冷入腹便絞痛或飛尸道尸發作無時捨心腸滿腸痛如刀刺口噤者方 吳茱萸
桂心 芍藥各二兩 乾地黃 乾薑 茯苓 甘草 細辛 當歸 羊脂各一兩 桔子仁十五粒
右十一味

咬咀以水八升煮取三升去滓內脂烊盡分三服欲利者加大黃三兩

衍義 方中藥味與前後諸方相類惟羊脂治賊風癩痺去經絡熱毒突出意表

治卒中惡風角弓反張或飛尸遁尸心腹絞痛方

乾地黃 菖蒲 當歸 桃芩

甘草各一兩 菖藥

吳茱萸 桂心 乾薑各二兩 桔子仁十四枚

右十味咬咀以水八升煮取三升分三服痛甚者加羊脂二

兩人參當歸芍藥各一兩心腹堅急加大黃三兩

行義 卒中惡風角弓張首用地黃兼芎歸芍藥以解血脈中之熱毒養血榮筋治風先治血也

桃皮湯 治中惡氣心腹痛胸脇脹滿方

桃白皮一握 東方真珠 附子各一兩 桔子仁當歸三兩

吳茱

萸二兩 柴五合桂心二兩 右八味咬咀以水五升煮取二升去滓同真珠末分作二服

一方無當歸

已下四味

桃奴湯 治中惡諸尸蠱症心腹卒絞痛方

桃奴 人參 當歸 乾薑各二兩 菖蒲 甘草各三兩 桂心

茯苓 鬼箭羽 扇角 丹砂 蘆薈各一兩

右十二味咬咀以水九升煮取二升半去滓分二服大便

不通腹滿加大黃三兩芒硝二兩

胡洽無丹砂菖蒲一兩

行義 桃皮湯取桃根白皮辟邪散血真珠鎮心安神以佐萸附辛溫散結施政分解旺氣也

桃奴 河中專取桃奴殺鬼精物鬼箭羽破血除風其間乾薑卽前方萸附之意扇角卽施政之意桂心當歸

散血溫經之用則一其餘諸味可以意推

治卒中風寒冷溫氣入腹脹急滿搶心胸腸久痛氣息不通脈弦緊汗不出及傷寒方

吳茱萸 當歸 麻黃 獨活 甘草 桔梗 茯苓各二兩 桂心 青木香 大黃 石膏各三兩 扇角 右十二味

咬咀以水一斗煮取三升分三服日三

治風冷入腹忽絞痛緊急如吹大小便閉小腹有氣結如斗大脹滿其脈弦緊或沉遲者方

瞿麥 當

歸 鬼箭羽 猪苓 桔梗 吳茱萸 海藻 川芎 防己各二兩 桂心 大黃各三兩 一方有扇角二

千金要方

卷十七

十五

右十二味㕮咀以水九升煮取三升分三服

衍義卒中風寒時行溫氣入腹用麻黃大黃石膏犀角等味分逐中外諸邪風冷入腹專用瞿麥茱萸桂心海藻防已大黃祛邪內泄也

治諸雜症相連續死及治三十年衆症方 桃根白皮一斤㕮咀以水二斗煮取一斗去滓分八九服須令二日服盡翟氏用桃根白皮治症心腹痛不可忍者○又方桃仁十四枚搗研酒服○又方 小芥子末雞子白和傅戶疰鬼疰者卽五戶之中尺症又挾諸鬼邪為害也其變動乃有三十六種至九十九種大略令人寒熱淋瀝沉沉默默不得知其所苦而無處不惡累年積月漸就頓滯以至於死死後復症易傍人乃至滅門覺如此候者宜急療之方 櫟肝一具陰乾治下篩水服一方寸匕日三如一具不瘥更作

衍義桃根白皮取其辟邪 桃仁取其散血

芥子入肺利氣豁痰兼有辟惡之功 櫟肝專殺瘵蟲兼療瘧疾

小附著散 治飛尸鬼發時急痛不在一處鍼之則移發一日半日乃瘥須臾復發者方 細辛 天雄

甘草各一分桂心 三分烏頭 附子 乾薑

各半真珠 雄黃

各半右九味治下篩酒服方寸

不知稍增以知為度

胡洽不用桂心附子有椒蜀四分

大附著散 治五尸疰忤與前狀同者方 天雄

桂心 酒半細辛 乾薑 雄黃 黃芩 黃連

由跋 椒目各一金牙 犀角 犀麝香 牛黃各一真珠

三分蜈蚣一枚 右十五味治下篩酒服一錢匕

日三服以知為度

衍義

方中一脈辛烈辟除邪毒之藥獨取真珠以安神識甘草以和胃氣 大附著散中天雄雄黃

金牙由跋蜈蚣麝香牛黃犀角無所不具專取芩連以清邪熱惡毒也

後金牙散 治鬼疰風邪鬼語尸疰或在腰脊胸脇流無常處不喜見人志意不定而脫色目赤鼻張

乾甲黃者方 金牙 雄黃 鐵精

曾青 珍珠 丹砂 野葛 芒硝 露蜂房 大黃 甘草

蛇蛻皮 蘭茹 乾漆各一石長生 狸骨鶴骨鬼臼
狼毒 蕤荑 藜蘆 雷丸 芫菁 滑石各二分 一毒公 鱉甲 牛黃 人參 胡蘿蔔 狼毒
桂心各四分 寒水石 蟠螭 蜈蚣 附子各一分 烧柳 亨長枝 石膏五分 徐長卿 班貓各十
二枚 右四十五味治下篩先食以酒服一刀圭日二不知漸加之蟲隨大小便出

崔氏名蜀

金牙散

四枚貝母

前大金牙散

治一切疰病

方見卷十二
膽腑門

衍義 衍義附見前十二卷膽腑門大金牙散下

白朮散 治風入臟腑悶絕常自躁痛或風疰入身冷疰鬼疰飛尸惡氣腫起或左或右或前或後或內
或外鍼灸流移無有常處驚悸腹脹氣滿心頭痛或恍惚悲懼不能飲食或進或退陰下濕癢或大便
有血小便赤黃房中勞極方 白朮 十四枝 附子 泰光 人參 牡蠣 蜀椒 細辛 黃芩 川芎
牛膝 三分 乾薑 桂心 防風 五分 獨活 柴胡、桔梗 茯苓 當歸 四分 鳥頭 天雄 甘草
莽草 麻黃 石南 杜仲 枯萎根 二分 右二十六味治下篩平旦酒服五分七訖如人行七里久
勢欲解更飲酒五合為佳

太乙備急散 治卒中惡客忤五尸入腹鬼刺鬼疰及中蠱疰吐血下血及心腹卒痛腹滿傷寒熱毒病
六七日方 雄黃 桂心 芫元 兩半 丹砂 蜀椒 兩半 藜蘆 巴豆 一分 野葛 三分 附子 五分 右九
味巴豆別研如脂餘合治下篩以巴豆合相更搗置銅器中密貯勿泄有急疾水服錢五匕可加至
一錢止老小半之病在頭當鼻効在膈上吐在膈下利在四肢當汗出此所謂如湯沃雪手下皆愈方
宜秘之非賢不傳

龍牙散 治百症邪鬼飛尸萬病方 龍牙 茯苓 各二兩半 雄黃 苓藥 藥膏 五分 乾地黃 石斛 胡
燕屎 各三兩 鬼箭羽 鳥頭 羌活 露蜂房 曾青 珍珠 桂心 厥仁 防風 桃奴 鬼臼
鵝骨 一枚 人參 大黃 兩半 白朮 二兩 蘇子 四合 橘皮 甘草 川芎 遠志 鱉甲 鬼督郵 銅

鏡鼻各半 狸陰二具 蟠蛇一枚 右三十三味治下篩酒服

一刀圭以知為度當有蟲從大便出

行義

諸症方中惟此因房中勞極故用法稍平雖有麻辛芥草烏附大雄之毒劣然得參芩歸芍等味涵養血氣不致大傷元氣也 太乙備急散橐集光華藜蘆野葛巴豆之毒劣濟以丹砂雄黃蜀椒桂附亦是峻銳之伍 龍牙散中鶴骨狐陰雄黃曾青烏頭三鬼辟邪攻毒之味無不畢宜為百症萬

病之類治也

治鬼疰蠱疰毒氣變化無常處方

犀角 腐香 丹砂 雄黃 鹿角 龍骨 鮫魚皮 蟠蛇 丁

香

蕤荷根 蜀椒 乾薑

各一錢子十枝

右十三味治下篩酒服方寸匕加至二匕日三

行義

方中丹砂雄黃鮫皮貝子之屬皆症病之治獨蕤荷專為蠱毒而設

備急丸

治卒中惡風氣忤迷絕不知人

方見前卷膽腑門中第十二

墨奴散

治卒得惡症腹脹方

金下墨一合鹽二合右二味合治以水一升半煮取八合一服令盡須

臾吐下即瘥

治暴心痛面無顏色欲死方

以布裹鹽如彈丸大燒令赤置酒中稍服之利即愈

治哭疰方

梳齒間刮取垢水服之

又方 亂髮

一兩臘月猪脂二合

右二味取猪脂煎髮消烊服之

蟲死矣○又方

熬大豆帛裹熨之

治一切病食症方

凡食上病為食症

取金下土如雞子大為末酢澄清一升和服之行五十步吐即瘥○又方

還取本食種數多少相似各少許和合布裹燒灰如杏仁大水服之

行義

墨奴散用金墨之同氣相引得鹽之鹹而涌之上泄也

暴心痛面無顏色太氣上逆可知但需燒鹽酒服以抑之下泄也

哭疰是火燉金象肺絡中為涎垢所積故用梳齒間垢水服取吐以泄火毒

猪脂髮灰金匱名楮膏髮煎治瘀血發黃陰吹正瞑等疾取其能破血通津也

入豆熬熱裹熨取其溫暖散氣食症因飽食以受邪食滯膈上故曰食症用金月下土醋服取吐在上者因而越

之也 又方以所食之物燒末服之以消化所傷之物此惟其發霍之人宜之

鶴骨 三寸丹

鶴骨丸 治飛尸遁尸積聚胸痛連背走無常處或在臟或腫在腹或奄奄然而痛者方 鶴骨 三寸丹
砂丹參 杜蠣杜丹一作 雄黃 芎草各四分 藜蘆 桂心 野葛各二分 質質 芫青各四分 蟠蛇一枚 巴豆一枚

砂丹參

杜蠣杜丹一作

雄黃

芎草各四分

藜蘆

桂心

野葛各二分

質質

芫青各四分

蟠蛇

一枚

巴豆一枚

沙丹參

杜蠣

雄黃

芎草各四分

藜蘆

桂心

野葛各二分

質質

芫青各四分

蟠蛇

一枚

巴豆一枚

蜥蜴丸 治癥堅水腫飛尸遁尸寒尸喪尸尸疰骨血相注惡氣鬼忤站毒邪氣往來夢寐存亡留飲結積虎狼所噉獵犬所咋鳩毒入人五臟服藥以殺其毒妻卽消婦人邪氣鬼忤亦能遣之之方方見前第十一

桔梗丸桔梗篇中

卷肝臟門

桔梗丸 治毒症鬼疰食症痰飲宿食不消酒癖諸病方 桔梗 藜蘆 皂莢 巴豆 附子 雨二
右五味為末蜜和搗萬杵丸如梧子大宿不食平旦飲服二丸仰卧服勿眠至食時膈上吐膈脇下去惡物如蝴蝶蟬蟆子或長一二尺下後當大虛口乾可作雞羹飲五合太極飲食粥一升三四日病未盡更服忌如藥法

桔梗丸桔梗篇中

卷肝臟門

桔梗皂莢藜蘆涌吐巴豆攻下附子以奮諸藥之力也

十症丸

治十種症氣疾勞疰鬼疰冷疰人疰死人疰尸疰食症水症土症等方 雄黃 巴豆 雨二人

參 甘草 麥門冬

細辛 茯苓茯苓一作 桔梗 附子 皂莢 蜀椒蜀椒一作 各一右十味為末蜜丸如梧子空心服

五丸日二稍加以知為度

桔梗丸桔梗篇中

卷肝臟門

桔梗丸取桔梗丸中四味不用藜蘆而用雄黃細辛蜀椒之辛烈辟邪且得人參甘草麥冬雖

云助長辛烈之性究竟良藥可保護津氣不似桔梗丸之一派峻銳耳

太乙神明隔冰丸 治諸病破積聚心下支滿寒熱鬼疰長病欬逆嘔噫辟除寒惡鬼逐邪氣擊客猝中惡胸中結氣咽喉閉塞有進有退繞脣絞痛惻惻隨上下按之跳手心中溫溫如有蟲狀毒症相染甚

千金要方

卷十一

十一

至滅門者方 雄黃 二兩 當歸 三兩 丹砂 磬石磬石一作桂心 大黃 各二
人參 珍珠 膜香 鬼臼 库角 牛黃 各一 枝 蟠蛇 一枚 射罔 一兩 烏頭 八枚 杏仁一枚
鴉雞 地膽各七枚 蟹螯七枚 巴豆 一分 右二十四味為末蜜和搗三萬杵丸如小豆先食服二丸日再
不知稍增又以二丸著門上令衆邪不近如傷寒服之無不愈若至病家及視病人夜行獨宿服二丸
衆邪不能近也因牛黃蜘蛛烏頭鴉雞雷歸十二味藥

陷冰為名者毒邪得藥如冰泮涣也方中二十四味除人參丹砂庫角珍珠餘皆大毒大劣上
行義

吐下泄之味尤為辟除邪固之用也

江南度世丸 治萬病癥堅積聚伏尸長病寒熱疰氣流行皮中久病著牀肌肉消盡四肢煩熱嘔逆不
食傷寒時氣惡症汗出口噤不開心痛方 蜀椒三兩 人參 細辛 甘草各二兩 茯苓 珍珠 大黃
乾薑 丹砂 野葛 桂心 雄黃 膜香 鬼臼 酵一烏頭 牛黃 各二附子 紫菀 各六枚 巴豆 廿
枝 蟠蛇 二枚右二十味為末蜜丸如小豆飲服二丸加至四丸日二服加獺肝一具更良

大度世丸 治萬病與前狀同者方 牛黃 大黃 雄黃 珍珠 丹砂 人參 附子 細辛 甘
草 射罔 鬼臼 莪草各一兩 蜀椒 膜香 鬼箭羽 桂心 蔴苓 紫菀各二兩 乾薑 三兩 野葛一兩
蜥蜴 蟠蛇各二十枚 鴉雞三十枚 巴豆八十枚 右二十六味為末蜜丸如小豆大飲服二
丸日二先食服之

度世而分江南見南方風氣柔弱不勝猛烈峻攻不似大度世丸之毒烈倍甚也 大度世丸
行義

度世而分江南見南方風氣柔弱不勝猛烈峻攻不似大度世丸之毒烈倍甚也 大度世丸

中射罔 莺草 蜥蜴 芫青 樟雞無不畢具其迅劣之威與陷冰丸不相上下也

治症病相染易及霍亂中惡小兒客忤長病方 獺肝一具 蟠蛇 一枚 膜香 二分 雄黃 莺草 丹砂

鬼臼 库角 大黃 巴豆 牛黃 酵一右十一味為末蜜丸如麻子空腹服二丸至三丸以知為度

療症傳染雖有雄黃巴豆鬼臼莺草牛黃麝香不用獺肝不能使傳尸瘧癆絕跡也

行義

雷氏千金九

治行諸氣宿食不消飲食中患心腹痛如刺及瘡方

硝石三分 大黃五分 桂心

乾薑

各二兩

巴豆仁

一枚十

右五味為末搗

三千杵

蜜丸如大豆服

二丸

神驗無比已死者

折齒灌之

衍義

於三物備急丸中更多硝石桂心二味以破積堅之邪乃三皇時古方也

九

治卒得尸疰毒痛往來方

杏仁

亂髮灰

等分

右二味研如脂丸如梧子每服酒下三丸日三

丸

日三

桂心

乾薑

兩一

巴豆仁

二兩

右三味治下篩以上醋和如泥傅

治道戶尸疰心腹刺痛不可忍者方

桂心

乾薑

各一

巴豆仁

二兩

右三味治下篩以上醋和如泥傅

病上乾卽易之

治道戶飛尸又治暴風毒腫流入四肢頭面方

白芥子一升

蒸熟

搗以黃丹

二兩

攪和分作兩分用疎

布袋盛更著使熱薄痛上當更迭蒸袋常使熱薄之

如此

三五次

卽定

治人皮膚中癟苦名癰疽方

醋和燕窠土傅之

治走疰方

燒車缸

令熱暫入水以濕布裹熨痛上

治三十年氣疰方

豉心半升

生椒一合

右二味以水二升煮取半升

適寒溫用竹筒吸

取汁令病者側

臥手摩大孔射灌之少時

當出惡物

此法垂死

悉得治瘥百十

不可具說

衍義

卒得死疰邪未深入

但用杏仁

以泄滯氣

髮灰以散結血

道戶尸疰心腹刺痛皆陰毒為患

故於備急丸中陰去大黃之純陰

易入桂心助陽

醋和傅痛處以破陰邪之秘拒

屍疰心痛不似心

腹刺痛之勢劇故以艾鋪熱熨取純陽之火

以散陰毒之邪耳

芥子祛疫黃丹拔毒

二物熱熨使熱

氣內達以散結積之毒

皮膚中痛風濕原來深

入但取燕泥

醋和以收其邪可無藉於湯藥

痛而

走疰風火之來故以車缸燒熨取其流動之意耳

或解惡毒散

結氣從上而引濁惡

下泄魄門亦

肺與大腸之竅也

凡五戶者飛戶遁戶風戶沉戶戶症也今皆取一方兼治之其狀腹痛脹急不得氣息上衝心胸傍攻兩
脇或塊壘踊起或牽引腰背治之之法灸乳後三寸男左女右可二七壯不止者多其壯數取愈止 又
灸兩手大拇指頭各七壯 又灸心下三寸十壯 又灸乳下一寸隨病左右多壯數 又以細繩量患
人兩乳頭內卽裁斷中屈之又從乳頭向外量使當肋罅於繩頭灸三壯或七壯男左女右 卒症猝攻
心胸灸第七椎隨年壯 又灸心下一寸三壯 又灸手肘穴隨年壯 一切病食症灸手小指頭隨年
壯男左女右 五毒症不能飲食百病灸心下三寸胃脘十壯 水症涌水經云肺來乘腎食後吐水灸
肺腧 又灸三陰交 又灸期門穴在乳下二肋間瀉肺補腎也各隨年壯 一切症無新久先仰卧灸
兩乳邊斜下三寸第三肋間隨年壯可至三百壯又治諸氣神良一名症市

長洲張瑞路王衍義
南沙席世臣郢客校

大腸腑方凡七類

大腸腑脈論第一

論曰大腸腑者主肺也鼻柱中央是其候也肺合氣於大腸大腸者為行道傳渴之腑也號監食機重二斤十二兩長一丈二尺廣六寸當脾右回疊積還反十二曲貯水穀一斗二升主十二時定血脉和利精神平全明堂外臺同難經云長二丈一寸半十六曲盛穀一斗水一尺狀半寸鼻遂以長以候大腸右手關前寸口陽絕者無大腸脈也若少氣心下有水氣立秋節即欲刺手太陽治陰在魚際間右手關前寸口陽實者大腸實也苦腸中切痛如鍼刀所刺無休息時刺手陽明治陽在手腕中湧之大腸病者腸中切痛而鳴濯濯冬日重感於寒則泄當臍而痛不能久立與胃同候取巨虛上廉腸中雷鳴氣上衝胸喘不能久立邪在大腸刺肓之原巨虛上廉三里大腸脹者腸鳴而痛寒則泄食不化大腸有寒驚滯有熱便腸垢大腸有宿食寒慄發熱有時如瘡狀肺前受病移於大腸肺欬不已欬則遺失使利廢氣客於大腸則夢田野肺應皮皮厚者大腸厚皮薄者大腸薄皮緩腹裏大者大腸緩而長皮急者大腸急而短皮滑者大腸直皮肉不相離者大腸結扁鵲曰手太陰與陽明為表裏大腸若病實則傷熱熱則脹滿不通口為生瘡食不入腸腸實而胃虛食下胃胃實而腸虛所以實而不滿今實全虛乍來乍去虛則傷寒寒則腸中雷鳴泄青白之利而發於腸氣水根在大腸方觀治大腸絕不治何以知之泄利無度利絕則死手陽明之脈起於大指次指之端循指外側上廉出合谷兩骨之間上入兩筋之中循臂上廉上入肘外廉循臑外前廉上肩出髃骨之前廉上出柱骨之會上下入缺盆絡肺下膈屬大腸其支者從缺盆直上上頸貫頰入下齒縫中還出伏口交人中左之左右之左上伏鼻孔是動則病齒痛頭腫是主津所生病者目黃口乾鼻衄喉痺肩前膚痛大指次指痛不用氣盛有餘則當脈所過者熱腫虛則寒慄不復盛

千金要方

卷十八

一

者則人迎大三倍於寸口虛者則人迎反小於寸口

大腸虛實

第二

脈二首

矣法七首

方二首

大腸實熱 右手寸口氣口以前脈陽實者手陽明經也病苦腸滿善喘欬面赤身熱喉咽中如核狀名曰大腸實熱也

生薑泄腸湯 治大腸實熱腹脹不通口為生瘡者方 生薑 橘皮 青竹茹 白朮 黃芩 蔴子
仁各三桂心一兩茯苓芒硝各二地黃十兩大棗十四枚右十一味㕮咀以水七升煮取二升去滓
下芒硝分二服

衍義 本經言生薑久服去臭氣通神明故千金以之泄大腸之實熱兼大棗以治心腹邪氣安中養脾平胃氣通九竅橘皮下氣通神竹茹黃芩梔子清上熱口瘡地黃芒硝治傷中逆血痔除邪熱通脹閉共襄推陳致新之功白朮茯苓保守中氣以助諸藥之力桂心為祛熱之內應也

治腸中膚脹不消方 炙大腸俞四十九壯

大腸有熱腸鳴腹滿俠脇痛食不化喘不能久立巨虛上廉主之

大腸虛冷 右手寸口氣口以前脈陽虛者手陽明經也病苦胸中喘腸鳴虛渴唇乾口急善驚泄白名曰大腸虛冷也

黃連補腸湯 治大腸虛冷利下青白腸中雷鳴相逐方 黃連四兩茯苓芒硝各三地榆五兩酸石
榴皮五片伏龍肝雞子大一枚 右六味以水七升煮取二升半去滓下伏龍肝末分三服

衍義

方下雖言大腸虛冷病下青白然腸中雷鳴火激痰動與生薑瀉心湯之用苓連佐乾生二薑同意此用黃連佐榴皮伏龍肝得寒熱相參之妙榴皮酸澀茯苓利之芒硝地榆佐榴皮以理血脫方下雖不治血而治血之義具見言外矣

治腸中雷鳴相逐病下方 炙承滿五十壯穴在伏巨闕相去五寸巨闕在心下一寸後之者伏巨闕兩邊各二寸半

治腸中常鳴時上衝心方 灸臍中

食飲不下腹中雷鳴大使不節小便赤黃陽納主之 腹脹腸鳴氣上衝胸不能久立腹中痛灌濯冬日重感於寒則泄當臍而痛腸胃間遊氣切痛食不化不嗜食身腫俠臍急天樞主之 腸鳴而痛溫留主之

肛門論第三論一首

論曰肛門者王大行道肺大腸候也號為通事令更重十二兩長一尺二寸廣二寸三分應十二時若臍傷熱則肛門閉塞大行不通或腫縮入生瘡若臍傷寒則肛門開大行洞泄肛門凸出良久乃入熱則通之寒則補之虛實和平依經調理方見二十卷中

皮虛實第四論二首

論曰夫五臟六腑者內應骨髓外合皮毛膚肉若病從外生則皮毛膚肉關格強急若病從內發則骨髓痛疼然陰陽表裏內體外皮其病源不可不詳之也皮虛者寒皮實者熱凡皮虛實之應主於肺大腸其病發於皮毛熱則應臟寒則應腑

蒴蘆根湯 治皮虛主大腸病寒氣關格方 蘧蘆根葉物三菖蒲葉物二桃葉皮枝二升細糠一斗秫米五升

右五味以水一石五斗煮取米熟為度大盆器貯於盆上作一小竹牀子罩盆人身坐床中周回四面將席厲障風身上以衣被蓋覆者欲氣息時開孔對中洩氣取通身接汗可得兩食久詳如此三日蒸還溫藥足汗用之若益重不過熱盆下安炭火非但治寒但是皮膚一切勞冷悉治之

衍義 蘭蘆治寒痺拘急菖蒲通利九竅桃葉辟邪散血糠米蒸發內膝共襄作汗之功也

梔子煎 治皮實主肺病熱氣方 梔子仁 枳實 大青 杏仁 柴胡 芒硝各二生地黃 淡竹葉一升生元參五兩石膏八兩

右十味以水九升煮取三升去滓下芒硝分三服

衍義 肺主皮毛肺熱則皮實故用梔子杏仁柴胡元參竹葉治外熱石膏芒硝大青地黃枳實治內

欬嗽第五

論二首
灸法十四首

論曰經云五臟六腑皆令欬肺居外而逆上合於皮毛皮毛喜受邪故肺獨易為欬也邪客於肺則寒熱上竄喘汗出欬動肩背喉鳴甚則唾血肺欬經久不已傳入大腸其狀欬則遺糞腎欬者其狀引腰背痛甚則欬涎腎欬經久不已傳入膀胱其狀欬則遺尿肝欬者其狀左脇痛甚者不得轉側肝欬經久不已傳入小腸其狀欬則清苦汁出心欬者其狀引心痛喉中介介如梗甚者喉痺咽腫心欬經久不已傳入小腸其狀欬則失氣脾欬者其狀右脇痛陰陽引肩背甚者不得動動則咳劇經久不已傳入胃其狀欬而嘔甚則長蟲出久咳不已三焦受之三焦欬狀欬而腹滿不能飲食此皆聚於胃關於肺使人多涕唾而面浮腫氣逆也若順時有風寒令人觸冒解脫傷皮毛閉入肺臟為欬上氣如此也有非時忽然暴寒傷皮膚中與肺合則欬嗽上氣或胸脇支痛欬唾有血者是其熱得非時之寒暴薄之不得漸散伏結深喜肺癰也因欬服溫藥欬尤劇及壯熱吐膿血汁出惡寒是也天有非時寒者急看四時方也問曰欬病有十何謂也師曰有風欬有寒欬有肢欬有肝欬有心欬有脾欬有肺欬有腎欬有膽欬有厥陰欬問曰十欬之證以何為異師曰欲語因欬言不得竟謂之風欬飲冷食寒因之而欬謂之寒欬心下堅滿欬則肢痛其脈反遲謂之肢欬欬則引脇下痛謂之肝欬欬而唾血引手少陰謂之心欬欬而涎出續續不止引小腹謂之脾欬欬引頭項而唾涎沫謂之肺欬欬則耳無所聞引腰并臍中謂之腎欬欬而引頭痛口苦謂之膽欬欬而引舌本謂之厥陰欬風欬者不下之寒欬肢欬肝欬刺足太衝心欬刺手神門脾欬刺足太白肺欬刺手太泉腎欬刺足太谿膽欬刺足陽陵泉厥陰欬刺手太陵夫久欬為欬欬而時發熱脈在九竅一作者非虛也此為胸中寒竇所致也當吐之夫欬家其脈弦欲行吐藥當相人強弱而用熱乃可吐耳欬家其人脈弦為有水可與十乘湯下之但二方不能除欬者陰不受邪故也留飲欬者其人不得卧引項上痛欬者如小兒掣狀夫酒家欬者必致吐血此坐久極飲過度所致也其脈沉者

不可發汗久於數歲其脈弱者可治實大數者死其脈虛者必善胃其人本有支飲在胸中故也治屬飲家上氣汗出而厥屬飲家厥而小便利若失溺不可發汗汗出即厥逆冷夫病吐血喘厥上氣其脈數有熱不得卧者死寒家厥而上氣其脈數者死謂其人形損故也脈大而散散者為氣實而血虛名曰有

表無裏上氣面附腫肩息其脈浮大不治加病尤甚上氣躁而喘者屬肺脹欲作風水發汗愈

小青龍湯

治咳逆倚息不得卧方見第九卷

小青龍湯

下已多唾口燥寸脈沉尺脈微手足厥逆氣

從小腹上衝胸咽手足痺其面翕熱如醉狀因復下流陰股小便難時復胃者與桂苓五味甘草湯治

其氣衝方
桂苓四兩桂心

甘草各二

五味子半升

右四味㕮咀以水八升煮取三升去滓溫服

分三服

衝氣即低而反更咳胸滿者苓甘五味薑辛湯以治其咳滿方

桂苓四兩

甘草

乾薑

細辛各三

五味子半升
右五味㕮咀以水八升煮取三升去滓溫服半升日三

咳滿即止

而更復渴衝氣復發者以細辛乾薑為執藥也脈之當遂渴而渴反止者為支飲也支飲法當

冒冒者必嘔

嘔者復內半夏以去其水桂苓五味甘草去桂加薑辛半夏湯方

半夏

五味子各半

升

桂苓四兩

細辛

乾薑

甘草各二

右六味

㕮咀以水八升煮取三升去滓溫服半升日三

水舌嘔止其人形腫者應內麻黃以其人遂痺故不內麻黃內杏仁

桂苓甘五味加薑辛半夏杏仁湯方

杏仁

半夏

五味子各半

桂苓四兩

細辛

乾薑

甘草各三

右七味

㕮咀以水一斗煮取三

升去滓溫服半升日三若逆而內麻黃其人必厥所以然者以其人血虛麻黃發其陽故也

若面熱如醉此為胃熱上衝薰其面加大黃利之

苓甘五味

加薑辛半

杏仁

半夏

五味子各半

升

桂苓四兩

細辛

乾

薑

甘草各三

桂苓四兩

杏仁

半夏

五味子各半

升

右八味

㕮咀以水一斗煮取三升去滓溫服

半升日三

衍義 小青龍湯余於傷寒門中太青龍條下具言之矣而金匱治咳敘於痰飲之下趙以德衍義論

之最詳以咳必因之痰飲而五飲之中渴膈上支飲最甚咳微渴亦外邪而
支飲漬入肺中自足令人咳嗽不已况支飲久蓄膈上其下焦之氣逆衝而上尤易上下合邪也夫以
之明外內合邪之證惟小青龍湯為的對耳然用小青龍湯其中頗有精義須防衝氣自下而上重增
濁亂其咳不能堪矣傷寒用小青龍湯無少陰證者可服雜證用小青龍湯亦恐少陰臥氣素虛衝任
之火易於逆上衝任火止無咳且增煩咳況久咳不已顧可動其衝氣耶益衝任二脈與腎絡同出胞
中腎虛不能固守於下二脈相挾從小腹逆衝而上也腎氣本虛之人即素無痰飲續感外邪則衝任
之火使乘勢上墮膈上迫脣津液而為痰飲支塞清道必致咳逆倚息不得卧也倚息本倚伏而喘息
陰火內應外邪為證最急不得不以小青龍湯為務祇緣真元素虧總有合劑不能逞迅掃之力所以
餘邪得以久持致有如下變證也 多唾飲上溢也口燥津液傷也寸脈沉尺脈微手足逆冷衝中陽
氣耗也氣從小腹上衝胸咽陰火逆也手足瘡榮血虛也其面翕熱如醉陽明胃熱也因復下流陰股
小便難陰火下流膀胱也時復冒太陽餘邪未散也然證雖屢變皆衝氣逆上之故且有時復冒冒一
證即定太陽表證確守曹家汗出自愈之例故反覆出入不離小青龍湯加減也設證多端衝氣最為
叵測所以首變後苓桂心五味甘草湯先治衝氣衝氣即低而反更咳胸滿水在膈間不散也再變前
方加乾薑細辛以治其咳滿咳滿即止 第二變而更復渴衝氣復發以細辛乾薑為熟藥也服之當
遂渴而渴反止者為支飲也支飲者法當冒冒者必嘔嘔者復內半夏以去其水水去嘔止 第四變
以其人形腫者以水尚在表也加杏仁王之其證應內麻黃以其人遂痺故不內之若逆而內之必厥所
以然者以其人血虛麻黃發其陽故也 第五變若面熱如醉此為胃熱上衝熏其面加大黃以利之
以前四變隨證加減施治猶未離本來繩墨至第五變其證頗似戴陽而能獨斷陽明胃熱乃加大黃
以利之按陽明病面白赤色不可攻之為其腎虛陽氣不藏故以攻為戒而此平昔陰虧血虛反用大

苗和之者以其證變體見雖有面熱如醉而脈見寸沉尺微潤非表邪怫鬱而為胃中熱蘊無疑竟行滌飲攻熱不以陰虛為慮而致扼腕也嗟夫仲景治咳全不從喉起見治其支飲下其逆氣衝氣法中之法逆力有餘于金祖述其義以為支飲咳逆之成則

咳而上氣肺脹且脈浮心下有水氣脇下痛引缺盆設若有熱者必躁其人常倚伏小青龍加石膏湯主之方 石膏 敗醬 桂心 細辛 各二 麻黃 四兩 等藥 甘草各三 半夏 半升 五味子一升 右九味㕮咀以水一斗先煮麻黃減二升去沫下藥煮取二升半強者服一升羸者減之仲景淨都心下有水外寒同右九服

衍義 小青龍湯原為咳逆喘息不得卧之首推今因心下有水氣而脈浮頗有似乎風水之候但彼因身腫自汗不渴知病在表故用越婢此因肺脹喘滿痛引缺盆如病在裏故用小青龍加石膏仍不出越婢法

射干麻黃湯 治咳而上氣喉中如水雞聲者方

射干

細辛

款冬花

紫菀

各三

麻黃

生薑

略

升去滓分三服日三

衍義

上氣而作水雞聲乃是痰礙其氣氣觸其痰風寒入肺之一驗故於小青龍方中除桂心之熱芍藥之收甘草之緩而加射干紫菀款冬大棗專以麻黃細辛發表射干五味下氣款冬紫菀潤燥半夏生姜開痰四法萃於一方分解其邪大棗運行脾津以和藥性也

厚朴麻黃湯

治咳逆上氣胸滿喉中不利如水雞聲其脈浮者方 厚朴 五兩 麻黃 四兩 石膏 細辛

乾薑 各二 小麥 一升 杏仁 半夏 五味子 各半 右九味㕮咀以水一斗二升先煮麥熟去麥內藥煮三升去滓分三服日三

衍義

咳而脈浮者外邪居多法當發散為主故於小青龍湯中除去桂枝湯三味加入厚朴以下氣

石膏以清熱小參引入胃中助其升發之氣也

澤櫟湯

治上氣而脈沉者方

澤櫟三升細切以東流水五斗五升去滓濁半夏半升生薑紫菀紫參白前各五

黃芩

甘草

桂心

人參各三

右九味內澤櫟汁中煮取五升每服五合日三夜一

衍義

咳而脈沉邪在營分熱過於營反而不出其血必結邪氣外襲故用澤櫟破血為君加以生薑

半夏之開痰紫菀白前之下氣黃芩之清熱桂心之和營人參甘草匡助胃氣以行藥力俾壅一空元氣不損製方之妙若此得不以之為法耶

麥門冬湯

下氣止逆治火逆上氣咽喉不利方

麥門冬汁三升半夏一升梗米三合人參甘草各

兩大棗二十枚

右六味以水一斗二升煮取六升去滓分四服日三夜一

衍義

此胃中津液乾枯虛火上炎之候凡肺氣有胃氣則生無胃氣則死胃氣者肺之母氣也故於

竹葉石膏湯中偏除玄石一味而加麥門冬數倍為君人參甘草粳米以滋肺母使水穀之精微皆得上注於肺自然沃澤無虞當知火逆上氣皆是胃中痰氣不清上溫肺隧占據津液流行之道而然是以倍用半夏更加太棗通津滌飲為先與義全在乎此若濁飲不除津液不致雖日用潤肺生津之劑烏能建止逆下氣之勳哉俗以半夏性燥不用殊失立法之旨

麻黃石膏湯

治上氣胸滿方

麻黃四兩石膏如雞子大朴五兩小參一升杏仁半升

右五味以水一

半先煮小參熟去麥下藥煮取三升去滓分三服

深師用此治人逆上氣喉中如水雞鳴者加半夏五味子各半升乾薑三兩

衍義

此於麻杏甘石湯中除去甘草之緩中易入厚朴以泄滿小參以助肺胃而資少陽生發之氣以其得春升之氣最先也

十乘湯

夫有支飲家咳煩胸中痛者不卒死至一百日一歲可與此方

大棗十枚大戟甘遂芫花搗為末以水一升五合煮盡取八合去滓內藥末強者一錢大羸者半七

頓服平旦服而不下者平旦更加半七後自然補養

芫花等分

右大戟甘遂芫花搗為末以水一升五合煮盡取八合去滓內藥末強者一錢大羸者半七

衍義十乘湯方在傷寒門中治表已解裏未和痰滿脇痛在金匱中治懸飲內痛干金取治支飲咳煩胸中久痛總取峻攻痰積以破宿積

欬而引脇下痛亦十乘湯主之

溫脾湯 治食飢而咳者方 甘草四兩 大棗十枚 右二味㕮咀以水五升煮取二升分三服若咽中痛而聲鳴者加乾薑一兩

衍義肺胃虛寒則咳故用甘草溫散臟腑寒熱邪氣大棗安中養脾其建溫脾之功世本方下註治食飽而咳宜有食飽胃實而咳反用甘草大棗二味實之之理故力正之

百部根湯 治嗽不得卧兩眼突出方

百部根 生薑各一兩

甘草六兩

各三兩桂心四兩麻黃六兩

右九味㕮咀以水一斗二升煮取三升去滓分三服古今錄驗有杏仁四兩紫菀三兩

衍義嗽不得卧兩眼突出明是寒鬱熱邪為患故首取百部之溫散肺氣麻桂薑辛之開發肺邪貝母助百部消寒木甘助麻桂透表五味收麻辛之散也

海瀉湯 治咳而下利胸中痞而短氣心中時憚四肢不欲動手足煩不欲食肩背痛時惡寒方

海瀉四兩半夏五味子各半升生薑一兩細辛三兩

於苓六兩 杏仁五十

右七味㕮咀以水一斗煮取三升去滓分三服日三一方無五味子生薑

衍義咳而下利水飲溢於肺胃滲於大腸而見痞逆短氣心中時憚者心火惡水之象也四肢不欲動不欲食者脾氣傷也背痛惡寒者陽氣失職不能榮於陽位也故用海瀉之鹹順而泄留飲水氣杏仁下氣泄滯於半身薑滁除痰垢五味收斂肺氣也

白前湯 治水咳逆上氣身體浮腫短氣張滿晝夜倚壁不得卧咽中作水雞鳴方 白前 紫菀 半夏

大戟各二 右四味㕮咀以水一斗浸一宿明日煮取二升分為三服

衍義咳逆上氣而見肢體浮腫作水雞聲乃水飲溢於肺胃流入百骸故用白前以疏肺氣紫菀以

散血氣半夏以滌痰氣大戟以利水氣皆從金匱澤漆湯中採出大戟之利水與澤漆不殊治九種氣嗽欲危百病方

乾薑 半夏 細辛 紫菀 菴花 茉莉 吳茱萸

茯苓

甘遂

防葵 人參 烏頭 大黃 杏仁各五分 厚朴 甘草 甘遂

白薇

遠志

菖蒲

五味子

前胡 枳實 蜀椒 皂莢 當歸 大戟 桂心各半

右二十八味為末蜜丸如梧子大先食

服二丸日二服以知為度不知增之

衍義 氣嗽而兼九種百病之治故兼採寒熱補潤氣血痰水及平峻攻之味無一不具苟非麗雜之方亦無以療龐雜之病

麻黃散 治上氣嗽方 麻黃半斤 杏仁一百枚 甘草三兩 桂心一兩 右四味治下篩別研杏仁如脂內藥末和合氣上時服一方寸匕食久氣未下重服一方寸匕可至二七氣發便服即止 一方去桂心

甘草

衍義 上氣而嗽非開泄肺氣無以逞止逆之功故取傷寒麻黃湯溫散胸中之邪不必更加一味素

亂先聖成則

蜀椒九 治上氣咳嗽太醫令王叔和所撰御服甚良方

蜀椒五分 烏頭 杏仁 石菖蒲 蘆石一

石 菊花 茄子 一錢 冬花 細辛 紫菀 乾薑各三分 麻黃 吳茱萸各四分

右十二味為末蜜丸如梧子

大暮卧吞二丸治二十年久嗽不過二十九

衍義

辛溫破結之劑彙集一方以治積年冷氣頑痰可謂峻矣更須舉石之專攻腹中堅癖皂莢之去風拔毒通關利竅何憚二十年久嗽不能克應乎

通氣丸 治久上氣咳嗽咽中腥臭壅氣覺心痛眼疼耳中嘈嘈風邪毒症時氣食不生肌肉胸中膈塞

嘔逆多唾惡心心下堅滿飲多食少惡疰淋痛病方 蜀椒二升 鹽糖三升 杏仁 天門冬 乾薑

人參各四分 烏頭七分 桂心六分 大附子五枚 蟠蛻五節

右十味為末別治杏仁如脂稍稍內藥末搗

千杵詳飴乃內藥末中令調和含如半束一枚日六七夜三四服以胸中溫為度若導與鬼交通及飲食者全用蜈蚣食不消加杏仁五合小腹急腰痛加天門冬杜仲有風加烏頭三枚附子一枚立夏後勿加也有停飲加葶藶三兩

衍義

金匱大建中湯專取蜀椒下氣止逆乾薑溫中破積人參補正除邪膠飴潤肺止嗽以治胸腹寒積出見有頭足上下痛不可觸千金加烏附桂心以攻毒破結杏仁泄肺散滿蜈蚣散風解毒天門冬除咳逆寒熱并化烏附椒薑之燥烈也

治咳逆上氣方 蜀椒 桂心 海蛤各四
昆布 海藻 乾薑 細辛各六
參門冬十分 右八味為

末蜜丸如梧子大飲服十九加至二十九日三服有人風虛中冷胸中滿上氣喉中如吹管聲吸吸氣上欲咳服此方得瘥

衍義

咳逆日久不除必是寒痰膠積之故故用椒桂薑辛以通肺絡之寒邪海蛤昆瀉以破肺竅之痰氣用麥門冬者不特治咳并滋方中辛燥諸味詳喉中如吹管聲豈非病在肺竅之明驗乎

治咳嗽胸脅支滿多唾上氣方 肺石一作烏頭 卷石一斤菖蒲各一兩 細辛 黃芩各二分 杏仁 款冬花 柴

莞各三

吳茱萸四分 乾薑五分 蜀椒五合

右十二味為末蜜丸如梧子大每服一丸著牙上嚥汁日

五六服劇者常含不止○又方 薑汁半升 砂糖五合

右二味煎薑汁減半內糖更煎服之○又方

白糖五分 茱萸末十六分之一

右二味先微暖糖令消內食茱萸末合和相得丸如小豆先食服三丸○又

方 酒一升半浸肥皂莢兩挺經宿煮取半升分三服七日忌始藥法若吐多以酢飯三四口止之○

又方 巴豆炮去皮勿傷破肉白飲吞下初日二枚二日三枚○又方服芥子丸以油酒下之

衍義 咳逆胸脅支滿濁痰委積清道也上氣多唾寒飲滌於膈上也方中譽石治堅癖邪氣烏頭散

茱萸並泄胸中逆滿以溫咳逆多唾也○又方 薑汁半升溫肺砂糖甘緩和脾火良疾清者為宜

千金要方

卷十八

六

又方 皂莢除痰垢飴糖緩其暴烈 又方 酒浸肥皂莢取吐較飴丸者尤甚 又方 以巴豆炮黑勿破碎服者以其毒烈傷犯喉吻也此惟冷積年久嗽不止者宜之 又方 服芥子入肺搜痰即控涎丹之意

射干煎 治咳嗽上氣方 生射干 穀冬花 酥二紫菀 細辛 桑白皮 附子 甘草 酥半白蜜
竹沥 生薑汁各一升乾薑五兩 云 飴糖三兩 右十一味先以射干內白蜜竹沥中煮五六沸去之㕮咀六
物以水一升合浸一宿煎七上七下去滓乃合飴糖薑汁煎如餚服如酸棗一丸日三劇者夜二不止
加之以止為度

衍義 咳嗽上氣有腎寒肺熱之分此治腎虛火乘於肺故用附子攝腎歸源細辛下通腎氣射干上
散肺結散冬花紫菀滋燥潤肺薑汁開發桑皮竹沥之性流動肺飴白蜜之滯也

杏仁煎 治冷嗽上氣鼻中不利方 杏仁五合五味子 穀冬花 酥二紫菀 乾薑 酥二桂心 三兩甘
草四兩麻黃一斤 右八味以水一斗煮麻黃取四升治諸藥為末又內膠飴半斤白蜜一斤合內汁
中摻令相得煎如餚先食服如半處許日三服不知者加之以知為度

衍義 肺氣通於鼻肺為客邪所遏以故鼻息不通喘嗽痰清非麻黃湯不能開發肺氣加乾薑以溫
腎氣欬多紫菀以溫肺經五味以收麻杏之散耳

又方 治忽暴嗽失聲語不出方 杏仁 薑汁 砂糖 蜜飴一紫菀 五味子 酥二通草 貝母各
兩桑皮五兩 右九味㕮咀以水九升煮取三升去滓內杏仁脂薑汁蜜糖和攪微火煎取四升初服
三合日再後稍加之

衍義 肺為諸氣之門戶暴嗽失音必有寒飲阻積肺絡故用杏仁疏洩肺滿通草通達肺氣薑汁開
通經絡桑皮潤肺之熟五味收肺之津得薑汁之辛散杏仁之閉泄可無欬閉邪風之患紫菀通肺經
之血貝母消肺鬱之痰沙糖理胃中之滞蜂蜜滋膈上之燥也

通聲膏方

五味子

款冬花

通草

三參

青竹皮

細辛

桂心

菖蒲

杏仁

薑汁

各

升白蜜二升

棗膏三升

酥五升

右十三味咬咀以水五升微火煎三上三下

去滓

煎令調和酒服棗大二枚

衍義

肺臟方中酥蜜膏專滋肺胃之燥以化其氣此方專滋肺脾之津以通其聲方中五味人參滋肺之氣欬冬行如清肺之燥桂心細辛搜肺之邪通草菖蒲利肺之竅杏仁酥蜜薑汁棗膏滋培津氣而通其聲大腸主津故以此方隸之此門

杏仁飲子

治暴熱嗽

方

杏仁

滔十

紫蘇子

一升

橘皮

一兩

柴胡

四兩

右四味咬咀以水一斗煮取

三升分三服

衍義

嗽起於暴是實非虛杏仁蘇子橘皮皆泄肺之品柴胡散寒熱之邪

蘇子煎

治上氣咳嗽方蘇子生薑汁地黃汁白蜜

格二

右五味

搗蘇子以薑汁地

黃汁澆之以絹絞取汁更搗以汁澆又绞令味盡去滓杏仁令黃黑治如脂又以向汗澆之絹絞往來六七度令味盡去滓內密合置銅器中於湯上煎之令如餡每服方寸匕七日三夜一崔氏無○又方乾薑末五兩膠餡一斤右二味和令調蒸五升米下冷以東大含化稍稍咽之日五夜二

地黃汁○又

衍義咳久而客邪未除蘊化為熱故用薑汁散邪地黃滋熱且製入蘇子順氣味中更以杏仁熬黑如大陷胸丸中法專滌胸中宿垢內密熬煎加餡緩行搜逐而無驟傷中氣之患如或病人肥盛素多痰濕者宜從崔氏去地黃例又方單用乾薑之辛散肺胃之寒膠餡緩其辛燥頓令噙化與上方藥品雖變而功則一揆

芫花煎

治新久嗽方

芫花

乾薑各二升

右二味

為末內密中令相和微火煎令如糜每

服如棗核大一枚

日三夜一以知為度欲利者多服

深即以治冷飲嗽又治三十年久嗽者以水五升

者先取三升去滓內薑加蜜合煮如糜服之

衍義

以芫花走而不守之味製入乾薑守而不走味中使邪氣去而正氣守內入密中以和走守性

欬久煎 治同前 款冬花 乾薑 紫莞各三五味子二兩

三味取三升半去滓內芫花乾薑末加蜜三升合投湯中令調於銅器中微火煎令如餡每服半棗許

右五味㕮咀以水一斗煮

日三

前
衍義

於芫花煎中加欬冬紫莞以緩芫花乾薑之烈五味以收耗散之津藥品雖倍而功反稍遜於

前

治三十年咳嗽或喘或咳咯雖不同患者之方 細辛 款冬花 防風

紫莞兩三粒蘆二兩蜀椒五

右六味㕮咀取藜蘆先著銅器中次紫莞次細辛次欬冬次椒以大棗百枚間著諸藥以水一斗二升微水煮令汁盡出來曝令燥雞鳴時服半棗不知明日服一枚以胸中溫溫為度若強人欲嗽吐者可小增服之便吐膿囊裹結吐後勿令飲食咳愈止藥藥勢靜乃食不爾令人吐不已

衍義

方中細辛欬冬防風紫莞蜀椒等味助藜蘆湧吐之性製入大棗之中迨逐腸胃積垢峻藥緩攻之妙無以逾之

治三十年久嗽方 百部根二十斤搗取汁煎如餡服一方寸匕七日二服

外臺和鵝一斤熬成煎以溫煶下深師方以白蜜二斤更煎

服二合

衍義

久嗽諸藥不應寸白蟲生肺中故用百部專力殺蟲正馬單刀不假他味佐使外臺之餡深師之審不過借甘溫之味引入蟲口近世師家治久嗽方不問有蟲無蟲槩用此味每發苦寒傷伐胃氣而致天札者不少是豈先哲立法之過歟

又方

紫莞二兩欬冬花三兩

右二味治下篩先食飲服方寸匕七日三服七日瘥

衍義

此方無問暴嗽久嗽虛嗽實嗽有痰無痰有血無血俱無妨礙但客邪勢甚者無益於治也

又方 白蜜一斤生薑二斤

右二味先秤銅鉗兩訖內蜜復秤和數次內薑汁以微火煎令薑汁盡有蜜入蜜

惟有蜜斤兩乃止旦服如東大含一丸日三服禁一切雜食

衍義

蜜取甘潤薑取辛散辛甘合劑專破癰結但火逆咽痛非其所宜
治久嗽不瘥方 兔屎四十枚硝砂二分 胡桐津一分 右三味為末蜜丸如梧子大每服三丸以粥飲下
日二服吐令物盡即瘥

衍義 兔屎為目科消翳要藥故于金取治肺中宿滯得硝砂之攻堅破積梧桐津之搜滌癰垢為形
濁氣穢久嗽之峻藥但梧桐津世鮮收取乃桐花開時飄忽沾衣汚不可滌者是專取濁惡之物以攻
濁惡之垢也吾觀聞人用桐皮漬水沐浴則不染塵垢用皮代津未為不可硝砂善爛金銀硼砂能承
五金無硼砂之毒劣以之代用亦無不可

紫苑丸 治積年咳嗽喉中呀聲一發不得坐卧方 紫苑 贝母 半夏 奎白皮 百部 射干
五味子各五克 英 乾薑 款冬花 細辛 橘皮 鬼督郵各四分 白石英 杏仁各八枚 蟠蛻二枚
右十六味為末蜜和丸如梧子大飲服十九日再服稍加至二十九粒惟無半夏射干蘆薈橘皮鬼督
鴉皮湯送下半以

衍義 久嗽積年不愈必有宿垢留伏於中呀聲一發則伏火內動所以坐卧不安故用皂莢射干督
郵之屬辟除惡毒兼石英薑辛助力祛邪紫苑款冬等味助供佐使之用耳

款冬丸 治三十年上氣咳嗽唾膿血喘息不得卧方 款冬花 乾薑 蜀椒 吳茱萸 桂心 菖
蒲 人參 細辛 菴花各五分 紫苑 甘草 桔梗 防風 芫花 藤苓 皂莢射干惟無半夏射干蘆薈橘皮鬼督
鴉皮湯送下各三
萬木蜜丸如梧子大酒服三丸日三

衍義

前方專辟痰垢此方兼散滯血滯血未有不兼痰垢者所以仍用皂莢滌垢薑辛破結更須羌
花利水桂心散滯人參茯苓甘草扶助胃氣以振祛邪之力餘皆疏風治嗽之常味也
又方 款冬花 紫苑 細辛 蜀椒 桂心 菖蒲 人參 甘草 防風 石斛 菖蒲 當歸
藁本 白朮 半夏 天雄 鍾乳 麻黃各三錢活二兩烏頭 附子 芫花各一錢仁紅升 右

二十四味

為末蜜丸如梧子大酒服二十九日二服不知加之酒清服亦得

衍義 此以麻黃附子細辛湯破除陰邪為主而兼白朮鍾乳雄烏半夏羌花甘草激諸味振發辛烈之性加以散血祛風破結利膈更濟以人參大力無堅不克但當諒其人元氣能任與否庶幾無誤治之失

又方 款冬花 紫菀 乾薑

桂心各三細辛二分杏仁 皂莢 肺石 菖蒲

烏頭各一川椒各五

吳茱萸六合

右十二味為末蜜丸如梧子大酒服五九日三夜一二十年嗽不過五十日愈患咳嗽

喉鳴上氣服一劑永瘥

衍義

譽石治腹中堅癖之峻藥兼用皂莢滌除痰垢濟以烏椒薑辛桂萸菖杏辛烈利膈等味得款冬紫菀引入肺經其氣迅掃之功自紫菀丸至此四方首主宿垢次兼滯血三破陰邪此攻堅癖皆湯練臟腑之劑不可與尋常治嗽等論也

治肺傷咳唾臍血腸澀背痛不能食惡風目暗眩

足胫寒冷方 白膠 生薑各五桂心 人參 紫

菀各二

地黃切半桑白皮切一川芎 大麻仁 餡糖各一

大麥

三升

太秉

二十

右十二味㕮咀以水一斗五升煮麥取一斗去麥內藥煮取三升分五服

衍義

白膠乃楓香脂其性疏通善於開發肺氣故取以治咳唾臍血川芎地黃得桂心和榮之力紫菀散結之功可無委積頓湧之虞且人參助氣於上麻仁滋化於下桑皮潤肺氣之滿大麥降肝氣之逆太棗餡糖滋腸胃之津氣也

五味子湯 治唾中有膿血牽胸脇痛方

五味子 桔梗 紫菀 甘草 川斷各二桑皮 地黃五

兩竹茹三兩赤小豆一升

右九味㕮咀以水九升煮取一升大合分三服

衍義

此火乘於肺所以唾中有膿血而胸脇痛乃血不榮筋之故用五味紫菀滋培津血桔梗桑皮疏泄肺氣竹茹小豆清膈上火生地逐傷中血川斷通行經絡甘草平調中氣不獨為火乘肺氣之

專藥并可為熱傷肺痿之神丹

竹皮湯 治咳逆下血不息方 生竹皮二兩 紫菀二兩 餡糖一斤 生地朮一升 右四味㕮咀以水六升

者取三升去滓分三服

衍義 咳逆下血而用竹茹清胃紫菀和血飴糖滋津地黃逐血然必不經火焙之鮮者方有散血之功若止血之用必明標乾地黃矣設無鮮者不妨以乾者酒浸或稍加桂心熱因熱用要在臨時權變

可也

百部丸

治諸嗽不得氣息唾膿血方 百部根二兩 半兩 麻桂心 五味子 甘草 乾薑 紫菀

兩各一

右七味為末蜜丸如梧子大每服三丸日三以知為度

衍義

嗽不得息明明是火逆為患故用百部導之於下升麻散之於上薑桂之辛以散火五味之酸以斂津紫菀甘草既能治嗽并可和血

治上風咳嗽喘息喉中有物唾血方

生薑汁 杏仁梢二個 膽膏二合 蜜 飴糖各一升 右五味先以豬

膏煎杏仁色黃出之以紙拭令盡搗如膏合薑汁糖蜜等合煎令可丸每服如杏核大一枚日夜六七

服漸漸增加之

衍義 喉中氣結似乎有物故薑汁杏仁開發肺氣飴糖蜂蜜並滋津血然惟大便實者為宜

治一切肺病咳嗽膿血及唾血不止方 好酥三十斤三遍煉停取凝當出醍醐一合日三服瘥止一切

藥皆不出此神方○又方 三煉酥如雞子黃適寒溫灌鼻中日二夜一

衍義

肺咳而用醍醐以滋津血之燥乃治無痰乾咳之的方 一法用乳酥烊化灌鼻孔以鼻為肺

竅也

鍾乳七星散一名吸散

治寒冷咳嗽上氣胸滿唾膿血方 鍾乳 磐石 款冬花 桂心等分 右四味

治下篋作如大豆七聚七星形以小筒吸取酒送下先食服日三不止加之數試大驗又云臨卧吸服

千金要方

卷十八

十九

之○又方 鍾乳 細辛 款冬花 天雄 紫苑 石膏等分 右六味治下篩取如大豆七聚如前法吸之日二只得食粥七日嗽愈乃止若大豆聚不知少益之勿太多

七星散 治三十年咳嗽方 款冬花 紫苑 桑白皮 代赭 細辛 伏龍肝各一 右六味治下篩作七星聚如丸豆者以竹筒口當藥上一一吸咽之令藥入腹中先食日三丸凡服四日日復作七星聚以一嚙肉災令熟以輒轉藥聚上令藥悉偏內上仰卧咀嚼細細咽汁令藥力散散割割然毒氣入咽中藥力盡總咽却取瘥止

衍義 七星之名聚其聚形以示靈驗之意方用鍾乳溫肺為主礬石滌痰欬冬下氣桂心散結利闊節也○又方除去礬石桂心易入石膏佐鍾乳為去熱之嚮導天雄烈勝桂心佐鍾乳以破結積之氣紫菀佐欬冬以通肺氣細辛專利闊竅也又以代赭之重以鎮逆氣佐伏龍肝之暖以散滯血其餘欬冬紫菀桑皮細辛雖治嗽常品專藉血肉同氣之物以為內應獨不用豕肉者以其能助痰肉動風氣且又七星所禁也

治嗽薰法 以熟艾薄薄布紙上紙廣四寸後以東黃末薄布艾上務令調勻以荻一枚如紙長捲之作十枚先以火燒纏下去灰烟從孔出口吸烟咽之取吐止明日復薰之如前日一二止自然可瘥得食白粥餘皆忌○又方 薰黃一兩研令細以蠟紙并上東黃相入調勻捲之如前法薰之亦如上法日一二止以吐為度七日將息後以羊肉羹補之○又方 藍青布廣四十上布艾上布青礬末礬上布少東黃末又布少鹽又布少豉末急捲之燒令著內燥罐中以紙蒙頭便作一小孔取吸烟細細咽之以吐為度若心胸悶時畧歇烟盡止日一二度用三捲不盡瘥三七日慎油膩

衍義 三法總為頑痰固結藥所不應者設若有沉寒則兼熟艾有毒熟則兼蜂蜜有積垢則兼青礬及鹽豉等味咸取薰黃取吐以辟之毒惡氣也

論曰凡上氣多有取吐藥得瘥者亦有鍼灸得除者宜深體悟之

灸法

喫灸兩乳下黑白際各百壯即瘥 又以蒲當乳頭周匝圍身令前後正平當脊骨解中灸十壯 又以繩橫量口中折繩從脊灸繩兩頭邊各八十壯三報三日畢兩邊者是口合度 灸從大椎數下行第五節下六節上穴在中間即道穴隨年壯并主上氣炎手足臂中橫文外骨捻頭得痛處十四壯 上氣咳嗽短氣氣滿食不下灸肺募五十壯 上氣咳嗽逆短氣風勞百病灸肩井二百壯 上氣短氣咳嗽逆胸背痛灸風門熱府百壯 上氣咳嗽逆胸滿短氣牽背痛灸巨關期門各五十壯 上氣胸滿咳逆短氣灸雲門五十壯 上氣咳嗽逆胸膺背痛灸胸膻百壯不鍼 上氣咳嗽逆短氣灸膻中五十壯 上氣氣閉咳逆咽冷聲破喉灸天瞿五十壯 天突逆氣虛勞寒損受寒筋骨掣痛心中咳逆泄症腹滿喉痺頭項強脢痔血陰急算効骨痛大小便澀鼻中乾煩滿狂走易氣凡二十病皆灸絕骨五十壯穴在內踝二三寸宛中

痰飲第六

論一首 方四十首 灸法一首

論曰夫飲有四何謂師曰有痰飲有懸飲有溢飲有支飲問曰四飲之證何以為異師曰其人素盛今瘦水走腸間濇濇有聲謂之痰飲飲後水流在肠下欬唾引痛謂之懸飲飲水過多水行歸於四肢當汗出而汗不出身體疼痛謂之溢飲其人咳逆倚息短氣不得卧其形如腫謂之支飲 凡心下有水者築築而悸短氣而恐其人眩而癲先寒即為虛先熱即為實故水在於心其人心下堅築築短氣惡水而不欲飲水在於肺其人吐涎沫欲飲水水在於脾其人少氣身體盡重水在於肝肠下支滿噫而痛水在於腎心下悸 夫病人卒飲水多必暴喘滿凡食少飲多水停心下甚者則悸微者短氣脈雙弦者寒也皆大下後喜虛耳脈偏弦者飲也肺飲不弦但喜喘短氣支飲亦喘而不能眠加短氣其脈平也留飲形不發作無熱脈微煩滿不能食脈沉滑者留飲病有留飲者肠下痛引缺盆噦轉甚其人咳而不得卧引項上痛咳者如小兒掣狀夫胸中有留飲其人短氣而渴四肢厥節痛其脈沉者有留飲也心下有留飲

千金要方

卷十八

十

其人背寒冷大如手病人肩息上引此皆有溢飲在胸中久者缺盆滿馬刀腫有劇時此為氣飲所致也
膈上之病滿喘咳吐發則寒熱背痛並寒自汗自出其人振振身瞶劇必有伏飲病人一臂不隨時復轉
移在一臂其脈沉細此非風也必有飲在上焦其脈虛者為微勞榮衛氣不周故也冬日瘧一本作人病
瘦飲者當用溫藥和之

小半夏湯 痘心腹虛冷遊痰氣上胸膈滿不下食嘔逆者方 半夏一升 生薑一斤 橘皮四兩 右三
味㕮咀以水一斗煮取三兩分三服 若心中急及心痛內桂心四兩 若腹滿痛內當歸三兩 痘弱
及老人尤宜服之 一方用人參二兩仲景無此人參

衍義 金匱小半夏湯治支飲不渴更合嘔吐噦中橘皮湯專取辛溫散結之味以治心腹虛冷等證
總以溫理中氣為主若心中急痛寒熱糾結加桂心以散之血虛不能以統血脹滿腹痛加當歸以和
之羸弱不能自主則加入參以補之此金匱法外法也

又方

半夏一升 生薑一斤 桂心三兩 甘草一兩

右四味㕮咀以水七升煮取二升半分三服

衍義

小半夏湯金匱本方口薑半二味令加桂心之散兼甘草之緩即苓桂术甘湯之變法

甘草湯

治心下痰飲胸膈支滿目眩方 甘草二兩 桂心一兩 白朮各二錢 苓四兩

右四味㕮咀以水

六升宿清煮取三升去滓服一升日三小便當利

衍義

金匱本名苓桂术甘湯此名甘草湯傷寒門中又名茯苓湯衍義見前十一卷中茯苓湯下

十乘湯

治病懸飲者若下後不可與也凡上氣汗出而咳者此懸飲也

方見本卷

小青龍湯

病溢飲者當發其汗范汪用大青龍湯

方見本卷

本防已湯

治膈間有支飲其人喘滿心下痞堅面白色蟄黑其脈沉緊得之數十日醫吐下之不愈者用

此方 本防已三兩 桂心二兩 人參四兩 石膏雞子大十二枚

右四味㕮咀以水六升煮取二升分二服虛者即愈實者三日復發發則復與若不愈去石膏加茯苓四兩芒硝三合微下利即愈 一劑不加

衍義 趙以德註金匱方曰支飲在膈間氣血皆不通利氣不利則與水同逆於肺而發喘滿血不利則與水雜擇結於心下而為痞堅腎氣上應水飲腎水之色黑血凝之色亦黑故黧之色見於面也脈沉為水緊為寒非別有寒邪即水氣之寒也醫雖以吐下之法治然藥不切於病故不愈用木防已以散留飲結氣石膏主心肺逆氣人參助胃祛水桂心和榮開結且支飲得溫則行若邪客之淺在氣分多而虛者服之即愈若邪客之深在血分多而實者則愈後必再發以石膏為氣分之藥故去之芒硝為血分藥能治痰壅堅秋苓伐腎利水而為芒硝之佐故加之

厚朴大黃湯 夫酒客咳者必致吐血此坐久飲過度所致其脈虛者必胸滿胸中有支飲此方主之
厚朴一尺 大黃六兩 枳實四兩 右三味㕮咀以水五升煮取二升溫服分二服

衍義 此即小承氣湯以大黃多遂名厚朴大黃湯若厚朴多即名厚朴三物湯此支飲胸滿必緣其人素多濕熱濁飲上逆所致故用蕩滌中焦藥治之

支飲不得息葶藶大棗瀉肺湯治之

方見十七卷
肺癰篇中

嘔家不渴渴為欲解令反不渴心下有支飲故也小半夏湯主之又有先渴即嘔者此為水停心下小半夏加茯苓湯主之

小半夏加竹茹湯 治半夏心下痞脹間有水目眩悸方 半夏一升 生薑半斤 茯苓三兩 右三味

㕮咀以水七升煮取一升五合去滓溫分再服

胡治不用菝葜心四兩

衍義

嘔家有痰嘔盡痰去而渴者為欲解與傷寒之脈生青龍湯已渴者寒去欲解同義令反不渴是積飲尚留去之未盡故用半夏散結勝濕生薑散氣止嘔于金更加茯苓佐之與治半夏嘔吐心下痞脹間有水眩悸同法

五苓散 假令瘦人臍下有悸者吐涎沫而顛眩水也此方主之方見前九卷
腹寒上
椒目丸 治腹滿口乾燥此腸間有水氣此方主之 椒目 木防己 大黃各一毫態二兩 右四味

為末蜜丸如梧子大先食飲服一丸日三夜稍增口中有津液止渴者加芒硝半兩

衍義 金匱名已椒黃芩黃九水補腸間則肺氣不宣膈鬱成熟而腹滿津液不主行而口舌乾燥用木防己椒目葶苈利水散結而葶苈无能利腸然腸胃所受水穀之氣邪實腹滿非輕劑所能治必加大黃以渴之若口中有津液則水去津回可勿藥矣若仍作渴者此痰飲聚於血分必加芒硝以祛逐甘遂半夏湯 痘者脈伏其人欲自利利者反快雖心下續堅滿此為留飲欲去故也此方主之 甘遂三枚半夏十二枚以水一升半升取半升甘草藥三枚甘草一枚如指大以水一升者取半升右四味以蜜半升內二藥汁合一升半煎

取八合頓服之

衍義 留飲堵塞寡隊胃氣不得轉輸故脈伏不顯若留飲既下胃氣受傷必欲自利自利而反快者中焦所塞暫通也通而復積故續堅滿必更用藥盡逐之然欲直達其積飲莫若甘遂快利用之為君欲和脾胃除心下堅又必以半夏佐之然芍藥停濕何留飲用之甘草與甘遂相反何一方並用益甘草緩甘遂之性使不急速徘徊逐其所留芍藥木鬱土中成堅滿又佐半夏以和胃消堅也
大茯苓湯 主胸中結痰飲癖脣下弦滿嘔逆不得食亦主風水方 茯苓 白朮各三半夏桂心細辛各一錢生薑一錢橘皮 附子 當歸各二 右九味㕮咀以水一斗煮取三升去滓分三服取三

剉良

衍義

水飲結於脣下雖有桂苓不得生附不能破除陰分之水癖雖有半夏不得生朮不能祛滯胸中之痰氣橘皮者茯苓之佐細辛者附子之佐當歸者桂心之佐也

於苓湯 治胸膈痰滿方 茯苓四兩半夏一升生薑一斤桂心八兩

右四味㕮咀以水八升煮取二升半分四服冷極者加大附子四兩若氣滿者加橘皮三七枚

衍義

痰氣聚於胸中故用小半夏加茯苓湯不得桂心之辛散難以逞破的之功冷極加附子是指真陽虛者而言氣滿加橘皮是指痰氣盛者而言非謂二味可以並入一方也 胃腑嘔吐門中名半夏湯藥味雖同而分而不類故兩存之

大半夏湯 治冷痰飲癖胸膈中氣不運方

米梶一升白朮三兩茯苓 人參 甘草 桂心 附子
各二生薑八兩

右八味㕮咀以水八升煮取三升分三服

衍義 金匱大半夏湯但用半夏人參甘草三味水蜜和煎以治胃及嘔吐此用參附术附桂附合苓桂朮甘湯仍用金匱三味以治冷痰飲癖故不用水蜜和煎而用生薑以滌痰氣也

半夏湯 治痰飲癖氣吞酸方 半夏

吳茱萸略三

薑六兩 附子一枚

右四味以水五升煮取二升半分三服老少各半日三

衍義 前方以中氣不運冷痰積故用參术佐半夏附子此以曲直作酸故用吳茱萸通達肝氣以佐半夏附子仍用生薑開豁痰癖也

乾棗湯 治腫及支滿僻飲方 太棗十枚大戟

大黃

甘草

甘遂

略二

黃芩

二兩

芫花

芫花

略半

衍義 右八味㕮咀以水五升煮取一升六合分四服空心服以快下為度

衍義 此即十棗湯加用甘草之相反激發大戟芫花逐飲之性更加芫花以佐芫花之破積大黃蕷芩以佐大戟而攻懸飲堅僻也

當歸湯 治留飲宿食不消腹中積聚轉下方

當歸

人參

桂心

黃芩

芍藥

甘草

芒硝

略二

衍義 兩大黃四兩澤鴻 生薑略三

右十味㕮咀以水一斗煮取三升分三服

衍義 中氣式微不能輸運而致癖積留著水道不利故用參甘歸芍平調血氣硝黃蕷桂攻理痰積黃芩澤鴻分利支河水道而通蘊阻之熱也

治痰飲飲食不消乾嘔方 人參 旋覆花 橘皮 細辛略一澤鴻

白朮

杏仁

枳實

略二

茯苓

半夏

生薑

柴胡

芍藥

略三

右十三味㕮咀以水九升煮取二升六合分三服日二

衍義 痰氣阻逆於中非開提於上不能開痰進食降濁升清故用旋覆花杏仁疏泄肺氣半夏枳實開豁痰氣人參白朮健運中氣柴胡芍藥調和肝氣細辛橘皮開發滯氣沙參澤鴻通調水氣使肺氣

降而胃氣升肝氣平而穀氣運濁氣散而正氣安矣

治胸中痰飲腸中水鳴食不消嘔吐水方

橘樹生薑

杏仁

柑皮各四半夏八兩茯苓五兩橘

皮三兩右七味㕮咀以水一斗煮取二升去滓分三服

衍義

杏仁開拓胸中之氣薑半消豁膈上之痰橘樹苓泄利腸中之水柑橘二皮一寒一溫升降上下諸氣此惟病氣未固元氣未漓者宜之

吳茱萸湯

治胸中積冷心嘈煩滿汪洋不下飲食心胸應背痛方

吳萸三兩半夏四兩人參桂心

甘草一兩生薑五兩太東二十

右七味㕮咀以水九升者三升去滓分三服日三

衍義

本氣虛寒之人胸中寒熱飲滯積所以汪洋飲食艱於消遣蘊積而從火化所以嘈煩茱萸不能充於陽位所以背痛故用萸桂通陽薑半滌飲人參甘草扶胃進食太東運行脾津乃大小半夏湯之發源也

治胸膈心腹中痰水冷氣心下汪洋嘈煩或水鳴多唾口中清水自出腸胎急脹痛不能飲食此皆胃氣弱受冷故也其脈來沉弦細遲悉主之方

半夏生薑各五兩藥三兩

扶苓四兩

旋覆花細辛

橘皮

桂心

人參

甘草

桔梗

各二

右十一味

㕮咀以水一斗煮取二升分三服

病先有時水

下者用白朮三兩去旋覆若欲得利者加大黃二兩須微調者用乾地黃

衍義

此亦大小半夏之發源彼以胸痛引背故用吳萸此以脹急脹痛故用桂心又以口出清水故

用旋覆細辛橘皮桔梗治冷涎泛舌藥佐桂心以治脇急旋苓佐人參以扶胃弱

衍義

治冷熱久癖實不能飲食

下虛滿如水狀方

前胡半夏

茯苓

生薑各四

枳實

白朮

甘草

芩桂术甘湯

滌除痰飲之專藥更合之以小半夏湯

湯扶苓湯枳朮湯但加前胡以下氣也

衍義

芩桂术甘湯

滌除痰飲之專藥更合之以小半夏湯

湯扶苓湯枳朮湯但加前胡以下氣也

前胡湯

治胸中久寒癖實膈塞胸痛氣不通利

三焦冷不調飲食減少無味或寒熱身重卧不欲起

各三

桂心二兩

右八味

㕮咀以水八升煮取三升分三服

各三

桂心二兩

芩桂术甘湯滌除痰飲之專藥更合之以小半夏湯

扶苓湯枳朮湯但加前胡以下氣也

前胡人參當歸半夏

甘草各二大黃防風麥冬吳萸黃芩各一

生薑四兩杏仁四十

枝右十二味㕮咀以水一斗煮取三升去滓分三服

深師方云若腋下滿加大利水亦佳

旋覆花湯

治胸膈痰結唾如膠不下食者方

旋覆花細辛前胡旋苓

甘草各一

生薑八兩

桂心四兩半夏一升烏頭五枚

右九味㕮咀以水九升煮取三升去滓分三服

桂心四兩半夏一升烏頭五枚

右九味㕮咀以水九升煮取三升去滓分三服

桂心四兩半夏一升烏頭五枚

甘草各一

生薑八兩

薑椒湯治胸中積聚痰飲飲食減少胃氣不足咳逆嘔吐方

薑汁七合川椒三合桂心附子甘草各一橘皮桔梗旋苓各二半夏三兩

右九味㕮咀以水九升煮取二升半去滓內薑汁煮取

二升分三服服三劑止若欲服大散諸五石丸必先取此湯及進黃芪九佳

一方不用甘草

川椒桂附入於二陳湯中但加桔梗舟楫之劑載諸藥以破胸中冷積寒痰也

薑附湯

治痰冷癥氣嘔沫胸滿短氣頭痛飲食不消化方

生薑八兩附子四兩生

用破

右二味㕮咀以

水八升煮取二升分四服亦主卒風

衍義

於前方中但取薑汁附子二味辟冷癥較之前方其力倍專乃乾薑附子湯之變法彼取溫中

故用乾薑此取滌痰故用薑汁而不移易之定法

擦膈散

治心上結痰飲實寒冷心悶方

瓜蒂心炒赤小豆

二七

人參甘草各一

右四味治下篩

為末酒服方寸七日二亦治諸黃

衍義

擦膈者擦動膈上痰飲使之上涌也方用人參甘草入於瓜蒂散中使人參助其上涌之一

舉而偏囊盡出也

斷膈湯治胸中痰癖方

恒山甘草松雞各一瓜蒂二十

右四味㕮咀以水酒各一斗半煮取

枝

一升半分三服後漸減之得快吐後須服半夏湯前篇

衍義 斷膈者斷除膈上痰癖也。瓜蒂吐膈中寒實加以恒山涌膈上調痰松蘿乃松上女蘿氣清味苦能吐肝膽風痰與赤小豆之涌吐心色熱痰似同而異。吐後服半夏湯以實中土緩恒山瓜蒂皆傷伐胃氣也。

松蘿湯 治胸中痰積熱皆除方 松蘿二兩 烏梅

梔子各十個 恒山 甘草各三

古五味㕮咀以酒

三升浸一宿半旦以水三升煮取一升半去滓頓服之亦可分二服 一服得快吐即止

衍義

松蘿湯中不用瓜蒂而用梔子以吐肺胃熱痰即用烏梅以收斂津液與吐後用半夏湯一意

杜衡湯 治吐百病方 杜衡

松蘿各三瓜蒂仁七

右三味㕮咀以水一升二合漬二宿去滓分二

服若一服即吐者止未吐者重服相去如人行十里久令藥力盡服稀糜一升即定者小用之亦佳

衍義

杜衡下氣消痰以其氣濁故用以助瓜蒂松蘿之涌吐

蜜煎 治寒熱方 蜜五合 恒山

甘草各二兩

右三味取二味㕮咀以水一斗煮取二升去滓內

蜜溫服七合吐即止不吐更服七合勿與冷水○又方 蜜六合醋八合 右二味調和平旦頓服須臾猥然欲吐摘之意中不盡明日更服無不大嘔安穩

衍義

蜜煎恒山兼甘草之甘緩與蜜同為戀膈之品專取緩搜膈上之痰也○又方以蜜醋多服須臾兀兀欲吐乘勢以指摘吐之以無瓜蒂恒山等傷胃之藥故云安穩

治卒頭痛如破非中冷又非中風其痛是胸膈中痰厥氣上衝所致名為厥頭痛吐之即瘥方 單煮若作飲二三升許適冷煖飲二升須臾摘令吐吐畢又飲如此數過劇者須吐膽汁乃止不損人而渴則

衍義 若咬苦能連滑淨之脉多食數咀則嘔膽汁亦不損人

葱白湯 治冷熱膈脹發時頭痛悶亂欲吐不得者方

葱白二七

桃葉一握

杜杞葉一握珍珠

恒山 烏頭

甘草 醣半

右六味㕮咀以酒水各四升和煮取二升去滓內珠末每服一升吐即止

衍義

葱白烏頭能吐風痰然須恒山佐之甘草和之慈白桃葉引之珍珠取以安神解毒此為安榮

人安心而用也自掠膈散至此八方總皆一系變法

大五飲丸 主五種飲一曰留飲水停在心下二曰僻飲水僻在兩脇下三曰寒飲水在胃中四曰溢飲水溢在膈上五臟間五曰流飲水在腸間動搖有聲夫五飲者由飲酒後及傷寒飲冷水過多所致方從容遠志苦參藜蘆烏賊骨白朮甘遂大黃石膏枯蠶根桔梗半夏紫苑前胡五味子芒硝桂心羌花大戟葶苈黃芩貝母人參茯苓當歸芍藥各三甘草恒山山藥厚朴細辛附子各三十巴豆三十右三十三味治下節審和丸如梧子大飲服三丸日三稍稍加之以知為度

衍義

金匱有四飲之名于金有五飲之治其法則一師曰其人素盛今瘦水走腸間澑澑有聲謂之痰飲飲後水流在脇下咳唾引痛謂之懸飲于金謂之僻飲三曰飲水流行歸於四肢當汗出而不汗出身體疼重謂之溢飲四曰咳逆倚息短氣不得卧其形如脢謂之支飲于金謂之流飲四飲之外又有留飲留飲伏在心下則背惡寒留於脇下則痛引缺盆平時則短氣而渴四肢歷節痛發則喘滿吐逆寒熱背痛腰痠目泣自出劇則振振身瞶謂之伏飲伏飲即留飲之伏而不動者于金合而言之則為五飲而四飲之中支飲為最劇其留伏之飲則心脇四肢中外皆病兼有四者之患所以于金首列留飲夫病人飲水多必暴喘滿食少飲多水停心下微者短氣甚者則悸悸則水在腎也若心下堅築短氣惡水不欲飲水在心也吐涎沫欲飲水水在肺也少氣身重水在脾也脇下支滿噦而痛水在肝也此槩言五飲致病五臟見證之大端金匱分隸而治于金兼該而行大旨水飲為陰類緣其人內乏真陽雖有濕熱但虛為粘軟不能稠厚所以五飲丸中必需辛溫益氣以鼓諸藥之力如人參白朮附子桂心助陽藥也藜蘆恒山涌吐藥也大戟羌花甘遂葶苈破水藥也大黃芒硝攻下藥也半夏巴豆滌痰藥也巴豆不獨滌痰兼能涌吐所以白散用之吐中便具發散之義使軀殼之水從皮腠而泄也

其用甘草人參芍藥專取相反之味以激大戟芫花甘遂藜蘆攻伐之力因方中攻伐之劑過多恐其津隨飲脫是以從容薯蕷五味扶苓之偏又為必需其餘諸藥或相扶正或佐去邪總不出五種諸法以為五飲通治也

旋覆花丸 治停痰游飲結在兩脇腹脹滿疏瘦不能食食不消化喜唾乾嘔大小便或濁或利腹中搖動作水聲腹內熱口乾好飲水漿卒起頭眩欲倒脇下痛方 旋覆花 桂心 枳實 人參各五分 甘遂三分 吳茱萸 細辛 大黃 黃芩 厚朴 芫花 穗梗各四分 乾薑 芍藥 白朮各六分

桔苓 狼毒 鳥頭 磬石各八分

右二十味為末蜜丸如梧子大酒服五丸日二後加以知為度

甘遂有皂莢附子各二分

白朮狼毒烏頭鷓石細辛黃芩厚朴吳茱萸芫花橘皮

四分

衍義 瘰癬結聚腹脹喜唾乾嘔眩暈欲倒故用旋覆花開結下氣行水消痰開發肺與大腸水氣之味為主其間參用桂心芫花甘遂葶苈大黃等與五飲丸相同者十餘味更加鳥頭乾薑狼毒磬石其破積散癖之力不減五飲丸中大戟巴豆之烈也

中軍候黑丸 治癬飲停結滿閤目暗方 芫花三兩巴豆八分杏仁五分桂心 桔梗各四分 右五味為末蜜丸如胡豆每服三丸稍增得快下止

衍義 黑丸之名專取杏仁熬黑以滌胸中宿垢與巴豆破積不殊并取芫花利水桂心散血桔梗上通肺氣下走大腸所以水腫先從頭面至足頭眩身熱亦取用之本經治腹滿腸鳴幽幽豈非下走大腸之一驗乎

順流紫丸 治心腹積聚兩脇脹滿留飲癩癖大小便不利小腹切痛膈上塞方 石膏五分桂心四分

巴豆七枚 代赭 鳥賊骨 半夏各三分

右六味為末蜜丸如胡豆平旦服一丸加至二丸

胡粉有藜蘆

當歸

歸各三分 蕤谷二分 桔苓三分 藜蘆五分

衍義 紫丸專取代赭煅赤以鎮心下癩癖配以石膏之寒而化心下結熱并取半夏滌除痰飲烏賊

清理敗血桂心分解散取血巴旦上浦冷涎下破寒積服此則承水順流而下故以名方

大黃

治停痰癖飲結在兩脇腹滿羸瘦不能飲食食不消喜唾乾嘔大小便或澀或利方
旋覆花 大黃

附子 茯苓 椒目 桂心 芫花 狼毒 乾薑

芍藥

枳實

細辛

絡八

右十二味為末蜜

丸如梧子大飲下三丸日三服後漸增

衍義 金匱大黃附子湯治脇下偏痛發熱以虛寒從下而上故用大黃附子溫藥下之細辛治陰邪

上逆之發熱此治停痰癖飲故加狼毒芫花枳實以佐大黃之湯癖乾薑桂心茯苓以佐附子之破結

旋覆椒目芍藥以佐細辛散熱也

治風氣膈上痰飲方 用不開口苦瓠一枚湯煮三五沸以物裹熨心膈上

衍義 苦瓠大苦大寒大傷胃氣用以湯煮熨膈者取其引領濁惡之氣從皮毛泄也

治結積留飲癖囊胸滿飲食不消方 火通谷五十壯

丸蟲第七論 三首 方四十五首

論曰人腹中有尸蟲此物與人俱生而為人大害尸蟲之形狀似大馬尾或如薄筋依脾而居有頭尾長三寸又有九蟲一曰伏蟲長四分二曰就蟲長一尺三曰白蟲長一寸四曰肉蟲狀如爛杏五曰肺蟲狀如蠶六曰胃蟲狀如蝨七曰弱蟲狀如瓜瓣八曰赤蟲狀如生肉九曰蟻蟲至細微形如芥蟲狀伏蟲則羣蟲之主也就蟲貫心則殺人白蟲相生子孫轉多其母轉大至長四五寸亦能殺人內蟲令人煩滿肺蟲令人咳嗽胃蟲令人嘔吐胃逆噎膈弱蟲又名膈蟲令人多唾赤蟲令人腸鳴蟻蟲居胴腸之間多則為痔劇則為癰因人瘡瘍則生諸癰疽癬瘻疥癬蟲無所不為人亦不必盡有有亦不必盡多或偏有或偏無此類婦人常多其蟲凶惡人之極患也常以白芷草沐浴佳根葉皆可用既是香草且是尸蟲所畏也 論曰凡欲服補藥及治諸病須去諸蟲并痰飲宿癖醒醒除盡方可服補藥不爾必不得藥力治肝勞生長蟲在肝為病恐畏腹中不安方 蟦 吳茱萸東行根皮各三 乾棗四兩 雞子五枚去黃梗米粉

右五味搗吳茱萸皮為末和藥銅器中煎可丸如小豆大宿勿食平旦飲服一百丸小兒服五

十九蟲當爛出

標名蟲子丸

衍義

諸蟲皆從濕熱生化濕熱之治其善於風藥然蟲蟲之濕皆屬內因內因之濕仍須治內風之者以通風氣而治內風乾漆殺蟲然非穀肉之味投其所喜不能引入其口使之爛出也

治心勞熱傷心有長蟲名曰蟲長一尺貫心為病方

雷丸

橘皮

桃仁

桃核

石蠶各五

狼牙

六分貫

眾二枚

蠻蟲

三七

蕪荑

青葙

乾漆各四

亂髮

如雞子大燒

吳茱萸根皮七分

古十二味為末蜜丸如

柏子

大空腹

苦酒下

七丸

加至二

七丸

日二服

一方無石蠶

衍義

治蟲諸藥如狼牙貫眾蕪荑青葙乾漆吳茱萸根皆能殺蟲獨雷丸專治心勞生蟲者昔有道

士治楊勗應聲蟲得此而愈以心為虛靈之臟言者心之聲故其所生之蟲亦靈慧而能應聲也

治脾勞熱有白蟲在脾中為病令人好嘔下蟲方

大麻子八升

東引

吳茱萸根

一尺

橘皮二兩

衍義

萸根橘皮殺蟲得大麻子引入脾經誘入其口而殺之

治肺勞熱生蟲在肺為病方

狼牙三兩

吳茱萸根

白皮五合

東行

桑根白皮物一

右三味

㕮咀以酒

七升煮取一升平旦頓服之

衍義

治腎勞熱四肢腫急蟻蟲狀如菜蟲在腎中為病方

蕪荑

胡粉

槐皮各一

乾漆二兩

貫眾三枚杏

仁四十

吳茱萸

五十

右七味

治下篩

平旦以井花水服方寸七加至一七半瘥止

衍義

解羨乾漆貫眾吳茱萸皆殺蟲之品胡粉引入於腎始能中的從甘草粉蜜湯中採出

治蛇蟲方

以好鹽末二兩

苦酒半升

合銅器中煮數沸宿

不食空心頓服之

又方

珍珠二兩

亂髮

衍義 鹽醋皆曰用之品惟是專用二物之鹹酸使有化蟲之功效 蟲乃血之所化故用髮灰以散滯血珍珠以散濕熱貴賤所稟不同主治不能無異

蘿蔔丸 治少小有蛻蟲結在腹中數發腹痛微下白汗吐悶寒熱飲食不生肌皮肉瘦黃四肢不相勝
舉方 蘿蔔 貫眾 雷丸 山茱萸 天冬 狼牙各八錢 蘿蔔 甘菊各四分 右八味為末蜜丸如大豆三錢飲服五丸五歲已上以意加之漸至十九加蘿蔔六分名蘿蔔丸治老小及婦人等萬病腹內冷熱不通急滿痛胸膈堅滿手足煩熱上氣不得飲食身體氣腫腰脚不遂腹內狀如水雞鳴女人月經不調無所不治

衍義 本經言蘿蔔辟邪惡除蟲毒取其辛散也貫眾雷丸狼牙蘿蔔皆殺蟲之味山茱萸既能治心下邪氣亦能斂肝腎精血天冬能殺三蟲去伏尸又能強骨髓甘菊能治惡風濕痺蟲乃風濕所化雖無殺蟲之功能散濕熱即蟲失所養必隨諸殺蟲藥而下出矣

治蛻蟲方 蘿蔔末以飲臍和服方寸匕不覺加之

急方治蛻蟲

治熱患有蛻蟲喫懷方 蘿蔔十分乾漆 紙竹絲二 右三味治下篩米飲和一合服之日三治蛻蟲在胃中漸漸羸人才 乾漆外臺鹽醕酒 白蜜各一 右三味內銅器中微火煎令可丸如桃核一枚溫酒中宿勿食旦服之蟲必下未下更服外臺治 又方 取棟實內醇苦酒中浸再宿用綿裹內穀道中入三寸一日易之

集驗方用治長蟲

治蛻蟲攻心腹痛方 劍薏苡根二斤以水七升煮取三升先食服之蟲即死出○又方 鶴虱為末苦

酒空腹服方寸大佳○又方 七月七日採葵蕓子陰乾燒灰先食服方寸匕日三即瘥

衍義

槿蘆殺蟲借臍引入蟲口 槿蘆走氣分更益以乾漆破血篇竹殺蟲化濕熱 乾漆殺蟲酒蜜殺蟲所好 苦棟殺蟲浸酒入綿以內穀道專主肛門之蟲 蒼藪根逐濕下行能治濕熱生蟲之

善藥 鶴虱苦寒殺蟲得苦酒之酸收使不逆上然須用天名精子為真否即是僞

刺疾藜治惡益

破癩痕積聚專祛風木之邪能治內濕生蟲之專味

治寸白蟲方

吳茱萸細根一握熟搗大麻子三升研

搗末

右二味以水三升和搗取汁平旦頓服至已時與好

飯二分

酒清取汗服

○又方

靡蕪六分

狼牙四分

白

右三味治下篩以苦酒二合和一宿次早空腹服之○又方

胡麻一升

胡粉一兩

右二味為末平旦空腹以豬肉臍汁嗽盡即瘥○又方

以榧子四十九枚去皮月上旬平旦空腹服十枚

七日服盡蟲消成水永瘥○又方

以吳茱萸北陰根乾去土切一升以酒一升浸一宿平旦分二服

凡茱萸皆用細根東引北陰者良若如指以上大不住用○又方

用石榴根如茱萸法亦可水煮服

○又方

麻仁五升搗取汁分五服亦治小兒蛇蟲○又方

以好麻油二升煎令熟內葱白三寸令

黑便軟冷頓服之○又方

熬鷄令十分燥作末以方寸七內羊內臍中服之○又方

桑根白皮切

三升以水七升煮取二升宿勿食平旦空腹頓服之○又方

檳榔二七枚治下篩以水二升半先者

其後取一升半去滓內未頻服暖卧蟲出或不盡更合服取瘥止宿勿食旦服之

衍義

萸根走肝麻仁入肺脾故治寸白有效

蘿蔔狼牙治蟲猛藥白飲散結止痛能解風氣百疾

胡麻胡粉皆入於腎隱曲生蟲之專藥

榧子殺肺中寸白

萸根細者行於經絡以治腠理之蟲

石榴根善透石罅故能治竈隧之蟲

白散風蟲亦風毒所化繼

非治蟲之藥實為治蟲之用專取其潤而導之使下也

餌糖濕熱之味然

雖熬本性猶存辛膾之膾投蟲所喜而為蟲濕同氣之治

桑根一味大泄肺氣故能下蟲非湯藥中

配入他藥之狀必生者乃效

檳榔泄胸中至高之氣破腹中委積之蟲總取獨用以擅專功

論曰

凡得傷寒疫疾病腹中有熱又人食少腸胃空虛三蟲行作求食蝕食五臟及下部若齒齦無

色舌上盡白甚者脣裏有瘡四肢沉重忽忽喜眠當數首其上唇內有瘡唾血唇內如粟瘡者心內懊憹

痛則此蟲在上蝕其五臟下侵內生瘡者其人喜眠此蟲在下蝕其下部人不能知可服此飲食蟲藥不偏
驟蟲殺人又曰凡患濕蟲者多是熱病後或久下不止或有客熱結在腹中或易水土溫涼氣著多生此
病亦有乾蟲不甚漏利而下部瘡瘍不問乾濕久則殺人凡濕得冷而苦利單煮黃連及艾葉苦參之屬
皆可用之若病人齒斷無色舌上白者或喜眠煩渴不知痛癢處或下痢急治下部不曉此者但攻其上
不以下部為意下部生蟲蝕其肛肚爛見五臟便瓦燒父於竹筒熏之

治傷寒蟲病方 取生雞子小頭叩出白入漆灰一合攪令極調當沫出更內著殼中仰吞之食酒或半
日乃吐下蟲劇者再服蟲盡熱除病愈

〔衍義〕傷寒蟲病多由熱傷榮血結蟲聚令人狐疑昏惑勢劇難堪者即以漆灰破血為主調雞子
生吞引入肝經血分 治濕蟲方 黃連十分生薑十分苦參四分艾葉八分 服三劑

〔衍義〕蟲乃濕熱蘊化故以黃連苦參苦燥之味療其濕熱兼取艾之純陽薑之辛散為同氣之內應
毋問何蟲無不宜之

懊惱散 治濕蟲瘡爛殺除蟲方 糜竹半兩槿蘆 雷丸 青箱子 女青 桃仁各三 下篩粥飲服方寸七日三加至二七亦可酒服

〔衍義〕懊惱亦是蟲蟲為患故用篇竹槿蘆殺氣分蟲雷丸青箱子女青桃仁破血蟲也

青葙散 治熱病有蟲下部生瘡方 青葙子一兩橘皮 篓竹各二兩槿蘆四兩甘草一分狼牙三分

右六味治下篩米飲和每服一合日三不知稍加之甘草無小品無

〔衍義〕青葙為竹槿蘆狼牙治蟲藥橘皮甘草調和中氣以行藥力

薑蜜湯 治濕蟲方 生薑汁五合白蜜三合黃連三兩 右三味以水二升別煮黃連取一升去滓內

薑蜜更煎取一升二合五歲兒平旦空腹服四合日二

衍義 方中一寒一熱分解濕熱借蜜引入蟲口濕熱之蟲無容身之地矣
治蠭蟲下部瘡穀道中生瘡方 阿膠 當歸 青葙子各二分 父葉一錢 右四味㕮咀以水八升煮取

二升半去滓分三服

衍義 青葙治蟲父葉導熱阿膠當歸以和其血

杏仁湯

治蟲方

杏仁五十

苦酒二升

鹽一合

右三味

和者取五合

頓服之

小兒以意量之

衍義

杏仁上散肺氣下走大腸

借酸鹹以收上逆之氣

桃皮湯

治蠭蟲蛔蟲及痔蟲食下部生瘡方

桃皮

父葉

葛根

一錢

半兩

大棗三十

右四味㕮

咀以水三升者取半升頓服之良

衍義

桃根白皮散

血殺蟲父葉溫血導火槐子益腎清火

大棗入脾以通津液

豬膽苦酒湯

治熱病有蟲上下攻移殺人方

豬膽一具苦酒半升和之

火煎令沸三上三下

藥成放

溫空腹飲三滿口蟲死便愈

衍義

蟲本肝家濕熱所化

豬膽專治肝膽之熱

以苦酒和之乃

豬膽導之變法

治濕病下部有瘡蟲蝕入五臟方

雄黃

皂莢各一分

麝香

硃砂各二分

得病酒服如梧子大一丸

日二

若下部有瘡取梧子大末

內下部日二

衍義

雄黃解毒殺蟲皂莢治瘡飲開脾麝香和榮利竊硃砂辟邪以安神氣

雄黃丸散

治時氣病蠭蟲下部生瘡方

雄黃二兩

桃仁半兩

青葙子

黃連

苦參各三分

右五味

為末

綿裹如棗核大內下部亦可棗汁服方寸七日三

治下部瘡瘍方

青黛

黃連

黃柏

丁香各一兩

麝香一分

右五味治下篩以小棗大內下部中日

一度重者乘大和猪脂二三合灌下部中日二

度重者乘大和猪脂二三合灌下部中日二

度重者乘大和猪脂二三合灌下部中日二

Last page

治下部生瘡方 濃者桃皮煎如鵝取內下部若口中有瘡令之
治濕蟲方 取生薑刮去皮斷理切之極熟研取汁一升半又以水一升半合和相得半日空腹服之仍
削生薑二枚如繭大以楸葉桃葉數重裹訖於爐灰中燒令極熱內下部中食頃著濕蟲者三旦作頓

肢無有不瘞

沿蟲蝕下部方 胡粉 雄黃 右二味等分為末著穀道中亦治小兒
瘧疾 **強方** 營馬帶灰作末以諸皆口導帛繩上內下卯申日五度

治病蟲蟲方 燒馬蹄灰作末以豬脂和傅綿繩上內下部中日五度


治大孔蟲癢方 桂大棗取膏以水捻和長三寸綿裹訖宿內大孔中明且蟲皆出水銀損腸宜慎之
治傷寒熱病多睡變成濕蟲四肢煩疼不得食方 羊桃十斤切搗令熟暖湯三斗淹浸之日正午時入
中坐一坎久不過二度瘥

治熱病帖毒令人喜寐不知痛處面赤如醉下利膿血當數視其人下部孔櫻櫻然一云搜搜赤即疎瘡也

劇困殺人見人肝肺服藥不瘥可熏之之方以泥作小圓令受一升竹篋一枚如指大一頭搗穿入臍腹中一頭內入谷道中淺入可取熟父如雞子大者賈中燃之於臍口吸烟令人腹父盡乃止太人可益父小兒減之羸者勿多宜亦害人日再熏不過三作蟲則死水斷亦可未燒雄黃如此熏之下部瘡瘍雄黃丸散最捷方中雄黃殺蟲桃仁逐血黃連苦參專解濕熱連柏青黛散濕熱麝香達摩散丁香開導熱邪之去路桃葉殺蟲下傅上舍俱無妨礙削生薑導以桃葉裏內下部如無桃葉桃葉亦可代用不必二葉並覆也胡粉入腎雄黃入心為殺陰毒蟲瘡之專藥馬蹄散血辟惡殺蟲亦可應用水銀為殺蟲猛藥雖和棗膏見熬本質猶動大能損腸故云宜慎羊桃壓丹石毒亦能化蟲蟲父熏以辟下部陰蟲加雄黃尤效

孫真人備急千金要方衍義卷十八終

spad hast



S957c

1915

V.D. 070.17-18