




Chinese Surgery


Vol. 3











外科圖說卷三

華亭高文晉採錄氏輯

上海葉鳳鳴橘宗

全校

奉賢交孫德福來

刀針線灸烙五法論

用刀之法。先將手指按於瘡上。熱者為有膿。不熱者為無膿。隨手而起者。定有膿也。然而開之一道。其中豈無法焉。如開胃癰。必須預補元氣。在月餘之後。方可開治。腦爍對口發背。全以內劑為重。待肉腐脫離。方可割。如貼骨癰。腿癰之屬。亦須先行溫補。大加桂

附設或前醫誤用寒涼皮肉必致堅厚散漫無頭日久不潰倘遇此證上則開於環跳下則開於膝上內廉此二處正當骨空不但其膿易泄而收功必速也如開出赤豆沙水者元氣已離必難治療又兩手十指之瘡絲縷帶直其肉最易湧出不若聽其自穿用藥施治若大指頭尖日久骨露必須拔去方能速愈若梅毒上攻聚於面部鼻交頰中肌肉帶橫宜開上唇裏面牙牀之上取出敗瘀朽骨則收功易而外無疤痕也又如喉風當開之證腫處不妨用刀亂割以洩其壅滯之氣若拘執畏縮反致悞人所謂喉疔百

刀正此謂也。惟上下牙盡又中開合之處乃忌刀鍼。至若舌強木舌只宜針刺舌兩邊不可傷及中央。若重舌蓮花舌又須線針直入刺之。大忌橫挑恐傷舌絡故也。至於治痔一法全要審其形勢如何。若小而收根分株者易治。上以麻藥施以利。及用絮止血。應手取效。何難之有。如大而根踏者宜用枯法。必須徐徐而治。或一月或三月亦能全愈。至若久年漏證初診探以銀絲方能知其橫飄直柱以及淺深曲直之由。通肛過橋之重證然後每日用柳葉刀開其二三分開後用絮止血約半日去絮乃上藥版通肛則用

灣刀若素有血證不可開。勞病脈數不可開。肛門前
 後不可開。髻齡以及髦年均不可開。此治橫飄之法
 也。若直柱之候。須用火針插其管中。外用艾炷。火氣
 內攻。覺疼即止。旋用拔管藥線。每日去腐。以長漸短。
 未有不愈者也。若夫掛線之法。有二。一者蛛絲為之。
 一者用藥水煎線為之。可繫則繫。可穿則穿。穿過徐
 徐收緊。亦能去痔。去管并除瘤贅者也。設或遇不可
 繫。不可穿之候。或人畏刀線。須灸法以叅之。灸之一
 道。或灸俞穴。或灸患處。病減即止。不可太過。
仲景云
火氣雖

微內攻有力焦骨
傷筋血難復也

至於烙之一法。口中可烙。喉癰身

上可烙堅塊瘰癧乳巖初起均烙患處凡流血不止
 烙之即止麻木堅頑烙之即愈烙時須預放大蒜或
 鼓餅或附麵或麝魏桂烏研粉作餅四圍用清涼解
 毒之品為末水調護之則使肌肉無傷堅凝可解也

止血絮

醫效靈方
卷六十四頁

上肩疽

下鼠疽



此毒因怒氣上攻于心酒後房事下傷于腎宜服

加味托裏散

桔梗

厚朴

白芷

人參

黃芪

當歸

官桂

川芎

荊芥

黃芩

烏藥

防風

連翹

香附

枳殼

天花粉

右水煎服

胸膈滿悶加陳皮砂仁

熱盛加小柴胡黃芩玄參

咳嗽加麥冬羌苓五味杏仁桑皮

口乾煩燥加麥冬前胡乾葛烏梅

寒多加厚朴防風藿香再服黃凡丸通氣散仍貼

玄武膏金絲膏

如膿出盡時服內補散三四貼

膿未盡時服排膿內托散

小便赤澁用五苓散加黃連燈心服之

其毒從小便中出

更服乳香護心散日進五服

又服黃凡丸日進三服

開胃散 治發背寒氣入胃不欲飲食

砂仁

枳殼

陳皮

茯苓

肉桂

甘草

藿香


厚朴

右水煎服

仍用神異膏貼之

此症上下生之其形雖一而中間皮好但內肉潰爛初起紅色亦不大痛日漸潰爛此症之來六氣七情所感嚴寒酷暑所遇積毒于臟腑或年老男婦性度怡默而亦患此者想平居坐臥濕地而然也若無外症得生若飲食日減泄瀉發熱勢難生矣治法與發背諸癰同

腎俞怒發及脾癰




此蓋土不土之其汗雖一而中間文致出內肉骨
 濕熱步珠過衣不火滯日補氣歸此蓋之來六氣
 出者以氣為寒補者以氣為毒于瀾瀾如平水思
 撮對與針熨而

此症下腎俞雙發因飲熱酒行房怒氣傷肝受濕
而得也陽發于外可治痰發陰發傷于腎膜膿稀
者爲虛難治若老少婦人性氣溫和飲食謹節又
無六情惱懷而亦患此者乃受地之濕氣或暑月
以冷水沐浴而然脾癰發于左膊之間初發可用
艾火灸之急服追疔湯汗之卽散治法服藥同前
蠟凡丸甚宜服之

左搭肩發



右搭肩發



此症少陽經少血有相火尤甚于厥陰發于左搭

肩骨上生者以動之處入可治難安串于右搭肩
難治也此症由于風變之來以脉斷之邪在
表其症大小便如故飲食如常口能知味知其不
在裏也不惡風只燥熱脉不浮知不在表若表裏
既和則邪在經絡中凝于經絡其癱斯出身半已
上風從受之故云八風之變法當却寒邪調和經
絡中氣血則氣血通暢自愈

摻藥

雞黃皮

焙

血竭

花蕊石

冰片

右爲細末濕用乾摻乾用清油調搽

加味麻黃桂枝湯 形實色黑背生紅腫胛骨下痛

脉浮數而洪緊食則嘔

生附子錢一 瓜蒌仁錢一 羌活錢一 甘草節分六 人參錢一

青皮錢一 黃芪錢二 半夏分六 白朮錢一 山藥錢一

水二鍾姜三片煎服 冬天加黃柏

牛膠飲 截癰疽惡瘡險處服之使毒氣不攻于內

不傳惡症

牛皮膠透明好者 右用好酒一碗入膠內重湯煮

令膠溶透者亦用酒煎米湯調和服之

白芷升麻湯

白芷 一錢

升麻 五分

桔梗 五分

甘草 一兩

生地 一兩

黃芩 二錢

酒炒

黃芪

連翹 各二錢

生黃連

一錢五分

紅花 一錢

歸稍 二錢

官桂 三分

當歸 一錢

右十三味水酒各一碗煎至半碗服之須臾并怡
養心神不可妄想以動心火

青皮 一錢

黃芩 一錢

半夏 一錢

白朮 一錢

山藥 一錢

菴州子 一錢

瓜蒌 一錢

茯苓 一錢

甘草 一錢

人參 一錢

祖傳總一而將藥食便便

水片

八種黃林好藥 滋實西黑背坐孫甄戰骨可

左右序



此症發于左搭肩骨上生在移動之處可治難安
串于右搭肩必難治矣可用雞黃皮及綿絮焙乾
爲末濕則乾摻乾則清油調搽

如症發于右搭肩骨上生在移動之處可治難安
串于左搭肩者亦難治之用藥搽摻依前左搭肩
藥治之

另有良方在前左串右串二形圖後看方治之

兩肩兩脇癰疽發



凡兩肩下兩脇邊成癰疽因血虛而氣亦虛切不可服補陽之藥熱劑卽補陽也倘受熱劑則虛熱愈盛易致傷骨膜切慎切慎宜服十六味流氣飲內疎黃連湯治法與發背

湯劑附子薄桂烏頭之類禁用

山潢流注疽




此症多生膏梁形重之人有此症者好食煎炒炙
燂糖蜜之類其疽大者如雞子形像猶如紫李只
腫不紅內串經絡之間流注骨節之內遍身痠疼
百節疼痛用內托散加木瓜 白芍 連翹
再服乳香護心散 黃凡丸

外用圍藥敷之不可遲也

凡用藥以意消息切勿執方對症夫子曰疾固也

痲發



卷一

七

此症屬陰多生骨骼之間初生如梅子大在干皮
肉之間內不疼不痒無力之人二十日始作紅腫
有力人一月方作紅腫內先潰爛皮面上紫黑色
破後口不能收時常作痛出臭膿水必成其漏則
難治矣急服排膿托裏散

排膿內補散

人參內補散

人參膏

五香連翹湯

蠟凡丸

護心散

更用猪蹄湯頻洗之
未潰之先用鐵箍散敷之
能消其一半

冷漏濕毒流注



此毒或因足痒爪破有傷湯火風氣或因寒濕流注於足脛生瘡形如牛眼四畔紫色黑色常出臭血水先用三稜針刺週迴血出盡然後金絲膏貼之呼出毒水腐肉然後將紫金膏貼看瘡已紅活再合隔紙膏貼之方具後

面粉

三錢

輕粉

一錢

白蠟

一錢

黃連末

一錢

黃柏

一錢

血丹

飛過一錢

爲細末清油燭調和攤隔紙膏貼之

又方摻藥

黃連末

二錢

輕粉

二錢

冰片

二錢

血竭

一錢

孩兒茶

一錢

右爲極細末乾摻

紫疥瘡



Faint vertical columns of text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The characters are mostly illegible due to fading and ink bleed-through.

此症五臟六腑之積毒其氣蒸肺而肺主皮毛故發于經絡相傳頭而體膚手足形如紫疥或疹或痒遍生不拘何處項中黑陷久則嘔逆沉重神思恍惚速治之方保無虞

清肌解毒湯

升麻

乾葛

粉草

防風

荆芥

連翹

薄荷

白芷

山梔

白朮

蒼朮

黃連

苦參

花粉

桔梗

羌活

胡麻

青皮

膽草

當歸

川芎

生地

赤芍

靈仙

白蒺藜

虛加人參煮酒加白花蛇蟬脫黃芩肉桂天麻馬鞭草等味以意消息之宜服苦參丸

煎湯洗法 荆芥 薄荷 苦參 白芷

蒼朮 柏樹枝 獨活 桑枝 柳杪

槐枝 鳳仙梗 金銀藤 用水不拘煎湯

去查在無風處薰洗之拭乾用搽藥

搽藥 杏仁一兩 去皮 風子肉一兩二味 另研如泥

輕粉真者 五錢 川椒末三錢 硫黃末二錢 荆芥末一錢

防風末一錢 白芷末一錢 樟冰二錢 枯凡三錢

右各另末和勻雄猪膽汁加生桐油調勻搽入肌

肉不見藥為効

清肌燥濕解毒湯

蒼朮

白朮

防風

荆芥穗

胡麻子

白蒺藜

苦參

減半

當歸

白芍

羌活

薄荷

白芷

川芎

石菖蒲

甘草

右十五味各等分磨末水和為丸每服二錢百沸

湯送下

煎湯

煎湯

煎湯


煎湯

煎湯

煎草藥和以飲此息之宜服苦參

煎散入參黃藥瓜白芥

坐馬癰



此毒癰受在腎經虛毒氣熱毒傷于內大腸之經
並聚成毒而為漏瘡此乃毒症先用宣毒湯次用
敗毒流氣飲

宣毒湯

白芷

赤芍

甘草

五分

大黃

三錢
酒蒸

當歸

二錢

連翹

枳殼

各一錢

水酒各一鍾煎一滾去查早辰空心服

又方

紫蘇

人參

桔梗

枳殼

甘草

柴胡

川芎

羌活

白芷

防風

白朮

芍藥

金銀花

姜三棗一煎服

後用內托追毒飲

人參

黃芪

厚朴

甘草

桔梗

枳殼

金銀花

黃連

烏藥

當歸

芍藥

白芷

川芎

防風

附骨疽癰論

夫貼骨癰者即附骨癰也皆附骨貼肉而生字雖殊而病則一此症之發盛暑身熱賊風入于骨節與熱相搏復遇冷濕所折或居勞太過兩足下水或坐臥濕地身體虛弱而受寒邪然風熱伏結壅遏附骨成疽着大骨節間其急者身不得轉動按之

應骨痛經曰便覺皮肉生急洪洪如肥狀其緩者
一點酸疼漸覺長大行步艱澁以致骨肉不相續
若失治合身成膿不潰至死身變青黯但痛按之
至骨久則結腫或結癰癰其附骨疽久而卽腫結
膿以此爲異若治附骨疽作賊風中之則病深膿
多凡偏枯攣曲之生乃附骨疽之漸也四肢困倦
乍寒乍熱小便赤大便澁無汗須用紫蘇蘄艾鳳
仙草煎湯熱熨之使腠理開發以布拭乾再用乾
被覆之燒乳香薰之如虛甚隨服人參膏畧加附
子以助其氣復以艾火攻之萬無不愈者

貼骨疽



Faint vertical columns of text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is mostly illegible due to fading and ink bleed-through.

此症用筋頭按患處極痛是穴以墨點定艾灸百壯爲期忽爾艾壯爆起不拘壯數乃其驗也不必灸矣獨活寄生湯加人參二錢一服

附骨疽癰之症其毒入于骨髓所犯甚深外膚若好而貼骨之肉已先內潰骨肉已不相連日輕夜重煎寒發熱至百日有膿方可用火針刺之不若初起之際艾灸百壯方可保命若待其出膿百火之中能生幾何急服蠟凡丸

久兩陰濕倍加

蒼朮

白朮

澤瀉

防風


木瓜

附骨癰

治法同前



臟毒症



臟毒者其大腸盡處是臟頭一曰肛門又曰泉孔

內是也毒者其勢兇也皆喜怒不測飲食不節陰
陽不調臟腑不和或房勞太過或飲醞戾之酒或
食五辛炙燂等味畜毒在內流積爲癰肛門腫痛
大便堅硬則株痛其傍生小者如貫珠大者如李
核煎寒作熱疼痛難安勢盛腫脹翻凸虛浮早治
易愈失治潰膿孔爛陷內寸許者難生血膿出而
腫消痛減者易生也

一初起微腫卽用濕蚯蚓糞捻成餅如錢厚放患上
艾壯如半粒豆大者燒之微熱卽去再換餅燒之
再易如前法以十四壯爲期外用冰香散搽之

爐甘石

火煨二錢

黃連膏淬之待乾乳末所用

乳香

一錢另研

石膏

一錢易研

冰片

二分

射香

一分

和研細末田螺搗爛取汁調

塗患上偶無田螺煎黃連汁亦可

先服行藥一劑追其毒

歸尾

二錢

生甘草

二錢

白芷

一錢

黃連

一錢五分

枳殼

檳榔

烏藥

赤芍藥

一錢

生地

天花粉

一錢

皂角刺

桃仁泥

二錢

紅花

各五分

大黃

三錢

穿山甲

焙二錢

玄明粉

二錢

水二鍾浸一宿明早煎至一滾空心服之行利六

七次用薄粥補之若補早腹反痛

清臟內托散

人葠

綿芪

當歸

川芎

陳皮

甘草

黃連

生地

赤芍

白朮

牡丹皮

黃芩

獨活

枳椇

白芷

防風

升麻

烏藥

槐花

廣膠

五錢煎服 倘寒熱脾胃餘症以意增減

肺

疽



此毒因暑熱炎天受其穢氣并伏熱毒之氣故生
此疽在皮膚之間或生遍身形如木鱉子大如鷄
頭大若不速治毒氣入囊卽死內服敗毒散加猪
苓澤瀉當歸黃芪桔梗天花粉荆芥連翹外用圍
藥敷之

升麻湯

治肺癰肺疽胸乳間皆痛口吐膿血作臭

升麻

桔梗

薏苡仁

地榆

黃芩

赤芍

牡丹皮

生甘草

黃芪

貝母

水煎服

虛甚加人參白朮

多服護心散

蠟礬丸

牛黃清心丸



Faint vertical columns of Chinese text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The characters are difficult to discern due to fading and the texture of the paper.

夫肺者五藏之華蓋也此癰因內外兩感風寒所傷及憂思愁慮形寒飲冷以傷肺經遂致成癰身發寒熱兩肢脇腋俱痛口吐膿臭日夜無度喘嗽胸膈喘滿兼脹睡臥不安已破入風者不治急服枳朮桔梗湯

并升麻湯

十六味消化飲

黃礬丸

各進三

五服夜服牛黃清心丸

更有乳香萬應膏貼之

參芪大補湯

節勞戒氣忌酒絕慾已破收斂瘡口

合歡皮白斂二味咬咀每服五錢水煎溫服合歡

皮卽黃芪皮也

桔梗湯

桔梗

貝母

當歸

枳殼

防風

苡仁

瓜蒌仁

桑皮

蜜炙 各二錢

黃芪

二兩 伍錢

杏仁

百合

甘草節

各五分

姜三片煎服

欬花湯

嗽而胸滿振寒脉數咽乾大渴時出濁唾

腥臭臭久吐膿如粳米粥狀者乃為肺癰

欬花

一兩五錢 去梗

甘草

一兩 炙

桔梗

二兩

薏苡仁

三兩

右作十劑水煎服

內癰有膿敗血腥穢殊甚遂致臍腹冷痛此乃敗

膿所致以此推下

膿血

白芷

四兩

白芍

一兩

桔礬

一兩

單葉紅蜀葵根

八分如無以蘇木節代之

右為細末煉蜜丸如桐子大每服三十九清米湯

空心下其膿漸出生肌

非

...

...

...

...

...

...

...

...

...



此症發于胸者名曰井疽狀如豆大三四日起若不早治必入于腹入腹不療十日當死急服內固清心散可治若內發傷膜主死無疑治法與發胸發背同

保內清心散

粉草

升麻

當歸

川芎

黃芪

芍藥

山梔

乳香

黃芩

羌活

桔梗

天花粉

青皮

白芷

水煎服

卽服護心散蠟礬丸

務要戒怒

圍藥同前

甘肅

人參

內塞婿

小燕荷



此毒生于心窩初起則心頭如火熱其毒先內潰
 心胞方出皮膚令人心神恍惚盜汗多出二日皆

紅舌如鷄金背裏外俱熱易治若毒發于外冷氣
攻心常嘔吐惡心口吐冷痰惡聞食味然氣臭者
死治方于後

辰砂 茯神 遠志 茯苓 人參 乳香

沉香 丁香 木香 藿香 麝香 酸棗仁

各等分末之入辰砂末二錢金箔五片全研細燈

心薄荷湯下

內塞散 治穿心冷瘻

人參 白朮 白茯苓 熟地

甘草 芍藥 黃芪 肉桂

當歸

黃芩炒

桔梗

防風

水煎服連服十貼次服黃礬丸護心散常服

詳治法

乾姜為末鷄子清調付如潰爛洗淨瘡口拭乾
末覺熱如烘生肌易愈

六合回生丹 有回生之妙

真鉛粉一兩

輕粉

銀珠

雄黃

乳香菊上

沒藥

同前各二分五厘共
一兩一錢二分五厘

右六味各擇真正好者研為極細末凡治其病先
用好苦茶洗淨瘡口軟絹拭乾后剖猪腰子片用

藥一二分摻腰上却付患上待腰子發熱如蒸良久取去自此拔去毒氣定減痛苦瘡口出膿不可手擠第二日依前法再付之第三日亦付之惡甚可傳七八九次瘡小只傳一次可愈猪腰子不發熱勿治矣

治痛心胸前有孔久不愈卽漏也胃癰井疽心肝癰心癭之類

鹿茸

去毛酥炙微黃

附子

炮去皮臍

鹽花

卽好鹽

右三味各等分

爲末用棗肉去皮核爲丸每服三十丸空心酒下

亦治腰疼



素問云人病胃脘癰當候胃脉脉沉細者氣逆氣
 逆者人迎甚盛則熱人迎者胃脉逆而盛熱聚胃
 口不行故胃為癰其發寒熱如瘡身皮甲錯或嗽

或嘔或吐膿血熱聚胃脘留結為癰須要知戒

連翹升麻湯

沉香 另

乳香 另

生甘草

青木香

各三錢

連翹

射干

升麻

羌活

桑寄生

木通

各七錢五分

大黃

飯上蒸三兩

射香

二錢

右作十劑每劑以粗藥水煎去渣入五香細末溫服以利為度能折其熱毒之氣

犀角湯

犀角

梔子仁

赤茯苓

赤芍藥

射干

黃芩

大黃

炒熟各二錢

水煎去渣入蜜再煎溫服



心者君主之官神明出焉肝者將軍之官謀慮出焉二官有君臣之分一身之主宰其可傷也此癰受在心心主行血氣血熱傷于經絡此是惡毒之

症不可不審也當用定痛敗毒散如不散用內托

流氣飲

定痛敗毒散

紫蘇

桔梗

枳殼

甘草

烏藥

茯苓

防風

白芷

香附

白芍

羌活

人參

前胡

姜三片棗一枚燈心甘莖煎服

內托流氣飲

人參

黃芪

厚朴

甘草

紫蘇

桔梗

枳殼

白芍

當歸

防風

烏藥

白芷

川芎

姜三棗一食前服

腹痛加沒藥玄胡索

血疔瘡



夫血疔者臟中虛弱邪氣相侵真氣衰少感毒閉
塞腠理發于肌膚初如紫疥破時出血瘡生遍身
行處成瘡損傷皮肉疼痛難存治法先服當歸連
翹散並服清肌滲濕湯并搽十神散

清肌滲濕湯

歸鬚

酒洗

白芷

甘草

升麻

蒼朮

白朮

土炒

川芎

白芍

酒炒

山梔

酒炒

連翹

黃連

酒炒

黃柏

鹽酒
排炒

知母

同上

木通

青皮

木瓜

澤瀉

茯苓

苦參

酒炒

枳殼

柴胡

石菖蒲

煎服治法亦同紫疥

蜂巢發胸



此症蜂窠發于胸乳間乃心火熱盛須用依則疎
導心火之藥稍治之遲則熱必攻心必然死矣
煎藥

人參

黃芪

白朮

茯苓

甘草

金銀花

連翹

生地

白芍

山梔

黃芩

天花粉

桔梗

防風

青皮

乾葛

麥冬

鼠粘子

冬天加官桂

夏天加黃柏

雨天加澤瀉

先貼膏藥

後用摻藥方具于前

先期用膏藥

九發



朝服
京服
田服
關服

中
大
中
章
門
中

卷之十一

三

此症發爲肺疽心疽肝疽腎疽脾疽胃疽大腸疽
三焦疽小腸癱右驗其人所膜依據此候審定癰
疽淺深其病從何臟腑發先曾食何乳石又驗其
氣血虛實穿潰出外者可治發于內者則傷膜流
膿大便出者必難治若以藥會膿大便出者則藥
味入于經絡引出無害當參詳而療之

參芪內托散具前愈後一年之外不許遠行及行
房事若不知戒終至于斃

圍藥同前

齊
齋



白木

卷三

三

此症生于膈內因食冷物油膩之物積聚于氣海之間聚結成癰若不速治卽內潰膈內出膿四圍堅硬或出此血水者卽難治也無此卽生

用內托散加

猪苓

澤瀉

歸鬚

黃柏

車前子

知母

膿盡多加

白朮

黃芪

熟地

山藥

多服蠟礬丸

如未潰破按之有膿將治腸肚癰行藥從大便中出甚妙方亦同

痛加乳香

小腸癰



卷三

三

此症因膀胱有熱畜毒不流結成此毒以致膿血
堅硬結核小便疼痛日夜下利無度治方于後
用服敗毒散加

猪苓

澤瀉

木通

燈草

甘草稍

瞿麥

又用連根葱十根搗爛盒臍上多服金花丸
用前腸癰肚癰之法治之

羌活 獨活 烏藥 茯苓 荆芥 當歸

川芎 桔梗 白朮 黃芪 升麻 貝母

枳殼 知母 黃柏 人參

再用前肚癰之法治之

會膿在大便中出法開后

大黃 三錢 姜黃 二錢 赤石脂 二錢 穿山甲 炮一錢

白芷 二錢 髮灰 一錢 巴豆 不去油一粒臨服和藥內研細

右為末老酒早晨空心調服

行利十餘次用薄粥補之如瀉不止飲新汲井水

三酒盃其瀉立止須要服參芪膏大補之

發肚毒



姜火

明

六

白

未

內

六

不

六

天

天

天

天

天

天

天

天

天

發肚之毒有發腹肚或手肚足肚者俱為發肚若不速治必致喪命便服蠲毒流氣飲三四服并服六皮四子湯

內托散加 木瓜 檳榔 蒼朮 空心煎服

未潰用金籬散

已潰后外貼金絲膏 服蠟凡丸

六皮四子湯

陳皮 青皮 腹皮 加皮

姜皮 茯苓皮 天花粉 蘇子

苟子 甘草 葶藶子 車前子

小瀉
大便不通出瀉水愈分

木質賦之而此內汗則神念以賦之於

貴亦入不命取前大

大即內

甘

人

氣

若

生



此毒生于脾經因食煎燂油膩酒醉太過及行房
事以致毒不流通聚成此癰或生在外或生在內
若不速治潰透脾膜卽死用此方服之

厚朴

砂仁

半夏

陳皮

茯苓

人參

青皮

芍藥

木香

枳殼

甘草

甜瓜子

黃芪

白朮

次服內補十宣散

蠟礬丸

潰后久不愈用前六合回生丹猪腰子法治之

未潰爛之前按內有膿狀急用腸癰之行藥追膿
大便中出庶易愈矣

助肚癰



此癰受在大小腸二經氣癰發出在表此乃結癰
聚毒也當用內托流氣飲

人參

木香

黃芪

厚朴

甘草

紫蘇

桔梗

枳殼

官桂

檳榔

烏藥

當歸

芍藥

白芷

川芎

防風

天花粉

姜三片棗一枚用水煎服

外用圍藥 內服腸癰從大便會膿之藥治之調
理禁忌之法相同

氣毒流注



此症因喜怒不常飲食失節氣上停食或因負重
努力傷其經絡故生此疾便服蠲毒流氣飲 內
托千金散 黃礬丸 護心丹 此症乃乘虛感

風濕熱相結而成初生一二漸至于多及有甘三五者遍體皆生先發汗以解風濕次用參芪之劑補之圍藥姜汁醋調石方在前

取汗流氣飲

川芎 白芷 升麻

甘草 當歸 羌活 獨活 烏藥

木香 紫蘇 防風 荆芥 蒼朮

厚朴 肉桂 麻黃 黃芩 桔梗

大柴胡 白芍 水二鍾姜五葱三煎熱服以衣覆身出汗為妙如無汗再服次

鍾有汗不必服止可一劑

次服千金內托散大加參芪 霖雨加蒼朮澤瀉

月藏詩

一求一列前聖

夏天... 詩人... 風...



Faint vertical text on the left side of the page, likely bleed-through from the reverse side.

此癱受在心流于小腸經發在臍中堅硬如石與
男子不同此是惡毒症也當用內托流氣飲定痛
三香飲治之治法須用圍藥并同男子臍癱之藥
加減治之

定痛三香飲

乳香

香附

木香

延胡索

人參

黃芪

當歸

川芎

芍藥

防風

官桂

甘草

枳殼

桔梗

烏藥

厚朴

白芷

夏天去桂加乾葛黃芩生地麥冬

姜三片棗一枚煎服

乳癰

此乳癰之類也

入乳中并管其線

代乳其管



此乳癰之類也

入乳中并管其線

乳房屬陽明經乳頭屬厥陰經此毒因驚憂鬱結
乳間成癰初起二三日即用鹿角散

鹿角

乳牛角

穿山甲

燒過三味為
末好酒調服

外用金縷散蜜水調付若不能痊急用荆防敗毒

散加

瓜婁子

天花粉

水二鍾煎服若五七

日不散服內托散加

白芍

金銀花

外吹乳者小兒吮乳吹風在內故也內吹乳者女
人腹中有孕其胎兒轉動吹風在外故也煎藥中
須用保胎之劑以治乳發之藥同治之

乳發



角散治乳癰及乳疼皂角

一條蛤粉三錢乳香一錢末

之酒調下以手揉乳令散 外用金籬散敷之

內服復元通氣散

木香

青皮

白芷

貝母

金銀花

陳皮

穿甲炮

紫蘇

當歸

川芎

連翹

甘草節

木通

瓜蒌仁

已潰者用人參黃芪貝母白朮之類

治發乳癰疽一切腫毒石膏

青皮

陳皮

穿山甲

酥炙

當歸

木香

人參

麻黃

白芷

甘草

乳香

沒藥

川芎

各分

漏蘆

枳殼

貝母

共為細末酒調服或剉水煎酒服亦可

又方

白芷貝母各半為末酒調下

二錢

日三次如乳

不下加漏蘆

乳疹洗法牡蠣

煨兩

五倍

五分

枯凡

五分

水

二錢

煎洗

婦癰



此疾因女子十五六歲經脉將行或一月二次或

過月不行致生此疾多生寡薄氣體虛弱宜服此
毒散加地黃再服黃礬丸其毒自然而散不致損
命每乳上只有一個核可治若串成三四箇卽難
療也治法逍遙調經湯開鬱順氣解毒湯加減用
之

開鬱順氣解毒湯

青皮

當歸

甘草

撫芎

生地

柴胡

香附

陳皮

梔仁

赤芍

連翹

砂仁

桔梗

天花粉

烏藥

黃芩

羌活

金銀花

冬加桂玄胡索再用夏
枯草四兩水煎服

逍遙調經湯

當歸

生地

熟地

白芍

陳皮

丹皮

川芎

香附

甘草

澤蘭

玄胡索

烏藥

青皮

黃芩

枳椇

柴胡

妳癖



此藥治婦人經水不調，或多或少，或前或後，或痛或不痛，或崩漏帶下，或赤白帶下，或子宮虛冷，或久不受胎，或產後血暈，或產後腹痛，或產後惡露不盡，或產後大便燥結，或產後小便不利，或產後一切雜症，服之立效。

卷之十一
 婦科

此疾乃五六十歲年老之人生此疾症不成膿結
毒莫用涼劑付貼若使涼藥付貼卽毒入肺腑卽
死用鹿角散相和黃礬丸頻頻服之以好爲度
開鬱順氣解毒湯方在前

千金托裏散

本為木木式封照一於日處三四期於煎藥類之

其想

鐵



此毒陰極陽衰柰虛陽積而與血無陽安能散故
此血滲于心經卽生此疾若未破可療已破卽難
治捻之內如山岩故名之早治得生若不治內潰

肉爛見五臟而死

未破用蠲毒流氣飲加

紅花

蘇木

生地

熟地

青皮

撫芎

烏藥

甘草

小柴胡

瓜婁仁

又方

撫芎

柴胡

青皮

香附

各三兩

甘草

玄胡索

陳皮

桔梗

黃芩

梔仁

枳殼

天花粉

烏藥

白芷

貝母

各一兩

砂仁

五錢


蔓荊子

炒一兩

右為末水丸每服二錢日進三四服作煎劑服之

亦可

風毒遍身佛



此毒生於皮膚之間因中暑毒或食災牛災馬痘
猪等物以生此痘雖見勢兇亦易治忌食生冷毒
入臟腑難治先服流氣飲次服人參敗毒散加

猪苓

澤瀉

當歸

防風

外用圍藥

次服蠟礬丸

用前醫流注取汗流氣飲治之甚宜

火腰帶毒受在心肝二經熱毒傷心流滯於膀胱
 不行壅在皮膚此是風毒也當用清肝流氣飲敗



火腰帶毒受在心肝二經熱毒傷心流滯於膀胱
 不行壅在皮膚此是風毒也當用清肝流氣飲敗

毒和氣散治之不可便敷藥清肝流氣飲亦宜

桔梗 甘草 防風 前胡 羌活

獨活 赤芍 連翹 薄荷 荆芥

石膏 枳殼 黃連 白朮 歸鬚

青皮 黃芩 煎服之

敗毒流氣飲 紫蘇 桔梗 枳殼

防風 柴胡 甘草 川芎 白芷

芍藥 當歸 羌活 茯苓 烏藥

陳皮 姜三棗一煎服

患上用紫金錠水磨汁頻用鷲毛蘸汁潤之

丙丹



卷之三

四

內外者從脇下至腰下腫發赤色名曰內丹如早
覺可治至腰便不可治其病多大小便不通似有
不過三日而飛遍身青黑色而死用救急丹醋磨
付內丹處更服連翹敗毒散

當歸

連翹

黃芩

甘草

麥冬

木通

柴胡

前胡

黃連

生地

姜二片棗一枚水二鍾煎服

肩並并丫疽



病肩疽者因負重傷動肩井穴故生此疽用內托
散加 烏藥 青木香 外貼金絲膏

丫疽因空心于宿水內洗手恐水中有蟲遊過染
其穢毒以生此疾急用鐵箍散暗醋調和厚付患
處却服敗毒內托散神思昏迷色紫氣臭者難治



世打劫瀝

刺效

天芥條

式之

當翻

白芥

四風

白芥

風

英檢

林

人



上下肋癰受在肝經寒熱不調風濕伏於腸胃結
成癰毒發出皮膚生此惡症當用敗毒流氣散後

服內托流氣飲

每流氣散

紫蘇

桔梗

枳殼

甘草

芍藥

烏藥

厚朴

青皮

茯苓

陳皮

柴胡

玄胡索

姜三棗一不拘時服

後用內托流氣飲

人參

木香

黃芪

厚朴

甘草

紫蘇

桔梗

枳殼

官桂

烏藥

當歸

白芍

防風

白芷

川芎


茯苓

陳皮

天花粉

姜三棗一煎服

疽 一名 標 疔



訓疽者肺經受熱發于兩手五指頭上一八日不
瀉必死四日可刺如發黑癰不甚過節猶可治也
黑甚過節者死雖過節猶可治者藥入及之也其
狀因小黯肉中生點子點小者如粟豆大惟大者
如梅李或赤或黑乍青乍白有實核卽根也不浮
腫慘痛應心至骨或身體發熱若不急治毒遂冲
上面悉腫泡點紫黑爛壞入藏殺人南人得此名
曰榻着毒卽截去其指恐毒攻上罕有一生十指
端忽然策策痛入于心不可忍之向明望者晃晃
黃赤或黯青黑是燍疽齒間出臭水血者七日亡

矣但厚肉處卽割去用炮鐵烙炮上令焦如炭亦
如疽上灸百壯爲佳須頓飲葵根汁青筵花竹瀝
犀角汁枳殼湯消毒飲若吐膿血不治宜以灰掩
膿血上不爾毒氣着人亦相染矣燦疽害人不旋
踵惡風入肌脉初未知覺毒鬱旣發若火之烈其
上隱小而深實點黑而不明其病應心稍緩則入
臟矣

枳殼湯

枳殼

射干

升麻

生地

黃芩

前胡

金銀花

連翹

大黃

炒

甘草節

犀角

另磨汁臨服加之

水二鍾煎日三服

消毒散

瘰疽熾甚十指舉赤痛而痒

梨蘆

大黃炒

黃柏

黃連

甘草

各二兩

水一斗文武火煮一升濾淨淋洗患處

皂角散

潰后用皂角去皮子燒灰為末鹽湯洗淨

乾付三四次

風疽

由風濕之氣入于腠理流注血脉不利攣曲

腫起疼痛經久不瘥蓋風勝則動故其疽留止無

常得之醉臥當風汗出宜用前十六味流氣飲并

服黃芪丸

芪丸 酒醉汗出風入經絡成風疽

黃芪

犀角

各三兩

黃連

茯神

當歸

防風

各三錢

甘草

三錢

芍藥

升麻

黃芩

各五錢

木通

八分

麝香

一分

右為細末拌勻煉蜜丸如桐子大每服二十九空
心生姜湯下食後再服再用麥冬湯調服護心散
時用膽礬乳香末付之大凡此症須剔去甲方愈
又方 用烏梅十枚熨斗內炭火燒令通赤去火毒
碾極細末以鹽湯洗淨摻之仍軟帛裹之如瘡急
痛卽以酥油塗瘡上

甲疽

足三陰經皆起于足氣血阻滯不行潰于指甲間
或剪甲傷肌或長侵肉或屢小不適血氣阻遏不
通腐潰久則浸淫爛指然病在四末不必治內惟
用摻藥而愈

綠礬丸

綠礬五兩置鐵板上聚炭封之火熾綠礬沸流出
沸定汁盡出火待冷爲末先以鹽湯洗淨瘡拭乾
付末多付愈佳軟帛紮裹當日卽汁斷瘡乾若急
痛以酥令潤每日一遍鹽湯洗有膿處令淨其

乾處不須近湯每洗訖付末如初但急痛卽塗
五六日其瘡上痂漸剝起依前洗付十日餘卽瘡
漸漸總剝痂落軟處或更生白膿疱卽捺破付藥
自然瘥也

甲疽赤肉生甲邊上裹甲用白礬燒令沸定爲末付
之濕則再付一日數易卽消散矣須先以葱椒湯
浸洗足甲令軟快刀割去甲角入肉處搥乾取藥
付之軟絹裹之半日藥濕則易之瘥后須用寬鞋
勿穿窄者

綠礬

蘆薈

各三錢

射香

一分

末之絹袋盛藥納

指于袋中線扎定以瘡為度

甲疽弩肉膿血疼痛

牡蠣厚者生研細末每二錢青旋少許酒調下

嵌甲

礪砂

乳香

各一錢

韶粉

五分

橄欖核

三枚

燒存性

黃丹

一錢飛過

末之麻油調付先以鹽湯挹乾拭之

代指 芒硝煎湯淋洗方潰

附脚背發此症由于消渴之症發于足指者名曰脫

疝其狀赤紫者死不赤黑者可治宜服苦參丸

苦參丸 專治此發

苦參

四兩酒拌炒

羌活

獨活

蔓荊子

茯苓

赤芍

川芎

何首烏

當歸

荊芥

甘草

白芷

防風

白蒺梨

山藥

黃芪

山梔仁

牙皂

川烏

生去皮各三錢再火炮

酒糊為丸每服二錢或酒或鹽湯下茶清亦可

又方

苦參無名異各半同桐油煎三沸加川椒五錢再

煎濾淨將桑葉或芭蕉葉浸油內七日貼在瘡上
即安手指發者同前治之

通風

白芥菜

山藥

黃芩

海桐

麻黃

白芷

白芷

薄荷

依甘

瓜葛

何首烏

竹葉

西藥

黃連

黃連

山藥

山藥

山藥

山藥

山藥

山藥

山藥

山藥

加后癰乃發臂毒也



此發臂毒受在心腎經通於五指絡毒氣流走通
為串漏此是惡毒也當用內托流氣飲定痛消毒

飲治之此肘后毒氣血流注積結成毒非乃靡毒也定痛流氣飲

當歸

生地

紫蘇

芍藥

甘草

桔梗

枳殼

烏藥

白芷

羌活

防風

川芎

茯苓

天花粉

消毒流氣飲

人參

木香

當歸

川芎

檳榔

黃芪

芍藥

防風

甘草

厚朴

桔梗

枳殼

烏藥

白芷

姜三棗一煎服

此左疽生於左腋下乳側間因喜怒不常或飲食
之間忽然被驚或忍氣而得之若不速治必成流
急服千金內托散 蠲毒流氣飲 黃芩丸
外用圍藥鐵箍散或金箍散敷治之

右腋疽




依此圖內其類

六類

右腋疽生於血堂之間初起一小核日漸長大成
疔急服內托散三五貼外用圍藥并服黃凡丸
再服十奇散三五服方可用針刺破

治法同前



筋疽或生臂撐上者即鳩癰也



平分

此於癰疽宜灸之

其間須想必此

非其本也

此疽生動脈之間筋寄之上臂膊不能屈伸若不
速治潰爛筋脈必致成疾若生於臂撐上者名鵝
癰紅腫作痛初宜灸之若潰之必損命不可輕忽
治方于後

內托散加木香五加皮更服黃凡丸十奇散護心
散
外敷鐵箍散加姜汁調付
多服護心散

丹發疽

丁刺毒

天蛇毒



天蛇頭毒

中發疽受在肝經氣血不行壅聚結成毒也當用
托裏流氣飲消毒流氣飲治之

羌活

人參

桔梗

枳殼

甘草

防風

柴胡

黃芩

川芎

獨活

前胡

蟬脫

芍藥

當歸

白芷

右水姜三片棗一枚煎服

托裏流氣飲

人參

黃芪

當歸

川芎

白芍

烏藥

甘草

防風

白芷

厚朴

茯苓

紫蘇

桔梗

青皮

黃芩

天麻

右煎法同前

此毒受在掌后因心經風寒喜怒驚風痰盛血不
流通結成此毒當用定痛散毒散內托清氣飲或



透手心或透腕外再用三香內托散治之
定痛敗毒散

白芍

白芷

乳香末

桔梗

枳殼

防風

當歸

羌活

茯苓

甘草

薄桂

靈仙

木通

金銀花

姜三棗一煎服

夏天加黃芩

內托清氣飲

人參

黃芪

紫蘇

桔梗

金銀花

枳殼

青皮

甘草

厚朴

川芎

防風

天花粉

木香

羌活

當歸

芍藥

煎同前

天蛇毒受心風傷于指肘背此是惡毒症也當用
定痛流氣飲治之

定痛流氣飲

人參 當歸 蟬脫 黃連 桔梗

防風 甘草 白芷 乳香 青皮

白芍 烏藥 山梔仁

此症未熟不宜便用刀開針撥其弩肉即發起深

難治者

又方 用蜈蚣一條火上炙乾末之猪膽汁調塗時

用膽汁潤之

又方 生豆爲末將黃梔子殼二枚研末膽汁調

塗一潰後經年不能長肉用二黃散摻之

二黃散

牛黃

一錢
真者

雄黃

二錢
透明

冰片

一分

右爲細末乾摻須要戒房勞湯火風氣之類

肩疽



肩疽

在腎 肺脫氣血凝滯不行結成疽毒也先

用流... 飲四圍以圍藥敷之

多服消毒散

人參

紫蘇

前胡

川芎

黃芩

桔梗

羌活

獨活

枳殼

茯苓

甘草

防風

赤芍

煎服

內托定痛散

人參

黃芪

地黃

白芷

川芎

赤芍

防風

赤茯苓

甘草

烏藥

桂心

枳殼

桔梗

木香

姜三棗一不拘時服

與肩癰藥同

背面毒



此背
面毒受在肝肺經氣血凝滯不通結聚成毒
此是
疔也當用清毒流氣飲

紫蘇

桔梗

枳殼

甘草

烏藥

白芷

腹皮

黃芩

當歸

芍藥

川芎

防風

羌活

柴胡

白芨

連翹

姜三棗一煎服

后用定痛內托飲

人參

當歸

芍藥

厚朴

桔梗

川芎

甘草

防風

白芷

黃芪

茯苓

羌活

烏藥

官桂


紫蘇


香附

右煎法同前

圍藥用金箍散敷之

外科圖說全書卷之三 終





W138
1856
v. 3

