

御纂醫宗金鑑卷六十一

編輯外科心法要訣目錄

人身經絡圖歌

脈訣歌

十二經氣血多少歌

癰疽總論歌

癰疽陽證歌

癰疽陰證歌

癰疽半陰半陽歌

癰疽五善歌

癰疽七惡歌

癰疽順證歌

癰疽逆證歌

癰疽辨腫歌

癰疽辨痛歌

癰疽辨膿歌

癰疽辨癰歌

癰疽辨暉歌

卷之二
癰疽總論治法歌

內消治法歌

內托治法歌

虛實治法歌

癰疽鍼法歌

癰疽砭法歌

癰疽灸法歌

隔蒜灸

豆豉餅灸

黃蠟灸

附子餅灸

癰疽烙法歌

神燈照法歌

桑柴火烘法歌

牛膠蒸法歌

藥筒拔法歌

御纂醫宗金鑑卷六十一

編輯外科心法要訣

十二經循行部位歌

手之三陽手外頭手之三陰胸內手足之三
陰足內走

註

手之三陽手外頭者謂手陽明大腸經從手次指內側之
端上行手臂外之上行音杭至頭鼻孔兩旁也手少陽三焦
經從手四指外側之端上行手臂外之中行至頭耳前動
脈也手太陽小腸經從手小指外側之端上行手臂外之
下行至頭耳中珠子也手之三陰胸內手者謂手太陰肺

經從胸乳上循行膕內下行肘臂內之上行至手大指內側之端也手厥陰心包絡經從腋下乳外循行膕內下行肘臂內之中行至手中指之端也手少陰心經從腋筋間循行臑外下行肘臂內之下行至手小指內側之端也足之三陽頭外足者謂足陽明胃經從頭目下循頸項乳中下行腹外股膝跗之前行至足二指之端也足少陽膽經從頭目外眥循行繞耳顱巔下行脇跨膝跗之中行至足四指外側之端也足太陽膀胱經從頭目內眥循行額巔項背外行臂膕膕踝之後行至足小指外側之端也足之三陰足內走者謂足厥陰肝經從足大指外側之端循行

前行上內踝上膕腨膝之中行內行陰器復腨之外行上
至乳下也足大陰脾經從足大指內側之端循行內踝
裏股內之中行上行腹中至季肋也足少陰腎經從足心
循行內踝足跟內循之後行上腹內至胸也諸陽行外諸
陰行裏四肢背腹皆如此也

頭正面圖



頭前正面歌

頭督唇任五中行
眡傍足太顴手陽側上足少繞耳手鼻傍手
明唇足方

註頭之正面分五行


音杭

其中行上嘴唇以上屬督脈下嘴唇

以下屬任脈此爲中行也其第二行目內眡旁上屬足太
陽經鼻旁下屬手陽明經此爲第二行也其第四行面顴
骨外旁屬手太陽經頭側上屬足少陽經繞耳前後屬手
少陽經此爲第四行也其第三行唇旁屬足陽明經爲第
三行也

頭後

項頸圖




頭後項頸歌

頭後七行督中行惟二足太足少陽頸前任中二足明三手四行手太陽五足少陽六是手七足太陽督中行

註 頭後項頸分七行其中行屬督脈惟兩旁第二行屬足太

陽經其餘第三行四行五行皆屬足少陽經頸前中行屬任脈二行屬足陽明經三行屬手陽明經四行屬手太陽經五行屬足少陽經六行屬手少陽經七行屬足太陽經項後中行屬督脈經也


胸腹圖



脊

背

圖



卷之十一
三
胸腹脊背歌

胸腹二行足少陰三足陽明四太陰五足厥陰六少陽脊背二
三足太陽

註 胸腹之中行屬任脈兩旁第二行屬足少陰腎經第三行
屬足陽明胃經第四行屬足太陰脾經乳下脇上第五行
屬足厥陰肝經脇後第六行屬足少陽膽經脊外兩旁二
行三行俱屬足太陽膀胱經脊之中行屬督脈經

手 體 脊 外 圖



手 脣 臂 內 圖



手體臂外內歌

手體臂外上手明中手少陽下太陽手體臂內上中下手太厥
少分三行

註

手體臂之外面係手三陽經部位也上行屬手陽明經中
行屬手少陽經下行屬手太陽經手體臂之內面係手三
陰經部位也上行屬手太陰經中行屬手厥陰經下行屬
手少陰經

足

膝

外

圖



內 膝 圖

足



足膝外內歌

足膝外前足陽明中行少陽後太陽足膝之內前中後足厥太少分三行

註

足膝之外面係足三陽經部位也前行屬足陽明經中行屬足少陽經後行屬足太陽經足膝之內面係足三陰經部位也足大指外側之前行股內之中行屬足厥陰經內側之中行股內之前行屬足太陰經足心繞踝之後行屬

足少陰經

手太陰肺經圖



肺經歌

太陰肺經起乳上系橫出腋膕中廉達肘循臂入寸口上魚大
指內側邊

註手太陰肺經起於乳上三肋端去中行旁開六寸腋前外
曲灣而至膕間由膕中廉達肘內循臂裏過前廉入寸口上
魚際終於手大指內側去爪甲角如韭葉

手陽明大腸經圖



大腸經歌

陽明之脈手大腸次指內側起商陽循手臂外過肘臑達肩入缺上頸旁貫頰下齒出入中上俠鼻孔終迎香

註手陽明大腸經起於手大指之次指內側去爪甲角如韭葉許循大指次指之岐骨行臂外前廉過肘外自臑達肩

行缺盆直上頭頸之側環出入中之左右以俠鼻孔兩旁迎香穴而終焉

足陽明胃經圖



胃經歌

陽明胃起目下胞從鼻入齒還承漿頤後頰裏上耳前額顱下循兩頸旁從缺盆口下乳中循腹腿班腿面行外抵膝臍走足跗至足中指外側當

註

足陽明胃經起於目下鼻旁下夾口吻繞腮上行耳前至額角下行頸側夾結喉至肩上橫骨陷中下行當乳之中去中行旁開四寸從乳頂下行至脅旁去中行旁開三寸從脅旁下行至腿之合縫去中行旁開二寸從合縫斜行向外直下膝外前廉至廉骨倒上復轉注而下行至足中指之端去爪甲角如韭葉而止

足太陰脾經圖



脾經歌

太陰脾起足大指上循內側白肉際核骨之後內踝前上臑循行脛膝裏股內前廉入腹中斜行九肋季脇止

註足太陰脾經起於足大指端內側去爪甲角韭葉許由內側白肉際核骨之後過內踝之前自裏中廉上膝由大腿內廉入腹裏上至乳上旁開四寸五分至胸中行旁開六寸許是其部也向外行至九肋間季脇之端而終

手少陰心經圖



心經歌

少陰心經腋筋間膕後肘臂內後廉由內後廉至銳骨小指內側爪甲端

註手少陰心經起於臂內腋下筋間循臂膕之外後廉至肘內廉循臂內後廉下抵掌後銳骨之中行於手小指內側去爪甲角如韭葉許而終

手太陽小腸經圖



小腸經歌

太陽小腸小指端循手外廉踝骨前從手踝骨出肘外上循臑
外出後廉上過肩解繞肩胛交肩貫頸曲頰邊面鳩骨下陷中
取耳中珠子經穴全

註
手太陽小腸經起於手小指外側之端去爪甲角如韭葉
許由手外側至手踝骨之前行肘外後廉上循臑外過肩
後廉而上行肩自肩貫頸過曲頰斜上顴骨至耳前而終

足太陽膀胱經圖



膀胱經歌

大陽膀胱起內眞上額交顴耳後尋下頸循肩肩膊內俠脊抵腰下貫臂貫臂斜入委中穴與支下合膕中存貫腨內出外踝後小指外側終至陰

註足太陽膀胱經起於目內眞上額交顴從顴至耳上角後行下項循肩臂內有二道一道俠脊旁開寸半抵腰中腰中有四空從腰中下貫臂入脰中一道又從脾內左右分下貫脾俠脊內旁開三寸下過髀樞循髀外後廉下合膕中以下貫腨內出外踝之後循京骨至小指外側端去爪甲角如韭菜許至陰穴而終

足少陰腎經圖




腎經歌

少陰腎經起足心上內踝骨足後跟上腨出臚入股內行至胸
中部位分

註足少陰腎經起於足心陷中循內踝入足後跟中行內踝之上上腨分中出膕內廉後股內行至合縫自合縫上行去腹中行旁開一寸至躰從躰旁上行復上去中行旁開一寸五分從腹上行至胸中旁開二寸而終

手厥陰心包絡經圖



心包絡經歌

厥陰心包腋下起腋下乳外臑內行入肘下行兩筋間入掌中指之端止

註手厥陰心包絡經起於腋下三寸乳外側一寸許從腋下向外上轉循臂內入肘內下行兩筋之間入掌中循中指出其端而終

手少陽三焦經圖



三焦經歌

少陽三焦四指端手腕臂外兩骨間貫肘上肩項耳後上繞耳
前動脈間

註手少陽三焦經起於手小指次指之外側去爪甲角如韭

葉許由小指次指岐骨之間上行手腕臂外兩骨中間貫
肘上肩由肩上項至耳後上繞耳上角下循耳前動脈而
終

足少陽經圖



膽經歌

少陽膽經起外眞繞耳前後上額顱巔後頸肩腋季脇跨膝踝
跗小指出

註足少陽膽經起於目外眞斜貫耳前循行耳後上抵額顱至顱後行頸側過肩下腋走身側之季脇下腿跨行膝之外至外踝之前內行足跗至足小指次指之外側去爪甲角如韭葉許而終

足厥陰肝經

圖說



頸劍根膝頭聚手腋下乳中側內側間土庫豐乳頭委陽土

圖說

肝經歌

厥陰肝經起聚毛循行足跗內踝間上膕環陰器季脇上行乳下二肋端

註足膝陰肝經起於足大指後去爪甲韭葉聚毛處循行足
跗上面走內踝上行膕環陰器向外灣行至
季脇內斜上行直乳下二肋端而終

呈

任

脈

圖



任脈歌

任脈起於兩陰中上行毛際腹中行頸下結喉中央上唇稜下
陷承漿名

註任脈起於前陰後陰之中間前行橫骨上行毛際由毛際
直上腹之中行上行頸下結喉上之中央由結喉上行至
下唇棱下陷中而終

圖

瘡

瘡




督脈歌

督脈起於尻骨端後行脊背腰腦巔前行鼻柱皆中道脣內齒上齦縫間

註督脈起於尻骨之端由尻骨後行脊背之中行上行至頸項之中前行至鼻下人中至脣內門牙之中縫而終

分配藏府圖



按素問藏要精微論曰民內兩
旁則委脇也尺外以候腎尺內
以候腹中附上左外以候肝內
中左外以候心內以候膻中然
外以候肺內以候藏內經藏書
確然可考豈有獨以候胃則曰
右外以候胃內以候脾者即當
以右外以候胃內以候脾之句
爲正真尺外之外字當是外字中附上
穴裏之裏字當是外字中附上
左右之內外字上附上左右之
內外字皆當後之故不循舊
所列以候內候藏外候腑之義

脈訣

脈部位歌

脈爲血脈百骸通大會之地寸口宗掌後高骨名關上關之前後寸尺名

註

脈者血之府也周身血脈運行貫通十二經中皆有動脈獨取寸口者蓋以其經每至寅時各經之氣皆上朝而大會於肺故曰寸口宗也掌後有高骨隆起界於尺脈寸脈之間名曰關部關前之位其名曰寸關後之位其名曰尺尺寸者謂從關上至魚際長一寸從關下至尺澤長一尺故名之也

脈分主歌

上焦候寸下焦尺中焦之候屬兩關包絡與心左寸應膽與肝家在左關膀胱小腸腎左尺胸中及肺右寸間胃與脾脈右關取大腸並腎右尺班

註

兩寸之脈主候上焦胸中兩關之脈主候中焦膈中兩尺之脈主候下焦腹中左寸之脈浮候包絡沉以候心左關之脈浮以候膽沉以候肝左尺之脈浮候膀胱小腸沉以候腎右寸之脈浮候胸中沉以候肺右關之脈浮以候胃沉以候脾右尺之脈浮候大腸沉亦候腎此遵內經分配三部診脈法也僞訣以大腸小腸配寸三焦命門配尺包

絡竟置不問悉屬不經滑壽以左尺候小腸膀胱右尺候大腸千古隻眼也當從之

浮沉脈歌

浮沉從肉上下行皮浮屬肺血心經筋沉屬肝骨沉腎肌肉爲脾候在中

註

脈從肉上行者謂之浮脈從肉下行者謂之沉然心肺俱浮於皮毛取之而得者肺之浮也於血脈取之而得者心之浮也故曰皮浮屬肺心血經也肝腎俱沉以筋平取之而得者肝之沉也至骨取之而得者腎之沉也故曰筋沉屬肝骨沉腎也肌肉在浮沉之間屬脾其候在中故曰緩

在中也凡脈以部位而得名者皆統於浮沉故以浮沉爲提綱以統濡弱芤伏牢革虛實微散諸脈也

濡弱芤伏牢革諸脈歌

浮沉無力曰濡弱中取無力芤脈看沉極筋骨爲伏脈浮沉極力革牢參

註浮而無力謂之濡脈沉而無力謂之弱脈浮沉有力中取無力狀如葱管謂之芤脈沉極推至筋骨按之而始得者謂之伏脈浮而極有力者謂之革脈沉而極有力者謂之牢脈

牢脈

虛實微散諸脈歌

三部有力曰實脈三部無力虛脈稱三部無力而且小似有如無微脈名三部無力而且大渙漫不收散脈形

註浮中沉三部俱有力謂之實脈浮中沉三部俱無力謂之虛脈浮中沉三部無力按之且小似有似無謂之微脈浮中沉三部無力按之且大渙漫不收謂之散脈

遲數緩疾結促代諸脈歌

三至爲遲六至數四至爲緩七至疾緩止爲結數止促動止難還代脈識

註一呼一吸謂之一息一息三至謂之遲脈一息四至謂之緩脈一息六至謂之數脈一息七至謂之疾脈緩脈動時

一止謂之結。數蹶動時一止謂之促。結促之蹶動而中止不能自還謂之代。蹶凡蹶以至數而得名者皆統於遲數故以遲數爲提綱以統緩疾結促代五蹶也。

滑濇弦繁洪細大長短動諸蹶歌

滑蹶如珠溜不定。濇蹶滯澁往來艱。弦蹶端直細且勁。繁比弦粗勁且彈來盛。去衰洪蹶是細則。如絲大豁然長。蹶迢迢短縮如豆搖搖作動看。

註

形狀如珠滑溜不定謂之滑蹶。往來滯澁進退維艱謂之濇蹶。狀如弓弦細而端直接之且勁謂之弦蹶。較弦則粗按之勁左右彈者謂之繁蹶。上來應指而盛下去減力而

袁謂之洪脈。脈形軟直如絲者謂之細脈。脈形粗大豁然者謂之大脈。來去迢迢而長謂之長脈。來去縮縮而短謂之短脈。其形如豆，約約動搖不移者謂之動脈。凡脈以形狀而得名者皆統於滑濶。故以滑濶爲提綱，以統弦緊洪細大長短動八脈也。

癰見疽。脈疽見癰。脈歌

癰脈宜洪大數。若逢牢短化膿難疽。脈最宜沉與弱浮大且散命歸泉。

註 癰乃陽毒應見陽脈。若洪大而數則毒易潰。若見牢短之脈則爲陰凝氣少。故曰化膿難也。疽乃陰毒脈應見沉與

弱是爲順蟯若見浮大而散則爲陽脫氣敗故曰命歸泉也

癰疽伏蟯歌

癰疽伏蟯理當明毒閉於經六蟯停審證無凶宜穿發氣通蟯道自然行

註

癰疽二證有見伏蟯者皆由於毒氣閉塞經絡營衛壅滯之故以致六蟯停止沉伏不見也若審其證無凶象非死蟯也治之惟宜穿通經絡宣發營衛使氣得通而蟯道自然行矣

腫瘍潰瘍浮蟯歌

腫瘍浮脈恐多虛或有風寒在表居潰後脈浮氣外瀉頻加補劑始相宜

註腫瘍脈浮者非氣血不足卽爲風寒在表須詳證施治潰瘍脈浮者乃氣從外瀉須補劑調養始爲合法

腫瘍潰瘍沉遲脈歌

腫瘍沉脈多毒閉潰後多毒在內存無力須詳毒內陷遲寒數熱更當分

註腫瘍不當脈沉而脈沉者乃毒閉使然也潰後而沉者是毒尙存於內也若沉而無力恐內虛毒陷當詳審之沉而遲則爲兼寒沉而數則爲兼熱更當分別

腫瘍潰瘍數鰥歌

腫瘍數鰥宜熱毒數且兼洪欲作膿潰後洪大爲病進膿出洪數治無功

註 腫瘍鰥數作膿兼洪皆正應之鰥也若潰後洪大膿出數洪者皆爲邪盛正虛病鰥相反其病曰進治亦無功

腫瘍潰瘍滑鰥歌

腫瘍滑鰥尙爲順初起有痰治痰宜潰後痰多恐氣乏喘生毒陷死之機

註 滑主流通腫瘍初起鰥滑無痰尙爲順鰥若有痰則當以治痰爲急恐潰後痰多氣乏致喘生毒陷而死也

腫瘍潰瘍濬脈歌

腫瘍濬脈屬毒滯有力爲實無力虛
潰後脈爲傷血急補氣
血莫遲疑

註濬主滯澁腫瘍初起脈者乃氣血爲毒滯之徵若按之
有力毒滯爲實按之無力正損爲虛不可不辨若潰後脈
濬爲傷血不足之象急當大補氣血莫遲疑也

腫瘍潰瘍虛實脉歌

腫瘍脈虛宜內托潰後內虛大補寧腫瘍脈實宜消散潰後如
實毒未清

註腫瘍未潰脈虛者不須攻毒惟宜內托已潰脈應虛者急

當以大補收功如腫瘍未潰，
實者乃毒氣猶未清也。

腫瘍潰瘍長衄歌

腫瘍長衄爲有餘消散之方任所施，
潰後得之爲氣治，條然和暢不須醫。

註 腫瘍見衄長者乃氣血有餘消散之方，任意施治，潰後衄長者乃氣之暢也。故曰氣治不待醫藥，自能愈也。

腫瘍潰瘍短衄歌

腫瘍短衄元氣虛，大加補劑始相宜。
潰後衄短爲虛甚，補之仍短決死期。

名醫全金匱 卷之十一
註 腫瘍鰥短者元氣虛也非大加補益之劑不可潰後鰥短者虛之甚也若補之而鰥仍短者則爲敗證其死必矣

腫瘍潰瘍洪鰥歌

腫瘍洪鰥陽熱盛宣熱攻毒必有功潰後洪鰥毒留內治之不退自然凶

註 腫瘍未潰鰥洪者熱盛也宣熱攻毒之法可施若潰後鰥洪者邪盛也服藥而鰥洪不退者爲正虛邪盛其凶不免

腫瘍潰瘍微鰥歌

腫瘍微鰥爲虛候內托受補始能痊潰後見此雖爲順微細無

神作逆觀

註

腫瘍鰥微者乃虛候也當以內托補劑爲主受補者方能痊可若潰後鰥微雖爲順候設按之微細無神則根本已虧亦當作逆證觀也

腫瘍潰瘍動緊鰥歌

腫瘍將發鰥動緊乃因毒氣外搏經潰後見之毒內搏此爲殘賊證不輕

註 腫瘍見動鰥緊鰥者乃毒氣外搏於經之象也若潰後見動緊之鰥則爲毒氣內搏於臟腑之象蓋動緊乃殘賊之鰥潰後不宜見之故曰證不輕也

腫瘍潰瘍緩鰥歌

腫瘍緩何須藥和緩從容最吉祥潰後見之爲胃好便和飲食自然康

註 腫瘍緩乃氣血和平不待服藥自然安愈之吉兆也潰

後見之則爲胃和飲食自甘二便自調其證自然康寧也

腫瘍潰瘍芤弦蚯歌

腫瘍芤蚯血原虛潰後見芤理所宜腫瘍弦蚯邪作痛潰後而弦邪病脾

註 腫瘍未潰蚯芤者其血必素虛也潰後見芤乃去血之後亦理之所宜也腫瘍蚯弦者乃毒攻作痛之象蓋弦主痛也若潰後蚯弦者則爲肝邪侮脾蓋弦乃肝蚯也

腫瘍潰瘍牢蟬歌

腫瘍牢蟬爲邪固未作膿時蟬見牢已潰見牢邪難已結核癧
癧不能消

註 腫瘍蟬牢未作膿時見之主毒邪牢固難消潰後見之邪
亦難已若一切結核癧癧見此牢蟬皆主牢固不能消之
候也

腫瘍潰瘍濡弱蟬歌

腫瘍濡弱蟬不足扶虛托裏始能痊潰後雖爲蟬病應但無虛
候始得安

註 腫瘍蟬見濡弱不足者必用扶元托裏之劑始能痊也潰

後衄見濡弱雖爲衄病相應但無虛證始得安全若精神疲憊飲食不思亦危候也

腫瘍潰瘍散衄歌

腫瘍散衄最可愁毒盛氣散不能收潰後見斯亦爲逆急投補固或無憂

註腫瘍最忌散衄蓋散衄爲毒盛氣散不能收功之診潰後見之亦主逆也急投補虛收固之劑或有生者

腫瘍潰瘍大細衄歌

腫瘍衄大爲順候潰後衄大不相宜腫瘍潰後衄細小總生癰

疽氣血虛

註

腫瘍鰥大爲正實毒必易出爲順候也潰後鰥大爲病進其毒難化爲不宜也腫瘍潰瘍鰥見細小者總屬氣血兩虛惟宜大補爲主

腫瘍潰瘍促鰥歌

促鰥無分腫潰瘍總爲陽結不宜常漸退毒散猶可愈常進不退必然亡

註

腫瘍潰瘍鰥見促者皆爲陽結但宜暫而不宜常也如促鰥漸漸而退則毒亦漸漸而散猶或可愈若常進不退其亡必矣

腫瘍潰瘍結代鰥歌

腫瘍結亟爲陰結急宜溫解始能康潰後見結陰虛歇如代之歇定然亡

註腫瘍亟結者乃陰結也急用溫散解毒之劑始可獲效若潰後見結亟則爲陰虛之歇止尚不主死若如代亟之歇及動而中止不能自還則爲真臟之亟見定主亡也

十二經氣血多少歌

多氣多血惟陽明少氣太陽厥陰經二少太陰常少血血虧行氣補其榮氣少破血宜補氣氣血兩充功易成厥陰少陽多相火若發癰疽最難平

註

人之十二經有氣血多少之分多則易愈少則難痊瘍醫
明此臨證可豫知癰疽瘡瘍之始終難易而用藥消補之
法始當也如手陽明大腸足陽明胃此二經常多氣多血
手太陽小腸足太陽膀胱手厥陰包絡足厥陰肝此四經
常多血少氣手少陽三焦足少陽膽手少陰心足少陰腎
手太陰肺足太陰脾此六經常多氣少血大法血多者則
破其血氣多者則行其氣氣少者難於起發宜托補之血
少者難於收斂宜滋養之氣血兩充則易於起發易於收
斂惟手足厥陰少陽四經倍多相火此四經若發癰疽肌
肉難長瘡口難合倘過用驅毒峻利之藥以伐其氣以消

其血必難收功故明其經之氣血多少則用藥不致有妄
汗妄下之弊矣

癰疽總論歌

癰疽原是火毒生經絡阻隔氣血凝外因六淫八風感內因六
慾共七情飲食起居不內外負挑跌撲損身形膏粱之變營衛
過藜藿之虧氣血窮疽由筋骨陰分發肉癰陽分發曰癰瘍起
皮裏肉之外瘡發皮膚癰通名陽盛焮腫赤痛易陰盛色黯陷
不疼半陰半陽不高腫微痛微焮不甚紅五善爲順七惡逆見
三見四死生明臨證色焮須詳察取法溫涼補汗攻善治傷寒

雜證易能療癰疽腫毒精

註

經云諸痛癰瘍皆屬心火故曰癰疽原是火毒生也癰疽皆因榮衛不足氣血凝結經絡阻隔而生故曰經絡阻隔氣血凝也其因有三外因內因不內外因也外因者由於春之風夏之熱暑長夏之濕秋之燥冬之寒也當其時而至則爲正氣非其時而至或過盛則爲淫邪凡此六淫爲病皆屬外因亦有因於八風相感如冬至日正北大剛風立春日東北凶風春分日正東嬰兒風立夏日東南弱風夏至日正南大弱風立秋日西南謀風秋分日正西剛風立冬日西北折風應時而至主生養萬物不應時而至

主殺害萬物若人感受內生重病外生癰腫凡此八風爲病亦屬外因故曰外因六淫八風感也內因者起於耳聰淫聲眼觀邪色鼻聞過臭舌貪滋味心思過度意念妄生皆損人神氣凡此六慾爲病皆屬內因又有喜過傷心怒過傷肝思過傷脾悲過傷肺恐過傷腎憂久則氣結卒驚則氣縮凡此七情爲病亦屬內因故曰內因六慾共七情也不內外因者由於飲食不節起居不慎過飲醇酒則生火消灼陰液過飲茶水則生濕停飲過食五辛則損氣血傷飢失飽則傷脾胃凡此皆飲食之致病也晝日過勞挑輕負重跌撲擗墜等類損其身形夜不靜息強力入房勞

傷精氣凡此皆起居之致病也其起於膏粱厚味者多令人榮衛不從火毒內結起於藜藿薄食者多令小冒氣不充氣血虧少凡此亦屬不內外因也人之身體計有五層皮肉筋骨也發於筋骨間者名疽屬陰發於肉脈之間者名癰屬陽發於皮裏肉外者名曰瘍毒只發於皮膚之上者名曰瘡癰凡癰疽陽盛者初起焮腫色赤疼痛則易潰易欬順而易治以其爲陽證也陰盛者初起色黯不紅塌陷不腫木硬不疼則難潰難欬逆而難治以其爲陰證也半陰半陽者漫腫不高微痛不甚微欬不熱色不甚紅此證屬險若能隨證施治不失其宜則轉險爲順否則逆

矣五善者五善之證也諸瘡見之爲順則易治七惡者七惡之證也諸瘡見之爲逆則難治凡患癰疽者五善爲順七惡爲逆見三善者則必生見四惡者則必死也醫者於臨證之時須詳察色脈宜溫者溫之宜涼者涼之宜補者補之宜汗者汗之宜攻者攻之庶有濟也然外證癰疽猶如內證傷寒善治傷寒則雜病無不易治能療癰疽則諸瘡無不精妙蓋以能辨表裏陰陽虛實寒熱也

癰疽陽證歌

陽證初起焮赤痛根束盤清腫如弓七日或疼時或止二七瘡內漸生膿痛隨膿減精神爽腐脫生新氣血充嫩肉如珠顏色

美更兼鮮潤若榴紅自然七惡全無犯應當五善喜俱逢須知此屬純陽證醫藥調和自有功

註 凡癰疽初起焮熱赤痛根束者暈不散也盤清者不漫腫也腫如弓者高腫也此皆屬陽之證故潰膿脫腐生新收口俱見易也

癰疽陰證歌

陰證初起如粟大不紅不腫疣瘡瘻木硬不痛不焮熱瘡根平大黯無光七朝之後不潰腐陷軟無膿結空倉瘡上生衣如脫甲孔中結子似含芳紫黑膿稀多臭穢若見七惡定知亡須知此屬純陰證雖有岐黃命不長

註 凡癰疽初起如粟米大之疙瘩不紅不腫不焮熱木硬不痛瘡根散漫色黯無光者此皆屬陰之證故不潰腐空倉無膿生衣如甲葉不脫孔中結子如花舍子紫黑膿清臭穢俱見難愈也

癰疽半陰半陽歌

陰陽相半屬險證陽吉陰凶生死昭似陽微瘡微焮腫如陰半硬半腫高腫而不潰因脾弱潰而不斂爲膿饒五善之證雖兼有七惡之證不全逃若能飲食知味美二便調和尚可療按法施治應手效陽長陰消自可調

註 凡癰疽似陽不甚焮熱腫痛似陰不甚木硬平陷此屬半

陰半陽之驗證若漸生善證則生漸生惡證則死也

癰疽五善歌

心善精神爽言清舌潤鮮不躁不煩渴寤寐兩安然肝善身輕
便不怒不驚煩指甲紅潤色溲和便不難脾善唇滋潤知味喜
加餐膿黃稠不穢大便不稀乾肺善聲音響不喘無嗽痰皮膚
光潤澤呼吸氣息安腎善不午熱口和齒不乾小水清且白夜
臥靜如山

註寤寐者醒與睡也不怒不驚者不自怒驚也溲者小水也
便者大便也不午熱者不午後發熱也

癰疽七惡歌

一惡神昏憤心煩舌燥乾瘡色多紫黑言語自呢喃二惡身筋
強目睛正視難瘡頭流血水驚悸是傷肝三惡形消瘦瘡形陷
又堅膿清多臭穢不食脾敗難四惡皮膚槁瘦多韻不圓喘生
鼻搗動肺絕必歸泉五惡時引飲咽喉若燎烟腎亡容慘黑囊
縮死之原六惡身浮腫腸鳴嘔餽繁大腸多滑泄臟腑敗之端
七惡瘡倒陷如剝鱠一般時時流汚水四肢厥逆寒

註

呢喃言語不清也驚悸心驚跳也消瘦肌肉消瘦也皮膚
槁乾槁也韻不圓不響亮也鼻搗動鼻孔搗動也咽喉若
燎烟乾熱嗆痛也容慘不樂也囊縮外腎縮也嘔餽嘔而
作格逆也如剝鱠瘡面無皮似剝皮鱠魚之狀也

癰疽順證歌

順證初起小漸大憎寒壯熱漸焮疼氣盛項尖高腫起血盛根
脚收束紅陽證二七膿熟潰陰證廿一膿始成已潰醣氣無滯
氣腐脫新生飲食增瘡形雖大終無害老少壯弱俱成功

註

癰疽初起從小而大漸漸憎寒壯熱漸漸疼痛焮赤氣盛
者頂尖高腫而起血盛者則根脚收束而紅此順證也陽
證則十四日而膿卽熟者陽性速也陰證必待廿一日而
膿始成者陰性遲也已潰膿有醣氣而無滯氣者則腐肉
易脫新肉易生飲食自增瘡形雖大終無害也醣氣卽俗
呼哈拉氣也

癰疽逆證歌

逆證黍米不知疼漫腫不熱項塌平未老白頭堅且硬舌乾煩躁不生膿肉腫瘡陷豬肝紫遺尿直視并撮空眼神透露精神短身縮循衣唇吻青面若塗脂皮枯槁唇白腹脹定難生已潰內堅皮破爛腐後心煩膿水清新肉不生多臭穢頭低頸轉懨悴容陽病指甲青必絕陰病額紅命必終鼻生烟煤譖妄語新肉板片瀉直傾面色土黃耳枯黑人中抽縮溝坦平口張氣出無回返鼻孔相搘隨息行汗出如珠不易散血水如肺痰膠凝肉綻爛斑神離亂滿面黑氣慘天庭綿潰內似葡萄嵌眼眶迷漫黑氣濃以上無論腫與潰但逢此證悉屬凶

註

癰疽初起形如黍米不知疼痛漫腫不熱頂見平塌未潰
白頭按之堅硬舌乾煩躁此等逆證決不化膿內腫瘡不
腫而陷其色如豬肝之紫者是毒邪已深也若更見遺尿
直視神露神短撮空循衣唇吻青面若塗脂皮膚枯槁唇
白腹脹種種惡候斷無生理已潰後內堅皮爛腐後心煩
膿水清稀新肉不生臭穢難近頭低項軟形容憔悴陽病
指甲青色陰病兩顴紅赤以至眼眶迷漫黑氣濃等證無
論毒之腫潰但逢此數者皆爲凶證難治也

癰疽辨種歌

虛漫實高火焮紅寒腫木硬紫黯青濕深肉綿淺起皚風腫宣

浮微熱疼瘀腫硬綿不紅熱鬱結更硬若岩稜氣腫皮緊而內
輒喜消怒長無熱紅瘀血跌撲暴腫熱產後閃挫久瘀經木硬
不熱微紅色將潰色紫已成膿

註人之氣血周流不息稍有壅滯卽作腫矣然腫有虛腫實

腫寒腫濕腫風腫痰腫有鬱結傷肝作腫有氣腫有跌撲
瘀血作腫有產後與閃挫瘀血作腫諸腫形勢各異如虛
者漫腫實者高腫火腫者色紅皮光焮熱僵硬寒腫者其
勢木硬色紫黯青濕腫者皮肉重墜深則按之如爛棉淺
則起光亮水炮破流黃水風腫者皮膚拘皺不紅其勢宣
浮微熱微疼瘀腫者輒如綿硬如饅不紅不熱鬱結傷肝

作腫者不紅不熱堅硬如石棱角狀如岩凸氣腫者以手按之皮緊而內軟遇喜則消遇怒則長無紅無熱皮色如常跌仆瘀血作腫者暴腫大熱肿脹不紅產後與閃挫瘀血作腫者瘀血久滯於經絡忽發則木硬不熱微紅若膿已成而將潰者其色必紫諸腫形狀如此不可一槩而論也

癰疽辨痛歌

輕痛肌肉皮膚淺重痛身在骨筋間虛痛饑甚不脹閉喜人採按暫時安實痛飽甚多脹閉畏人挨按痛難言寒痛喜煖色不變熱痛煥痛遇冷歡瞞痛鼓長按復起瘀痛隱隱潰不然風痛

氣痛皆走注風刺氣刺細心看

註 痛由不通然亦種種不一有輕痛重痛虛痛實痛寒痛熱痛膿痛瘀血凝結作痛風痛氣痛之別輕痛者筋肉皮膚作痛屬淺重痛者痛徹筋骨屬深虛痛者腹飢則甚不脹不閉喜人採按暫時可安實痛者食飽則甚又脹又閉畏人挨按痛不可言寒痛者痛處定而不移皮色不變遇煖則癟熱痛者皮色歟赤遇冷則散膿痛者憎寒壯熱形勢鼓長按而復起瘀血凝結作痛者初起隱隱作痛微熱微脹將潰則色紫微痛既潰則不疼風痛者走注甚速氣痛者流走無定刺痛難忍諸痛如此不可不詳辨也

癰疽辨膿歌

癰疽未成宜消托已成當辨有無膿按之堅硬無膿象不熱無
膿熱有膿大軟應如膿已熟半軟半硬膿未成按之卽起膿已
有不起無膿氣血窮深按速起稀黃水深按緩起壞汚膿實而
痛甚內是血內是氣今按不疼輕按卽痛知膿淺重按方疼深
有膿薄皮剝起其膿淺皮不高阜膿必濃稠黃白膿宜先出桃
紅紅水次第行肥人膿多瘦人少反此當究有變凶稠黃氣實
虛稀白粉漿污水定難生汗後膿穢猶可愈膿出身熱治無功

註

凡看癰疽瘡形勢未成者卽用內消之法若形勢已成
卽用內托之法當辨膿之有無淺深以手按之堅硬者無

膿之象按之不熱者無膿熱者有膿按之大軟者內膿已
熱半軟半硬者膿未全成按之指起卽復者有膿不復者
無膿其氣血必窮而虛甚也深按之而速起者內是稀黃
水深按之而緩起者內是壞汚膿按之實而痛甚者內必
是血按之虛而不疼者內必是氣輕按卽痛者其膿淺重
按方痛者其膿深薄皮剝起者其膿必淺皮色不變不高
阜者其膿必稠大抵癰疽瘡瘍先宜出黃白稠膿次宜出
桃花膿再次宜淡淡紅水胖人宜於膿多瘦人宜於膿少
若胖人膿少是肉不腐瘦人膿多是肉敗壞皆非吉也又
凡氣實者多稠黃膿氣虛者多稀白膿半虛半實者多稠

白膿又有膿出如粉漿如污水者謂之敗漿不治之證也
命必難生惟汗後膿穢者可愈若膿已出而身猶大熱不
休者治亦無功蓋癰疽之得膿如傷寒之得汗汗出而反
大熱者壞傷寒也膿出而身猶大熱者壞癰疽也

癰疽辨癰歌

初起作癰因風熱潰後膿漚或冒風將斂作癰生新肉癰若蟲
行氣血充

註 癰屬風亦各有因凡腫瘍初起皮膚作癰者爲風熱相搏
潰後作癰者輕由膿漚甚由瘡口冒風故突起疙瘩形如
小米抓破之後津水者是脾濕津血者是脾燥若將斂作

瘻若緣初腫時肌肉結滯氣血罕來及至將斂氣血漸充
助養新肉故瘻也然必瘻若蟲行方稱美疾他如疥癬作
瘻皆屬風淫勿視爲一類也

癰疽辨暈歌

真暈應知非腫痕瘡旁形狀若紅筋藏府蘊受銳毒發三暈可
愈五傷身

註俗以腫痕爲暈非真暈也真暈生於瘡口之旁狀若紅筋
皆因藏府蘊受銳毒而成二三暈可治五暈難醫

癰疽總論治法歌

癰疽瘡瘍初如粟麻癰焮痛卽大毒不論陰陽灸最宜灸後湯

洗膏固護內用疎解與宣通外宜敷藥四圍束輕證神燈照三
枝平塌須急補不足高腫不可過於攻內熱毒盛須消毒二便
秘結宜通利臟腑宣通方爲福十日以後瘡尚堅鉗鍼點破最
宜先半月之後膿若少藥筒拔提膿要黏瘡已潰爛腐不脫當
腐剪破開其竅能令膿管得通流自然瘡頭無閉塞頻將湯洗
忌風吹去腐須當上靈藥生肌散用將飲時保養須勤毋怠惰
切忌膿出投寒涼冬宜溫室夏明窓肌肉長平將蒼飲謹慎調
理更加詳新肉如珠皮不歛若失保養命多亡

註

癰疽瘡瘍初起如粟若麻癰歛痛者卽毒甚也七日以前

形勢未成不論陰陽俱先當灸之輕者使毒氣隨火而散

重者拔引鬱毒通徹內外實良法也灸完卽用湯洗之法洗完用太乙膏貼於瘡頂上預防風裏內服疎解宣通之劑如神授衛生湯內疎黃連湯蟾酥丸之類外圍敷藥如冲和膏玉龍膏之類四圍束之輕證以神燈照照之每用三枝如形勢已成當因證施治平塌者宜投補劑以益其不足使毒外出高腫者不可過於攻伐以傷元氣致難潰飲內熱盛者須佐消毒之劑以防毒熾二便秘結者急用通利之方使臟腑宣通方爲佳兆如十日之後瘡尚堅硬必須用鍛鍼當頭點破半月之後膿尚少者急用藥筒拔法拔之膿血膠黏者爲順紫血稀水者爲逆過二十日

縱有稀膿亦難治矣若已潰之後腐仍不脫堵塞瘡口者
用刀剪當頭剪開寸餘使膿管通流自然瘡不閉塞拔膿
剪腐已完用方盤一箇瘡下放定將豬蹄湯以軟帛淋洗
瘡上併入孔內輕手擦淨內膿庶敗腐宿膿隨湯而出以
淨爲度再以軟帛疊成七八重勿令太乾帶湯乘熱覆於
瘡上兩手輕按片時帛溫再換如此洗按四五次血氣疏
通患者自然爽快每日如是洗之謹避風寒腐肉處以黃
靈藥摻之候腐肉脫盡已見紅肉時洗後隨用抿脚挑玉
紅膏於手心上搽化搽塗瘡口內外用太乙膏蓋之不數
日新肉頓生瘡勢將斂以生肌散或珍珠散撒之保養謹

慎不可怠緩曠出後切忌投以寒涼之藥患者冬宜溫室
防其寒也夏宜明窓避風暑也肌肉長平蒼歛時尤加小
心謹慎調理即使新肉如珠皮口將歛若調理疏忽失於
保養恐致虛脫暴變命必危亡矣

內消治法歌

內消表散有奇功
厥證俱實用最靈
厥證俱虛宜兼補
發渴便秘貴疎通
清熱解毒活氣血
更看部位屬何經
主治隨加引經

藥毒消肌肉自然平

註 經云發表不遠熱又云汗之則瘡已故曰內消表散有奇
功也惟厥證俱實者斯可用之若厥證俱虛便宜兼補發

渴便祕須急疏行不可概施表散之劑也癰疽皆因氣血
凝結火毒太盛所致故以清熱解毒活氣活血爲主更宜
詳看部位屬何經絡卽用引經之藥以治之則腫痛自消
肌肉自平矣

內托治法歌

已成不起更無膿堅硬不赤或不疼膿少清稀口不歛大補氣
血調衛榮佐以祛毒行滯品寒加溫熱禦寒風腫消膿出腐肉
脫新生口歛內托功

計

凡瘡腫已成不能突起亦難潰膿或堅腫不赤而疼或不
疼膿少清稀瘡口不合皆氣血虛也宜以大補氣血調和

榮衛爲君祛毒爲佐加以辛香行其鬱滯加以溫熱禦莫
風寒候膿出腫消腐肉盡去氣血充足新肉自然生矣

虛實治法歌

癰疽未膿灸最良藥服托裏自安康發熱惡寒身拘緊無汗表
散功最長腫硬口乾二便秘下利毒熱自然涼歟痛熱盛煩渴
渴便和清熱自吉昌內膿不出瘀內塞用刀開割法相當軟漫
無膿不腐潰宜服溫補助生陽潰後新肉如凍色倍加溫熱自
吉祥大汗亡陽桂枝附自汗肢厥四逆湯脾虛潰後肌消瘦膿
水清稀面白黃不眠發熱瘡口懈食少作渴大便溏宜服清補
助脾劑投方應證保無妨

註

凡治癰疽不問陰陽表裏日數遠近但未見膿時俱宜灸之。焮腫發熱脈浮者宜用托裏之藥。若脈緊發熱惡寒偏身拘緊無汗者宜用表散之藥。腫硬口乾二便秘疎者宜用下利之藥以洩其毒。熱焮痛勢深煩躁飲冷口燥舌乾便和者宜用清熱之藥。內膿不出瘀肉堵塞瘡口者用刀開割之。軟漫無膿不腐潰者陽虛也助以溫補之劑以生其陽。潰後新肉生遲如凍色者肉冷肌寒也宜倍加溫熱之藥。如大汗不止者亡陽也宜用桂枝附子等藥。自汗肢厥者宜用四逆湯。若潰後肌肉消瘦膿水清稀面色黃白者脾虛也不寐發熱者虛火上炎也瘡口解大者氣陷不

固也食少作渴大便溏者脾虛熱也俱宜服清補助脾之

藥

癰疽鍼法歌

取膿除癥用鍛鍼輕重疾徐在一心皮薄鍼深傷好肉肉厚鍼淺毒猶存腫高且輒鍼四五堅腫宜鍼六七分腫平肉色全不變此證當鍼寸許深背腹肋脅生毒患扁鍼斜入始全身欲大開口鍼斜出小開直出法須遵氣虛先補鍼宜後膿出證退效如神用在十日半月後使毒外出不傷人又有不宜用鍼處癰瘍冬月與骨筋

註 經云癰氣之癥者當以鍼開除去之又云鍛鍼末如鋒銳

以取大膿故曰取膿除癥用鉗鍼也其輕重疾徐自有一
定在人心度量用之不可亂施蓋皮薄鍼深反傷好肉肉
厚鍼淺毒又難出大抵腫高而軟者在肌肉鍼四五分腫
下而堅者在筋脈鍼六七分腫平肉色不變者附於骨也
宜鍼寸許若毒生背腹肋脅等處宜扁鍼斜入以防透膜
鍼既透膿視瘡口必有膿意如珠斯時欲大開口則將鍼
斜出欲小開口則將鍼直出所謂逆而奪之順而取之也
隨以棉紙撲蘸元珠膏度之使膿會齊二三時將撲取出
瘡口貼太乙膏四圍敷烏龍膏元氣虛者必先補而後鍼
膿一出則諸證悉退再者用鍼自有其時不可太早亦不

可太遲如十日之間瘡尚堅硬用鉸鍼當頭點破半月後不作膿腐者用鉸鍼品字樣三孔開之不問深淺以知痛爲住隨用藥筒拔法拔之又有不宜鍼者如癰瘤結核之類肚臍骨節近筋之處及冬月閉藏之時皆在所禁也

癰疽砭法歌

癰疽腫赤走不定赤遊丹毒紅絲疔時毒瘀血壅盛證砭石治法最宜行只須刺皮無傷肉磁鋒對患最宜輕毒血遇刺皆出盡腫消紅散有奇功

註 凡癰疽紅腫色赤遊走不定及赤遊丹毒紅絲疔走散時毒瘀血壅盛等證皆宜行砭石之法然忌其太深內經所

謂刺皮無傷肉也法用細磁器擊碎取有鋒芒者一塊用
筋一根將頭劈開夾而縛之用二指輕捺筋稍以磁鋒對
患處懸寸許再用重筋一根頻擊筋頭令毒血遇刺皆出
至次日腫赤全消再量行砭之以腫消紅散爲度

癰疽灸法歌

癰疽初起七日內開結拔毒灸最宜不痛灸至痛方止瘡疼灸
至不疼時法以濕紙覆其上乾處先灸不宜遲蒜灸黃蠟附子
灸豆豉蠅螬各用之

註 凡癰疽初起七日以前開結拔毒非灸不可不痛者灸至
知痛瘡疼者灸至不疼蓋着毒則不痛至好肉則痛必灸

至知痛者令火氣至好肉方止也着皮肉未壞處則痛着
毒則不痛必灸至不疼者令火氣着毒方止也法以紙蘸
水滿覆患上看紙先乾處卽先灸之但灸法貴於早施如
證起二三日卽灸十證可全八九四五日灸者十證可全
六七六七日灸者十證可全四五愈早愈妙其法不一有
隔蒜灸者有當肉灸者有用黃蠟灸者有用附子灸豆豉
灸蟾蜍灸者一壯灸至百壯以效爲度至艾壯之大小則
量瘡勢以定之然灸有應忌者如腎俞發不宜灸恐消腎
液手指不宜灸因皮肉澆薄恐皮裂肉努至於頭乃諸陽
之首諸書俱云禁灸若誤灸逼毒入裏令人痰喘上涌反

加大腫然遇純陰下陷之證必當灸之不灸則不能回陽
若半陰半陽之證則仍當禁而不灸

隔蒜灸法

大蒜切成片約三錢厚安瘡頭上用大艾壯灸之三壯卽換
一蒜片若漫腫無頭者以濕紙覆其上視其先乾處置蒜片
灸之兩三處先乾兩三處齊灸之有一點白粒如粟四圍紅
腫如錢者卽於白粒上灸之若瘡勢大白數多者以蒜搗爛
鋪於瘡上艾鋪蒜上灸之蒜敗再易以知痛甚爲效凡癰疽
流注鵝膝風每日灸二三十壯癰疽陰瘡等證艾數必多宜
先服護心散以防火氣入內灸小兒先將蒜置大人臂上燃

艾候蒜溫卽移於小兒毒上其法照前經云寒邪客於經絡之中則血泣血泣則不通不通則衛氣從之壅遏而不得行故熱大熱不止則肉腐爲膿蓋毒原本於火然與外寒相搏故以艾火蒜灸之使開結其毒以移深居淺也

黃蠟灸法

凡癰疽發者惡瘡頑瘡先以濕麵隨腫根作圈高寸餘實貼皮上如井口形勿令滲漏圈外圍布數重防火氣烘膚圈內鋪蠟屑三四分厚次以銅漏杓盛桑木炭火懸蠟上烘之令蠟化至滾再添蠟屑隨添以井滿爲度皮不痛者毒淺灸至知痛爲度皮痛者毒深灸至不知痛爲度去火杓卽噴冷水

少許於蠟上俟冷起蠟底之色青黑此毒出之徵也如漫腫無頭者亦以濕紙試之於先乾處灸之初起者一二次卽消已成者二三次卽潰瘍久潰不歛四圍頑硬者卽於瘍口上灸之蠟從孔入愈深愈妙其頑腐瘀膿盡化收歛甚速

附子餅灸法

生川附子爲末黃酒合作餅如三錢厚安瘍上以艾壯灸之每日灸數壯但令微熱勿令疼痛如餅乾再易餅灸之務以瘍口紅活爲度治潰瘍氣血俱虛不能收歛或風寒襲之以致血氣不能運行者實有奇驗

豆豉餅灸法

癰疽發背已潰未潰用江西淡豆豉爲末量瘡大小黃酒合作餅厚三分置患處灸之餅乾再易餅如已有瘡孔勿覆孔上四布豉餅列艾其上灸之使微熱勿令肉破如熱痛急易之日灸三度令瘡孔出汗卽瘥

蠭螬灸法

疳瘻惡瘻諸藥不驗者取蠭螬剪去兩頭安瘻口上以艾灸之七壯一易不過七枚無不效者

麥冬梗米飲

此方治癰疽陰瘻法當艾灸或灸太過者或陽瘻不應灸而誤灸者以致火毒入裏令患者頭項浮腫神昏痰湧吁吁作

喘急服此藥以清解火毒甚效

麥門冬

去心

粳米各三錢

水二鍾煎一鍾徐徐熱服

方麥冬粳米各等分能醫灸後頭項腫神昏痰湧作喘聲水

煎徐徐功最勇

癰疽烙法歌

烙鍼二枚須一樣筋大頭圓七寸長燃時蘸油燒火上斜入向
輒烙斯良一烙不透宜再烙膿水流出始安康再用紙撲入烙
口外貼膏藥古稱強此法今時不常用惟恐患者畏驚惶今時
多用陽燧錠代火鍼烙實奇方

註癰疽流注經久不消內潰不痛宜用火鍼烙之二枚一様形如筋粗頭圓長七寸撚時蘸香油炭火上燒紅於瘡頭近下斜入向軟處烙之一烙不透再烙必得膿水不假手按流出方用綿紙撮撫如繩狀隨深淺撫入烙口餘紙分開外貼膏藥此古法也今罕用之蓋恐患者驚懼故以陽燧錠代之

陽燧錠

蟾酥

末各五分

硃砂

末

川烏

末

以上共和勻用硫黃一兩五錢置杓內微火炖化次入前

草烏

末

直殭蠶

一條末

蟾酥等末攬勻再入當門子麝香二分冰片一分攬勻卽
傾入濕磁盤內速盪轉成片俟冷取收磁罐內用時取甜
瓜子大一塊要上尖下平先用紅棗肉擦灸處粘藥於上
用燈草蘸油燃火淬藥錠上灸五壯或七壯九壯畢卽飲
米醋半酒鍾候起小炮用線鍼串破出黃水些須貼萬應
膏其毒卽消如風氣痛用筋子於骨縫中按之疫痛處以
黑點記灸之再諸瘡初起於腫處各灸三五壯立瘥

方歌陽燧錠灸寒腫瘡殊砂二烏殭硫黃火煉加蟾共冰麝乘
熱傾出成片良

神燈照法歌

癰疽輕證七日時神燈照法最相宜未成自消已成潰卽發卽腐實稱奇油浸灼火周圍照初用三根漸加之照後敷藥貼患上有膿湯洗不宜遲

註

凡癰疽輕證初起七日前後神燈照法最宜能使未成者自消已成者自潰不起發者卽起發不腐者卽腐實有奇驗將神燈照麻油浸透用火點着離瘡半寸許自外而內周圍徐徐照之火頭向上藥氣入內毒氣隨火解散自不致內侵臟腑初用三根漸加至四五根候瘡勢漸消時仍照之但照後卽用敷藥圍敷瘡根比瘡量大二三分爲率瘡口用萬應膏貼之如乾及有膿用豬蹄湯潤洗之如已

潰大膿漏時不必用此照法

神燈照法方

硃砂

雄黃

沒藥各二錢

麝香四分

共爲細末每用三分紅綿紙裹藥搓燃長七寸麻油浸透

聽用

方神燈照法功速急麝沒雄硃血竭宜爲末紙裹麻油潤火

點薰瘡火毒離

桑柴火烘法歌

癰疽初起腫且疼重若負石不潰膿桑柴烘法能解毒止痛消

腫有奇功新桑樹根劈條用木枝長有九寸零劈如指粗一頭
燃吹滅用火患處烘片時火盡宜再換每用三四枝方罷每日
須烘二三次腫潰腐脫新肉生

註 凡癰疽初起腫痛重若負石堅而不潰者桑柴烘之能解

毒止痛消腫散瘀毒水一出卽能內消若潰而不腐新肉
不生疼痛不止若用之助陽氣散瘀毒生肌肉移深居淺
實有奇驗法用新桑樹根劈成條或桑木枝長九寸劈如
指粗一頭燃着吹滅用火向患處烘片時火盡再換每次
烘三四枝每日烘二三次以知熱腫潰肉腐爲度此古法
也但桑柴火力甚猛宣用於未潰之先可以生發陽氣速

潰遠腐若已潰之後或瘡口寒或天氣寒或肌肉生遲者
亦須烘之使肌肉常煖法以桑木燒作紅炭以漏杓盛之
懸患上自四圍烘至瘡口或高或低總以瘡知熱爲度每
日烘後再換敷貼之藥蓋肌肉遇煖則生潰後烘法亦瘍
科所不可缺也

牛膠蒸法歌

癰疽發背痔漏瘡牛膠蒸法最相當熬稠攤紙貼患上醋煮軟
布熱蒸良溫易瘡癰慢出盡洗法膠紙貫衆湯

註 癰疽發背痔漏惡瘡臙瘍久頑不斂等瘡用牛皮膠一塊
水熬稀稠得所攤厚紙上每剪一塊貼瘡口次用釀醋煮

軟布二塊乘熱罨膠紙上蒸之稍溫再易蒸至瘡癢膿出
至盡豫用貫衆二兩煎湯熱洗去膠紙外用膏藥貼之次
日日照前蒸洗直至膿盡瘡乾爲度

藥筒拔法歌

癰疽陰證半月間不發不潰硬而堅重如負石毒膿鬱致生煩
躁拔爲先鉸鍼放孔品字樣膿鮮爲順紫黑難

註 癰疽陰證十五日前後瘡不起發膿至深不能外潰瘡勢

堅硬重如負石毒膿內潰好肉致生煩躁宜用藥筒拔法
爲先令毒膿得門路而出豫將竹筒藥水煮熟次用鉸鍼
置瘡頂一寸之內品字樣放開三孔深一寸或半寸量瘡

之高下取竹筒乘熱合於瘡孔上拔出膿血紅黃鮮明者
爲順證易治若膿血紫黑者爲敗證難治

煮竹筒方

羌活

獨活

紫蘇

蘄艾

菖蒲

白芷

甘草

各五錢

連鬚葱

二兩

水十碗熬數滾聽用次用鮮嫩竹一隻長七十徑口一寸半一頭留節刮去青皮厚約分許靠節鑽一小孔以杉木條塞之放前藥水內煮數十滾將藥水鍋置患人榻前取筒傾去藥水乘熱急合瘡頂鍼孔上按緊自然吸住待片

時藥筒已溫拔去杉木塞子其筒易落外用膏藥蓋貼勿令受風膿血不盡次日再煮仍按舊孔再拔治陰瘡擠膿不受疼之良法也勿忽之如陽瘡則不必用此法恐傷氣血慎之

方藥水煮筒有奇能令瘡膿出不受疼菖蒲羌獨艾芷草整

葱竹筒水煮濃

御纂醫宗金鑑卷六十二

編輯外科心法要訣目錄

腫瘍主治類方

仙方活命飲

神授衛生湯

清熱消風散

乳香黃耆散

內疎黃連湯

回陽三建湯

竹葉黃耆湯

內消散

內固清心散

琥珀蠟簪丸

護心散

透膿散

托裏消毒散

神功內托散

復元通氣散

雙解貴金丸

黍米寸金丹

黎靈丹

保安萬靈丹

腫瘍敷貼類方

如意金黃散

五龍膏

四虎散

真君妙貼散

二青散

坎宮錠子

離宮錠子

白錠子

蝌蚪拔毒散

二味拔毒散

回陽玉龍膏

冲和膏

鐵桶膏

烏龍膏

神效千絕膏

馬齒莧膏

潰瘍主治類方

四君子湯

四物湯

八珍湯

十全大補湯

人參養榮湯

內補黃耆湯

異功散

理中湯

六君子湯

香砂六君子湯

托裏定痛湯

聖愈湯

柴胡四物湯

地骨皮飲

知藥四物湯

三黃四物湯

補中益氣湯

人參黃耆湯

獨參湯

溫胃飲

橘皮竹茹湯

胃愛丸

二神丸

加味地黃丸

參米膏

八仙糕

洗滌類方

斷葱歸湯腫腫湯

艾薑敷法

豬蹄湯

膏藥類方

萬應膏

紺珠膏

陀僧膏

巴膏

亞聖膏

絳珠膏

絳紅膏

加味大乙膏

白膏藥

化腐紫霞膏

貝葉膏

碧螺膏

麻藥類方

瓊酥散

整骨麻藥

外敷麻藥

去腐類方

白降丹

紅升丹

元珠膏

生肌類方

生肌定痛散

輕乳生肌散

薑礬散

腐盡生肌散

月白珍珠散

五色靈藥

生肌玉紅膏

瑩珠膏

呂祖一枝梅

御纂醫宗金鑑卷六十二

編輯外科心法要訣

腫瘍主治類方

仙方活命飲

此方治一切癰疽不論陰陽瘡毒未成者卽消已成者卽潰化膿生肌散瘀消腫乃瘡癰之聖藥誠外科之首方也故名之曰仙方活命飲

穿山甲

三大片炒

皂刺

五分

歸尾

一錢五分

甘草節

一錢

金銀花

二錢

赤芍藥

五分一錢

乳香

五分

沒藥

五分

花粉

一錢

防風七分

貝母一錢

白芷一錢

陳皮一錢

五分

右十三味好酒煎服恣飲盡醉

歌方仙方活命飲平劑瘡毒癰疽俱可醫未成卽消疼腫去已成膿化立生肌穿山皂刺當歸尾草節金銀赤芍宜乳沒天花防貝芷陳皮好酒共煎之

神授衛生湯

此方治癰疽發背疔瘡對口一切丹瘤惡毒諸證服之宣熱散風行瘀活血消腫解毒疎通藏府乃表裏兩實之劑功効甚速

皂角刺

一錢

防風

六分

羌活

八分

白芷

六分

穿山甲

六分炒

連翹

六分

歸尾

一錢

乳香

五分

沉香

六分

金銀花

一錢

石決明

六分

天花粉

一錢

甘草節

一錢

紅花

六分

大黃

二錢酒拌炒

右十五味水二碗煎八分病在上部先飲酒一杯後服藥
病在下部先服藥後飲酒一杯以行藥力

如氣虛便利者不用大黃

方歌

神授衛生表裏劑癰疽諸瘡惡毒良行瘀活血兼消腫表

裏疎通實劑方皂刺防風羌芷甲連翹歸尾乳沉香金銀

石決天花粉甘草紅花共大黃

清熱消風散

此方治癰疽瘡腫已成未成之際無表無裏故外不惡寒內不便秘惟紅腫焮痛高腫有頭者宜服此藥以和解之也

皂角刺

一錢

防風

五分

陳皮

一錢

連翹

一錢
去心

花粉

五分

柴胡

一錢

黃芩

五分

川芎

五分

白芍

五分

甘草

五分

當歸

五分

黃耆

一錢

金銀花

五分

蒼朮

一錢
炒

紅花

一錢

右藥十五味水二鍾煎八分食遠服

方清熱消風無表裏癰疽諸毒和解方皂刺防風陳翹粉柴

芩芍芍草耆當銀花蒼术紅花入婦女還加香附良

若婦人加香附子用童便炒

乳香黃耆散

此方治癰疽發皆諸毒疔瘡疼痛不可忍者乃氣虛不勝毒之故也服之未成卽消已成卽潰不用刀砭惡肉自脫并治打撲損傷筋骨疼痛之證

當歸一錢

白芍一錢

人參一錢

生黃耆一錢

川芎一錢

熟地一錢

乳香五分

沒藥五分

陳皮一錢

栗殼

一錢
去筋膜蜜炙

甘草節

一錢

右水二鍾煎八分量病上下食前後服之

方歌乳香黃耆治氣弱癰疽諸毒痛難當未成卽消已成潰歸芍參耆菖地黃乳沒栗陳甘草節更醫打撲筋骨傷

內疎黃連湯

此方治癰疽陽毒在裏火熱發狂發熱二便秘澀煩躁嘔噦舌乾口渴飲冷等證六脈沉數有力者急宜服之以除裏熱

山梔

一錢

連翹

一錢

薄荷

一錢

甘草

五分

黃芩

一錢

黃連

一錢

桔梗

一錢

大黃

二錢

當歸

一錢

白芍

炒一錢

木香

一錢

檳榔

一錢

右水二茶鍾煎八分食前服加蜜二匙亦可

方歌內疎黃連瀉裏熱癰瘡毒火陽盛狂腫硬發熱二便秘煩

躁乾嘔渴飲涼梔翹薄草芩連桔大黃歸芍木檳榔

回陽三建湯

此方治癰疽發背初起不疼不腫不紅不熱堅如頑石硬若牛皮體倦身涼氣息遲細色似土硃粟頂多孔孔流血根脚平散軟陷無膿皮不作腐頭溫足涼者並急服之

人參一錢

附子一錢

當歸一錢

川芎一錢

甘草五分

茯苓一錢

生黃耆一錢

紅花五分

枸杞一錢

紫草五分

獨活五分

陳皮一錢

蒼朮五分

厚樸五分

木香五分

山萸肉一錢

炒

炒

右十六味加煨薑三片皂角樹根上白皮二錢水二碗煎
回陽八分入酒一杯隨病上下食前後服之用棉帛覆蓋瘡上
常令溫煖不得大開瘡孔走泄元氣爲要

方歌回陽三建治陰疽體倦身涼鹹細遲不腫不疼不紅熱堅

如頑石硬如皮根平輒陷無膿腐參附歸芎草梔耆枸杞

紅花與紫草獨陳蒼樸木山萸

竹葉黃耆湯

此方治癰疽發皆諸般疔毒表裏不實熱甚口中乾大渴者
服之生津止渴

人參八分 生黃耆八分 石膏八分

半夏八分製 麥冬八分

生地二錢

白芍八分 甘草八分

川芎八分

當歸八分 竹葉十片

黃芩八分

右十二味水二鍾薑三片燈心二十根煎八分食遠溫服
方歌竹葉黃耆口乾渴清熱補正助生津參耆膏夏麥冬地芍

草芍歸竹葉芩

內消散

此方治癰疽發背對口疔瘡乳癰無名腫毒一切惡瘡能令
癰腫內消使毒內化尿色赤汚從小便而出勢大者雖不全
消亦可轉重爲輕移深居淺

知母

一錢

貝母

一錢

花粉

一錢

乳香

一錢

半夏

一錢

白及

一錢

穿山甲

一錢

皂刺

一錢

銀花

一錢

右九味水酒各一碗煎八分隨病上下食前後服之留藥
渣搗爛加秋芙蓉葉一兩研爲細末再加白蜜五匙用渣
調敷瘡上一宿卽消重者再用一服

歌方內消散用化諸毒毒化從尿色變行知貝天花乳夏及穿

山角刺共金銀藥渣搗和芙蓉葉白蜜調敷毒卽平

已上諸方治癰疽七日以前瘡勢未成形體壯實而表裏之證相和者宜服病退卽止如過七日以後形勢已成則宜托裏消毒等湯使毒現於外以速其膿若仍用前散下之藥恐傷元氣致生變證也

內固清心散

此方治癰疽發背對口疔瘡熱甚掀痛煩躁飲冷其人內弱服之預防毒氣內攻於心也

菉豆粉二兩

人參二錢

冰片一錢

雄黃二錢

辰砂二錢

白豆蔻二錢

元明粉二錢

茯苓二錢

甘草二錢

乳香二錢

大黃二錢

右十味爲細末每服一錢五分審湯調下不拘時服

方歌內固清心防毒攻內弱毒氣入心中掀痛熱甚兼飲冷豆

粉人參水片雄辰砂白蔻元明粉茯苓甘草乳香同

琥珀蠟礬丸

此方治癰疽發背瘡形已成而膿未成之際其人卽不虛弱
恐毒氣不能外出內攻於裏預服此丸護膜護心亦且活血
解毒

黃蠟

一兩

白礬

一兩

雄黃

二分

琥珀

一錢
另研極細

硃砂

一錢
研細

白蜜

二錢

右上四味先研細末另將蠟蜜入桐杓內溶化離火片時候蠟四邊稍凝方將藥味入內攪勻共成一塊將藥火上微烘急作小丸如菉豆大硃砂爲衣磁罐收貯每服二三十丸食後白湯送下毒甚者早晚服其功最速

方歌 琥珀蠟礬治癰毒未出膿時平劑佳預服護膜能解毒蠟

礬雄珀蜜硃砂

護心散

此方治瘡毒內攻口乾煩躁惡心嘔吐者服此藥護心解毒

也

荳豆粉一兩

乳香三錢淨末

硃砂一錢

甘草一錢

右四味研細末每服二錢白滾湯調服早晚二次

方護心散治毒內攻煩躁口乾嘔逆冲豆粉乳香硃共草二

錢調下有神功

透膿散

此方治癰疽諸毒內膿已成不穿破者服之卽潰破毒出

生黃耆

四錢

穿山甲一錢

川芎三錢

當歸

二錢

皂角刺

一錢五分

右五味水三鍾煎一鍾瘡在上先飲酒一杯後服藥瘡在

下先服藥後飲酒一杯

歌 方透膿散治膿已成不能潰破劑之平用此可代鍼瀉毒角

刺歸耆山甲芎

托裏消毒散

此方治癰疽已成內潰遲滯者因氣血不足不能助其腐化
也宜服此藥托之令其速潰則腐肉易脫而新肉自生矣

皂角刺

五分

銀花

一錢

甘草

五分

桔梗

五分

白芷

五分

川芎

一錢

生黃耆

一錢

當歸

一錢

白芍

一錢

白术一錢

人參一錢

茯苓一錢

右十二味水二鐘煎八分食遠服

方歌 托裏消毒助氣血補正脫腐肌易生皂角銀花甘桔芷芎

耆歸芍木參芩

神功內托散

此方治癰疽腦頂諸發等瘡日久不腫不高不能腐潰鰥細身涼宜服此溫補托裏之劑以助氣血也

人參

五分一錢

附子

製一錢

川芎

一錢

歸身

二錢一錢

黃耆

一錢

白术

土炒一錢五分

白芍

一錢

木香

研五分

穿山甲

八分

甘草

五分
炙

陳皮

一錢

白茯苓

一錢

右十二味煨薑三片大棗二枚水二茶鍾煎八分食遠服

方歌神功內托陰毒證不腫不高不潰疼參附芎歸耆木芍木

香山甲草陳芩

復元通氣散

此方治乳癰腹癰便毒耳痛耳聾等證皆由毒氣滯塞不通故耳服之則氣通毒散

青皮

四兩

陳皮

四兩

桔梗仁

二兩

穿山甲

二兩

金銀花

一兩

連翹

一兩

甘草

二兩

半生半炙

右七味研末每服二錢黃酒調下

歌方復元通氣乳腹癰便毒兼治耳竇聾青陳裏甲銀翹草一

服能救毒氣通

雙解貴金丸

此方治背疽諸毒初起木悶堅硬便秘鰥沉實者悉效隨證
加藥服法列後

生大黃

一觔

白芷

十兩

右二味爲末水丸每服三五錢五更時用連鬚葱大者三
根黃酒一碗煮葱爛取酒送藥服畢蓋臥出汗過三二時

俟大便行一二次立效

按此宣通攻利之劑也濟之以葱酒力能發汗故云雙解弱者隨用中劑行後以四君子湯補之老人虛人每服一錢用人參加生薑煎湯送下過一時再一服得睡上半身得汗則已

方歌雙解貴金治諸毒腫瘍初起木硬堅大黃白芷爲丸服葱

酒煎送汗下痊

黍米寸金丹

此方乃異人所傳常有暴中急證忽然卒倒者撬開牙關研灌三丸其人卽活又能治發背癰疽偏身壅腫附骨癰疽等證也凡初起憎寒壯熱四肢倦怠沉重者不分表裏老幼輕

重並宜服之

乳香

沒藥各一錢

狗膽

一個
乾者

鯉魚膽

三個
陰乾

硇砂二錢

蟾酥二錢

狗寶

一錢
酥炙

麝香五分

白丁香四十
九個

蜈蚣

全者七條
酥炙

黃蠟三錢

烏金石一錢

頭胎男乳

一合
輕粉一錢

雄黃一錢

水銀煉粉霜白色者

三錢

右十六味爲細末除黃蠟乳汁二味熬成膏子同藥和丸

如茶豆大小兒用一丸大人三丸重者五丸冷病用葱湯

熱病用新汲水送下衣被密蓋勿令透風汗出爲度諸病

如失

方歌

黍米寸金奇效方癰疽發背服之良乳香沒藥狗鯉膽蟾
硇寶麝白丁香蜈蚣黃蠟烏金石男乳輕雄共粉霜

麥靈丹

此丹能治癰疽惡毒無名諸瘍及疔瘡回裏令人煩悶神昏
或婦人初發乳證小兒痘疹餘毒或腰腿暴痛等證

鮮蟾酥

二錢

活蜘蛛

二十一個

定心草

一錢卽兩頭尖鼠糞

飛羅麵

六兩

右四味共研一處用菊花熬成稀膏和好撲爲麥子形如
麥子大每服七丸重大者九丸小兒輕證五丸在上俱用

白滾水服在下用淡黃酒送服每一料加麥子一合收磁
罐內

歌麥靈丹治疔毒疽鮮蟾酥與活蜘蛛定心草共飛羅麵黃

菊熬膏相合宜

保安萬靈丹

此方治癰疽疔毒對口發頤風寒濕痺濕痰流注附骨陰疽
鶴膝風及左癰右瘻口眼歪斜半身不遂血氣凝滯偏身走
痛步履艱辛偏墜疝氣偏正頭痛破傷風牙關緊閉截解風
寒無不應效

茅山蒼术八兩

麻黃

羌活

荆芥

防風

細辛

川烏

湯泡去皮

草馬

湯泡去皮

川芎

石斛

全蠍

當歸

甘草

天麻

何首烏

各一兩

雄黃

六錢

右十六味爲細末煉蜜爲丸重三錢硃砂爲衣磁罐收貯
視年歲老壯病勢緩急酌用之如惡瘡初起二三日間
或癰疽已成至十日前後未出膿者狀若傷寒頭痛煩渴
拘急惡寒肢體疼痛惡心嘔吐四肢沉重恍惚悶亂皮膚
壯熱及傷寒四時感冒傳變疫證惡寒身熱俱宜服之用

行經絡熱非常麻黃羌活荆防細川草烏芎石斛蒼全蠍
葱白九枝煎湯調服一丸蓋被出汗爲效如汗遲以葱湯
催之其汗必出如淋如洗令其自收不可露風患者自快
瘡未成者卽消已成者卽高腫潰膿如病無表裏相兼不
必發散只用熱酒化服又按此方原載諸風癱瘓門中今
移錄於此者蓋瘡瘍皆起於營衛不調氣血凝滯始生癰
腫此藥專能發散又能順氣搜風通行經絡所謂結者開
之也經云汗之則瘡已正與此相合也服後當避風忌冷
物戒房事如婦人有孕者勿服

歌
萬靈丹治諸瘧病此藥猶能治腫瘍發表毒邪從汗解通

當歸甘草等天麻何首共雄黃

腫瘍敷貼類方

凡腫瘍初起時腫高赤痛者宜敷涼藥以寒勝熱也然亦不可太過過則毒爲寒凝變爲陰證如漫腫不紅似有頭而不痛者宜敷溫藥乃引毒外發也經云發表不遠熱敷熱藥亦發表之意凡調敷藥須多攬則藥稠黏敷後貼紙必須撕斷則不崩裂不時用原汁潤之蓋借濕以通竅乾則藥氣不入更添拘急之苦矣凡去敷藥必看毛孔有汗意者爲血脈通熱氣散也反此者逆

如意金黃散

此散治癰疽發皆諸般疔腫跌撲損傷濕痰流毒大頭時腫
漆瘡火丹風熱天泡肌膚赤腫乾濕脚氣婦女乳癰小兒丹
毒凡一切諸般頑惡熱瘡無不應效誠瘡科之要藥也

南星

陳皮

蒼术各二
勑

黃芩

五觔

薑黃

五觔

甘草

二觔

白芷

五觔

上白天花粉

十觔

厚朴

二觔

大黃

五觔

右十味共爲咀片晒乾磨三次用細絹羅篩貯磁罐勿泄
氣凡遇紅赤腫痛發熱未成膿者及夏月時俱用茶清同
蜜調敷如欲作膿者用葱湯同蜜調敷如漫腫無頭皮色

不變濕痰流毒附骨癰疽鶴膝風等證俱用葱酒煎調敷
如風熱所生皮膚亢熱色亮遊走不定俱用蜜水調敷如
天泡火丹赤遊丹黃水漆瘡惡血攻注等證俱用大藍根
葉搗汁調敷加蜜亦可湯潑火燒皮膚破爛麻油調敷已
上諸引調法乃別寒熱溫涼之治法也

如意金黃敷陽毒止痛消腫實良方南陳蒼蠅薑黃草白
芷天花朴大黃

五龍膏

此膏治癰疽陰陽等毒腫痛未潰者敷之卽拔出膿毒

五龍草

卽烏蘡苺詳本草綱目蔓草部俗名五爪龍江浙多產之

金銀花

稀荳草

車前草

連根葉

陳小粉

各等分

右四味俱用鮮草葉一處搗爛再加三年陳小粉并飛鹽
末二三分共搗爲稠糊徧敷瘡上中留一項用膏貼蓋避
風爲主若冬月草無鮮者預採蓄下陰乾爲末用陳米醋
調敷一如前法并效如此方內五龍草或缺少不便倍加
稀荳草亦效

方歌

五龍膏用拔膿毒平劑五龍草銀花荳草車前俱搗爛小

粉飛鹽攬糊擦

四虎散

此散治癰疽腫硬厚如牛領之皮不作膿腐者宜用此方

草烏

狼毒

半夏

南星

名等分

右四味爲細末用猪腦同搗徧敷瘡上留頂出氣

方歌四虎散敷陰疽癰頑腫不痛治之平厚似牛皮難潰腐草

烏狼毒夏南星

真君妙貼散

此散治癰疽諸毒頑硬惡瘡散漫不作膿者用此藥敷之不痛者卽痛痛者卽止如皮破血流濕爛疼苦天泡火丹肺風酒刺等證并用之首效

蕎麵

五觔

明淨硫黃

十觔爲末

白麵

五觔

右三味共一處用清水微拌乾濕得宜趕成薄片微曬單紙包裹風中陰乾收用臨時研細末新汲水調敷如皮破血流濕爛者用麻油調敷天泡火丹酒刺者用靛汁調搽并效

方歌真君妙貼硫二麵水調頑硬不痛膿油調濕爛流血痛靛

汁泡丹酒刺風

二青散

此散治一切陽毒紅腫疼癢腫熱等證未成者卽消

青黛

黃藥

白飲

白薇

各一兩

青露

三兩

卽芙蓉葉

白及

白芷

水龍骨

卽多年牋
船舊油灰

白鮮皮

各一兩

天花粉

三兩

大黃

四兩

朴消

一兩

右十二味爲末用醋蜜調敷已成者留頂未成者偏敷

方歌二青散用敷陽毒腫痛紅熱用之消黛蘂歛薇青露及芷

龍鮮粉大黃消

坎宮錠子

此錠子治熱毒腫痛焮赤諸瘡并捺痔瘡最效

京墨

一兩

胡黃連

二錢

熊膽

三錢

一麝香

五分

兒茶

二錢

冰片

七分

牛黃

三分

右七味爲末用豬膽汁爲君加生薑汁大黃水浸取汁醃

醋各少許相和藥成錠用涼水磨濃以筆蘸塗之

方歌坎宮錠子最清涼熱腫諸瘡并痔瘡京墨胡連熊膽麝兒

茶冰片共牛黃

離宮錠子

此錠子治疗毒腫毒一切皮肉不變漫腫無頭捺之立效

一血竭

三錢

用陳年

硃砂

一錢

燒田

膽礬

三錢

一京墨

一兩

蟾酥

三錢

麝香

一錢

方歌

離宮錠治諸疔毒漫腫無頭涼水塗血竭硃砂爲細末膽

攀京墨麝蟾酥

白錠子

此錠專敷初起諸毒癰疽疔腫流注痰包惡毒及耳痔耳癰等證

白降丹

四錢卽白靈藥

銀勦

二錢

寒水石

二錢

人中白

二錢

右四味共爲細末以白及麵打糊爲錠大小由人不可入口每用以陳醋研敷患處如乾再上自能消毒

歌方白錠專敷初起毒癰疽疔腫與痰包降丹銀勦人中白寒

水白及醋研消

蝌蚪拔毒散

此散治無名大毒一切火毒瘟毒敷之神效

寒水石

研極細末

淨皮硝

研極細末

川大黃

各等分研極細末

蝦蟆子

初夏時河內有蝦蟆成羣大頭長尾者
撈來收蟬內泥封口埋至秋天化成水

右用蝌蚪水一大碗入前藥末各二兩陰乾再研勻收磁
罐內每用時以水調塗患處

方歌
拔毒散治無名毒火毒瘧毒俱可施寒水消黃蝌蚪水浸
乾藥末水調之

二味拔毒散

此散治風濕諸瘡紅腫痛癢疥癩等疾甚效

明雄黃

曰礬

各等分

右二味爲末用茶清調化鴛翎蘸掃患處癢痛自止紅腫卽消

方歌二味拔毒消紅腫風濕諸瘡痛癢寧一切肌膚疥癩疾雄

礬爲末用茶清

回陽玉龍膏

此膏治癰疽陰瘡不發熱不腫痛不腫高不作膿及寒熱流注冷痛痺風腳氣手足頑麻筋骨疼痛及一切皮色不變漫腫無頭鶴膝風等證但無肌熱者一槩敷之俱有功效

軍薑

三兩炒

肉桂

五錢

赤芍

三兩炒

南星

一兩

草烏

三兩
炒

白芷

一兩

右六味製畢共爲細末熱酒調敷

方歌回陽玉龍陰毒證不熱不疼不腫高軍薑桂芍星烏芷研

末須將熱酒調

冲和膏

此膏治癰疽發背陰陽不和冷熱相凝者宜用此膏敷之能行氣疎風活血定痛散瘀消腫祛冷軟堅誠良藥也

紫荆皮

五兩
炒

獨活

三兩
炒

白芷

三兩

赤芍

二兩
炒

石菖蒲

一兩
五錢
炒

五味共爲細末葱湯熱酒俱可調敷

方冲和發背癰疽毒冷熱相凝此藥敷行氣疎風能活血紫
歌

荆獨芷芍菖蒲

鐵桶膏

此膏治發背將潰已潰時根脚走散瘡不收束者宜用此藥
圍敷

膽礬三錢

銅綠五錢

麝香三分

白及五錢

輕粉二錢

鬱金二錢

五倍子一兩
微炒

明礬四錢

右八味共爲極細末用陳米醋一碗杓內慢火熬至一小
杯候起金色黃泡爲度待溫用藥末一錢攬入醋內炖溫

用新筆塗於瘡根周圍以棉紙覆蓋藥上瘡根自生繩紋漸收漸緊其毒不致散大矣

方歌 鐵桶膏收毒散大周圍敷上束瘡根膽礬銅線及輕粉五

倍明礬麝鬱金

烏龍膏

此膏治一切諸毒紅腫赤暈不消者用此藥敷上極有神效

木鱉子

二兩去殼

草烏

半兩去皮

小粉

四兩

半夏

二兩

右四味於鐵鎗內慢火炒焦黑色爲度研細以新汲水調敷一日一換自外向裏塗之須留瘡頂令出毒氣

方
烏龍膏用治諸毒赤暈能收治腫瘍木鱉草烏小粉夏涼

水調敷功効良

神效千搘膏

此膏專貼瘡瘍疔毒初起貼之卽消治療癰連根拔出大人
臓瘡小兒蟾拱頭等證並效

土木鱉

五個去殼

白嫩松香

四兩揀淨

銅綠

一錢研細

乳香

二錢

沒藥

二錢

蓖麻子

七錢去殼

巴豆肉

五粒

杏仁

一錢去皮

右八味合一處石臼內搗三千餘下卽成膏取起浸涼水
中用時隨瘡大小用手捻成薄片貼瘡上用絹蓋之

歌 方 千搘膏貼諸疔毒癰瘡瘍頭木鱉松香銅乳沒草

麻巴豆杏仁投

馬齒莧膏

馬齒莧性味清涼能解諸毒今用此一味或服或敷甚有功效所治諸證列後

一治楊梅癰身如癩喉硬如管者取莧碗粗一握酒水煎服

出汗

一治發背諸毒用莧一握酒煎或水煮冷服出汗再服退熱

去腐三服即愈并杵莧敷之

一治多年頑瘡膿瘡疼痛不收口者杵莧敷之取蟲一日一

換三日後腐肉已盡紅肉如珠時換生肌藥收口

一治面腫脣紫搗汁塗之

一治婦人臍下生瘡痛癢連及二陰者用莧四兩青黛一兩研勻敷之

一治濕癬白禿取石灰末炒紅用莧汁熬膏調勻塗之

一治丹毒加藍靛根和搗敷之

方歌馬齒莧膏只一味楊梅發背服敷之頑瘡面腫搗汁用婦

女陰瘡共黛施濕癬白禿加灰末丹毒藍根相和宜

潰瘍主治類方

四君子湯

人參

茯苓

白朮各二錢
土渺

甘草

一錢

右四味薑三片棗二枚水煎服

四物湯

川芎

一錢
五分

當歸

三錢
酒洗

白芍
炒二錢

地黃

三錢

右四味水煎服

八珍湯

人參

一錢

茯苓

一錢

白朮

一錢
五分

甘草

五分
炙

川芎

一錢

當歸

一錢

白芍

一錢
炒

地黃

一錢

右八味水煎服

十全大補湯

於八珍湯內加黃耆肉桂水煎服

人參養榮湯

於十全大補湯內去川芎加陳皮遠志五味子水煎服

丙補黃耆湯

於十全大補湯內去白朮加遠志麥門冬水煎服

按

四君子湯補氣不足者也四物湯補血不足者也八珍湯
雙補血氣不足者也十全大補湯大補血氣諸不足者也

人參養榮湯去川芎者因面黃血少加陳皮以行氣之滯
五味子以收斂氣血遠志以生心血也內補黃耆湯治潰
瘍口乾去白术者避其燥能亡津也加遠志麥冬者以生
血生津也如痛者加乳香沒藥以定痛硬者加穿山甲皂
角刺以消硬也已上諸方凡癰疽潰後諸虛者悉準於此
當隨證酌用之

方歌

四君參芩白术草四物芎歸芍地黃二方雙補八珍是更
加耆桂十補湯榮去芎加陳遠味內去术加遠冬良痛甚
乳沒硬穿皂瀆後諸虛斟酌方

人參二錢

白朮二錢
土炒

茯苓一錢

甘草五分
炙

陳皮五分

右五味薑三片棗二枚水煎服

理中湯

人參二錢

白朮二錢
土炒

乾薑一錢

甘草五分
炙

右四味水煎服

六君子湯

人參二錢

白朮三錢
土炒

茯苓一錢

甘草一錢
炙

陳皮一錢

半夏一錢五分
製

右六味薑三片棗二枚水煎服

香砂六君子湯

人參

一錢

白朮

二錢

茯苓

一錢

甘草

五分

藿香

一錢
或木香

陳皮

一錢

半夏

一錢五分

砂仁

五分

人參

八味薑三片水煎服

按

四君子湯加陳皮名異功散潰後脾虛氣滯者宜之四君

子湯減茯苓加乾薑名曰理中湯潰後脾虛寒滯者宜之

蓋氣虛則陽虛陽虛生寒故於補氣藥中加溫熱之味也

四君子湯加陳皮半夏名六君子湯潰後氣虛有痰者宜

之六君子湯加藿香或木香砂仁名香砂六君子湯潰後
胃虛痰飲嘔吐者宜之無痰飲氣虛嘔逆甚者加丁香沉
香潰後氣虛有寒加肉桂附子潰後瀉者加訶子肉豆蔻
腸滑不固加鷄粟殼食少咳嗽者加桔梗麥冬五味子渴
者加乾葛傷食脾胃虛弱加山楂神麴穀芽或麥芽此皆
潰後氣不足者以四君子湯爲主隨證加減也

歌四君加陳異功散理中減芩加乾薑有痰陳半六君子嘔
吐砂仁木霍香逆下丁沉寒桂附瀉加訶蔻粟滑腸咳桔
冬味渴加葛傷食查麴穀麥良

托裏定痛湯

於四物湯內加肉桂乳香沒藥粟殼水煎服

聖愈湯

於四物湯內加柴胡人參黃耆水煎服

柴胡四物湯

於四物湯內加柴胡人參黃芩半夏甘草水煎服

地骨皮飲

於四物湯內加丹皮地骨皮

知蘖四物湯

於四物湯內加知母黃蘖

三黃四物湯

於四物湯內加黃連黃芩黃藥

按托裏定痛湯潰後血虛疼漏者宜之聖愈湯潰後血虛內
熱心煩氣少者宜之柴胡四物湯潰後血虛有寒熱者宜
之地骨皮飲潰後不寒者宜之知藥四物湯潰後五臟陰
火骨蒸者宜之三黃四物湯潰後六腑陽火煩熱者宜之
蓋血虛則陰虛陰虛生熱故補血藥中多加寒涼之味也
此皆潰後血不足者以四物湯爲主隨證加減也

方歌

四物加桂乳沒藥托裏定痛也效奇聖愈四物參耆入血
虛血熱最相宜血虛寒熱小柴合惟熱加丹地骨皮陽火
煩熱三黃合陰火骨蒸加藥知

補中益氣湯

補中益氣湯治瘡瘍元氣不足四肢倦怠口乾時熱飲食無味衄洪大無力心煩氣怯者俱宜服之

人參一錢

當歸一錢

生黃耆二錢

白朮

一錢
土炒

升麻三分

柴胡三分

甘草

一錢
炙

麥冬一錢
去心

五味子五分
研

陳皮

五分

右十味水二鍾薑三片枣二枚煎一鍾空心熱服

人參黃耆湯

治潰瘍虛熱不睡少食或寒濕相凝作痛者效卽前方去柴

胡加神麪五分炒蒼朮五分炒黃藥五分炒

方補中益氣加麥味瀆後見證同內傷參耆歸术升柴草麥

味陳皮引棗薑人參黃耆寒濕熱加麪蒼藥減柴方

獨參湯

此湯治潰瘍膿水出多元氣虛餒外無邪氣自汗衄虛者宜
服之

人參

二兩

右一味水二鍾棗十枚或蓮肉元跟肉煎好徐徐服之若
煎至稠厚卽成膏矣作三次用醇酒熱化服之亦可

方歌 腸水過多元氣餒不生他恙獨參宜徐徐代飲無窮妙聚

卷之二十一
蓮元肉共煎之

溫胃飲

此湯治癰疽脾胃虛弱或內傷生冷外感寒邪致生呃逆中
脘疼痛嘔吐清水等證宜急服之

人參

一錢

白术

二錢
土炒

乾薑

一錢
炮

甘草

一錢

丁香

五分
土炒

沉香

一錢
炮

柿蒂

十四個

吳萸

七分
酒洗

附子

一錢
製

右九味水三鍾薑三片棗二枚煎八分不拘時服

方歌 温胃飲治寒呃逆內傷外感邪寒生理中加丁沉柿蒂寒

盛吳萸附子寧

橘皮竹茹湯

此湯治潰瘍胃火上逆氣衝以致時時呃逆身熱煩渴口乾
脣焦此熱呃也服之有效

橘紅二錢

竹茹三錢

生薑一錢

柿蒂七個

人參一錢

黃連一錢

右六味水二錘煎八分空心溫服

方歌 橘皮竹茹熱呃逆胃火氣逆上衝行橘紅竹茹薑柿蒂虛

加參補熱連清

胃愛丸

此丸治潰瘍脾胃虛弱諸味不喜者宜服此丸助脾氣開胃

口而飲食自進矣

人參一兩

山藥

一兩肥大上白者切片
男乳拌合透晒後微焙

建蓮肉

五錢去皮心

白豆蔻

三錢

小紫蘇

五錢蜜拌晒乾微蒸

雲片白朮

一兩

鮮白者米泔浸去澀
水切片晒乾同麥芽拌炒

陳皮六錢用陳老米先炒黃
色方入同炒微燥勿焦

上白茯苓

一兩

切片分厚咀片用砂仁二錢同茯苓合碗內飯上蒸熟

甘草炙三錢

右九味共爲細末用老米二合微焙碾粉泡荷葉熬湯打糊丸梧桐子大每服八十丸清米湯送下不拘時服

方歌 不思飲食宜胃愛開胃扶脾效若仙異功山藥蘇梗葉建

蓮白蔻米糊丸

清震湯

治潰瘍脾腎虛弱或誤傷生冷或氣惱勞役或病後入房太早以致寒邪乘入中脘乃生呃逆急服之

人參

益智仁

半夏各一錢
製

澤瀉

三分

香附

陳皮

白茯苓

各一錢

附子

一錢
製

炙甘草

一錢

柿蒂

二十四個

方歌清震湯治腎家寒人參益智半夏攢澤瀉香附陳茯苓附

子甘草柿蒂煎

二神丸

此丸治癰疽脾腎虛弱飲食不消黎明溏瀉者服之有效

肉果

二兩
麪裹煨肥大者搗去油

補骨脂

四兩
微炒香

右二味共爲細末用大棗四十九枚老生薑四兩切片水
浸薑棗薑至水乾爲度取棗肉爲丸桐子大每夜半用清
米湯送下七十丸治腎瀉脾瀉甚效

方歌

二神丸治脾胃弱飲食不化瀉黎明肉果補脾骨脂腎生

薑棗聚肉丸成

加味地黃丸

此丸治癰疽已潰虛火上炎口乾作渴者宜服之

熟地

八兩
酒蒸搗膏

山藥

四兩
炒

山萸肉

五兩
去核

白茯苓

四兩

牡丹皮

酒洗四兩

澤瀉

三

兩

肉桂

六錢

五味子

炒三兩

右八味共爲末煉蜜丸如梧桐子大每服二錢空心鹽湯送下

方加味地黃勞傷腎水衰津少渴良方山萸山藥丹苓澤肉

桂五味熟地黃

參术膏

此膏治癰疽發背等證大潰膿血之後血氣大虛急宜用此

補之

人參

半觔切片用水五大碗沙鍋慢火熬至三碗將渣再煎
汁一椀共用蜜絹濾淨復熬稠厚磁碗內收貯聽用

雲片白朮

六兩

懷慶熟地

六兩

俱熬同上法

以上三膏各熬完畢各用磁罐盛之入水中待冷取起密蓋勿令泄氣如患者精神短少懶於言動短氣自汗者以人參膏三匙白朮膏二匙地黃膏一匙俱用無灰好酒一杯炖熱化服如脾虛弱飲食減少或食不知味或已食不化者用白朮膏三匙人參膏二匙地黃膏一匙熱酒化服如腰膝痠軟腿脚無力皮膚枯槁者用地黃膏三匙參朮膏各二匙化服如氣血脾胃相等無偏勝者三膏每各二匙熱酒化服此膏用於清晨及臨睡時各進一次自然強健精神頓生氣血新肉易長瘡口易合一切瘡形危險勢

大膿多者服之自無變證也夏天炎熱恐膏易變令作二
一次熬用亦好愈後常服能鬚髮變黑返老還童已上諸方
功難及此

方 參术膏治大膿後血氣雙補此方宗人參白术同熟地熬
成膏服有奇功

八仙糕

此糕治癰疽脾胃虛弱食少嘔泄精神短少飲食無味食不
作饑及平常無病久病者服之能健脾胃

山藥

六兩

人參

六兩

梗米

七升

糯米

七升

白蜜

一觔

白糖霜

二兩半

蓮肉

六兩

芡實

六兩

白茯苓

六兩

右將山藥人參蓮肉芡實茯苓五味各爲細末再將梗糯米爲粉與上藥末和勻將白糖入蜜湯中炖化隨將粉藥乘熱和勻攤鋪籠內切成條蒸熟火上烘乾磁器收貯每日清早用白湯泡數條或乾用亦可饑時隨用服至百日啟脾壯胃功難筆述

方歌

八仙糕用健脾胃食少嘔泄服之靈山藥人參梗糯米蜜

糖蓮芡白雲苓

洗滌類方

洗有蕩滌之功滌洗則氣血自然舒暢其毒易於潰腐而

無壅滯也凡腫在四肢者湯潰之在腰腹脊背者淋之在下部者浴之俱以布帛或棉蘸洗稍溫卽易輕者日洗一次重者日夜洗二次每日洗之不可間斷凡洗時冬月要猛火以逼寒氣夏月要明窓以避風涼若不慎此輕則有妨收口重則恐變純陰夫洗藥不一如初腫與將潰者俱用葱歸湯腫湯燙洗如陰證不起者俱用艾茸湯敷法如潰後俱用猪蹄湯燙洗用猪蹄湯者以助肉之氣而逐腐也此滌洗之法乃瘍科之要藥也

葱歸湯腫湯

此湯治癰疽瘡初腫將潰之時用此湯洗之以瘡內熱癰

名醫全集

卷二十一

三

爲度

獨活 三錢

白芷 三錢

葱頭 七個

當歸 三錢

甘草 三錢

右五味以水三大碗煎至湯醇瀝去渣以絹帛蘸湯熱洗
如溫再易之

方 葱歸湯腫洗諸毒初起將潰用之宜洗至熱癢斯爲度獨
此膏治陰瘡黑陷而不痛者用之爲良以知痛則生不知痛

芷葱歸甘草俱

艾草敷法

此膏治陰瘡黑陷而不痛者用之爲良以知痛則生不知痛
出紫血者死然必內服大補回陽之劑以助之

硫黃五錢

雄黃五錢

艾草一觔

右以硫雄二味爲末同艾入水煎半日水將乾取艾出搗
爛溫敷患處再煎再易十餘次爲度

方艾草敷法治陰瘡黑陷不痛用之良石硫雄黃同艾煮搗

成膏敷定能康

豬蹄湯

此湯治癰疽諸毒流膿者熬好洗之以助肉氣消腫散風脫
腐止痛去惡肉活死肌潤瘡口如腐盡者不必用之當以米
泔水熱洗之令瘡潔淨不可過洗過洗則傷水皮膚破爛難
生肌肉斂口矣

黃芩

甘草

當歸

赤芍

白芷

蜂房

羌活各等分

右七味共爲粗末看證之大小定藥之多少先將獐豬前
蹄一隻用水六碗煮蹄軟爲度將汁濾清吹去汁上油花
卽用粗藥末一兩投於汁中再用微火煎十數沸濾去渣
候湯微溫卽用方盤一箇靠身於瘡下放定隨用軟絹蘸
湯淋洗瘡上并入孔內輕手捺盡內膿庶敗腐宿膿隨湯
而出以淨爲度再以軟帛疊七八重蘸湯勿令大乾覆於
瘡上兩手輕按片時帛溫再換如此再按四五次可以流

通血氣解毒止痛去瘀也洗訖用絹帛挹乾卽隨證以應

用之藥貼之

方 豬蹄湯治癰疽毒已潰流膿用此方消腫散風能止痛芩

甘歸芍芷蜂羌

膏藥類方

萬應膏

此膏治一切癰疽發背對口諸瘡疾核流注等毒貼之甚效

川烏

草烏

生地

白欵

白芷

象皮

官桂

當歸

赤芍

羌活

苦參

土木鱉

穿山甲

烏藥

甘草

獨活

元參

定粉

大黃各五錢

右十九味定粉在外用淨香油五觔將藥浸入油內春夏三秋七冬十候日數已足入潔淨大鍋內慢火熬至藥枯浮起爲度住火片時用布袋濾去渣將油稱準每油一度滴入水內成珠薄紙攤貼

方歌 萬應膏用貼諸毒發皆癰疽對口瘡川草烏同地蘇及象

皮桂芷芍歸羌苦參木鱉穿烏藥甘獨元參定粉黃

紺珠膏

此膏治一切癰疽腫毒流注頑癰風寒濕痺瘻乳癰痰核血風等瘡及頭痛牙疼腰腿痛等證悉驗

製麻油

四兩

製松香

一觔

右將麻油煎滾入松香文火溶化柳枝攪候化盡離火下細藥末二兩三錢攬勻卽傾於水內拔扯數十次易水浸之聽用

一瘀血腫毒瘰癧等證但未破者再加魏香散隨膏之大小患之輕重每加半分至三分爲率

一毒深膿不盡及頑瘡對口等證雖潰必用此膏獲效
一未破者貼之勿揭揭則作癢痛亦勿揭能速於成膿患在
平處者用紙攤貼患在灣曲轉動處者用絹帛攤貼

一臘瘡及臂腿寒濕等瘡先用茶清入白礬少許洗淨貼之
見效

一頭痛貼大陽穴牙痛塞牙縫內

一內癰等證作丸用蛤粉爲衣服下

一便毒痰核多加魏香散如膿瘡再加銅青如蠟拱頭癬毒
貼之亦效

製油法

每麻油一觔用當歸木鰐子肉知母細辛白芷巴豆肉文
蛤打碎山茨茹打碎紅芽大戟續斷各一兩槐柳枝各二
十八寸入油鍋內浸二十一日煎枯去渣取油聽用查朝
鮮琥珀膏多續隨子此方宜加之

製松香法

擇片子淨嫩松香爲末十觔取槐柳桃桑芙蓉等五樣枝
各五觔剉碎用大鍋水煎濃汁濾淨再煮一次各收之各
分五分每用初次汁一分煎滾入松香末二觔以柳槐枝
攪之前煎至松香沉下水底爲度卽傾入二次汁內乘熱拔
扯數十次以不斷爲佳候溫作餅收之餘香如法

行醫全集

卷之十一

膏內細藥方

乳香

沒藥各五錢

明雄黃四錢

血竭五錢

麝香一錢

輕粉二錢

右爲細末加入膏內用

魏香散

乳香

沒藥

血竭各等分

阿魏

麝香各減半

爲末罐收聽用

方
紺珠膏貼癰疽毒流注頑瘻濕瘡名瘰癧乳癰痰核塊血
歌
風頭痛及牙疼松香化入麻油內乳沒雄黃竭麝輕隨證

更加魏香散麝香魏竭乳沒并

陀僧膏

此膏專貼諸般惡瘡流注瘰癧跌撲損破金刃慢傷等證用
之有效

南陀僧

二十兩研末

赤芍

二兩

全當歸

二兩

乳香

五錢去油研

沒藥

五錢去油研

赤石脂

二兩研

苦參

四兩研

百草霜

二兩篩研

銀勦

一兩研

桐油

二觔

香油

一觔

血竭

五錢研

孩兒茶

五錢研

川大黃

半觔

右藥先將赤芍當歸苦參大黃入油內燥枯熬至滴水不

散再下陀僧末用槐柳枝攬至滴水將欲成珠將百草霜細細篩入攬勻再將羣藥及銀黝篩入攬極勻傾入水盆內衆手扯千餘下再收入磁盆內常以水浸之

方歌陀僧膏貼諸惡瘡流注癰瘡跌撲傷陀僧赤芍歸乳沒赤脂苦參百草霜銀黝桐油香油共血竭兒茶川大黃

巴膏方

此膏貼一切癰疽發背惡瘡化腐生肌甚效

象皮

六錢

穿山甲

六錢

山梔子

八十個

人頭髮

一兩二錢

血竭

一錢

兒茶

二錢

另研極細末

硇砂

三錢

另研極細末

黃丹

飛

香油

桑槐柳杏枝各五十寸

右將桑槐桃柳杏五共用香油四觔將五枝燥枯擗出次入象皮穿山甲人頭髮燥化再入山梔子燥枯用絹將藥渣濾去將油復入鍋內煎滾離火少傾每油一觔入黃丹六兩攪勻用慢火熬至滴水中成珠將鍋取起再入血竭兒茶硇砂等末攪融用涼水一盆將膏藥傾入水內用手扯藥千餘遍換水數次拔去火氣磁罐收貯用時不宜見火須以銀杓盛之重湯炖化薄紙攤貼

方
歌癰疽發皆用巴膏象甲梔茶髮竭硇枝用桑槐桃柳杏黃丹攬和共油熬

亞聖膏

此膏治一切破爛諸瘡並楊梅結毒貼之甚效

象皮

一兩

驢甲

一塊
即懸蹄

鷄子清

三個

木鱉子

七個

蛇蛻

二錢

蟬蛻

四錢

血餘

三錢

穿山甲

六錢

槐枝

榆枝

艾枝

柳枝

桑枝

各二十一寸

黃丹

黃蠟

麻油

三觔

右將藥浸七日煎如常法濾去渣每淨油一觔入黃丹七
兩煎成膏入黃蠟五錢化勻再加血竭五錢兒茶三錢乳

香三錢沒藥三錢煅牡礪五錢五靈脂五錢右五味研極細末入膏內成膏出火攤貼

方歌

亞聖膏治破爛瘡楊梅結毒貼之良象驢鷄釐蛇蟬蠅血

甲槐榆艾柳桑丹蠅麻油勻化後竭茶乳沒蠅靈襄

絳珠膏

此膏治潰瘍諸毒用之去腐定痛生肌甚效

天麻子肉

八十一粒

鷄子黃

十個

麻油

十兩

血餘

五錢

黃丹

二兩水飛

白蠟

三兩

血竭

三錢

硃砂

二錢

輕粉

三錢

乳香

三錢

沒藥

三錢

兒茶

三錢

米片

一錢

麝香

五分

珍珠

二錢

右將蘇油燂血餘至焦枯加蘇子肉鷄子黃再燂枯去渣入蠟候化離火少時入黃丹攪勻再加細藥和勻收用攤貼

方歌

絳珠化腐主生肌蘇肉 鷄黃油血餘丹蠟竭砂輕乳沒兒

茶冰麝共珍珠研細和勻隨證用乳岩須要入銀朱

乳岩加銀朱一兩

絳紅膏

此膏治一切腫毒已成瘡 痛不消者貼之悉效

銀朱 五錢

有一味爲細末以生桐油調攤如膏先用神燈照後貼此

膏

方歌絳紅膏治毒已成腫痛難消用最靈一味銀朱爲細末桐油調和貼之平

加味太乙膏

此膏治發背癰疽及一切惡瘡濕痰流注風濕偏身筋骨走注作痛湯燙火燒刀傷棒毒五損內癰七傷外證俱貼患處又男子遺精女人白帶俱貼臍下臍毒腸癰亦可丸服諸般瘡癰血風癩癩諸藥不止痛癢者並效

白芷

當歸

赤芍

元參各二兩

柳枝

槐枝各一百寸

肉桂二兩

沒藥三錢

大黃二兩

木鱉二兩

輕粉四錢

研不見星

生地二兩

阿魏三錢

黃丹四十兩

乳香五錢

血餘一兩

右將白芷當歸赤芍元參肉桂大黃木鱉生地八味餅槐
柳枝用貞麻油足稱五觔將藥浸入油內春五夏三秋七
冬十八大鍋內慢火熬至藥枯浮起爲度住火片時用布
袋濾淨藥渣將油稱準用細舊絹將油又濾入鍋內要清
淨爲佳將血餘投上慢火熬至血餘浮起以柳枝挑看似

膏溶化之象方算熬熟淨油一觔將飛過黃丹六兩五錢
徐徐投入火加大些夏秋亢熱每油一斤加丹五錢不住
手攬候鍋內先發青烟後至白烟疊疊旋起氣味香馥者
其膏已成卽便住火將膏滴入水中試輒硬得中如老加
熱油如稀加炒丹每各少許漸漸加火務要冬夏老嫩得
所爲佳候烟盡掇下鍋來方下阿魏切成薄片散於膏上
化盡次下乳沒輕粉攪勻領入水中以柳棍摟成一塊再
換冷水浸片時乘溫每膏半觔扯拔百轉成塊又換冷水
浸隨用時每取一塊銅杓內復化隨便攤貼至妙

方歌太乙膏治諸般毒一切瘡傷俱貼之白芷當歸赤芍藥元

參桂沒藥槐枝大黃木鱉輕生地阿魏黃丹乳血餘

白膏藥

此膏專貼諸瘡腫毒潰破流膿甚效

淨巴豆肉

十二兩

蓖麻子

十二兩去殼

香油

三觔

蝦蟆

五個各
榔人髮一團

活鯽魚

十尾

先將巴豆肉蓖麻子入油內浸三日再將蝦蟆浸一宿臨熬時入活鯽魚共燂焦去渣淨慢火熬油滴水成珠離火傾於淨鍋內再加官粉二觔半乳香末五錢不時攬之冷定爲度用時重湯炖化薄紙攤貼

方歌

白膏專貼諸瘡毒巴豆蓖麻浸入油活鯽蝦蟆同燂後再

將官粉乳香投

化腐紫霞膏

此膏善能穿透諸毒。凡發背已成瘍肉不腐及不作膿者用此膏以腐爛瘴肉穿潰膿毒其功甚效。

金頂砒

五分

潮腦

一錢

螺螄肉

二兩
用肉晒乾爲末

輕紛

三錢

血竭

二錢

巴豆仁

五錢
研用白仁

右各爲末共碾一處磁罐收貯臨用時用麻油調搽頑硬肉上以棉紙蓋上或膏貼俱可。

方歌

化腐紫霞膏穿毒透膿化腐效如神。金砒潮腦螺螄肉粉

竭。蘇仁巴豆仁。

名醫全錄 卷之二

貝葉膏

此膏貼癰疽發背一切潰爛諸瘡

麻油 一觴

血餘

鷄子大一個

白蠟 二兩

右將血餘以文火燂化去渣下火入白蠟溶化候溫用棉紙剪塊三張張於油蠟內蘸之貼於磁器上用時揭單張貼患處日換八九次力能定痛去腐生肌其功甚速切勿忽之

方歌

貝葉膏治潰爛瘡去腐生肌功效強血餘麻油煎渣去下

火入蠟化貼良

碧螺膏

此膏治下部濕瘡芥癬并結毒癰串癰瘡

松香

取嫩白者佳爲末篩過用銅盆以豬油遍搽之入水至滾八香不住手攬之以香沉底爲度卽傾冷水中拔扯百十次以

不斷爲度

右將麻油煎滴水成珠入松香一觔文火溶化看老嫩取起離火住滾徐徐入糠青膽礬各淨末五錢以柳枝左攬勻爲度如老加熟豬油二三錢用綠紙薄攤貼之

方

碧螺膏治疥濕瘡豬脂麻油嫩松香再入糠青膽礬末綠

紙攤貼效非常

麻藥類方

瓊酥散

此散治一切腫毒等瘡服之開鍼不痛

蟾酥一錢

半夏六分

閑羊花六分

胡椒一錢八分

川椒一錢八分

草荳一錢

川烏一錢八分

右七味共爲細末每服半分黃酒調服如欲大開加白酒
藥一丸

方瓊酥散是麻人藥開鍼不痛用蟾酥草荳閑羊生半夏朝

椒川椒與川烏

整骨麻藥

此藥開取箭頭服之不痛

麻黃

胡茄子

薑黃

川烏

草烏各等分

鬧羊花倍用

右六味共爲末每服五分茶酒任下欲鮮用甘草煎湯服
之卽甦

方歌 整骨麻藥取箭頭不傷筋骨可無憂 麻黃 薑黃 胡茄子 川

草烏與鬧羊花

外敷麻藥

此藥敷於毒上麻木任割不痛

川烏尖

五錢

草烏尖

五錢

蟾酥

四錢

胡椒

一兩

生南星

五錢

生半夏

五錢

一方加華菱

五錢

一方加

細辛

一兩

右爲末用燒酒調敷

方歌外敷麻藥調燒酒刀割

不痛效最神川草烏蟾椒星夏一

加華菱一加辛

去腐類方

腐者壞肉也諸書云腐不去則新肉不生蓋以腐能浸淫
好肉也當速去之如遇氣實之人則用刀割之取效若遇
氣虛之人則惟恃藥力以化之蓋去腐之藥乃瘍科之要

藥也

白降丹

此丹治癰疽發背一切疔毒用少許瘡大者用五六釐瘡小者用一二釐水調敷瘡頭上初起者立刻起炮消散成膿者卽潰腐者卽脫消腫誠奪命之靈丹也

硃砂

五錢

雄黃

各二錢

水銀

一兩

硼砂

五錢

火消

白礬

皂礬

各一兩

食鹽

先將硃雄硼三味研細入鹽礬硝皂水銀共研勻以水銀不見星爲度用陽城罐一個放微炭火上徐徐起藥入罐化盡微火逼令乾取起如火太大乾則汞走如不乾則藥倒下無用其難處在此再用一陽城罐合上用棉紙截半

寸寬將罐子泥草薺灰光粉三樣研細以鹽滴滷汁調極
濕一層泥一層紙糊合口四五重及糊有藥罐上二三重
地下挖一小潭用飯碗盛水放潭底將無藥罐放於碗內
以瓦挨潭口四邊齊地恐炭灰落碗內也有藥罐上以生
炭火蓋之不可有空處約三炷香去火冷定開看約有一
兩外藥矣煉時罐上如有綠烟起急用筆蘸罐子鹽泥固
之

紅升丹

此丹治一切瘡瘍潰後拔毒去腐生肌長肉瘡口堅硬肉黠
紫黑用丹少許鷄翎掃上立刻紅活瘍醫若無紅白二丹決

難立刻取效

硃砂 五錢

雄黃 五錢

水銀 一兩

火消 四兩

白礬 一兩

皂礬 六錢

先將二礬火消研碎入大銅杓內加火消一小杯炖化一
乾卽起研細另將汞硃雄研細至不見星爲度再入消礬
末研勻先將陽城罐用紙筋泥搪一指厚陰乾常輕輕撲
之不使生裂紋搪泥罐子泥亦可用如有裂紋以罐子泥
補之極乾再晒無裂紋方入前藥在內罐口以鐵油蓋蓋
定加鐵梁蓋上下用鐵鑼鐵絲紮緊用棉紙撲條蘸蜜周
圍塞罐口縫間外用熟石膏細末醋調封固蓋止加炭火

二塊使蓋熱罐口封固易乾也用大釘三根釘地下將罐子放釘上罐底下置堅大炭火一塊外砌百眼爐升三炷香第一炷香用底火如火大則汞先飛上二炷香用大半罐火以筆蘸水擦蓋第三炷香火平罐口用扇搗之頻頻擦蓋勿令乾乾則汞先飛上三香完去火冷定開看方氣足蓋上約有六七錢刮下研極細磁罐盛用再預以鹽酒汁調罐子稀泥用筆蘸泥水掃罐口周圍勿令洩氣蓋恐有綠烟起汞走也綠烟一起卽無用矣

方歌白降丹爲奪命丹拔膿化腐立時安硃雄汞與硼砂入還
有消鹽白皂礬若去硼鹽紅升是長肉生肌自不難

元珠膏

此膏治腫瘍將潰塗之膿從毛孔吸出已開鍼者用擦蘸送孔內呼膿腐不淨塗之立化

木鱉子肉

十四個

蟹螯

八十一個

柳枝

四十九寸

驢甲片

三錢

草烏

一錢

麻油

二兩

右藥浸七日文火燥枯去渣入巴豆仁三個煎至黑傾於鉢內研如泥加麝香一分攬勻入罐內收用

方呼膿化腐用

元珠木鱉蟹螯

共柳枝

驢甲

草烏

油內浸燥

枯巴豆腐香施

生肌類方

凡大毒潰爛內毒未盡若驟用生肌則外實內潰重者逼
毒內攻輕者反增潰爛雖卽收口其於旁處復生大疽是
知毒未盡不可驟用生肌藥也只以貝葉膏貼之頻換俟
生肉珠時方用生肌藥如元氣弱者須當大補以培元氣
生肌定痛散

此散治潰爛紅熱腫痛有腐者用此化腐定痛生肌

生石膏

一兩爲末用甘草湯飛五七次

辰砂

三錢五錢

冰片

二分

硼砂

五錢

右四味共爲末撒患處

方 生肌定痛治潰爛腫疼紅熱實相宜石膏飛過辰砂用共

八冰糊細撒之

輕乳生肌散

此散治潰爛紅熱腫痛腐脫者用此定痛生肌

石膏

一兩
煅

血竭

五錢

乳香

五錢

輕粉

五錢

冰片

一錢

有水加龍骨白芷

各一錢

不收口加鷄內金

一錢

右爲末撒之

方

輕乳生肌治腐脫石膏血竭乳輕冰若然有水加龍芷收

口須添雞內金

薑礬散

此散治一切諸瘡發癢者用此撒之甚效

枯礬

乾薑

右等分爲末先用細茶食鹽煎湯洗之後用此散撒之
冷瘡不收口者用乾薑一味爲末撒患處覺熱如烘生肌
甚效

方薑礬最治諸瘡癢先用鹽茶煎洗之若是冷瘡不收口乾

薑一味撒生肌

腐盡生肌散

此散治一切癰疽等毒諸瘡破爛不斂者撒上卽愈

兒茶

乳香

沒藥各三錢

冰片

一錢

麝香二分

血竭三錢

旱三七

三錢

右爲末撒之

有水加龍骨

一錢
熔

欲速收口加珍珠

一兩

蟹黃

二錢

法取團濟蟹蒸熟取黃晒乾取用

或用豬脂油

半觔

去渣

一兩

溶化傾碗內稍溫加前七

味調成膏

攤貼癰疽破爛等證若杖傷則旱三七倍之

一用鮮鹿腿骨紙包灰內煨之以黃脆爲度如黑焦色則

無用矣爲細末撒之生肌甚速

方歌腐盡生肌瘡不斂兒茶乳沒冰麝香血竭三七水加骨收
口珍珠共蟹黃或用豬油溶黃蠟調前七味貼之良一用
火煨鹿腿骨爲散生肌效甚長

月白珍珠散

此散治諸瘡新肉已滿不能生皮及湯火傷痛并下疳腐痛
等證

青缸花

五分

輕粉

一兩

珍珠

一錢

右爲末撒之

下疳腐爛用豬脊髓調搽

一用鷄子清傾瓦上晒乾取清爲末撒之

歌 方 月白珍珠皮不長并醫湯火下疳瘡青缸輕粉珍珠共豬

髓調搽真妙方一用雞清傾瓦上晒乾爲末撒之良

五色靈藥

此五色靈藥治癰疽諸瘡已潰餘腐不盡新肉不生撒之最
效

食鹽

五錢

黑鉛

六錢

枯白礬

枯皂礬

水銀

火消

各二兩

先將鹽鉛鎔化入水銀結成砂子再入二礬火消同炒乾
研細入鉛汞再研以不見星爲度入罐內泥固濟封口打

三炷香不可太過不及一宿取出視之其白如雪約有二
兩爲火候得中之靈藥

如要色紫者加硫黃五錢

要黃色者加明雄黃五錢

要色紅者用黑鉛九錢水銀一兩枯白礬二兩火硝三兩
辰砂四錢明雄黃三錢

升煉火候俱如前法

凡升打靈藥硝要炒燥礬要煅枯

一方用燒酒煮乾炒燥方研八確

一法凡打出靈藥倍加石膏和勻復入新確內打一枝香

用之不痛

方歌

五色靈藥白用鹽黑鉛硝汞皂角礬欲成紫色硫黃八黃
者雄黃加五錢紅去皂鹽鉛重用硃砂飛盡必須添

生肌玉紅膏

此膏治癰疽發背諸般潰爛棒毒等瘡用在已潰流膿時先
用甘草湯甚者用豬蹄湯淋洗患上輕絇挹淨用根櫛挑膏
於掌中捺化遍搽新肉上外以太乙膏蓋之大瘡洗換二次
內兼服大補氣血之藥新肉卽生瘡口自歛此外科收飲藥
中之神藥也

當歸

二兩

白芷

五錢

白蠟

二兩

輕粉 四錢

甘草 一兩二錢

紫草 二錢

瓜兒血竭 四錢

麻油 一觔

右將當歸白芷紫草甘草四味入油內浸三日大杓內慢火熬微枯色細絹濾清將油復入杓內煎滾入血竭化盡次下白蠟微火亦化用茶鐘四個預放水中將膏分作四處傾入鐘內候片時方下研極細輕粉各投一錢攬勻候至一日夜用之極效

一歌方生肌玉紅膏最善潰爛諸瘡瘍卽收歸芷蠟輕甘紫草瓜

兒血竭共麻油

瑩珠膏

此膏治潰瘍去腐定痛生肌并楊梅瘡杖頭瘡下疳等證

白蠟

三兩

豬脂油

十兩

輕粉

一兩

五錢

樟冰

一兩五錢

豬脂油

十兩

輕粉

一兩

五錢

先將白蠟脂油溶化離火候溫入輕粉樟冰攪勻成稍凝
再入冰片末一錢攪勻成膏罐收聽用 凡用先將甘草
苦參各三錢水煎洗淨患處貼膏

杖瘡用荆川紙攤極薄貼之熱則易之其疔瘻卽散疼痛
立止

楊梅瘡加紅粉二錢

頑瘡乳岩加銀硃一兩

臘瘡加水龍骨三錢或龍骨四錢

歌方瑩珠膏用治潰瘡定痛生肌功效強白蠟豬脂樟冰粉楊

預乳杖并臘瘡

呂祖一枝梅

此藥治男婦大人小兒新久諸病生死難定之間用芡實大
一餅貼印堂之中點官香一枝香盡去藥已後一時許視貼
藥處有紅斑暈色腫起飛散謂之紅霞捧日病雖危篤其人
不死如貼藥處一時後不腫不紅皮肉照舊不變謂之白雲
漫野病雖輕淺終歸冥路小兒急慢驚風一切老幼癥疾俱
可貼之凡病用之皆可預知生死也

雄黃

五錢

巴豆仁

五錢
不去油

硃砂

三分

五靈脂

三錢

銀朱

一錢五分

蓖麻仁

五分

麝香

三分

右各研細於端午日淨室中午時共研加油燕脂爲膏磁盒收藏勿經婦人之手臨用豆大一圓捲餅貼印堂中其功立見用過餅送入河中

歌

呂祖一枝梅驗病定人生死印堂中紅斑腫起斯爲吉無

腫無紅命必終藥用五靈蓖麻子砂銀巴豆麝香雄

