



71-76





上

三

御纂醫宗金鑑卷七十四

編輯外科心法要訣目錄

發無定處下

疥瘡

癬

黃水瘡

暑令瘍毒小瘡

瘡疽

產後癰疽

翻花瘡無圖

血風瘡

痞癩

浸淫瘡

火赤瘡

貓眼瘡

魚脊瘡

骨痠瘡

風疔 無圖

血疔

白疔

漆瘡

血筋

血痣

股痛 無圖

瘡口誤入毒水 無圖

諸瘡生蠅蛆 無圖

背木疔

唇合與毒小瘡

疔毒

癩

髮無生瘡

神水丹心火要指日粉

醫宗全錄卷七十四

醫纂醫宗金鑑卷七十四

編輯外科心法要訣

疥瘡五種圖

疥瘡五種



醫纂醫宗金鑑

卷七十四

編輯外科心法要訣

五

疥瘡

疥瘡乾濕蟲砂膿各經蘊毒風化成治論上下分肥瘦清風利濕兼殺蟲

註

此證有乾濕蟲砂膿之分其形雖有五種總由各經蘊毒日久生火兼受風濕化生斯疾或傳染而生凡疥先從手了生起透遍週身癢癢無度如肺經燥盛則生乾疥癢癢皮枯而起白屑如脾經濕盛則生濕疥聾腫作痛破津黃水甚流黑汁如肝經風盛則生蟲疥癢癢徹骨撓不知疼如心血凝滯則生砂疥形如細砂焮赤癢痛抓之有水如腎經濕熱則生膿窠疥形如豆粒便利作癢膿清淡白或

脾經濕盛亦生膿窠疥但頂含稠膿癢疼相兼爲異疥雖
有餘之證而體虛之人亦生以便秘爲實便利爲虛亦有
虛而便燥者如風秘則便燥血分枯燥則便澁又在瘡形
色重色淡及脈息之有力無力辨之初起有餘之人俱宜
防風通聖散服之虛者服荆防敗毒散透發之及形勢已
定則無論虛實乾疥服消風散濕疥服蒼朮膏蟲疥服蘆
薈丸砂疥服犀角飲子膿窠疥服秦艽丸經久不愈血燥
者服當歸飲子外治乾疥者擦繡毬丸濕者擦臭靈丹潤
燥殺蟲俱效疥生上體多者偏風熱盛下體多者偏風濕
盛肥人多風濕瘦人多血熱詳辨治之

蒼朮膏

南蒼朮

十觔切片入砂鍋內水煮減半取汁再加水煮如前以水無味為度併汁一處用小砂鍋再煎如乾一寸加汁一寸煎成膏加蜂蜜四兩和勻

每服二羹匙空心白滾水調服

方歌蒼朮膏醫濕疥瘡切片入鍋煮取湯熬膏加蜜空心服濕

除熱散勝羣方

犀角飲子

犀角

鎊

赤芍

甘花菊

元參

木通

赤小豆

炒

石菖蒲

各一錢五分

甘草

生一錢

生薑三片水二鍾煎八分服

方歌犀角飲子砂疥生癢疼色赤出心經芍菊元參通赤豆莒

蒲薑草水煎成

秦艽丸

秦艽

苦參

大黃

酒蒸

黃耆

各二兩

防風

漏蘆

黃連

各一兩五錢

烏蛇肉

五錢

酒浸焙乾

共為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十九食後溫酒

送下

方歌秦艽丸服膿疥愈清熱癢除瘡自去苦參大黃風漏蘆烏

蛇黃連耆蜜聚

當歸飲子

當歸

生地

白芍

酒炒

川芎

何首烏

荆芥

防風

白蒺藜

各一錢

黃耆

甘草

各五分
生

水二鍾煎八分食遠服

方歌當歸飲子膿疥久癢添血燥不能除四物黃耆何首草荆

防蒺入風白疎

繡毳丸

川椒

輕粉

樟腦

雄黃

枯白礬

水銀 各二錢

大風子肉

一百枚 另研

共研細末同大風子肉再碾勻加柏油一兩化開和藥攪

勻作丸以二掌合搓如圓眼大先以鼻聞次擦患處

方 繡毯丸用椒輕粉樟腦雄黃礬水銀大風子研柏油兌乾

疥搓擦效如神

臭靈丹

硫黃末

油核桃

生豬脂油 各一兩

水銀 一錢

本草綱目卷之十一 雜考 外科心法要訣

搗膏用擦患處

歌方 臭靈丹擦膿濕疥硫黃末共油核桃生豬脂油各一兩水

銀一錢同搗膏

防風通聖散 見頭部 禿瘡

荆防敗毒散 見頭部 腦疽

消風散 見頭部 鈕扣風

蘆薈丸 見牙齒部 牙衄

白粉

白粉

水粉 各二錢

癬 瘡 圖



癬瘡六種

御纂醫宗金鑑
卷之二十一
編輯外科心法匯纂

癬

癬證情形有六般風熱濕蟲是根原乾濕風牛松刀癬春生桃花面上旋

註

此證總由風熱濕邪侵襲皮膚鬱久風盛則化為蟲是以

搔癢之無休也其名有六一曰乾癬搔癢則起白屑索然

彫枯二曰濕癬搔癢則出黏汁侵淫如蟲行三曰風癬即

年久不愈之頑癬也搔則痺頑不知痛癢四曰牛皮癬狀

如牛領之皮厚而且堅五曰松皮癬狀如蒼松之皮紅白

斑點相連時時作癢六曰刀癬輪郭全無縱橫不定總以

殺蟲滲濕消毒之藥敷之輕者羊蹄根散久頑者必效散

搽之亦有脾肺風濕過盛而腫痛者宜服散風苦參丸解
散風濕其腫痛卽消又有面上風癬初如痞瘡或漸成細
瘡時作痛癢發於春月又名吹花癬卽俗所謂桃花癬也
婦女多有之此由肺胃風熱隨陽氣上升而成宜服疎風
清熱飲外用消風玉容散每日洗之自效

羊蹄根散

羊蹄根

八錢末

枯白礬

二錢

共研勻米醋調擦癬處

方歌

羊蹄根散敷諸癬羊蹄根共枯白礬二味研末加米醋搽

患滲濕癢可痊

必效散

川槿皮 四兩

海桐皮

大黃 各二兩

百藥煎 一兩四錢

巴豆 一錢五分

盤螿 一個

雄黃

輕粉 各四錢

落
共研極細末用陰陽水調藥將癬搨損薄敷藥乾必待自

方歌

必效大黃百藥煎川槿海桐巴豆盤雄黃輕粉陰陽水調

搨諸癬久年頑

散風苦參丸

苦參 四兩

大黃

炒香

獨活

防風

枳殼

麩炒

元參

黃連

各二兩

黃芩

梔子

生

菊花

各一兩

白共研細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十九食後白滾

絲水送下日用三服茶酒任下

方歌散風苦參風濕盛癬瘡多癢腫痛兼大黃芩獨防風枳元

參梔子菊黃連

疎風清熱飲

苦參

二錢酒浸蒸曬九次炒黃

全蠍

土炒

皂刺

豬牙皂角

防風

荆芥穗

金銀花

蠟蛻各一錢

酒水各一鍾加葱白三寸煎一鍾去渣熱服忌發物

方歌疎風清熱風癬患時作痛癢極纏綿苦參蠟刺豬牙皂防

風荆芥銀花蟬

消風玉容散

綠豆麩三兩

白菊花

白附子

白芷各一兩

熬白食鹽五錢

共研細末加冰片五分再研勻收貯每日洗面以代肥皂

方歌消風玉容綠豆麩菊花白附芷食鹽研加冰片代肥皂風

除癬去最爲先

黃水瘡圖



黃水瘡

御製醫宗金鑑
卷之十四
編輯外科心法要訣

黃水瘡

黃水瘡如粟米形起時作癢破時疼外因風邪內濕熱黃水浸淫更復生

註

此證初如粟米而癢兼痛破流黃水浸淫成片隨處可生由脾胃濕熱外受風邪相搏而成宜服升麻消毒飲熱甚外用青蛤散敷之濕盛碧玉散敷之卽效痂厚用香油潤之忌見水洗

升麻消毒飲

當歸尾

赤芍

金銀花

連翹

去心

牛蒡子

炒

梔子

生

羌活

白芷

紅花

防風

甘草

生

升麻

桔梗

每味用二錢為大劑一錢五分為中劑一錢為小劑水三

鍾煎八分食遠熱服

如瘡生頭面減去歸尾紅花

方歌升麻消毒却風濕歸芍銀花翹莖梔羌芷紅花防草桔黃

水浸淫服漸失

青蛤散

見鼻部
鼻齧瘡

碧玉散

見面部
燕窩瘡

暑令瘍小瘡圖



暑瘍小瘡

暑令瘍毒小癰

暑令瘍癰焮腫疼頭暈口苦背肌紅較之癰疽發熱異不分日夜似火攻

註

此證係暑令所生瘍毒小癰初發背心肌膚紅暈次生腫痛發熱無時日夜不止兼頭目暈眩口苦舌乾心煩背熱肢體怠倦初宜荆防敗毒散加藿香黃連石膏服之外治按癰疽腫瘍潰瘍門

荆防敗毒散

見項部腦疽

瘰癧 疔 圖



瘰癧生在筋骨先黑變青色如拳打之狀

瘡疽

瘡疽因受山嵐瘴毒伏藏久痛附筋骨初黑次青如拳打急砭惡血後膿熟

註

此證因受山嵐瘴氣伏藏筋骨之間年月久遠令人痛附筋骨始發黑色頑痺如木石其毒附着於筋骨重按方知微痛五七日後毒勢湧出浮腫次變青色如拳打之狀寒戰似瘧頭顫口偏手足厥逆黑睛緊小始見黑色時急用砭法令出惡血隨服不換金正氣散加羚羊角以洩邪毒次按癰疽腫瘍潰瘍治法膿熟潰黃白膿爲順出黑汁者

險

不換金正氣散

蒼朮

米泔水浸炒

厚朴

薑製

陳皮

藿香

半夏麴

各二錢炒

甘草

一錢炙

水二鍾生薑五片紅棗肉二枚煎一鍾去渣稍熱服忌生

冷油膩

方歌

正氣散因山瘴感伏久生疽身戰寒平胃散加半夏麴

香薑棗服平安

蘇山因安山瘴感伏久生疽身戰寒平胃散加半夏麴

產後癰疽圖



御製醫宗金鑑
卷之二十四
婦科
編纂
心法要訣

七

產後癰疽

產後癰疽最屬險七情之傷六淫感瘀血稽留成癰疽勢潰托裏不宜緩

註

此證因產後氣血經絡俱虛或因七情所傷或因六淫所感與瘀血相稽而成最屬險候法宜大補扶助根本兼活瘀生新爲要其客病以未治之初服生化湯隨證加減以消毒有表邪服清魂散有裏熱服回生丹勢欲潰膿時急宜托裏遲則恐毒內陷藥味宜和平純善最忌汗下峻劑其餘腫潰治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門

生化湯

當歸 八錢

川芎 四錢

薑炭

甘草 各四分

桃仁 十枚 去皮尖研泥

水一鍾半煎六分加無灰酒一小杯和服

方歌 生化湯宜產後直通滯和榮又補虛歸芎薑炭炙甘草桃

仁酒服善消瘀

清魂散

荆芥 一錢

川芎 五分

人參

甘草 炙

澤蘭葉 各三分

為末黃酒調服

方歌 清魂產後風邪侵荆芥川芎與人參炙甘澤蘭同作劑能

本草綱目卷之二十一 婦人經水不調 編纂外科心法

七

疎表證效通神

回生丹

黑豆 三升煮熟取汁三盞去豆
紅花 三兩炒黃色入醇酒大盞同煮三五滾去紅花用汁

生大黃 一劑研末
蘇木 二兩剉用河水五盞煎汁三盞去渣

先將大黃末以好米醋三四盞攪勻文武火熬成膏如此

二遍次下紅花酒蘇木湯黑豆汁共熬成膏離火再入後藥

當歸 熟地 川芎

白茯苓 延胡索 小烏藥

香附 蒲黃 半膠

桃仁 另研
蒼朮 各二兩米泔水浸炒
白芍 酒炒

甘草
炙

羌活

山萸肉
酒浸

三棱

陳皮

地榆

木香

五靈脂
各五錢

人參

白朮

土炒

青皮

木瓜
各三錢

良薑

四錢

乳香

沒藥
各一錢

共研細末用大黃膏為丸如彈子大每服一丸黃酒炖化

通口服

方歌回生產後存惡露致發癰疽服可逐除熱活瘀榮衛和紅

花大黃豆蘇木八珍羌莢稜延胡烏藥青陳榆香附乳沒

蒲黃良膠瓜木香靈脂桃蒼朮

翻花瘡 無圖

翻花瘡因潰後生頭大蒂小努菌形雖無痛癢觸流血血燥肝

虛怒氣成

註此證因生瘡潰後努肉自瘡口突出其狀如菌頭大蒂小

愈努愈翻雖不大痛大癢誤有觸損流血不佳久則虧虛

身總由肝虛怒氣血燥而成宜服逍遙散外用烏梅煨灰輕

白粉各等分研末撒之或馬齒莧煨灰豬脂調敷俱效

逍遙散 見背部上搭手

甘草

柴胡

白芍

黃連

黃芩

山慈姑

血

風

瘡

圖



風瘡發在遍身起如粟米下視淡紅暈

血風瘡

血風瘡證生徧身粟形搔癢脂水淫肝肺脾經風濕熱久鬱燥
癢抓血津

註

此證由肝脾二經濕熱外受風邪襲於皮膚鬱於肺經致
徧身生瘡形如粟米搔癢無度抓破時津脂水浸淫成片
令人煩躁口渴搔癢日輕夜甚宜服消風散外敷雄黃解
毒散若日久風邪鬱在肌膚則耗血生火搔癢倍增夜不
得寐撓破津血心煩大便燥秘咽乾不渴此屬火燥血短
宜服地黃飲外擦黃連膏潤肌膏合而用之悉效兼忌椒
酒雞鵝動風等物

雄黃解毒散

雄黃

寒水石

各一兩

白礬

四兩

共研細末滾水調敷

方歌雄黃解毒寒水石白礬四兩共研之血風瘡生粟米癢滾

水調敷滲毒濕

地黃飲

生地

熟地

何首烏

各三錢

當歸

二錢

丹皮

黑參

白蒺藜

炒去刺

殭蠶

各一錢五分

紅花

甘草

各五分

水煎早晚服

方歌地黄飲治血風瘡癢盛不眠血燥傷首烏丹皮生熟地

參歸蒺藜紅殭

消風散

見項部
鈕扣風

黃連膏

見鼻部
鼻瘡

潤肌膏

見頭部
白屑風

藥黃

藥水

白雲

藥黃

瘡 痛 圖



瘡痛形如豆瓣扁疔瘡紅腫占量

痞痛

痞痛汗出中邪風狀類豆辦扁瘡形日癢秦朮湯宜服夜重當

歸飲服寧

註此證俗名鬼飯疙瘡由汗出受風或露臥乘涼風邪多中

表虛之人初起皮膚作癢次發扁疙瘡形如豆辦堆纍成

片日癢甚者宜服秦朮牛蒡湯夜癢重者宜當歸飲子服

之外用燒酒浸百部以藍布蘸酒擦之謹避風涼自效

秦朮牛蒡湯

秦朮 一錢五分

牛蒡子 炒研

枳殼 麩炒

麻黃 蜜炙

犀角 鎔

黃芩

防風

甘草
生

黑參

升麻 各一錢

水二鍾煎八分服

方歌 秦艽牛蒡風留膚痞瘡生如麻豆形枳殼麻黃犀角鎊黃

芩風草黑參升

當歸飲子

見疥瘡

浸 淫 瘡 圖



浸淫瘡初起如細疥破津黃水蔓延成片

浸淫瘡

浸淫瘡發火濕風黃水浸淫似疥形蔓延成片癢不止治宜清

熱並消風

註此證初生如疥搔癢無時蔓延不止抓津黃水浸淫成片

由心火脾濕受風而成經云歲火太過甚則身熱肌膚浸

淫仲景云從口流向四肢者順四肢流入口者逆初服升

麻消毒飲加蒼朮川黃連抓破津血者宜服消風散外搽

青蛤散即愈若脈遲不食黃水不止此屬脾敗不治之證也

升麻消毒飲

見黃水瘡

消風散

見項部鈕扣風

青蛤散

見鼻部鼻齩瘡

火赤瘡圖



火赤瘡起燂漿紫疱

天腫瘡頂白根赤燒漿水疱

火赤瘡

火赤瘡由時氣生燎漿水皰遍身成治分上下風濕熱瀉心清脾自可寧

註

此證由心火妄動或感酷暑時臨火邪入肺伏結而成初起小如芡實大如棋子燎漿水皰色赤者爲火赤瘡若頂白根赤名天皰瘡俱延及遍身燉熱疼痛未破不堅皰破毒水津爛不臭上體多生者屬風熱盛宜服解毒瀉心湯下體多生者屬濕熱盛宜服清脾除濕飲未破者俱宜蚪蚪拔毒散敷之已破者俱宜石珍散撒之清其濕熱破爛自乾甚效

解毒瀉心湯

黃芩

黃連

牛蒡子

炒研

知母

石膏

煨

梔子

生

防風

元參

荊芥

滑石

各一錢

木通

甘草

各五分 生

水二鍾燈心二十根煎八分食遠服

方歌 解毒瀉心湯火赤芩連牛蒡木通知石膏梔子防風草元

參荆芥與滑石

清脾除濕飲

赤茯苓

白朮

土炒

蒼朮

米泔浸炒

黃芩

生地黃

麥冬

去心

梔子

生研

澤瀉

甘草

生

連翹

去心

茵陳蒿

枳殼

麩炒

元明粉

各一錢

水二鍾竹葉二十片燈心二十根煎八分食前服

方歌 清脾除濕天炮疾赤苓二朮芩生地麥冬梔瀉草連翹茵

藤元明同作劑

石珍散

輕粉

石膏

各一兩

黃蘗末

青黛

各三錢

共研勻先以甘草湯洗淨瘡處再用此藥撒之

方歌石珍散去火邪害天炮破撒自康泰一兩輕粉煨石膏三

錢黃藥加青黛

蝌蚪拔毒散

見腫瘍門

水二盞... 二十... 二十... 人... 食前服

數... 太... 心

茵刺... 膏

蘇... 干... 主... 代

蠟... 珠

甘草... 主

黃... 水

土... 黃

參... 之... 心

貓眼瘡圖

貓眼瘡形如貓眼光彩閃爍



貓眼瘡

貓眼瘡名取象形痛癢不常無血膿光芒閃爍如貓眼脾經濕熱外寒凝

註

此證一名寒瘡每生於面及徧身由脾經久鬱濕熱復被外寒凝結而成初起形如貓眼光彩閃爍無膿無血但痛癢不常久則近脛宜服清肌滲濕湯外敷真君妙貼散兼多食雞魚蒜韭忌食鮎魚鱗鰕而愈

清肌滲濕湯

蒼朮

米泔水浸炒

厚朴

薑汁炒

陳皮

甘草

生

柴胡

木通

澤瀉

白芷

升麻

白朮

土炒

梔子

生

黃連

各一錢

水二鍾生薑三片燈心二十根煎至八分溫服

方歌清肌滲濕瘡貓眼脾濕熱鬱外寒纏平胃柴胡通瀉芷升

麻白朮梔黃連

真君妙貼散

見腫瘍門

魚脊瘡圖



魚脊瘡初起白點漸長如魚脊狀

白芷

白芷

白芷

白芷

白芷

二十掛煎至八水為服

魚脊瘡初起白點漸長如魚脊狀

魚脊瘡

魚脊瘡由虛人成感受濕熱皮間凝虛寒發緩炮津水次變稠

膿陽氣生

註此證形如魚脊由陽氣虛寒之人復感濕熱結滯而成多

生筋骨之間以陽氣虛寒故發長緩慢只在皮膚堅凝聳

痛初起白炮漸長狀如魚脊破津黃水正膿生遲初治無

論已破未破宜蒜片艾灸以通陽氣外用真君妙貼散香

油調敷宜服內補十宣散得稠膿色鮮者為順若灸之不

應色暗腐爛出臭水者逆其次內外治法俱按癰疽潰瘍門


真君妙貼散

見腫瘍門

內補十宣散

見胸部癰疽

骨 痿 瘡 圖



骨痿瘡色紅大如桐葉

骨痠瘡

骨痠瘡形粟豆紅漸如梅李火毒成膿血不出痛不止治同疔法即成功

註

此證初生形如粟豆色紅漸大如梅如李由火毒而成血不出膿不生痛亦不止久則延及遍身內外治法與疔門

參考

風疔 無圖

風疔證如風癬形破流黃水癢微疼由於風濕客谷道如聖膏搽功即成

註此證由風濕客於谷道而成形如風癬作癢破流黃水浸
淫遍體微疼宜用如聖膏搽之即愈

如聖膏

當歸 五錢

巴豆 三錢
去殼

香油八兩將二藥煤枯去渣入黃臘三兩化盡離火絹濾
淨將凝入輕粉二錢攪勻搽之

方歌如聖膏用歸巴豆二味一同入香油煤枯加蠟添輕粉凝
搽風疔功即收

此膏專治一切瘡毒如癰疽疔毒無名腫毒等症

血 疔 圖



血疔發在遍身形如紫芥其色紅紫搔癢

血疔

血疔形如紫疥瘡痛癢時作血多傷證因風熱閉腠理消風散
服功最强

註此證由風熱閉塞腠理而成形如紫疥痛癢時作血燥多

熱宜服消風散

消風散

見頂部
鈕扣風

血

白 疔 瘡 圖



白疔生在福身色白瘡瘻起白皮

白疔

白疔之形如疹疥色白而癢多不快固由風邪客皮膚亦由血

燥難榮外

註此證俗名蛇虱生于皮膚形如疹疥色白而癢搔起白皮

由風邪客于皮膚血燥不能榮養所致初服防風通聖散

次服搜風順氣丸以豬脂苦杏仁等分共搗絹包擦之俱

效

搜風順氣丸

大黃 五兩 酒浸 蒸曬九次

車前子 酒炒

山萸肉

山藥 炒

牛膝 酒浸

菟絲子 酒煮

獨活

火麻仁微火焙去殼 檳榔

枳殼

楚炒

郁李仁

各二兩滾水浸去皮

羌活一兩

右爲末煉蜜和丸如梧桐子每服三十九茶酒任下早晚

各一服

方歌 搜風順氣車前子 萸藥大黃膝菟絲 羌獨火麻榔枳郁服

去風邪血燥滋

防風通聖散

見頭部 禿瘡

漆

瘡

圖



漆瘡隨處可生紅腫如疹

漆瘡

漆瘡

漆瘡

漆瘡

漆瘡

漆瘡

漆瘡

漆瘡

漆瘡

漆瘡

漆瘡

漆瘡

漆瘡

漆瘡

漆瘡

漆瘡

漆瘡

漆瘡感受漆毒生腠理不密腫焮紅初發覺癢後如疹皮破流水更兼疼

註

此證由人之腠理不密感漆辛熱之毒而生初發面癢而腫抓之漸似癩疹色紅徧傳肢體焮痛皮破爛斑流水甚者寒熱交作宜韭菜汁調三白散塗之內服化斑解毒湯忌浴熱水戒油膩厚味發物或用神麩研為末生蠟黃調塗患處尤效

三白散

鉛粉 一兩

輕粉 五錢

石膏 三錢

神效醫宗金鑑 卷之二十四 編纂外科心法要訣

共研勻韭菜汁調敷紙蓋如無韭菜汁涼水調亦可

方歌 三白散敷漆瘡消輕粉鉛粉煨石膏去熱解毒功效速研

勻須用韭汁調

化斑解毒湯 見肋部內發丹毒

水煎服之

此藥治一切瘡毒主熱腫不消濕熱毒腫疔毒癰疽疔毒等症

血 箭 圖

血箭發無定處血從毛孔射出



血箭

血箭毛孔射出血心火熾迫血亂行桃花散用涼水敷再塗金

墨即能停

註

此證一名肌衄由心肺火盛逼血從毛孔中射出如箭宜

服涼血地黃湯外用桃花散以涼水調敷或用金墨研末

醋調涼塗其血即止

涼血地黃湯

生地 三錢

黃連

當歸 各一錢五分

甘草

梔子 生研

元參 各一錢

黃芩 二錢

水二鍾煎八分量病上下服之

方歌涼血地黃心火盛毛孔血溢不歸經黃連歸草苓梔子元
參煎服效通靈

桃花散

白石灰半升用水潑成末與大黃片一兩五錢同炒以灰變
紅色爲度去大黃將石灰篩細用涼水調敷

方歌桃花止血最爲良一兩五錢生大黃半升石灰相併炒去
軍研篩水調強

血

疰

圖



血色紅

此症之起
 由於血虛
 故其色紅
 而脈象亦
 見芤或沉
 而無力之
 象也

血痣

血痣初起似痣形漸大如豆其色紅指破外皮流鮮血肝經怒

火鬱血成

註

此證由肝經怒火鬱血而成初起如痣色紅漸大如豆觸

破時流鮮血用花蕊石散撒之血已止宜冰蟬散枯去本

痣以月白珍珠散用太乙膏蓋貼生皮即愈血出甚者服

涼血地黃湯兼戒厚味發物

花蕊石散

花蕊石

五錢火煨入童便淬之七次

草烏

南星

白芷

厚朴

紫蘓

羌活

沒藥

輕粉

龍骨

細辛

檀香

蘇木

乳香

蛇含石

火煨童便淬三次

當歸

降真香

各二錢

麝香 三分

共為細末罐收臨用時撒於患處

方歌

花葶石散止血強草烏星芷厚蘇羌沒輕龍骨細檀麝蘇

木乳歸含降香

水蠟散

即水蠟擦研末見乳部乳岩

月白珍珠散

見潰瘍門

涼血地黃湯

見血箭

太乙膏

見潰瘍門

血痣

血痣初起似痣形漸大如豆其色紅指破外皮流鮮血肝經怒
火鬱血成

註

此證由肝經怒火鬱血而成初起如痣色紅漸大如豆觸
破時流鮮血用花蕊石散撒之血已止宜冰蟬散枯去本
痣以月白珍珠散用太乙膏蓋貼生皮即愈血出甚者服
涼血地黃湯兼戒厚味發物

花蕊石散

花蕊石

五錢火煨入童便淬之七次

草烏

南星

白芷

厚朴

紫蘓

羌活

沒藥

輕粉

龍骨

細辛

檀香

蘓木

乳香

蛇含石

火煨童便淬三次

當歸

降真香

各二錢

麝香

三分

共為細末罐收臨用時撒於患處

方歌花蕊石散止血強草烏星芷厚蘇羌沒輕龍骨細檀麝蘓

木乳歸含降香

水蠅散

即水蠅擦研末見乳部乳岩

月白珍珠散

見潰瘍門

涼血地黃湯

見血箭

太乙膏

見潰瘍門

腹痛 無圖

腹痛本於寒氣侵鬱在肌 肩痛連心衣觸手捺無皮狀法宜椒

酒綿濕温

註

此證係暴寒侵襲肌 胃之中寒鬱不行偶犯衣觸或以手

捺疼痛連心似乎如 皮之狀法宜胡椒四錢燒酒四兩

共入磁盆內重湯炖 以軟綿蘸酒温湯熨痛處即效

瘡口誤入毒水 無圖

瘡潰誤入污水毒或傷諸 刺痛至骨金蠟散煨敷瘡內毒水流

盡刺亦出

註

瘡潰誤入皂角驢馬 尿糞一切污穢毒水入瘡或木刺傷

着於瘡內焮腫疼痛至骨者先以溫水洗瘡拭乾再用金蟬散煨煉妥協撒於瘡內外以加味太乙膏蓋之良久毒水流盡有刺亦自出矣

金蟬散

大乾蝦蟆 一箇

胡椒 十五粒

皂角子 七粒

右用乾鍋入藥在內瓦蓋鍋口慢火煨至烟盡取出存性

研為細末取用

方歌 金蟬潰瘡受毒水腫痛或因木刺傷蝦蟆胡椒皂角子火

煨烟盡研撒良

加味太乙膏

見潰瘍門

諸瘡生蠅蛆 無圖

夏月諸瘡臭腐爛蠅衆生蛆治勿慢蟬花散服可除之蛆化為

水蠅畏散

註夏月諸瘡潰爛腐臭或孤單及懶惰之人失於洗浴積膿

污穢蒼蠅聞穢叢聚以致生蛆宜急服蟬花散蛆盡化水

而出蠅亦不敢近瘡嬰兒痘爛生疽者亦服前藥外用寒

水石細末摻之又治瘡膿忽臭有冬月潰瘡生蛆者係陰

濕之所化也宜海參為末撒之或皂礬飛過為末撒之其

蛆亦化為水

蟬花散

蛇蛻 一兩 火燒 蟬蛻

細辛 二錢五分

青黛 各五錢

右為末每服用三錢黃酒調服日用二服

方歌 蟬花散療諸瘡穢夏月生蛆蠅近圍蛇蛻細辛蟬蛻黛酒

調蛆化蠅畏飛

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

御纂醫宗金鑑卷七十五

編輯外科心法要訣目錄

雜證部

跌撲

金瘡

箭頭入肉

鐵鍼入肉

鐵鍼誤入咽喉

誤吞銅錢

骨硬咽喉

杖瘡

夾傷

竹木刺入肉

破傷風

發瘰

湯火傷

凍瘡

人齧傷

熊虎狼傷人

馬齧傷

瘋犬齧傷

馬汗驢涎入瘡

蛇齧傷

蜈蚣齧傷

蠍螫

蠶齧

射工傷

蚯蚓傷

天蛇瘡

蠼螋傷

百蟲入耳

醫部全錄卷之七十一

御纂醫宗金鑑卷七十五

編輯外科心法要訣

雜證部

跌撲

跌撲之證屬尋常復元活血湯最良已破亡血八珍服未破血
瘀大成湯

註

此證有已破未破之分亡血瘀血之別如尋常跌撲微傷
皮肉疼痛未破者以復元活血湯散瘀活血若損傷筋骨
血流過多不止者卽爲亡血急用花蓋石散乾撒止血內
服八珍湯加酒炙骨碎補續斷紅花若從高跌墜未曾損

破皮肉者必有瘀血流注臟腑人必昏沉不醒二便秘結
當以大成湯通利二便其人自醒若便利不醒者灌獨參
湯救之

大成湯

大黃 三錢

枳殼 各二錢

枳殼 各二錢
麩炒

厚朴 薑炒

當歸

紅花

木通

蘇木

陳皮

甘草 各一錢
生

水二鍾煎八分不拘時服服後二時不行渣再煎加蜜三

匙冲服

方歌大成活痰便立通消黃枳殼厚歸紅木通蘇木陳皮草煎

服不行加蜜冲

復元活血湯

當歸尾 二錢

柴胡 一錢五分

穿山甲 炙研

紅花

栝蒌仁 各七分

甘草 五分

桃仁 十七個

大黃 三錢

水二鍾酒二鍾煎一鍾食遠服以利為度

方歌復元活血跌撲證惡血流瘀積滯疼山甲柴紅栝蒌草桃

仁歸尾大黃行

花蕊石散

見發無定處血痣

八珍湯

獨參湯

俱見潰瘍門

金瘡

金瘡須宜驗傷痕輕傷皮肉重傷筋外撒如聖桃花散血多八

珍湯獨參

註

此證有金刃傷箭鏃傷磁鋒傷須看傷痕深淺輕者皮肉

破損血流不住以桃花散撒之重者筋斷血飛係大脈已

傷用如聖金刀散撒上以絹帛紮住止而復流再撒若藥

痂過厚拘痛者以生肌玉紅膏塗傷處外貼陀僧膏長筋

止痛生肌治之無論輕重傷破出血初服三黃寶蠟丸傷
破微出血者服黎洞丸若出血過多其人面黃眼黑不可
專攻瘀血宜用八珍湯甚者獨參湯先固根本二方俱加
蘇木紅花兼調瘀血此證雖係好肉暴傷然驗脈法形證
亦可以定生死如傷血過多脈見虛細沉小和緩者生若
脈見浮洪數大實虛促者死被傷入肺者二七死左脇下
傷內者腸全斷者少腹下傷內者傷處繁多者老人左股
壓碎者傷破陰子者肩內耳後傷透於內者死凡傷天臑
穴與眉角腦後臂裏跳脈髀內陰股兩乳上下心下鳩尾
及五臟六腑之輪者皆死腦後出髓而不能語目睛直視

喉中沸聲口急唾出兩手妄舉者亦死又有腹皮損破腸
出者看腸若僅傷一半者可治先以大麥煮粥取濃汁溫
洗其腸以桑皮尖茸為線蘸花蓋石散縫腸傷口急於縫
處塗活雞冠血隨以清油塗腸令潤將腸輕輕納入腹中
外用生人長髮密縫腹傷口之裏肉留外皮撒月白珍珠
散以待生肌斂口若傷口大者不能外縫以陀僧膏護貼
候自潰膿即按潰瘍門治法縫後勿驚笑以米飲少少飲
之漸增待二十日後再喫濃粥調理而愈

三黃寶蠟丸

藤黃

四兩製法見
黎洞丸內

天竹黃

無真者九轉
南星代之

紅芽大戟

劉寄奴

血竭

各三兩

孩兒茶

雄黃

各三兩

朴消

一兩

當歸尾

一兩五錢

鉛粉

汞

即水銀

乳香

麝香

各三錢

琥珀

二錢

各研極細末稱準和一處將水銀同鉛粉在鐵鍋內火上

熱研成末入前藥內共研勻用煉淨黃蠟二十四兩放磁

器內坐滾水中化開將藥入內攪勻病重者每丸一錢病

輕者每丸五分熱黃酒調服倘受傷至重連服數次服藥

後飲酒出汗更妙又治一切惡瘡以香油化開敷之甚效

方歌

三黃寶蠟琥天竹大戟兒茶消寄奴雄竭藤黃鉛粉汞乳

歸麝碾去其粗蠟丸黃酒熱調服外治惡瘡油化敷能療
金瘡傷損證續筋瘀散痛全無

黎洞丸

三七內坐瀉水中生大黃藥人內阿魏

孩兒茶末天竹黃無血竭二兩

乳香各二兩沒藥各二兩雄黃一兩

山羊血五錢無真者以小子羊鮮心血代之冰片

麝香各二錢五分牛黃以上各研細末

藤黃二兩去浮沉取中將山羊血拌入曬乾以秋荷葉露泡之隔湯煮十餘次

取秋露水化藤黃拌藥搗千餘下如乾加煉蜜少許為丸

重一錢黃蠟封固每用一丸黃酒化服外敷亦用黃酒磨

塗此藥如在夏天修和取天落水拌之為丸

方歌黎洞金瘡跌撲傷發背癰疽諸惡瘡癩癰刑傷瘋犬齧蜂

蛇蠍毒服敷良三七大黃冰麝魏兒茶天竹竭藤黃羊血

牛雄黃乳沒秋露和丸酒化強

桃花散 見發無定處血箭

如聖金刀散 見足癩脫疽

生肌玉紅膏

陀僧膏

八珍湯

獨參湯

月白珍珠散 俱見潰瘍門

花蕊石散 見發無定處血瘕

論西人肉

箭頭入肉 附毒箭

箭頭入肉鉗不出解骨丸納羊脂敷煖銅毒箭金汁解射菌中人藍汁塗

註 箭頭嵌入肉內鉗不出者宜解骨丸納傷口內外用羊脂

脂細嚼貼之覺癢忍之極癢箭頭漸冒撼動拔出即以人

尿洗之貼陀僧膏日換傷口自斂又有毒箭二種交廣蠻

夷用焦銅作箭鏃甚毒人若中之纔傷皮肉便悶脹沸爛

而死急飲金汁外亦用金汁抹之若金汁一時不得即灌

人糞汁並外敷之非此不能解毒也又一種以毒藥喂箭

名爲射菌人若中之甚毒急用葛氏方用藍錠汁一盃灌

之外亦用塗抹傷處一法用大豆豬羊血內服外敷解毒
亦效又箭鏃不出者搗鼠肝塗之或鼠腦搗塗即出

解骨丸

蛻螂

研

雄黃

研

象牙末

各等分

共和勻煉蜜為丸如黍米大納傷口處

方歌

解骨丸能拔箭鏃蛻螂雄黃功效速象牙末加蜜煉丸大

如黍米納傷處

陀僧膏

見瀆
瘍門

鐵鍼入肉

鐵鍼入肉隨氣遊走向心胸險可愁烏鴉翎灰酒調服膏貼鍼

出始免憂

註

凡鐵鍼誤入肉中無眼者不動有眼者隨氣遊走若走向

心窩胸膛者險急用烏鴉翎數根炙焦黃色研細末酒調

服一錢或二錢俱可外用神聖膏貼三五次其鍼自出前

法用在一二日間效

神聖膏

用車脂輦油不拘多少研如膏調慈石末攤紙上如錢許貼

之每日二換

鐵鍼誤入咽喉

誤吞鐵鍼入咽喉急飲蝦蟆血數頭鍼不卽吐箬籬散或食飴糖出不留

註鐵鍼誤入咽喉無藥可施宜用癩蝦蟆數個將頭剝去倒垂流血以盃接之得一盃許灌入喉中移時連鍼吐出鍼自輒曲一方用舊箬籬煨存性研末每服三錢黃酒調服亦能化鍼或用飴糖一觔食盡便出

誤吞銅錢

誤吞銅錢雖無疼久留腹中病必成葶薺能化堅為軟多食無傷可化銅

註

誤吞銅錢多食葶薺即能化堅為軟若誤吞鐵骨等物腸中不能轉送覺墜者多食青菜豬脂自然送入大腸與糞同出甚效

骨骮咽喉

骨骮咽喉最可憂吐嚙刺痛礙咽喉魚骨須用鴨涎灌獸骨狗

涎灌即瘳

註此證由嚙物急迫骨骮於咽喉妨礙飲食吐嚙刺痛宜急

治之然有魚骨獸骨之分誤吞魚骨者用河中養蓄活鴨

倒掛垂涎以磁盃接下令患人仰臥頻灌其骨盡化誤吞

獸骨者用狗一隻倒掛接涎如前法頻灌其骨盡化俱效

若失治咽喉腫痛潰膿宜用冰硼散吹之不可妄服涼藥

若骨勢大者與飲食難下餓倒胃氣者俱屬難救

冰硼散 見口部 驚口瘡

杖瘡

杖瘡須宜看其形已破未破要分明清涼拈痛膏破用敷之消腫並止疼未破瘀血須當砭湯劑急宜用大成玉紅膏貼瘀腐痛搽之新肉自然生

註

此瘡有已破未破之分已破者隨杖後用清涼拈痛膏敷之疼腫即消未破瘀血內攻者急宜砭去瘀血內服大成湯便通自愈如傷處瘀腐作疼者生肌玉紅膏搽之自然腐化新生其效甚捷

清涼拈痛膏

如意金黃散一兩加樟腦末三錢和勻又用生白石灰塊三

四觔許以水泡開水高石灰二三指露一宿將石灰面上浮起油水結如雲片者輕輕帶水起入盥內有水一鍾對香油一鍾竹筋攪百轉自成稠膏調前藥稀稠得所不用湯洗徧敷傷處紙蓋布紮夏月一日冬月二日方用葱湯淋洗乾淨仍再敷之以腫消痛止爲度

方歌 清涼拈痛金黃散加入樟腦末三錢杖瘡破後多疼痛石

灰水油調敷痊

大成湯

見跌撲

生肌玉紅膏

見潰瘍門

如意金黃散

見腫瘍門

夾傷

夾傷禁用藥貼敷硃砂燒酒可調塗瓊液散服隨飲醉腫勢必消痛自除復受重刑潰破者代杖湯藥速宜圖氣血弱者當大補六真膏貼痛卽無

註

夾傷卽擠傷也禁用敷藥膏藥及泥塗等法恐後必作腫成膿受刑初宜服代杖丹以護心隨用銀硃或硃砂末燒酒調敷傷處再著一人以手十指尖輕啄患者腳心先覺癢次覺疼爲止次著一二人以筆管於患者腳面上輕輕趕之助通血脈候傷處凹者突起四圍腫大爲度卽服瓊液散隨飲至醉次日揩去所敷銀硃只用洗杖傷湯日燙

二三次次日再服瓊液散其腫自消痛即止矣如復受重刑以致破潰者外貼瓊液膏內服代杖湯繼宜大補氣血易於收功生肌時換貼六真膏其效甚捷

代杖丹

丁香

蘇木

蚯蚓

去土

無名異

丹皮

肉桂

木鱉子

乳香

沒藥

自然銅

各一兩

火煨醋淬七次

右為末煉蜜和丸二錢重用一丸黃酒化下

方歌代杖護心血不攻丁香蘇木蚓無名丹皮肉桂木鱉子乳

香沒藥自然銅

瓊液散

開羊花

擇去梗蒂蕊葉洗去
灰沙曬乾砂鍋微焙

為末每服五分壯者七分先飲醇酒至半酣次用調藥服

下再飲至大醉為度靜臥勿語語則發麻至次日其麻方

解消腫止疼其功甚捷連服三五次弱者間一日再服

方歌

瓊液散消瘀血滯豫酌酒至半酣時開羊花末調服下瓊

漿復飲醉如癡

洗杖湯

陳皮

透骨草

南星

天門冬

地骨皮

天靈蓋 各五錢

象皮 一兩切碎

水煎浸洗日三二次

方歌 洗杖湯陳透骨星天冬地骨共天靈象皮水煎日勤洗夾

傷消腫又除疼

瓊液膏

當歸尾

鬧羊花

紅花

白芷

蒲黃 各二兩

香油一觔浸藥七日燥枯去渣入白蠟黃蠟各一兩溶化
盡絹濾淨稍溫再入莽片六分沒藥乳香末各六錢攪勻

攤貼

歌方 瓊液膏貼夾傷破歸開紅花芷蒲黃油燻又下白黃蠟再

加冰片沒乳香

代杖湯

乳香

沒藥

蘇木

各二錢

蒲黃

木通

枳殼

麩炒

甘草

生

當歸尾

丹皮

木耳

穿山甲

各一錢
炙研

土木鱉

五個
焙

酒水煎服

歌方 代杖湯醫夾傷驗乳沒蒲黃通枳甘歸尾丹皮鱉木耳酒

煎蘇木炙穿山

六真膏

樟腦 三兩

孩兒茶

滴乳香

血竭

沒藥

三七 各三錢

共為末用豬脂油十二兩盪盛水煮化將藥入油內和勻

攤貼

方歌六真膏貼夾杖傷樟腦兒茶滴乳香竭沒三七脂油化和

敷諸瘡也相當

竹木刺入肉

諸刺入肉係外傷螻蛄搗塗最為良如刺已出仍作痛再塗螻蛄即無妨

註

諸刺入肉外傷之證也輕淺者以鍼撥出硬深者搗螻蛄塗之少時即出如刺已出而仍作痛者再以螻蛄塗之即愈

愈

六真膏

靈應膏

好藥茶

斷骨膏

竹木刺入肉

破傷風

皮肉損破外傷風初覺牙關噤不鬆甚則角弓反張狀吐涎抽
搐不時寧因動靜驚潰審陷縮神昏不語凶在表宜汗裏宜
下半表半裏以和平

註

此證由破傷皮肉風邪襲入經絡初起先發寒熱牙關噤
急甚則身如角弓反張之狀口吐涎沫四肢抽搐無有寧
時不省人事傷口銹澁然傷風有四因動受靜受驚受瘡
潰後受皆可傷風動而受者怒則氣上其人跳躍皮肉觸
破雖被風傷風入在表因氣血鼓旺不致深入屬輕靜受
者起作和平之時氣不充鼓偶被破傷風邪易於入裏屬

重驚受者驚則氣陷偶被傷破風邪隨氣直陷入陰多致
 不救屬逆若風邪傳入陰經者則身涼自汗傷處反覺平
 塌陷縮甚則神昏不語噤口舌短其證貴乎早治當分風
 邪在表在裏或半表半裏以施汗下和三法如邪在表者
 寒熱拘急口噤咬牙宜服千里奔散或雄鼠散汗之次以
 蜈蚣星風散頻服追盡臭汗如邪在裏者則驚而抽搐臑
 疔半腑秘澀宜江鱧丸下之如邪在半表半裏無汗者宜羌麻
 湯主之若頭汗多出而身無汗者不可發汗宜榆丁散和
 之若自汗不止二便秘赤者宜大芎黃湯主之又有發表
 太過臑疔雖和自汗不止者宜防風當歸散服之發表之

後表熱不止者宜小芎黃湯服之攻裏之後裏熱不止宜
栝石湯服之若傷時血出過多不可再汗宜當歸地黃湯
主之至於生瘡潰後受風者因生瘡潰而未合失於調護
風邪乘虛侵入瘡口先從瘡圍起粟作癢重則牙緊項顛
下視不宜發汗誤汗令人成瘕當以參歸養榮湯加殭蠶
主之先固根本風邪自定若手足戰掉不已者宜硃砂指
甲散主之若癩盛抽搐身涼者宜黑花蛇散主之外治之
法遇初破之時一二日間當用灸法令汗出其風邪方解
若日數已多卽禁用灸法宜羊尾油煮微熟絹包乘熱熨
破處數換拔盡風邪未盡者次日再熨兼用漱口水洗之

日數玉真散至破口不銹生膿時換貼生肌玉紅膏緩緩收斂按劉完素只論三陽汗下和三法而不論三陰者蓋風邪傳入陰經其證已危如腹滿自利口燥咽乾舌捲囊縮等類皆無可生之證故置而不論也

千里奔散

用行遠路驟蹄心陰陽瓦煨存性研細每服三錢熟黃酒沖服

方歌千里奔散破傷風口噤拘急寒熱攻驟蹄火煨存性研每服三錢黃酒沖

雄鼠散

活雄鼠一枚用鐵線縛繞陰陽丸煨存性研為細末作一服
熱黃酒調下

方歌雄鼠破傷風居表活鼠一枚鐵線繞陰陽丸煨存性研酒
調盡服風邪了

蜈蚣星風散

蜈蚣 二條

江鱧 三錢

南星

防風 各二錢五分

共研細末每用二錢黃酒調服一日二服

方歌蜈蚣星風邪未散搜風發汗去風源南星江鱧防風末酒

服經絡自通宜

江鱧丸

天麻

雄黃

各一錢

蜈蚣

二條

一江鱧

殭蠶

炒

野鴿糞

各五分

共研細末作兩分一分飯丸加梧桐子硃砂為衣一分加

巴豆霜二分五釐飯丸如梧桐子大每用硃砂藥二十九

丸加巴豆藥一丸二服加二丸白滾水送下至便利為度再

服硃砂藥病愈即止

方歌江鱧破傷風八裏驚兼抽搐下之宜天麻蜈蚣野鴿糞雄

黃巴霜丸硃衣

羌麻湯

羌麻湯

羌活

麻黃

川芎

防風

枳殼

白茯苓

石膏

黃芩

細辛

甘菊花

蔓荊子

前胡

甘草

生 各七分

白芷

薄荷

各五分

生薑三片水二鍾煎八分服

方歌羌麻湯芎風枳殼苓芷石膏芩薄荷細辛菊蔓前甘草發

汗破傷風卽瘥

榆丁散

防風

地榆

紫花地丁

石象醫宗金鑑 卷七十一

馬齒莧 各五錢

共研細末每服三錢温米湯調下

方歌 榆丁破傷風為患頭汗身無不宜散此藥米湯服解和腸

榆地丁馬齒莧

大芎黃湯

黃芩

羌活

大黃 各二錢

川芎 一錢

水煎服以微利為度

方歌 大芎黃治破傷風汗多便秘小水紅水煎黃芩與羌活大

黃切片共川芎

防風當歸散

防風

當歸

川芎

生地

各二錢五分

水煎服

方歌防風當歸表太過臟腑雖調汗出多只將四味水煎服川

芎生地共相和

小芎黃湯

川芎 三錢

黃芩 二錢

甘草 五分

水煎溫服

方歌小芎黃湯發散後表熱猶存用此醫芎苓甘草煎溫服退

執除根神效奇

栝石湯

栝萹仁 九錢

滑石 一錢五分

蒼朮

米泔水浸炒

南星

赤芍

陳皮

各一錢

白芷

黃蘗

黃芩

黃連

各五分

甘草

二分

生薑三片水三鍾煎一鍾服之

方歌

栝石芍芷蘗苓連蒼朮南星陳草煎醫治破傷風下後熱

猶不解服之痊

當歸地黃湯

當歸

熟地

川芎

藁本

白芍

防風

白芷

細辛

防風

水煎服

方歌當歸地黃芎藁本白芍防風芷細辛破傷之時血出甚服

此滋榮風不侵

參歸養榮湯

人參

當歸

川芎

白芍

熟地

白朮

白茯苓

陳皮

甘草

酒炒

各一錢

土炒

五分

生薑三片紅棗肉二枚水煎服

方歌參歸養榮榮衛虛潰瘡失護風邪居生薑三片一枚棗入

珍湯內入陳皮

硃砂指甲散

八手足指甲

燒存性用大錢

硃砂

南星

獨活各二錢

共研細末每用四錢熱黃酒調下

方歌硃砂指甲散神效破傷風侵手足搖每用四錢熱酒服南

星獨活指甲燒

黑花蛇散

麻黃 一兩

黑花蛇 六錢
即烏蛇酒浸

天麻

白附子

乾薑

川芎

附子 製

草烏 各五錢
泡去皮

蠍稍 三錢五分

共研細末每服一錢熱黃酒調下日二服

方歌 黑花蛇散蠍麻黃天麻白附子乾薑川芎附子草烏泡善

却風痰醫破傷

玉真散

白芷

南星

白附子

天麻

羌活

防風 各五錢

共研細末唾津調濃敷傷處如破傷風初起角弓反張牙

關緊急每用三錢熱童便調服亦妙

方歌 玉真散芷共南星白附天麻羌活風破傷風襲傳經絡熱

酒調服立奏功

生肌玉紅膏

見潰瘍門

天麻白附干草薑黃黃芩白芷甘草

共研末每用一錢煎黃斷斷不日二服

天麻白附干草薑黃黃芩白芷甘草

天麻白附干草薑黃黃芩白芷甘草

天麻白附干草薑黃黃芩白芷甘草

天麻白附干草薑黃黃芩白芷甘草

發瘧

潰瘍發瘧類破傷有汗為柔無汗剛膿血出多成此證補正驅

邪要審詳

註

此證勢類破傷風牙緊體強肢搐背反有汗曰柔瘧無汗

曰剛瘧由潰瘍亡血過多所致治宜大補氣血以十全大

補湯加釣藤鈎槩子天麻服之不應者服獨參湯手足逆

冷加桂附誤作風瘧汗之則危

十全大補湯

獨參湯

俱見潰瘍門

湯火傷

湯燙火燒皮爛疼炮起挑破使毒輕煩躁作嘔防毒陷便秘神昏氣喘凶

註

此證係好肉暴傷湯燙火燒皮膚疼痛外起燎炮即將炮

挑破放出毒水使毒輕也其證雖屬外因然形勢必分輕

重輕者施治應手而愈重者防火毒熱氣攻裏令人煩躁

作嘔便秘甚則神昏悶絕初傷用冷燒酒一鍾於無意中

望患者胸前一潑被吃一驚其氣必一吸一呵則內之熱

毒隨呵而出矣仍作煩悶者以新童便灌之外初用清涼

膏塗之解毒止痛不致臭爛次以鷲粟膏塗之痛止生膿

時換黃連膏貼之收斂火毒攻裏者宜四順清涼飲服之
務令二便通利則毒熱必解初終禁用冷水并泥浸溺傷
處恐熱毒伏於內寒滯束於外致令皮肉臭爛神昏便秘
端肩氣喘多致不救外花砲火藥烘燎者治法同前

鷓鴣膏

鷓鴣花

十五朵無花
以殼代之

香油四兩將鷓鴣粟煤枯濾淨入白蠟三錢溶化盡傾入盃
內待將凝之時下輕粉二錢攪勻炖水中令冷取出臨用
時搥脚挑膏手心中捺化搽於傷處綿紙蓋之日換二次
其痛自止次日用軟帛挹淨腐皮再搽之

方歌 鷲粟膏治湯火燒香油鷲粟共煎熬白蠟更兼真輕粉患

上搽塗痛即消

清涼膏

水發開石灰末一升加水四盃攪渾澄清取清汁一盃加香

油一盃以筋順攪數百轉其稠黏如糊用雞翎蘸掃傷處

黃連膏 見鼻部

四順清涼膏 見面部

疔腮

凍瘡

凍瘡觸犯嚴寒傷氣血肌肉硬腫殭凉水揉湯覺熱散大忌烘
火立成瘡

註

此證由觸犯嚴寒之氣傷及皮肉着凍以致氣血凝結肌
肉硬腫殭木不知痛癢卽在着凍之處墊衣揉搓令氣血
活動次用凉水頻洗覺熱殭木處通活如故則已若日久
凍殭疙瘩不散用水一塊絹包濕之以殭疙瘩化盡爲度
此從治之法也若暴凍卽着熱或進煖屋或用火烘湯泡
必致肉死損形輕則潰爛重則骨脫筋連急剪去筋否則
浸淫好肉初治宜人參養榮湯加醇酒服之潰爛者外按

癰疽潰瘍治法亦有經年不愈者用獨勝膏敷之甚效

獨勝膏

於六月初六十六二十六日用獨頭蒜杵爛日中曬熟塗於
凍發之處即於日中曬乾忌患處著水

人參養榮湯

見潰瘍門

火立

東... 補... 益... 氣... 血... 肉... 豐... 潤... 容... 水... 養... 人... 參...

東...

人齧傷

人齧係受牙毒傷腫痛臭爛異尋常始終惟宜童便洗蟾酥條餅功最良

註

此傷由人牙齒食用炙煇之物漸漬有毒故一受其傷則腫痛臭爛異於尋常初齧時用熱童便浸傷處洗去牙黃汚血貼蟾酥餅以萬應膏蓋之出微膿卽愈若失治則爛痛發腫仍用童便浸洗次用油紙燃點火於患處薰之良久插蟾酥條如傷口大作餅上萬應膏蓋之俟腫消時用葱白二兩甘草五錢水煎日洗一次換生肌玉紅膏蓋貼萬應膏收口一法隨於齧後卽用童便洗之大糞塗之

腫潰時人中黃熬湯時洗較諸治法尤覺神效

蟾酥餅

蟾酥條

俱見疔瘡門

萬應膏

生肌玉紅膏

俱見潰瘍門

撥世是夏

人雖新受天毒毒氣未散與毒常故外雖以意治之

人雖

熊虎狼傷人

熊虎狼傷致成瘡內外服洗葛根湯青布燃薰鐵湯洗獨窠粟子嚼塗傷

註

熊虎狼牙爪傷人皮肉成瘡者初宜葛根濃煎內服一二鍾外洗日十度或煮生鐵有味者洗之又用青布急捲爲繩燃着納竹筒中注瘡口薰之出毒水次宜獨窠粟子生嚼塗傷口效

瘋犬齧傷

瘋犬齧傷毒最深刺吮糞灸尿洗淋頂心紅髮當拔去三年禁忌保終身

註

犬因五臟受毒而成瘋犬故經其齧必致傷人九死一生之證也初被齧時急就齧處刺令出毒血以口含漿水吮洗傷處或以拔法拔之或以人尿淋洗拭乾卽用核桃殼半邊以人糞填滿罨在齧處上着艾灸之殼焦糞乾再易灸至百壯以玉真散唾津調敷次日再灸漸灸至三五百壯爲度於初灸時卽服扶危散逐惡物血片從小水中出若毒物血片堵塞莖中致小水澀滯若淋者卽服琥珀碧

玉散以通利之被齧之人頂心有紅髮一根速當拔去一
法用豆豉研末香油調稠丸如彈子大常指拭所齧處搗
開看豉丸內若有狗毛茸茸然此係毒氣已出易丸再搗
至無茸毛方止甚效始終禁忌必當慎重終身忌食狗肉
及蠶蛹赤豆百日内忌見麻物忌飲酒三年內忌食一切
毒物及房事可常食杏仁以防其毒若治遲犬毒入心煩
亂腹脹口吐白沫者用虎頭骨虎牙虎脛骨為末酒調二
錢服之若發狂叫喚人聲似犬聲眼神露白者逆終始犯

風 禁忌者不救

扶危散

蟹螯

按日數用之如犬齧已竟七日用七個
十日用十個去翅足加糯米同炒去米

滑石

一兩
水飛

雄黃

一錢

麝香

二分

共研細末每服一錢温酒調下不飲酒者米湯調下

方歌

扶危散治瘋犬齧蟹螯糯米一同炒滑石雄黃與麝香研

加酒服毒即掃

琥珀碧玉散

滑石

六兩

甘草

一兩

琥珀

五錢

青黛

八分

共研細末每服三錢燈心煎湯調下

方歌

琥珀碧玉用六一黛珀同加研極細燈心湯調服三錢滑

澀能醫小水利

瘋犬齧傷拔法

用砂燒酒壺兩個盛多半壺燒酒先以一壺上火令滾無聲
傾去酒卽按在破傷瘡口拔出汚黑血水滿則自落再以次
壺仍按瘡口輪流提拔以盡為度其證立愈

玉真散

見破傷風

此散治諸般風火瘡癩癰疽疔毒一切惡毒不論新舊
其效如神未破者一搽即愈已破者一搽即愈

散

藥

香

此散治諸般風火瘡癩癰疽疔毒一切惡毒不論新舊
其效如神未破者一搽即愈已破者一搽即愈

馬汗驢涎入瘡

潰瘡誤犯馬汗傷焮痛紫腫瘡四旁急疔腫處出紫血烏梅嚼爛塗敷良患者煩熱毒攻腹強弱量服馬莧湯更有驢涎入瘡者冬瓜青皮末敷瘡

註

此證係潰瘡未合誤入馬汗之毒以致瘡口四旁忽復焮痛紫腫宜急疔腫處令出紫血烏梅嚼爛塗於瘡上若患者煩悶發熱恐毒入腹以致不救急用醇酒濃煎馬齒莧飲之盡醉爲效但馬齒莧其性寒滑凡瘡潰未合氣血未復而又受此馬汗必量人壯弱用一兩或五錢更有驢涎入瘡者形證與馬汗毒同宜用冬瓜片下青皮晒乾研末

敷之熬湯洗之亦可毒甚者亦用馬齒莧酒飲之立效

蛇齧傷

蛇齧傷時即飲醋仍宜用繩紮患處再服五靈共雄黃腫消口

合自如故

註凡被蛇齧傷者即時飲好醋一二碗使氣不隨血走以繩

紮入紫傷處兩頭若昏困宜用五靈脂五錢雄黃二錢五分共

碾為末酒調二錢灌之少時齧處出黃水水盡則腫消以雄

黃末摻之口合而愈

此方觀感入錄

蜈蚣咬傷

蜈蚣咬傷用雄雞倒控雞涎手蘸之抹搽傷處痛立止甚飲雞血最相宜

註

此傷取雄雞倒控少時以手蘸雞口內涎抹搽傷處其痛立止甚者生雞血乘熱飲之立效

蠍螫 蠶齧

蠍螫急取大蝸牛搗爛塗之痛立休蠶齧須將芋根搗取汁搽塗患卽瘳

註

凡蠍螫取大蝸牛一個搗爛塗之其痛立止一時不得蝸牛卽將螫處擠去毒水急用膏藥烤熱貼之亦能止痛蠶齧者用芋根搗汁塗之卽愈

血是麻宜

蠍螫急取大蝸牛搗爛塗之痛立休蠶齧須將芋根搗取汁搽塗患卽瘳

蠍螫急取大蝸牛搗爛塗之痛立休蠶齧須將芋根搗取汁搽塗患卽瘳

射工傷

射工傷人必癢痛甚則骨肉爛成瘍豆豉搗敷白芷洗已爛海
螵蛸末良

註

射工卽樹間雜毛蟲也又名瓦刺蟲人觸着則能放毛射
人初癢次痛勢如火燎久則外癢內痛骨肉皆爛諸藥罔
效用豆豉清油搗敷痛癢之處少時則毛出可見去豆豉
用白芷煎湯洗之如肉已爛用海螵蛸末搽之卽愈

蚯蚓傷

蚯蚓蔽傷受毒氣眉髻脫落全無跡法用鹽湯頻頻洗久則其毒自然去

註

蚯蚓蔽傷即受蚯蚓之毒今人眉髻皆落狀如大麻風但夜則蚯蚓鳴於體中為異耳宜用鹽湯頻頻洗之其毒自去

鹽湯末頁

取土封人必聚其限骨肉離及寒豆短謝潔白至其白離

限工則

天蛇瘡

天蛇瘡發肌膚中似癩非癩是其形證因苜內蜘蛛毒復被露

水侵始生

註

此證生於肌膚似癩非癩是草中花蜘蛛螫傷復被露水

所侵而致法宜秦艽一味煎湯徐徐飲之外敷二味拔毒

散甚效

二味拔毒散

見腫瘍門

蠼蝮傷

蠼蝮隱壁尿射人誤着皮膚水炮淫痛如火烙如豆大鹽湯二味拔毒侵

註

此蟲一名多脚蟲藏於壁間以尿射人若誤中其毒令人

皮膚起燎漿水炮痛如火烙初如飯糝次如豆大宜鹽湯綿湯瘡上數換即消甚則毒延徧身搔癢不休宜二味拔

毒散敷之甚效

二味拔毒散

見腫瘍門

天... 蠼蝮... 尿射... 皮膚... 水炮... 淫痛... 如火... 烙如... 豆大... 鹽湯... 二味... 拔毒... 散

天... 蠼蝮

百蟲入耳

蟲偶入耳勿驚慌燒肉香氣近耳旁獨坐夜燈引蟲出麻油滴耳使蟲斃

註

百蟲偶然誤入耳中如蠅蚊小蟲以麻油數點滴入耳竅蟲卽死取出如蚰蜒筭物入者以肉炙香置於耳旁蟲聞香自出夜間暗入者切勿驚慌响叫逼蟲內攻宜端坐點燈光向耳竅其蟲見光自出若對面有人其蟲不出人皆旁避方效

養氣大效

氣血兩虧其病最重夫血出於心而滲於脾人其氣不出人其

香自出矣胃脾人其氣自出矣脾人其香自出矣宜識此理

滋潤液血出於心而滲於脾人其香自出矣脾人其香自出矣

補首端雖然始大耳中取應效小端以親而獲顯人耳

耳對端效

處歸人耳於端對熱肉香涼宜耳也雖坐亦欲得端出親而

百端人耳

御纂醫宗金鑑卷七十六

編輯外科心法要訣目錄

嬰兒部 風輪圖

此官風輪圖

赤遊丹毒

以川椒湯洗之

胎瘤

紅絲瘰

以人轆漚湯洗之

胎癥瘡

痘癰

以人轆漚湯洗之

葡萄疫

胎驚丹毒

以人轆漚湯洗之

滯熱丹毒

嬰兒瘡瘍

以人轆漚湯洗之

垂癰

胎風

以人轆漚湯洗之

臍瘡

臍突

以人轆漚湯洗之

陰腫

脫肛

肛門作癢

遺毒

痘裏夾瘦

痘疔

痘裏發丹

痘爛

痘風瘡

逐日人神所在不宜鍼灸歌

十二時人神歌

十二支日人神所在歌

十干日不宜用鍼犯之病多反覆

嬰九宮尻神圖

九宮尻神歌

升打靈藥固罐法

升打靈藥封罐口法

煉金頂砒法

製寒食麵法

御纂醫宗金鑑卷七十六

編輯外科心法要訣

嬰兒部

赤遊丹毒

胎毒初患赤遊丹腹肢先後內外參內服外貼兼砭血紅輕紫重黑難痊

註

小兒赤遊丹之證皆由胎毒所致欲發之時先身熱啼叫驚搐不寧次生紅暈由小漸大其色如丹遊走無定起於背腹流散四肢者順起於四肢流入胸腹者逆或初生之後外用熱水洗浴兼以火烘衣物觸動內毒遂成此證治

之者先宜砭出惡血看血色紅者輕紫者重黑者死次宜
牛羊肉片徧貼紅暈處微乾再易俟肉片不乾換如意金
黃散用藍靛青汁搗敷內初服大連翹飲次服消毒犀角
飲大便秘結加生大黃三五分若煩躁唇焦面赤者宜服
五福化毒丹若失治毒氣入裏腹脹堅硬聲音雌啞吮乳
不下噤者宜服紫雪散下之一二日間身輕腹軟熱退身
未涼硬處肉活乳哺如常者生反此者不治

大連翹飲

連翹

去心

黃芩

歸

赤芍

防風

桑寄生

木通

滑石

水飛

牛蒡子

炒研

蟬蛻

去足翅

瞿麥

石膏

煨

荆芥

甘草

生

柴胡

黃芩

梔子

生研

車前子

各五分

水二鍾燈心二十根煎八分子與乳母同服

方歌大連翹飲赤遊丹歸芍防通滑勞蟬瞿麥石膏荆芥草柴

芩梔子共車前

消毒犀角飲

犀角

鎊

防風

各一錢

甘草

生五分

黃連

三分生

水二鍾燈心二十根煎四分徐徐服之

方歌消毒犀角飲黃連防風甘草共和煎赤遊丹毒啼驚搐氣

粗身熱服之安

五福化毒丹

黑參 赤茯苓 桔梗 各二兩

牙消 青黛 黃連

龍膽草 各一兩 甘草 五錢 人參

硃砂 各三錢 冰片 五分

共研細末煉蜜為丸如芡實大金銷為衣每服一九薄荷

燈心煎湯化服

方歌 五福化毒消熱速 瘡瘤丹毒服卽除 參苓桔草消水黛黃

連膽草黑參硃

如意金黃散 見腫瘍門

紫雪散 見舌部重舌

胎瘤

嬰兒初產患胎瘤胎熱瘀血是根由色紫漸大熟透刺放出膿汁自可瘳

註 此證由胎前孕母積熱以致胞熱更兼血瘀滯結而成多

生頭上及胸乳間初如李核漸大如饅色紫微硬漫腫不

甚疼痛嬰兒初生卽有者候過滿月熟透方可鍼之放出
赤豆汁或膿水汁其腫卽消初服五福化毒丹兼貼黃連
膏潰貼生肌玉紅膏生肌斂口若滿月後生者必待膿鼓
熟透鍼之若癰皮含血絲者詳註於紅絲癰

五福化毒丹

見赤游丹毒

黃連膏

見鼻部鼻瘡

生肌玉紅膏

見潰瘍門

紅絲瘤

嬰兒初生紅絲瘤皮含血絲先天由精中紅絲腎伏火相傳患此終難瘳

註

此證一名胎瘤發無定處由小漸大嬰兒落草或一二歲之間患之瘤皮色紅中含血絲亦有自破者治法雖同胎瘤但此患由先天腎中伏火精有血絲以氣相傳生子故有此疾終變火證潰處亦難收斂

胎癩瘡

癩瘡始發頭眉間胎中血熱受風纏乾癢白屑濕淫水熱極紅
暈類火丹

證

此證生嬰兒頭頂或生眉端又名奶癩癢起白屑形如癬
疥由胎中血熱落草受風纏綿此係乾癩有誤用燙洗皮
膚起粟搔癢無度黃水浸淫延及徧身卽成濕癩俱服消
風導赤湯乾者抹潤肌膏濕者用嫩黃蘗頭末與滑石等
分撒之膿痂過厚再以潤肌膏潤之又有熱極皮膚火熱
紅暈成片遊走狀如火丹治法不宜收斂只宜外發宜服
五福化毒丹亦以潤肌膏抹之癢甚者俱用烏雲膏搽之

乳母俱忌河海魚腥雞鶩辛辣動風發物緩緩自效

消風導赤湯

生地

赤茯苓 各一錢

牛蒡 炒研

白鮮皮

金銀花

南薄荷葉

木通 各八分

黃連 酒炒

甘草 各三分

燈心五十寸水煎徐徐服

方歌消風導赤醫胎癥疎風清熱勞黃連白鮮生地赤苓薄銀

花燈草木通甘

烏雲膏

松香末 二兩

硫黃末 一兩

研勻香油拌如糊攤南青布上少半指厚捲成條線
再用香油泡一日取出刮去餘油以火點着一頭下用粗
碗接之布灰陸續剪去取所滴藥油浸冷水內一宿出火
毒抹用

方歌烏雲膏搽胎瘰瘡油拌松香末硫黃布攤捲茶香油泡火

燃去灰用油良

潤肌膏

見頭部
白屑風

五福化毒丹

見赤遊
丹毒

痘癰

痘癰毒留經絡中發無定處腫不紅留於肌肉爲治易結於骨節難成功

註

此證因出大痘漿灌不足以致毒漿不得透發留結經絡之中隨處可生小如李者爲毒大如桃者爲癰漫腫不紅亦無炊痛身熱多煩若生單個者毒在肌肉屬順易治連發數處者船小載重屬險若結於骨節之間或成對發出者其毒已盛潰破之後滲泄氣血不能斂口屬逆初發不可強消俱宜服透膿散外敷烏龍膏膿熟鍼之加味太乙膏貼之若氣血虛弱者兼服保元湯潰後潮熱全退毒氣

方淨否則他處又發忌生冷硬麵發物

保元湯

人參

白朮

土炒

當歸

黃耆 各一錢

甘草 三分

生薑一片紅棗肉二枚水二鍾煎八分食遠服

方歌保元湯補真元氣脾胃虛弱服更宜人參白朮炙甘草當

歸薑棗共黃耆

透膿散

烏龍膏

俱見腫瘍門

加味太乙膏

見潰瘍門

葡萄疫

葡萄疫同葡萄狀感受癘疫鬱疑生徧身發點青紫色毒攻牙齒類疳形

註

此證多因嬰兒感受癘疫之氣鬱於皮膚凝結而成大小青紫斑點色狀如葡萄發於徧身惟腿脛居多甚則邪毒攻胃以致牙齦腐爛臭味出血形類牙疳而青紫斑點其色反淡久則令人虛羸初起宜服羚羊角散久虛者宜服胃脾湯米泔水漱口以非疳散日擦四五次卽效近見中年之人下虛者亦患此證治法同前

羚羊角散

羚羊角 鎊

麥冬 去心

黃芩

知母

牛蒡子 炒研

防風

元參 各八分

甘草 二分 生

水二鍾淡竹葉十片煎六分食遠服

方歌 羚羊角散 麥冬 芩 知 蒡 防 風 草 元 參 葡 萄 疫 發 初 宜 服 煎

加竹葉效如神

胃脾湯

白朮 土炒

遠志 去心

麥冬 去心

沙參

茯神

陳皮 各六分

五味子

甘草 各五分 炙

水二鍾煎六分食遠服

虛弱自汗者去沙參加入參黃耆各五分

方歌 胃脾湯治葡萄疫日久虛添羸弱宜木遠麥冬五味子沙

參甘草茯苓陳皮

非疳散

水片 四分

人中白 煨去臭氣存性

五倍子 各一兩 炒茶褐色存性

共研細末先用米泔水漱口後擦此藥

方歌 非疳中白煨五倍二味同研水片兌醫治諸疳患處擦清

熱止疼去臭穢

胎驚丹毒

胎驚丹毒面初生形如水痘根微紅時出時隱延頸項繼發丹毒赤遊同

註

此證因孕母受驚傳襲子胎嬰兒初生之後週歲以上忽

兩眼胞紅暈面色青黯煩熱夜啼或面如燕脂此屬伏熱

在內散發於面狀如水痘根脚微紅時出時隱延及頸項

繼發丹毒初用四聖散洗目其形色順逆治法皆同赤遊

丹若此患延及胸乳痰喘抽搐此屬火毒攻裏防變驚風

宜服百解散五和湯救之

四聖散

木賊

秦皮

紅棗子

燈心

黃連

各五錢

共研粗末每用二錢水一鍾煎七分去渣頻洗兩目

方歌

四聖散治熱毒侵木賊秦皮棗燈心再入黃連研粗末煎

湯去渣洗目頻

百解散

乾葛 二兩五錢

升麻

赤芍 各二兩

甘草 一兩五錢

黃芩

一兩

麻黃 七錢五分

肉桂 二錢五分

揀薄者刮去粗皮

共研粗末每服二錢水一鍾薑二片葱一根煎七分不拘

時溫服

方歌百解驚丹毒內攻煎服不致變驚風乾葛麻黃芩桂草升

麻赤芍共薑葱

五和湯

大黃

枳殼

麩炒

甘草

各七錢五分

赤茯苓

當歸

各五錢酒洗

共研粗末每服二錢水一鍾煎七分不拘時服

方歌五和甘草並當歸赤苓枳殼大黃隨驚丹延乳添抽檣煎

服火毒卽刻推

滯熱丹毒

滯熱丹毒赤遊形傷乳多食滯熱生較之赤遊走緩慢先宜消

食次宜清

註

此證初發形若赤遊丹較之赤遊丹遊走緩慢因嬰兒乳

食過多不能運化蘊熱於內達於肌表而生發熱面赤口

酸舌有黃胎宜服保和丸先消食滯若脣焦便秘者宜一

捻金服之丹毒仍作者宜犀角散服之其餘治法俱按赤

遊丹

保和丸

白茯苓

半夏製

山查肉

椰爲末須加蜜

犀角散

犀角屑

升麻

防己

山梔

生

朴消

黃芩

黃耆

各一錢

牛黃

五分

右爲細末每服五分竹葉煎

湯調下量兒加減用之

方歌

犀角散消丹毒赤升麻防己

共山梔消芩黃耆牛黃末竹

葉湯調服無時

嬰兒瘡瘍

嬰兒瘡瘍乳火成因食厚味滯火凝更兼六淫氣感受腫潰治

法按疽癰

註

凡嬰兒生瘡瘍小疔多由乳母七情之火或過週歲能飲

食者由過食乾焦厚味而生滯火更兼六淫之氣感受皆

能成之但發表攻裏托裏消毒等法及腫潰外治俱按癰

疽腫瘍潰瘍門嬰兒純陽火證居多非峻劑不能勝其病

但肌體臟腑柔脆應效即止不可過劑

垂癰

嬰兒垂癰上腭生喉前結腫色紅疼積熱凝結宜刺破服五福丹抹水礪

註

此證生於喉前上腭下垂如珠紅腫脹痛不能吮乳三四日後宜用鍼刺一二分放出膿血其腫痛即減出積熱凝結而成宜服五福化毒丹兼用水礪散抹於癰處日三抹之乳母當忌魚腥辣物

五福化毒丹

見赤遊丹毒

水礪散

見口部鵞口瘡

胎風

胎風初起皮色紅狀如湯潑火燒同證由孕母多積熱清胃湯服卽有功

註

此證又名胎赤嬰兒初生身熱皮紅狀如湯潑火燒由孕母過食辛香熱物以致脾胃積熱乳母宜服清胃湯嬰兒亦飲少許外皮焮赤用煨石膏研細敷之如無焮赤乃孕母脾虛用粳米粉敷之若兒大能食米麪身熱皮紅者係腑熱內蒸濕氣外乘之故卽名玉爛瘡宜如意金黃散蜜水調敷內服導赤湯卽效

清胃湯

見齒部
牙齦

如意金黃散

見腫
瘍門

導赤湯

見口部
口糜

臍瘡

臍瘡兒臍被水傷莖紙燒灰敷最良久而不愈風邪襲恐發風
痲緊緊防

註

此證由水濕傷臍所致若久不愈則發抽搐又因風邪外

襲也恐變風痲宜大草紙燒灰敷之或加枯礬或再加龍

骨燒灰等分入麝香少許撒之即效

臍突

臍突胎中積熱生蠱由孕母失調停兒臍突出腫赤大宜清母

子即臍平

註 此證兒臍突出赤腫虛大是也由孕母失於調停兒在腹胎受母積熱既生之後兒臍即腫宜清母子之熱兒臍不必敷治恐反為害如旬日外兒臍忽腫如吹不赤捻動微响或驚悸作啼者宜用白芍藥湯加薏苡仁令兒服之外以外消散敷之即愈

白芍藥湯

白芍 一兩 酒炒

澤瀉 五錢

甘草 一錢一分 生

肉桂 揀薄者刮去粗皮一錢

共研粗末每用二錢水一鍾煎四分空心頻服
臍下痛加釣藤一錢生薑一片食鹽五釐

方歌白芍藥湯澤瀉甘再加肉桂共粗研專醫臍腫驚啼叫空

心煎服整二錢

外消散

大黃

牡蠣各五錢

朴消二錢

共研細末用活田螺數十枚洗淨再以清水半盆養之過

宿取田螺清水調藥敷於患處其螺仍放水中勿害方效

方歌

外消散敷臍突胃大黃煨牡蠣朴消活田螺用清水泡過

宿取水將藥調

陰腫

陰腫之證小兒生久坐陰濕寒氣凝或因怒叫氣結閉寒熱虛實擇可行

詩此證即古名脫囊由久坐陰濕之地為寒氣所凝而成間

或有因怒叫氣閉結聚於下而成者俱宜用桃仁丸主之

若寒氣客於厥陰少陰者則陰囊腫痛腹痛冷汗引縮二

子入腹痛止方出謂之內疝宜烏梅散勻氣散主之有陰

莖全縮不見或不縮而陰囊腫大光亮不燥不疼者肝腎

氣虛也宜橘核煎湯調勻氣散服之囊腫及四肢俱腫二

便不利者膀胱蘊熱風熱相乘也宜白牽牛散主之若女

見陰戶腫脹者心熱相傳也宜導赤湯服之或五苓散用
薏苡車前子煎湯調服外治法俱敷立消散甚效

桃仁丸

桃仁 七錢五分
去皮尖炒微黃

白蒺藜 微炒去刺

桂心

丹皮 各五錢

黑牽牛 二錢五分
頭末

右為細末煉蜜和丸如黍粒大每服十九黃酒送下

方歌桃仁丸逐陰腫疾怒氣閉結或濕蘘疾蒺藜牽牛桂丹皮研

末蜜丸如黍粒

烏梅散

烏梅肉

甘草 半生半炙

元胡索 各五錢

釣藤鈎

乳香

沒藥 各二錢五分

共搗粗末每服二錢水一鍾煎七分服

方烏梅散用乳香沒鈎藤甘草元胡索陰囊腫兼腹中疼煎

服必先研粗末

勻氣散

桔梗 二兩

陳皮 一兩

茴香 炒

縮砂仁 各五錢

甘草 四錢

薑炭 二錢五分

共研細末每服五分或一錢白滾水調下

方歌勻氣散因外寒侵陰囊腫痛汗淋淋桔梗陳皮甘草炙茴

香薑炭縮砂仁

白牽牛散

白牽牛

半生半熟

甘草

炙

橘紅

白朮

土炒

桑白皮

木通

各一錢

水煎服

方歌

白牽牛散草橘紅白朮桑白皮木通陰囊相兼四肢腫能

逐膀胱熱結壅

五苓散

白朮

土炒

赤茯苓

各一錢五分

豬苓

澤瀉

各一錢

桂心

五分

水煎服

方歌五苓白朮桂心加赤茯苓除心火邪豬苓澤瀉能分利調

和臟腑效堪誇

立消散

赤小豆

風化消

赤芍

枳殼

商陸

各五錢 俱不宜見火曬乾共研為末

用側柏葉煎湯候冷調敷腫處

方歌立消陰囊腫痛注因受風寒濕熱毒赤小豆與風化消芍

白枳同研加商陸

導赤湯

見口部

口糜

脫肛

小兒脫肛肺虛源補中益氣湯居先腫硬作痛除積熱臙毒翻

肛臙連丸

註

此證由小兒氣虛肛脫於外用補中益氣湯加羌活白芍

煨薑主之如腫硬疼痛者有濕熱在內當用清熱除濕之

劑以清之若生臙毒肛門翻出者以臙連丸為主外治以

五倍子老葱頭朴消煎湯洗之腫用坎宮錠子塗之俱效

補中益氣湯

見潰瘍門

臙連丸

見醫部痔瘡門

坎宮錠子

見腫瘍門

肛門作痒

肛門作痒係蟲傷下唇必生小白瘡九味蘆薈丸與服外撒銅綠共雄黃

註

此證係小兒肛門作痒由蟲蝕也視其下唇內必生小白瘡或耳之前後結小核如串珠者是也書曰下唇有瘡蟲蝕其肛宜用蘆薈丸服之外用雄黃銅綠等分為末撒之

即效

蘆薈丸

見齒部
牙齦

遺毒

遺毒稟受結胎先無皮身赤未易痊肌膚紅點次斑爛染受尙可稟毒難

註

此證係先天遺毒於胞胎有稟受染受之分稟受者由父母先患楊梅而後結胎元嬰兒生後則周身色赤無皮毒攻九竅以致爛斑患此難愈百無一生染受者乃先結胎元父母後患楊梅毒氣傳於胎中嬰兒既生則頭上坑凹肌膚先出紅點次發爛斑甚者毒攻口角眼眶耳鼻及前陰穀道破爛初宜人中黃細末三五分土茯苓煎湯調稠日用二三服腫用太乙紫金錠水磨塗之破爛者用黃蘗

蜜炙為末撒之乾用香油調搽投藥應效者後服二黃散
十中可保三四若毒延徧身日夜多啼不喫乳食者屬毒
甚氣微終難救治

二黃散

胡黃連

山慈菇 各二錢

甘草 一錢五分
生

牛黃 七分

右為細末每服三分蜜湯調服

方歌 二黃散治遺毒方胡連甘草共牛黃山慈菇研為細末每

服三分加蜜湯

太乙紫金錠 見胸部
脾發疽

痘裏夾瘦

痘裏夾瘦生頸項形如桃李瓜棗狀證兼身熱多渴煩痰氣凝結致此恙

註

此證結於頸項或生耳後腋下形如桃李棗瓜身熱煩渴由痰氣凝結所致痘初起卽發瘦者治宜托裏消痰解毒如木通桔梗生地甘草蟬蛻芍藥荆芥等藥缺一不可若芩連等藥及耗燥之劑俱不可用若痘發在三四日而作瘦者則毒隨痘洩毒隨痘灌自可挽全而無害宜服三消散倘斯時紅腫將膿一潰則元氣洩而痘漿必不能充灌乘未潰時急用黃耆衛元湯補之若痘至七八日灌漿時

而發癭者冲和飲子主之若痘瘡蒼蠟色而作癭者宜消
毒兼保元氣潰後宜生肌玉紅膏貼之

三消散

當歸

赤芍

天花粉

甘草

牛蒡子

炒研

白茯苓

生地黃

紅花

蟬蛻
去足翅

木通

半夏
各八分
製

水二鍾燈心二十根煎六分服

歌 三消痘發三四日痰凝結癭須當治歸芍天花甘蒡苓生

地紅蟬通夏製

黃耆衛元湯

黃耆

人參

當歸

桔梗

紅花

甘草
炙

白芍

酒炒

防風

各一錢

水煎不拘時服

方歌
黃耆衛元瘦腫起已潰未潰急補之
人參歸結紅花草防

風芍藥服無時

冲和飲子

麥門冬

去心

人參

桔梗

當歸

黃耆

柴胡

白芍

酒炒

白茯苓

天花粉

荆芥

防風

連翹

去心

白朮

各七分
土炒

水煎服

方歌 冲和飲子麥門冬參桔歸耆柴芍苓花粉荆防翹白朮痘

發七天痰氣凝

生肌玉紅膏

見潰瘍門

痘疔

痘疔不與痘瘡同俗呼賊痘是其名色紫黯黑硬如石諸證蜂起難灌膿疔有多般須宜記再審何處發其形捲簾疔生舌根底大小不一最易明火珠疔生鼻孔內闌塞噴火面赤紅眼沿生疔名忘汲腫如封蛤熱煩增參虎疔於耳內見腎毒攻耳致成形燕窩疔生兩腋下面赤譫語更腫疼注命疔生足心裏紫筋直透足股中透腸疔在肛內發痛如錐刺一般同驪龍疔生尿孔內身熱譫語便不通法按疔名施醫治自然諸證悉能平

註

此證名多治不一法痘生五六日間或三五枚或六七枚

雜於諸痘之間其色紫黯甚則黑硬如石有此以致諸證

蜂起不能灌膿如捲簾疔生於舌根底小如黑豆大似葡萄
 荀令兒舌捲喉痛急用銀鈎鈎破儘淨惡血隨以苦茶漱
 口搽拔疔散再以冰片硼砂青黛黃連薄荷荆芥炒薑薑
 共為細末吹用火珠疔生於鼻孔內闕塞噴火面赤眼紅
 亦用銀鈎鈎破用黃連膏加水片滴入鼻孔內服瀉金散
 忘汲疔生於眼沿腫如封蛤煩熱面紫宜挑破用燕脂嚼
 汁點之兼蒲公英菊花煎湯洗之參虎疔生於耳內於膿
 成之時宜挑破搽拔疔散燕窩疔生於腋下腫硬面赤譫
 語如疔在左腋潛注則右體之瘡沉伏失色右亦如之亦
 挑破去其根用拔疔散搽之服消毒飲子注命疔生兩足

心腫硬如錢如豆如椒有紫筋直透足股挑之去淨血用
田螺水點之次用慎火草菜豆浸脹搗爛敷之透腸疔生
疔門旁在六七朝腫硬如錐挑之銀花防風煎湯令洗之
次用輕粉珍珠冰片白斂末塗之內服黃連解毒湯驪龍
疔生尿孔內於五六朝身熱譫語眼翻肢厥腹脹小水閉
瀉急用蟾酥牛黃冰片麝香研末次用黃連細茶濃煎候
冷取半匙調末以細軟稻心蘸之送入孔內服消毒飲子
甚效

瀉金散

犀角

鎊

牛蒡子

炒研

紅花

生地

桔梗

赤芍

紫蘇

甘草

生 各一錢

水煎服

方歌 瀉金散治火毒疔面赤眼紅鼻內疼犀芩紅花生地桔赤

芍紫蘇甘草生

消毒飲子

白茯苓

生地

連翹

去心

牛蒡子

炒研

紅花

甘草

生

犀角

鎊

木通

赤芍

各一錢

燈心二十根水煎服

方歌 消毒飲子苓 生地翹莠紅花甘草犀木通芍藥燈心共善

却疔毒火證宜

拔毒散

見牙齒部牙疔

黃連膏

見鼻部鼻瘡

田螺水

見唇部

黃連解毒湯

見疔部黑疔

痘裏發丹

痘裏發丹因熱極宜施涼血散毒劑塗抹內服量寒涼外用化

斑湯洗浴

註此證由內熱甚極而成內宜服生地牛蒡芍藥甘草木通

黃藥荊穗等藥其毒自消腫痛者加柴胡羌活頭頂盛者毒湊

用煎上焦也宜用炒黃連柴胡甘草車前子梔子等藥外用化

黃藥斑解毒湯洗浴量服寒涼藥及豬膽京墨水片塗抹丹之

斑解毒湯洗浴量服寒涼藥及豬膽京墨水片塗抹丹之

化斑解毒湯 見肋部內發丹毒

痘爛

痘爛浸淫無完膚水淬茶葉帶濕鋪上隔草紙令兒臥一夜膿乾爛即除

註

此證係出痘破爛身無完膚膿水浸淫沾黏衣服宜用茶葉揀去梗入滾水一燉即撈起再揀去梗濕鋪牀上上隔草紙令兒臥之一夜膿乾甚效

痘風瘡

痘風瘡生先作癢次延成片水浸淫痘後遇風甚成癩麥餞散搽效可申

註

此證由痘後遇風所致先發細瘡作癢次延成片脂水漸
長浸淫宜滲濕救苦散搽之兼避風戒口甚者搗癩毒水
浸淫肌無完膚即成痘癩急用十全大補湯大補氣血兼
散風苦參丸以清熱解毒二方合而服之外塗麥餞散甚

效

滲濕救苦散

蜜陀僧

滑石

各二兩

白芷

五錢

右研細末乾用白蜜調搽濕則乾撒

方歌

滲濕救苦散白芷蜜陀僧研入滑石痘風瘡起癢成片白

蜜調搽可去之

麥餞散

小麥

一合炒焦存性

硫黃

四錢

白砒

一錢

共研細又加烟膠末八錢枯礬末川椒末各三錢共和勻
先以葱湯洗淨患處香油調塗油紙蓋紫三日一換

方歌

麥餞痘風成癩恙小麥炒加砒硫黃次入烟膠枯礬末川

椒香油調上良

十全大補湯

見潰瘍門

散風苦參丸

見發無定處癬

逐日人神所在不宜鍼灸歌

人神走注須當記足大指兮屬初一外踝二日股內三四日在
腰五口寄六手七日內踝存八腕九尻腰背十十有一日鼻柱
間十二日兮在髮際十三注於牙齒中十四常在胃腕聚徧身
十五十六胸十有七日氣衝集十八股內足十九二十日在內
踝麗二十一日手小指念二外踝神所寓肝及足兮二十三在
手陽明念四日二十五口足陽明念六在胸念七膝二十八日
伏於陰念九卽在膝脛室三十日兮在足趺人神所在刺灸忌

十二時人神歌

子踝丑腰寅在目卯面辰頭巳手屬午胸未腹申在心酉背戌


頭亥股續

十二支日人神所在歌

子不治頭君須認丑日腰耳寅胸應卯日鼻脾辰膝腰巳手午
心真捷徑未頭手足申頭背酉行膝背同其類戌日在陰頭面
間亥日遊行頭頸位十二支神禁灸歌男除女破應該會
十干日不宜用鍼犯之病多反覆

甲不治頭乙耳喉丙肩丁背與心求戊己腹脾庚腰肺辛膝壬
當腎脛收癸日不宜鍼手足十干不犯則無憂

屍神圖



十二支日人轉位至郊

此神農所置一歲起坤
 二歲震逐年順飛九宮
 週而復始行年到處則
 所主效切忌鍼灸慎勿
 犯之否則變生他病慎

九宮屍神歌

屍神所在有根由

坤內外踝聖人留

震宮牙口膻宜記

巽位還居乳口頭

中宮肩骨連尻骨

背面目從乾上遊

手膊兌宮難砭灸

艮宮腰項也須休

離膝肋脇鍼難下

坎肘還連肚脚求

為醫精曉屍神訣

萬病無干禁忌憂

升打靈藥固罐法

宜用陽城罐將罐煨熱搗大蒜於罐外徧擦之再煨再擦如是三四次以薑醋入罐內盪之煮之以乾爲度次用黃土二分煤灰二分以馬毛以鹽水合之固罐一指厚陰乾裂縫再固必要完固聽用

升打靈藥封罐口法

入藥畢蓋鐵盞用鐵絲鑿畢用石膏無名異等分食鹽減半俱煨過爲極細末醋調成膏次加炭火二三塊於盞內燒盞熱以筆蘸藥周圍塗之隨乾隨塗以口平爲率一用石膏生白礬食鹽三味等分爲末水調塗之如前

煉金頂砒法

用鉛一觔小罐內炭火煨化投白砒二兩於化烱鉛上煉烟盡爲度取起冷定打開金頂砒結在鉛面上取下聽用

製寒食麩法

用白麩一觔外再以麩半觔水調稠厚趕成薄片二塊將前麩包合於內周圍捏緊於清明正日蒸熟掛透風處陰乾用麩包藏勿經女手愈久愈效

改步... 文... 命... 命...

... 內... 即... 日... 以... 用...

... 一... 以... 水... 二... 前...

... 命... 命... 命... 命...

... 命... 命... 命... 命...

... 命... 命... 命... 命...

欽定四庫全書

