

醫學入門

五卷上

#1336609111
v.10

編註醫學入門 五卷上

婦人

經俟

五葉崩漏

六帶下

八癰瘕

胎前

十七臨產

二產後

附胎殺禁忌胎殺所在產中起神
生子所向方散胎衣方

小兒

五觀形

十七察脈

十九五臟形症虛實相乘

胎毒類

三十初生

三死症

三十乳子調護

三十臍風 附胎風

三十撮口

五嚙口

三十臍風

六胎驚夜啼

四天鈞

三十諸驚

四內鈞

四癰氣

七客忤

四天鈞

三十諸驚

四內鈞

四癰氣

六裹蒸

四龜胸龜背

附解顱頸填顱陷滯順

八五軟五硬

四丹毒 附胎瘡

內傷乳食類

五吐瀉

五痺

五諸積

五外感

四諸熱

五痘

五癰

李公林

李如璽

李正義

李清隱

李公遠

李正衡

李公諒

李前頭

李公諒

編註醫學入門外集卷之五

△婦人門

○經候

經病百端血滯枯 婦人以血爲主，天真氣降，壬癸水合腎氣全盛，血脉流行，常以三旬一見，以象月盈則虧，故曰月經。經行與產後一般，若其時餘血未淨，或外被風寒及濕冷暑熱邪氣，或內傷生冷，七情鬱結，爲痰，爲瘀，凝積於中，日血滯，或經止後用力太過，入房太甚，及服食燥熱以致火動，邪氣盛而津血衰，日血枯，良方云：經後被驚，則血氣錯亂妄行，逆於上，則從口鼻而出，逆於身，則水血相搏變爲水腫，恚怒則氣血逆於腰腿心腹背腸手足之間，重痛。經行則發，過期則止，怒極傷肝，則有眩暈嘔血癥瘕血風瘡瘍等病，加之經血滲漏於其間，遂成癰瘍，生瘡淋漓不斷，濕熱相搏，遂爲崩帶，血結於內，變爲癥瘕，此變症百出，不過血滯與枯而已，但血滯亦

有虛熱血枯亦有虛熱故重則經閉不通以滯
滯枯分言輕則經水不調止言虛與熱而已
補虛宜須大黃乾漆之類推陳致新俾舊血消而新血生
也若氣旺血枯起於勞役憂思却宜溫和滋補或兼有瘀
火濕熱尤宜清之涼之每以肉桂為佐者熱則血行也但
不可純服峻藥以耗陰道至於耗氣益血之說雖女科要
法但血爲氣配氣熱則熱氣寒則寒氣升則升氣降則降
氣行則行氣滯則滯如果鬱火氣盛於血者方可單香附
丸散抑氣散常加木香殼榔枳壳以開鬱行氣若氣亂則
調氣令則溫氣虛則補男女一般陽生則陰自長氣衰則
血亦涸豈可專耗其氣耶論者多泥叔和血旺氣衰不知
叔和論肺肝一肝則宜肝旺於肺其實氣血平和有孕故
繼曰兩臟通和但婦人見偏性鄙婢妾志不得伸鬱怒無
時不赴故香附爲女入仙藥經曰邪氣盛則實正氣奪則
氣盛則實正氣奪則虛可不悟諸經行
登則風寒入內以致凝溢者小溫經湯經行適來續得寒
熱就閉不通或寒或暑俱謂之熱入血室小柴胡湯加生

地或黃芩芍藥湯加生地經行過食生冷或外被冷溫以致瘀血凝結者五積散去麻黃加牡丹皮紅花○七情心氣鬱結不行者分心氣飲去羌活半夏桑皮青皮加川芎當歸香附莪木玄胡索有火者更加黃芩或小柴胡調經散單香附丸也有盛實次宣疏氣血盛實經絡過閉或時疫癰者左或燒存性紅花當歸煎湯下枯傷勞食或依泄單大黃膏或馬鞭草取汁熬膏爲內傷飲食勞倦損傷脾胃氣弱體倦發熱腹痛腸鳴飲食減少而不生血者補中益氣湯加川芎生地天花粉有腸鳴月水不來者病在胃胃虛不生血氣宜草薢朴玉錢空心水煎或單蒼朮膏水泄少食者升陽益胃湯無泄少食者二陳湯加白朮黃芪便製香附當歸芍藥牡丹皮麥門冬山楂麥芽因飲食積者更加莪朮枳壳濕瘀胃熱分脾瀆海地位經閉者草薢湯加川芎黃連不可服地黃泥隔故也如用須姜汁炒過○胃熱消渴善食漸瘦津液爲熱燥渴者宜鴻胃散熟四物湯合調胃承氣湯名玉燭散丹合涼膈散名三和散輕者小柴胡湯合四物湯去人參半夏加天花粉○素

虛形瘦口燥善食厚味鬱爲痰火有潮者逍遙散加黃芩
無潮者四物湯加桃仁紅花或加朱蕤英丸大棗肥人多
氣弱有濕痰瘦人多血怯有火脫血入房胞氣竭房氣竭肝腸月事衰少
者腎或多產育過勞劬墮胎及多產育傷血或誤服汗下
賊方或失全太補湯不通木槩只如此虛熱痰氣四症而已不調亦大
血氣流通更有疑滯然後可用紅花當歸散紫葳散通經
丸草經丸之類虛者只用當歸散以通之通後又須養血
益陰使津液流通苟不務氣血充和而惟以毒藥攻逼是
求千金於乞丐必死而後已○以上言經水不通以下言
經水不調前後色何如以期言之對期者性和平足湯狹
不調或只差一二百者亦不爲害以色
言之心主血陰從陽故以色紅為正雖不對期而色正者易調後期來少血不足後期三五日散
爲血虛四物湯加參芪白朮陳皮升麻瘦人只是血少四
物湯倍歸地少加桃仁紅花肥人多瘀二陳湯加南星蒼

术滑石 苕歸香附○來少色和者四物湯點滴欲閉潮須
脉數者去芍加澤蘭葉三倍 苕草少許十味香
附丸內寒血盛來少或日少五六日以一茶上者四物湯加桃仁紅花牡丹皮桑花先期來多血有餘
先期三五日者爲血熱四物湯加參連肥人加瘦藥先十
數日者血氣俱熱也四物湯加黃芩柴胡香附肥人青海
蒼朮丸加黃連白朮來多或日多五六日以上者內熱
血鬱也四物湯加芩朮瘦人有火者固經丸肥人多痰者
清海丸或前或後或多或少或逾月不
或前或後氣血亂至或一月再至當歸散調紅散

單丹淋瀝不斷邪未踈時行時止淋瀝不斷腹中作痛乃
參散寒熱邪氣客於胞中留滯血海外疼也如有積下利不足有所去則愈腑下逆氣上攻脇痛
故而者桃仁散或用當帰四錢乾漆三錢蜜丸服如腰臍
腹痛者生膠散或行或止心痛者失笑散經水適來適斷
往來寒熱者先服小柴胡湯加地黃後以四物湯和之有
月事頻數者四物湯倍方藥加黃芪有經行不止者
四物湯加地榆阿膠荊芥熱者倍黃芩或吞固經丸風熱

色紫甚則黑淡因痰滯濕模糊

色紫者風也黑者熱甚也淡者虛也或痰停水

以混之也如烟塵水如屋漏水如豆汁或帶黃混濁模糊者潔痰也成塊依片色不變者氣滯也或風冷乘之也色變紫黑者血熱也○太緊紫者四物湯加防風白芷荆芥黑者四物湯加芩連香附淡白者古芩歸湯加參芪白芍香附有痰者二陳湯加芎歸如烟塵者二陳湯加秦艽防風蒼术如豆汁者四物湯加芩連成塊者四物湯加香附玄胡索枳壳陳皮隨症選用○通用
琥珀調經丸百子附歸丸墨附丸

外症潮熱內腹痛水

循環纖病不作而有子若兼潮疹重則加之咳血汗虛或渴有肺津則血愈消耗有咳虛則氣往上升濕則津偏於後疼則積結於中是以必先去病而後可以滋血調經就中潮熱疼痛尤爲婦女常病蓋血滯積入骨髓便爲骨蒸血滯積瘀於中與日生新血相搏則爲疼痛血枯不能滋養百脉則蒸熱於外血枯胞絡火盛或挾痰氣食積寒冷外邪則爲疼痛○潮熱有時爲內傷爲虛無時爲外感爲實虛者大溫經湯熱者四物湯加柴芩經閉者滋舌血湯骨

蒸者太胡連丸大烏鵲丸五心潮者四物湯加黃連胡黃連無汗者芩茶補心湯有汗者逍遙散經前潮者血虛有滯逍遙散加牡丹皮桃仁玄胡索經後潮者血虛有熱逍遙散去柴胡換地骨皮加生地便炒黃芩此方能加減退熱聖藥有咬加桑白皮貝母桔梗知母麥門冬咳血加生地山楂牡丹皮嘔吐加陳皮半夏旋覆花嘈雜加姜炒黃連或芩連二陳湯尋常潮熱者腎氣丸大造丸減四物湯料加便炒黃芩各一兩四製香附丁斤蜜丸服痛滯經前虛後呼此言腹痛也經事欲行臍腹絞痛者爲血滯一兩痛甚者萬金丸經水臨行時痛者爲氣滯烏藥湯氣滯血瘀者大安胡索散或四物湯加桃仁紅花莪朶玄胡索香附木香發熱加柴芩經水將來陣痛陣止者爲血實四物湯加玄胡索木香黃連香附腰腹痛者內補當歸丸經水將行被風冷相搏銚齶痛者乃寒氣客於血室大溫經湯桂枝桃仁湯經水已來時痛者四物湯加陳皮玄胡索牡丹皮甘草○經後痛者爲血虛八物湯小烏鵲丸歷年血寒積結胞門嘔吐涎唾脣脣痛陰冷徹引腰脊

而痛者酒煮當歸丸太溫經湯。通用水腫經前血腫後
交加地黃丸滋陰百補丸七製香附丸。

經水斷而後腫名曰血分乃瘀血化水閉塞胞門比水腫
更難治但能調其經則水自消小調經散蕎歸丸先浮腫
而後經水不通名曰水分乃脾不能制血與水并浮肌肉
爲之虛腫紅楂丸通用腎氣丸水分君澤鴻加防己草藤
木通血分君壯丹皮加牛膝紅花有經閉脚腫者桑皮散
血風身痛瘻皮膚血風乃氣風寒身體壓節痛者大青葉散
經閉身痛澀澀陰虛濕熱甚也四物湯加蒼朮陳皮牛膝
甘草水煎頻服間用蒼朮丸加蒼耳白芍經先期者蒼朮
丸加蒼耳白芍龜板金毛狗脊經後期者蒼朮皮膚搔
痒者四物湯加荆芥或古方荆丸肌肉頑麻者烏頭丸上
攻頭目暉劄者單蒼耳散頭項脊痛者柴胡調經湯頭身
痛寒熱咳嗽怔悸一功難症人參荆芥散素
虛者金丹史國公浸酒方胎前產後皆同養胃通心真
要法經日二陽之病發心脾蓋衝爲血海任主胞胎二脉
走於胞內爲經絡之海與手太陽小腸手少陰心爲

表裏主上爲乳汁下爲滑水月水乃經絡之餘衝任氣盛則血脈而下憂思耗傷心血以致火炎血不歸肝而出納之用已竭母念子虛脾亦不磨而食少食少則肺金失養水絕生化之源而經閉不調治者須知心爲氣血之主心氣鬱結者宜調心血通心經而血自行脾胃爲氣血之運飲食勞倦損其中氣以血少不行或行之間斷者只宜平胃散四君子湯之類補養脾胃而氣血自生自運乃標本兼治法之良者也室处扶陰抑寡居女子十四衝任盛而月事下必近三十二方可匹配可見陰氣之難成也或恣食鹹酸煎炒熟燥以致氣血上壅不通者紅花當帰散威蕤散單大黃膏如逾年未瘳或年未及而思男傷心血久火脾肺熱腎枯而血閉成瘍者十分分難治宜四物湯加黃芩柴胡或逍遙散加山梔芩連以養血來血降火或腎氣丸加子芩紅花養陰柏子丸亦好因怒逆者四製香附丸加黃芩生地因驚者抱膝仰視經絕不通者尾核散○寡婦鬱悶百端或暴失不能頓忘或門戶不能支持或望子孫昌盛心火無時不起加之飲食厚味遂成痰火其症惡風體倦乍寒乍熱面赤心煩或時自

汗、肝脉弦長、當抑肝之陰氣、柴胡抑肝湯、抑陰地黃丸、越
婢丸、如貧苦淡食者、四製香附丸主之、有_二、每日上午補思
昏憒、怕見明處、惡聞入語、至午後方可、及頭昏腹痛驚惕、
稍涉勞勤、與月經來時其症尤劇、此不得遂志之故也、宜_二
清神養榮四物湯、加入參芪、神陳皮柴胡羌活甘草香附
有_二、與鬼交通者、由神不守舍、或時獨笑、或疽脉遲伏、或如
雀啄、不知度數、顏色不變者、宜_二、恭神羌活蔓荆子防風
薏苡仁黃芪五味子麥門冬石菖蒲黃芩甘草水煎服

○崩漏

崩漏有虛亦有熱、熱則流通、虛滯泄、血熱則流虛則滯、
謂之崩中、有五色以應五臟、虛多房勞挾火邪、經行犯
後過度、損傷衝任、氣血俱虛、不能制約經血、忽然暴下、宜_二
大補氣血、大溫經湯、氣虛者、四物湯加參芪、血虛者、四物
湯加膠艾炒乾姜爻、不止者、五子附歸丸、墨附丸、虛寒腫
腹冷痛者、伏龍所散、一切虛症、內炎散、虛火涼血地黃湯、

生地 李連湯 蒲陰丸 久者
當歸 龍骨丸 大小烏鵲丸 热只飲食不調節 有因膏染原
下流於腎與相火合爲濕熱迫經下漏其色紫黑腐臭宜
解毒四物湯 泰血地黃湯 膠艾四物湯 加黃芩 或單芩心
火 四物坎離丸 固經丸 有因飲食失節火乘脾胃下陷
顏容似無病者外見脾困倦煩熱不卧等症經水不時暴
至或適交道只宜養胃脾胃加以鎮墜心火
之藥補陰漏陽自止 补陽裏經湯 补陽裏經湯 或因四氣
苦相侵 子宮爲四氣相搏則血亦難停大槻風冷搏動者
五橫散 去麻黃入醋煎服或不換金正氣散加川
芎官桂或四物湯加荆芥 寒冷所乘及年老久崩者伏
龍肝散 加附子鹿茸阿膠蒲黃糯米糊丸服已暑月單芩
霜 濕者升陽除濕湯 或爲悲憂心痛切 悲哀甚則胞絡
心火或益元散加百草 心火或益元散加百草
氣內動發則心下崩數溲血也宜補益散四製香附丸烏
藥湯 古方歸丸 夢遺因先富後貧先順後逆心事不足
鬱火旺於血脉之中宜四物湯加香附白朮各一錢地榆
黃芩各參各五分升麻二分甚者加棕櫚灰酒調服○心

痛甚者名殺血心痛小產後血過多心痛勢急須宜止且
者亦同用烏賊魚墨炒爲末醋湯調服

行經日陰據陽謂之崩言屬熟者多也崩乃經血錯亂不行循故道淖盜妄行蹶止便有積凝成窠臼不止又恐昏暈必先服五靈脂末一錢其性能行能止然後分服熱用調和氣血之藥一二貼後耳服單五靈脂散去故生新血更不止烏絲帽散亦可散左黑神散單夏枯草膏有火者周經丸虛者女金丹養胃安心還舊血血崩止後宜四物湯加炒乾姜調之氣弱加參芪有聲血加香附炮火加芩連少許更服大宜丸四物湯以還舊血兜致孤陽防其再發如脾胃氣弱者補中益氣湯心神不安者寧神膏滋陰寧神湯此疾有心血不足者有心火亢甚者若不早治變爲白濁白澀血枯發熱不可治矣

○帶下

帶下赤白皆濕熱腰腹痛甚濕熱結

經日小腹窪熱溲出白液窪若濕熱屈抑

凝滯_{スル}結_{スル}於任脈_ニ自胞上而過帶脈_ニ出於大小腸_之分_ノ淋瀝_ヲ
以_テ下_ル故日帶下_也赤屬血_也白屬氣_也其症頭目眩口苦舌乾
咽嗌大便或閉或溏小便澁皆熱症也如赤白痢濁下般
但不痛耳間有痛者濕熱拂鬱甚則肝腹引痛婦人眼食
燥熱_ニ行乘戾以致肝旺脾虧而生溫熱熱則流通古人
有用瀉水丸_ニ正_テ之繼以淡劑滲之或苦練丸大女胡索散
調_{ハシテ}之如膚腹痛者暫以辛溫開瀉如天_仁溫經湯補經固真湯龜柏姜_ニ施丸是也熟多瘦婦必潮煩
瘦人多熱脉數外症潮煩乃陰虛火盛也芩柏樗皮丸帶
不止者用地骨皮一兩牛地五兩酒十盞煎至三盞分三
次服或白芷散草薢益母丸○白帶兼痛風者二陳湯加蒼
柏南星牛膝川芎兼頭風鼻涕者蒼柏辛苦散兼七情者
側柏樗皮丸

濕勝肥黃痰作孽

肥人多濕身黃脾緩陰戶如水

或痛白帶升陽燥濕湯四炒固

或癰半飽凍液下數丸候鬱積開眼茶芍藥丸○通用五

物

苓散合四物湯或單樗白皮炒爲末酒糊丸血虛加四物

湯氣虛加參术陳皮火動加黃柏滑石加龍骨赤芍脂性燥加黃連腹痛加乾姜間有虛寒帶臭

腥陰中冷痛何曾歇

虛因月水淋瀝不已或崩中暴下或產後去血過多以致陰虧陽竭榮氣

不升經脈凝泣衛氣下陷精氣累滯於下焦蘊積而成白滑如涕下流腥臭若黃芩建中湯去桂加當歸水煎吞苦

練丸

父不止腑腹引陰冷痛者東垣

固真丸

有火者

補益固真湯大烏鵲丸常用氣虛四君子湯血虛四物湯

有火

加黃柏有寒加桂附○寒始因亡血復亡其陽陽氣虛極帶下脾臭多悲不樂附桂湯腹痛陰冷者四物湯加

桂附常用酒煮當歸丸小尊

鷄丸

益母丸琥珀調經丸外感風邪傳各經

風邪入於

胞門或中

經脉

流傳臟腑若傷肝經青如泥色心經赤如紅津肺經

白形如涕脾經黃如爛爪腎經黑如動血宜胃熱湯或五

積散去麻黃主之

通用單地榆散

一種白澀思慮切

思想無窮所願不得意澀於外入房大甚

發爲筋痙攣又爲白淫謂白物淫如白精之狀不可誤作白

帶過服熟藥又有日夜流津如清米泔或如麴膠者謂之

白崩與白疕大同。多憂思過度所致。誠難治療。宜平補鎮心丹。因思傷脾胃者。四七湯下。白丸子。或歸脾湯。痞悶少食者。沈香降氣湯。因勞傷腎氣。心腎不交者。金鎖正元丹。小兒。孫子丸。威喜丸。疏苓丸。室女胎產法相同。室女經水初來。一時驚悸。或浴以冷水。或當風取涼。故經水止而卽患帶下。宜琥珀硃砂丸。足孕婦帶下全。是濕熱宜芩桂。橘皮丸。平時陰陽過多。及產後亡血下虛。風邪乘虛。入於胞經。宜暖宮丸。加姜附。吳萸。或黃芩。桂枝湯去桂加當歸。水煎吞。其線丸。補衛調脾。循故轍。提。如升陽調經湯。或用芩桂。加伏龍肝散。白芷散。然暫止而終不止者。蓋衛司開闔而爲榮血之主。脾胃爲血海。水波之會。衛氣與胃氣俱虛。則血液無所約制。是以古方有用桂枝湯。加附子。以固衛氣者。四君子湯。加草菓子。香木香。以燥水健脾者。或用理中丸。湯加陳皮半夏。或草薢半夏丸。用芎歸煎湯。下。或補中益氣湯。平胃散。皆補衛。厚脾。使氣血自循故轍。而不專於收斂之也。

○癰瘕與男子積聚，俗參看。

癰瘕冷熱都是癥，或因食積或鬱怒。癥者堅而不移，痕者緩而能移。七瘕八瘕，紅亦不詳。雖有蠅蚊鱉肉髮米等名偶，因食物相感假血而成形耳。痕比癰稍輕，其為病所起異於男子者，皆由產後及經水行時，或飲食以致脾虛與臟氣相結，或七情氣鬱生痰，皆必挾瘀血而後成形。要知癰瘕，察癰有痕，腸覃有食癥，血癥有血痕，種種不一。盡皆痞塊之異名耳。經云：大腸移熱於小腸，小腸移熱於大腸，兩熱相搏，則血溢而為伏痕。事不利以此推之，癰瘕皆有熱者，蓋瘀血亦有熱燥逼成，況陽氣恣火蘊聚，飲食濕熱怫鬱結成，未可專以寒冷論也。太極虛冷者，內散琥珀丸溫，自先熱者消瘰丸、連翹丸外貼聖膏，神妙阿魏散之，不能愈者，猪肝丸、玄明粉下之，或桂枝桃仁湯加桃仁非殊甚者，加蜀葵根入玄明粉下之，或桂枝桃仁湯外以韭菜搗餅熨，痛處或萬痛丸、桃皮散（食積三棱煎保和丸、紅花散、白米葛蒲散益氣湯、熱者大承氣湯加

黃連方藥川芎乾姜芍草或單黃連丸小調中湯加貝母
姜汁糊丸服○鬱氣白芩散蟠桃散七製香膏丸當歸龍

奮丸○痰飲潤下丸或二陳湯加香附枳壳桔梗芩蘇食積者白芥丸海石丸腹痛經閉如懷胎

面黃寒熱夢無數癥瘕得冷則發腹痛支滿脅脇腰背相
氣甚盛令人恍惚夜多異夢寒熱往來四肢不舉陰中生
瘡甚者小便淋瀝或兼帶下小腹重痛面色黃黑入於子
臟則絕產入於胞絡則經閉宜人參荆芥散小溫經湯逍
遙散通經丸古瘧丸選用○血與氣併心腹痛連腰脇
背膂甚則搐搦經候不調謂之血氣交阻索散手拈散失
先經散典故漆丸數症因痰瘀氣積者臍上諸方通用

癰病治頗相同瘻者在腹內近臍左右各有二條筋脈急
在兩肋之間有時而痛名曰痃癖者偏僻和飲食停滯冷氣相搏而成亦得冷則發腹脹不食亦可

懶紅丸子猪肝丸小鷄丸葱散腸覃可按血自通大腸
乃寒氣客於大腸與胃相搏大

腸爲肺傳送肺主氣氣得熱則行得冷則凝凝則清氣散而濁氣結而爲瘕覃延日久不已。瘍肉乃生始姤鷄矢久而血未病也宜二陳湯加香附以開之或香粉丸石炭塞胞經無路。女子癥瘕疝氣發則腹痛逆氣上衝乃胞中傷損瘀血結成久則堅硬如石塞於子門大如懷胎月事不下乃先感寒氣而後血壅不流所致血瘕石燕丸氣血痰散聚湯疝瘕麻香丹古硝黃土膏石瘕丸見腹舟主之或通經丸加紅花尤妙血鹽氣蠱堅如石水鹽腫滿俱難治。蠱者三食血之象卽癥瘕之甚者肚腹急硬如石腫滿如水乃瘀結胞門或產後爲水與血搏通用四香散千金桃仁煎內消散。蛔蟲者大腹皮飲投之謀男斜腫張類調氣破血漸消除靈者還宜補脾胃善治癥瘕者調其氣而破其血消其食施以傷元氣寧扶脾正氣待其自化此開營正元之由也愈後宜大小烏鵲丸八珍湯交加散交加地黃丸調。

之。凡攻擊之藥，病重，病受病輕，胃氣受之而傷矣。
或云待塊消盡而後補養，則胃氣之存也幾希。

○胎前

充

胎前清熱與養血。婦人無病月事時下，乃能受孕。氣血克不克，偶然受孕，氣血不足，榮養其胎，宜預服八珍湯補養，氣血以防之，免其墮墮。或原有熱而後受孕，或孕後挾熱，及七情勞役，動火輕則胎動不安，重則遇三五七陽月必墮。火能消物故也。宜安胎丸常服以清其熱。熱清則血循經，而不妄行，所以養胎也。謬云：胎前不宜熱，良有以哉。月分依經善調燮，多少虛實不調，則胎孕不安。依經調之，一足厥陰二少陽。夫人之有兒，隨胎患大忌，男女交合，血室方開，父之精潮適至，陰幕既翕，布袋絞紐而精血乘沖氣自然旋轉不息，如蠅蠅之湊糞吞嚥含受，成一團圓璇璣，九日一息，不停然。後陰陽大定，玄黃相包，外似蘿絲瑪瑙，其中自然匯成一竅，空洞虛圓，與鷄子黃中丁穴。

相似而團圓之外氣自凝結爲胞衣初薄漸厚如彼米飲
豆漿面上自結平皮中竅日生從無入有精血日化從有
入無九日之後次九又九凡二十七日卽成一月之數竅
自然凝成一粒如露珠然乃太極動而生陽天上生水謂
之胚足厥陰脉所主也此月經閉無潮無痛飲食稍異平
日不可觸犯及輕率服藥○又三九二十七日卽二月數
此露珠變成赤色如桃花瓣子乃太極靜而生陰地二生
火謂之脾足少陽脉所主也此月腹中或動或不動猶可
猶疑若吐逆思酸名曰惡阻有孕明矣或偏嗜一物乃一
臟之虛如愛酸物乃肝臟止能養胎而虛也二三箇月間
忽心墮痛不安者用當歸三錢
阿膠牛黃各二錢葱四莖煎眼三四胞絡三焦訣又三九
日卽三月數百日間變成男女形影如清鼻涕中有白絨
相似以成人形鼻與雌雄二器先就分明其諸全體隱然
可悉斯謂之胎乃太極之乾道成男坤道成女手厥陰脉
相火所主胎最易動古方木湯或爲丸服最妙如無惡
阻等症胎有可疑者用驗胎法以川芎爲末一錢五更艾
湯調服服後腹中不覺動若則爲經病如覺微動者則爲

百孕或因驚恐墜墮胎氣不和轉動不能勝腹疼者溫酒調下二錢加當歸尤妙如胎不安及腰背痛不可忍者古桂續丸○四月男女已分始受水精以成血脉形像具六腑順成手少陽脈所主多心腹脹脹飲食難消甚者用平胃散換白术加香附烏藥大腹皮如因驚恐動胎下墜小腹痛引腰脇小便疼痛下血者安胎當歸湯四五箇月忽心腹疼痛者用大棗十四枚炒黑鹽一錢燒赤爲末取二撮酒調服之立愈五脾六胃七肺金五月始受火精以成陰陽之氣筋骨四肢已成毛髮始生足太陰脉所主○六月始受金精以成筋口目皆成足陽明脉所主五六月胎不安者安胎散固胎飲選用○七月始受木精以成骨皮毛已成遊其魂能動左手手太陰脉所主如胎氣不安常處者亦名阻病宜旋覆花散形體漸長九竅皆成遊其魄能動右手手陽明脉所主如胎不安者单砂仁炒爲末米飲下止痛行氣甚捷但非施胎肥大者東臍丸八九箇月內不可多服九腎十膀神氣完以成皮毛百節

畢備三轉其身足少陰脉所主○十月受氣足五臟六腑
齊通納天地氣於丹田使關節人神皆備足太陽脉所主
惟手少陰太陽經無所專主者以君主之官無爲而已此
兩月素難產者達生散素肥盛及奉養安逸大過者松葉
散素怯弱者益氣救生散半產須防三七月半產多在三五箇月及七
墮則下次必延期復然凡半產後須多服養氣血固胎元
之藥以補其虛損下次有胎先於兩箇月半後卽服清熱
安胎藥數貼以防三月之墮至四箇半月後再服八九貼
防過五月又至六箇半月後再服五十貼以防七月及至
九箇月可保無虞○間有感傷并雜症姪孕傷寒詳見二三卷○尋常
去半夏熟服令肌體微潤而已風熱甚者雙解散去硝黃
麻黃石羔○感寒創漏欲嘔苦腹滿痛大使清潔參蘇散
散去半夏加吳萸阿膠○感暑肢膚煩渴尿赤驚惕嘔吐
膝下苦急者香薷散合古芩术湯或十味香薷散○感寒
腹脹身重者平胃散泄者二白湯加砂仁厚朴蒼术內熱
加黃芩○內傷中積氣滯不行者紫蘇飲○內傷勞役以

致小腹常墜甚則子宮墜出者氣陷也補中益氣湯如因房勞者八物湯加酒炒黃芪爲君防風升麻爲使內傷飲食留膈滿痛者平胃散換自术加山楂麥芽黃連內傷姜椒熱酒腥膻炙燒以致胎熱令母兩自失明頭痛腮腫項強者消風散或四物湯加芩連荆防內傷生冷米血或外又感寒以致胎冷不轉胎腹絞痛腸嚙泄瀉者宜從權以理中湯之劑治之泄甚加木香調子陳皮白芍栗米中病即止○因感傷以致胎虛寒者八物湯加吳萸阿膠湯原謂風冷傷於子臟而墜者此類間亦有之非常法也○雜病與男子一同但孕婦服藥禁忌不一犯則不動胎如女子瘡熱多清脾散去半夏寒多入參養胃湯去半夏爻不愈者勝金丹截之胎痢熱者古方木湯黃芩湯虛者胃風湯香薷丸傷冷瘡痢交作者醒脾飲子胎驚心中怔忡寐卧不宜熱者殊被安神丸虛者定志丸餘可類推調治須知三禁法婦人天癸未行屬少陽天癸已行屬厥陰是祖化之源也治無犯胃氣及上二焦爲三禁不可汙下利小便是也汙則痞滿下則傷肺利小便則亡津液舊以

四物湯爲主，如傷寒各經加減，法例莫若。外感時氣從四物湯合小柴胡湯、陰症四物湯合理。中湯吉苓术湯、傷寒

最妙。雜病四物湯、四君子湯、二陳湯加減，間有服毒藥而致胎動者，乃病邪重，胎元實也。豈可視為常法。且陰陽種而後有胎，凡胎家有病亦不必太多也。經曰：婦人重身，毒之有故無殞。然衰其大半而止。如陰陽調和者不可妄服藥餌。三五月前一毫辛散滑利禁用。七八月間偶有秘結，乃取滑利，又當審其素慣墮胎及難產而斟酌之。

胎動心腹腰作疼甚，則下血如經行。或因七情氣不順，或

因外感風寒凝衝任。

受胎不堅，或因驚恐，或因喜怒不常，或因冷攻入陰戶，以致胎動，而母心腹作痛甚，則腰痛下血。當安胎而母自定。

○胎動因七情氣逆，心腹脹滿者，安胎飲加柴胡。

蘇飲。因外感發熱頭痛嘔逆，心腹脹滿者，安胎飲加柴胡大腹皮。氣血虛者，安胎飲倍參术。虛熱者，固胎飲加柴胡服。安胎藥不止者，須辨寒熱虛實寒者，理中湯加砂仁香附。熱者，黃芩湯。血虛胎痛者，四物湯或平胃散加蘇益煎。

湯吞二、宣丸氣虛痛者四君子湯加芍藥當歸氣實心腹
脹痛者用香附枳壳等分爲末空心白湯下。○心痛寒者
艾葉小茴川練等分空心水煎或草豆蔻丸熟者二、陳湯
去半更加山梔黃芩。○心腹痛素有冷氣腹痛衝心如刀
刺者四物湯去地黃加茯苓厚朴人參吳萸桔梗枳壳甘
草水煎服心腹太痛氣欲絕者古方歸陽加茯苓厚朴等
分水煎服單方用鯉魚如食治入大棗十四枚炒鹽一錢
酒少許煮汁飲之不飲酒者用鯉魚和粳米姜葱煮粥十
日一下食善能護胎長胎。○腰痛最爲緊急酸痛者必發產
也因七情者紫蘇飲加杜仲續斷因悶剎若用破故紙二
錢爲末胡桃肉一箇研勻空心酒調服。素虛痛者青娥丸
腰痛如折不能轉側者用鹿角五錢冰煅酒淬再煅丹淬
以碎爲度研末酒調服。○胎動下血者膠艾芎歸湯或加
砂仁秦艽卷柏桑螵蛸桑寄生杜仲下血腹痛難忍或下
黃芩如漆如豆汁者用野蕷根金銀花根各五錢水酒或
各一盞煎服下血產門痛者用單黃連末一錢酒調服或
各一盞煎服下血產門痛者用單黃連末一錢酒調服或
因母病或壓墜有因母病以致胎動者祖治母病而胎自
安矣如母有宿疾而胎不旺者長胎白朮

服

丸有羸瘦挾癆氣血枯竭胎終不可保者用牛膝四分瞿
麥桂心瓣瓜各二分爲末空心溫酒調服下之免害其母
單方用紅酒麴五兩漬酒十盞煎沸去渣分五服隔宿勿食次早再服其子如糜令母肥盛無疾或麥芽神麴並
尋常古草歸湯最妙孕婦或從高墜下車物所壓觸動胎元心腹痛甚下血者用砂仁炒焦爲末熱酒盞
湯艾湯皆可調服覺腹中熱其胎即安胎家無所鍼不治功同
血總安寧葱白或乾生姜少許熟加天花粉寒熱加柴胡
通用古芩木湯加阿膠風邪加生姜豆豉寒加
項強加葱白熟腹痛加芍藥腹脹加厚朴下血加艾葉
地榆腰痛加杜仲驚悸加黃連煩渴加麥門冬烏梅思慮
過加茯神痰喘加旋覆花半夏麴勞役加黃芪氣喘去白
朮加香附便燥加麻子仁素慣難產加枳壳蘇葉素慣墮
胎加杜仲素血虛加芍歸此安胎之聖藥也凡卒有所下
急則一日三五服緩則五日十日一服常服安胎易產故
生男女又無胎毒蓋妊娠脾土運化遲滯則生濕濕則生
熱故用黃芩清熱以養血白术健脾以燥濕安胎丸金匱

煎

當歸散加味養榮丸
皆此方而推之也

胎漏下血腹不痛心腹痛而下血者爲胎動不痛者爲胎漏血多爲熱少爲虛
熟者下血必多內熱依渴者四物湯加白朮芩連益母草
或金匱當歸散加味養榮丸血黑成片者三補丸加香附
白芍血虛來少者古膠艾湯或合四物湯長胎白朮丸
○氣虛者四君子湯加黃芩阿膠因勞役感寒以致氣虛
下血欲墮者芎歸補中湯或下血如月信以致胞軟
予母俱損者用熟地炒乾姜各二錢爲末米飲調服惟有
犯房難救止胎漏亦有肥盛婦人月水當來者或因登廁
廁用灌藥治之反墮惟犯房下血者
乃真漏胎也八物湯加膠艾救之偶然尿血莫糗糊尿
自尿門下血胎漏自尿門下血姪娠尿血屬胞熱者多四
物湯加山楂髮灰半苦賣藥飲亦效因暑者益元散加升
麻煎湯下稍虛者膠艾四物湯久者
用龍骨丁錢蒲黃五錢爲末酒調服

惡心阻食名惡阻

或大吐或嘔吐清水惡聞食臭由子宮經絡絡於胃口故蓬食氣引動精氣衝

上必食吐盡而後精氣乃安亦有悞交合而子宮穢盛者過百日則愈

瘦人多熱肥人痰

陳

湯加竹茹生姜熟加芩連因怒者單黃連丸茯苓煎湯下亦有無陰并氣弱

無陰則樞無火則火者左脉必

弱頭疼全不入食者八物湯合陳湯加枳梗氣弱者四

君子湯加陳皮麥門冬厚朴竹茹日久水漿不入口吐清

水者並加丁香惡聞食氣或因胎動別症兼

三內簡月病惡阻者多因

胎動不安或兼腰腹疼痛者保胎飲葉瘡口中無味及

曾傷風冷者醒脾飲半升傷食者二

陳湯加砂仁香附或

單白朮爲丸或單砂仁爲末米飲下甚者紅丸子極効

子煩燥悶亂心神火盛剋肺好生頭

孕心煩燥謂之

月間指火用事或應天令五六月間君火大行俱能乘肺以致煩燥胎動不安大抵相火盛者單知母爲末蜜丸

丸

實大，每三丸酒下。日月未足，欲產及難產者亦効。君火盛者，單黃丸。心神不寧者，朱砂安神丸。煩甚恐傷胎者，單白散。功不可。或有停痰，胃膈滯亦令煩躁，不宜久。或有停以單煩藥治之，亦令煩燥。胎動不安者，用茯苓防風麥門冬、黃芩等分，竹葉燒半水煎入竹瀝，謂服。

子懸心腹脹滿痛，胎氣凌心相火鬪。

姪孕四五箇月以來，相火養胎以致胎熱

氣逆，凌心，胃膈脹滿，疼痛謂之子懸。宜紫蘇飲，有節心腹脹滿甚者，加莪术及丁香少許，不食者古本木湯倍白朮，加芍藥，甚則悶絕，欲傷人而死。飲連進枚之誤藥子死。

不能動，寒手，指唇俱青全以舌爲症驗。古本歸陽救之。

胎水遍身虛腫浮，姪孕經血閉以養胎，胎中挾水濕與血腫，名曰胎水，又曰子腫，多五六箇月有之。原因頑渴引飲太過，或泄瀉損傷脾胃，脾虛不能制水，血化爲水所制，宜

五皮散倍加白术爲君氣喘小便不利者防己散
濕熱盛者單山梔炒爲末米飲調服或單此梔丸腹大異

常亦堪憂

妊娠五六箇月腹大異常高過心胸氣逆不安

若不早治必然其子手足軟短

形體殘疾或生下即死子母難保宜鯉魚湯

至腫消水散爲度仍常煮鯉魚粥食之

又有脚腫或

出水胞漿大盛故下流

妊娠七八箇月以來兩脚浮腫頭面不腫乃胞漿水濕下流微腫者

易產名曰皺脚腫甚者平胃散加木瓜、枳外感者擴散

自腳面腫至膝腿喘悶妨食甚至足指間有黃水出者謂之子氣宜天仙藤散如脚腰腫者腎着湯

者用赤小豆桑白皮等分水煎服重者加商陸

姪孕中風名子癟只因體薄受風寒發則口噤痰涎壅

時昏暈胎難安

體虛受風而傷太陽之經絡後復遇風寒

人時醒時作謂之兒暈又曰子癟又曰瘡甚則角弓反張

小續命湯意重者熟羊角湯輕者四物湯加葛根牡丹皮

秦艽細辛防風竹瀉痰加貝母陳皮茯苓甘草或古勞活
散如中風寒犯觸身體盡寒乍熱胎不安常苦頭眩
痛癲臍下寒時時小便白如米泔或青黃寒慄腰若冷痛
目視瞞瞞者四君子湯去茯苓加當歸厚朴韭白姜煎入
酒謂服○不醒不

事若革荆茶散

子淋、濁澁、膀胱熱

姪孕飲食積熱膀胱以致小便閉澁又謂之子瀆宜古勞湯加木通麥門冬

人參甘草燈心

臨月加滑石爲君熱甚者五林散

○原因

房勞內傷胞門衛任虛者

四君子湯合六君子湯

或腎氣丸

甚則大小便閉結

○臟腑積熱大便不通者用赤茯苓枳壳等分大腹皮甘草歲半葱白煎服或四

物湯加黃芩厚朴枳壳○胞熱小便不通碧重惡

寒頭眩者用冬葵子赤茯苓等分爲末米飲調服

轉脬、弱

物湯加黃芩厚朴枳壳○胞熱小便不通多栗弱

閉痛難當

性急厚味者有之○姪孕脅爲胎盤展在二邊

轉脬若脅緊轉戾、扭升舉其胎、脅轉水道自通宜四物湯合六君子湯去茯苓探吐以提之無孕者亦同不可專用滑滲之

藥○有素肥盛忽瘦兩尺，脈絕者，陰虛也。腎氣丸主之甚。
者，冬葵子赤茯苓赤芍等分水煎入鬱灰少許。○有熱者，
古本木湯合益元散服之。○一法將妊娠倒竪起其胎不
墜其溺自出。○產後有脬轉或脬出者，搗葱白於膍上灸
之立効。如欲服藥，與胎前大同。遺尿赤白宜分別。妊娠遺尿古方用白薇
酒調服然亦有虛有熱，赤者屬熱，白者屬虛，安胎飲或鷄膽莖散。
茱萸五味子少許，白者屬虛，安胎飲或鷄膽莖散。
子癥腹鳴，自笑悲姪孕三五箇月以來，忽失音不語，若胞
繫分塊，後卽自能言。○腹中作鐘鳴或哭者，多年空房下，
漏火中土爲末，酒下或乾噙之卽止。○腹中兒啼者，黃連
前濃汁呷之，或青黛亦好。○有臘燭悲傷，慘瘞，嘔下者，大
麥甘草棗煎服。○有自哭自笑者，紅棗燒存性，半粒，調服。
發痘動胎命必絕。胎前患痘，用峻藥動胎。
靈去邪保胎真口訣。孕婦脾土不運而生濕，濕生痰，痰生
熱，熱生風，如子腫，濕也，惡阻，痰也。子

煩子沫熟也子癟風也子懸氣也轉脬濕也清熱滲濕消
痰順氣躁風補虛或兼雜症去邪保胎二法並行子母俱
安飲食禁忌亦須知鷄肉合糯米食令子生寸白虫食大
廩餌蒼食兔肉令子缺唇食羊肝令子多舌食鱉肉令子
項短縮頭鳴子同桑椹食令子倒生心寒鮮魚同田鷄食
金子瘡雀肉同豆醬食令子生雀子斑食螃蟹橫生食
姜芽令子多指食水漿令絕產食雀肉飲酒令子多淫無
能食茨菇消胎氣食驢馬肉過月難產豆醬合雀菜食墮
胎食山羊肉令子多病食鱖鱠無鱗魚難產食諸般菌生
子驚風而疾食雀腦令子患雀目勿妄服湯藥勿妄用針
灸勿過飲酒漿勿壅重登高勝險心有大驚子必賴瘤勿
多瞞卧須時時少步勤和血脉勿勞力過傷使腎氣不足
子必解顱腦破少合衣毋太溫食毋太飽若脾胃不和榮
衛虛損子必羸瘦多病戒之入轉女求男皆古設生男坐女陰陽造化玄
內以斧置孕婦床席下懸弓矢於壁蓋弓矢斧片男予事
也勿令人知此意恐不信者令待鷄抱卯之時以斧置案

下盡是雄鷄故胎教常令見王大人亦此意也更偏雄黃一二兩於孕婦身左或萱花亦可二法皆驗用其一而也○又後有月日時遊胎殺雖不可泥然門一戶床籠實不可輕易移動求嗣者尤宜慎之

○臨產

臨產切不可羌忙十月氣足胎充壯健者忽然腹痛或只腰痛須臾產下何俟於催此易生天然之妙喜服單益母膏兜產後之患中間有體弱性急者腹痛或作或止名弄痛漿水淋瀝來少各試水雖脇腹俱痛發動露頸而腰不痛者切莫倉惶切禁洗母動手於腹上揣摩直待日子已到腹痛陣密破水已後并腰痛眼中加火方可坐草須待兒頭直順且正逼近產門方可用力力一失如坐草太早用力太過產母困倦及至遲滯乃用催生之藥凡難產皆孕後縱慾及驕恣全不運動又食生冷硬物凝滯或矮石丸子交骨不開或腹大甚胎水未盡或臨產閉精之人驚恐產婦恐則精快精快則上焦閉閉則氣還下焦脹而不行紫蘇飲最妙氣實者瘦胎枳甘散氣弱

洗母產時イテニミタサイ
日本ノウヤトモ
又洗娘老トリアケハコモ
アリ

者達一
生散活血安胎未破漿湯以活其血或漿水已破而少痛
雖痛而不宜安胎飲或達生散以固胎元切不可輕用
峻藥徒滲水道反傷胎氣而產愈難產母亦聽其眠食自
如但不可過
睡過飽耳破漿已久猶難下黑神散血虛者古芳歸陽
下名芳歸黑神散氣弱者四君子湯下名四君子黑神散橫
逆側產每加麝一釐此時如舟坐船上須瀉水而後可通
服此藥後外用葱二斤搗爛鋪於小腹上用急
水灘頭沙一斗炒熟絳布狀於葱上輕輕畧揉滑利迅速
要相當催生有露項頑正而生猶遲滯者恐外感風冷寒
或三退六一散冬月凍產則血凝滯常令房中火燒宜催
生五積散有水道乾澀不能下及服黑神濫藥又多者用
清油白蜜等分猪肝煮汁調服或六一散七錢加葵子五
錢爲末每一錢熱服有產難日久木乾及觸犯惡氣心煩
燥悶散鬼胎丸腰痛心煩者用人參乳香各二錢辰砂五
分蜜末鷄子清調姜汁化開冷服已上正產難之法

已下橫逆橫生露手逆露足徐徐推上任洗娘

横者兒先
露手原因

腹痛兒身未轉產母用力一逼遂至橫來當令產母安然仰卧洗母輕手徐徐推兒稍上漸漸以中指摩其肩推上又攀其足而正之服苦歸黑神散固血生血猶待兒身正直且順臨門服阿膠滑石葵子爲末溫酒入蜜攏勺服之然後方可用力送下○逆若先露其足因母氣之關健不牢用力太早致兒逆來當令產母安然仰卧洗母徐徐推足入去分毫不得驚恐服苦歸黑神散固血活血候兒自順若經夕不生却令洗母輕緩用手推足全就一邊直上令兒頭一邊漸漸順下多服苦歸等藥直待兒生轉門路正當然後用二尺散調服方可用力送下坐產露臀高攀手坐者先露其臀當高處牢繫手巾丁條全產母以手攀之服固血藥輕輕不足良久兒即順生

喫面貼頂枚盤腸盤腸者小腸先出急用熟水浸軟舊布水七分碗調停喫產母面每一下喫令一縮三喫三縮當收盡爲度又以如意膏貼產母頭頑中心腸上卽拭去內裏

服芳歸參酉太補之藥加升麻防風以提之未有不收者
又，有久而爲風吹乾不能收者用磨刀水少許火上溫過
以潤其腸後用好磁石煎

湯一小盞服之其腸自收

碍產兒肩膝帶絆

番轉膝帶絆

住其肩雖露正項而不能生當含產母仰洗母輕輕推
兒背上徐徐引手以中指托兒頭下其脣豐服固血藥
仍須候兒身正順方可用力送下斯

露額側來墜眼尻

產母用力一下逼以致

兒頭偏墜左腿忽偏墜右腿或露左額角或露右額角兒

頭偏墜

一畔多服苦帰黑紳散令產母仰卧洗母輕輕推

兒近上以手正其頭直向人門然後用力送下若是兒項

後骨偏墜

敷過郎金兒只露額當含洗母以綿文炙令溫

煖用手於敍道外畔輕輕推兒頭上而正之服催生藥

後卽含產母用力送下此非洗母輕手巧妙不能傷產

薰然口翻噤

當產設用催生峻藥傷母氣血急用安胎湯

盡皆倉惶用力太早之過或因子欲生時兒枕先破敗血

裹住宜蓋頭

一兩以青布包了燒存性入麝香一錢爲末

用糞鑊產紅淬酒調服。一盞含卒，只以新汲水磨京墨服之。墨水晏兒身出，或旁歸益油草藥心皆能逐瘀，以開產路。○有坐草之時，暮然目翻口噤，吐沫者，霍霍靈丹。○有矮石女子交骨不開難產者，龜壳散或古勞歸湯。○通用無憂散來甦胎死母舌黑非常外症指甲青黑，脹悶不食口散兔腦丸。胎死母舌黑非常外症指甲青黑，脹悶不食口錢水酒煎服。其胎化成血水而下，便閉脉實器大黃備急丸。或單鹿角爲末，葱豉煎湯調服，昏沉脉微者，養正丹、濃煎乳香湯。下二至一百廿丸，血乾或有寒者，四物湯。下五桂香丸氣弱者，催生五積散加麝一丁，雙胎一死一活者，用奪命丸。外用聖膏貼足心仍服催生藥及通關散吹鼻，卽下胞衣不下，因血脹消瘀和氣信。古方皆因用力太早，產下不能更用力，送出胞衣，停喘急疼痛者危急，將腰帶以少物繫墜，然後截斷，不然則胞上抱心而死，只要產母心安，不可輕信。洗母用左手宜內。

服牛膝湯、催生五積散、或用真血竭爲末酒調服。甚者奪命丹、外用如聖膏貼脚心、昏輩危堪八味黑神散、黑龍丹。

○產後

產後必須先逐瘀。正產體實無病、不藥可也。但難產氣衰、歸陽、加童便一丁半服之。如無童便以淡醋磨墨、一小盤入前湯藥亦好。服藥後且閉目少坐，然後上床仰卧，不得側卧，宜立牕不可他足高枕，厚蓆四壁無風，時以人爲從心，括至膀胱。如此三日，又不可太睡，熟宜頻喚醒，睛置醋炭，或燒乾漆與舊漆器以防血迷血暈。夏日房中不可太熱，亦不可一人多氣盛以致熱過，則氣耗散而不能送血，又不可太飽，時與白粥飲之，加漸一月之內針線勞役，當時不見大害。月後卽成羸勞，手腳及腰腿酸痛，亦不可脫衣洗浴，強起離床太早以致外感，身強角弓反張，名曰癲風。如交合陰陽，令下部終身虛疾，將息一百日以過乃可。須知產後百病皆血虛火盛，瘀血妄行而已矣。厥有內傷飲食外感，則寒熱亦必先逐瘀，補虛爲主，瘀消然。

後堪補助

瘀消後方可行補如左脈弱加補血藥右脈弱加補氣藥如不逐瘀還服參芪甘美停滯之劑

有瘀血攻心

卽死

者食肉

太早亦然

瘀衝

眩暉腹心疼

夫血過多

眼花頭眩

者古勞

歸湯入童便

甚者加炒乾姜人參汗多

加黃芪或

八味黑神散

單五靈脂散返魂丹

田弱血虛發厥倉公

散白薇湯

○臨產用力勞心氣虛

而暉者用入參一兩蘇

木五錢水煎入童便

調服○氣血俱虛火泛上焦

者置者

八物湯合

○陳湯舌白芍

○火虧血上昏暉或拔風邪者

清魂散○被驚者抱膝丸殊妙安神丸

○腹心疼痛全是以

瘀血八味黑神散四味散失效散

有寒熱者當歸鬚散○

虛寒心痛者桂心湯

感寒者理中湯○七情心痛者木

湯○食滯寒熱心腹痛者熟料

五積散加莪术○小腹痛

者名兒枕痛單五靈脂散

或加桃仁醋糊爲丸氣虛四君

子湯下血虛

四物湯下○產門脇下虛痛者大

溫紅湯羊內湯○通用女金丹加味益母丸

血虛火動

寒熱互

產後血虛發熱氣虛

惡寒氣血俱虛發熱惡寒切

不可發表○陰虛血弱者四物湯小熱加芩苓爲

諸病中風，用乾姜爲佐，去血過多，外熱內煩，短氣悶亂者。
夫麻黃發物，蒸乳發熟者，四物湯加參芪白朮天花粉，發
熱麻醉寒，難者補虛陽，產後真正不宜涼也。內傷勞後漸

良癥。產後勞役過度，名曰蓐勞。其症虛羸，乍寒乍熱，臂膊不消時，有咳嗽頭目昏痛，發渴盜汗，寒熱如瘡，臂膊

拘急，宜十全大補湯。去芎加續斷牛膝鱉甲桑寄生桃仁。

爲末，猪腎一對，去脂膜，姜一片，棗三枚，水二盞煎，至一盞入煎，未二錢，家三寸烏梅半箇，荆芥五穗，同水煎空心服。○身痛寒熱者，當歸羊肉湯。腹子湯食滯脾家。

渴，且吐。○凡寒熱有腹痛者，爲瘀血，如腹痛脣齦瀉，必兼

木僵，加神仁。○濕加姜附，人參泄瀉不止，睛腹痛者，理中丸

加肉豆蔻。○挾寒腹痛，腸鳴小便清白，止渴者，四君子湯合

金匱五苓散，加肉豆蔻炒白芍。○挾熱，腸鳴便澁痛，一陣瀉

一陣口渴者，四君子湯合四苓散加酒炒黃連及木通少許，或益元散。○挾濕，身重腹脹者，胃苓湯。○嘔吐因敗血

乘虛，入胃脹滿者，六君子湯加澤蘭葉赤芍，乾生姜，腹脹

胃氣不和者，桔梗半夏陳皮等分姜煎服。脾腫者，云白

湯加乾姜陳皮黃芪滑石甘草飲食成積痞者，內外散。

○霍亂吐瀉煩渴肢冷者，理中湯加陳皮麥門冬姜煎服。

寒熱無時停補中帶表無過度，產後外感離床太早或夜

寒熱似瘧頭疼不歇血虛者，古方歸陽加人參紫蘇乾葛

血氣虛者，補血湯加陳皮乾姜寒熱甚者，熟附玉積散熱

不止者，黃龍湯主之，大體盛發熱惡寒及瘧痢者，小柴胡

湯合四君子四物湯加黃芪名三分散切不可以傷寒治

法，魯謀眼熱藥過多熱症大見久而便閉者，柴胡桂枝湯

或四物湯加大黃芩硝曹服即調補之，產後傷寒，二卷

身痛筋攣虛渴煩因產走動氣血升降失常留體關節筋

脉急引或手足拘挾遍身肢節走痛者，五積散

○趣痛散或餘血不盡流於遍身腰脚關節作痛者，五積散

去麻黃加人參香附小茴桃仁木香等分姜煎服者，生

諸風寒弱筋攣無力者，血風丸或煎服。

○煩渴氣虛者，生

拔散血虛者，四物湯加天花粉麥門冬氣血俱虛者，清頭

駁脚弱飲食無味者用入參二錢麥門冬一錢半熟地七分天花粉三錢芍草五分糯米姜棗煎服○虛煩者用入參麥門冬小麥茯苓各一丁錢竹茹一丁彈丸半夏八分芍草五分姜煎服心虛驚悸者亦宜汗多大便偏閉固產後發熱自汗者古歸因湯甚加白朮防風牡鵝麥門冬熟地茯苓芍草或黃芪建中湯自汗兼腫滿者太調經散自汗肢體疼痛者當帰羊肉湯○發熱盜汗者用猪腰子一枝糯米半合葱白二莖煮米熟取清汁一盞八人參當歸各一丁錢煎服○大使閉者古方歸陽湯加防風枳壳甘草閑滿者麻子仁先或蘇麻粥蓋產後去血多則鬱肩臂肩則多汎多汎則大使閉皆血虛也鬱肩即血葷○小便不通腹脹滿者用益填臍中葱白一束切作二指厚放益上以文火炙之熱氣入腹卽通熱者六三丁散加檳榔枳壳木通麻子仁葵子水煎服不語敗血濕痰迷產後敗血停蓄上干於心心氣閉塞舌淡不能言使然者急料五積散四味散有臨產服湯藥過多胃虛湯或痰氣鬱端閉目不語者用生白薑末一丁錢熟水調服

乍見鬼神

非邪忤

產後乍見鬼神者

由血虛勞動肝心所致

鬼祟也宜小調經散

加龍膚少許或炒香散加當歸地黃

黃連

○瘀血迷心妄言妄鬼及心虛譖妄皆蟲者入物湯

去芍藥加琥珀柏子仁遠志硃砂金銀煎服甚者黑龍丹

○產後血少怔忡睡卧不寧者十味溫膽湯或寧神補膏定丸

又○有惡露常淋漓或因脾損尤難止

○產後五淋白茅根

敗血淋漓不斷者

烏金散淋久不止四肢之力倦困者牡蠣散

○有生産時

被洗母誤損尿脬以致日夜淋漓者四君子湯加黃芪陳

反挑仁用猪屎脬煮清河任是孽風并腫浮

○產後中風各

煎溫服血虛者加姜歸

日暮風口噤

牙關緊急手足瘺癰及血虛強直壅心眼劄吐瀉欲死者

○有死者

牛荆芥散古荆歸陽血虛勞碌太早風寒乘虛而入者小

續命湯羌活愈風湯如口噤反張涎沫多者交加散或太

黑豆半升炒令烟起以酒二碗洗之入磁器內每用酒半

碗入獨活五錢同煎溫服

○產後敗血停蓄化水循經流四肢浮腫者小調經散

血氣虛者四君子加蒼朮或女金丹血虛若補虛湯步加蒼朮茯苓使水自利忌峻劑攻利
補榮衛產後雜病與男子二下同但常兼補兼逐瘀則病無是也假如月裏病疾惡露未盡者多瘀凝滯腸胃與經後血滯作痢一一向四物湯加桃仁黃連木香主之裏急甚者通玄二八丹○咳嗽多是瘀血入肺古方母散加桃仁杏仁人參茯苓水煎其除以意會之可也惟有鼻角也黃湯救之發喘聲高難救護產後氣喘由榮血暴竭氣無所治之症單人參湯或加蘇木少許救之若敗血停滯脹肺喘者用血竭沒藥等分爲末酒八水調服兼用奪命丹

陰門腫突腸不收產後陰肉兩旁腫痛手足不能伸伸者戶兩旁良久卽愈○因產用方過多陰門突起若四物湯加龍骨末少許連進二服外用草麻子搗爛貼頑少枚卽

去草麻子

產後生腸不收八物湯加防風升麻白芍

用酒炒蕷草爲君外以荆芥藿香樗皮煎湯薰洗上

膜休羞惡

產後下二物如合餅狀有二破者子宮也補中

四物湯加人參調理

○產後下二物如帕約重斤餘者因

臨產勞役或肝癆所致

有稻席不得上者乃肺膜無妨補

中益氣湯去柴胡連翹

二十貼卽收

以致育腹有傷

垂身肉線一條約三四尺長牽引心腹痛

不可忍以手微動之則痛苦欲絕

先服失笑散數貼仍用

生姜三片洗淨搗爛以清油

一千斤拌勻炒令油乾焦爲度

却用熟綿五尺摺作數層方

令穩重婦人輕輕盛起肉線

便之屈曲作二十團納在水道口却用綿袋兜前油

妻乳溫

傳在肉線上薰之覺姜冷又用熨斗火發熱常使

有姜氣如姜氣已過又用新姜加此薰鍛一日一夜其肉線已縮

入一半再用前法越兩日肉線盡入却再服失笑散

古方歸湯調理不可使肉線斷作兩截則不可治矣乳汁

不通血氣虛氣滯塞者戒鬱怒

產後氣血虛弱乳汁少者

金匱

產後氣血虛弱乳汁少者

用鐘乳粉二錢漏盡煎禮

湯調服或用猪懸蹄一隻通草五兩煮汁食或鯉魚木通
煮汁食亦好。○氣滯乳少者漏蘆散氣塞乳少者湯泉散
○無子食乳要消者用麥芽二兩炒爲末四物湯調服卽止。
○凡乳母但覺小水短少卽是病生便須服藥謂垂脾
胃肝腎如不愈者必氣滯且逆也蓋婦人凡事不得專行
多憂思忿怒憂思過則氣結而血亦結分脅過則氣逆而
血亦逆甚則乳硬脇痛煩熱要之女病皆因氣血鬱結所
以古方多用香附砂仁木香檀根青皮枳壳者行氣故也
怪疾乳長尺有餘先賢治法仍詳具乳仲長細小如腸直
過小腹痛不直忍名曰乳癰症用川芎當歸各一斤水
煎濃湯不時溫服耳用二斤逐旋燒烟安在病人面前桌
子下令病人曲身低頭鼻及病乳常吸之烟氣味甚縮
丹用一斤料則瘀血消而乳頭自復矣若更不復舊用華麻
子搗爛貼項上片曉夜卽洗去。

附胎殺禁忌凡胎殺所在不宜修整雖隣家興動孕婦當
避縱不墮胎令兒破形色青體摩竅塞夭頃

胎殺所在

正月在房床，二月在牕戶，三月在門，四月在龜，五月在身床，六月在床倉，七月在碓磨，八月

在廁戶，九月在門房，十月在床房，十一月在爐竈，十二月

在床房子，丑日

在中堂寅卯辰酉日，在竈巳午日，在門上未

申日，在蘿下戌亥日在房已

上禁忌總要全不修理爲高下

房中避神

癸巳甲午己未丙申丁酉日在房內北癸卯日，在房內西申亥乙巳丙午丁未日在房內東大

戊六巳日，在房中庚子辛丑壬寅日，在房內南

酉神所在，是安床換帳致重物於床中，必主墮胎。

生子所向方

子午卯酉日宜西南，寅巳亥日西北，辰戌

藏胎衣方

宜生氣方上正月，子方二月，丑三寅四卯五辰，巳六巳七午八未九申十酉十一戌十二月亥方

死，生氣方直，不便依曆日藏於奏書博士月德方，上忌月空三殺太歲方上俗多置之河中者兆。

婦人

終

小兒門

白露 秋分 寒露

處暑

酉

戊 霜降

立秋 申

太陰

太陽 方廣

玄臺 武臺 風門

大暑 未

日角

太陽

方廣

魚尾

小暑 未

月角

太陽

方廣

池

心火

顙門

髮

際

額

空

印

疊

山根

鼻

頭

命

夏至 午

月角

太陽

方廣

池

芒種

小滿

巳

太陽

方廣

池

立夏

穀雨

辰

太陰

玄臺

武臺

風門

寅

雨水

立春

大寒

小寒

清明 春分

驚蟄

卯

觀形

察兒氣色
肝青心赤脾黃肺白腎黑凡病面無黃色不治
春白夏黑秋赤冬黃者逆先分部位

左頰青龍屬肝應春青爲有餘右頰白虎屬肺應秋白爲不足天庭額高

而離陽紅心熱心火紅主太熱青乃肝風印堂青者人驚

頭紅者三焦積熱印堂至山根紅者心少陽熱小使赤澁山根至鼻柱紅者心胃熱大小使澁地閣額低

而坎陰應夏色腎水承脈色青食時驚或煩燥夜啼黃多白腎虛吐逆紅者腎中氣病兩頤赤者肺熱

鼻在面中應四季准頭脾應唇際紅主渴蛔虫咬心頤者深長惡平湧黑者鴻麻死凡五色赤者皆熱淡白者皆虛

○陳氏五臟驚積冷熱詩曰肝驚起鬱際肝積在食倉肝冷唇青白肝熱正眉當心驚在印堂心積額角荒心冷太陽位心熱而頰裝脾驚正要際脾積唇瓣黃脾冷眉中岳脾熱穴太陽肺驚要際赤肺積要際當肺冷人中見肺熱面頭傍腎驚耳前穴腎積眼胞相腎冷額色紫腎熱赤食倉紅氣見而熱痰壅盛印堂禹心紅色熱痰青色露而驚

風怔悸如燐之黑爲痛中惡逆傳似橘之黃食傷右太陰

文武墓

皆脾虛吐利亦有白乃痺勞爲寒肺氣不利紫爲熱熾變黑者死青遊

口角難醫嵌驚黑掩太陽不治左太陽青驚輕紅色傷寒鼻塞變蒸壯熱黑青乳積右太

陽青驚重紅色風抽眼目黑赤者死紅至太陰者必死黑色瘡者熱強連武臺者漸生變症年壽赤光

肉外有熱蓮文墨者熱強連武臺者漸生變症年壽赤光

平者壽多生膿血山根青黑頻見灾厄必死黑色瘡止赤黑色吐鴻因倦黃色瞿亂紅色夜啼紫色傷飲食朱雀貫於雙瞳火入水鄉瞞瞗熟毒黑暗黃者傷寒危症

青蛇遶於四白肝乘肺部青爲肝風黃乃食積濁痢而帶陽須防咳嗽而拖藍可忌疼痛方殷面青而唇口撮驚風欲發面赤

而目竄視火紅光焰焰外感風寒金黃氣浮浮中藏積滯

乍黃乍白癥積連綿又赤又青風邪癰瘍氣之顛門成坑

紅色驚熱夜啼紅腫驚風瘡熱前顛虛軟母氣血弱後顛不堅父精不實血衰頭毛焦枯黃

者膚熱肉折皮枯若死肝氣眼生眼淚脾冷涎流滯頤正口紅色爲

白主失血青黃驚積青黑者死面白虛浮定腹脹而上喘眉毛頻蹙必腹

痛而多啼久病兩眉紅者夜啼紫色風熱赤紅者死皺者癆疾風氣二池如黃土則

爲不宜風池紅有風瘡將發搐左右兩頰似青黛則爲

氣池紅傷風有熱八裏

客忤黃色瘀實紅主驚風赤者傷寒風門黑主疵而青爲驚紅主

滑吉而皆黯紅中庭天庭同空印堂額角方廣皆命門方瀉方廣光

滑吉而皆黯紅門部位青黑驚風惡候亦忌摸陷手如

數物兮肝風將發將手抱丸頭散死面若塗硃兮心火似炎坐卧夢

分

死

發搐

丸

火

夢

疫風寒之入，伸縮就冷，煩熱之攻，肚大腳小，脾欲困而成
痺，目瞪口張，勢似危而必驚。スイヌア噫五體以頭爲尊，一面惟神
可恃。芒如魚貓眼狀，或兩眼閉而黑睛矇昧者死。或外若
昏困而神藏於內不脫者生。黑珠滴輪睛明者少病。眼白
多，睛珠或黃或小者，稟弱多病。目症內赤者心熱，淡紅者
心虛，熱青者肝熱淺淡者肝虛黃者脾熱無睛光者腎虛白而混者肺熱。况乎聲有輕重之不
同。聲輕者氣也弱也，重濁者痛也風也。高減者熱欲狂也。
聲急者神驚，聲塞者痰聲，戰者寒聲，噎者氣不順喘者
氣促，噴嚏者傷風，驚哭聲流不響者重聲濁。
沈鬱者，痺積如生來不大而哭，聲啾啾者夭啼。有乾濕之
類異，直聲往來而無淚者是痛連聲，不絕而多淚者病之。
初作必先呵欠。スル肝所主也。面赤者風熱，面青者驚風，面黃
者脾虛，多睡者內熱，心神不安者氣熱，聲

壅者

火之大發忽然驚叫

乃火動氣虛必死夜半發

宜卽看之

藜藿

不同於膏粱韋布自殊於紺綸雖由外以識中勿刻舟而

求劍相兒壽夭歌身軟陽痿頭四破膝小膝高肉不就妻稀色脆短聲啼遍體青筋俱不毒死腫臍骨若不成能踞能行能立死膝深色若

性尊持方是人家長命子

○察脈

小兒初生至半歲看額脉週歲以上看虎口三十關男子五歲女人六歲以大指上下滾轉分取

三部診寸一

口二三部脉

額脉三指熱感寒

額前眉上變際下以無名指中指食指三指按之如俱熱感寒邪鼻塞聲粗

俱冷指吐瀉臟不安食指若熱眉中痛無名熱者乳消難

上熱下冷食中熱

食指爲上名指爲下若夾驚名中指詳

司若無名中指熱六
看便是夾驚之候

食指風氣命三關

男左女右以左陽右陰故也然陰陽男

女均有兩手亦當參驗左應心肝右應

肺脾於此變通消息可也故有以左手紅紋似線者脾積兼驚三又者肺熱風痰夜啼

兼驚右手紅紋似線者脾積兼驚三又者肺熱風痰夜啼

病重命關脉紋短小而風關無脉則無病有脉病輕氣關病重命關脉紋短小而

色紅黃外症又輕則無妨若直射三關青黑外症又重者

死五色惟有紅黃安五色紅黃紫青黑由其病盛色能加

變如紅黃之色紅盛作紫紅紫之色

紫盛作青紫青之色青盛作黑青黑之色至於純黑者不治又白色主痔黃而不光者主脾困

淡紅寒熱

在

青驚積深青色或大小曲者四足驚赤色大小曲者水

表火飛禽驚紅色大小曲者水驚青帶黃者雷驚

或紅或青如線丁直者是因傷食所致紫絲

青絲或黑綠隱隱相雜似出不出主慢脾風

深紅疹痘是

傷寒赤紅傷寒痘疹空紅泄瀉○錢氏歌紫風紅、

傷寒青驚白色癰黑時因中惡黃卽困脾端



紋鷁

停食紋細腹痛

多帝乳食不消紋多則主氣不和

主氣不和紋亂者病久紋曲者風熱盛

二紋麤黑

射驚風頑

紋篤直射若病久紋曲者風熱盛惡候紋黑如墨困重難治

二縣針青黑風水

氣疳熱

命關人驚多傳慢脾風不治餘佐此

魚刺

又有色青風關驚氣虛

勞艱水水字

風關肺咳驚風或驚癆疾

二膚痰積乙乙字風氣二關驚風盡

瘧肝

曲直風關太腸穢

二肝風關胃氣多吐

如環○流珠

紅點膈熱三焦

瞿亂吐鴻腸鳴自利煩燥啼哭

腹痛夾積團

來蛇乾嘔臟腑滯

左半則爲肝病去蛇昏睡瀉

濕濕○弓反

裏形感寒熱

頭目皆重心神驚悸倦怠四肢稍冷小便赤色

二反外

心神恍惚間夾驚火食風癟症候

紋勢彎曲入裏者病雖重而症順猶可用力若紋勢弓反出外腰

腰

靠於指甲者斷不可回其有二關紋如流珠流米三十五點相連或形於面或形於身危症尤甚

氣症向

裏風

辨向外

斜左傷風

右寒

雙鈎三曲

傷冷硬

脉亂如魚辨蛔攢

鎗形痰熱驚風搐

絞雙字

食毒驚

積難

孫兒三歲至五歲一指三關定其息浮洪

浮緩傷風洪緊

傷寒氣口

風盛數多驚急促

虛驚虛冷沉遲

細實有積脈緊如

索弦是風癇沈緩湏知乳化難腹疼緊弦牢實

大秘沈而

數者骨中寒弦長多是膈

亢風

弦緊者氣不和

緊數驚風四肢掣

浮洪胃口似火燒

單細辨勞洪東齒虛濁

有氣不和更兼驚

神不守舍，脉芤多崩。大便血變蒸脉，亦隨時移伏。遲寒嘔無潮熱，物聚爲前大後小。童脉順前，小後矢必氣咽。大小不均者，用柴。

四至洪來若煩滿沈細，腹中疼切切滑。主露濕冷所傷，弦

長客忤分明說。五至夜甚浮大晝六至夜細浮晝別，純陽

六至號平和。五至虛四至病三至脈七至八至死。此是聖人，病輕九至十至，劇十一十二至死。

傳妙訣

脈過寸口入魚際，主遺尿驚搖。脉浮數身溫順沉，細肢冷逆。夜啼脉微小順，洪大身冷逆。吐噚脉浮，大身溫順流細，身冷逆。脾勞脉緊數，臟實順沈細。脾壯逆，身滿脉緊滑，身溫順浮大唇青逆。餘病順逆同太人。

○五臟形症虛實相乘

肝風氣熱爲外傷風，自直。熟則兩臂俱緊，不轉。九目青，青者必發驚咬牙甚者亦發驚。

手搐

肝主謀故搐

衣領亂

撓物

風甚身強反張力大

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

噉

心乘風火相搏則發搐

瘧赤散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

散

渴

</

脾風泄而嘔。下陳湯加黃芩。心乘脾，肺熱體重而渴。桂活黃芩、蒼朮、甘草湯主之。肺乘脾能食不，大便而嘔，嗽，瀆。橘大黃煎湯下。莫若丸。腎乘脾惡寒而泄。理中丸。肺燥，喘，散潤之。手搗眉目鼻面者，井桔湯主之。肺只傷寒，則不，而爾。肺熱復有風冷，留滿短氣，喘嗽。海白散。大青膏主之。
虛則白，少氣喘無厭。氣哽長出，少氣先眼，益黃散而後治。次薰恭散。阿膠散。肝乘肺，惡風，眩，胃，憒，人參，羌活散。腎乘肺，增寒嗽，清利百部丸。脾乘肺，體重痰嗽，泄瀉，四君子湯加藿香乾葛木香甘草。腎寒畏明，顧自解。腎不足，腰痺，痘瘡，腎實氣不充，則神不足，目多白睛，畏明，顧顱自開，而魄白色皆難養。或夭，有因病而致虛者，可補。下竄足熱，火欲炎。下竄者，骨重，惟欲墜下，而縮身也。足熱，不喜衣覆，惡寒桂皮湯加黃芩爲丸。肺乘腎，喘嗽，皮溢寒，百部丸。乘腎拘急氣搐，身寒理中丸。脾乘腎，體重泄瀉，身寒，理中丸。

左凡李臘虛弱皆鬼賊寢害當補本臘正氣假令肺病咳嗽當春補腎當夏救肺當秋濕肺當冬補心濕本臘乃名之寒濕大抵五臟各至本位節氣盛不可更補到初冠位不可更復又肺病重見肝虛症易治見肝熱症難治蓋肺病久則虛冷肝強實而反勝也經曰受所制而不能制謂之真強法當先補肺而後濕肝肺勝者當補肝潤肺然正氣久虛羸不可服寫白散宜腎氣丸又肝病見春秋肝勝肺也宜補肺潤肝輕者病退重者唇白如枯骨者死肺病見春肺勝肝也心病見冬心勝腎也腎病見夏腎勝心也脾病見四臟順者易治逆者難治五臟病機不離五步生剋制化之理所以有臟腑虛實乘勝之病丑俗不審此理往往率指爲外感內傷而用藥枉死此錢氏素古之功大矣哉

○死症

眼上赤脉下貫瞳人困絕顙門腫起兼及爪心鼻乾黑燥肺絕肚大青筋脾絕氣目多直視五臟俱絕覩不轉睛止不榮指甲

黑色肝忽作啞聲脾氣有出無入脈絕也虛舌出口心齒齒咬人胃絕魚

口氣急如口如魚呷水之狀是氣急肺絕啼不作聲肺絕蚊虫既出消食脾是

皆出必是死形發泄手足寒難已手足溫易已凡病困汗來入死形出如珠不下流者死頭毛皆上逆者死唇口乾目皮反口中氣冷手足四垂其脉短縛掌中冷者死

○乳子調護

養子須調護看承莫縱馳乳多終損胃食壅卽傷脾被厚

非爲益衣單正所宜無風頻見日寒暑順天時初生三五
全臍勿堅頭抱出六箇月方可與稀粥亦不可將乳同喫
五歲方可喫葷腥○養子十法一要背暖二要肚暖三要
足暖四要頭涼五要心胸涼六要勿見異物七脾胃常
要溫八要未定勿便飲乳九勿服輕粉硃砂十少洗浴

小兒病機

大半胎毒大半、胎食小半、內傷乳食十分之一、外感風寒一、

濕熱生痰痰、痰生火火、濕熱結滯滯、而然且真水未旺水、心火獨炎炎、故肺金受制制、肝常有餘有餘、脾腎不足不足。

胎毒類

初生

撮口

噤口

臍風

夜啼

諸驚

急驚

慢驚

慢脾

馬脾

癰瘡

寄忤

天鈞

內鈞

痘氣

變蒸

龜胷

丹毒

○初生

初生何故便

醫

生

下

啼聲

未

出

急用

膝墨

手指蘸

生

其

定更以蜜調硃砂末一字抹入口

中

鎮心

安神

解毒

延年

生方

初生

勝帶落後

取置新瓦上

用炭火

四圍燒存性若

臍帶有五分入飛過辰砂二分半爲末

用生地

當歸煎濃

汁調勻抹兒

上脣間及乳母

乳頭上一日

至晚服盡爲度

次日遺下穢濁之物終身

無痘疹

諸疾

小炒法

胎熱胎寒

胎瘦肥

胎熱因母食

熱胎寒因母

感寒或傷生冷。胎瘦怯、面黃白暗多喜哭、身肌肉薄大便色白屬肺宜預服長生丸。檳榔枳壳各一兩木香五錢砂仁半夏丁香肉豆蔻全蝎各廿枚爲末飯丸黍米大每五十丸乳汁下寬上實下補脾化痰止瀉。胎胞生下肌膚血紅五心煩熱大便難宜用浴體法。百礬青黛烏硝蛇各一錢半天麻五分蝎子硝砂各二分半麝香一字桃枝一搗水煎十沸溫熱浴之勿洗。胎瘦者亦宜。胎寒身冷多漏利盤腸內釣痛無時。生後身冷口氣亦冷。腸鳴利青黑盤腸內釣心腹絞痛。不乳者木香白芷散或白姜散白姜木香官桂陳皮。檳榔甘草各等分。加木瓜丁香面青肢冷去寒。指標加川芎當歸水煎量兒大小以絲蘸灌之。或不能啼或腎縮。有生下不能啼者必因難產冒寒所致。急以絲繩包抱懷中未可遽斷腰帶且將胞衣置灰火中煨之。仍作大油紙擦點燈於腰帶上徃來遍帶燎之。蓋帶連兒腑得火氣由腑而入更以熱醋湯澆洗。腰帶須臾氣回帶契如常方可用湯洗并斷腰帶。有腎縮者乃初生受寒用硫黃吳萸各五錢爲末研大蒜汁調塗腹上仍以蛇床。

子瘡

微薰

生泡遍身或無皮

生下遍身如魚泡如水晶碎則

蜜陀僧爲末，繆之仍服。蘇合香丸。○生下遍身無皮，俱胎是紅肉都乃脾氣不足也。用早米粉撲之，候生皮方止。

熱懸癰落地死

有生下卽死者急看兒口中懸癰前脣上

喉卽

初生穀道無乳者乃肺熱閉於肚

死穀道無乳事亦奇

明急用金銀玉簪看其端的處刺

穿或用火針刺不可深以蜜藥法套住緊只

以油紙擦套住內服四順清涼飲免其丹合一便不通

因不乳有生後面紅氣急脹疾呵二便不利或有血水

甚則手足常搐眼常邪視身常掣跳宜連翹飲五

福化毒丹梨漿飲○有不能飲乳者用黃連枳壳赤茯苓

等分，蜜丸乳汁下○有生下面赤眼閉二便不通不飲乳

者釀乳方澤瀉五分生地四分猪苓赤茯苓天花粉茵陳

草各一分水煎冷乳母捏去宿乳服之良久乳寬此釀

乳法餘皆效此○有單小便不通者乃心氣積熱併於小

腸急用生地龍數條蜜少許研勻敷陰莖上內用

蠶退燒

死人研砂服少許爲末，麥門冬燈心鴟湯調服。有不乳小便難者，用乳汁四合葱白一寸，煎三沸，灌之。若兼腹脹難支持，太便不通，腹脹欲絕者，令婦人以溫水漱吸，吸三五次，以紅藥爲度，便即自通。生赤如丹，生黃疸。有生下身如丹，塗者草木花粉葛根等分爲末，薄荷煎湯入蜜調服，五分後用藍葉浮萍水苔同研絞汁，謂朴硝土硃，塗赤處。有生下身肌肉紅白，二三日後遍身面白，小便皆黃，太便不通，謂之血症，因母受濕熱或衣被大熒所致，宜四物湯加天花粉等分水煎服，兼以黃柏煎湯洗之。鵝口口瘡急拭之，白膚滿舌，如鷺之口者，蘸薄荷自然汁拭淨，如不脫，用保命散，枯礬，硃砂各一錢，馬牙硝五錢爲末，每丁字取白鵝糞，搗水調塗，舌上及頸頰內。口瘡者，心臟積熱也，用淡醋調南星末貼兩脚心，乳母服先心敷輕者，用薄蓮或細茶爲末，少加甘草蜜調敷之，甚者用黃柏青黛片，腦爲末，竹蔗調敷，或前保命散去瑞，鼻孔尤妙，如漏口生瘡糜爛者，用黃柏細辛青鹽爲末。

齧之吐涎三日卽愈大人亦宜○有口爛不能製乳者用
巴豆二粒入硃砂或黃丹土硃少許同搗爛剝開小兒齧
門貼之如四邊起粟米泡急用溫水洗去恐成瘡用菖蒲煎湯洗之立効

重舌木舌牙齧白舌

心脾熱盛附舌根而重生一物如舌短小而脰日重舌着
頬裏及上齶曰重腮著齒齶曰重齒當刺出血再刺
不爾則脹滿塞口有妨乳食宜青黛散黃連黃柏各一錢
青黛牙硝辰砂各二分雄黃牛黃硼砂各一分片膾二釐
馬先用薄荷汁拭口後以藥末少許糁之咽瘡腫塞口
亦宜○木舌心脾熱壅腫硬不和漱漁塞滿口中亦能害
人用黃柏爲末以竹蕊調熙舌上其者加朴硝白蜜二症
通用百草霜芒硝滑石爲末酒調敷之○又弄舌舌絡微
緊時時露出亦脾熱也不可冷藥當與黃散漱服之面
黃肌瘦五心煩熱者胡蓮左大病後弄舌者齒初生
舌下生膜如石榴子蓮於舌根令見聲不能發急摘斷之
微有血以艾灰糁之○有口內并牙齦生白點者名馬牙
不能食齧齧口不同少緩不能救急以銅挑出用東墨
磨薄荷汁以母油髮裹手指蘸墨遍口擦之勿得食乳

見睡一時醒後與乳耳爲擦之卽愈盡皆母熱遺於兒

○撮口

撮口聚面氣喘急胎家熱毒入心脾

撮口風面目黃赤氣

喘啼聲不出胎熱流

毒心脾則舌強唇青撮口聚面飲乳有妨用姜鹽二枚粟炒爲末蜜調敷唇中或大利驚丸或竭霜散竭霜四十九

箇每箇用生薄荷葉捲定以線扎之砂鍋內袞炒薄荷草酥爲度再入姜鹽四十丸箇腦麝少許爲末用紫雄鷄肝

一片煎湯調服治

一切胎風及百日內撮口臍風如胎風

冷者加川烏熱者另用辰砂膏有初生七日患此者急

看兒齒齦之上有小泡如粟米狀急以青軟布裹

手蘸溫水輕輕擦破卽開口便安不用服藥亦有脾

肺虛寒者撮口氣不和也肺主氣口屬脾脾虛不能

撮口氣不出白沫四肢冰冷最

肢冷不可爲爲惡候一十七見之必死

○噤口

噤口スル不乳スル不能啼タク胎熟復爲風搏之

名三
噤口風眼閉啼聲嘶

小舌上聚肉如粟米

狀吸氣不得口吐白沫二便皆通由胎中受熱毒流心脾故形見於喉舌或生下腹爲風邪搏之所致宜鵝黃散珠銀丸スル有初生口禁不開不收乳者用金鎖赤足蜈蚣一條炙焦爲末每五分以猪乳汁二合和勻分三四次灌之

或用竹瀝調牛黃末一字口一中灌之更以猪乳竹點口一中此症皆因裏氣鬱吐痰利驚最

得宜スル據口脣風三者スル一種同因裏氣鬱閉宜先用控

藜散止痰蠅翁銅青各五分硃砂一錢礦粉一字麝

香少許爲末每一字茶清調服或甘草煎湯探吐尤穩却以猪膽汁點入口中卽瘥次用入參養胃湯去芩朮半夏

加木香蘇子與乳母服耳用辰砂膏利驚卽愈吹鼻噴嚏還可治條蠅翁四齒姜

蟲七箇瞿麥五分爲末每一字吹入鼻中可治仍用薄荷煎湯調服七朝見此十分危朝

見此症者，危。百日內見此症，手足蹣跚者，亦不治。

○臍風附胎風

臍風，風冷濕氣流，臍風因斷臍後爲寒水濕風冷入臍流於心脾所致。臍腫腹脹，四肢柔，突，其症臍腫或腹脹滿或多啼，搐防撮噤。若日日夜多啼，不能飲食，是爲內搐，不治。凡臍邊青黑小甲，黑者俱死。古方大利，主之。或用藥口條，吹鼻，有捷可治。甚者金鳴散，金頭，螺旋半條川鳥尖三箇生麝香少許爲末，每半字金銀，煎湯調服。或外科寶命丹一粒，金妙丸如風稜箱定多啼，煥者太，溫驚丸。
間有熱者，生可求。亦有熱在胸堂，伸引努氣，亦可求。先，臍腫法，用荆芥煎湯洗淨，後以葱葉火上炙過候，冷指甲刮薄貼，腫處次日便消，方服通心飲，木通蓮翹瞿麥，山梔黃芩，甘草各三分，燈心麥門冬各少許，水煎服，通心氣，利小便，退潮熱，分水穀，兼治旋螺眼風，如春勝加防風，神

退夏加矣岑車前子，秋加牛蒡子升麻。冬加山梔蓮翹鈎氣加鉤藤川練子。口瘡加生地黑苧根。○通用安臍法治臍中血水汙出，或赤腫痛，當歸烏參，或白芍脂末，蝦蟆油，頭髮燒灰，皆可敷之。○炙肚筋法：兒生七朝，患此者必自發，出青筋一道，行至肚必生兩盆，待行至心不治，知者常視其青筋初發，速照青筋頭上灸三炷，或行至生兩盆處亦照，照兩盆頭上，截灸六炷，青筋自消，兒必活矣。○煉臍法藥方見第一卷。凡初生下時，用綿裹臍帶離肚三寸，以線扎住，却於線外將臍帶剪斷，片時去線，待血流盡，看近肚處，臍有兩小孔，一大孔用鷺毛管送陳臍藥一二分，入太孔內，以羊指輕輕揉散，艾火灸臍頭三炷，結作乾繒，軟帛腰裹，切不可曉，常揭着，待臍落失，自無風矣。又，臍落胎之時，視其臍軟者，不須治，如臍硬直者，定有臍風，急用銀簪，於臍根傍刺破一二處，入麝香末少許，艾灸二三炷，極妙。

胎風癇症多嘔吐，生者紅色注眉頭。

胎驚癇風乃孕婦嗜口，忿怒驚撲或外挾風邪，傷胎子乘母氣生下，即病嘔吐搐掣，口眼斜，驚啼，聲短，腮縮，顱悶，或頰赤或面青紫，口咬牙，眼合翻涎，筋骨

拘摩身腰強直，臍腹腫起與疎撮同症。但胎風合眼與慢脾異，不可妄用溫藥。視其眉間氣色紅赤鮮碧，有生青點黑者死。治法解散風邪，利驚化涎，調氣辰砂。最妙太乙散，天漿子，南星白附子，天麻防風，茯苓各一錢，全蝎硃砂各一錢，麝香少許，爲末。每五分乳汁化下，治胎驚。

○胎驚夜啼

上夜驚啼多瘡熱仰身，有汙赤面頰者，月內夜啼驚惕抽掣，宜加乳膏、瓊珀防風各一錢，硃砂五分爲末。胎中受驚所致，一字珠兒口中或保命丹、金箔鎖心丸。驚者，痰者，抱龍丸。驚有熱者，亦驚丸、龍腦安神丸。尋常邪熱夜啼者，用燈花三顆爲末，燈心煎湯調抹兒口，中以乳汁送下，日二服。本槩有瘡熱者，多上半夜仰身，有汙而啼。下夜曲腰必虛寒，甚則內釣手足掣。夜啼氣虛者，四君子湯加山藥扁豆，挾熟加黃連竹葉血虛焦啼者，用當歸爲

挑

末乳汁調服氣血俱虛腹痛夜啼者用黃芩當歸赤芍木香甘草等分爲末每匙少許着乳頭上使吸乳服之○有胎寒及衣被過涼以致臍寒盤腸內約肚腹脹痛啼則眼目上視手足搐掣益夜則陰盛寒則疼痛甚則陰盛發躁所以夜啼宜保命丹輕者益黃散外炒麥麴服之凡下半夜曲腰而啼面白青白拘腹覺冷必冒寒腹痛也○有因驚受風邪而啼者二活散者活獨活各二十分續天麻麻黃甘草各一分水煎服或加南星爲末蜜調可貼頤門○有傷乳食作痛而啼者消乳食丸

○客忤中惡哭黃昏○有日夜驚啼必兼昏中惡治詳後客忤條飲乳方啼燭口舌○有欲飲乳到口便啼身額皆腫痛宜冰梅丸大半錢煎治之○凡初生月內多啼者吉胎熱胎毒胎驚得散且無奇疾要短頻浴凍腹便成臍風不急生人異物則爲客忤噤口驚啼乳食重服則吐瀉痰逆過煖則口舌齎瘍過涼則臍寒鉤氣調理之法適中而已

○諸驚

神驚痰聚發風搐或因內熱風生肝

小兒元氣未充神魂未定

或見生人異物

或聞厲聲響器驚入心之胞絡火炎舍空而聚痰生熱

熱生風心肝脾病也又有心內積熱而驚惕肝內生風而

發搐痰涎壅盛風熱併發所以暴烈緊急心肝病也蓋心

主熱脾主痰肝主風相因而發謂之驚風痰熱可也謂之

驚熱風痰亦可也太要驚熱者硃砂安神丸熟甚者涼驚

丸馬者溫驚丸痰盛者辰砂化痰丸抱龍丸痰熱者滚痰

丸驚風痰熱全者天麻防風丸古礞石丸○又有驚積者

受驚日久而積成之也其症額汗喘息煩渴潮熱往來肚

熱脣中覺腹內有物跳動瀉下如白脂豆砂是

也治法量與辰砂膏疎導仍與謂氣和胃而愈

成假搐不比真搐閉牙關

其有搐搦反張斜視而牙關不緊口無痰涎者多是外感風寒

內傷飲食夾驚而成謂之假搐非真搐內生驚痛也○內

傷飲食華熱或因食後遇驚謂之傷食夾驚身熱溫壯或

吐不思食大便堅臭先用入參卷沽散加青皮柴蘇取表

消積次用鴉青丸加辰砂謁猶祛風鎮驚食辟挾驚熱者

寬熱飲痰積者白玉餅○驚食兩重四肢搐搦痰壅盛者先與利驚丸消導次服啞脾散調脾○外感因驚虛風邪乘入心府二經或內有積熱外又感風邪謂之傷風夾驚神困昏憒頭疼口中氣膩而熱先用惺惺散參蘇飲入參若活散或太青膏選用微表次與天麻防風丸○通用導赤散五福化毒丹鴻青丸腎氣丸凡驚風用天麻水銀輕粉巴豆芒硝鉛霜腦麝蟾酥蜈蚣等劑往往由此變成慢驚難治况驚搐發熱甚因內傷外感痳瘺而作其害尤遠家用細辛羌活青皮乾姜荆芥之類以代腦麝散獨活柴胡山梔枳壳大黃之類以代銀粉巴硝通利蓋鴻青丸治肝熱牽衣直視或搐或不搐或臘麻發泄諸藥不止等症如驚熱出於心肺者宜桑白皮草薢赤茯苓車前子山梔甘草姜棗煎服從小便利之兼能鴻府風降心火最利驚熱或加山梔羌活大黃又有驚瘡驚瘡挾一切雜症者又當以意會之參上一擣有虛實有逆順驚風痰熱四症輕者用各門藥可也

擣有虛實有逆順

驚風痰熱四症輕者

牙關緊急搖頭竄視張口出舌角弓反張身體掣顫手足

搐搦四肢攢掣肩方謂之小候凡髮際印堂青筋三關原

口紋紅紫青出日驚風之候實熱爲急驚屬肝木風邪有餘
陽症虛熱爲慢驚屬脾土中氣不足陰症慢驚本無熱所
以熱者虛使然耳故曰熟分虛實○男搐左視左眼上竇
女搐右視右眼下竇男握拳太指出外女握拳大指出裏
五指交如姜把若死男引手挽左直右曲女引手挽右直
左曲凡此皆順反之則逆亦有先搐左而後雙搐者但搐
順則無聲搐逆則有聲其指紋形勢彎弓入裏者
順出外者逆出入相半者難痊故曰症別道順人治分先
後與湯難治搐先於截風治風先於利驚治驚先於豁痰
一或有遺必生他症故曰治有先後雖然五臟多傳變無
急驚屬腑易治慢驚屬臟難治○急驚屬腑易治慢驚屬臟難治

卷之二
非瘡火併其間，驚邪入心則面紅臉赤夜啼，八肝則面目汗多，八肺則面色淡黃嘔吐不食，虛牙。○寅卯反時，搖者肝木旺也，當以腎氣丸補，腎渴者，當以歸肝，已未時，搖者心火旺也，當以腎氣丸補，肝導茶散，驚心申酉戌時，搖者肺金旺也，當以益黃散補，脾，驚風亥子丑時，搖者腎水旺也，當以心氣丸補，心導茶散。

眞赤散抑心濁青丸取肝亥子丑時搐者水土俱旺之時
水虛不旺惟土旺也當以益黃散補脾草赤散涼驚丸抑
心火要知五臟傳變皆痰爲患蓋痰乃風苗火蟲則伏於脾
火動則壅於肺痰火交作則爲急驚或成疾癲痰火結滯各
則爲癇瘈或爲咳嗽痰火來去則爲驚者皆由脾濕而來
哉少驚風忌純用風藥不問急慢當以養血藥爲使古方
保元湯加三百芍一
爲慢驚表劑也

急驚發搐牙關緊潮熱秘渴壅痰延面赤唇紅渾身壯熱
口一中氣亦熱作渴引飲大使秘小便赤脉浮數洪緊原因
內有實熱外夾風邪風熱併作氣亂痰壅所以百脉凝滯
關竅不通發時暴烈發過如故百脉凡搐日內見此症二三發不止者亦死先與和氣通關竅痰因
氣鬱氣順則痰化而搐自止矣先宜蘇合香丸薄荷煎湯
入姜汁化下順氣下痰通竅或星香散開關用前吹鼻法
或用天南星一錢片腦少許爲末生姜汁
調蘸藥於左右木牙齦上擦之牙熱即開次截風搐清心

田

藏風丸 天麻 姜蠶 南星 各二錢 暖蛇一條 白附子 防風
蘇砂 全蝎各一錢 麝香少許爲末 密丸 椎子大 每十九丸

薄荷

煎湯化下 治驚風癲搐

○定搐散

蜈蚣一條 麻黃半

星白附

姜蠶炭活代赭石 蜈蚣稍 姜黃 砂砂各一錢 麝香五分
分爲末 每一字荆芥紫蘇煎湯下 治急驚

定搐丸

不正加鳥蛇肉 牛黃清心丸 搞定痰熱尚可

退下之只用抱龍丸

膽星一兩 天竺黃五錢 辰砂雄黃各二錢半 麝香一小錢爲末 密丸 茄實大

其草薄荷

煎湯化下 一丸 痰壅甚 姜湯下 心虛陽人矣

魏珀煎湯下

蓋抱者保也 號者肝也 肝應東方青龍主藏

魏魄安則驚自定

理小兒諸驚 四時感冒 瘧疫濕痰邪熱

以至煩躁不寧

痰厥氣急癥參散 出發搐常服

桂風化痰

鎮驚解熱和脾胃

益精神又治蠭毒中暑及室女白帶用

鹽少許細嚼

一二丸 新汲水井下 牛黃抱龍丸 膽星八錢

雄黃不參茯苓各一錢半辰砂

一錢二分姜蠶三分鈎藤

四兩煎膏和丸 英實大金箔爲衣

陰乾藏之勿泄氣每近

微火邊每服一丸或半丸

薄荷煎湯磨服治一切急慢驚

風及風熱風癱等症。○有熟者，涼驚丸忌巴豆，利後溫膽，及諸熱藥。○僵仆不醒者，用初生保浴體法。

巴豆

利後

溫膽

與定魄

驚慄頑痰者，溫膽湯加酸棗仁或川椒安神丸。

定魄

驚風

已退

神

魂瞻志未

定者，定魄丸人參現珀茯

苓遠志殊砂天麻菖蒲天門冬酸棗仁甘草各等分爲末

蜜丸如皂子大殊砂爲衣，每一丸，燈心薄荷煎湯化下。

醒脾防變

慢驚丸

醒脾散人參白朮茯苓甘草白附子姜

煎溫服或爲丸服治小兒脾困昏

洮默默不食，吐瀉不止，痰作驚風。

慢驚

吐瀉

喘鳴

神緩

眼開

睡露睛

搐搦乍靜又乍發身

熱或冷面黃青

眼半開半合

口眼不瞬

十指或開或合

口口不時

眼手足牽掣

其肢或浮或

沉身或來或熱或吐或瀉或不吐瀉或

不乳名半陰半陽

舌苔白如傷寒半表半裏也

陰症自陽

宜細認驚

男子以瀉得之爲重女子以吐得之爲重

隨

症生胃截風形

因吐瀉得者理中湯加木香或五苓散

脾

味木附湯附子白术各一兩肉豆蔻一箇木香甘草各五

錢每二錢姜棗煎服治吐瀉後脾虛變成慢驚身如裂

脾

吐乳貪睡汗多宜此溫寒燥濕行氣健脾○因下積取轉

得者先與木香句氣散因外感寒邪得者先與桂枝解肌

湯葷因夏月脾胃伏熱大吐瀉解者當解暑熱不可專一

回陽其他久嗽久痢傷寒變陰過服涼藥之類可以類推

尚有陽症蟬蛻散初傳尚有八候陽症在肺但於生胃氣

藥中加以截風定搐如全蝎花蛇姜蠍

白附子天麻南星葷可逐可熟均平陰陽不必專一回陽

○方傳慢驚者蟬蛻散全蝎七箇蟬退廿箇南星一箇甘

草二錢半每五分姜棗煎服○不若人事者保命丹吐瀉痰壅者來復丹若是純陰烏蝎星巴

慢驚外無八候但吐瀉不止者鳥蝎散人參白术茯苓甘草川芎全蝎南星各一分姜棗煎服如耳服卽去川芎

厥冷回陽疏附進流附丸生附子尖二箇蟬稍七箇熟硫

黃一錢爲末生姜汁爲丸菉豆大每

九米飲下兼治慢脾風肢冷或渴
波丹靈丹或四君子湯加附子助胃回陽身煖礞石與

五靈錢

風痰壅盛者古蒙石丸青礞石搗碎一兩同焰硝五

三丸急驚薄荷荆芥煎湯下慢驚慢脾木香煎湯下但礞
硝雖能利痰非胃家所好故以木香佐之能裹痰隨大便
出而無糞寒不動臟腑始知藥妙○痰搐忌下者靈胎丸
五靈脂白附子木香姜蠶各一分全蝎半分硃砂一錢南
星五錢為末醋煮生半夏糊丸麻子大每三丸姜湯下
安神散全蝎四箇塘水浸一宿用南星一箇開三竅入蝎
在內以南星未蓋口麪包火腿赤色埋土中一宿去火毒
取出去南星用全蝎為末每一字磨刀水調服亦治搐搦
○皆迷有痰者自玉餅○凡方中麝香開竅龍腦輕粉下
涎礞砂遠心皆為純陽實熱者設虛者全要斟酌用之
慢脾風微搐眼全閉由慢驚後吐瀉損脾已極故曰脾風
但脾間痰旋虛熱往來眼合者脾困神迷痰涎凝滯難療亦有不由急慢風傳次而至者頭低垂睡顙

汗多舌短或吐頻頻嘔口噤咬牙身冷不和以手摸久聲

又小生胃回陽奈若何

初傳慢脾陽氣未甚脫者白姜蠶

南星二錢姜蠶地龍金蝎五靈

脂各一錢爲末煮半夏麴爲糊丸如

附子三分甘草半分姜煎服得手足溫

蘇省爲度次以四

君子湯加附子或異其散以溫中正氣○脾因不食者醒

附子三分甘草半分姜煎服得手足溫蘇省爲度次以四

脾散吐瀉者加五味木附湯疏

附子重散來復舟金液丹

馬脾風因肺寒甚痰嗽齁齁症最危

寒邪停留肺俞寒化爲熱亦生痰喘飢逆

上氣肺脹齁齁俗云馬脾風若不速治立危

宜抱龍丸或

馬脾風散灰砂二錢半輕粉五分甘遂一錢半爲末每下

字用溫漿少許上滴香油一點抄藥

在油花上沈下却去漿水灌之神効若只痰嗽將發搐憚

先宜惺惺散參蘇飲人參若落散次服保

蘇保命便能痊命冊全齋十四箇防風南星蟬退姜蠶天

麻塊珀各二錢白附子辰砂各一錢麝香五分有熟加牛黃片腦一方加羌活爲末粳米飯搗丸臭子大金箔十片爲衣初生兒半丸乳汁化下二十歲已上兒二丸鈞藤燈心煎湯或薄荷金銀煎湯化下治初生勝風搗口夜啼胎驚內鈞肚腹堅硬目竇上視手足攢掣角弓反張痰涎壅盛一切急驚及慢驚尚有陽症常服安神化痰丸水調化下丸八鼻內令更以鈞藤煎湯調服○凡外感夾驚亦宜此法防之

○癇瘡

驚風三發則爲癇瘡惡病關五臟似驚風心痛面赤目瞪舌僵心丸或鎮心丸遠志雄黃鉄粉琥珀各二錢辰砂一錢射香五分蜜肉丸黃豆大金銀箔廿一片爲衣每一丸麥門冬煎湯化下○肝痛面青上竄手足拳抽掣反折散風丹膽星二錢羌活獨活防風天麻人參荆芥川芎細辛柴胡各一錢爲末蜜丸梧子大每二丸大者三四丸紫蘇煎湯化下亦治癇瘡○脾痛面黃直視腹滿自利妙聖丹代赭石

石雄黃蝎稍灰砂杏仁各二錢輕粉麝香各一字巴豆二粒爲末棗肉丸梧子大每一丸杏仁煎湯下○肺癆面白反視驚掣掌吐沫潮涎天皇丸膽星全蝎退各二錢半防風白附子天麻姜蟲各一錢半麝香五分爲末棗肉丸菉豆大每三丸荆芥生姜煎湯下○腎癆一面黑晦振目視人口吐清沫如尸不動時滴湯獨活麻黃川芎大黃甘草各六分姜煎服○體柔時醒與瘡別風驚食癆治不同小兒血氣未爲風邪所傷者名風癆屈指如數有熱生瘡宜先疎風然後清痰散熱安神定志搐散風丹○因驚者名驚癆駁氣積驚帶叫恍惚宜先治驚然後清三焦去熱化痰紫石散或定魄丸用青黛一錢爲衣金銀薄荷川芎煎湯化下○因食者名食癆或食時遇驚停乳大便酸臭或結瘡先寒後子熟宜先消積然後治癆又有痰火作癆者宜吐痰瀉火安神驚瘡膏丸用蝎稍煎湯下之或醒脾散爲丸服諸癆通用荆芥穗二兩白礬一兩半生半枯爲末麪糊丸黍米大研砂爲衣每廿丸姜湯下○急驚二點藥丹蜈蚣一條南星二錢全蝎防風遠志白附子薑膏玄胡索辰砂各一錢麝

香

一字金銀箔各三片爲末糊丸梧子大每丁丸紫蘇膏

蒲煎湯慢驚來復用薄荷泡湯化下二丸得利卽

愈

凡驚風對症用藥已効若覺未甚蘇省可再服數丸

凡癇症方萌起耳後高骨間必有青紋紛紛如線見之急

爲

爪破須令血出

啼叫尤得氣通

凡潔洗兒衣不可夜露

恐爲雌鳥落羽所洒染觸其間未有不爲癇也

挾邪怪者

其色變易不掣

陽癇身熱抽掣

帝叫仰卧

常見人羞怕

陽癇身熱抽掣

帝叫仰卧

面黑脉沈病在臟

難治陽癇忌溫

藥陰癇忌涼藥

古方治陰陽癇

用代赭石火煅醋淬爲末

每五分金銀

煎湯

清心豁痰是上工

血滯心竅邪氣在心

入金瘡少許調平

心經氣血鬱痰爲要也

○通用猪心丸

或竹瀝丸白术蜜

炒厚朴甘草水煮

各二錢半附辛犀角各一錢全蝎七箇

每箇用薄荷葉裹

湯泡

時灸黃爲末竹瀝丸黑豆大每

一丸金銀薄荷煎湯隨兒大小加減化服

○癇後瘡不能

言教用南星濕紙煨香爲末

每一字雄猪膽汁調眼効

○癇愈後復作者斷續用

冬癇氣血不足者活鹿丹

一身強硬爲瘡瘍終日不醒分剛柔
先譖語而發若名剛
發若名柔當發汗先肢冷而
瘡當解肌柔瘡理中剛麻葛柔瘡理中湯
瘡當解肌剛瘡理中湯三生散
癰續命投斷瘡丹小續命湯

詳雜病及傷寒門

○客忤

客忤異物暴觸驚悔而驚脾臟冷而痛多夜啼狀若瘡風
眼不竄吐沫瘻癰喘腹疼雄麝千金龍膽灌雄麝散雄黃
分麝香一字爲末每一字刺鷄冠血調灌之仍以母衣覆一錢乳香五
身卽愈或鉤藤散千金龍膽湯保命丹外用龜心土蚯蚓
等分爲末醋調爲丸摩兒頭及五心詳前夜啼條有中
馬汗氣臭忤或馬鳴驚忤者用馬尾燒烟頻薰兒面以瘥
爲度或先用姜湯調下蘇合香丸次用豆豉水濕搗名鷄
子大摩兒頭上及足心各五六遍次摩腑心及上下良久

孽開自有
毛卽擲之ヲ

○天鈞

天風外觸內熱發瘡因乳母愛酸鹹食煎炒鹹酸過度毒氣入乳遂令芽兒心肺生熱瘡癰氣滯加之外感天風觸動卒然日直身強如魚上鉤之狀故曰天鈞搐熱

眼翻如邪祟壯熱驚搐手足抽掣眼目翻騰或啼或笑喜怒不常如邪祟狀甚者爪甲亦

青藍通用鉤藤井保命

鉤藤散人參犀角各五分全蝎天麻各二八分甘草一分水煎溫服

風熱勝者保命丹大半錢

抱龍丸熱痰者滾痰丸

挾食疎通和胃兼

夾積受驚肚熱脹硬曉中

腹內跳動宜寬熱飲壯下惡臭然後與調和脾胃之藥治之此等不可誤作驚風

○內釣

內釣內臟抽掣痛胎氣壅原因胎驚胎風動胎中風氣壅結兼驚而得眼
有紅筋血身反張啞黑偃啼外腎腫吐瀉方了外搐來內
外兼故實可恐誰知至寶釣藤膏調氣鎮驚踈風內外共
驚風內釣腹中極痛偃啼面白青肢冷尿如米泔者釣藤膏
乳香沒藥各三錢木香姜黃各四錢木鱉肉十二錢爲末
蜜調成劑收砂罐內量兒大小加減釣藤煎湯或四匙湯
化下次服五味木香散川練肉七箇用巴豆卅五粒去皮
同炒豆黃去巴豆木香史君子玄胡索茴香各一錢爲末
量兒大小加減米飲調下○內釣令痛者古方歸湯加乾
姜肉桂等分丁香沈香青皮小茴減半水煎服○痛甚者
魏氏散莪术五錢阿魏一錢先用溫水化阿魏浸莪术一
晝夜焙乾爲末每一字紫蘇煎湯或米飲調下○內釣腹
痛驚啼者乳香丸乳香五分沒藥沉香各一錢蜜酒十四
湯化下○內釣陰腫便秘者歸脾丸大每上二十九葛蒲釣藤煎
箇擴脚一錢半爲末蜜丸梧子大每上二十九葛蒲釣藤煎

之齊若驚車有宜

定魄

丸以鎮之

盤腸腰曲重嘔攻

盤腸痛因寒欬

小腸

亦腹痛多喘與內釣

相似但痛則曲腰乾啼額汗爲異古方用白荳蔻砂仁青

皮陳皮香附莪木甘

草等分爲末紫蘇煎湯下

○魚症亦

與內釣相似但虫痛攻心叫喫合眼

嘔吐涎沫清水四股

羸瘦面青黃或寒或熱流默不知病處發作有時爲異化

魚丸主之

○一切積痛盤腸虫痛者通用沈乳感應丸

沈乳

香杏仁木香丁香各一錢肉豆蔻一箇百草霜一分

香乳香杏仁木香丁香各一錢肉豆蔻一箇百草霜一分

巴豆十四粒爲末酒煮過薰蠅和丸菉豆

大茴四丸姜湯或鈎藤煎湯下

痢疾亦宜

中風不語似

名

種盤腸虫症中風三種俱似

內釣但中風不語爲異治與

天人一同小兒有中風後瘡不能言者用木香

陳皮生

草煎湯吞肥兒丸

內有黃連能去心竅惡血故也

○有肺

風喘促涎潮竄視者用阿膠紫蘇烏梅人參煎服蓋阿膠

能育神驚風後眼中

瞳子不正者最宜

○疝氣

疝氣亦因胎患得

有因父服熱藥以致氣滯於下者有因孕婦傷寒而致氣入胎中而成此疾者

有久坐濕地而得者

多啼冷氣傳

腎經

有因兒多啼不已冷氣吸收入小腸鈎痛傳流腎經而得者

又有木賾有腎腫有腎癰有偏墜

有癩病有奔豚有疝痕與大科同

面青吐沫陰囊腫

甚則小便淋漓陰囊腫者

用耳草汁調地龍糞塗之○風熱外腎

撒赤腫痛日夜呻吟不數日退皮如鷄卵愈而復作者

用老杉木燒灰入腹粉漬油調敷神妙

小腹痛連腰背傾

諸病皆因腎虛寒邪冷濕之氣侵入

膀胱之經留而不散故陰核腫硬沈墜

治法先宜疏利次用逐寒溫臟之藥拔穴灸之惟木腎腎癰瘡毒之氣入於

腎經久則成膿治法外用拔毒之藥敷

貼內服消散癰毒排膿利水道等藥先宜疏導歸牛散

肉桂牽牛各五錢當歸太黃桃仁各二錢半全蝎一錢每

丁錢入蜜煎服利後以青皮陳皮茯苓木香砂仁茱萸生姜煎服和胃良者死治疝氣

便閉小腹疼痛牽引痛甚夜啼次與和胃羹金齡散金齡肉一兩

砂仁七錢半、草澄茄木香各五錢爲末。每一錢大者二錢或
薑湯或酒調服。治病痛時先曲腰乾啼脚冷唇乾額汗或
外腎鈎上陰囊偏大。

通用鈎藤膏魏本散

○變蒸

變則氣升、蒸則熱。變者，變生五臟。蒸者，蒸養六長氣血。小兒初生，形體雖具，臟腑氣血尚未成就，而精神者，是也。初生至三十二日，一變。生全故三十二日。一蒸。凡遇一變，卽覺性情有異於前。上宸中心有一點白者，是也。初生至三十二日，一變。生癸水。屬足太陽膀胱。其發耳，與至六十四日，一蒸。二變。生壬水。屬足太陽膀胱。其發耳，與至九十六日，三變。生丁火。屬手少陰心主藏神。其性爲喜。至一百一十八日，二蒸。四變。生丙火。屬手太陽小腸。其發汗出而微驚。至一百六十五日，五變。生乙木。屬足厥陰肝主藏魂。喜笑。至一百九十二日，三蒸。六變。生甲木。屬足。

金屬手太陰肺主藏魄生聲至二百五十六日四蒸八變
 生庚金屬手陽明太腸其發膚熱而汗或不汗至三百八
 十八日九變生己土屬足太陰脾主藏意與智至三百二
 十日五蒸十變生戊土屬足陽明胃其發不食腸痛而吐
 乳又手厥陰心胞絡與手少陽三焦二經俱無形狀故不
 變而不蒸十變五蒸者天地之數以生成之然後生意志
 能言語知喜怒故云始全也十變後六十四日爲一大蒸
 計三百八十四日長其經脈手足故手受血而能持物足
 受血而能行立又六十四日爲二大蒸計四百四十八日在
 則言諦意志有異於前又六十四日爲三大蒸計五百一
 十二日變蒸既畢學語倚立扶步能食血脉筋骨皆輕則
 宰稟氣盛者暗合而無利症稟氣弱者乃有蒸病
 潮汗微似驚輕則發熱微汗重則壯熱
 或止或汗或煩渴燥渴七八日始解與傷寒相似亦有變
 蒸之後續感寒邪者如蒸於肝則目昏微赤蒸於肺則嘔
 哽毛聳隨症調治治貴平和汗下微者微主之不可妄治宜平和

欽子、白茯苓一錢半、人參甘草各五分、升麻二三分、宣慶四
分加白术一錢、水煎服、變蒸前後三日、各進二服、可免百
病、及百日內亦宜。○吐瀉不乳、多啼者、和氣散、木香、香附
厚朴、人參、陳皮、薑香、甘草各等分、姜棗煎服。○宿乳者、紫
霜丸。○癥熱者、惺惺散。柴胡當歸寒熱湯、骨熱心煩啼叫不已者、柴
胡飲、柴胡人參麥門冬甘草各二分、龍膽草防風各一分、水煎服。○有寒無熱者、當
歸湯、當歸四分、木香、桂枝、人參甘草各二分、姜棗煎服。○
蒸熱甚者、紫陽黑散。○積熱寒熱者、瘡者、梨根散。

熟寒熱如瘡者、梨根散

○龜胷龜背附解癲頸墳顛滯頤

龜胷、肺熱百合丹、姪孕及乳子時多食五辛、灸燙滯藏生
受熱也、行動喘乏、但遇風寒、或多食則痰嗽、氣急喘滿、肢
體瘦慘、久而不治、將成痀偻之疾、百合丹主之、大黃三分
天門冬杏仁一百合木通桑白皮、桔梗、葛石燕各五錢爲末、
煉蜜丸、如菉豆大、每服十五丸、食後臨卧、熟水化下。

龜背客風松藥驗

嬰兒生下不能護背客風吹入於骨髓所致或小兒坐早僵硬背高如龜多

成痼疾間有灸肺俞膈俞性粟米大艾三五壯內服松葉丹松花枳壳防風獨活各一兩麻黃前胡大黃桂心

各五錢爲末煉蜜丸如黍米大每服十丸或二十丸粥飲下量兒大小加減用之或外以烏龜屎點脊骨縫中一粒

解顱原是腎家虛

小兒年大頭縫開解而不合腎主腦胎

髓少如木無根

不過千日終成廢人宜腎氣丸或八物湯

湯加酒炒芥連外用南星白斂

爲末醋調攤紅帛上烘熱

貼之或顱頭骨燒灰油調敷縫中

外作頭布遮護其父母母

宜服肾氣丸虎潜丸

丸得精血充足終育子女無是患也

風熱顱填脾虧陷

顱填者顱門腫起也脾主肌肉乳哺不常饑飽無度或寒或熱乘脾以致臟腑

不調其氣上衝填脹顱高而突舌蹇短黃自汗

若寒氣上衝則牢韌宜溫之熱氣上衝則柔軟宜涼之劑量輕重兼

與調氣又有肝盛風熱交攻以致顱填突起者鴻青丸如

因故熱者驚風即至○顱陷者顱門成坑也始因臟腑有

熱渴飲水漿致成泄利久則氣血虛弱不能上充腦髓之
頸項僵硬不得平滿宜黃狗頭骨灸黃爲末鷄子清調敷
滯頤熱者胃火炎冷涎胃弱不收斂滯帶於順間也○熱涎
稠粘者乃胃火炎上也宜通心飲或瀉黃散加減○冷涎
自流者乃胃虛不能收約也宜木香半夏丸木香半夏丁
香各五錢白姜白朮青皮陳皮各二錢半爲末
蒸餅丸麻子大一歲十九二歲倍之米湯灌下

○五軟五硬

五軟皆因無受虧行遲語遲齒髮遲脚軟身軟口軟是也
○頭軟頭不能正詳督痺條○項軟天柱倒也有吐瀉久
弱者宜補脾胃有傷寒不及發表成者難治○有肝膽伏
熱面紅唇紅肌熟者羊角散羚羊角白朮芩莖骨酸棗
仁桂心熟地防風甘草各等分爲末每一錢酒調服或涼
肝丸防風二錢人參赤茯苓各一錢半黃芩茺蔚子黑參
大黃知母各一兩爲末蜜丸菉豆大量兒大小食後茶清

下兼治痘後目赤腫痛。○有風氣入肝筋，舒頭項，軟者，天桂丸，蛇含石一塊，火煅淬七次，帶金麝，香各少許，爲末，飯丸，龍眼核大，每一丸荆芥煎湯或金銀薄荷煎湯化下。○通用健骨散，每丸姜蠶炒爲末，每三五分薄荷泡酒調服，治久，患痔疾，體虛不食，及諸病後，天柱骨倒，○外用生筋散，木鱉子六箇，華麻子六十箇，俱去壳，搗爛，先抱鹿兒頭，摩項上，令熱，後用津液調勻，貼之，效。○貼項方，生附子兩星等分，爲末，生姜自然汁調勻，頸項軟處，○手軟無力，以勤也，所受肝弱，兩手筋縮，不能舒伸，薏苡丸，薏苡仁當歸秦艽酸棗仁防風羌活各一兩，爲末，蜜丸，芡實大，每一丸至二丸，麝香荆芥煎湯化下。○脚軟行遲，乃骨髓不滿，氣血不充，筋弱，不能束骨，宜腎氣丸，加牛膝，加皮鹿茸五分，六歲不能行者，羊角丸，羚羊角，鹿脰骨，生地，酸棗仁，白芍苓各五錢，桂心防風，當歸黃芪各一錢半，爲末，蜜丸，皂角大，每丸一錢，或二丸，溫酒化下，三歲不能行者，用五加皮一兩，牛膝木瓜各五錢，爲末，每一錢米飲入酒少許，調服。○有脚指蹠縮，無力不能伸展者，海桐散，海桐皮，牡丹皮，當歸熟地，牛膝各二分，山茱萸補骨脂各一分，葱煎服。○

鶴膝風俗云，敵掉風乃腎虛精髓內耗爲風邪所襲皮膚不乘日漸枯瘁，布鶴腳之節宜。腎氣丸加五加皮鹿茸牛膝。○身軟肉少皮膚自離飲食不進爲肌膚四肢君子湯陰皮丸遍身筋軟者鹿茸四斤丸加當歸青鹽各等分。○口敵語遲，嬰兒在胎母卒有驚怖驚氣乘胞絡之經使生子心神不足古本不通四五歲猶不能言菖蒲丸石菖蒲入參麥門冬遠志川芎當歸各二錢乳香硃砂各一錢爲末蜜丸麻子大每半丸米飲下。○諸病後不能語者鷄頭丸雄鷄頭一箇鳴蟬三箇狼灸焦木黃川芎甘草各一兩人參木通各五錢當歸黃芩遠志麥門冬各三分爲末蜜丸小豆大每五丸空心米飲下夕服取效。○齒遲因血氣不足則髓不能充骨宜腎氣丸或十全大補湯加知母黃柏外用當歸川芎芍藥山藥沉香甘草各等分爲末，掺齒齦上仍可白湯調服。草方雄梟屎廿粒每日用一粒揩齒齦上至廿一日當生。○髮遲乃血氣不能上榮，蓬朮丸肉蓯蓉川芎當歸芍藥熟地各等分胡粉減半爲末蜜丸黍米大丸十九黑豆煎湯下仍磨化抹頭上。○已上皆因寒受不足或因吐瀉後致者可以補助脾胃失治必成無辜篤疾。

五硬強直本風症若兼腹硬兼積醫五硬者頭項四肢強直宜冷乃肝受風邪
擴散加烏藥姜桂積消氣和則愈若心腹俱硬面青者死

○丹毒附胎瘡

丹毒遊行走遍身病因濕熱逼心君丹名不一皆由母食
或不甚乾卽着濕熱侵淫心火驟盛以致毒與血搏而風乘之所以赤腫遊走遍身不定其始發於手足或頭面胷脅令人煩悶腹脹其熱如火痛不可言若八小腹陰囊如青傷者死按毒涼肌審起處治法
針砭去血外用殺毒涼肌之藥敷從頭項上起用葱白然汗塗
○從頭項上紅腫痛用赤小豆爲末鷄子清調塗從面上赤腫用竈土末鷄子清調塗
白皮末脂調塗從兩背赤腫黃色柳木燒灰水調塗
○從兩脇虛腫用生鐵剉末入猪糞水調塗從兩脚赤腫起用乳香爲末
匙用梅榔爲末米醋調塗從兩脚赤腫起用乳香爲末

羊脂調塗○從兩脚赤白點起用猪槽下土爲末滑油調塗○從陰上起用羣漏屨土爲末羊脂調塗○錢氏通用
朴硝土硃爲末藍葉桑芽水苔同研終日調塗或用朴硝
一丁兩大黃五錢爲末新汲水調時時塗掃○凡丹毒變易
移輕如經三日不入裏內消可救久紅內消散救之紅內
治攻入臟腑卽死入裏內消氣入裏腹脹則死
消當歸茄片或茄蒂亦好甘草羌活黃芩各五錢麝香五
分爲末每二錢生地黃煎湯調服○通用五福化毒丹犀
角消毒飲四順清涼飲入參敗毒散加葛草或休麻蕷根
湯加白朮茯苓木香枳壳太極以清心火去寒熱爲主勿
令毒陷有不可服
涼藥者惺惺散炒胎瘡必先化其毒次用父便刷如神
歲生瘡遍身先服五福化毒丹或犀角消毒飲外用父小
便鴉翎蘸刷濕者青黛末乾糁更與丹毒通用條參看

○內傷乳食類

吐瀉

五疳

諸積

癬病

腹脹

脹痞

脹黃

腹痛

八痢

乳散

喘

屎白

汙多

○吐瀉

吐瀉初生怎可當

脾虛

則瀉胃虛

則吐

脾胃俱虛

吐瀉不

止夕則變成慢驚與癆

○初生惡物未

下但嘔

黃升

者木瓜丸

本瓜膩粉木香

檳榔

麝香各等分

爲末

麵糊丸

小豆大

每一二丸

甘草煎湯

下斯

初生呴瀉

不足者

珠砂片

硃砂南星

巴霜各等分

爲末

糊丸

黍米大

每二丸

薄荷煎湯灌服

正之後以

硃砂煎

調乏硃砂

二錢

藿香三錢滑石五錢丁香十四粒

爲末

用新汲水一盞麻

油滴成花

抄藥五分在上

須臾

墜下澄

去水別用溫水

下斯

初生吐瀉壯熱不思乳食

大便色白或不通者

停乳也

先宜紫霜丸

正之後用

香橘餅

木香橘皮青皮各二錢半

厚朴神麌麥芽砂仁各五錢

爲末蜜丸

芡實大茲丁丸

紫蘇煎湯米湯任化下

或加內豆蔻

調子一丸

冷積泄俱

效治者先分身熱涼寒

吐腥臊瀉青白

熱吐酸臭瀉色黃

初生及齶長嬰兒

吐瀉以身涼面黃瀉

青白吐腥臊者爲

內傷寒乳或外感風寒

以身熱面赤瀉黃赤

吐酸臭者爲

內傷熱食或外感暑熱○古方吐瀉身寒者觀普散○吐瀉身熱作渴者鐵氏白术散○吐瀉身溫或乍寒乍熱不思乳食或食乳難化太便青白此上實下虛也先宜益黃散後宜四君子湯隨五臟見症如渴如吐瀉肢厥顛憎加藿香丁香脾虛生風多困加半夏曲及冬瓜子少許驚啼寒癰疊卧不安加全蝎鈎藤白附子赤白術加歸芍粟米白術加乾姜栗泄加陳皮厚朴傷風加川芎挾風芎防風羌活細辛發渴加乾葛枳杷葉及木瓜少許

必定增寒熱

傷風多作吐瀉風木好侵脾土故也外症必

先服大青膏或鈎藤散發散後服益黃散補脾冷者先服益黃散補脾後服大青膏或鈎藤散發散如吐瀉或瀉完穀者乃傷風甚也本半夏湯

被濕腹脹濶不長利平胃散主之虛者異

濕多身重腹脹小承气不散○壯熱體重吐酸瀉利者濕兼熱也羌活荳芩蒼朮甘草等分水煎溫服

攻散○吐瀉作渴溺溢者五苓散

白色不渴者益黃散暖痛有理

多腹痛暑必渴

寒月吐瀉白色不渴者益黃散暖痛有理

肢冷加附子○久不正者沒石子丸

治右子 丁箇 白芷 茼蒿 五齒 諸子 二商木 香黃 連各 一錢 為
末 飲 丸 麻子 大 每十五丸 米飲下 兼治 痰癆 釀鴟 ○ 暑月
吐鴟色 黃引飲者 誘 行丸 或 玉露 丸 石羔 寒水石 各 一兩
甘草 五錢 為末 糊 丸 黃豆 大 每一丸 冷水下 吐不 止 姜湯
下 又不 止者 古蓮柏 丸 黃連 黃柏 各 一兩 為末 入猪膽
汁 內 煮 丸 素豆 大 每廿丸 米飲下 ○ 挑論 二症多見於夏
秋如立夏前後濕熱時 行暴 吐鴟者 蘇葛湯 夏至後 吐鴟
身熱或傷乳食 鴟深 黃者 益元散 合四苓散 加 蒼朮 為末
溫水調服 夏暑後 吐鴟身溫或傷乳食 鴟黃白者 食前服
益黃散 食後服 益元散 立秋後 吐鴟身寒不食多睡多噦
不渴者 頻服 益黃散 少服 益元散 秋分
後 吐鴟身冷不食 鴟青褐色水者 益黃散 鴟臭喰乳食必傷
內傷乳食不化 面黃腹脹 鴟如抱囊鶴死臭者 胭乳食舟
丁香木 香青皮 肉豆蔻 三稜 薤木 各等分 為末 糊 丸 麻子
大 每五丸 米飲下 小便不清者 胃冷湯 加 肉豆蔻 為丸
米飲下 ○ 腹痛 吐乳者 平胃散 合蘇合香丸 糊 調 米飲下
○ 挑瘀者 二陳湯 加 山楂麥芽 白朮 烏梅熟 加 黃連 寒加
乾姜 ○ 茄子 烧饼丸 黃丹 一兩 或 加 枯梗等 分 為丸



