



#1336609111

v.11

編註醫學入門 四卷下

腰痛

辛 疝氣

辛 脚氣

燥

辛 消渴

辛 燥結

火

辛 脇痛

辛 夢遺

辛 淋

辛 小便不通

辛 小便不禁

辛 脫肛

脾胃

辛 傷食

辛 積聚

辛 蠱瘴

氣

辛 氣滯

辛 衄血

血

辛 吐血

辛 嘔血

辛 衄血

九 嗽唾咯

九 溺血

九 便血

九 衄血

痰

辛 喘

辛 吼

辛 惡心

三 嘈雜

四 噎氣

四 嘔吐

五 飢逆

六 膈噎

八 關格

八 瘕

九 癰

百 顛狂

百 驚悸怔忡健忘

百 咽喉翻蹇音

虛

百 發熱附惡寒

百 汗

百 痿

夏 厥

夏 癆瘵

一 諸虫

三 水嗣



○腰痛

腰痛新久總腎虛

新痛宜疎外邪清熱以則補腎兼理氣血○腰者腎之候一身所恃以轉後

開闢然諸經貫於腎而絡於腰者雖外感內傷種種不同必腎虛而後邪能窺之故不可純用涼藥亦不可純用參

芪補氣痛甚面上忽見紅點入中黑者死外感暴痛寒背拘傷寒必依六經症

見紅點入中黑者死○尋常感肩暴痛不能轉側如寒傷腎者遇天寒發連背拘攣脈沉弦緊再積散加吳萸杜仲桃仁痛甚加黑

牽牛少許肢厥者古姜附湯連肩背濕痛重者熱煩燥又者通氣防風湯摩腰升品神效法

卑濕兩露後滯為濕所着腰重如石冷如水喜熱物屢不渴便利飲食如故着腎湯加附子傅永沈重小便不利五

苓散淡蒼熟湯腰重痛準角茴散久不已羊牛膠浸酒服青娥丸加華蘚最妙○濕兼熱者長夏暑濕相搏或因膏梁

成濕熱者亦同實者二炒蒼柏散加葉胡防風煎服虛者七味蒼柏散濁赤者五苓散清燁湯健步丸有諸藥不效

灸

若用其遂牽牛大瀉其熱而止乃濕熱甚也古風牽膠膝

方有以并遂末三錢和猪腰子煨熟空心酒下

強難言以顛風熱敗毒散加杜仲二夜閉者并豆湯加續

斷天麻風虛小續命湯加桃仁或烏藥順氣散加五加皮

風挾寒濕者五積交加散用全蝎妙過去蝎獨活寄生湯

若活勝濕湯加味龍見散

或單葳仙烏朮酒調服

內傷失志腰膨脹失志則心血

養筋脈腰間鬱鬱膨脹不伸令人屈羸面黑不能久立遠

行七氣傷倍茯苓加沈香乳香少許虛者當心腎俱補入

參養束湯加

憂怒腹脇痛相須五臟皆取氣於穀脾者腎

杜仲牛膝

氣不行腰痛連腹脇脹滿肉痺不仁沈香降氣湯木香勻

氣散飲食難化者異香散宗筋聚於陰器肝者腎之同

系也怒傷肝則諸筋縱弛腰痛連脇聚香散中調肝散

七情挾外感有表者人參順氣散烏藥順氣散枳朮散加

葱白通用七香丸痰連背脇積難仰濕痰流注經絡背脇

青木香丸立安丸

加南星蒼朮黃柏風加麻黃防風羌活寒加姜桂附子  
 延丹大便秘者龜搏丸食積因醉飽入房濕熱乘虛入  
 腎以致腰痛難以俯仰四物二陳湯加麥芽神麩葛花砂  
 仁杜仲黃柏官桂枳椇痛甚者速効散續聚者加味龍虎  
 散濕熱者七味  
 蒼柏散清燥湯閃到痰逆夜偏呼  
 閃到跌撲墜墮以致血  
 血順氣實者林仁承氣湯或大黃生薑等分水浸一宿五  
 鼓服之夕散補陰丸加桃仁紅花或五積散去麻黃加茵  
 香木香檀柳連脇痛者  
 復元通聖散加木香  
 作勞血脉難週養  
 勞力傷腎者黃  
 歸杜仲或四物湯加知母黃柏五味子杜仲吞大補陰丸  
 熱者獨活湯勞心者養授天王補心丹杜仲煎湯下  
 勞慾悠悠或軟如  
 房慾傷腎精血不足養筋陰虛悠悠痛  
 不能運用者九味安腎丸加杜仲鹿茸百倍丸  
 殊丸加鹿茸木瓜當歸續斷或煨腎丸猪腎酒

○疝氣

病本濕熱標則寒

醉飽勞役房欲忿怒動火火鬱久則生濕津液疑為痰瘀流入肝經肝性急速

又暴為外寒所束是以痛甚有專言寒者論其標耳大要

熱者遇熱則發二便赤澀小腹肛門俱熱外腎累垂玉莖

挺急寒者遇寒則發二便皆利脇腹清冷外腎緊縮又

有冷熱不調者外腎小腹或冷或熱二便或閉或利小

腸膀胱總由肝

其標末而言其實主於肝也蓋肝環陰器

而上入小腸又肝腎所屬於下與衝任督相附腎與膀胱

為臟腑其氣相通運為外腎系於華丸此二經相連相會

然肝主筋華丸雖名外腎非厥陰環而引之與玉莖無由

伸縮在女子則為募戶經云邪在小腸連華丸係屬於腎貫

肝絡肺心系氣盛厥逆上衝腸胃蕪所散於有結於臍惟

取厥陰以下之及論三臟脉皆以滑為病每云風病者非

外風也乃肝木陽騰氣動之風論三陽病發寒熱言膀胱

非受病之處必傳於肝而後為病又明堂穴法治疝皆厥

陰部分可見病主肝經○小腸多氣少血之經忿怒憂思

起於肝而心氣因之鬱結心與小腸為表裏腹外氣聚無

出攻及膀胱腎納氣房勞過度敗精蓄為水氣滯入裏

胞絡負氣膀胱氣脹然皆肝所主也所以病發不特外腎

小腹作痛或改刺腰脇或遊走骨背或搶心痛或連臍痛

男子遺精女久不月令人羸瘦少氣洒淅寒熱食少嘔吐

吞酸久則遂成暴吐其則角弓反

張發牙戰汗冷汗流不止者難治

大綱囊痛引小腹

痛者有連小腹痛者感及觸怒則壅物逆上

囊根心和氣平則壅物自循管系歸入囊中

水筋氣血孤

癩寒按之依水聲得於醪酒行房遇外邪結於囊中

筋如黃瓜在小腹兩傍俗云便毒得於春夏大燠氣勞於使

內血滲入得囊結氣癰腫

氣病上連腎俞下及陰囊得

於號與忿怒氣鬱而脹或勞役坐馬致被腫脹備有大小

者難治○孤疝狀如仰瓦即入小腹如披之畫出穴而

弱夜入穴而不溺亦與氣疝大同○癩疝有�種註後○

寒疝囊冷結硬如石陰莖不舉或控筆丸而痛得於寒濕

便內過勞久而無子此七疝之各從經旨也餘皆謬妄不

痛

取九疔久則成積盤附臍  
之上上下左右為疔為癥  
陰癩腫痛硬如石

如石○腸癩即小腸氣吊外腎偏墜腫痛○如癩玉莖腫  
硬引臍絞痛甚則陰縮肢冷囊上生瘡成癰二症出水不  
止者死○氣癩素有濕熱因怒激起相火昏眩手搖如狂

面黑華毛能左右相過氣抽黃連梅石丸寒冷者五橫  
散蟠葱散當歸四逆湯木香芍氣散青木香丸柴萸肉消

丸黑錫丹○水癩外腎腫大如斗如升下痛不痒得於單  
濕五苓散加小茴韭汁為丸果作茹湯熱者三白散橘核

散久者橘核丸硬木不通腫偏丸此又言癩疔之中有示腎者有  
偏墜者○木腎堅硬頑痒不痛

乃心火不下降腎水不溫活腎丸四製菜萸丸四炒川練七  
或單用雄指樹葉不結子者是晒乾為末酒糊丸種子大

每五十九空心益酒下又有跌傷驚氣與敗血攻入者當  
消瘀血○偏墜腫有大小偏左多瘀血怒火或腎氣虛橫

偏右多濕痰食積是知癩疔症兼七疔治宜詳審故特抽  
言之外治藥腰膏○小兒偏墜此丹皮散○婦人子宮寒

言之外治藥腰膏○小兒偏墜此丹皮散○婦人子宮寒

言之外治藥腰膏○小兒偏墜此丹皮散○婦人子宮寒

出有寒濕者澤蘭葉散金液用有熱則不  
固者小葉胡傷合四物湯加龍膽草青皮治詳內外宜疎

利病雖濕熱然生於陰起於下四氣每先傷足三陰部分  
所以遇外感而發○風症小腸陰筋走注痛甚有汗身

痛身重桂枝湯有泄者四君子湯加羌活附子○寒症心  
痛筋縮肢冷食已則吐古施附湯五積散加吳萸小茴及

食鹽少許四製萊菔丸礞石丸○暑症小腹脹急瀉瀉香  
茹散加瞿麥木通○濕症身重小便不利大便或澀五苓

散最效濕熱入裏暴痛難當者加減柴苓湯加減八正散  
濕盛者煎水片二白散或復元通聖散加黑丑虛者十味

蒼柏散在表有寒熱者柴胡桂枝湯○七情病乍滿乍減  
濕熱者氣痛飲古更連丸寒冷者蠶豆散生料木香白氣

散○通用五苓散猪苓澤瀉分陰陽以和心與小腸白朮  
利腰膝間濕及死血茯苓利膀胱水不得桂則枯故用以

伐肝木風換桂枝羌加紫蘇生薑鹽少許暑加白芍濕加  
白朮小腸氣加小茴膀胱氣加金鈴子橘核腎氣加檳榔

木通消痰瘀積補虛煩○凡病痛走注無形屬氣痛有常處  
有形乃濕痰食積瘀血下聚而成

○痰痲海石香附二味姜汁調服痰飲食積昔守劫在  
 食積熱血者拖挑枳查散失矣散食積按熱者積痲丸食  
 積按虛者八味茴香丸○虛痲暴痒四君子湯加川練子  
 茴香枳實山查山拖按之不痛者加肉桂姜汁按之不定  
 者用桂枝烏頭山拖為末姜汁糊丸姜湯下大能却痛又  
 者三黃內消丸九虛痲不宜預補經云邪之所湊其氣必  
 虛留而不去其病則實必先瀉其所蓄之熱而後補之是  
 以諸方多借巴豆氣者此也虛甚上為吐逆下有遺精者  
 危要知濕熱為病俱宜瀉南補北不可妄用剛劑○久成  
 癥瘕腹滿氣積如臂者白芍散或理中湯加阿魏腹痛有  
 塊盤膈傷者聚香飲子葫蘆芭丸腹痛有塊附膈下者去  
 鈔丸欲作奔豚者茯苓桂枝湯奔豚痲痛者大七氣湯加  
 炒牽牛○通用二陳湯加姜汁積加枳實山查熱加山拖  
 痛加橘核痰血加玄胡索桃仁蘇加木香茴香川練子痛  
 甚加乳香沒藥荔枝核腎大如斗加茴香青皮昆布海藻  
 為丸服水煎加猪苓澤瀉以逐水筋痲加黃連白朮茯苓  
 以降火血痲合四物湯以調血不愈清肝益榮湯或清暑  
 益氣湯氣痲加柴胡青皮香附行氣狐痲加青皮香附蒼

木逐氣流經更以蜘蛛十四枚桂枝五錢為末蜜九米飲  
下癩疔加白朮蒼朮猪苓澤瀉煎調荔枝散寒疔加吳萸  
姜桂溫散○常用辛平破血消痰積之劑橘核散辛溫散  
氣溫散之劑五炒川練丸四炒川練丸金鈴丸四味茴香  
散古玄竭散辰砂一一新  
丹神聖代針散選用

### ○脚氣

脚氣須知有濕乾脚氣內經各厥兩漢各緩風初病不覺  
類傷寒但初起則卒然脚痛發則旬月又作為異○濕者  
筋脉弛長而軟或浮腫或生腫瘡之類謂之濕脚氣宜利  
濕疎風○乾即熱也乾者筋脉膝縮癢痛枯細不腫謂之乾脚氣宜潤血清燥內因食積外風寒  
內因好食乳酥醃酒濕熱下流肝腎加之房勞故富貴之  
人亦有脚疾外因久坐久立濕地或貧苦跋涉山溪瘴毒  
夏月則感濕熱之氣發則四肢多熱冬月則感濕冷之氣  
發則四肢多冷加以當風取涼汗出洗足醉後入房故成

此疾外感止於下脘腫痛內傷或至手  
節週身初起察其起處隔蒜灸之最妙  
濕勝則腫除熱湯加檳榔防已腫者紅花蒼柏丸肥人

加痰藥赤裂腫痛甚者用耳遂為末水調敷腫處另用耳  
草煎湯服之立消或敗毒散加蒼术木黃搜風順氣丸

濕兼寒則痛五積散不換金正氣散附子六物湯勝駿丸  
○濕兼風則走注不常烏藥順氣散地仙丹甚者用赤芍

草烏等分酒糊丸服以劫之挾瘀血者復元通聖散合消  
風散○濕兼熱則腫痛異常加味蒼柏散二妙蒼

柏散清燥湯○食積濕痰下注者檳榔蒼柏丸 虛火軟  
緩痺且頑 軟痺者乃膏梁火乘肝腎以致血氣溢則痺厥

順氣丸然腎主骨虛則骨軟陽虛附鹿四片丸陰虛虎潛  
丸腎氣丸脚軟筋痛者太補陰丸去地黃加白芍知母耳

草倍牛膝肝主筋虛則脚膝頑麻養  
真肝腎脾俱虛者五熟三置丹 在下并之衝上降

氣在下隨氣血痰藥中加防風蒼术并提其濕衝心則恍  
惚嘔吐不食脉乍大乍小者死宜木香流氣飲或蘇子降

氣在下隨氣血痰藥中加防風蒼术并提其濕衝心則恍  
惚嘔吐不食脉乍大乍小者死宜木香流氣飲或蘇子降

氣湯吞養正丹有火者四物湯加黃柏以降之再用附子  
 未津調塗湧泉穴引勢下行入腹不仁喘急欲死者木薑  
 散腹脹煩燥者松節湯入肺喘咳小青龙湯加檳榔入肝  
 頭目昏眩喘滿逼促官燕平氣散入腎腰脚腫脹小便不  
 利日額皆黑左尺絕者死牛膝散加大黃救之如少陰腎  
 氣入心乃水尅火也急宜入柴九救之有脚氣寒熱足腫  
 心煩體痛垂死者杉節湯不食加砂仁青皮木瓜外用桃  
 柳桑椹楮五枝煎湯洗之消腫佳痛須先喫酒三五盃最  
 忌熱藥蒸泡恐逼邪入經絡  
 故治脚以疎通氣道為佳  
 表汗裏下任湯丸濕熱流注  
三陰經絡  
 火鬱成毒腫上于三陽寒熱嘔惡身痛且重者左任湯主  
 之或香蘇散加木瓜檳榔七情丹加五加皮木香痛加赤  
 芍忍冬藤婦人加當歸三陰裏症胃滿怔忡通體轉筋  
 二便閉澀或自利者若結蘊滯湯除濕丹導水丸搜風順  
 氣丸拔痰者三花神祐丸挾食積者開結蘊飲丸裏虛  
 者獨活寄生湯換腿丸表裏兼見者左任湯加大黃  
 跟痛轉筋皆血熱亦有痰火及風寒脚跟痛有血熱者四  
物湯加知母黃柏牛

丹

丸

膝有痠者五積散加木瓜或開結道飲丸  
 脚轉筋有血熱者四物湯加酒芍紅花有筋動於足大指上至大腿近腰結了者此奉養厚因風寒而作又當加蒼木南星感濕者除濕丹常用松節二兩乳香一錢慢火焙存性為末每一錢木瓜煎酒調服有裸上生一孔約深半寸至下半日疼異者此濕毒注成漏也用人中白炙出水滴入瘡口

△燥類

○消渴

消渴先明氣血分

經曰二陽結謂之消渴二陽者手陽明大腸主津液足陽明胃主血津血不足

發為消渴又有燥結者肺與大腸為表裏也有氣分渴者因外感傳裏或服食僭燥熱耗津液喜飲冷水當與寒涼滲劑以清利其熱熱去則陰生而渴自止矣有血分渴者因內傷勞役精神耗散胃氣不升或病後胃虛亡津或餘熱在肺口乾作渴喜飲熱湯當與甘溫酸劑以滋益其陰陰生則燥除而渴自止矣  
 總是大炎不必

問、消者、燒也。如火烹燒物理者也。三消上中既平不復傳下。上輕中重下危。總皆肺被火邪薰蒸日久氣血凝滯。故能食者未傳癰疽水自溢也不。能食者未傳脹滿火自炎也皆危。上消引飲便如常上焦

心肺煩燥舌赤唇紅少食引飲小便數者四物湯合生脉散。天花粉地黃汁藕汁乳汁酒客加葛汁能食者白虎加參湯不食者錢氏白朮散清心蓮子飲又膈滿者謂之膈消門冬飲子火留肉分變為癰腫者忍冬藤丸黃芪六一

一湯益元散中消善饑無屎糞熱蓄中焦脾胃消穀善饑不甚消小便赤數大便硬者四物湯

加知母黃栢石羔黃芩滑石以降火熱甚者調胃承氣湯三黃丸初病寒中陰勝陽鬱後變為熱中者升麻葛根湯

瀉黃散濕積毒者消渴痞丸虛者錢氏白朮散便閉者當歸潤燥湯泄瀉者白朮芍藥湯上中二消者蘭香飲子心

火乘脾者黃連猪肚丸肝侵氣衝肌熱不食食即吐咽者烏梅丸鐵粉丸有虫耗其津液者單苦練湯水停於下變

為臍腫者五苓散或腎消溺濁陰莖強熱伏下焦腎分精竭引水自救隨即

去桂加入參元妙

溺下小便混濁如膏淋然腿膝枯細面黑耳焦形瘦者四  
 物湯加知母黃柏五味子玄參人乳汁善調水火或補陰  
 九腎氣丸先坎離丸八味丸去附子加五味子玄參虎骨鹿  
 尾丸夢授大主補心丹威靈丸妙香散單藜系湯或十全  
 大補湯去桂倍地黃加知母黃柏上熱下冷者清心蓮子  
 飲○有五石過度之人真氣既盡石氣獨留陽道與強不  
 交精泄者謂之強中小便或油膩或赤黃或泔白或濁而  
 且利或渴而不利或不渴而利飲食滋味入腹如湯沸雪  
 隨小便而出落於溝中結如白脂肌膚日瘦者無治法  
 保肺滋腎脾自運養肺降心  
 夕則滋腎養脾蓋本在腎標在肺腎煖則氣上升而肺潤  
 腎冷則氣不升而肺焦故腎氣丸為消渴良方也然心腎  
 皆通乎脾養脾則津液自生參苓白朮散是也三消通用  
 卑文蛤為末水調服回津止渴單凡葵根丸消渴神藥大  
 忌半夏燥劑○抑論水包天地人身臟腑亦津液真水所  
 包然有形者凡水也兌也坤也無形者天一所生之水氣  
 也坎也乾也能以無形之水沃無形之火是謂既濟雜病  
 渴多虛熱實熱者少凡渴後忌針灸令瘡口出水而死

燥結

燥結兩字亦有辨

燥有風燥熱燥火燥氣血虛燥諸燥門結有能食脉實數者為陽結不能食脉

弦微者為陰結亦有

燥潤結通無後患

燥屬少陰津液不足辛以潤之結屬

太陰有燥糞者以瀉之凡結後仍服潤血生津之劑免其再結再定愈傷元氣

濕鬱脹滿熱有時

濕熱佛鬱心腹脹痛有車積者橫痃丸凡燥結有時者為實無時者為虛有藥不盡者大小便閉氣脹如鼓者三和散合三黃湯飲食毒者

香連丸胃火者白朮湯

津少臟寒七情憤

津少因發汗利小便過多及產

後失血等症血液枯者五仁丸增氣丸大補陰丸或導瀉

通幽湯加橫痃條全陳皮氣虛者參仁丸補中益氣湯挾

七情者古越流丸臟寒則氣溢臟冷則血枯有痰癖冷

氣結滯者古半硫丸古姜附湯五積散水冷與之其病雖

宜服陽藥若大便不通者亦當暫與潤劑微通大便不令

閉結七情氣閉後重窘迫者三和散六磨湯如脉浮晝

便難者用陳皮杏仁等分蜜丸服脉沉夜便難者換桃仁○痰滯不通者二陳湯加枳壳檳榔宿食秘喘  
 審熱寒傷熱物者二黃丸傷寒物者丁香香脾積丸流行肺  
 氣無遲慢肺與天腸為表裏故也枳梗湯加紫蘇或蘇子  
 弱約束津液不能四布但輸膀胱故小便數而大便難此  
 脾約丸之由制也但脾屬陰虛火燔金耗則肺失傳化充  
 宜滋陰養血在西北壯實者以脾約丸開結可也東南氣  
 血虛者潤燥為主○通用冷熱灸法捲膈法麻油藥法

△火類

○脇痛

脇痛本是肝家病痛引小宜分左右審實虛  
 左右者陰陽

肝陽血陰右肺陰氣陽實者肝氣實也痛則手足煩燥不安  
 安胃小柴胡湯加芍歸白芍蒼朮青皮龍膽草或車黃連

九、虛者肝血虛也。痛則悠悠不止，身目瞞瞞，善恐。如入將捕四物湯，加柴胡、胡梢，或五積散去麻黃，加青木香、青皮。虛甚成損，脇下常一點痛不止者，各乾脇痛甚危，入物湯加木香、青皮、桂心，有火去桂，加山梔，或吳萸水炒黃連。左

為怒火與死血。大怒氣逆及謀慮不決，或外感風邪，皆令肝火動甚，脇痛難忍。古黃連丸當歸龍薈

丸輕者小柴加黃連、牡蠣、枳殼。瘀血必歸肝，經夜痛或午後發者，是小柴胡湯合四物湯，加桃仁、紅花、乳沒，痛甚

者古枳芎散便堅，黑者桃仁承氣湯，或瀉青丸。皮痛吐血者熱傷肝也。小柴胡湯加芎歸、生地，外用韭菜熨脇及現

拍膏。右食痰飲七情居。食積脇下如扛掇，起一條作痛神保。枳實煎湯下，輕者保和丸。

痰飲流注肝經，喘咳引痛者，二陳湯加南星、蒼朮、川芎、柴胡、白芥子，或入青黛、少許姜汁。二匙痰甚者，控涎丹如胃

背脇痛喘急，効悶者瓜蒌實丸。飲水停滯，脇下如插痛者，濃煎葱白湯調枳殼煎散，甚者用傷寒水症治法。

情凝滯，如有物刺痛，氣促嘔吐者，分氣紫蘇飲流氣飲子。調中順氣丸，鬱氣挾食連乳痛者，推氣散、薑煎散、悲哀傷

者根元者散四味根實散一  
提氣丸素有益者越鞠丸

兩脇常兼左右症

濕熱盛則兩脇痛當

歸龍薈丸諸脇痛皆効如痛不可舒伸者用此丸二錢半  
加姜黃桃仁各五錢蜜丸或煎服○外感脇痛寒熱者小

柴胡加枳實丸成積還有餘

脇痛二三年不已者乃痰積  
結成積塊肝積肥氣肺積息

賁發作有時雖皆肝木之餘不可峻攻宜枳朮丸加官  
桂陳皮桔梗甘草蜜丸服或復元通聖散附脇膈方

### ○高遺

夢遺之病全屬心

交感之精雖常有一點白膜裹藏於腎  
而元精以為此精之本者實在乎心日

有所思夜夢而失之矣治宜黃連清  
心飲或十味溫膽湯妙香散定志丸

相火

一動走精金身

之精貴於金寶初因君火不寧久則相火擅權精元一於  
走而不固甚則夜失連連日亦滑溜不已宜先投離片有

火盛精中多有紅絲全溺於桶澄視之便見後不信無夢  
生子一歲身生紅絲墻不救宜補陰丸腎氣丸

而遺者念頭將動精先沈

氣宜降精宜升念去凝滯久則莖中痒痛常如

欲小便然或從小便而出或不從便出而自流者謂之遺精此之夢遺尤甚宜草薢分清飲或八物湯真珠粉丸

日久

有虛無寒

水虧火益燥

滋陰降火湯

脾胃濕熱亦相侵

君火失權而相

火乘脾濕與熱合脾土全是死陰少運飲食易於侵犯宜樗栢丸脾虛弱者三灰樗栢丸猪肚丸如原非心腎不交

果因飲酒厚味乃濕熱內鬱中氣不清所化之精亦皆濁氣歸於腎中而水不寧靜故遺而滑也宜補陰藥中加人

參升麻北胡以升胃中清氣更宜節飲食以固命根也意精字從米從青生於穀之清氣也養生者味之固有

年高

虛脫者

四十以後後勞傷氣血不能固守者養榮湯加棗吞單樗皮丸或小兒絲子丸如早年

慾過陽脫者究源心腎丸青娥丸黑錫丹縮泉丸金鎖正元丹氣隔者神芩湯

却無精滿溢而淋

有日年壯久不御女精滿而溢者深為可笑人之臟腑惟氣與血神則主宰其中而無形迹可見精乃一時交感三

焦之火吸撮而成豈先有蓄積於中耶惟節色氣血漸盛而精不消薄理也其不御女而漏者或聞淫事或見美色或思想無窮所願不得或曾入房太甚宗筋弛縱發為筋痿而精自出者謂之白淫蓋腎臟天一以慳為事至意內一在則精全而固去思外淫居室太甚服藥滋陰戒酒色清宜乎滲漏而不拔也單黃柏丸最妙

**心先要斷真淫** 亦有清心靜坐養精神者但好色種子猶益之說以為可以止精不漏然對景忘情實際不復戀乎隈褻之事矣故曰學仙不斷淫蒸砂飯不成養生者慎之通用單五味子膏金櫻膏水陸二仙丹金錢思仙丹艾實丸秋石固真丸固精丸單非子散威喜丸石蓮散金櫻丸

○淋

五淋氣血石膏勞

淋小便澀痛欲去不去不去又來滴滴不斷之氣淋澀滯餘瀝不盡沈香散或不

益元散加苗香木香檳榔之血淋澀痛遇熱則發白薇赤芍等分為末酒調服二錢或犀角地黃湯單車前飲四物

湯加知相選用色鮮者心與小腸虛熱也漢赤散去甘草  
加黃芩色如豆汁者腎與膀胱火也五淋散又有一種小  
便見血而不痛者為溺血非淋也四物湯加山梔滑石牛  
膝或單苦黃菜飲單髮灰散單糖珀散石淋溺有砂石  
莖強痛甚單牛膝膏單鱉甲為末酒調服膏淋血凝如  
膏用黑豆一百廿粒甘草一寸水煎臨熟入滑石末一錢  
空心調服或海金沙散勞淋痛引氣衝遇勞則發痛墜  
及房透膈散勞傷四物湯加知相滑石琥珀虛甚者鹿角  
霜丸熱淋暴淋痛甚八正散或五苓散合敗毒散加味  
石羔湯急痛者六一散二錢加木香檳榔小茴各一錢為  
末服冷淋必先寒慄而後溲便澀數竅中腫痛生附散  
二朮散淋皆屬熱間有冷者外因當風取來冒暑濕熱  
鬱滯胞內痿痺神不應用內因七情心腎氣鬱小腸膀胱  
不利或忿怒房勞忍溺酒肉濕熱下流膀胱干於肝經廷  
孔鬱結初則熱淋血淋久則火渴不渴間差鰲尾熱在上  
燥為砂石淋如湯鐘煎久生燠渴不渴間差鰲尾熱在上  
渴而小便不利者肺中伏熱水不能降宜氣薄淡滲之藥  
清金瀉火以滋水之上涼清肺飲子熱在下焦血分不渴

而小便不利者腎與膀胱無陰而陽氣不化水枯火升宜  
氣味俱陰之藥除熱瀉閉以滋水之下源滋腎丸腎氣丸  
前消渴以渴為主而分氣血故血分亦有渴者此以淋為  
主而分氣血故血分有不渴者但渴而多汗亡津又未可  
以輕也清熱利便人人曉治暑淋熱淋血淋山拖仁開行滋  
滲也

**破東垣高**治膏砂石淋鬱金琥珀開鬱青皮木香行氣蒲  
黃牛膝破血黃柏生地滋陰東垣用藥凡例小

腹痛用青皮疎肝黃柏滋腎  
蓋小腹小便乃肝腎部位  
**小腸澀脹脾經濁**小腹痛滿  
甚者瀉腎

湯火府丹凡小腸有氣則張有血則澀有熱則痛又土燥  
水濁宜四君子湯加滑石澤瀉麥門冬淡竹葉痛者六君

子湯加知柏  
**肝家莖脇刺如刀**肝經氣滯有熱者用甘草  
稍五錢青皮黃柏澤瀉各

一錢水煎服或三味葶藶散莖痛引脇者參苓琥珀湯  
腸痛引腰背者磁石湯虛者清肝解鬱湯清肝葶藶湯腎

**虧惡症精敗竭**腎虛淋瀝莖中澀痛者加棧八味丸以補  
陰小便頻而黃者四物湯加參朮麥門冬

五味子以滋肺腎小便短而黃者補中益氣湯加麥門冬  
 五味子山藥以補脾腎熱結膀胱者五淋散以清熱脾肺  
 氣燥者茶柏二味以清肺若膀胱陰虛陽無生者滋腎丸  
 膀胱陽虛陰無以化者腎氣丸○精敗竭者童男精未盛  
 而御女老人陰已痿而思色以降其精則精不出而肉敗  
 莖中痛澁為淋者八味丸料加車前子牛膝煎服若精已  
 竭而復耗之則大小便中牽疼愈疼則愈欲大小便愈便  
 則愈疼倍附子救之凡此當滋化源不可誤用知相淡滲  
 等劑既瀉真  
 陽復損真陰  
 中虛總難利膀胱  
 中氣既弱不能運通水道  
 下輸膀胱者補中益氣湯  
 凡汗多亡津瀉久胃乾諸瘡失  
 血俱宜滋補不可過利小便  
 痰飲阻轉脬何足異吐提

一法免呼號  
 精痰在肺以致膀胱不通譬之水壺上竅閉  
 則下竅不出宜下  
 康揚探吐或灸百會穴皆  
 以開上竅也蓋膀胱雖主水道而肺金為水之化源也  
 脬系轉戾臍下併急而痛小便不通各日轉脬有因熱逼  
 或強忍小便氣逆脬轉者石散加車前子木通等分  
 煎外用炒鹽熨臍冷即易之○因氣者先用良姜葱白蘇

葉煎湯熏洗小腹外腎肝門拭乾伸脚仰臥後用葵子赤  
茯苓赤芍白芍等分入鹽一字煎調蘇合香丸服之忍  
尿疾走及忍尿飽食者二陳湯探吐忍尿入房者蒲中  
益氣湯提之陰虛兩尺脉絕服諸滑利藥不效者腎氣丸  
陽虛者八味丸或附子澤瀉等分燈心煎服此  
危症也體薄性急人多有之惟孕轉脬見婦人

### ○小便不通

小便不通本實熱

經曰膀胱不利為癰候其鼻頭色黃者  
小便必難腎主水滯於膀胱泄於小腸

實相通也然腎應於心心火盛則小腸熱結熱微則小便  
難而僅有熱甚則小便閉而絕無宜清熱生津為主  
稍散五苓散臍下脹者加琥珀或單琥珀為末蜜丸人參  
茯苓煎湯下或搗生車前子自然汁入蜜一匙調服有利  
大便行而後小便利者八正散加木香熱盛莖中瀉  
痛者薄荷散加山梔大黃或麻子仁丸冷熱熨法

有痰有氣結

虛損久病自汗五內枯燥及諸瘡失血過多  
者人參養榮湯有精竭下痛莖痒者八味丸

有虛

有胃弱不能通調水道下輸膀胱及氣虛者四君子湯加  
 黃芪升麻有脾枯亡血及勞傷血虛者四物湯氣血俱虛  
 者八物湯○痰涎阻滯氣道不通者導痰湯加木香香附木通俱先服一  
 劑氣結閉竭不通者二陳湯加木香香附木通俱先服一  
 劑後煎查探吐以提其氣氣升則水自  
 降矣實熱砂糖調牽牛末一二錢探吐  
 上熱者導赤散加黃連燈心下虛者  
 滋腎丸上盛下虛者清子蓮子飲  
 即寒淋小便痛引臍腹上有清涕着腎湯熱者馮腎湯  
 ○腸痺乃強泄小便閉澁津液偏滲後便宜分利而已

○小便不禁

小便不禁不自覺赤者為熱白者虛

實熱乃膀胱火動四  
 苓散合三黃湯加五

味子山茱萸少許虛熱四苓散合四物湯加山茱升麻  
 虛乃腎與膀胱氣虛亡全大補湯加益智仁或縮泉丸六  
 兔絲子丸二苓丸遇夜陰盛愈多內虛自汗者秘製丹內  
 虛濕熱者腎氣丸八味丸戒澤瀉附子加五味子杜仲故

紙倍山茱萸內虛寒冷者古桂附湯木皮絲子丸加肉桂心脾勞者頻頻少輕於不禁香散桑螵蛸散勞役傷脾者補中益氣湯脾約症見傷寒不約多遺或溼餘則膀胱不約便溺自遺或尿後餘瀝皆火盛水不得寧治宜補膀胱陰血瀉火邪為主而佐以牡蠣山茱萸五味子之類不可溫藥古方補陰丸最妙婦人產後傷胞小兒胞冷鷄肝散主之

○脫肛

脫肛全是氣下陷

難經曰病之虛實入者為實出者為虛肝門脫出非虛如何勞倦房慾過度及

產育用力冬痢久瀉小兒叫呼耗氣俱有此症宜參底芩歸升麻水煎服血虛加芍藥地黃厚寒加炒黑乾姜虛按熱者縮間有熱者病乃暫熱則流通意也氣熱者用條芩

者四物湯加黃柏升麻風邪者敗毒散暑熱者黃連阿膠丸薄荷煎大補肺腎兼升提肺與

爲裏肺熱則肝門閉結肺寒則肝門脫出必須溫肺  
 補腸胃宜補中益氣湯加訶子檉皮少許或升陽舉經湯  
 蠟皮散釣腸丸挾濕熱者升陽除濕湯有兼痢者四  
 物湯加槐花黃連升麻有腎虛者腎氣丸八味丸  
 敷藥洗藥亦可攪

△內傷類

○傷食

傷食惡食分上下次審寒熱行吐瀉胃痛噎噎心口腹

疼發熱

胃有伏火或似瘧痢

皆因食不化

停於上脘氣壅痰盛者宜吐如傷冷食腹脹氣逆噎

氣吞酸惡心欲吐不吐宜平胃散入鹽少許探吐如傷熱物或酒麪發熱心口刺痛停痰停飲伏火宜二陳湯加黃連枳實探吐傷重填塞胃中下部無脉體實年壯者方敢以手探吐尋常飲食過飽在膈以手探吐爲好停宿中

下脫者宜下以逐之如傷冷物腹脹痛者木香見現丸

下香脾積丸感應丸如傷熱物痞滿者二黃丸日晡潮熱

盛者小承氣湯寒熱兩傷者大黃備急丸除原散體弱者

下藥兼補保和丸凡傷食乃中焦血病如牽牛猛烈傷氣

及一劫峻攻反傷胃氣又現有吐者二陳湯加砂仁黃連

青皮枳實現有瀉者胃苓湯加山查麥芽或三白湯隨時

令寒暑選用如身受寒氣口又傷冷初得便

宜辛溫理中稍久鬱而為熱當兼辛涼散之吐下未淨消

導之紅丸子枳木丸保和丸大安吐下已虛補益借四君

木君子湯補中益氣湯酒客分清與調中飲酒與水過者宜上汗下

微沫即愈參劑五苓散調中二陳湯如久困於酒或傷灰

酒成積腹痛大便窘迫者酒蒸黃連丸香連丸如傷酒嘔

逆眩暈頭痛如破者補中益氣去白朮加半夏白芍芍栝

乾葛川芎有塊者更加莪朮木香如善飲每早長嘔不吐

若小調中湯最妙一月三五次服之亦可為丸如醉飽行

房以致蓄血胃口時痛者大調中湯或八物湯加砂仁之

類有痛飲不醉忽糟粕出出前數尿溺出後發者四物湯加  
 海金砂木香檳榔木通桃仁數服可安。喫茶成癖者星  
 木九憂思鬱抑藥兼霸附炒黃連白芍姜汁蒸餅糊丸服全  
 不食者溫膽湯神效憂思兼傷食者木香化滯湯。瘦倦  
 氣抑不食者二炒蒼朮散加香附白芍陳皮半夏黃連扁  
 栢等分白朮為君姜汁炒丸服濕痰  
 氣滯不食者三補丸加蒼朮倍香附

○積聚

五積六聚皆屬脾

經曰積聚癥瘕痞滿皆太陰濕土之氣  
始因外感內傷氣鬱醫誤補而留之以

成積。積者陰氣五臟所主。脈沈伏或左或右發有根痛  
 有常處。肝積左脇下曰肥氣言風氣有餘而血隨氣不行  
 也。令人脇痛痠瘕。心積臍上曰伏梁言如梁之橫於心下  
 令人煩心。乃火之鬱也。忌熱藥與炙。又腸癰與此相似。但  
 身股背腫環臍而痛為癰。脾積胃脘稍右曰痞氣言陽氣  
 為濕所蓄也。令人黃疸倦怠。食不為肌膚。仍忌熱藥。肺

積右，脇下曰息貫，言喘息而上行也。今人咳嗽肺癰，腎積發於小腹，或委心下曰奔豚。言若豚之奔衝，上下無時也。令人喘逆骨疼，最為難治。諸積勿輕吐下，徒損真氣。積亦不丟，奔豚尤不可吐。五積古有五方，今皆損五積丸更妙。○聚者，陽氣六腑所成，脉流結或隱或見，發無根痛，無常處，散聚湯，七氣湯，承氣丸，大阿魏丸，大安丸，加參。

右中間移不移。氣不能作塊，或聚塊，乃痰與食積死血，有形之物而成。積聚癥瘕，一也。有積聚成塊，不能移動者曰癥，言堅硬貞固也。或有或無，或上或下，或左或右者曰瘕，言假血而成，蠢動之形，且有活性。

死血，芍右氣積。治方：破血為玉海石丸，或當歸龍薈丸，料五錢，加桃仁、姜、黃各一兩，蜜丸。○治右調。

氣，青皮湯，木香分氣丸。有積者，消積正元散，紅丸。子小阿魏丸，或當歸龍薈丸，保和丸，俱加鷓鴣屎。當中痰。

結一團而。中乃水穀出入之路，飲食七情鬱積成痰，百鍊丸，白朮丸，凡痞塊在皮裏膜外，俱宜下陳湯，加。

補氣行有餘消導分新。積初為寒，宜辛溫消導，大七氣湯，烏白丸，大小溫中丸，退黃丸。

氣藥。有餘消導分新。積初為寒，宜辛溫消導，大七氣湯，烏白丸，大小溫中丸，退黃丸。

阿魏撞氣丸久則為熱宜辛寒推蕩木香橫榔丸通玄二  
八丹消塊丸通用纂積丹生膠膏有虫者妙應丸外治三

聖膏三稜煎不足平補是上醫陽虛有積易治惟陰虛難  
神効阿魏散以峻補痞積又忌滯藥止

宜早服滋補藥中加鯨甲龜板秋石丹午服根木丸太安  
丸或醋煎丸善消融化為妙若痞積滯冷貫臍誤為沈寒

痼冷投以姜附熱藥初服甚與病情相宜久則痞積益甚  
真氣傷而陰血燥矣但硫附固不可服如知相閉冬寒涼

傷脾滯氣亦所不宜古云衰其大半而止又云養正積自  
除皆為虛損有積而言也平補之外更能斷厚味節色慾

戒暴怒正思愚庶乎萬全

○蠱瘴 皆因飲食起  
居而得故附

中蠱害人俗不妍 據方書蠱有數種皆妖昧變惑之氣其  
怪使然人有造作而得之者多取虫蛇

之類以蘊盛之使其自相噉食其間一物獨存者則以酒  
肉祭之取出於毒於酒者以害人毒發令人面自青黃

力之身痛嘔吐鮮血小便淋瀝大便膿血唇口乾燥胃腸妨痛腹痛如虫蟻又如虫行病人所食之物皆變化為虫侵蝕臟腑蝕盡則死死則病氣流注復染傍人人死則精魂反為其家代力致富不知有此事否萬病能毒丹東坡雄礬丸主之或於足小指尖處灸三壯即有物出酒飲得之隨酒飯出肉菜得之隨肉菜出凡中蠱毒不論年月遠近但煮鷄卵一枚去壳以銀釵插入外中併入中合一飯頃取出視之釵外俱黑即為中毒一法令患人嚼津於水沈則是蠱浮則非也又法口含大豆豆脹爛而皮脫者是蠱否則亦非也如出外須用預知子置衣領中遇毒則有聲凡中蠱之人用藥已瘥自後飲食求不得喫更有挑冷若飲食帶冷則鬼氣乘之毒虫復生竟不能救

### 生及毒泉

嶺南多有莖生毒者乃水毒於魚肉菜菓酒醋之中以害於人其候初覺胃腹作痛次則漸漸

攪刺痛十日則物生能動行上脘痛流下腹痛在上脘者用膽礬末五分投以熱茶內溶化通口服之探吐在下焦者用鬱金丹末二錢米湯調服瀉下惡物後以四君子湯去其草調之如脇下急腫傾刻生癰大如碗許者用升麻末

二錢茶熱水調連服瀉出如葱根其腫即消後以平胃散  
兼進白粥調之。江南溪澗中有射士毒或因雨潦逐水  
而入人家食沙射人之影得之寒熱悶亂頭目俱痛亦如  
中屍卒不能語又有水毒虫一各溪温得之病同射士但  
有爛瘡為射士無瘡為溪温又有沙虫細如赤虫遇陰雨  
則行出草間著人則入皮裏痛如針刺是三者為病朝輕  
暮重手足冷至肘膝二三日腹中生虫食入下部臍中生  
瘡不痛不痒急視下部有瘡赤如截肉者為陽毒最急如  
鯉魚齒者為陰毒稍緩要皆殺人不過二三日也用蒜搗  
濃汁煎温洗之是水毒身體當發赤斑否則非也當以他  
病調治消水

**瘡氣寒温分内外**  
東南兩廣山峻水惡地濕  
滬熱如春秋時月外感霜

毒飲子主之

毒寒熱曾滿不食此毒從口鼻入也宜清上熱解內毒降  
氣行痰不宜發汗平胃散加苓連升麻北胡桔梗枳壳木  
香木通姜煎服如寒月外感風寒氣閉發熱頭疼自汗如  
瘡南人氣外或曾滿痰壅飲食不進與北方只傷表而裏  
自和者不同宜解表清熱行痰降氣二陳湯加北胡黃芩  
蒼朮羌活川芎水煎服微汗即止如內傷飲食得者理脾

舒肝湯補益氣湯不換金正氣散枳朮丸 匪甚或挾房  
 勞者一粒金丹熱者柴苓湯承氣湯三黃湯合竹葉石膏  
 湯或三黃 不服水土 與瘴同源 平洋土堅水熱山谷土潤  
 枳朮丸

水土風氣冷熱加減或變瘴痢黃疸瘡癩俱於各類求之  
 然以扶脾胃為本凡綠酒色及食魚肉味新菜菓等廠生  
 冷糯飯燒酒及油炒醬燻鷄鴨麩食過饑過飽歇臥處有  
 穢氣半夜失蓋早行沾露空腹出外皆能發瘴仕宦商賈  
 遊外俱宜節飲食謹起居以此防之

△氣類

○氣滯 此即諸氣專抽氣 滯一邊詳言之取

氣滯不行辨久新濕熱痰積是其因

蒼天之氣清淨不息 變為雲霧為雷雨者

濕熱薰蒸也人身元氣與血循環無端彼衝擊橫行  
 於臟腑之間而為疼痛積聚痰癰壅逆於骨髓之上而為

痞滿刺痛等症，多因七情飲食鬱滯，為濕熱成痰，與積初起，宜辛溫開鬱，行氣豁痰，消積久則宜辛寒降火，以除根。

**滯膈痞滿滯下** 秘 氣滯上膈，為嘔咳痞滿，枳橘湯枳梗湯，橘皮一物湯，枳實非白湯，沉香降氣湯。

古身附湯，濕熱者清膈蒼朮丸，實熱者解蓋湯，加知母枳壳，痰火者瓜蒌實丸，食積者枳朮丸，加木香二錢，○氣滯

下焦為腰痛脹墜者，七氣湯加橘核，或木香勻氣散，吞青娥丸，便閉者四磨湯，六磨湯，木香順氣丸，木香檳榔丸。

**滯中刺痛或週身** 氣滯於中，則心腹脇肋刺痛，伏梁痞塊，者神保丸，一塊氣丸，木香分氣丸，阿魏

撞氣丸，古和巴丸，濕熱古黃連丸，更連施石丸，○氣滯於外，則週身刺痛，流氣飲子，主之，或手足浮腫者，三和散，合

五苓散，或五皮散，加桂，青木香丸，散火破氣，錫古法，古法散火之法，必先破氣，氣降則火自降。

矣，但枳壳青皮破滯，要藥，養血補虛，同婦人，男子更勞失血，及婦人產

多服，損入真氣，虛者慎之，月後因氣者，四物湯加木香檳榔，陰虛氣滯者，去木檳榔，加玄參黃柏，或炒烏山施一味入姜汁煎服，開五臟結益少。

陰血最妙。有婦人平時性急，適月事不行，氣填胸膈，嘔惡全不入食，食則吐痰，或有一塊空胃，喉而痛，或一塊如知，繁觸心下疼痛，或腹中塊物動作，致刺腰背，時發開熱，四度乏力，脚不能行，小便白濁，帶下日就瘦弱，全似羸若穀食不入，甜喜果子雜物者，乃有孕也。產前安胎，產後調氣，俱以四物湯主之。○通用二陳湯，上焦氣滯加枳椇，香附，砂仁，中焦加厚朴，枳實，三稜，莪朮，下焦加青皮，木香，檳榔，因怒者加山梔，香附，痞滿加黃連，枳實，痰盛加瓜蒌，臨痛加青皮，柴胡，芍藥，草薢，膽刺痛加枳殼，氣虛加參，木香，喜動加黃連，怒動加柴，胡，思動加芍藥，悲動加黃芩，恐動加黃柏，成瘕不解者，煎吞交感丹。

### △血類

○吐血 此即諸血特

吐血屬胃 審陰陽 盛身熱 陰盛涼 內傷外感及飲食房勞墜悶五臟有傷血

聚膈阻從胃脘出者則為嘔吐從鼻出者則為衄陽盛身熱多渴陰盛身寒不渴然血陰也身寒者易愈陽多

積熱并怒火

陽盛多因飲食辛熱傷於肺胃嘔吐出血大上  
煎飲子主之因酒者古葛連丸小調出湯吐

膿血若名肺疽桔梗湯○大怒氣逆上衝暴甚者四物湯  
加蘇子陳皮沈香童便或茅根煎湯磨沈香服之若血聚

滿膈間則吐者蘇子降氣湯加人參阿膠或暴吐紫黑成  
塊者痰血也雖多亦不妨四物湯合解毒湯調之覺胃中

氣寒者桃仁承氣湯下之五志  
火動熱者解鬱湯虛者保命散陰為心力暴勞傷因勞力

傷氣吐血鮮紅心脈絞痛自汗者四君子湯加黃芪柴胡  
山藥百合前胡姜棗煎服或用蓮心糯米等分為末溫酒

下○勞傷氣虛按寒陰陽不相為守血亦錯行所謂陽虛  
陰必走者是也外症必有虛冷之狀法當溫中使血自歸

經絡如胃虛不能化食其氣逆上吐衄者理中湯加木香  
胃寒不能約血者甘草乾姜湯或七氣湯加川芎自汗者

小建中湯古桂附湯下虛極而氣壅喘嗽血不歸元者黑  
錫丹金液丹○勞力傷肺唾肉有血咽喉不利者鷄蘇散

如心肺脈破血若湧泉口鼻俱出者不治○勞心過度不

能統血反上令人煩悶倦怠者茯苓補心湯歸脾湯古方

治血多以致茯苓神為佐者心主血故也○思色強力入

房勞傷心腎陰虛火動者加棗四物湯凡血越上竅皆是

陽盛陰虛有升無降俱宜補陰抑陽氣降

則血自歸經矣陰盛陽虛者間有之耳 先痰帶血皆痰

熱先痰嗽後見血多痰火積熱化痰降火為急不可純用

血藥恐泥痰也 中棗地黃湯○痰帶血者多胃中清血

熱蒸而出重者 山施輕者監寶 先血後痰虛火倡

花粉化痰 山施牡丹皮麥門冬降火蓋 先見血後痰嗽多陰虛

吐血火病也雖挾痰者亦只治火則止 陽熱涼血與行氣

陰虛補滋自歸藏 凡血不可單行單止蓋血來未多必有

血熱則行宜苦寒涼血為君辛味行氣開鬱為臣升提俾

復其位為佐酸澁止塞其源甘溫收補其後○涼血犀角

地黃湯黃連餅毒湯陶氏生地芩連湯四生丸○行氣枳

梗湯二陳湯枳橘湯古烏附湯○滋補血虛加棗四物湯

昏暈古詩歸湯氣虛單入參湯扶脾生肌散清脾生肌飲  
 甚甚者十全大補湯○止澁古參柏糊狗膽丸單鹿墨丸  
 或單用炒乾姜為末童便調服善能止血降火○久者升  
 提二黃補血湯斷根天門冬丸大阿膠丸女貞丹○還血  
 歸元參苓白朮散四君子湯腎氣丸瓊玉膏○抑論血疾  
 陰火誤用陽燥熱藥則血枯瘦怯癆瘵成矣勞傷誤用寒  
 藥則胃滿膈痛血愈鬱矣墜墮閃到誤行補澁則瘀蓄於  
 胃心下脹滿食入即吐名曰血道古法以二陳湯去茯苓  
 甘草加赤芍等分投之  
 此血疾難調最宜斟酌

○嘔血

嘔血與吐無大異成益無聲者為吐成碗有聲者為嘔 怒火暴甚不可當怒

逆甚血溢口鼻當抑怒全陰并桔湯加 氣虛發熱咽喉痛參芪歸地

熱者解鬱湯虛者保命散許或單黃柏蜜灸為末麥門冬煎湯下 血虛熱熾滋降

良二加減四物湯主之

衄血

衄血熱溢肺與胃  
肺竅於鼻鼻通於腦血上溢於腦又行  
清道所以從鼻而出兼以陽明熱鬱上

行則口鼻俱出大熱衄血者用萱草  
去根搗汁一盞生薑汁半盞和勻服  
涼血行血治同古人

方初宜黃芩湯加鬱金或茅花冬青子止之久宜清肺生  
疎飲苦梅丸古天地膠有鬱者古菝葜散因鼻流涕久

成衄者防風散或犀角地黃湯凡初衄不可遷止去多恐  
量急用百草霜末三錢水調服仍取一捻吹鼻中或用人

中白末湯調服更加髮灰一錢麝一字仍用少許搐鼻立  
止或將患人頭髮分開井水濕紙頂上搭之亦好如鼻乾

燥以麻油滴入潤之如吐衄太甚不止防其血暈用茅根  
燒用酒醱酒之令鼻嗅氣以過其勢或驀然以水噴面使

帶驚則止此法非特衄血雖上吐下便  
九竅出血者亦效止後隨症虛實調之  
諸般血藥不能正

必熱氣鬱血無藏  
來血散火藥不効者古法  
等散燥者單天門冬膏

○嗽唾咯

嗽痰帶血本脾經  
虛者六君子湯加桑白皮黃芩枳  
壳五味子有火者加截道遙散 有咳

屬肺恐難  
火升痰盛身熱者鹿腦鷄蘇丸鷄蘇散滋陰  
降火湯古百石膏黃連阿膠丸虛者二陳芍

歸湯八物湯或二陳湯加嫩桂桑白皮杏仁桔梗知母貝  
母阿膠生地山柰蓋嫩桂枝能治上焦故也愈後調理玄

霜膏咳血咽  
倉穀不洽 血隨唾出自腎來  
滋陰降  
痰血聚肺火相煽

帶中紅絲乃  
是肺痿難治 咯出血屑瘡為咯血或帶紅絲細如線  
有血  
在咽

下咯不出者甚咯則有之者此精血竭也四物湯加竹瀝  
姜汁童便青黛或聖餅子地黃膏蓄血在上閉塞清道喜

忘者犀角  
地黃湯 此是肺腎真臟傷滋陰降火非偏見

○ 溺血

溺血純血全不痛

血從精竅中來乃心移熱小腸四物湯加山梔茯苓連單麥灰散入麝半釐淡苦

酒湯下單苦實

暴熱實熱利之宜

煎服實熱者承氣湯加

當歸下之或小劑飲子後以四物湯加山梔調之心經熱者導赤散暑熱者益元散升麻煎湯下或五苓散

虛

損房勞兼日久滋陰補腎更無疑

又虛者四物湯加山梔牛膝或單牛膝膏房勞

傷精火動溺血者膠艾四物湯腎氣丸小兒絲子丸虛甚

病久者鹿角膠丸秋石固真丸金櫻膏痛不可忍者單豆

豉一撮煎湯溫服甚効此疾日久中乾非清心靜養不可救也

○ 便血

便血須先分內外

自外感得者曰腸風隨感隨見所以色鮮多在糞前自大腸氣分來也自內傷

得者曰臟毒積久乃來所以色黯多在糞後自小腸血分  
來也又有不拘糞前後來者氣血俱病也皆因七情六淫  
飲食不節起居不時或坐臥濕地或醉飽行房或生冷停  
寒或酒麪積熱以致榮血失道滲入大腸經曰結陰便血  
一陰結一升二陰結二升三陰結三升蓋邪犯五臟則三  
陰脈絡不和而結聚血因停滯溢則滲入大腸陰非陰寒  
之謂也針經云陽絡傷則血外溢而吐衄陰絡傷則血內溢而便溺  
風清熱紅甚則烏寒黯

**毒濁濕不痛**

此屬外感風者色青或結下清血實者入參  
敗毒散加槐花荆芥虛者不換金正氣散久

虛者胃風湯古樗參散廿廿參丸結陰丹○熱者鮮紅用黃  
芩秦丸槐角升麻青黛等分水煎服酒蒸黃連丸香連丸  
蒼地丸龜柏丸挾風者臟頭丸暑月黃連香茹散熱甚則  
黑者解毒湯合四物湯加大黃有瘀血者飛仁承氣湯○  
寒者色黯平胃散合理中湯加葛根升麻益智神麴當歸  
地榆姜棗煎服○毒者病邪蘊久色濁後重疼墜四物湯  
加木香檳榔或四味香連丸○濕者直  
來不痛白栢丸濕熱者古蓮壳丸  
濕癖血箭最難除

原因傷風犯胃，食滯久，而濕毒成癰，注於大腸，傳於少陰。

名曰腸癖，俗呼血箭，因其便血，澀出有力，如箭射之遠也。

又有如篩四散，漏下者，初起濕熱，或發當長夏者，當歸和

血散，涼血地黃湯加木香、檳榔，久而色紫黑者，濕毒甚也。

升陽除濕和血湯，外湯補胃湯，或補中

益氣湯，去柴陳，加芩連、川芎、槐角、枳殼。內傷食積糟粕混

內傷飲食，腹必脹滿，糟粕與血同來，平胃散加槐角、枳殼，

當歸、烏梅、甘草，或通玄、八丹、虛者，六君子湯加芎歸、神

變或六勞傷氣陷鬱悶拘。內傷勞傷元氣下陷者，補中益

氣虛弱，若四君子湯，或單人參湯，加炒乾姜少許。古卷栝

散、古烏、荆丸、煎紅丸、陽虛甚者，格附丹。內傷陰虛血弱

者，四物湯加乾姜、龜板丸、活龜丸、腎氣丸。內傷脾絡下

血者，古連、壳丸、虛者，十全大補湯主之。內傷憂思怔忡

少寐有汗者，歸脾湯，或寒熱脇痛，小腹悶墜拘急者，造造

散、六君子湯，俱加柴胡、山梔，或木香少許。已上藥前俱

加其黃、薑、棗，後俱加黃連，二味須用熱湯同浸，拌濕，再頓液

湯半日，夕令藥氣相和，方炒各棟出，若生則偏寒偏熱。

初起和血祛風濕

常歸和血散或赤血地黃湯實者槐角丸黃連阿膠丸虛者加味槐角丸四物

枝離丸通用四物湯祛風加栝葉防風荆芥秦艽槐花

蠟皮黃芩地榆枳殼甘草者加升麻柴胡提之解毒加

槐花栝葉荆芥枳殼芍藥連近血加檳榔枳實槐花條芍瀉

大腸火遠血加木通吳萸炒黃連瀉小腸火熱者加山梔

槐花黃連大下不止加血見愁少許姜汁和服虛者加炒

乾姜濕熱加蒼朮秦艽黃芩芍藥枳氣加香附枳殼或單

香附丸又古考婦湯調血上品熱加茯苓槐花冷加茯苓

木香凡大小便血俱不可純用藥宜辛味為佐兼升舉

及酒炒藥婦人胎前患者古考木湯古考婦湯六一散

三方合服產後患者補中益氣湯加吳萸黃連或八物湯

隨症選用久只補脾瀉劑俱補劑補中益氣湯參苓白朮散厚

朴煎蓋精氣血皆生於穀氣胃氣

一復血自循軌不受補者宜瀉劑香梅丸腸風黑散單

方糞煎酸石榴皮為末一錢荔枝煎湯下糞後艾葉為末

生薑汁下或乾柿燒灰為末米飲下亦好抑考腸風臟

毒血自腸臟中來垂痔之血肛門傍生小竅射如血線未

肝門既脫，腐血侵淫，化為虫蠱，蝕傷腸口，滴血淋瀝，當以益蕒、艾葉、苦練根等化虫，或燒鰻鱗骨，薰之內服，黑玉丹。

△痰類

○喘

喘急先分肺實虛

呼吸急促者謂之喘，喉中有響聲者謂之哮。虛者氣乏，身涼冷痰如米實者氣

壯胃滿身熱便硬

其次當知有火無

經曰：諸逆衝上，皆屬火。虛火宜滋補降氣，實火宜清肺瀉

胃火炎得食喘暫止

火炎肺胃喘者，乍進乍退，得食則墜，下稠痰則止，食已入胃，反助火痰上

喘反大作宜降火清金，導痰湯加芩連山梅

杏仁瓜蒌茹胃有實火，瀉上稠痰，都氣丸

痰喘喉似水

鷄吹

痰喘必有痰聲，風痰千縉湯，或合導痰湯，痰氣蘇子降氣湯，四磨湯，食積濕痰古二母散，神保丸，木羅皂

九七情氣急無聲響

驚憂氣鬱，惕惕悶悶，引息鼻張，氣喘呼吸急促而無痰聲者，四七湯，枳梗

湯分氣紫蘇飲四磨湯  
因服補藥喘者三拗湯

外感裏逆只氣粗

外感表邪傳裏裏實不受則氣

逆上詳見傷寒尋常感冒風寒相干肺脹逆而喘者隨時令祛散風喘金沸草散麻黃杏仁飲寒喘加減三拗湯

藿香正氣散加五味子杏仁或蘇沈九寶

水喘怔忡或腫

飲暑月香薷湯熱症小柴胡湯涼膈散

脹水喘水氣轉有聲忡忡者小青龍湯古葶藶散白前湯水腫水氣脹肺而喘然喘必生脹脹必生喘二症

相因皆小使不利肺主氣先喘而後脹者宜清金降火而後行水次之脾主濕先脹而後喘者宜燥脾行水而清金次

之已上諸喘皆有餘陰虛火從臍下起

陰虛喘者血虛則陽無所依附而上

奔宜四物湯倍芍藥加入參五味子以水煎之有小腹下火起衝上而喘者宜降心火補真陰四物二陳湯加知柏枳

壳黃氣短不能續呼吸久病氣短不能接續似喘非喘者參湯扶脾生脉散調中益氣

湯勞涉過者香參散飲食熱者葶藶散痰阻短氣者藁麥湯濁陰在上清陽陷下咳喘嘔吐者加味瀉白散腎

冷元氣不能納

下元虛令腎氣不得歸元者九味安腎丸  
八味丸甚者黑錫丹以鎮墜之煩躁無脉

身冷神擗有擗肚胃衰乎

胃虛極則氣上逆擗有擗肚生  
昏者死脉散加杏仁陳皮白朮或理中

九加胡椒救之仲景云髮汗如油汗出如珠不流擗有  
擗肚喘而不休及胃前高起脉絡散張手足厥冷脉散及

數者皆死但婦人喘病尤亟產後榮  
竭衛氣無依獨聚於肺發喘者死速

未發扶正治其本

補血氣虛補氣兼以  
清金降火順氣化痰

已發辟邪痰火踈

喘非風寒乘肺則  
痰火脹肺風寒祛

散痰火踈蘊但火急甚者亦不可純苦藥宜溫以劫之用  
椒日五七錢為末姜湯下喘止後因痰治痰因火治火諸

喘不止者小蘿皂丸定息餅子含荷丸定喘化痰散久者  
人參清肺飲倍粟壳澁之抑考內經云夜行喘出於腎

滋氣病肺有所墮恐喘出於肝淫氣害脾有所驚恐喘出  
於肺淫氣傷心渡水跌仆喘出於腎淫氣損肝又云邪入

六腑身熱喘呼不得再此  
喘之名同而所感各異耳

○哮喘即痰喘甚而常發者

哮喘喉中痰作聲吐法必須量體行體實者用紫金丹二

止服二三丸則不吐臨發時用此劫之丹溪方去豆豉更妙一法用二陳湯加蒼朮黃芩下小胃丹體虛者吐下俱

忌須帶挾水挾寒須帶表水哮喘者因勿時被水傳蓄於肺

防已或古葶藶散道水丸有寒包熱者麻黃湯加枳梗紫蘇半夏黃芩有風痰者千禧湯或用鷄子一枚畧敲壳揅

勿令膜破放尿缸中三日夜取者食之効斷根扶正金宜

凡哮喘忌燥藥亦不宜純系須常帶表欲斷根者必先淡滋味然後服清肺金扶正氣之劑如

定喘湯黃芩利膈丸是也遇厚味發者清金丸久不得

○惡心

睡者楚鈴丸單方猫兒頭骨燒灰酒調服二三錢一服即止

惡心欲吐不得吐一見飲食心便惡

二陳湯加白豆蔻香附砂仁

不渴

胃虛與胃寒

胃寒理中湯加陳皮半夏生薑各等分胃虛六君子湯加砂仁煨火加薑汁炒黃連少許

煩渴胃家痰火聚

痰盛者大小半夏湯火盛者二陳湯加薑汁炒芩連煎暈惡心治同

○嘈雜

心嘈似饑又煩雜

似饑非饑似痛非痛或兼噯氣痞滿惡心嘔至胃脘作痛乃飢逆番胃之由也

縱食多憂痰火合

食鬱者枳朮丸加山查麥芽有熱更加芩連停飲者朮丸胃滿者太安丸保

和丸○憂鬱者越婢丸香連丹濕痰氣鬱不喜食者二補丸加蒼朮倍香附索食者三聖丸○痰因火動者治痰為

先二陳湯加薑汁炒芩連山梔為君南星半夏為佐熱多

加青黛○火動其痰者二陳湯加薑炒芩連山梔火鬱更  
加撫芎蒼朮痰火  
俱盛者祛痰火丸  
五更嘈者思慮傷血分稍壓宜補接物

湯加香附貝母  
山梔黃連甘草

○ 噎氣

噎轉食氣名噎氣有痰有火滯於胃  
胃中鬱火膈上稠痰飲食鬱成宜祛痰火

九潤下丸  
古更連丸  
實噎食罷噎方  
氣盛實噎食罷噎轉腐氣甚

致二陳湯加蒼朮神麩麥  
芽姜炒黃連或保和丸  
虛噎濁氣填習次  
不因飲食常

胃有濁氣膈有濕痰俱能發噎  
六君子湯加沈香烏君厚  
朴蘇子為臣吳黃為使  
久者白氣丸或蘇合香丸甚若靈

砂以鎮  
墜之

○ 嘔吐

嘔吐須知胃冷熱  
大槩肥白肉浮多寒濕瘦黑骨露多燥熱更參麻症  
胃冷面青手足厥食久

乃吐二陳湯加姜桂甚加丁附或丁香半夏丸胃熱面

紅手足熱食已即吐二陳湯加姜炒芩連山梔暴甚累加

檳榔木香胃口痛加姜汁或葛根竹茹湯加味橘皮竹茹

湯或心柴胡湯加竹茹如時常口吐清水冷涎自下湧上

者此脾熱所致也二陳湯加白朮白芍升麻炒次分三焦

芩連山梔神麩麥芽乾生薑等分或丸或煎服

有妙括眩暈不食氣上攻上焦吐者氣衝胃痛食已暴吐

而渴治當降氣和中六君子湯

加木香藿香桔梗枳椇葉或七氣湯熱胃滿酸悶食作孽

氣衝者古煎黃湯加入參甘草檳榔

中焦吐者食積與氣或先吐而後痛或先痛而後吐治當

以木香檳榔等分為末調服行氣蒸液丸消積尋常脾胃

散二陳湯加青皮砂仁厥冷下焦停有寒下焦吐者寒也

白豆蔻山查神麩調之朝食暮吐暮食

朝吐夕則小便清利大便不通乃陰氣偏結不與陽和治

當溫其寒而通其秘復以中焦藥和之附子理中湯木香

白氣散合理中湯四逆湯丁胡三三陽熱壅大便結嘔家不可

建湯古半湯養正丹古半硫丸

下者常也如喜冷煩渴胃滿腹痛甚而大便閉者  
大小腸膀胱結也熱者大柴胡湯下之虛者潤之痰火不

已水怔忡嘔吐痰火為多二陳湯加姜炒芩連或單人中白姜

汁化服脾經濕痰鬱滯上中二焦時時惡心吐此清水或  
如豆汁者胃寒湯加半夏檳榔水嘔心下怔忡先渴後

嘔者赤茯苓湯先嘔後渴者腥燥薑心多痰血腥氣腺氣  
猪苓湯木入即吐者五苓散

嘔吐雜以涎血此膿血聚於絳中所謂嘔家  
治膿蓋自愈四物湯倍赤茯苓丹皮虛者八珍湯加陳

皮客風翻翻暑渴煩風邪在胃翻翻不定或鬱酸水全不  
入食者不換金正氣散麥天湯安脾

丸不宜輕用參朮補任邪氣反甚惟名病助痛者木克土  
也方取用六君子湯加青皮芍藥柴胡升麻川芎砂仁神

變治水熱者小柴胡湯加青黛姜汁蒸餅為丸服○暑吐  
煩渴黃蓮香茹散六一散加砂仁或枇杷葉散錢氏白朮

散氣虛痞滿臣痛切嘔者四味藿葉湯或四君子湯去茯苓

苓加香附參芪胃痞短氣者調中益氣湯胃虛寒痰依嘔  
 者增甘湯○重吐時常惡心胃口作痛口吐清水得食暫  
 止饑則甚者胃中有蛔也○陳湯加苦練狼史君子自未  
 烏梅或用錫灰檳榔等分米飲調服亦可凡吐如清菜汁  
 者死此是乍然嘔吐非翻胃比也○又舟  
 暈木吐渴飲水者多死惟童使飲之最妙

○飢逆

飢逆分不足有餘不足因內傷脾胃及大病後胃弱多面  
青脹冷便軟有餘因外感胃燥及大怒

大飽多面紅肢熱便閉有餘可治不足者危 不足火炎陰氣虛火乃元氣之賊  
人之陰氣依胃

氣而養胃土受傷則木氣侵之陰火所乘不得內守木挾  
 相火直衝清道而上乃屈之甚也○膏梁濕熱者十味小

柴胡湯吞單黃柏丸或調益元散胃火善食者小半煎湯  
 加山梔黃芩吐之火盛者益元散加黃連黃柏自利更加

參朮白芍陳皮○久病滯下及婦人產後從臍下逆勞後  
 上夜分轉甚者皆屬陰虛四拗湯加知相陳皮竹茹

傷脾故有此貧者太勞火動濁升清陷者補中益氣湯或合生脈散加黃柏附子少許挾房勞者瓊玉膏腎氣不歸元

者九味安腎丸久病寒搏火為辜極是危症脈數為火刑金必死凡傷寒吐下及

雖病久每飽逆者皆火欲上行為胃中寒邪所遏故搏而有聲俱宜下香柿蒂散范活附子湯理中湯倍參久者三

香散或木瓜根煎湯呷之中虛有餘飽食胃中寒塞失升降陳

湯也枳痰鬱何由得泰舒痰閉於上火動於下無別症忽

湯或只陳皮半夏姜煎服或人參薑煎湯吐之停痰或因

葱鬱痰熱者亦宜蓋參薑濕肺肺衰氣降而火土復位矣

七情氣鬱者木香勻氣散陽症失下多潮熱地道不通

用蘿蔔煎湯下蘇子降氣湯宜寒藥下之大柴胡湯陽極脈微將脫者宜涼膈散解毒湯養陰退陽不可大下汗吐下後胃熱

未除小柴胡加橘皮竹茹或有餘湧吐泄平人食物太速飲米入肺毒寒

太多亦屬有餘食飽笑飽以紙撚鼻嚏或久閉氣可止  
○水飽小腸胃湯小青龍湯去麻黃清之利之而已

足補補有溫平涼莫拍凡汗吐下服涼藥過多者當溫補

宜涼補有方李用丁附溫煖助火損  
不足而益有餘宜乎飽逆之必死也

○膈噎

三焦枯稿成膈噎飲食不下而大便不通名膈噎疏云膈

大便不通通故以膈噎為題有拒格意即膈食反胃也

而遺下焦又妄分十膈五噎皆非經首病因內傷憂鬱失

志及飲食滯然而動脾胃肝腎之火或因雜病誤服辛香

燥藥俱令血液衰耗胃脘枯稿其稿在上焦賁門者食不  
能下下則胃脘當心而痛須臾吐出乃止賁門即胃脘上  
口言水穀自此奔入於胃而氣則傳之於肺也其稿在中  
焦幽門者食物可下良久復出幽門與中脘相近言其位  
幽僻胃中水穀自此而入小腸也其稿在下焦闌門者朝

食暮吐暮食朝吐闕門臍下爛約水穀分入膀胱大腸而為糞溺是大小腸膀胱乃氣血津液流通之道路也

**火上升有虛熱** 經曰三陽結謂之臍小腸熱結則血脈燥

三陽熱結必共數有力前後閉塞下既不通必反而上行所以噎食不下縱下復出乃陽火上行而不下降也

實火黃連解毒湯加童便姜汁或益元散入姜汁澄白脚為小丸時時服之溫共丸尤妙甚者陶氏六一承氣湯人

參利膈丸虛火衝上食不入者枳梗下陳湯加厚朴白朮及木香少許或古更連芫渴者錢氏白朮散大便閉者

導滯通幽湯或參仁丸麻子仁丸當噎未至於臍之時便宜服此防之膏肓之疾豈可忽忽之間有身受寒氣口傷

冷物以脾胃火衰臍上苦冷腸鳴脈必滑微宜暫用丁香者散五膈湯五噎湯單附子散以劫之若不求其本偏認

為寒藥用辛香燥藥必至燥陰不救 **為痰為積本七情** 古云膈壅神思間病

火起薰蒸津液為痰為積積又則血愈衰針經曰怒氣所至食則氣逆不下勞氣所至為膈噎喘促思氣所至為中

痞三焦閉塞咽嗑不利。○痰飲脈滑或伏。○陳湯古參夏  
 湯化痰丸。瓜蒌實丸。或用黃連吳萸貝母瓜蒌仁牛膝草  
 水煎。○食積脈滑而短。枳木丸。加黃連陳皮半夏。或狗米  
 平胃丸。虎脂平胃丸。或用保赤丸。二錢於姜炒黃連二錢  
 由查二錢為丸。麻仁大腹脂為衣。每六十九。入參煎湯入  
 竹瀝下。○七情鬱結脈沈而滑。飲食喜靜。胃背痠者。四七  
 湯溫膽湯。痞滿煩悶微嗽。二便不利者。分心氣飲。四磨湯  
 或木香檳榔二味等分。為末白湯下。傷神不睡者。古宋溫  
 膽湯。硃砂安神丸。腹脹腸鳴者。木香勻氣散。有  
 積聚者。阿膠撞氣丸。惡聞食氣者。五膈寬中散。

氣血兩虛

**多口沫** 沫大出者死。○氣虛不能運化。生痰者。時必緩而  
 無力。○君子湯大便閉。加蘆根童便。氣虛甚者。

君子湯加附子。大黃。酒毒。加其蔗汁。單人參湯。人參膏。元  
 妙。○血虛不能滋潤。生火者。脈必數。而無力。四物湯加童  
 便。竹瀝。姜汁。大便閉。加桃仁。紅花。有瘀血。加牡丹皮。非汁。  
 陽生。五加驢尿。血虛甚。加乾姜。血燥。加牛羊乳。汁。不可以  
 人乳代。蓋人乳反有七情飲食之毒。  
 火故也。○氣血俱虛者。八物湯主之。

金水二臟須扶持

血陰主靜內外兩靜則臟腑之火不逆而金水二氣有益  
養陰血自生津液傳化合宜何膈壅之有腎氣凡主益

**陰養胃是總訣** 不問虛實俱以益陰養胃為至庶免後患  
通用一二陳湯加童便竹瀝姜汁韭汁直

熱加土炒芥蓮瓜蒞桔梗七情加香附川芎木香檳榔不  
納食加麥芽神麩熱結食逆上奔加大黃桃仁氣虛合四

君子湯血虛合四物湯雜方燒針丸梓糠丸紫金錠霞  
天膏神仙奪命丹古阿膠散或靈砂燒酒下凡五十歲後

血枯糞如羊屎及年少不淡  
薄飲食斷絕房室者不治

○**關格** 與嘔吐膈噎  
淋症案看

**關不利便格吐逆** 經云人迎脈大於氣口四倍名曰  
格氣口脈大於人迎四倍名曰關 **上寒**

**下熱中焦窒** 關乃陽不下以寒在膈中塞而不入格乃陰  
不上以熱在下焦塞而不出上下不通二焦

擦亂中氣不足陰陽不能相榮故既關且格○中虛者補  
中益氣湯加檳榔以升降之中虛痰盛者六君子湯去木

加栝子仁及麝少許蓋甚吐提其氣非為痰關格與噎稍異胃中覺氣

有碍欲升不升欲降不降飲食不食宜下陳或浴下焦不

可執古云關格死在旦夕但治下焦可愈維云少陽所至

獨為關非格也大承氣湯下之若但吐而不得小便者胃

凡關格見頭汗者死參利水之藥詳前淋症

### ○瘥

瘥症虛果實則剛陽極則為剛瘥多類風症宜清熱化痰祛風陰極則為柔瘥多類厥症宜溫補

化痰降火此升溪謂實則為剛虛則為柔皆危症也餘詳傷寒中寒不醒通身強瘥病發

不醒瘥病發則身軟時內外因皆挾痰火或外因風邪或

挾痰火而後發症。○痰壅發症不醒或只手足搐搦左右  
動搖宜祛風道痰湯加竹瀝姜汁。○風痰盛者敗毒散加  
防風天麻黃芩全蝎生薑薄荷或通聖散加人參柴胡間  
服毒星丸姜汁竹瀝下。○火盛則遍身戰振猶火炎而旋  
轉也火能燥物而使氣液不足宜因物二陳湯加麥連知  
柏竹瀝童便補而散之。○實火則胃滿口噤咬牙脚攣臥  
不着床大便閉者大承氣湯下之仍忌風藥蓋火  
為風燥之本能治其火則風自散而燥自潤矣。 鬱閉諸

### 虛甚則亡

七情鬱悶者烏藥順氣散八味順氣散主之。○  
諸虛絕無風邪而筋脉攣急角弓反張者乃氣

血虛脫無以主持養筋此等尤不可純用風藥經曰諸症  
發直皆屬於濕濕極反兼風化制之實非風也虛也故又  
有言曰虛為本痰火外邪為標氣虛者補中益氣湯加竹  
瀝或六君子湯加黃芪附子柴胡血虛者四物湯加防風  
羌活或大秦丸湯瘵病比癩  
更重甚則因而昏死者有之

### 癩

癩與顛狂相似但癩病時發時止邪  
流五臟顛狂在經又不愈邪全歸心

# 癩有陰陽只是痰

內傷最多外感極少蓋傷飲食積為痰

舍舍空痰塞丹溪云癩因痰塞心竅發則頭旋卒倒手足

搖搦口眼相引旬背強直叫吼吐涎食頃乃醒病先身熱

脉浮在表者陽癩屬六腑易治病先身冷脉沈在裏

者陰癩屬五臟難治若神脫目眩如愚痴者不治時師

## 何必究五三

癩文必歸於五臟肝癩面青搖頭喜驚作雞

利吐苦羊吼肺癩面白生沫腹脹牛吼腎癩面黑直視如

尸猪叫此五癩病狀偶類之耳其實痰火與驚三者而已

小兒風驚食

三癩見五卷

## 痰挾火與驚多少

肥人多痰動則有聲沫

三枚姜煎服或追風祛痰丸再生丸驚痰紫石散驚風

丸抱龍丸三癩丸引神歸舍丹毒星丸因怒者順氣煎痰

湯加首蒲反砂因夏思者妙香散食痰醒脾散瘦人

火盛面赤者防風當歸飲或小調中湯加南星或滾痰丸

鴉黃丸生黃清心丸龍腦安神丸千金龍腦湯痰火俱

盛者猪心丸溫酒下上吐下利去頑痰老痰為妙通用

折劑丹活應丹蟬

散控寒九紫金錠

### 調中補北瀉東南

癩本痰熱挾驚宜寒藥清心降火化

痰為至故古法用一陳湯加瓜蒌南星黃連探吐吐後必服珠砂安神丸以降南方之火當歸龍薈丸以平東方之木但化痰必先順氣順氣必先調中頑痰膠固非辛溫熱藥為佐何以開道是以古方治驚癩皆有溫劑又如錢仲陽治小兒癩經吐瀉及服寒藥過多身冷閉目不食後用益黃散補中能食次服腎氣丸補北方腎水能語此須從權以救癩之壞症亦可以為成法

### ○ 顛狂

### 顛狂痰火閉心堂都緣喜怒太無常

素問註云多喜為顛多怒為狂在喜屬心怒屬肝

屬肝二經皆火有餘之地但喜則氣散畢竟謀為不遂鬱結不得志者多有之大驚痰迷心竅者葉氏清心丸金箔鎮心丸珠砂安神丸心風顛者朱黃清心丸追風祛痰丸馬峇加蒙河車一具為糊惹傷肝者寧神鎮痰湯鴻青丸

當歸龍薈丸 因驚者抱龍丸 驚氣丸 丹溪云 五志之火鬱  
而成 痰為顛為狂 宜以人事制之 如喜傷心者以怒解之  
以悲勝之 憂傷肺者以喜勝之 以怒解之 陽明熱結膏藥味  
陽明發狂 見傷寒 雜症 胃與大腸實

熱燥火鬱結於中 大便閉者 涼膈散 加大黃下之 膏藥  
醉飽後發狂者 止用益湯止痰 即愈 或小劑中湯 服芳  
草石藥 熱氣慄悍發狂者 二黃石羔湯

加黃連 甘草 青黛 藍板 根 或紫金錠 謾議重陰與重陽

難經云 重陰者顛 重陽者狂 河濶以顛狂一也 皆屬痰火  
重陰之說非也 但世有發狂一者 妄言妄語 而不成久顛

者 又有痴迷顛倒 縱久而不發狂者 故取河濶合三於前  
難經分析於後 顛者異常也 平日能言 顛則沈默 平日

不言 顛則呻吟 甚則僵仆 直視心常不樂 此陰虛血少心  
火不安 太調中湯主之 不時倒暈者 滋陰寧神湯 言語久

倫者 定志丸 悲哭呻吟者 經鑑退故紙酒調 二錢 草麻仁  
煎湯常服 可以斷根 狂者 凶狂也 輕則自高 自是好歌

好舞 甚則棄衣而走 踰牆上屋 又甚則披頭大叫 不避水  
火 且好殺人 此心火獨盛 陽氣有餘 神不守舍 痰火壅盛

而然小調中場三黃丸控逆丹卑苦參丸狂則專於下  
痰降火顛則兼乎安神養血經年心經有損者不浴

言未見如神鬼邪崇由來痰作殃視聽言動俱妄者謂之邪崇甚則能言平生未

見聞事又五色神鬼此乃氣血虛極神光不足或痰痰火  
壅盛神氣不定非真有妖邪鬼祟大槩內服傷寒瘟疫條

人中黃丸照依氣血痰湯藥為病或單人中黃亦好服或  
單石首蒲未猪心血為丸服亦可有婦人夜夢鬼來交者

定志丸料加赤小豆水煎服有婦人月水崩漏過多血氣  
迷心或產後惡露上衝而言語錯亂神志不守者此血虛

神耗也宜養神膏但亦不可絕服補心斂神藥血熱者小  
柴胡湯加生姜生地煎服百餘帖即安血迷心胞喻牆上

屋歌唱無時者逍遙散加遠志桃仁紅花蘇木服後病退  
用平胃散少用厚朴倍加蒼朮升麻常服以絕病根又男

子挾痰血者陶氏當歸洋血湯有卒中屍惡吐利如草芥

亂狀或狂語如醉人有起心先知其肇或已死口噤不開  
者急用傷寒門道魂湯灌之  
即醒外法詳邪丹灌鼻法

即醒外法詳邪丹灌鼻法

○驚悸怔忡健忘

驚悸傷惕不自定如入

獲捕曰怔忡

思慮過度及因大驚

或耳聞大聲目見異物臨危觸事便覺驚悸甚則心跳故

厥脈弦濡者虛也血虛凶物湯茯苓神湯妙香散珠砂安神

丸氣血俱虛人參養榮湯養心湯時作時止者痰也二陳

湯加白朮黃連遠志竹瀝姜汁○怔忡因驚悸久而成痰

在下火在上故也溫膽湯加黃連山拖當歸貝母氣鬱者

四七湯加茯苓神遠志竹瀝姜汁或十味溫膽湯全椒鎮心

丸傳飲胃中漉漉有聲快快不安者二陳

湯加茯苓神橫柳麥門冬沈香或米雀丸

又有健忘非實

鉅精神短少痰相攻

怔忡又則健忘三症雖有淺深然皆

心脾血少神虧清氣不足痰火瀰氣

上攻引神歸舍丹主之亦有所稟陰魄不足善忘者常大

補氣血及定志丸如老年神衰者加減固本丸○三症通

用歸脾湯仁熟散養授天

王補心丹壽星丸參藥丸

○咽喉附失音骨鯁

種種咽喉總是火

咽喉氣之呼吸食之出入乃人身之門也一十八種雖後世強名亦不可不

知一左單蛾二右單蛾風形圓如小筋頭大生於咽喉關上可治生於關下不見者難治三雙蛾風兩箇生於喉間關下難治四蟬舌風舌下再生一舌五牙疳風牙齦腫毒成瘡六木舌風舌腫大如煮熟猪舌不能轉動七舌黃風舌上腫痛黃色八魚口風口如魚咬水不治九塞喉風喉痺聚毒延唾稠實而發寒熱關上可治關下難治十懸壺蠱毒風上脘腫水食不下形腫如雞卵十一掩食風因食鯽鱸惡物發泡十二箭癩風腮頰結腫牙齦腫破十三纏喉風自頰纏繞赤色寒熱十四松子風口內疳瘻赤如三指肝張口吐物則氣逆關閉飲食不能十五崩砂痔口風自舌下牙齦上腫赤口內作瘻如湯熱牙齦乾爛亦能脫齒十六連珠風自舌下起初起一箇又起一箇甚者三五七九箇連珠生起十七蜂子毒或在臉腮洋爛或在喉關舌下依膠色黃如蜂十八走注瘰癧風頸項結核五七箇

皮膚赤腫作寒熱尋常咽瘡痛者多是虛火意種類雖繁  
同歸於火蓋少陰君火少陽相火二脉並絡於咽喉君火  
勢發則熱結而為痰為腫相火勢速則腫甚不仁而為痺  
痺甚不通而痰塞以死矣故曰一陰一陽結謂之喉痺一  
陰肝與心胞一陽少陽二焦四經皆有相火火者痰之本  
痰者火之標故信火則痰在其中矣言咽喉則牙舌亦包  
在其中矣

火有虛實從何知實火便閉胃必緊

實火因過食煎炒蘊熱積毒煩

潤二便閉澀風痰上壅將發喉痺必先三日勿服不利脉  
弦而數治宜先去風痰而後解熱毒赤膈散加黃連荆芥  
石膏或古刺黃湯防風通聖散二葉丸含化又風燥咽喉  
乾枯常如毛刺不嚥有得敗毒散加黃芩半夏倍桔梗薄荷  
荷生薑煎服痰盛加石膏凡服此藥子服午攻午服子攻  
如嘔吐略傷因食熱物及穀芒刺溢風熱併煎血氣相搏  
腫痛者消風散加薄荷玄參全蝎或射干湯牛蒡子湯木  
舌重舌者奔聖金錠舌根腫者麝香砂丸時行咽痛者  
普濟消  
虛火便利脉亦微  
虛火因飲酒則動脾火忿怒則動肝火色慾則動腎火火火火上



牙也咽者忌牙最忌誤人惟磁針出血即汗之之義也血  
 出多則愈有針者養才調熟水時時吸之畏針者委曲  
 針之凡關上血泡最宜關下不見者令病人含水一口用  
 黃管削尖入鼻孔刺出血妙惟腎傷寒及帝中腫者忌針  
 用蛇床子於瓶中燒烟

令酒人段中入喉中上立愈 毒結開關還可救 准黃絲毒丸

匙或用巴豆壓油紙上取油紙捲成條子點燈吹滅以烟  
 薰入鼻中一時口鼻涎流牙關自開一方用巴豆肉以綿

裹定隨左右塞於鼻中左右俱有左右俱塞立透蓋方  
 中以巴豆湯走馬喉痺者以熱攻熱熱則流通之意也喉

失音者却難醫 喉痺失音者秘傳降氣湯去陳皮加黃芩  
 風寒失音者其桔湯加訶子木通入生地

汁潤之或柯子散血虛受熱咳嗽聲嘶者用青黛蛤粉蜜  
 調含化或潤肺丸蜜脂煎尋常聲音不清者加味固本丸

內傷虛損咽瘖失音者無治法 骨鯁用朴硝為末對入  
 龍腦鷄蘇丸內為丸彈子大噙化不過三五丸自然消化

魚骨鯁食橄欖或以核為末順流水調服  
 外用鹽瓜爬也自下餘詳七卷急救方

△虛類

○發熱 附惡寒

發熱原無表裏症明是內傷虛損病 外感發熱人迎緊盛隨表裏見症汗下即

解惟內傷虛熱經久不解無表裏二症雖食積類傷寒初症右脈氣口緊盛身節不痛為異 勞後力倦

慾昏神 內傷勞夜發熱脈虛而弱倦怠無力不惡寒乃胃中真陽下陷內生虛熱宜補中益氣湯 ○內傷色

慾陰虛發熱便硬能食者滋陰降火湯 仲味逍遙散清骨散 ○內傷思慮神昏恍惚眼燒者歸脾湯交神湯 生

冷鬱遏四肢甚 內傷生冷鬱遏陽氣及脾虛伏火只手足心熱肌層不甚熱自汗不食者火鬱湯

晝熱口淡是陽虛 凡饑飽勞役傷胃陽虛口中無味晝熱夜輕者俱宜補中益氣湯甚加附子

盛下虛者清 心蓮子飲 夜熱晝輕陰弱定 凡房勞思恐傷腎陰虛口中有味夜熱晝輕者俱宜

瘦

腹脹

因物湯加知柏黃芩甚者加童便  
龜板峻補其陰有鬱抑者下甲丸  
陰陽兩虛熱無時陰陽

晝夜發熱煩渴不止症似白虎而無自痛鼻乾者古帶湯  
湯如臟冷榮熱脈浮者人參地骨散久虛積損者八物湯

人參養榮湯甚者既濟湯去半夏加五苓子當歸地黃入  
童便少許或一全丸八宋丸二神交濟丹抑論胎人及

脈弦大無力者氣虛於血宜甘溫補氣氣旺則能生血若  
瘦人及脈弦帶瀉者血虛於氣止宜苦寒為主佐以其溫

若氣血平補依舊氣旺而陰愈消矣凡虛熱皆因精神外  
馳嗜慾無厭陰氣耗散陽無所附遂至浮散肌表而發熱

實非者骨蒸傳變須防命骨熱因氣虛不能化血血乾則  
火自沸騰肉如針刺骨熱煩疼

或五心俱熱或兩肋如火或子午相應或晝微惡寒而夜  
反大熱雖腎經所主傳變不常蒸上則見喘咳痰血唇焦

舌黑耳鳴目眩等症蒸下則見遺精淋濁壯瀉腰疼脚酸  
陰物自強等症蒸中則見腰膝痠痛四肢倦怠等症古云

肝症發熱肉下骨上寅卯尤甚鴻青丸人中白散心症發  
熱在血脉日中則甚單瀉心湯導赤散珠砂安神丸脾症

發熱在肌肉遇夜尤甚三九瀉黃散三七六三白湯肺症發熱在皮青

日西則甚瀉白散其者涼膈散腎症發熱在骨亥子時甚

兩手足心如火滋腎丸主之大要脉弦而濡者秦升扶歸

湯加味逍遙散脉弦而數者節齋四物湯通用五蒸湯丸

二下參湯香連猪肚丸大虛煩內煩不得眠乃心內煩躁無

胡連丸補腦丹大造丸外熱也仍分氣虛血虛或大病後津液枯竭煩而有渴者

人參明冬湯溫膽湯不眠者六下散甚加牛黃勞心者妙

香散脾弱者三挾痰挾積尤難淨挾痰發熱者二陳湯加

白湯詳見傷寒味子挾濕痰發熱者清膈蒼朮丸濕熱甚者皮枯肢疼唇

燥面赤痰嗽飲食少味者宜量體吐出痰涎然後服清熱

化痰開鬱之藥古方蒼朮丸蒼朮丸蒼朮丸蒼朮丸選用

○積病最能發熱多夜分腹肚熱甚柴陳湯加山查麥芽

惡寒陽虛不自任

尋常外感惡寒頭痛微汗即止內傷表分衛虛惡寒者黃芪建中湯或調中益

氣湯加黃芪桂枝內傷陽虛自汗全不任風寒者四君子

湯減茯苓倍加黃芪桂枝或附子如晝夜惡寒甚者單用

參芪桂附峻補其陽如久病陽氣鬱陷惡寒者升

麻葛根湯去芍加參附白芷草豆蔻蒼朮葱煎服酒浙陰

虛痰火盛

陰虛微惡寒而發熱者二陳四物湯加知母黃

一錢為末非汗調服探吐吐後以川芎南星蒼朮黃芩糊

丸白湯下冬月去蒼加姜汁為丸調之○素病虛熱忽覺

惡寒須臾戰慄如喪神守乃火炎痰鬱抑遏清道不能周

密腠聖四物湯加黃芪黃連黃柏或合二陳湯如火尅肺

酒淋惡寒者甘桔湯加酒芩山耨麥胡冬五味子惡寒糞

燥者四物湯加大黃下之及病過服熱藥惡寒者先探吐

痰後以通聖散加生地當歸或四物湯去芍倍地黃加白

朮黃柏參芪身草通山炒熱煎服如酒熱內鬱惡寒者黃

芩一兩葛根五錢煎服大汗而愈○抑者內經論陰虛因勞倦氣衰則火薰胃中而生內熱陽虛則不足衛護皮膚

而外寒陰盛則血脈不通而中寒陽盛則腠理閉塞而外  
熱仲景謂陽虛陰盛宜汗散其陰邪陰虛陽盛宜下瀉其  
陽邪東垣謂晝熱陽氣旺於陽分夜熱陽氣下陷陰中皆  
名熱入血室重陽者晝夜俱熱夜寒陰血旺於陰分晝寒  
陰氣上溢陽中重陰者晝夜俱寒丹溪謂惡熱非熱明是  
虛症惡寒非寒明是火症玉水謂熱之不熱是無火也當  
浴其心寒之不寒是無水也當浴其腎噫寒熱陰陽虛實  
醫家大分幸四公發明經旨善學者必合而玩之始得

### ○汗

自汗侵侵屬氣虛 汗者元陽真液因飲食驚恐房勞行動  
出汗者曰多汗不問昏醒朝夕侵侵出

汗者曰自汗乃陽氣不足衛護發熱者補中益氣湯加麻  
黃根浮小麦但升柴俱宜蜜水炒過以殺其升發之性又  
欲其引參芪至肌表故不可缺也發厥者古法  
附湯順元散間有氣血俱虛者黃芪建中湯 亦有痰濕

外邪初 痰症自汗頭眩嘔逆宜川芎白朮陳皮甘草水煎  
服多汗身軟者濕也心主熱脾主濕濕熱相搏如

護

地之濕熱氣為雲霧為雨各臟皆令有汗獨心與脾胃為  
 濕熱主耳宜調衛湯玉屏風散火炎上蒸胃濕作汗者涼  
 膈散胃熱者二井湯是知自汗亦有實者故外感初症亦  
 多自汗風症桂枝湯加附子寒症古桂附湯暑症五苓散  
 風濕相搏防己黃芪湯凡自汗久用參芪附子不効宜養  
 心血或汗乾仍熱者必外感風宜參蘇飲病止住服是反  
 治也盜汗全是陰分弱腎火脾濕心勞劬睡着出汗醒則漸收蓋睡則胃氣行  
 於裏而表虛醒則氣散於表而汗止心火炎盛以致肺失  
 衛讓者當歸六黃湯陰虛火動者四物湯加知柏蒸氣虛  
 者加參芪白朮腎火動甚者正氣湯脾濕者四製白朮散  
 肝熱者用防風龍膽草等分為末米飲調服心虛者用人  
 參當歸各二錢半先用猪心血煮湯澄清以汁煎藥服思  
 慮過度以致心孔獨有汗出者用艾湯調下茯苓末一錢  
 或青桑第一番葉帶露採陰乾或焙為末米飲調服或古  
 芷砂散通用黃芪六一湯加浮小麥牡蠣府黃根外用五  
 倍子白礬為末津液封臍中一宿即止或用牡蠣麥  
 麩府黃根葉木糯米防風白芷等分為末周身撲之

痿

諸痿不痛火尅肺

經曰諸痿皆生於肺熱肺熱葉焦脾弱

發為諸痿悲哀失志上發喘而下瘦血乃心熱下虛也曰

肺痿則脛脛筋脉縱緩而不能任用於地思色無窮或入

房太甚口苦白淫乃肝熱膽津滲也曰筋痿則筋脉乾急

蹠躄居處卑濕肉蠕動而口渴乃脾熱胃燥也曰肉痿則

肌肉麻痺不仁有所勞行大熱而渴則陽氣內伐熱舍於

腎水不勝火骨髓空虛色黑齒槁各曰骨痿則腰膝輿脊

不舉骨痿不能起於床者死

肺傷木旺肢體廢

肺被火傷則水寡畏而傷土則脾亦為之傷矣

肺傷則不能管攝一身脾傷則不能運用四肢而痿廢矣

五痿總屬陽明陽明者宗筋之會也陽明實則宗筋潤而

機關利矣 瀉南補北是大經

瀉南則肺金清而東方不旺脾不傷而宗筋潤矣補北則心火降而

慎勿滾同風

痺治痺乃風寒濕合脚氣寒濕而成緩風邪深手足肢

因外感宜發散痿屬內傷補血氣血虛者四物湯合生脉

補陰九氣虛者四君子湯加蒼朮黃柏黃芩下鹿茸四片

參朮黃或兼濕熱或兼痰有濕多者有熱多者有濕熱相

起於手足之內者二陳湯加蒼朮又恐食積妨碍陽明滯

清燥湯如食全五痿旺時病易安隨各臟旺凡調補則易

獨活寄生湯祛風者天產作陽戒厚味助火發熱故也素

木秦朮湯何首烏丸不能淡薄者搜風

順氣丸

○厥與麻木條參看

厥症不獨手足厥宗筋脾胃合為孽

內經氣厥篇厥者氣逆也凡移寒移熱或

伏熱深而振慄或虛寒甚而發躁皆謂之厥不做手足厥冷而日宗筋陰器也厥陰所主脾胃肝皆輔逆宗筋寒厥則陰縮而四肢冷熱厥則津乾不榮四肢溺赤而手足熱是六經之厥皆統於肝與脾胃也

太陽胸仆

足難行經曰巨陽之厥腫首頭重足不能行發為胸仆而僵仆倒地

陽明腹滿顛狂發

陽明之厥則顛疾欲走呼腹滿不得卧面赤而熱妄見而妄言

少陽耳聾脇肋疼

少陽之厥則暴

聾頰腫而熱脇痛脈不可以運

太陰腹脹作嘔泄

太陰之厥則腹滿腹脹後不利不欲食食則嘔

不得少陰心痛口舌乾

少陰之厥則口乾溺赤腹滿心痛

厥陰莖縮膝腰

折厥陰之厥則小腹腫痛腹脹溼洩

又或咽腫咳不寧腸

不利好卧屈膝陰縮腫脈內熱

癰項強衄吐血

太陽厥逆僵仆嘔血善衄少陽厥逆机關不利機關不利若腰不可以行項不可以

顛發腸癰不治驚者死陽明厥逆喘咳身熱善驚衄嘔血  
 手太陰厥逆虛滿而咳善嘔沫手心主少陰厥逆心痛引  
 腹身熱死不可治手太陽厥逆耳聾泣出頭不可可以顛腰  
 不可為俛仰手陽明少陽厥逆發喉痺隘腫痊若三陰俱  
 逆不得前後使人手足寒三日死

**外感寒泣暑相煎**

寒泣血發厥脈沈微者理中湯四逆湯暑

耗氣發厥脈虛者白虎湯或香薷散加羌活夏月勞役犯  
 房以致陽氣煩擾目昏耳閉內經謂之前厥言熱氣煎逼  
 損腎與膀胱而成也宜四君子湯加遠志防風赤芍內傷  
 麥門冬陳皮凡外感發熱者宜解散藥中加姜汁

**薄厥痰火挾**

內因喜怒傷氣傷志氣逆而不下行則血積於心胃內經謂之薄厥言陰陽相薄氣血奔

井而成古法暴厥氣逆身冷者蘇合香丸八味順氣散怒  
 氣逆甚嘔血熱衄發厥者四物湯去地黃加赤茯苓人參  
 桔梗陳皮麥門冬檳榔姜煎服或六鬱湯氣實多怒忽大  
 叫發厥者乃痰閉於上火起於下而上衝用香附五錢川  
 芩七錢生甘草三錢童便姜汁煎服又青黛人中白香附  
 為丸服箱愈用藜蘆痰湯加黃連香附煎吞當歸龍薈丸因

而

勞役飲水被驚發厥者六君子湯加參連竹瀝姜汁。內傷痰火發厥脈弦滑者二陳湯加竹瀝枳實加生附子。痰火加參連山拖竹瀝肥人加入參姜汁。凡厥症為顛為胸仆為妄見或腹脹二使不利或嘔或心痛皆痰火鬱氣病也。總因酒色陰陽衰。熱厥因醉飽入房濕熱鬱於脾土不能滲榮四肢陽氣獨盛故手足心熱。

宜補益益氣湯升陽散火湯火鬱湯。寒厥因多慾奪精元陽大有所損不能滲營經絡陰氣獨在故手足皆寒宜十全大補湯加附子或當歸四逆湯。尋常氣虛發厥者。

四君子湯血虛發厥者四物湯有火加知母黃柏虛寒加附子但厥多不以不勝乘其所勝如腎移寒於脾則為寒厥心移熱於腎則為熱厥六經皆然抑論陽症煩渴譫語。

身熱陰症不渴靜倦身寒與傷寒陽厥陰厥大同但雜病多因酒色七情痰火所致外感者少故經曰陽衰於上則。

為寒厥陰衰於下則為熱厥陽極似陰陰極似陽與傷寒因雖不同而病狀變化亦相似也。尸厥亦是。

下虛極。凡有吊死問疾或入廟登塚卒中外邪與臟氣相忤氣過不行經絡脈伏昏不知人忽手足逆冷頭。

入時

卷

面青黑牙關緊急昏暈卒倒或錯言妄語決不可作風治  
 先宜蘇合香丸灌之候醒以木香勻氣散合平胃散調之  
 素虛者用煇硝五錢硫黃二錢為末作三服用陳酒一盞  
 煎覺煇硝氣便於盞內蓋着溫服如人行五里又進一服  
 如無前藥用古參附湯入姜汁酒煎服外灸百會穴如葉  
 豆大艾九壯氣海百壯身溫者生暴死者追魂湯灌之  
 蛇厥見傷寒接補陰陽本內經陰陽氣不相接則厥熱厥  
 血厥見產後接補陰陽本內經補陰寒厥補陽正經所謂  
 壯水之主以鎮陽光益吐下還為實者設以蘇合香丸灌  
 火之源以消陰翳也  
 與痰壅口噤者瓜蒂散吐之或搐鼻  
 亦可熱甚者大承氣湯雙解散下之

○癆瘵

癆瘵日瘵先須辨陰陽  
 熱癆陽病口乾舌蒼咽痛涕唾稠  
 粘手足心煩疼小便黃赤大便燥

結虛癆陰病唾痰白色胃逆口惡飲食難化小便多遺精  
 白濁大便溏泄又有嗽痰仰時不得者必陰陽兼病也多

因十五六歲或二十前後血氣未定之時酒色虧損精液  
 而成全屬陰虛間有因外感久瘧久嗽而成者多屬陽虛  
 熱癆咽瘡失音者死  
 虛癆泄不止者死  
 陰陽傳變最無常 不問陰病陽病日  
 久皆能傳變男子  
 自腎傳心肺肝脾女子自心傳肺肝脾腎五臟復傳六腑  
 而死亦有始終只傳一經者有專着心腎而不傳者大要  
 以脈為 潮汗咳 或見血 泄分輕重 輕者六症間作重者六  
 症發 為咳血為潮熱火動於下則為精濁為泄瀉若先見血止  
 血為先其餘流傳變症雖多亦必歸重於一經假如現有  
 精濁又加之脛酸腰背拘急知其邪在腎也現有咯血多  
 汗加之驚惕口苦生瘡知其邪在心也現有喘咳嗽血加  
 之皮枯鼻塞聲沈知其邪在肺也現有夢遺加之脇痛多  
 恣頸核知其邪在肝也現有泄瀉加之腹痛痞塊飲食無  
 味四肢倦怠知其邪在脾也當隨其邪之所在調之○勞  
 熱清骨散內熱保真湯補熱黃芪驚甲湯○勞血咯血大  
 平丸嗽吐咳咯保和湯血去多二黃補血湯血不止十灰  
 散鼻衄紫石散○勞嗽乾咳人參潤肺丸保和湯大平丸

寧肺湯肺痿知母茯苓湯肺癰桔梗湯單白朮散。○勞壯  
 白木膏八珍湯腎氣丸。○勞汗黃芪散更當於各病本條  
 參初與開關起胃房。勞者倦也。氣血勞倦不運則凝滯。跡  
 則上焦不行。下脘不通。熱薰胃中而生內熱。凡頭上有核  
 腹中有塊。或當臍水冷。或無力言動皆痰涎結聚。氣血凝  
 滯之所致也。故以開關起胃為先。蓋關脈閉則氣血乾枯  
 胃氣弱則藥無由行。但陽虛不可偏用辛香。丁附之類。陰  
 虛不可偏用苦寒。知柏之類。水立有開關散定胃散。今亦  
 難用。竊其意推之。○陽病開關清熱利便。宜瀉白散。加銀  
 柴胡。秦艽。桔梗。木通。澤瀉。當歸。芍藥。木香。以小使多為病  
 去。○陰病開關行痰利氣。宜二陳湯。加便製香附。貝母。牡  
 丹皮。當歸。山查。蘇梗。及生地。木香。少許。以氣清痰少為病  
 減。○陰陽俱用。參苓白朮散。三白湯。或二陳湯。加白朮。神  
 效。麥芽。以起脾胃。如有泄者。尤宜多服。久服。俟胃氣轉然  
 後依症用藥。○古方以生犀散。防風。當歸。飲。或三德丸。黃  
 連丸。治熱癆症。然必初久則平補火自熄。久虛積損成  
 起體實而後敢用之也。

散十全大補湯人參養榮湯補中益氣湯單人參湯○陰  
虛加味逍遙散滋陰降火湯節齋四物湯補陰丸大造丸  
補天丸虛甚者瓊玉膏白鳳膏○古云服東藥百無一死  
飲溲溺萬無一死惟脾胃虛及氣血弱者必以滋補藥中  
量入童便以代降火之藥今俗非偏用知相生地滯脾則  
又偏用人參桂附助火治咳輒用堯鈴紫苑款冬青黛牡  
蠣收澁肝經治血輒用京墨金石寒束傷其氣血退潮輒  
用錄柴胡胡黃連消其肌肉遺精輒用龍骨石脂滋燥其  
精皆不治  
其本取 **扶正祛邪** 虫亦亡 虫亦氣血凝滯痰與瘀血化  
梅青蒿硃砂之類而虫自亡矣紫河車丹紫河車丸青蒿  
膏蛤蚧散天靈蓋散選用○傳屍之說不必深泥歷觀癘  
瘵皆因酒色財氣損傷心血以致虛火妄動醫者不分陰  
陽用藥病家不思疾由自取徃徃歸咎前人積惡甚則疑  
及房屋器血墳墓且窺業飛屍逆相傳症古人亦云癘瘵  
三十六種惟陰德可以斷之不幸患此疾者或入山林或  
居靜室清心靜坐常焚香叩齒專意保養節食  
戒慾度乎病可斷根若不遵此禁忌服藥不效 **我有一言**

真藥石改財氣過遷善篤信天理內穿蒼

○諸虫

九虫皆因臟氣弱濕熱薰蒸痰成諸虫皆因飲食不節

腥膻炙煨或驚覓同食以致中脘氣虛不運而成積積久成熱濕熱薰蒸痰與瘀血凝結隨五行之氣變化而為諸

般奇怪之形若腐草為螢是也九虫一曰伏虫長四寸許為諸虫之長二曰蛔虫長尺許貫心即殺人三曰白虫長

一寸母子相生其形轉大而長亦能殺人四曰肉虫狀如爛杏五曰肺虫其狀如蠶六曰蝟虫狀如蝟蝟七曰弱虫又名瞞虫

狀如瓜瓣八曰赤虫狀如生肉九曰蟯虫狀如菜虫形至細微心煩咳嗽多嘔唾肉虫令人

肺虫令人咳嗽蝟虫令人嘔吐既逆喜噦嘈雜心煩滿悶愛契泥炭生米茶益姜椒等物弱虫令人多唾瘡癰痔漏

與腸鳴瘡疥癩多虫之為害赤虫令人腸鳴又有感觸蠱

瀾

動物心腹刺痛藥不靈或山澗蛇虺水蛭遺精誤飲其水

心腹刺痛或引腰脇時作時止諸藥不効乃虫症也雄砂丸止之婦人鬼胎兒血驚婦人

腹大僅一月間便能動作乃至過期不產或有腹痛此必

虫症雄砂丸或萬應丸主之。血驚小兒最多大人間有

蓋驚因積痰而成故也追虫打驚丸不敢下者

釣虫黑白丸亦好但釣後須服調脾和胃藥。眼鼻下黑

蟬瓜明凡虫症眼眶鼻下青黑面色痿黃臉上有幾條血

不早治相生不絲如蟬瓜分明飲食不進肌肉不生沈重寒熱若

已貫心殺人傳屍癆虫十八種傳屍自上注下病與前

血歸於元陽之內變幻種類最多古謂第一代虫如嬰兒

或如鬼或如蝦蟇遇丙丁日食起醉歸心俞榮二代虫如

亂髮或如守宮或如蜈蚣或如蝦蟇遇庚辛日食起醉歸肺

俞第三代虫如蛟如蟻或如螻蛄或如刺蝟遇庚辛日食

起醉歸厥陰第四代虫如亂絲或如猪肝或如蚯蚓如蛇

遇戊己日食起醉歸脾俞第五代虫如蟹龜或首頭無足

或如

或如

或如

或如

或如

或如

蚊

或有足無頭或如鼠或如精血遇甲乙日食起醉漏肝俞  
 第六代虫如馬尾有兩條一雌一雄或如驚有頭足尾或  
 如爛麩或長或短遇丑亥日食起醉漏腎俞週而復始凡  
 取務虫依五臟方選用必俟其大醉日方可取之取後隨  
 補各臟如取脾虫後則補脾取腎虫後則補腎若病甚者  
 不分臟腑只用追病丹以斷其根又有輕者只用鰻鱧魚  
 煮食或紫河車丹陽虛者金夜丹最妙○取務虫法先令  
 病家用皮紙糊一密室不留些罅隙擇一老成人過道以  
 安息香水洒其過道之人身以雄黃雌黃塗耳口鼻上  
 安排鉄鉗一把布巾一幅用香油二斤以鍋盛頓微煎令  
 沸仍用高桶一箇以石灰在桶内生布巾蓋桶口俟月初  
 虫頭向上却服取虫藥五更初一服五更三點時一服服  
 藥後腹中疼痛如刀斧劈不妨至巳時必須下虫或取下  
 臭穢如膠漆或吐瀉膿血癥塊皆於灰桶中共虫或從汗  
 出紫蠶苗狀或從耳鼻口中出或小便中出異般形狀不  
 一或青黑或黃紅大者急用鉄鉗取入油中煎當日將油  
 紙裹虫入瓦罐內石灰填實埋於深山遠僻之處免再染  
 人其患人衣被床席並皆棄去醫人分付藥後亦須遠避

其取<sub>下</sub>虫色白者食臟腑脂膏可三十日服藥補之虫色  
黃赤者食<sub>入</sub>血肉可六十日服藥補之虫色紫黑者食<sub>入</sub>  
精髓病傳至腎可謂極矣異其萬一或為子孫除害則  
可又虫頭白者亦難治此危氏說也丹溪謂不必深泥

肺咯血必損聲

瘵虫須分五臟皆居肺間正所謂膏之上  
盲之下針之不到藥之不行只宜早灸膏

言四花為佳若蝕肺系則咯血吐痰聲嘶思食無厭病患  
至此未易治療○又有應聲虫每語喉中如有物依聲相

應者有入教誦本草至雷丸則無聲  
乃頓服數枚而愈孤感蠱症見各條 虛先溫補後追逐

者俱宜先用溫補扶其元氣然後用王道之藥佐以中下  
殺虫之劑如化虫丸史君子丸五膈下氣丸之類或追虫

後而繼以溫補亦可不然 實則吐下量體行 膈心腹痛

用樟木屑濃煎湯服之大吐虫痛殺後煎甘草湯與之  
和胃如有積自吐虫者用黑錫灰橫柳等分為末米飲下

○上虫用追虫丸取積藥苦練根  
湯萬應丸萬病解毒丹量體選用

求嗣

求嗣之理非玄微

由無不草木人無不生育婦人要經調

虛靜流而不能直射子宮多不成胎蓋因平時嗜慾不節

施泄太多所致宜補精元兼用靜工存養無令妄動候陽

精充實依時而合一舉而成矣女人陰血衰弱雖投真精

不能攝入子宮雖交而不孕雖孕而不育是以男女配合

必當其年未算之女陰氣未完慾盛之婦所生多女性行

和者經調易挾性行施者月水不勻相貌惡者刑重稟容

媚者福薄大肥脂滿子宮不能受精太瘦  
子宮無血精不能聚供不宜子不可不知  
精血無病交合  
時男精女血皆兼氣血陰陽總屬腎與命門精血充盈別  
無雜病宜交會得時乃成胎孕凡經盡一日至二日新  
血未盛情勝其血男胎成矣四日至六日新血漸長血勝  
其精女胎成矣六日至十日鮮有成者縱成亦皆女胎欲  
求子者全在經盡三日以裏於夜半子時生氣海精受妊  
必男斯時男女無暴怒毋醉飽毋食炙燻辛熱母用他術

贊益陰陽和平精血調暢交而必孕孕而必育育而為子  
且壽娠後宜內遠七情薄五味大冷大熱之物皆在所禁  
蓋子食母氣以成形食母味以養精苟無胎動胎痛漏血  
及風寒外邪不可輕易服藥亦不得交合觸動慾火生後  
攝養一如胎前蓋母食熱則乳熱母食寒則乳寒母  
食膏粱饗烈之物則乳毒有是數者子受其害矣 寡慾

清心為上策

寡慾則不妄交合積氣儲精待時而動故能  
有子凡心有所動即是慾心主血而藏神腎

主精而藏志心神外馳則腎志內亂其於交會之際殊無  
靜上清寧之氣所泄之物同歸腐滿而已安能發育長養

於其間哉慾寡神完不惟多子  
抑亦多壽故養生莫善於寡慾 服藥陰陽貴得宜 若見命

細或絕陽事痿弱法當補陽若見命門脈洪大鼓擊陽事  
堅舉是為相火妄動法當滋陰若或腎脈浮大乳緊遺精

尿血法當補陰若帶洪數蕪以瀉火若見腎脈微甚欲絕  
別無相火為病法當陰陽雙補陽脫痿弱精冷而薄或來

慢不能直射子宮命脈微細者還少丹打老兒丸精清淡  
若雀卵丸陽痿不舉命門脈虛欲脫者巨勝子丸壯陽丹

腎氣欠旺來慢不能直射子宮者續嗣丹溫腎丸精漏無  
 火者金鎖思仙丹陰虛有火者大造丸腎氣丸補陰丸鹿  
 髓丸四十以後縱有次動者只宜小兒絳子丸天門冬膏  
 忌用知柏芍藥寒涼陰陽兩虛者八味丸二神交濟丹通  
 用種子大補丸玄牝太極丸五字衍宗丸十子丸加味蒼  
 朮膏何首烏丸女宜鼓動微陽女金丹各歸斯丸大小烏  
 雞丸調養經血四製香附丸七製香附丸十味香附丸墨  
 附丸單醋附丸百子附歸丸琥珀調經丸加味養榮丸加  
 味益母膏滋陰百補丸大造丸補陰丸○依症選用不可  
 慕乃各之美珍藥之異而先自傷根按本亦不可過服熱  
 藥以遺子患古云父吞剛劑子患熱淋且性燥多火男女  
 皆然况造化之妙豈可專恃藥餌必也改過遷善懲忿窒  
 慾人倫日用無所欺肆買賣交易不致刻  
 剥自然德可動天生子必賢且壽勉之

○養老 附鬚髮

老人無非血液衰

兩腎中間白膜之內一動氣大如筋  
 頭鼓舞變化開闔週身薰蒸三焦消化

水穀外禦六淫內當萬慮晝夜無停年老精血俱耗平居  
七竅反常啼號無淚笑如雨流鼻不嚏而出涕耳無聲而  
蟬鳴如雙食口乾寐則涎溢溲不利而自遺便不通而  
或泄晝則對人瞋晝夜則獨卧惺惺此老人之病也火動

**風痰百病摧**

陽虛氣盛兩手脈大緊數飲食倍進臉紅神  
健雖時有煩渴膈熱大便閉結但以平和湯

藥消解切勿不可用苦寒疎瀉○火症風症戰掉氣亂目直  
口緊筋急者通垂散痰症二陳湯三子養親湯清氣化痰

丸節齋化痰丸凡年老覺小便短少即是病進宜卻病延  
壽湯小便頻數者腎氣丸去澤瀉加茯神益智五味子大

便燥者搜風順氣丸陰虛筋骨  
痿弱足膝無力者加味補陰丸亦有脾虛多積滯若果是從

陽之氣一向憊之之人全在斟酌湯劑當加溫補調停  
將以爲養治宜補中益氣湯橘半枳朮丸平胃散竹瀝枳

**米溫和丸散可扶培**

任有外邪息大汗吐下宜平和藥調  
之任是衰老不宜峻補古方固真飲

予神仙訓老丸遇仙益壽丹神金丹五仙丹及諸虛明養  
性延年之藥皆可選用厭服藥者只宜食治詳前一卷

鬚屬少陽髮腎水精不上升白似灰

膽榮在鬚腎華在髮精氣上升則鬚潤而

黑六八以後精華不能上升秋冬令行金削肺枯以致鬚髮焦槁如灰白色養生者宜預服補精血藥以防之染掠亦非上策○染鬚方用大烏龜一箇餓一二日將飯與肉骨果子烟火之食飼之三五月後夜間以漆盃盛之用薄竹片置盃縫口通氣外放燈一盞盃內作熟龜在內旋轉不已自然撒尿緊急只用麻油烟薰鼻其尿即出先用五倍子炆醋如膠若龜尿得一小鐘入五倍醋半鐘同入磁器內炆一滾即止牛角確收貯每用新筆畧蘸搽鬚表上多用則面黑○又方炒五倍一兩銅末四分生食鹽生白礬白麩各二分為末濃茶調膏搽鬚上俟鬚乾以手撚下○內服烏鬚丸胎髮青鹽各四兩共入罐內封固火炆三炆香夕冷定取出為末用何首烏冬青子九蒸九晒旱蓮草枸杞子生地當歸白茯苓各四兩人參二兩以水十碗煮汁五碗去渣熬膏將前二味入內攪勻分作幾小罐盛之每空心滾水酒調下三五茶匙因下血多而鬚髮易白者尤宜秤金丹亦妙○因吐衄失血多者瓊玉膏○因房

室損精易白者還元丹還元秋石丸女貞丹有火者大造丸。因濕痰癩痢等疾衰白單蒼木膏加味蒼木膏。皮膚肌骨有風痛痒者何首烏丸陽虛者卻老烏鬚健陽丹延年益壽不老丹有火者八仙添壽丹是知烏鬚亦必因症用藥若不顧臟腑專務鬚髮而刻投丸散是刮腹而藏珠也噫。鬚髮脫落非因老內風血燥亦奇哉。年來髮落鬚長常也少壯有髮落或鬚亦落者腎枯火炎肺痿內風妄動故也腎氣丸單天門冬膏主之內風甚者柏葉煎單方用自已髮或胎髮童男女髮洗淨泥固煨過爲末空心酒下。一分兼烏鬚髮入補藥丸外用黑附子蔓荊子柏子仁等分爲末烏雞脂搗勻瓦罐封固一月取出塗之即生餘詳癩風條。

編註醫學入門外集卷之四 終

滕序緝吾劉君  
名時熙贈刻

增

論王制人四

...

...

...

...

...

...

...

...



