

後園學入門

外
五卷下

#1336609/11

v. 12

編註醫學入門 五卷下

外科

腦脛部

癰疽總論

九葉 腦發五種

百 頭瘡

百 風屑

百 白禿

百 軟癬

百 大頭腫

百 鬢疽

百 耳瘡

附侵淫瘡 月蝕瘡

百 內疔瘡

百 疥腮

百 瘰癧

百 瘰核

百 癭瘤

手部

百 疔

百 甲疽

百 代指

頁 天蛇頭

頁 鷲掌風

頁 紅絲瘡

頁 心癰 附脇

胸腹部

頁 乳癰

頁 肺癰痿

頁 胃癰

頁 腸癰

頁 腹癰

背腰部

百 背發七種

百 腰發二種

臀腿部

百 臀發癰 附臀疽瘡

百 便毒

百 路岐

百 懸癰

附穀道

百 痔

百 漏

百 陰瘡

百 陰囊癰

附小瘡

見陰囊

百 婦人陰瘡

附交接上寒濕瘡

百 杖瘡

附骨疽

附腿上一切寒濕瘡

足膝部

八^百 鶴膝風

八^百 入面瘡

八^百 腎臟風瘡

九^百 臙瘡

九^百 腳跟瘡

附脚肚瘡
及脚口瘡

十^百 腳發

十^百 嵌甲瘡

十^百 脚指了瘡

十^百 脚背發

遍身部

十一^百 五疥

十二^百 五癬

十三^百 血風瘡

十二^百 癩風

十四^百 楊梅瘡

十五^百 疔瘡

十六^百 多骨疽

十七^百 翻花瘡

十七^百 流注

十七^百 瘰

十八^百 癩

十八^百 暑熱瘡

十八^百 癩瘡

十八^百 寒冷瘡

十八^百 凍瘡

十九^百 手足皸

十九^百 螭瘡

十九^百 癩瘡

十九^百 侵淫瘡

十九^百 白蛇纏

十^百 湯火瘡

十^百 肥瘡

十^百 疔瘡

十^百 漆瘡

十^百 竹木刺

十^百 折傷

十^百 破傷風

論... 卷八 疔毒下

至九十一葉小兒門也誤附此卷

等

肉丸 芡實大 每服一丸 用針挑於燈焰上 燒存性 乳汁或
米泔冷水 任化下 此藥清鎮專主吐逆及瀉 大人亦宜

肉虛 失音 為腎怯 吐瀉五內俱虛 有失音者 乃腎怯也 食

少氣 陷損 胃陽 吐瀉久不止者 乃清氣下陷 胃口陽虛 飲

散 虛渴者 但食即吐 先除積 四肢逆冷 腹脹 當先用消

乳食 用取積消導 寬利 胃腸 如嘔甚者 只用白豆蔻砂仁

下者 宜或燒針丸 亦妙 冷氣入胃 嘔吐不已 若四君子

湯 加白豆蔻砂仁 肉豆蔻 山藥 為末 或蜜丸 每下錢木瓜

紫蘇煎湯下 脾胃虛弱 逆痰 含哭 飲乳 食物停滯 不散

腹滿 嘔吐 嬰兒乳者 四君子湯 加南星砂仁 丁香 藿香 冬瓜

子 姜煎服 或啓脾丸 嘔而不止 痰涎在喉 有聲 將作驚
者 二陳湯 加丁香 藿香 或抱龍丸 主之 因驚氣逆 而吐
者 太溫驚丸 吐而湯水不納者 五苓散 吐涎痰熱者
白玉餅下之 冷者 溫之 有吐沫 或白綠水者 胃冷也 理中

丸或半夏陳粟米等分姜煎服○吐稠涎及血者肺熱也
 久則肺虛阿膠散加我○吐沫水者後必虫痛安虫丸煎
 漆二分雄黃巴霜各一錢為末糊丸黍米天每五七丸或
 廿丸發時取東行石榴根煎湯痛甚苦練根或蕪荑煎湯
 下量兒大小服之○經年吐乳眼慢黃幾有筋膜者乃父
 母交感時喫乳所致宜益黃散五疳保童丸九喫乳因驚
 因積因氣滯因瀉滑青者慢驚防滑者或出不知或直射
澀流或穀食不化或下
 外感與治吐同
 之如桶激遺四君子湯加訶子木香陳皮肉豆蔻姜煎服
 兼進固腸丸或真人養臟湯或殺石子丸加乳香肉豆蔻
 選用○瀉青色者乃夾驚木尅土也益黃散太溫驚丸主
 之有初起黃變青或瀉藥物直過者尤為寒瀉三五次即
 困急用附子埋中湯或肢冷只鼻氣亦冷故依慢驚慢脾
 若觀昔散加全蝎天麻防風羌活甚者用金液丹為末煎
 生薑米飲調灌多服乃效候胃氣已生手足漸暖惡瘧猶
 在若球用金液丹合青州白丸字等分服之兼用異攻散
 理中丸釣藤散轉驚丸調理雖至危者往往死中得生全
 液丹真小兒吐瀉之妙劑也蓋小兒吐瀉皆當溫補若已

虛損尤當速生胃氣惟尋常時行瀉症不可遽投熱藥
瀉止痢作無疑若患瘡瀉青乃毒去無害不必服藥

五疳

五疳由積虛而成 疳者乾也瘦瘠少血也五疳病關五臟
二十歲以下曰疳二十歲以上曰癆始

因乳食太過或乳母喜怒房勞後即與兒乳或飯粥肉食
太早肥甘不節而成間有傷寒病後久吐久瀉久渴痞積

疹痘雜症妄施吐下內亡津液而成者要皆脾胃虛弱血
氣枯滯生積生熱生痰乘臟氣之虛傳入為疳間有熱者

亦虛熱耳故治熱不可妄表 內熱中滿病初萌 經曰飲食
過涼治虛不可峻溫緊補

熱數食其令人中滿言病之始也凡嬰兒乳食停滯稍覺
飽滿內煩不安虛者必須扶胃而兼消導實者必先疎利

而後和胃不可因循以致積久成疳又有熱滿
未甚便施蘆薈胡連龍膽苦寒傷胃反致疳者 內疳痞結

漸黃瘦外鼻赤爛瘡瘻生 疳症初患中滿及則結痞初患
內熱及則外潮令人肌膚黃瘦

或耳鼻生瘡或遍身生瘡受喫泥炭土米鹹酸雜果食不
 消化不便不清大便反利大藥熱痔多見外症冷痔多見
 內症○痔症鼻頭有瘡不着痂就蓮耳生瘡宜用白及輕
 粉各二分烏賊魚骨三分為末先以漿水洗拭乾糝或鼻
 下赤爛自搽者用蘭香葉燒灰二分銅青半分輕粉少許
 為末乾糝○痔症遍體生瘡不歇乃虫內耗精髓外蝕皮
 膚宜連丹丸黃連七兩水濕透納雄猪肚內用線緊縫飯
 上蒸十分爛取出和少菜飯搗丸小豆大每二三十九米
 飲下仍以川芎生地茯苓神與之調血清心或蘆薈丸
 肥兒丸生犀散選用間服外以大伏皮苦參白芩煎湯洗
 後却用訶子帶皮核燒灰入麝香輕粉熱痔身熱大便秘
 少許為末敷之自幼小以至弱冠皆同
 痔病初起人未瘦怯但臉赤口臭唇焦煩渴潮熱如火大
 便秘澀者為熱痔宜胡連丸胡黃連川黃連各五錢辰砂
 一錢半為末入猪膽內繫定懸於鉢內用深漿煮一炊
 飯久取出入蘆薈末二錢麝香少許粳米飯九麻子大每
 五七丸茶清下下方有青黛蝦蟇灰各二錢○熱痔黃冷
 類犀目遇夜不見或生瘡者五福化毒丹陳粟米飲下

痺身涼瀉不停痺病久則目腫面黃體瘦煩渴多汗腹脹滑瀉無常或青或白或如垢膩者為冷毒

宜至聖丸丁香香丁皮各一錢木香厚朴史君子陳皮肉冷

豆蔻各二錢為末神麩丸麻子大每七九米飲下冷熱二症交互非就非

熱相兼泄且秘或時便血或潮熱久不內外因者宜消積

和胃滋血調氣淡薄飲食久則自然堅牢如聖丸主之胡

黃連川黃連蕪荊史君子各一兩麝香五分為末用蝦蟇

五箇搗碎酒熬成膏和丸麻子大每五七丸或二十九丸

參煎湯下常服錢氏白朮散以生津液蓋痺本濕熱久則

寒濕全在驚痺面赤盜汗渴安神退熱滋衛榮

臨時愈意驚痺即心

虛血弱神不守舍更加乳食不調心臟積熱所致外症臉

赤唇紅口舌生瘡胃膈煩悶小便赤澀五心皆熱盜汗發

渴齋齒驚悸宜茯神丸琥珀葦連赤茯苓各三

錢遠志用黑豆水煮去骨鈎藤皮蝦蟇灰各二錢菖蒲一

錢麝香少許為末粟米糊丸麻子大每十九

薄荷煎湯下輕者硃砂安神丸太溫驚丸風痺涼血真

順氣搖頭揉目便多青

風疳即肝疳多因胎風更加乳食不調肝臟受熱或乳母外感肉傷

邪氣未散遷與乳兒所致外症搖頭揉目白膜遮睛或赤

腫眵淚爛弦痛痒雀目昏暗甚至經月眼合名曰疳眼汗

流合面而卧肉色青黃髮立筋青腦熱羸瘦宜生熟地黃

丸加常歸前服或黃連肥兒丸中梔煎湯下○疳眼非熱

體瘦脇疼便青一切肝症風疳丸青黛黃連天麻五靈脂

夜明砂川芎蘆薈各一錢龍膽草防風蟬退各一錢半全

蝎二枚乾蟾頭三錢為末猪膽汁浸糕丸麻子大食疳痞

每十丸薄荷煎湯下如脇硬眼角見黑氣者難治

脹多澹泄磨積退黃脾漸寧食疳即脾疳由乳食傷而後傷脾氣孤弱或乳母恣食生

冷肥廕或酒飯後即與乳兒又則變為乳癖腹脇結塊各

日乳疳外症黃瘦腹脹氣促瀉臭合睡食減吃泥宜益黃

散補乳食丸或肥兒丸加我木青皮陳皮○肚大青筋若

小胡連丸胡黃連五分去果積阿魏一錢半去肉積神效

去食積黃連去熱積各二錢麝香一微為末氣疳咳血或

猪膽汁和丸黍米大每丹丸白木煎湯下

聲亞退熱化痰肺自清

氣痔即肺痔原因傷寒傷風汗後勞復更加乳食不調以致肺氣受

傷外症鼻下兩傍瘡痒不痛或鼻流臭汁内生息肉或汁

所流處隨即成瘡各曰瘡囊不時咳嗽氣逆寒熱唾紅汁

瀉多帶揉鼻咬甲與癆症大同宜先服清肺湯黃芩當歸

麥門冬連翹防風赤茯苓桔梗生地紫蘇甘草煎胡各五

分桑白皮一錢水煎服次服化鑿丸蕪荑蘆薈青黛川芎

白芷胡黃連川黃連蝦蟆灰各等分為末猪膽汁浸糕丸

麻子大每廿丸食後臨卧杏仁煎湯下其鼻常用熊膽泡

湯水筆蘸洗俟前藥各進數服再用青黛當歸赤小豆瓜

蒂地榆黃連薑薤各等分雄黃少許為末入鼻欬瘡○痔

啞不能發聲者用黃連肥兒丸十五粒蘇合香丸一粒硃

砂五靈脂各少許為末腎痔耳焦天柱倒齒脫手足冷如

菖蒲煎湯乘熱調服

水腎痔又名急痔言五痔惟腎為最急也

未淨更加乳食不調其味入脾而生虫狀似傷寒脈或

上齧齒齲則口瘡出血臭氣甚則齒齲潰爛齒黑脫落頭

有穴者名曰走馬痔言陽明熱氣上奔如馬然下齧腸胃

則下痢肛爛即後痔痢外症腦熱肌削手足如冰爪黑面
鰓身多瘡疥寒熱時作甚者天桂骨倒俱宜腎氣丸加史

君子川練肉○走馬痔并痘毒牙痛者溺白散或用白芷
五錢馬牙硝一錢銅青五八分麝香一字為末乾敷口角及

豫齒又有諸般難治症日痔乾痔渴痔癆痔瀉痔痢痔腫
上效皆五痔之危症日蛔痔腦痔奔痔

無辜痔了系痔噴露痔皆五痔死症所以然者五臟俱病故也痔乾五臟俱不平心痔舌

肝痔乾啼眼不轉睛脾痔搭口癡眼口乾作渴肺痔聲焦
皮燥大便益結腎痔身熱股冷小便乾澀古方通用蓮膽

丸黃連五錢猪膽汁浸瓜蒌根烏梅蓮肉杏仁各二錢為
末牛膽汁浸糕丸麻子大每十五丸烏梅姜蜜煎湯下如

五乾俱見身上粟生色瑛黑者必死痔渴遇夜還稍止痔渴臟中宿有痔氣

灸燻酒麩以致小兒心肺壅熱日則煩渴引飲乳食不進夜則渴止宜連膽丸如飲水不止舌黑者即死痔癆

潮汗咳瀉成痔癆骨蒸五心潮熱盜汗咳嗽泄瀉肚硬如
石面色如銀斷不可治古方八物湯去白朮

加黃芪柴胡陳皮半夏史君子蝦蟆灰鱉甲各等分
煎服或連膽丸香連猪肚丸加蝦蟆灰救之如氣促者即

死
痔瀉額上青紋見
泄下糞粕忌用熱藥止之宜香薷丸

黃連三錢木香肉豆蔻訶子砂仁茯苓各一錢為末飯
丸黍米大每五九米飲下如瀉瀉脫肛飢逆者死速

痢五色濕邪滲
痔痢見有痔疾加之傷食及感冷熱不調

三錢木香厚朴夜明砂砂仁各二錢訶子一錢為末
丸麻子大每十五九姜艾煎湯下如入中平滿者必死

痔腫中虛毒氣併
故令肚腹脹由是脾復受濕故令頭

面手足浮腫宜退黃丸肥兒丸
一兩陳皮青皮檳榔黑丑五靈脂赤茯苓我木各五錢木

香二錢半為末麩糊丸菜豆大每十五九桑白皮紫蘇煎
湯或蘿蔔煎湯下治小兒乳食不消心腹脹滿嘔逆氣急

或腸鳴泄瀉腹中冷痛食癥乳癰瘰癧氣痞結積聚腸胃或
秘或利頭面浮腫兼治五痔小痢肌瘦腹大者如神一方

有胡椒黃連三稜苦練根各二錢半○疳脹腹皮緊者

疳虫出難為精

蛔疳因缺乳粥飯肉食太早腸胃停蓄甜膩化為蛔虫多啼嘔沫腹痛唇紫腸頭及

齒痒蛔雖食虫却不可動動從口鼻出者難治凡疳積久莫不有虫形狀不一黃白赤者可醫青黑者死

顛腫髮作穗

腦疳因胎中素挾風熱生下乳食越常或臨產犯房以致滿頭餅癩腦熱如火髮結作穗

顛腫顛高過身多汗宜龍膽丸龍膽草升麻苦練根防風赤茯苓蘆薈油髮灰青黛黃連各等分為末猪膽汁浸糕

丸麻子大每廿九薄荷紫蘇煎湯下食後仍以蘆薈末入鼻

疳脊蝕脊鋸齒形

脊疳虫蝕脊脊

骨如鋸齒拍背如鼓鳴十指背生瘡頭咬爪甲煩熱黃瘦下利宜蘆薈丸無華項核虫如粉或

因烏羽古方評

無辜疳腦項邊有核轉動軟而不疼中有虫如米粉不速破之則虫隨熱氣流散

蝕臟腑以致肢體癱瘓便利膿血壯熱羸瘦頭露骨高初起可用針破膏藥貼之或因浣兒衣時夜露瘡下為雌烏

落羽所汚兒着此衣虫入皮膚故也其衣用火烘之則無
此恙宜月蟾丸用癩蝦蟆一箇打殺置桶中以尿浸之却
取糞蛆一杓入內任蛆食一日夜取出以布袋繫於急流
水中浸一宿瓦上焙乾入麝香丁字為末飯丸麻子大每
卅丸米飲下一服更煩退再服渴止三服瀉住亦治諸毒
疔灸腹大手足小項極小伶仃也灸腹大也甚者凡高肉削臍
突颯哭習腦或生穀癩愛喫生米嘔露翻食骨稜層嘔露
熱性來頭骨分開翻食吐虫煩渴嘔噦骨瘦稜層露形者
死蓋下突嘔露皆因脾胃久虛不能消化水穀以致榮衛
氣弱肌肉消燼腎氣不足復為風冷所傷形體瘦露亦有
胎中受毒臟腑少血所致盡皆無辜種類難治宜十全
救保童消食堪通用五疳保童丸 鰻鱓頭蟾頭熊膽麝香
夜明砂 天漿子 黃連 龍膽 草 青皮 五
倍子 苦練 狼 雄 黃 青 黛 薑 薈 胡 黃 連 各 等 分 為 末 糯米糊
丸 麻 子 大 每 一 丸 米 飲 下 治 五 臟 乾 疳 五 疳 消 食 丸 史
君子麥芽陳皮薑蕘神麩草龍膽黃連山查各等分為末
陳米飯丸黍米大每十丸米飲下消疳救虫退熱磨積進

兒下利寒熱去來毛髮不澤或因婦人有兒未能行時復
有孕使兒飲乳亦成此疾宜千金龍膽湯仍以紅紗袋夜
明紗與
兒佩之

○諸積

諸積須分虛與實虛者熱微實熱多

諸積腹脹腹痛甚結
癖痞浮腫黃疸以至

八利等症總皆積之為害虛者渾身微熱或夜間有熱少
食神倦抱起如積實者壯熱吐熱尤甚便閉顯腫喉塞涎
鳴壅盛熱毒發瘡俱宜木香丸主之虛者少用實者倍服
其或變症面黑瀉黑久瀉氣促手心生瘡瘦軟若不洽

乳積吐瀉極其臭

吐乳瀉乳其氣酸臭皆由滯叫未已飲
乳停滯不化得之雖未變熱而有痞是

為乳
氣積蟹渤叫啼過

腹痛啼叫利如蟹渤或發熱吐瀉
體瘦飲食不為肌膚皆由積性其

氣柔衛不和滯延日
又得之是為氣積

食積面黃肚腹硬

腹硬帶熱渴瀉或
嘔面黃皆由飲食

無度食積過飽後即行氣消乳食自磨行氣丸木香檀榔丁香神壳芽松史

君子神麩麥芽各二錢半二稜我木青皮陳皮香附各五

錢甜黃連一錢為末蒸餅丸黍米大每廿九米飲下治氣

積如汗散去青皮或五朮木香散亦好○消乳食丸砂

仁陳皮三稜我木神麩麥芽各五錢香附一兩為末糊丸

麻子大每廿九紫蘇煎湯下治乳積食要知小兒腸胃軟

積甚者消積丸感應丸紅丸子下之

切戒猛峻傷元和小兒有積腸胃脆軟忌用毒藥攻擊久

之法調脾和胃緩急次為攻之切勿傷其胃氣

有因下積傷脾反生潮熱變為慢驚者有之

癖病不食但飲乳凡小兒不食但飲乳飲乳而寒熱如瘧

因停水惟癖能發潮熱或寒原因乳食失調以致中脘停

水不能宜行為痰為痰冷氣搏之結而為癖所以

久瘡多藏於隱僻脇腹疼即痞塊與大人積聚同多藏

有之

癖保安還

是主 輕者木香九 重者取癖丸 其遠荒花牽牛 棘桂莪朮 青皮木 香桃仁 五靈脂各二錢

為末 入油巴豆一錢和勻 飛麩糊丸 麻子大 每一二九 姜

蜜煎湯下 泄後冷粥補仍與和胃 秘傳保安丸 白朮土

炒三兩 神麩木 香檳榔 茯苓 三稜 史君子 厚朴 葶藶 其草

各一錢 蒼朮二兩 陳皮 枳實 人參 莪朮 各一兩半 黃連 楮

膽汁浸 砂仁 麥芽 益智仁 肉豆蔻 藿香 白豆蔻 各五錢 為

末 蜜丸 龍眼大 每一九 米飲化下 嘔吐姜湯下 治小兒五

疳 痢吐瀉 肚大青筋 面黃肌瘦 疳積等疾 有肉積加山

查 喘加蘿蔔子 瀉加澤瀉 猪苓 各一兩 化痞丸 木香人

參 黃芪 當歸 枳 梗 黃連 三稜 莪朮 鱉甲 夜明砂 綠礬 枳實

史君子 苦練根 訶子 各一兩 蝦蟆 灰七錢 半為末 蜜丸 葶藶

豆大 每卅九 米飲下 忌生冷 雜果 發脾之物 大人癥瘕去

夜明砂 蝦蟆 黃連 為丸 梧子 大服 治疳消癖 進食 止瀉和

胃 進虫 楮脾散 海蛤粉 黃丹 硫黃 各等分 切休日 修合

為末 用醋調成膏 攤瓦盆內 曬乾 再研 為末 一歲兒服一

分 空心米飲下 取卞脾臟 如藍汁 為効 貼疳膏 水紅花

子二錢 大黃 枳 硝 山 搥石 灰 各一錢 酒 醱 下 塊 鷄子 六 共

子二錢 大黃 枳 硝 山 搥石 灰 各一錢 酒 醱 下 塊 鷄子 六 共

鴉成膏用布攤開貼痞塊上再用湯煎炙手
怕勒之三日後揭起肉黑如墨是其效也

腹脹由中虛氣作有積實者喘氣惡有積悶亂喘滿為實宜紫霜丸白玉餅消

積丸積丸子選用必利其積若氣

短喘急者分氣紫蘇飲換蘇子無積不喘虛宜溫

為虛可以溫散六君子湯加白芍乾姜厚朴或大異香散

加五靈脂為末紫蘇煎湯下或五苓散脾上下分消其氣

不可妄下仍誤下面腫及手脚誤下脾氣內陷脾主

忌香燥熱藥誤下面目胞腫脾主

四肢故腫脹通用塌氣丸胡椒一两蟬稻五錢為末麩糊

作浮腫腹大加蘿蔔子大喘氣腎虛水氣乘肺大喘者陰腫多

因地氣抽或啼怒傷小腸絡陰核氣結腫大鈎痛謂之癩

地風濕傷之俱宜五苓散有風熱囊腫便閉者白散

有因啼叫不止致冷陰氣下維水實不行或孕婦啼泣過

傷冷兒生下小腸氣閉血水凝聚水上乘肺故多先喘而
 從腫痛有稀軟者有木硬者宜行心氣逐腎邪利二便更
 無補法宜桃仁丸桃仁三錢蘇桂木黃薑半羌活壯丹皮
 各二錢為末蜜丸麻子大每五七丸葱白木通青皮入鹽
 煎湯下或煎流氣散子下青木香丸○外治腎囊腫天華
 物通明用牡蠣為末先以津唾塗腫處次用乾糝○坐地
 被風及虫蟻吹着囊腫用彈退煎湯頻洗或葱地絲或糞
 為末甘草汁調敷○風熱外腎暴腫且硬或生瘡者用生
 地黃為末先以葱椒煎湯洗淨次用津唾調敷
 外腎熱者鷄子清調敷或加牡蠣少許餘詳外科疝氣
 脹久不通吞塞胃芩連枳梗當斟酌痞結因熱聚腹不得
宣通上攻胃脇按之
 則痛時發壯熱宜芩連枳梗湯枳壳枳梗各五分半夏黃
 芩瓜蒌仁黃連各三分生姜麥門冬煎服利去黃芩即安
 熱甚加大黃少許○虛氣痞塞胃膈留飲聚於腹脇或加
 脹滿手不可近枳實理中丸去芩瀉加瓜蒌根瀉加牡蠣
 脹久虛濕熱生黃深黃為熱淡黃胃弱脹久中虛停瀉生
熱熱生黃各日黃

痘治與大人一同有熱者小柴胡湯加麥芽枳實山花茵陳
陳胃弱者四君子湯或理中湯加茵陳○通用萬金丸蒼
木二兩陳皮厚朴夜明砂各一兩為末用綠礬二兩化水
入醋少許煮漿糊或者棗肉搗丸棗豆大每五十九米飲
下磨積去黃一方加史君子一兩枳實黃連訶子各五錢
用巴豆十粒同炒令紫色去巴豆不用再入蝦蟆灰五錢
苦練根皮二錢半為丸治疳
消癥進食止瀉和胃追虫

腹痛面黃只是積腹痛面黃口中氣溫多嘔畏食大便臭
者消積丸甚若白玉餅下之後以錢

氏白朮散和胃○尋常輕者只用平胃散加山查麥芽砂

仁青皮甘草為末每一錢米飲下熱加黃芩寒加吳萸

間有寒熱邪相擊面赤為熱面白寒感熱依痛者面赤
熱感熱依痛者面赤四股煩熱口中氣

熱宜四順清涼飲加青皮枳壳或黃芩芍藥湯○感寒水

痛者面白或青四股冷甚宜小建中湯或大七氣湯加肉

桂調蘇冷熱不調多嘔逆宜枳壳桔梗青皮陳皮當歸甘

合香丸冷熱不調多嘔逆草各等分木香煨平姜煎服

心腹俱痛面眺白光口中吐沫虫攻的虫動心痛與癩釣相似但目不正斜而

手不搖可化
魚丸主之

八痢本與大科同惟有驚痺屬幼童八痢冷痢白積熱痢赤積冷熱不調積下

赤白痔痢黃白積或見五色下無時度驚痢青積不臭休息痢糞黑如魚腸愈而復作釀痢停積又來腹脹便臭厚

痛蠱毒痢下紫痛蠱毒痢下紫白冷挨積温脾胃純白若積冷毒也宜感應丸挨去其毒然後用

參苓白朮散之類温和脾胃赤白順氣與和中順氣則腹痛自止和中則裏急自除○純赤者

積熱毒也宜煎滯湯或赤或白冷熱不調腹痛後重腸胃虛滑食少困倦宜小駐車丸黃連六兩乾姜一兩當歸

二兩阿膠三兩為末醋糊丸黍米大每卅丸米飲下大人亦宜○久不止及釀痢者沒石子丸鷄子煎 妾下

腫脹渴隨至脾虛有積積化成痢妾下脾胃重 誤補脫肛虛變成浮腫脹滿作渴不可為矣

色掀紅

熱者黃連阿膠丸薄荷煎○有服涼藥過度或久痢臟寒脫肛者釣腸丸木香煎湯下或真人養臟

湯○有痢類脫肛黑色生禿者用巴豆壳燒灰芭蕉自然

汁煮入朴硝少許洗軟用清油點三滴放三角白礬煨過

龍骨少許為末乾糝取頭用芭蕉葉

托上勿令便去出入令木兒抱定

乳軟百日內不宜懸膈損胃肺孤危

或因啼叫未定喫乳或飲乳過度以致停

蓄胃膈胃也上干於肺故發咳嗽能逆肺胃俱病百日內見者為惡候

熱嗽面赤九葶藶

其

四時感冒嗽者當用參蘇飲惺惺散之類微表如挾熱暴嗽面赤壯熱便閉者宜葶牛丸

敬可醫

阿膠七分半白茯苓馬兜鈴糯米各二分半杏仁十粒甘草二分水煎治久嗽肺虛氣促有痰惡心

二三歲時欲斷乳夜靜用藥畫兒眉

畫眉膏山中槐炒黑三箇雄黃硃砂輕粉各

少許為末清油調勻候兒睡著濃抹畫兒兩

眉上醒來自不喫乳未効再畫仍墨搽乳頭

喘因乳啼未定或挾風冷肺家病或因啼乳未定與乳與鹹酸以致氣逆不

下或因飲乳過度內挾風冷傷肺而喘或餽飽逆者宜

紫蘇子湯蘇子詞子蘿蔔子杏仁木香人參各等分甘草

青皮各減半嘔吐不食胃家虛痰壅發熱火炎盛嘔吐驚

姜煎溫服

自汗者為虛而赤氣虛痰盛發熱者為

實俱陳湯主之虛加參木熟地麥連

尿白成疳積中熱尿白如泔脾經有積久則成疳亦兼心

木砂仁各五錢青皮陳皮滑石甘草各二

錢半為末每一錢麥門冬煨心煎湯調服淋瀝有驚氣下

結十餘歲因驚之候心氣下行小便淋瀝日夕三四十次

漸覺黃瘦宜順經散葶子琥珀益智仁金毛狗脊白茯苓

石燕各五錢石萎一錢為

末每一錢非湯調日二服

汗多胃怯兼驚惕胃怯出汗上至頸下至臍者葶黃散有

因驚惕心虛以致脾弱少食心腹汗多

者大溫驚丸驚熱者小涼驚丸俱壯懶麻黃根煎湯下或全因驚惕盜汗者古世砂散脾胃弱者錢氏白朮散

有氣弱心血溢盜汗不止氣弱體瘦乃心血溢盛為汗非

水煎服以收斂心血如手掌心汗多者亦効額汗陽虛蒲扇灰頭汗連頸而止本屬陽虛但小

兒純陽或因厚衣被而額汗出或睡中盜出者用故蒲扇燒灰為末每三錢溫酒調服輕者不藥自止如滿口生瘡

及久病額汗如油者亦治遍體香瓜痰火炮遍身汗出者痰火盛也宜香瓜丸胡黃連太黃柴胡

驚甲黃柏黃連蘆薈青皮各等分為末用大黃瓜萹一箇去頭填入諸藥至滿却蓋口用柴插定慢火內煨熟取出

烏爛入麩糊丸棗豆大每三九或五七丸食後冷漿水下

○外感

小兒傷寒夾驚食治與大人無異所異者夾食夾驚而已雜病亦然陰陽表裏六

科同傷寒左額青紋見肢冷無汗慘顏容錢氏云男子面黃體重女人面

赤喘急其呵欠煩悶手背熱入迎脉盛則一也若手足温又有汗面光發熱是傷

風亦左額青紋夾食吐熱兼嘔逆右額角青似小葱右額角青

筋發熱頭額肚腹熱甚或兼嘔吐腹痛者傷食也如傷寒夾食若人參羌活散加青皮紫蘇或藿香正氣散合敗毒

散便閉加大黃如內傷生冷外感風寒夾驚手掌心有汗

青紋先見額當中額正中青紋面色青紅手掌心有汗時

驚熱也脫用散紅絲散或人參羌活散加姜蠶蟬退南星

全蝎白附子麻黃便閉加大黃煎調硃砂安神丸或溫驚

凡驚輕者先發表而後安心神可也傷寒表初喜隈煖傷寒惡寒初起未發熱時喜隈入藏身密

衣被若發熱者晝夜不止俱宜量體汗之太繁太陽症見

着活冲和湯陽明症見葛根解肌湯少陽症見小柴胡湯

裏熱掀衣便不通

入裏內熱者必揚手擲足口中氣急壯熱作渴大便不通方敢與調胃承氣湯

或大柴胡湯微下之大柴大陰症見羌活

厚朴少陰症見羌活

仲和湯加川芎柴胡

有羌復有裏及驚風症見雙解散加羌活天麻羌蠶白附子蟬退

色慘瀉青陰病裏虛空

理中湯甘草乾姜湯甚者四逆湯

汗吐下溫俱從

緩免動驚痰與蛔虫

傷寒溫補太過以致生痰變作驚風者有之或汗下涼藥太過以致胃寒

變成慢驚及蛔虫上文者有之危哉

傷風鼻塞氣促亂身熱咳嗽忌大汗

起

仍喜服入引衣惡風故也凡傷風治與傷寒亦同但傷風

有汗只宜離肌身熱咳嗽聲重氣促體弱者惺惺散咳熱

盛者參蘇飲發熱盛者人參羌活散天麻防風丸

壯熱者升麻葛根湯此傷風表藥不可誤用麻黃入裏能

食渴且煩便閉大黃方可灌

入裏與傷寒二同但傷風能食為異如煩渴二便赤黃者

四順清涼飲合小柴胡湯二便閉者大柴胡湯風熱內實者木黃丸
 風與滯血留蓄上焦脣膈高起大便不通者沒藥散沒藥大黃枳壳桔梗各
 二分木香甘草各一分姜煎服兼脾肢冷吐瀉攻益黃補
 後六青散風主肝兼脾則必四肢清冷吐瀉不思乳食不
 膏發散如身熱能食作渴者當先以益黃散或理中湯補脾後以六青
 散後以益黃散補脾如作喘脹者兼用塌氣丸虛渴者兼
 用錢氏白朮散肺喘心驚腎畏明各臟見症依此斷兼肺則喘息
 兼腎則畏明各隨尋常感冒必從輕暑濕大科尤可玩懷
 補母臟藥選用書云雙解散能治風寒暑濕勞倦然貴加減得宜耳

○諸熱

諸病發熱辨其初有發熱不歇鼻塞聲重者為外感表熱屬二陽經有潮熱者似潮有信為裏熱

屬胃有壯熱者遍身向熱不已合睡咬牙甚則發驚屬心
 有風熱者身熱口中氣熱屬肝有痰熱者面赤或腫身熱
 喘咳胃膈不和屬肺有溫熱者但溫而不甚熱屬脾有腎
 熱者陰囊赤腫釣痛大便閉澀屬腎有驚熱者時聞發熱
 即退來日依時發熱或面青狂叫有積熱者五心發熱肚
 熱至夜則甚有疳熱者骨蒸盜汗咳瀉有瘡熱者寒熱一
 日一發或二三日一發有血熱者晝靜夜熱有變蒸熱者
 上唇微腫如卧蠶或有珠泡子有麻痘熱者耳鼻脚稍中
 指冷顛赤噴嚏唇紅肌膏稠緊發熱種種相類初起當先
 詢問父母已出痘未如未患痘仔細認症蓋麻痘誤用下
 藥必變且真傷寒症亦必表陽症為實陰症虛凡實熱面
 症已罷日哺潮熱方取下之
 渴唇腫使閉暴喘掀揭露衣似傷寒陽症宜入參若活散
 參蘇飲通心飲道赤散瀉白散瀉黃散涼肝丸連翹散并
 露飲生犀散四順清涼飲八正散隨宜選用○凡虛熱面
 色青白神緩口冷泄瀉多尿夜出虛汗似傷寒陰症宜惺
 惺散虛煩白牙者保元湯
 采加芍藥浮小麥黃棗煎服又有乍清乍溫症上熱下冷

不自如上熱驚惕怫鬱不得自如下冷泄瀉不常收毒散

虛陽浮外熱不退和胃元氣自歸凡發熱表裏已解忽陽浮於外煩熱

大作者當與和其胃氣使陽氣歛而歸元身體自涼參苓白朮散錢氏白朮散天乙丸選用

骨蒸多因熱有餘間有稟賦榮衛虛因大病後得者榮衛稟賦弱者宜謹避風寒以護其外調飲食

以養其內俱生尾散或四君子湯加棧積痰熱濕火

盛因飲食得者腹有積痞面色淡黃潮熱腹痛宜磨積調脾順理三焦其熱自退枳朮丸肥兒丸成疳者蘆薈丸

子因積生熱生痰者二陳湯加升麻葛根白芍人參五味子姜煎服或枳朮丸加陳皮半夏黃連山查神麩為丸服

亦通用梨漿飲最宜梨漿飲青蒿童便浸一宿曬乾柴胡人參黃芩前胡秦艽甘草各一分生

梨或生藕各一片薄荷二葉地黃一吋水煎服治潮熱積熱瘧熱及脾積寒熱青蒿飲亦效

痘

痘症不過氣血毒

毒乃胎家滲火食穢停蓄臟腑生後帝聲一發悉歸命門遇歲火運時行傳染

或冬煖遇春夏而發或因傷寒熱病失汗下而變成或因外感風寒內傷生冷而發或因跌撲驚恐蓄血而發發則命門火動煎熬左腎夾脊逆流自頭額而下尅丙火不聚於面令散四肢所稟氣血實則勝毒為順氣血虛則毒勝為逆氣血與毒相等則險凡言順者不必藥治逆者治之無効險者必用藥救首尾一十二日間

除初熱三日不弄有熱發三五日或十餘日故也自報痘至收斂首尾一十二日中間有不守禁戒以至淹纏又有氣血和者不及三十二日而愈初不甚拘日數以後分日為初學較言取症有初症并雜症陰陽常變類傷寒任他壞症并瘥症無非邪與毒相殘初熱

類傷寒初症自初熱至報痘類傷寒六經三陰三陽症六日已後謂之雜症報痘次至收斂常症也異常謂之變症

水痘斑疹謂之類症，不治謂之壞症。餘毒謂之瘡症，其間
機軸儼似傷寒，但痘毒自裏出表，非若傷寒自表入裏，所
以治法微異。至於痘中百病，皆外感內傷邪穢與毒相搏，
大法痘未盡出見三陽症，宜清肌解毒；痘已出齊見三陰
症，宜溫中托裏。太陽病惡寒身熱氣急，尿赤出不快者，
防風荆芥甘草湯三味等分水煎服。少陽病乍寒乍熱，出
不快者，蓮翹防風甘草湯三味等分水煎服。陽明病身熱
目赤便秘，滄瀉通肌肉出不快者，升麻葛根湯加紫草四股
出不快者，防風芍藥甘草湯三味等分水煎服。太陰病腹
滿自利，四肢厥逆已出者，附子理中湯。木香散理中丸少
陰病痘出黑陷，口舌腐爛，四物湯加紫草紅花厥陰病舌
卷囊縮，黃青目青時發厥逆異攻，十全大補湯加附子。
凡陽症見於春夏及天晴則順，陰症見於秋冬及陰雨則逆。
痘象豆形色，豆色惟有黑
陷最驚人，痘者豆也，大小不一，無妨。惟欲圓滿硬實，不宜
如浮萍，不分箇數者，逆。做日順，其形則順。逆其形則逆。
色者五臟精華，紅黃綠者為佳，痘乃脾土及君相二火所

主黃綠乃脾胃正色毒將出也紅亦深色桃紅三分紅中
 一分白毒始出也鮮紅則為血熱初起紫者大熱全白者
 氣虛毒未出也初起白者大虛灰白者血衰而
 氣滯也黑者毒滯而血乾也焦褐者氣血結也形屬氣
 色屬血形貴充頂色潤身頂形圓滿者天之象也氣陽也
 象也血陰也故色屬乎血頂尖圓滿而不皺陷則氣體天
 而常親乎上根窠紅潤而暈外明淨則氣體地而常親乎
 下極其形色得平要根治根地圓暈顯有神交會不明形
 順也

色反燈影週旋眼法新氣可盈而血不可盈苟或形陷伏

親乎下色泛溢而不凝斂則血有餘而反親乎上又有氣
 多血少者痘雖凸而四圍無色血多氣少者痘雖陷而四
 圍紅紫毒有餘而氣血不足者其痘不發不紅此氣血之
 辨也○根即圓暈痘疱曰窠疱圍暈曰根圍暈外曰地
 皮白無紅是為交會明白圓暈乃氣血之會形色之神也
 蓋色血而成圓者氣之形然必氣與血會而後圓形周淨

附氣而成尿者血之形然必血與氣交而後暈色分明雖
然一元流行而已自氣血凝滯而言謂之形自氣血光華
而言謂之色形中有形運用鼓舞形色而言謂
之神○燈影週旋者痘形色雖陰若燈光影與痘根圓暈
相為週旋根暈紅活漿影深厚雖陷伏灰紫皆可調治若
根暈不紅不起血死不活漿無影者雖輕難治故雖白日
亦必用麻油紙擦照之自始至終全
以根地為主眼法新巧全在於此
症與痘亦恒相因善
而症惡者必外感寒暑症善而痘惡者必外觸
穢汚痘為主症為輔雖無他症而痘惡者死
表實難出

虛易出

症以身熱無汗為表實症以紅突為表實症以身
寒汗多為表虛症以灰陷為表虛蓋無汗則膚膜

閉密所以痘稍難出出則紅活綻突多汗則腠理空疎所
以痘反易出出則灰炎頂平有言表實易出者必裏實甚
也表虛難出者裏實順臍虛倒臍吐瀉少食為裏虛裏實
必裏亦虛也
則正氣收毒自痘頂而下漸次結痂者順
裏虛則氣血不能收毒而痘根先臍者逆不綻或淡表裏

墜症既吐瀉汗多痘又輕者從頭至足稀能食便調不須灰自陷伏表裏俱敗

治重者不食二便或或秘或瀉脚先頭上或齊至凡出至足為順從

足至頭為逆頭脚齊出齊齊者險所以輕者腦出俱從頭

至足痘亦稀少重者稠密頭上未出未未腦脚上先出先腦

然痘以脾土為主自始至終以能食者順脹貫時宜食老

鷄補氣收腦時宜食雞鴨收毒或猪猪肉肥者助痰滯氣

始終忌魚腥二日一便者為順三四輕變重者非有效外

日不便者為秘一日三四便者為利感內傷犯汚穢忌風寒忌損表忌暑恐生煩燥忌濕恐膿

恐渴忌酒葱魚羊蒜等恐痒淡食為佳忌煮鷄鷓鴨卵病

人聞氣害目忌柿棗砂糖恐痘瘡入眼忌茶醋猪肝猪血

恐藏黑忌燒香通室以燥血只宜常燒蒼木猪甲乳香以

避惡氣忌酒色僧人洒淨冷水閉其皮膚大忌父母房室

月水乳母服氣人畜糞汚房內灸燻對梳掃地生人往來

一切惡穢以致氣滯蓋氣聞香則行聞臭則止故也自蒸

痘至收靨一有感傷穢汚便令當出不出當靨不靨或變
黑陷作痛發痒一切雜症○大槩外感冬時五積散去麻
黃加桂心紫草春時不換金正氣散加芎芷防風或為風
邪所襲者消風散加紫草暑月六一散清暑益氣湯體薄
清貴者只用保元湯隨症加減○內傷乳食氣壅遏者二
陳湯加山查升麻白朮四君子湯加砂仁木香川芎紫草
或枳朮丸宿食重者感應丸傷生冷涼藥者益黃散治中
湯○內傷兼外感者調解散加朱四聖散○穢汚觸者避
穢丹蒼朮細辛甘松川芎乳香降真香各等分為末烈火
焚之將出者用胡荽泡酒噴帳幃及懸胡荽於帳中甚者
以胡荽泡湯化下蘇合香丸但胡荽能通心竅利大腸惟
便溫者忌之○穢毒入內黑陷者丹甦丹白礬生地龍炒
各等分為末每五分用小猪尾血調新汲水下不拘時服
如體薄者四物湯去地黃加入參黃芪稍連翹白芷甘草
稍木
香

類症

水痘熱三白出靨俱易眼光華

水痘似正痘仍身熱
二三白而出初出即

如赤小豆大皮薄痲結中，心圓暈更，少易出，易脫，被濕則難結，痲亦不為害，外症兩眼如水，宜小麥湯，滑石并草地

骨皮各一分，人參麻黃大黃知母羌活葶藶各二分，小麥七粒，水煎服。如斑瘡水痘煩熱，溺澀口苦，生瘡，散

關熱發斑或丹毒，斑紅痕如錦紋，或如蚊迹，與傷寒陽毒發斑同熱，極則發宜敗毒散表之，汗後

身涼紅痕自退，再越二日，或報痘反少，又有報痘時熱盛發斑者，透肌散加紅花黃芩升麻咽痛加玄參磨犀角和

服，或玄參升麻湯加葛熱盛者解毒湯加芎歸白芍防風若見黑斑即死，水痘膿疱後發斑者亦死，斑少者可救

報痘時有紅丹如雲，額突者敗毒散加紫草紅花黃芩頂解之，如腫高紅紫痕者透肌散加黃芩地骨皮蠲退

平有水是疹麻，疹如粟米，微紅隱隱，皮膚不為作痒，全無腫痛，麻即如麻頂平軟，不得指印，有清水

痘多夾疹同出，麻亦多夾疹同出，故曰痘疹麻疹，但痘成膿疱後出疹者，反順水痘後出者，逆又有先發疹而後發

斑者亦無害，治疹宜消風熱，用敗毒散加葛根升麻白芷表退，肌熱則疹自無矣，又有報痘後麻疹稠密，如蠶種者

透肌散加柴胡紅花解之若色好不麻有夾痘同出者麻

可過用涼藥必傷脾胃致陷伏也

沒痘存色愈加存蓋痘屬五臟為陰難出難騰麻屬六腑

為陽易出易沒麻沒後痘必起發形色愈加者順如形色已

木香糯米入酒煎服麻急理麻痘急理痘麻痘源頭共一家

雜症熱毒頭亦痛凡雜症皆因榮衛不和以致毒不泄於

多披內外邪穢頭痛初起為風以後多熱毒上攻毒甚則腫眼紅舌胎唇吐詭紅或目

黃肝熱舌上白胎心熱口瘡咽痛鬱多啼脾熱五福化毒

丹或蜜潰黃柏汁飲之咽乾泄痛口爛齒腫心胃熱也

甘露飲或甘桔湯加牛蒡子麥門冬竹葉煎服水漿不入

者紫雪抱龍丸消毒飲如能食便溏者又當清上溫下不

可純用涼藥多啼當察外症鬱毒在表在裏調之如果

因心熱痰熱者辰砂六一散痘未出葱白煎湯下痘
出盛燈心煎湯下黑龍腦半釐紫草煎湯下貫脹

極忌咳與喘初熱咳嗽氣促風寒在表故也痘出時咳嗽
臨痛吐食不下者半表裏邪也小柴胡湯加

五味子枳壳桔梗小便赤者加山桅赤茯苓如服冷藥大
過咳嗽肢冷嘔吐者甘草乾姜湯脹貴時呵欠噴嚏打屁

赤忌如咳嗽氣喘乃毒攻肺脹初起高聲啞而死果係外感
者亦必痘好乃吉初起煩燥喘急者麻黃湯加桑白皮

及麝一釐或黃芩湯加麻黃桂枝便秘者
前胡枳壳湯凡無痰喘急不能睡者死大渴不止恐陰

虛口渴毒火炎上者用甘草瓜蒌根等分水煎服或黑豆
菜豆各二合烏梅二箇水煎澄清服飲水小便少者恐

濕漬脾土後難收腐宜六一散淡之內虛津乏者保元湯
加麥門冬五味子或參苓白朮散黃芪六一湯如虛陽偏

盛好飲冷者木香散倍丁香官桂陰寒偏盛好飲熱者異
技散加木香當歸惟血虛痘黑火動發渴者難治凡虛症

見渴者胃緊煩燥安眠少加枳壳煩燥動止不寧初起

皆死

報症時燥者表未解也宜清內解肌黃芩芍藥湯和之起
 脹時燥者毒欲散未散也宜生黑豆一升煎湯徐徐冷飲
 解毒散熱召復陰氣或拘攣凡生犀角磨碎單其草煎湯
 俱能解毒貫臍時燥者毒衝心膈也宜利小便大便不通
 者宜潤之結加後燥者解其餘毒可也痘出及餘毒煩燥
 小便不利者用燈心一把驚甲二兩煎服煩燥不得眠
 者酸棗仁湯腹痛有塊或堅硬初熱時腹痛甚手足稍冷死陰
 香正氣散升麻葛根湯參蘇飲俱加山查內傷生冷飲食
 腹痛自利者理中湯加陳皮砂仁木香如痘出腹痛便調
 者無妨便秘身熱痛甚痘出不快體冷甚發厥者獨聖散
 或四逆湯服之則毒氣泄而四肢溫腹痛自止已出厥痛
 者亦宜腹脹初起尚可表初熱腹脹毒與邪搏升麻葛根湯
 症隨症加減由人但此湯乃於起及結加後解毒涼肌之
 藥惟內虛胃弱及紅點見後無表症者忌之如大小便難
 者四聖散失血肺胃被熱侵毒併太腸便秘了極忌動血

此紫甚飲

初

口鼻失血肺胃熱甚宜解毒湯加生地大黃輕者黃芩湯

犀角地黃湯或小柴胡湯加生地痘出下利黃赤膿血

身熱作渴者薤白湯黃熱艾湯解其毒而痘自出

血神昏不醒者抱龍丸救之蓋痘雖內毒運之者血心主

血藏神今使血神昏宜平危矣如天小使血及七孔流血

者即死有因服涼藥以致毒陷瀉血有如豆汁黑者急

用理中湯胃脹湯得便閉瘡紅活者生若脹貫時便血而

瘡壞無膿者胃爛必死痘愈後便血或下腸垢身熱者

升麻葛根湯加黃連生地身熱煩渴者解毒湯熱勢盛者

小兒氣瀉下利者黃連阿膠丸小兒車丸內外毒蘊便不通煩脹汗渴言謔查

活人謂首尾不可下者蓋痘未出有表無裏痘既出表盛

裏虛所以首尾忌下奈其間有因外感裏熱及內傷熱食

熱藥以致熱毒蘊結便秘煩燥腹脹手掌心并腋下汗

作渴謔語實熱裏症悉具腸胃壅塞脈絡凝滯壅遏痘毒

不出不起不瀝必用下藥通其榮衛而後毒得起發從權

以下利藥中加以升提俾邪熱去而痘毒升痘未出者升

蕨葛根湯消毒飲加大黃熱甚者涼膈散以其有連翹薄荷輕清亦上升發也雖痘出不快有此裏邪實熱者亦宜痘已出或將靨有熱毒便秘者小柴胡湯加生地或四順清茶飲犀角地黄湯俱加大黃尋常熱輕而無煩脹狂譫痘未出者只宜敗毒散連翹散紫草飲紫草木通湯痘已出者四物湯加麥連桃仁麻仁或麻子仁丸以潤之苟非外感邪入裏深極內傷濕熱蘊結與毒相拒斷不敢下惟痘後餘毒壅體下之可也故曰痘疹下之早則為陷伏倒靨猶傷寒下之早則結胸也又痘瘡利藥忌用丸丹及巴豆水銀輕粉此三味但能去臟中驚涎積熱非痘家所宜

小使赤澀腹心膨熱微熱甚有分曉

小使赤澀以致心腹膨滿由胃熱心火不降陰氣不能升也痘未出者紫草飲發出其毒即愈痘已出者四聖散加黃芪小使澀赤熱并大便亦秘不敢下者五苓散蘇赤散紫草木通湯連翹散以滲之如熱微又不散滲小使恐損真氣者只宜獨聖散紫草飲以解其毒古云大熱利小便小熱和緩是也又回熱甚狂喘或漿內腐化毒溺多則順稍有閉者宜善調之

發驚誤投驚藥禍非小

痘已出狂叫多怒喘呼者肝熱甚而無陰以斂之也犀角地黄湯

痘毒驚搖雖亦由於心熱肝風旺而脾土虛則火炎為搖宜瀉肝則風自去利小便則熱不炎若藥用驚風涼藥如

銀粉腦麝青魚珠砂礞石令心寒而毒氣內伏當出不出已出不應如先驚後痘者輕先痘後驚者逆痘色粒分明

驚來即去者無害痘未出因外感與內熱相搏發驚者惺惺散消毒散加戒紅綿散大青膏紫草膏兼服勻氣散

毒泄而心神自定氣勻而痘瘡自出矣又有暑搖昏者六一散痰盛神昏不醒者抱龍丸或睡中手足常縮將發

驚搖者急用蕤赤散利小便或四聖散以解毒○痘已出虛者保元湯加芍藥最為熱者五福化毒丹瀉毒丸古牛

蠶散熱甚搖毒攻心以致黑陷者從權以涼驚丸或猪尾膏暫服可也○抑考熱症謔語妄言屬心搖擲驚癩屬肝

腫脹便秘屬脾喘渴咳嗽屬肺遍身作痛毒外行痛乃痘

盡皆四臟所發虛症可以類推或遍身痛或只幾顆痛有外邪所搏者初見紅點時宜參

蘇飲加木香轉者消毒飲或并麻葛根湯倍芍藥甚者更

加蟬退山查羌活有痘出身痛肉斂痘密熱痒清內虛實

表難而痒者為實諸痒為虛虛實於形色上分之色不灰陷便

者四君子湯加酒芩連或大黃微瀉之通用單蟬退湯時

時服之痒甚者水楊湯浴之或用食鹽和百草霜水濕罌

炒過置次內燒烟薰之其痒立止虛痒亦効或用蜜水調

滑石末塗之且令瘡痂易落無痕色淡甚則倒磨便瘡

而痒者為虛宜保元湯倍加黃芪實表少加芍藥活血痒

甚遍身凡破膿血淋瀝不能坐卧者內托十宣散去桂倍

黃芪加白芷止痒當歸和血木香調氣氣行血運其痒自

止或水活血散合四君子湯加黃芪枳壳有毒氣陷內痒

塌者木香散加丁香玫瑰裏官桂瀉表虛症腹脹身必涼已

以救之凡手足常搖動者將發痒也出虛脹有二有因內傷生冷寒藥與內熱毒相拒不得發

越故令腹脹宜蘿蔔子紫蘇梗陳皮各一錢乾姜甘草各

五分水煎服食減者加白木甚者發寒肢厥瘡白無血色

多致不救急用木香散溫中逐冷甚則異攻散○有毒氣

隔伏作脹者宜溫中解毒人齒散吐瀉痘出最難當吐瀉

小活血散惟腹脹日閉口臭者死

無妨痘出脾胃冷者胃愛散因外感者寒丹理中湯五積

散異坡散暑月六和湯胃寒湯因內傷者四君子湯加砂

仁陳散理中湯去參加厚朴宿食重者感應丸痘出後

極忌泄瀉起脹尤忌有瀉皆屬虛冷急用保元湯加桂芍

或木香散泄瀉若用肉豆蔻一箇乳香一豆大為末米飲

下或固腸丹因泄頂陷者肉托十宣散四聖散加菴茹吐

瀉喘渴蛔虫已出日自汗氣弱難收瀝濕熱薰蒸神木方

直便流利腸堵者死

痘出後切忌汗多以致氣虛必難作漿收靨急用保元湯

止之如初起濕熱薰蒸者用白木二錢黃連一錢浮小麥

煎服若傷風自汗量用桂枝防風痘出寒熱內虛甚寒戰

可也惟身寒汗綴如珠神昏者死

火辯必發痒已出痘而寒熱者屬內虛五日前後獨熱者

損而毒火內鬱難治寒戰咬牙足膝冷如冰牙身反熱

脹貫腦時極忌乃氣血虛極宜保元湯加桂甚者異攻散

變症冷秘熱吐瀉

臟腑熱則便秘脾胃冷則吐瀉常也有嘔吐不食面青瘦者為冷秘久不大便

而無裏急後重者為虛秘俱宜內托十宣散氣虛者四物湯麻子仁丸又有能食結滯下如粟塊者為風秘胃脇腹

腹引痛者為氣秘○熱毒攻胃吐瀉手掌心并腋下熱而

戰戰有牙臉赤渴欲飲乳乳滿胃膈不化則吐吐了又渴急欲飲乳是熱吐也小便赤澀而渴者熱瀉也俱宜五苓散竹葉石膏湯加陳皮痰壅吐食者二陳湯濕熱吐者葛

根竹茹湯加黃連濕熱瀉下臭穢者解毒湯加白朮○大吐身熱腹滿二便赤澀面赤喘悶者當利小便四苓散導

赤散不嗟者熱甚四肢仍發厥凡痘症身寒不治但其間宜風散下之

若猶傷寒伏熱深而厥亦深也宜隨症用清內解毒藥毒出而身體自溫矣如痘未出猪尾膏最妙大便不

通小便血遍身肌肉盡破裂初熱誤用熱藥報痘又以胡

實者令毒攻臟腑肢絡灌注耳目口鼻咽閉塞大便不通小便如血或為癰瘡肌膚破裂皆陽盛無陰也宜猪尾

膏犀角地黃湯解毒湯三黃丸服後瘡出紅活者志倒腐者死○暑月痘爛生蛆乃熱毒盛也內服清熱之藥外以

帶葉柳枝鋪地卧之或水楊湯沃之亦好痘變倒腐與陷伏痘色初出淡紅變

出鮮紅變紫紫變黑者逆○痘形陷伏倒腐自其內傷氣虛而不能起發而言謂之陷伏宜溫中托裏令脾胃煖而

榮衛通也甚至疏附亦可暫服自其外感及穢汚而言謂之倒腐外感宜溫散寒邪而榮衛復行犯穢宜薰解之凡

痛出不出當脹不脹當貫不貫當腐不腐俱以照原為氣血旺退減均謂之倒腐陷伏惟有黑陷當

詳究黑乃北方寒水之色然火熱反兼水化色亦能黑故變黑當寒熱寒症變黑者因風寒歸腎宜溫散因

內虛毒陷宜溫補熱症有毒盛火炎宜涼心清解有膿燥無陰宜潤血化痰噫痘變不過陷伏倒腐黑陷斑爛四者

黑陷最危初出黑色狀如蚊秘燥皆因瘀血蓄初出狀如蚊蛟色黑

者因毒氣暴出瘀熱搏之故血凝不行遂成黑陷大小便閉腹脹喘急煩燥宜山施仁湯八齒散加味四聖散單

七十三

良湯加紫草出不快者宜毒膏猪尾膏

出不能快如炭焦表分大熱還宜透

表熱如炭焦黑陷伏見熱症者透肌散加紅花地骨皮或單犀角磨冰服之或獨聖散小活血散腹痛者單蟬退湯

乾枯罔陷甚者單麻黃五錢用蜜水拌炒水煎去沫再煎乘熱服之其痘復起青乾紫黑身熱微

便秘急下去陳垢痘出不快已出者青乾紫黑身不大熱

宜宣風散氣怯者木香檳榔丸俱令先下黑糞次下褐糞後以四君子湯加厚朴木香陳米和胃良久糞黃瘡自出

透若表大熱者不可大下如青乾此紫黑喘昏入裏熱極身牙出不止煩燥熱渴腹脹喘喘二便秘者危

紫黃喜瀉膿痂惡毒臭毒氣入裏心神昏悶或出不快或難結痂乃毒火燥盛以致黑陷者

猪尾膏涼心通竅則氣和神疎而痂自結矣○痘出黑陷及瀉結痂不結痂便秘腹脹身黃紫腫變黑濕熱最重者

急以單大戟丸利去膀胱邪水猶傷寒木賊土敗急下之可保五死一生如所下水殺不消身冷戰振多汗死耳熱

者為水溢土崩必死若下後身熱氣溫飲水免身冷或瀉膿血瘡痂者為毒氣盡去胃氣猶強瀉後仍宜四君子湯

加厚朴木香溫脾為妙臟燥至極已亡陰痰盛發驚狂叫吼毒鬱臟燥無陰

以守狂叫喘呼痰盛欲發驚風者四齒散加蟬退古牛黃散以解毒遂成黑陷者犀角地黃湯以養陰抱龍丸以降

痰若發驚狂謔語者辰砂六一散用紫草燈心煎湯磨犀角玳瑁汁調服或護心散蓋涼血則不致紅紫鮮毒則免

黑陷失治不果係虛寒二便清脾腎兼補加訶慈痘出裏白聲啞而死

惡熱以致黑陷者八物湯去地黃恐滯血夫芍藥恐伐胃加木香和脾胃大補氣血蓋脾胃暢而不致內陷氣血盛

而不致瘵塌寒冷多因乳母忍饑受冷以致芽兒寒冷歸腎痘變黑陷寒月木香散異攻散發之天溫時內托十

宜散去桂木香帶紫為熱帶白虛黑如烏羽猶可救帶紫者為

血熱四物湯加芩連紅花帶百者為氣虛保元湯去甘草加紫草通用靈砂三五粒磨酒服能起黑陷凡痘變黑如

烏羽光潤不發寒而尻耳冷者為血活可救紫草飲合小活血散外黑裏白赤者輕外黑裏白者輕外黑裏赤者微重外白裏黑者太重瘡頂陷黑中有眼如針孔紫黑者死輕甚一箇大黑痘頭面上忽生三五箇或只一箇高大紫黑儼似釘痘者名曰飛痘有此痘出最輕或只此一痘再不出痘是知黑豆生死輕重迥殊可不一詳辨深究之乎遍身斑爛膿不乾痘當發散不發散喘促悶亂不當發散而強發散則痘毒出盛表虛難靨以致肌肉如爛故曰瑛爛治宜調脾進食令大便不秘不利養榮衛以生肌解毒則無自赤咽痛口瘡吐衄等症如大便不通膿水不乾者牛黃丹瑛爛膿汁不乾作痛者敗草散或乾黃土為末乾糝輕者用豬膽汁調芒硝未敷之勿令動着直候瘡痂自落瘡爛成片欲不成癩痕者用乾牛糞火煨過取白心入乳香為末藉之甚者麥楚襯臥暑月熱盛當藉之以芭蕉葉○有因過汗內虛臟腑自利瑛爛或因飲水多者俱保元湯加防風白芷外敷敗草散○敗草散用蓋屋及墻背上遠年腐草洗淨焙或晒乾為末帛

甚妙之甚者鋪床席令兒卧之作痛有如刀刻鏤穢汚觸

治見穢汚要知痘變頂不變陽存生意必然復報痘自頂上陽

肉如痘遍身變壞獨頂額上不變則吉貫膿時變成水疱

無膿皮薄如紙遍身擦之即破惟額上不破者可治若陽

位與心曾先破者死速收膿時敗症急見疔痘頭面曾背

危四肢點破毒可泄起脹時有痘長大而紫黑者名曰疔

弱以致毒聚而成形如氣血勝而毒變制結於四肢或

或箇數少而穿筋骨者易治結於頭面腹背遍近於內者

勢必穿臟腑難治急以保元湯加牛蒡子荆芥芥連助氣

逐毒外以銀精挑破疔頭令父母以去惡血或綿裹指甲

搨去惡血展去亦可蓋痘破而毒氣得發故也或用珍珠

五粒鉄器上灸黃色斑豆四十九粒頭髮一團俱燒存性

為末油臘脂調成膏將兒在温煖處忌風寒穢氣先用銀

簪挑開疔口將藥點入疔內即時變為紅白色餘瘡皆起

又有黑痘獨大頂心黑撥之如綿筋有臭者保痘癰手足
死湯加芎桂糯米補提其氣如變黃色者可保

先腫疼血引毒注三陰穴凡痘癰必先手足及脈絡之處

手足有硬痛處或足痛不止或足上痘腫如心皆發癰之

兆也因其腫痛深淺而知其癰之大小原因痘出復被風

寒鬱其熱毒或痘出服熱藥熱食過多所致又有痘變壞

而毒併一處發者反吉治法見後瘡症蓋痘未愈時雖癰

發亦不宜治癰若初起胃前腦上有一塊紅腫及遍脹貫

身有塊者死貫膿時足腫青紅流米痘不好者亦死脹貫

收靨或不齊發疔發癰反可悅凡痘當脹貫不脹貫當靨

凡癰毒疔痘生於胃前腰腎之間至重紅小者生黑大者死陽毒凡瘡每乘虛濕潤為

實乾枯乏七日前陽毒凡瘡即黃疱血風眩花楊梅瘡之類

而出陽瘡陰毒稠雜一黨反勝諸毒而名之也其瘡濕潤者為氣血俱盛而諸毒易成漿也宜解毒湯主之其瘡枯

燥乾紅者為氣血俱弱，毒與諸瘡相拒而俱不成漿也。宜保元湯加芎桂糯米，更以水楊湯沃之，則枯轉潤，白變紅。其漿自益矣。○水楊湯：楊柳五斤，春冬用枝，秋夏用葉，洗淨搗碎，取長流水一大釜煎六七沸，去渣，將三分之一注盆中，宜先服湯藥，然後乘熱洗浴。又許乃以油紙捻點燈照之，曩醫藥然有是勢，陷處有圓暈紅絲，此漿影也。漿必痛，足如不痛，又如前浴法。弱者只浴頭面手足，勿浴背燈照。如無起勢，則氣血敗而津液枯，蓋痘不成漿，乃氣泄血滯，腠理固密，藥氣力緩，頗難頓爾達其頭面手足。惟服藥後以此沃之，其藥藉此井提開豁萬竅，洗法必添湯，夕浴使其緩透肌肉，疏通內外，斯毒氣隨暖氣而發。凡報痘起脹行漿貫滿痘瘡頂陷漿滯不行，或為風寒久尅者皆效。

壞症 頭低肢軟脆 初起表症足冷無害，惟足冷頭低四肢軟弱，始終大忌。痘出後頭溫足冷者，必死。

面色青腫 枕鼻屎 痘以心血為主，面赤者順，面青必生而不透，以致身體頭面兩自皆腫，風搖身強者，人參羌活散救之。如當脹之時，頭額腫如瓜，或面腫或頤頰亦腫而

散救之。如當脹之時，頭額腫如瓜，或面腫或頤頰亦腫而

瘡不腫者死宜消腫毒補中氣以救之若痘色與皮一般腫根窠紅者無害或一邊面腫形色順者吉○鼻燥有黑氣或以手扞露睛耳焦唇紫崩兩目閉而露睛無魂如魚鼻孔者死

而光燥者亦死○耳內焦黃唇紫燥烈甚則唇崩潰爛乃見標之時復感風寒使熱毒攻內不治口爛舌卷戛牙齒

因七日前被風寒於中膝理周密壅塞其毒反攻臟腑之內宜量與清胃消毒豁痰解散風寒之劑救之○咬牙作渴身熱者心胃熱也宜井露飲如寒戰咬牙則為腎毒上攻內托十宣散去防風白芷加茯苓救之

聲啞飲食便秘者井桔湯加當歸黃連大黃身涼者內托十宣散倍桔梗如漿滿聲啞者肺氣絕也

亦死又有飽逆胃寒冷氣上升也宜鹽炒吳黃一錢丁香五分水煎服○咽喉有毒飲食如鋸挫喉水漿不入或吐

瘡不腫者死宜消腫毒補中氣以救之若痘色與皮一般腫根窠紅者無害或一邊面腫形色順者吉○鼻燥有黑氣或以手扞露睛耳焦唇紫崩兩目閉而露睛無魂如魚鼻孔者死

而光燥者亦死○耳內焦黃唇紫燥烈甚則唇崩潰爛乃見標之時復感風寒使熱毒攻內不治口爛舌卷戛牙齒

因七日前被風寒於中膝理周密壅塞其毒反攻臟腑之內宜量與清胃消毒豁痰解散風寒之劑救之○咬牙作渴身熱者心胃熱也宜井露飲如寒戰咬牙則為腎毒上攻內托十宣散去防風白芷加茯苓救之

聲啞飲食便秘者井桔湯加當歸黃連大黃身涼者內托十宣散倍桔梗如漿滿聲啞者肺氣絕也亦死又有飽逆胃寒冷氣上升也宜鹽炒吳黃一錢丁香五分水煎服○咽喉有毒飲食如鋸挫喉水漿不入或吐

出或常乾嘔者危若貫臆時見此症二便閉者反吉腰痛如咬囊縮死腰痛如咬不能起立骨高

足冷者腎絕若微痛者風寒所傷敗毒散解之外以麻油揉按○囊縮者肝絕不治身温為實身凉

虚温補解毒法盡矣不問初症雜症變症壞症俱以身温為順身凉為逆譬之種豆晴暖則易

生且人無非常之熱亦無非常之冷惟身温温温則為氣血和也大槩熱症身温俱宜解毒虚症身凉俱宜温補虚症

有熱者温補中兼解毒熱症有虚者解毒中兼温補解毒初出消毒飲連翹散解毒中畧兼温補解毒防風湯鼠

粘湯○温補血虚四物湯或古芳婦湯氣虚四君子湯或保元湯為主泄若暫加白朮茯苓煩渴加門冬五味子虚

熱加黃連濕痰加陳皮氣鬱不通加山查消毒毒加鼠粘子退離腫加荆芥穗扶胃氣加陳黃米助陽發表加生薑色

紫血熱加連翹要知連翹鼠粘山查并草始終必用官桂川芎紫草芍藥五七白後慎用氣血俱虚者內托十宣散

耗裏散或保元湯加當歸芍藥以活血或合芍藥散以和氣温補中畧兼解毒以物湯加酒炒芍連或保元湯各一

氣温補中畧兼解毒以物湯加酒炒芍連或保元湯各一

氣温補中畧兼解毒以物湯加酒炒芍連或保元湯各一

氣温補中畧兼解毒以物湯加酒炒芍連或保元湯各一

錢加牛蒡子黃芩黃連玄參系瓜灰連翹白芍各五分姜
葱煎服七日後勢重毒深者氣虛保元湯加大黃血虛古
芍歸湯加大黃芒硝下之又有虛寒變症木香散異攻散
古姜附湯四逆湯皆救危妙劑但虛寒常遲十數日方死
熱毒者死速已上
總論初熱以至收斂

初熱儼似太陽病所異顯赤中指冷初起發熱惡寒類傷寒太陽表症但傷寒

男面黃女面赤麻痘則顯赤也傷寒中指熱驚風男左女
右五指俱冷麻痘中指與耳鼻尖及手足俱冷又察其耳

後有紅筋赤縷為真無筋者非痘筋紅赤易愈紫者難治黑者死太陽正病不須醫感傷

傳變用藥整初熱見太陽表症乃痘家正病不必服藥惟

氣令其自出熱重者清肌解毒甚則滲泄但誤下則傷脾

誤溫則損目慎之外感表鬱熱盛痘難出難作漿宜表
托以助其欲發之勢兼心症者惺惺散消毒散兼肝症者
人參羌活散兼脾症虛者惺惺散或保元湯加地皮黃芩

荆芥熟者升麻葛根湯如聖湯兼肺症者參蘇飲加葱白
山查根通用無汗者羌活中風湯有汗者防風中風湯邪
傳半表半裏見胃脘嘔吐煩燥不眠等症小柴胡加生地
虛者二參湯邪傳入裏二便俱秘或溺中見血者涼膈散
防風通聖散下之有不效下者蜜導法輕者四聖散合敗
毒散或合辰砂六一散或解毒湯微微滲利不可盡去其
熱恐痘難發○內傷飲食生冷見嘔瀉者寒月理中湯胃
受散不效金正氣散暑月六和湯二陳湯胃疼湯如傷飲
食俱加山查麥芽消導之藥○披驚者加戒紅縮散○披
痰見血者犀角地黃湯合小柴胡湯○抑論痘症始終必
兼四臟如熱衝於心時作驚悸甚則狂譫宜硃砂參苓之
類熱蒸於肝呵欠煩悶甚則發搐宜防風羌活天麻全蝎
南星之類熱蒸於脾乍涼乍熱肢冷多瞤甚則目腫腹脹
便秘作渴宜枳壳陳皮神麴山柘地黃之類熱蒸於肺面
赤噴嚏甚則喘渴咳嗽鼻乾宜桑白皮半夏馬兜鈴之類
惟腎無症所以不可宜冷若先如瘡後發渴其瘡色黯乃
腎症不治然四臟又以脾肺為主蓋肺主皮毛脾主肌肉故也初熱為根痘為標根少標

多生不永 痘未出非太熱不能發痘已出非微熱不能成

一二日即湧出鮮紅根少標多者七日後 欲防眼患藥宜

死若全不發熱痘少而好又無雜症者輕 清痘出太盛恐入眼為患宜消毒飲或氣血藥中加酒炒

聽其自然深 護眼砂亦簡省 兩菜豆粉一兩半甘草四

兩為末痘瘡正發之時用清油調塗兩眼四畔則面上痘

亦稀少或用硃砂為末水調塗眼眶或只用乾胭脂末蜜

調塗眼眶則痘不入眼古方用如米細硃砂為末蜜調

少許每五分作二次量兒大小加減溫水送下不拘痘瘡

出未首尾可服密者可稀稀者可無黑陷者可起痘癰

掀腫可消兼治壯熱煩渴微喘但性亦微寒不可多服

報痘三朝毒居中止汗忌下和為上

報痘毒居半表半裏

愈助火邪忌汗者痘點在肌無俟於汗也忌下者痘在肌

而反空腸胃無是理也縱有外邪亦但於宜服藥中加以

陳皮生姜之類和之而已 熱未徹者猶有邪半清表兮半溫養 熱徹出

如熱猶未徹者必感傷邪未盡淨此時熱毒內薰恐後滯為癰毒宜半清表半溫裏之劑調之四聖散解毒防風湯

紫草木香湯加報痘乾一燥腹瀉腰痛不止者死

一日母痘初見形幾點淡紅間架明 痘先出者為母後出者為子孫母好子孫

多則自然有不然者亦無害如紅點先見於口鼻上下顛顛年毒之間眼中全無大小形狀不一作三四次出或單

或雙間架明白稠密乾紅宜漸補 三五相連圓壘成箇乾淡紅色潤者順 紅少潤未可與施補藥

俟其氣血交合方可保元 但嫌枯黑參天庭 先見於天庭湯加官桂助陽 令其紅潤 方廣印堂兩

耳太陽太陰及結咽心胃之處或頭尚無而脚先有或心胃稠多腰密纏過如蠶種者急用消毒飲加山查黃芩紫

草虛加入參或升麻葛根湯加連翹一分或敗毒散犀角地黃湯以清內能肌如初發便見腰痛瘡稠乾枯幾點此

黑者死或間紫黑歸腎陽位不宜何也諸陽聚頂諸毒聚頂頂稠枯黑毒勝氣血明矣嘗考瘡毒一發出於四臟而腎不盛邪為吉如申酉戌時發熱屬肺發為膿疱如涕色白而大巳午未時發熱屬心發為血疱色赤而小多兼癰亥子丑時發熱屬脾色黃微沫多兼疹寅卯辰時發熱屬肝發為水疱如淚色微青而小此皆初發之狀不同如此若報痘三日當悉成血疱起脹二日後血疱成膿疱貫膿三日後膿疱結痂而瘡愈矣蓋貫膿膿色黃充滿與初出色白淡淡如膿者名同實不同也

二白如粟根圓混頂滿光明碍指佳

二日紅點如粟如黍如菽豆如真珠如水

晶頂滿色光根脚圓暈混合不散以手摸之覺得碍指者順如根窠雖圓而頂陷者氣弱不能運血也保元湯加芎桂助陽但川芎暫用以為參芪之使有汗者忌之若頂陷色枯或鮮紅連肉亦紅又無根脚者必死出速且多毒太盛出速且密胃背亦多身熱者恐毒盛不能收成必變青乾此紫陷宜消毒飲鼠粘湯解毒防風湯

湯出盛內外熱壅血聚以致能食腹脹便秘煩渴喘急

狂譫者毒氣與心貫注無陰以斂也宜猪尾膏毒盛壅遏

出不快者亦宜若出不快而更被外邪入裏遂至胃爛便

血而出遲內虛必挾邪紅點數日不出而復陷者逆惟出

死若既用發散陽氣外出令瘡色白縱出亦有忽然而斃

者矣有榮衛虛不能出者必面青肌軟惡寒宜小活血

散入物湯中氣下陷而不犯發者保元湯補中益氣湯人

齒散有脾胃冷因服涼藥損傷以致吐利者須益氣溫

中中溫則氣不消削而自充發於肌膚矣宜益黃散理中

湯丸木香散甚者古姜附湯或大瀉下丸去姜附榴櫛加

砂仁木香痘出而復不出或泄或秘煩渴者乃痘出誤

服涼藥逼毒在肺中痘帶白膿者輕紫黑者重鼻有黑氣

者死外盛裏虛毒氣發越不透半成血痂半是紅點不

能乳食大便如常小便清白宜半溫熏半助表四聖散紫

草飲解毒防風湯萬金散紫草木香湯蟾肝丸或絲瓜連

皮燒灰沸湯調服或葡萄研酒飲之選用有氣實痰鬱

滯發不出者，陳湯跣氣飲。○啼叫不已，神不安，舍不能
主行榮衛而發不出者，勻氣散小活血散，大溫驚丸。○外
感羈絆胃氣而出不快者，便清自調，知其表方，可量體
微，微發散。因天寒不能出者，熟料五積散，正氣散，或參蘇
飲，此草膏四，肢出不快者，防風芍藥甘草等分，水煎服。瘧
瘡不出，傷寒不語者，單燒人屎為末，蜜調服。瘡毒既發，瘡
瘡不發者，黑膏。○因炎暑煩渴，昏胃不能發出者，辰砂五
苓散，用生地麥門冬煎湯下。身熱甚者，小柴胡湯加生地。
煩渴便實者，白虎加參湯。輕者，竹葉石膏湯。加生地。○外
感邪入裏不散，大小便秘，氣滯壅遏而出不快者，紫草木
通湯。痘發出者，紫草飲。如痘出乾黑，身不大熱，大小便秘
者，毒滯於內也，宜宣風散。用大黃煎湯下。若表大熱者，不
可妄下。或已出稠密喘渴者，當歸
丸，黑膏輕者，消毒飲。加大黃山梔。已出復被風寒，拒青紫
如痣，遍身遮。痘出被風復入者，加味四聖散。或快藥散。去
相拒不能發出，以致發熱狂搖，遍身或青或紫，如痣，點如
癍疹。俗云鬼捻，青年壯皮厚者，多有之。宜卻寒溫肌透裏。

之劑危甚者用經霜紫背荷葉舊者亦好入姜蠶等分爲
末胡荽煎酒調服或絲瓜連皮燒灰爲末沸湯調服發痘
最妙見風寒表症者惺惺散古出不少遍色不潤痘已出
特蠶散見熱毒症多者透肌散
遍色不紅潤者乃毒盛以致氣血壅塞故也宜紫草飲外
用芥子爲末白湯調如膏塗兒脚心乾即再塗其毒漸漸
復出痘蒼多但要照原不減此凡痘出不快而先出之痘形
依前紅活但照原者乃毒未發也如形
色漸退者乃內虛毒入必死若痘出喜笑如常飲壯年皮
食進精神爽無諸雜症則痘本少也不可再發
厚多勞役舊以飲乳嬰兒臟腑嬌嫩服藥但宜釀乳與能
食童子可以服藥治有不同然年壯與年幼者
又有不同若年壯外實皮膚厚痘毒難以快出或被風寒相
搏則身痛甚宜透肌散主之或勞役汗多氣弱發熱耳自
皆昏脉大者當用補中益氣湯去升柴自始至終服之有
虛無寒不可用丁香香姜附反致熱耗元氣又有男子破陽
已多女子通經已後乃患痘者尤宜謹慎常服保元湯以
固脾胃八物湯調理氣血腎虛者腎氣丸以滋水使腎氣

旺而毒不下陷也孕婦動胎生摘瓜孕婦以命門繫胎痘毒又發

安胎飲加黃芩白朮為壬天寒有表症者間用五積散去

麻黃半夏厚朴姜桂換白朮赤茯苓赤芍加柴胡黃芩向

膠人參糯米等分水煎服身熱咳嗽者暫用參蘇飲煩燥

者古芍朮湯加白芍麥門冬或小活血散痘稠密者肩粘

湯痘出太盛或便秘者犀角地黃湯紫草飲痘出不快者

消毒飲痘出後血虛者古芍歸湯加芍藥氣虛者保元湯

加芍藥氣血俱虛者內托十宣散去桂倍歸芍加烏梅香

附熱盛恐墮胎者昇胎散胎動者安胎飲連進或單砂仁

炒為末酒調服後覺胎熱則安凡胎前患痘倘用峻藥

動胎去血泄氣者孕婦必死如生摘瓜必動其蒂也患麻

亦與痘同若無孕婦人麻痘初熱煎熬血海必然經來小

柴胡湯加生地主之產後麻痘但忌芍藥以黃芪代之

三日出齊至脛股三日放標至足三陰為出齊正宜觀形

頂起而色慘不明者保元湯加官桂助陽芍藥

斂陰糯米溫中若一日出齊乾紅紫菴者死上脹下無

亦可取上身先有起脹而下身還未出或出未盡者無妨 淡白頂軟氣全虛淡白頂不

堅實不得指者氣虛也內托十宣散去防風白芷自汗倍黃芪聲不出倍桔梗 白光帶紅決不愈

痘白色薄根全無紅色或根帶點紅二五白後如菜豆樣者決不能貫膿而死淡紅摸過又轉

白血衰氣滯宜大補根窠不紅或夏紅手摸過即轉白者氣血虛也十全大補湯或但淡紅不

轉白者血虛也小活血散 口角有粒如疥形將來變黑歸腎腑口角此

如疥不日必變焦黑歸腎而死鼻有餘瘡妨睡息痘出後有餘瘡塞鼻中時有粒

末入麝少許葱白蘇藥入鼻中數次即通紫痘刺黑無生路痘稠密中有紫痘

熱毒化痰湯救之血黑者死又有白疱者乃氣協熱毒仍以化痰湯解之刺開血紅乃血協

起脹朝毒盡浮於表最怕中虛入裏了痘出三日後當潮起脹先報者先起

後報者後起至五六日毒盡發於表宜內托不致內攻
痘氣血壯弱變毒深淺全在此關諸虛症見而痘形色反
者皆死雖然氣血有盈虧平陷仍分痘多少雖平而色光潤
痘多者亦自無害血盈氣虧則頂平而色又乾
枯恐變陷伏不論痘多少俱內托十宣散救之

四日血痘已分明四日水痘當成血痘淡紅不喜胃背顛

尚平額上紅者終不起脹顛臉一身之主若顛上先脹者
四肢必順顛上不振必遍體皆然若手足下身肚腹

等處皆脹准胃背不起脹則不宜上體已脹下體緩慢

上體緩慢陸續出者反長生有出不快直待起脹時陸續出
如粟米於痘空際圓淨者亦吉

五日頂尖欲碍指五日頂尖滿起如鼓了額項皮紅擦破

死痘起滿頂紅紫連皮肉紅賊痘軟大氣血衰報痘雖稀
或遠項紅後必擦破而死根窠全白

無血三四日便起脹痘大按之虛軟者此名賊痘氣血大衰也保元湯加紫草救之額上見之尤凶必貫膿時變成水疱擦破而死毒陷腹上多青紫毒入胃則腹上痘多青紅紫

六日圓滿光明美六日氣血榮盛發揚於外原形尖圓肥滿紅活者順血熱紫紅尚

不起火盛血熱色紅紫不起脹者內托十宣散去桂加紫草紅花熱盛加黃芩痘紫黑陷者獨聖散中陷

黑白皆氣虛有中黑陷而外白起或外黑赤而內白陷者氣虛而血熱也宜兔血丸如原不起頂灰白

陷者氣虛也宜單人參湯或保元湯加川芎助陽當歸和血木香行滯如頂陷漿滯不行或風寒久尅者水揚湯沃

之惟腹脹不食神昏者死水疱變痒一定死頂陷灰白紫黑必變為水疱發痒而死

貫膿三朝胃氣升自肌從漸至充盈痘以胃氣為本胃氣升騰化毒成膿自肌

肉上貫起漸至頂切忌寒涼與唾泄傷脾損胃漿難成貫膿

九竅俱宜封閉極已寒涼解毒及疎發淡滲之劑傷脾損胃清氣下陷不能貫膈或吐利不止或二便下血聲啞腹脹乳食不化寒戰咬牙痘爛無膿肌肉黑者不治

七日漿行痘裏黃淡紅軟大非真漿漿行痘裏肥滿黃光

者吉色淡者虛血虛四物湯去地黃加紅花少許氣虛保元湯加桂米若淡紅疎大如膿者必變焦黑其間紫者血

熱灰白氣虛如前法治水疱皮薄有根活純是清水皮白而薄與水

或根窠起脹血紅而活猶有生意者內托十宣散倍其當歸又將人乳汁和酒各半溫服又有痘中生水疱乃氣盛

津液有餘隨毫孔生出小如圓眼核者皮破流膿去濕方

保元湯加山查白朮大如鷄卵者死有濕痘內如水漬皮未破者宜溫中藥內加防風白芷以

瀉肌表間濕氣如皮破流膿不乾者用白螺壳火煨為末乾糝或用苦參滑石蚌粉輕粉白芷等分為末乾糝瘡口餘詳前斑爛條中空乾燥血枯朽火

蚌

盛天水義悠長

中空乾燥全無膿水血分枯朽剥極宜小
活血散加當歸火盛者一散加荆芥乾

葛升麻輕清之劑以散其
火服後猶無膿水者死

八日漿成喜飽滿不滿只是氣血緩

八日氣血大振毒漿
已滿將欲收斂之時

圓滿光潤者吉其有化漿不滿者乃氣血因
寒少緩也宜保元湯加姜桂糯米助其成漿
滿而又陷或

不齊痘暫滿而又陷者內托十宣散去防風白芷倍用人
參黃芪水酒各半煎服人弱不食者入人乳○痘皆

貫膿中間幾顆不貫者終變虛寒痒塌宜
內托十宣散或托裏溫中湯倍加補藥
不齊有熱亦難

貫當結膿窠不結此由毒氣內外灌注血熱相搏必復入
貫心急宜猪尾膏涼心血使陰氣感之隨時結痂回漿自

面至項或至背不
回腐而住者死

九日回漿喜自額

頭面上先回漿四肢方總起脹者吉如
七日前唇上有痘幾顆膿黃熟乃毒由

攻胃爛 必先吐上無漿涎 肚上未収背先収者必外駁
必死 碎肉非真實有漿涎膿液完結

也摸過皮皺難収 凡貫膿肥痛度易結膿雖脹滿光澤
可觀然摸過軟而皮皺縱橫如椰子

皮者中雖有膿不甚 膿清収者亦徒然 膿清或半膿半水
滿足必不能収 若四肢麻絡處 必變瘡塌而死

若四肢麻絡處 發癰毒者可生

収膿三日如果熟 如果熟蒂落氣収血平光色如 虛寒有
欬黃黑色光者輕黃灰者重

膿難結壳者重寒戰咬牙者死 収成大半熱宜清 収膿將
作高驚在掌症乃氣血不能収欬疽 口眼流膿防齒目角

清鮮其內免毒遺於臟腑以生餘症 流涎帶血者必患牙疳齒落眼角出膿太甚者必損雙目
俱宜清解內毒以預防之有漿回眼腫不能開者以水潤

濕絹帕拭去膿屎思用指攀開 臉皮透一點風不致有翳攻睛

濕絹帕拭去膿屎思用指攀開 臉皮透一點風不致有翳攻睛

十日、蒼蠟似葡萄、按之堅硬、不灰焦

十日、收腐膿、膿色或似此

紅葡萄色者佳、自上而下、按之堅硬、全腐快、有瘡疔可保

無灰、陷焦黑者生、自下而上、倒腐者死、腐慢有黑反可調、當腐不腐謂之

者生快而失聲者死、氣急、痰上、聲啞、目閉、無神者死、間有黑慢亦有熱觸穢者

無陰以斂生微潮、有內外熱極、毒氣散漫、而無滲氣以斂

糖水、喫即結痂矣、但七日前最忌砂糖、有觸穢、胃寒黑

陷不收、腐者異、文散調、四屎散、最妙、有毒盛不結疔者

猪尾膏、換猪心、血為丸、服、腐不能齊、因飲過、原因初出之時、煩渴引飲

散以解其標、君不因飲、將腐全白、瀉難、熬色如豆、壳散、水、散、保、元、湯、加、苓、木、主、之、仍、因、初、時、飲、水、過、多、故、腐、不、能、齊、亦、日、倒、腐、大、便、秘、則、通、大、便、小、使、秘、則、通、小、使、連、翹、散、小、柴、胡、湯、加、枳、壳、四、順、清

涼飲如泄 傷冷瘡陷傷熱爛 凡瘡瘡解毒已清至取腐時 或因觸見以致陷伏與爛瘡

搨不屬者異攻散如寒戰咬牙手足顛掉及腹脹足冷過 勝者危亦宜此救之○凡痘過服寒熱表藥以致痘爛不

結痂者小柴胡湯猪乳膏麥門冬煎湯下外用敗草散敷 之有真爛深坑不取口者用猪膽汁調芒硝未敷如遍身

真爛如餅搭不可 近目中無神者死陰囊屬起命三朝 陰囊及足上 先屬起者死

十一日 漿老痂已結 忌用峻寒峻熱恐致內損之患 加戒 脚

根紫者還是熱 辨成熟之際脚根色紅紫者屬熱用涼藥 解其毒升麻葛根湯或犀角地黃湯加酒

炒芩連連翹之類蓋 氣衰頂陷漿濕乾 奴屬注尿尖圓結 犀角升麻善解熱毒 寶佳如頂陷若菜

莖漿濕盈癢不斂者危保元湯加苓朮以救之如痂 結剝乾不潤內無血者亦危人物湯加黃芪救之 遍身

屬盡留一節 遍身皆屬惟數顆不屬亦能救入猶蛇退皮 雖一節被傷不能退者亦死若原貫膿充滿

如粟

毒氣盡出不生
異症者無效

十二日 痂落從頭妙 從頭上至背膈手腹腰 痂未易落色

宜耀 痂難脫外見熱症 蒼色紅紫因原貫 膿不痛薄身臭

故身上痂不落者加地骨皮 頭面痂不落者加白芷 外剪
去頭髮以烏桕油搽之 若見諸虛症及有潮熱者必危

屬癩迭凸紅色佳 若無血色還堪吊 屬後癩紅者吉 白無

者用部粉一两輕粉一字研勻 猪油調塗癩上 痂落不

宜早見風好事 癩痕用藥療 癩剝之後見風太早以致成

或炒白疾藜為末 鷄子清調敷 或馬齒莧絞汁 熬膏塗之

或用人精調鷹屎白敷之 其痕自滅 如欲不作癩痕者 雖
於纒結痂後即以真酥潤之 用手抵破或剝去 又潤之 稍
遲則乾硬深入肌肉 經及方脫遂成癩痕 凡瘡後肌肉

尚嫩不可洗浴亦不宜食炙博五辛五味并有毒之物
恐執善薰於肝腸眼目多生翳障必過百日乃可萬全

瘡症無非是餘毒毒盛痘再發如初
痘疹愈而再發者亦
輕因愈後失於解利

毒氣未盡浴宜保元湯
加解毒藥量體增減
餘毒仍當分虛實虛症坐立仗入

扶瘡後雜症熱多虛少但亦有稟弱及服涼藥以
致愈後坐立振搖須入扶策宜雙和散保元湯吐瀉熱

渴補脾胃中氣暴虛不食者參苓白朮散胃受散虛熱口
渴不食者四君子湯加陳皮山查黃連吐瀉理

中湯丸益黃散異效散久不止者危身熱
自汗若補中益氣湯壯熱經日者參湯飲食調和漸自

如**如**輕者但以飲食調和久則氣血自復
純陽之體痘毒之餘慎不可服峻藥實症能食何須藥

能食便秘當預圖痘愈能食便秘者脾胃實無害惟胃中蘊
熱善消穀食大使秘硬將來必口齒咽

喉吐衄驚風之症或發為瘡疽癰毒宜量體清解如曾服
執藥過多者必用三黃丸利之便秘口渴身熱者大黃散

濕熱

八十一

八十七

胃熱嘔吐口舌生瘡下部亦有瘡而下利膿血單黃連湯
煩渴溺少者五苓散作煩渴者單黃連湯或燈心一把煎
甲二兩水煎服溫壯齒疼或腫者其露飲口牙出血者五
福化毒丹咽痛者抱龍丸或甘桔湯加牛蒡子麥門冬竹
葉肝熱多怒呼不得眠者柴胡清肝湯下血疼痛者蘇白
湯三黃熟艾湯心痛不可忍者用乳香二錢或加沒藥當
歸赤芍水煎服身熱不退者小柴胡湯竹葉石膏湯
手足厥冷口噤涎流聲如拽鋸甚則手足微搐此因裏虛
被地風所吹名曰中風宜消風散二錢入蟬退末一錢分
三服入生薑薄荷汁及酒少許溫湯浸之連進二三服當
隨時少進或作癩疹或作瘡疹而愈或小續命湯去桂附
加荊芥發搐咳血更難除愈後非時發搐目瞤面赤飲食
亦可散抱龍丸或小柴胡湯加生地又有病後胃弱食積發搐
潮熱大便酸臭不調或嘔吐腹疼宜紫霜丸小承氣湯選
用症惡者死○咳嗽有觸肩風寒者參蘇飲如喘入眼
滿者煎胡枳壳湯若毒攻肺喘急咳臭膿血者死

翳膜皆忌點愈後日翳但宜活血解毒則五臟和而夜痛自止翳膜自去則不致凹凸損陷不宜點者
毒氣自臟達外點藥攻逼反以為害但翳膜已成者只用
生鱈魚刺血點入翳上更服兔屎湯最妙若無翳但眼目
無光者過百日後氣血復自明但曾過服熱藥熱食風毒
盛者須內服藥清解或曾過服利藥及竹稟性弱以致痘
愈眼昏不明仍當量補肝腎脾胃○熱眼丹後方山施决
明赤芍當歸黃連防風連翹升麻桔梗作小劑煎服治痘
瘡傷眼○熱翳地黃散生地熱地當歸各一分防風羌活
犀角蟬退木賊穀精草白蒺藜木黃各一錢玄參五分木
通甘草各一錢半一方有黃連為末每五分量兒大小用
羊肝煮汁調服忌口將息治痘瘡入眼心肝壅熱目赤腫
痛或生赤膜或白膜遮睛四邊散漫者易治若暴遮黑睛
多致失明宜速用此大人亦宜○風腫翳膜者蟬壳散蟬
退地骨皮牡丹皮黃連白木菊花蒼朮各一兩龍膽草五
錢甜瓜子半盞為末每一錢半煎芥煎湯調下食後臨卧
各一服兼治時疾後餘毒上攻眼目甚效忌油麪煎炒醋
醬等物○熱極生風上攻眼痛紅絲遮睛便秘者洗肝散

加^二姜^一連^一芒^一硝^一下^一之昏暗加^二石^一羔^一羌^一活^一石^一決^一明^一穀^一精^一草^一菊^一花
 兼^二豆^一豨^一膜^一加^二蟬^一退^一倍^一石^一夾^一明^一白^一羨^一藜^一若^一未^一厲^一前^一疔^一瘡^一入^一眼
 者^一洗^一肝^一散^一去^一大^一黃^一癰^一溢^一多^一淚^一生^一翳^一若^一柴^一胡^一散^一撥^一雲^一散^一或^一神
 醫^一散^一加^二黑^一豆^一皮^一○虛^一眼^一熱^一地^一黃^一丸^一滋^一陰^一地^一黃^一丸^一益^一氣^一聰^一明
 陽^一如^一肝^一腎^一俱^一虛^一者^一於^一虎^一丸^一於^一羊^一角^一虎^一膠^一骨^一生^一地^一酸^一棗^一仁^一各
 五^一錢^一肉^一桂^一防^一風^一當^一歸^一黃^一芪^一各^一五^一分^一為^一末^一蜜^一丸^一皂^一子^一大^一每^一一
 丸^一溫^一水^一化^一上^一○虛^一翳^一用^一羊^一肝^一煮^一汁^一入^一蟬^一退^一末^一二^一錢^一服^一之^一○
 通^一用^一眼^一痛^一不^一可^一忍^一者^一浮^一萍^一散^一浮^一萍^一為^一末^一每^一二^一錢^一用^一羊^一肝^一半
 介^一以^一竹^一枝^一刺^一破^一投^一水^一半^一盞^一絞^一汁^一調^一服^一傷^一者^一亦^一効^一○眼^一睛^一昏
 白^一氣^一虛^一危^一症^一保^一元^一湯^一加^二陳^一黃^一米^一救^一之^一神^一昏^一不^一醒^一者^一死^一○食
 毒^一物^一眼^一睛^一凸^一出^一者^一二^一仙^一散^一仙^一靈^一脾^一歲^一靈^一仙^一等^一分^一水^一煎^一服^一○
 久^一不^一愈^一者^一古^一蟬^一猪^一散^一猪^一懸^一蹄^一中^一二^一兩^一瓦^一礮^一內^一塩^一泥^一固^一濟^一燒
 存^一性^一蟬^一退^一二^一兩^一於^一羊^一角^一一^一分^一為^一末^一每^一一^一字^一或^一五^一分^一或^一二^一錢
 量^一兒^一大^一小^一溫^一水^一調^一服^一治^一痘^一瘡^一入^一眼^一半^一年^一已^一過^一者^一一^一月^一取^一効^一
 惟^一過^一一^一年^一者^一難^一治^一○外^一治^一腫^一突^一如^一桃^一者^一護^一眼^一膏^一如^一腫^一不^一開
 者^一用^一黃^一連^一為^一末^一鷄^一子^一清^一調^一塗^一兩^一太^一陽^一穴^一及^一兩^一足^一心^一○風^一毒
 腫^一痛^一痒^一溢^一淚^一昏^一暗^一羞^一明^一者^一秦^一皮^一散^一滑^一石^一黃^一連^一三^一味^一等^一分
 水^一煎^一乘^一熱^一洗^一○受^一風^一流^一淚^一者^一用^一田^一中^一豆^一莢^一搗^一汁^一滴^一入^一眼^一中^一

已成翳膜者，塞牙丹者，銀一錢，黃丹五錢，搗勻作六丸，入砂鍋內，圓瓦蓋定，濕紙糊口，以香爐盛炭火燒一日，取出，以薄綿裹之，瘡瘡在左塞左耳，在右塞右耳，立見逐下。下方用輕粉、黃丹等分，為末，竹筒吹入耳內，左眼有翳吹右耳，右眼有翳吹左耳，即退。

牙疳殺入鼻若珠
殺入最速，牙齦腫痛，動搖者，其露飲外，以韭菜茶葉濃煎洗去腐肉，見血以溺白散敷之，日三次，如爛至喉中者，用竹管吹入紅血黃水出者，可治鼻竇發紅點，如珠者，不治其色似乾醬，二日爛一分，二日爛一寸，故各日走馬疳，宜與前疳疳條條治之。

痘癰四體脾經毒

血熱引毒流傳經絡，故於肌肉虛處或關節動搖處偏盛而成癰，又有愈後餘毒不攻，臟腑皮膚層而為諸雜病，乃注脈絡而為癰，輕者結核腫痛癢癩而已，甚者頭頂曾腦手足肢節掀腫而作痛。

○毒氣流於脾經者，癰發四肢手腕并膝臍腫痛，宜消毒飲升麻葛根湯，虛則十六味流氣飲，加附子，外用馬齒莧搗汁入猪脂蜂窠熬膏塗腫處，或用活蟻子不拘多少，以水養五日，旋取此水洗手面，漸生肌肉無痕。

肺經

手牖內穴俞

毒氣流於肺經則腸內并手腕腫流為赤癰
毒宜消毒飲如聖湯五福化毒丹或用醫金

雄黃各一錢半巴霜四十粒為末醋糊丸菘豆大每二三

丸量兒大小熱茶清下以利之如氣血虛者內托十宣散

加枳梗犀角咽喉不利或腫痛者并桔湯加麥門冬牛蒡

子薄荷口齒流涎血臭氣者用生地黄自然汁化五福化

毒丹一丸以鷄翎刷入口中如肺毒流入三陽皆頰項結

大腸秘結或便膿血見前雜症便血條下

毒氣流於三陽經則背頰項結核腫痛宜小柴胡湯加

核生地最妙熱盛腫痛者敗毒散加荆防腫盛者消毒散

加忍冬藤虛者內托十宣散減肉桂○通用赤芍連翹為

君桔梗身草為臣貝母忍冬藤白芷瓜蒌根為佐上用升

麻葛根為使下用檳榔牛膝為使大便閉加大黃發寒熱

加茶相不問膿已成未成膿實者宜服○虛者通用保元

湯加酒炒茶連少許久者上體宜保元湯加引經藥下體

宜保元湯或內托十宣散加減三五飲不拘虛熱常

服外護筋骨免偏枯

凡痘癰不問發於何經初起紅腫時
却用黑豆菘豆赤豆等分酸醋研漿

時時以鷲翎刺之一切癰疽疔毒不用針刀自潰如膿已
 熟者用拔針燒紅刺之內服消毒散在頰項加金銀花若
 不早治必至潰爛筋骨○金華散黃丹黃柏黃連大黃黃
 芪輕粉麝香為末乾糝瘡乾猪油調塗治痘後肥瘡疔瘡
 癰疥水水赤肌餅毒○欵肌散地骨皮黃連五倍子黃柏
 甘草為末乾糝兼治痔蝕不斂并痘後膿血雜疹不收等
 瘡○瘡癩散用白礬為末塞入蠶繭內令滿以炭火燒令
 礬汁盡取出為末乾糝治痘後身上及肢節上生疔蝕瘡
 膿水不絕**此痘方是後人巧信者縱出亦稀疎**太古無痘疹周
未秦初乃有之
 初生用生地黃自然汁服三規壳許利下惡汚亦可稀痘
 ○每遇冬月溫煖恐春發痘宜預服三豆飲黑豆赤豆豉
 豆各等分甘草減半水煮熟任意飲之凡天行痘瘡鄉鄰
 盛發宜先服七日痘末不出○小兒陽盛無陰以制令頭
 髮豎直飲食減少此伏熱之兆便宜服油劑麻油一盞逐
 日飲盡末不出痘更服升麻葛根湯三豆飲以預防之○
 消毒保嬰丹纏豆藤即毛豆梗上纏繞細紅藤八月間採
 陰乾一兩半黑豆三十粒赤豆七十粒山查肉牛蒡子生

地辰砂各一兩升麻連翹各七錢半荆芥防風獨活甘草
當歸赤芍黃連枯梗各五錢經霜絲瓜長五寸者二箇燒
存性前藥須預辨精料遇春分秋分上元七夕忌婦人猶
大誠心修製為末和勻淨沙糖為丸李核大每一丸濃煎
其草湯化下凡小兒未出痘者每遇春分秋分時各服一
丸其痘毒能軟消化若只服一二次亦得減少若服三年
六次其毒盡能消化必無虞矣錢劉陳魏皆堪法得要還羨丹溪書
本胎毒毒解而氣血自伸陳魏以痘雖內毒毒出則虛丹
溪隨表裏厚實溫補解毒兼用但見熱症便用清肌解毒
甚則硝黃但見虛症便用溫中托裏甚則姜附噫法無不
善用貴得宜痘本外科傷寒之一兼內傷雜病婦女胎產
小兒驚積痘非醫之統要矣乎

○麻

麻毒原來只肺胃紅斑五六日方出

肺六腑腸胃之熱蒸於外感內傷併發與

痘症表似同而裏實異初熱三日出脹共三日出而又沒
沒而又出沒一週時許重者遍身細脹眼亦封閉有赤
白微黃不同仍要紅活最嫌黑陷及面自胃腹細密咽喉
續纏者逆發不出而喘者即死與大科癩疹相似又與發
爽相似但發爽如錦紋有空缺處如雲頭狀麻即如麻
遍身無空但疎密不同取仍有交爽夾丹夾瘡同出者初

起寒熱咳嗽

初起呵欠發熱惡寒咳嗽噴嚏流涕頭眩
宜升麻耆根湯加紫蘇葱白以解肌功忌

大汗痰不紅者亦宜乃麻症初起之神方潮熱盛加苓蓮

地骨皮謔語調辰砂六一散咳多加麻黃杏仁麥門冬石

羔咳甚另用桑膈散加桔梗地骨皮泄瀉合四苓散便血

合犀角地黄湯吐血血加炒梅子小便赤加木通○寒熱

似瀉小 藥胡湯 面赤全不思食味 初起全類傷寒但面 煩喘便秘

已出煩燥作渴者解毒湯合白虎湯喘滿便秘者

三四日者小承氣湯乃風通聖散謔語濁秘者導赤散如

汗者四苓散加車前木通謔語如狂者解毒湯調辰砂六

散或時便血并吐血

大便血或小便亦見血者犀角地黃湯合解毒湯吐血衄血解毒湯加炒

山柘重便輕者黃芩湯加生地山柘重便

又或渴濕與嘔乾

泄瀉

湯合四苓散喘兼泄瀉溺澀者柴苓湯煩渴作瀉者白虎加蒼湯猪苓湯○熱盛乾嘔解毒湯傷食嘔吐四君子湯

夏月因暑依嘔四苓散加人參忌用豆蔻木香姜桂熱藥

始終雜症皆熱熾

麻症初起已出已沒

及一切雜症與痘毒大同但始終藥宜清涼雖然麻受清涼痘受溫不易常道虛則補實則瀉醫家活法故治麻亦

有血虛而用四物湯氣虛而用四君子湯天寒傷冷則溫中理中之藥一時之權也

沒後餘毒內攻

鑽指衣妄語昏神智

沒後餘熱內攻指衣摸床謔語神昏喪智者死如熱輕餘毒未除必先見

諸氣色須預防之始終以升麻葛根湯為主或消毒飲解毒湯隨症選用仍忌煎腥葱蒜

小兒終

△外科

○癰疽總論

癰疽毒要氣血勝內外因皆濕熱凝。癰者壅也為陽屬六腑毒騰於外其發暴而所患浮淺不傷筋骨疽者沮也為陰屬五臟毒攻於內其發緩而所患沉深傷筋蝕骨凡年壯氣血勝毒則順年老毒勝氣血則險有內因飲食積毒者經曰膏粱之變足生大方榮氣不從逆於肉理榮氣即胃氣胃和則榮衛順而滋養皮膚膏粱金石厚衣煖被以致蘊熱臟腑濕熱聚下燒燻腎水陰火熾盛入脉沸騰經隧凝滯故水穀精微不能上行陽道反逆聚肉之腠理而成癰有外感風寒濕蘊毒者經曰地之濕氣感則害人皮肉又曰諸癰腫筋癢骨痛者此寒氣之腫入風之變也蓋風濕外侵鬱久為熱自膀胱左遷移熱小腸小腸後熱於臆風性上衝瘡形高色赤赤痛小則為癰大則為癰而已非若疽之自裏也亦有因心氣鬱結饑飽勞役房室過度水竭火炎痰凝氣滯而

成所謂相火能為瘡瘍諸痛痒瘡瘍皆屬心火是也因火
 有君相之分微甚或鬱痛而不甚腫或虛腫而不甚痛雖
 然病該三因總皆濕熱丹溪云人身血行脉中氣行脉外
 氣血周流不息惟寒濕搏之則凝滯而行遲火熱搏之則
 沸騰而行速氣為邪鬱津液為痰為飲積久滲於脉中血
 為之濁此陰滯於陽而為癰血為邪鬱隊道或溢或結積
 各溢出脉外氣為之亂此陽滯於陰而為疽蓋陽氣無形
 陰血有質必濕熱淫血而後發為癰疽故有方曰癰疽皆
 熱勝血也又曰二熱相搏熱化為膿蓋熱非濕則不能腐
 壞肌肉為膿譬如夏熱諸物皆不壞爛壞爛者交秋濕熱
 大行之際純陽炊赤潰斂易純陰色黯全不疼半陰半陽
 此理甚明

腫痛慢用藥回陽乃可生

癰疽有大而愈者有微如豆而死者陽發初起皮薄作熱色赤

炊腫疼痛潰後肉色紅活此為外發更加身健能食發熱
 便秘脉數有力為純陽易治陰發初起皮厚不熱色黯微
 腫硬如牛皮不痛陷軟不化膿不潰微開潤破後肉色紫
 黑此為內發未潰臍臑已前壞爛更加身倦少食不熱便

利麻軟無力為然陰不洽又有半陰半陽似腫非腫似痛非痛似赤非赤似清非清脈數無力如陽多陰少用藥托裏變陽者生陰多陽少用藥托亦不起投陰必死就中尤以有熱無熱為死生妙訣蓋陽症有熱則氣血行而生肌陰症無熱則氣血滯而不斂遇有熱者切不可風則多痒退熱但宜溫藥清滲此小癰毒無熱亦不妨

氣則痛濕腫食則熱寒增多有挾風挾濕挾痰挾氣挾血

挾陰虛等症大較風氣食三種俱以不換金正氣散加川芎木香為主兼風多痒加祛風藥兼氣多痛加調氣藥兼

食多發寒熱加消積藥兼濕多腫加滲濕藥又云熱瘡癩痛虛瘡淡白風寒瘡口帶白古方外因四氣單用大黃

半生半熟甘草節等分為末每空心酒下一匙以利為度

內因七情單用遠志為末酒調二錢澄清服以查敷患處不內外因金石灸燔房勞困老膏一切熱毒槐花酒藥毒堅硬有如石則堅硬如

石不痛宜甘草虛瘦重著怕潮蒸虛勞瘦弱榮衛不滋患黑豆煎湯解之處重者如負石然因其

有者蒸潮也。治宜滋補，故不可用養命丹等香燥踈泄之藥。亦不可過用降火滯脾之藥。惟腎氣丸括裏散，甚得其宜。且古方謂藥毒近骨生虫，近虛漏血為虫，多冷久則化，虛者多熱，久則傳細認穴道屬何經。腦發屬督脉，足太陽氣成漏，多痛少痒。細認穴道屬何經。腦發屬督脉，足太陽眉發手足，太陽少陽經，頤發髭發足，陽明經，腮發手，陽明經背發中，屬督脉餘皆足，太陽經，腋發手，太陽經，乳癰內，陽明外，少陽經，乳頭足，厥陰經，腎癰足，太陽經，外腎癰足，厥陰經，腿發外，足三陽內，足三陰經，喉癰膈癰，任脉足，陽明經，穿襠發督，衝任三脉，騁馬癰，囊癰足，厥陰經，內疽肺癰，手大陰經，腸癰手，太陽陽明經，胃脘癰足，陽明經，惟少陽少陰太陰多氣少血，厥陰太陽多血少氣，肉皆難平，惟手足陽明氣血俱多，分經用藥，則不犯經，禁病禁，以致下妄汗，且瘡屬腎經者最重，脾肺二經者次之，他經者又次之。腦乃諸陽所在，咽喉飲食所通，腎命根所係，皆至險之地，又不可多着艾灸。俗方專圖人形瘡樣，而忽經絡，謬哉。外因寒熱宜表散，毒因外

內無便溺阻隔外有六經形在腫痛雖甚飲食如常脈浮
 數邪在表也宜托裏微汗以表散之如發腦項背脊黃連
 消毒散尻腎分內托毒活湯臂上白芷升麻湯乳鬲內托
 升麻湯兩脇下味中和湯腿外側內托酒煎湯腿內近膝
 股內托底柴湯通用敗毒散九味活湯辛熱手足太陰
 經分自汗浮腫流注四肢附子木物湯辛溫發熱十味
 流氣飲養命丹暑月內托復煎散寒月內托十宣散或不
 換金止氣散丹淡治形實腫浮數冬月背生紅腫及脾骨
 下痛者用桂麻各半湯加生附酒柏瓜薑仁甘草節羌活
 青皮人參黃芩半夏姜煎服六劑而愈此正內托法也有
 謂蒼家身痛不可汗汗之則發產者邪不在表而謂汗也
 內熱痛秘急疎行內傷飲食積毒者腫
 痛異常外無六經形在內有便溺阻隔口渴煩燥脈沈實
 為邪在裏急與寒涼攻裏內疎黃連湯瀉心湯活命飲四
 順清涼飲輕者清熱消毒飲加紫草或清心散塗之○內
 積熱毒外又感邪者宜發表攻裏五香連翹湯防風通聖
 散蓋盛者解毒湯下神勞傷氣鬱無表裏邪在經中和衛
 勞丸濕盛者除濕丹

脉

榮毒因內傷虛損房勞鬱怒而發者形雖腫痛外無六經

之形症內無便溺之阻關知邪在經也不可妄施汗下

只宜補形氣調經脉和榮衛或專補脾胃可也鬱怒者十

六味流氣散虛勞者托裏消毒散內托復煎散補中益氣

湯古人治癰以寒藥者正治法也治疽以熱藥者從治法

也蓋藥性熱則開行寒則踈泄疽乃有形之物非熱藥從

治豈能行之乎此內托潰後托裏排膿盡肌肉自然

肉踈正治從治之義也

平潰後氣血大虛惟恐毒陷托裏之法一日不可缺也古

方托裏散托裏清中湯托裏溫中湯托裏和中湯托裏

建中湯托裏抑青湯托裏益黃湯托裏益氣湯選用蓋托

裏則氣血壯而脾胃盛膿穢自排毒氣自解死肉自潰新

肉自生瘡口自斂若不務補托而誤用寒涼反助邪火膿

多臭穢甚則麻洪大渴真氣虛而死矣丹溪云但見腫痛

參之脉症虛弱更與滋補乃可萬全又不必泥氣質素實

及參芪滿中滯痰也但初潰時問有執毒盛者量加消毒

清劑如發背搭肩膜破穿心必死尤宜托裏免致毒陷托

裏即護心也若毒氣上攻心神昏悶欲嘔者間服護心散

以救之如帶表邪面赤等症勢未甚也者內托復煎散或
內托十宣散暫服若無熱毒表邪但見穢氣觸犯虛熱少
食不睡者便進人參黃芪湯但見膿多心煩少睡者便進
聖愈湯但見脾虧氣弱不能生肌收斂者便進補中益氣
湯但見腎虛不能消潰水斂或補熱作渴者便進八味丸
或腎氣丸緊急不及作丸大料煎服頭防救危始終妙劑
若不務本根而專用敷圍生肌之藥則斂口大速毒反內
攻或傍邊再發一窩者有之或愈後而惡在頓起太命隨
去者有之惟務內治而不貴外治者為高外治初起灸最妙
形傷則痛氣傷則腫或先痛後腫傷乎血先腫後痛傷乎氣
腫痛並故氣血俱傷皆因臟腑不和而非外治能調古法
隔蒜灸法再鼓餅惟外傷成瘡者不宜自內發者痛則灸
至不痛不痛則灸至痛時方佳早覺早灸為佳一日三次
十日灸十日活三日十日灸十日活三日十日灸十日活五日
十日活十日灸十日活七日則不可灸矣其熱痛半軟針相
餘點割敷透間有毒盛者量用之則可
當癰疽毒氣已成宜托裏以速其膿膿成者當驗其生熟
淺深而針之若腫高而軟者發於血脈腫下而堅者發

於筋脉肉色不變者附於骨也

九十五

膿按之便痛者膿淺大按方痛者膿深按之陷而不起者

膿未成按之而復起者膿已成按之都軟者無膿不痛者

血癰痛者氣癰按之一邊軟者有膿若膿生而用針氣血

既泄膿反難成若膿熱而不針腐潰益深瘡口難斂若瘡

深而針淺內膿不出外血反泄瘡淺而針深內膿雖出良

肉受傷元氣虛者必先補而後針其膿諸症自退若瘡毒

熾盛中有肉點者宜內泄脾胃外塗單巴豆膏令其點處

漸低赤處漸高六七日間亦點之處自有裂紋如刀割狀

點肉漸潰當用拔針利剪徐徐引去若膿出肉腐腫痛仍

作必內有筋間隔宜再引之急補脾胃不痛者純用補藥

針用馬啣敷圍點痰非得已

疑斂敷寒末閉塞膜理氣凝

血瘀舊肉不潰新肉不生則毒反內攻難以潰斂甚則不

起必內分陰陽用藥外分陰陽敷圍內外夾攻藥氣相通

為妙純陽症內服內疎黃連湯清熱消毒飲之類外敷柳

陽散半陰半陽症內服托裏消毒散外敷陰陽散純陰症

通

太

內服補中益氣湯加姜附入酒煎外敷抑陰散○點癆瘵
 灰膏以去惡肉藥線三品鏡子以透膿管皆欲敗腐盡除
 不至浸蝕筋骨止痛斂口免開張癰疽不可不痛不可大
 非得已而用也止痛斂口免開張癰疽不可不痛不可大
 便秘宜內疎兼連湯解毒湯作膿痛者排之膿脹痛者針
 之已清膿出反痛者虛也氣虛四君子湯加歸芪血虛四
 物湯加參芪氣血俱虛托裏益氣湯脾虛者托裏和中湯
 腎虛者腎氣丸因登廁犯穢氣觸者藥中加乳香芷芍之
 類和之風寒逼者加防風桂枝之類溫散之燥者潤之濕
 者導之果係瘀血惡肉凝滯者亦可乳香止痛散和之○
 瘡口不斂由於肌肉不生肌肉不生由於腐肉不去腐肉
 不去由於脾胃不壯氣血不旺必以補托為主而佐以行
 經活血之藥則肌肉受毒者自生死者自潰又何待於點
 割耶大變氣虛體倦食少者補中益氣湯血虛肺熱內熱
 者四君子湯加歸地牡丹皮膿水清稀者氣血但虛十全
 大補湯或不痛或不潰或不赤或內膿不潰或外肉不腐
 者氣血虛敗桑枝灸法十全大補湯加姜桂壯其陽氣則
 四畔即流瘡頭即腐若脾胃虛弱慢腫不赤者六君子湯

諸白木若初起腫痛或因尅伐及入房以致色黯而不痛者乃陽脫變陰急用古參附湯以救之問有血分虛熱者

瘡口肉色必赤四物湯加山梔連翹氣分虛熱煩渴者竹葉黃芪湯要知瘡口難斂或斂大漸開出血者危俗皆以

腫痕所至為暈非真暈也暈生於瘡口之畔洗能疎毒活狀如紅筋三暈三暈尚可以四暈五暈者死

血氣洗藥疎通氣血腫血掀聚之時所賴朝夕燂醋蘸洗敷肉或洗毒散肉止痛風冷瘡口白者乾艾煎湯亦

廷點膏不被風寒傷膏藥多熱輕小瘡癩貼之即消發表不遠熱之意也若大毒初起用之迷

塞疑滯為禍不小惟瘡後只用白蠟膏婦幼患此無他與大乙膏或水粉膏外護不致破傷風寒

婦宜調血勿宜清婦人調血開鬱為主值經閉及潰後月水又發所患堅硬不破不腫不疼者尚

小兒主去胎毒或有飲食積熱者藥稍宜清涼如素稟受體薄及稍長而久病者仍以補托氣血脾胃為主治之

雜症仍以瘡為主潰未清心要酌量瘡症俱熱者未潰前內消解毒已潰後托

內消解毒已潰後托

裏消毒脉症俱虛者未潰前托裏消毒已潰後托裏補中
 治其瘡而諸症自退瘡為本病為標若病急而元氣實暫
 治其標病緩而元氣虛只治其本心通諸竅臟腑所包者
 一膜耳若憂驚入心膜破必死藥中當加茯神遠志為妙

五善能食便調順體鮮不臭聲音長
五善動息自寧飲食知味一也便利調勻

二也體潰腫消水鮮不臭三也神彩精明語音清朗四也體氣和平五也此屬腑症病微邪淺若能慎節勿藥自愈

七惡皆因真氣損
七惡乃五臟虧損之症外似有餘而內實不足法當純補胃氣多有可生不可

因其惡而遂棄不治大抵元氣虛弱或膿水出多氣血虧損或汗下失宜榮衛消燦或寒涼尅伐氣血不足或峻厲猛劑胃氣受傷以致

真氣虛而邪氣實矣
煩躁口乾渴非常或泄或閉或淋瀝大渴發熱或泄瀉淋閉者邪火內淫一惡也○凡瘡腫發熱潮煩或失血過多或潰膿大泄或汗多亡陽或下多亡陰以致陰血耗散陽無所附浮於肌表而非火也若發熱不寢虛熱也聖愈湯兼汗不止氣虛也參湯發熱煩

脹

躁肉攣筋傷氣血俱虛也。八物湯。木渴面赤。脉洪大。而虛
 陰虛發熱也。古歸芪湯。微熱煩躁。面赤。脉沉。而微。陰盛發
 躁也。四君子湯。加姜附。凡渴不可專沉於火。若焮痛發
 熱。便利調和者。竹葉石膏湯。腫痛發熱。大便秘澀者。四順
 清涼飲。焮痛熾盛者。活命飲。膿水多者。聖愈湯。胃傷內
 津液者。錢氏白朮散。腎水乾涸者。八味丸。有先作渴。小便
 頻數。而後患疽者。或愈後作渴。或舌黃乾硬。小便頻數。而
 後患疽者。尤其惡也。宜慎服八味丸。補中益氣湯。以滋化
 源。可免是患。蓋癰疽未有不由腎虛而作。切勿忘知母黃柏
 損陽。則陰氣無由而生。○泄瀉因寒涼傷脾者。六君子湯。
 加砂仁。或托裏建中湯。托裏溫中湯。脾虛下陷者。補中益
 氣湯。吞二神丸。命門火衰者。八味丸。料煎吞四神丸。腎虛
 不固者。古菱附湯。加吳萸五味子。天孔痛者。附子理中湯。
 四逆湯。凡癰疽嘔瀉。腎脉虛者。死。○便秘因熱毒入臟。嘔
 噦心逆發熱。腫硬。秘結。固宜通之。又有伏熱。陽氣怫鬱。面
 赤便秘者。為邪火在經。宜汗以發之。潰後氣虛。血渴便秘者。
 者十全大補湯。或因入房傷腎便秘者。加姜附以回陽氣。
 則大便自潤。凡便秘能食而肚腹不脹者。切不可下。若腹

痞脹而秘者借膽法用猪膽一枚剪去頭入鹽醋少許以
鷲管插入膽中灌穀道內須臾自通○小便淋瀝頻數短
少或莖中澁痛皆腎虛惡症詳四卷淋類八十一葉潰後腫痛臭難當膿血既出腫

臭敗者胃虛火盛二惡也人參黃芪湯或十全大補湯加麥門冬五味子黑睛緊小白青赤視

不正黑睛緊小白睛青赤瞳人上視者肝腎陰虛而目係急三惡也腎氣丸料或八物湯俱加炒山梔麥門冬五味

子喘急恍惚喜卧床喘粗短氣恍惚嗜卧者脾肺虛火四

湯加麥門冬五味子心火剋肺金入參平虛惡肩背四肢肺散陰火傷肺腎氣丸料加五味子煎服

重肩背不使四肢沈重者脾腎虧損五惡也補中益氣湯十全大補湯俱加山藥山茱萸五味子食少嘔

藥傷寒涼不能下食服藥而嘔食不知味者胃氣虛弱六惡也六君子湯加木香砂仁甚加附子挾痰者

托裏清中湯挾火者托裏益黃湯○抑論瘡腫時作嘔熱毒攻心潰時作嘔陰虛潰後作嘔脾虛如熱盛燉痛活命

飲護心散作膿掀痛托裏消毒散膿熱脹痛托裏散或針

以泄之炊瀉便秘者內疎黃連湯寒涼傷胃者六君子湯

加乾姜木香木乘土位加芍藥柴胡胃脘停痰加桔梗脾

虛自病或水侮土加益智仁砂仁鬱結傷脾加川芎山梔

蒼朮香附濕氣侵胃倍白朮白朮生肌斂聲嘶唇鼻變青

口妙劑又有登廁觸穢作嘔者仍宜補胃

色面目四肢腫且黃脾肺俱虛七惡也補中益氣湯加姜

十全大補湯加炮姜陽虛寒戰腹疼甚自汗飢逆雷鳴腸陽虛皆因

或瀆後勞役或吐瀉之後或誤入房夢遺或外邪所乘初

則虛火假症仍發熱頭疼良久寒戰咬牙腹痛雷鳴泄瀉

飢逆自汗盜汗陽虛寒氣所乘之症八惡也急用托裏瀉

中湯後用六君子湯加附子或加姜桂甚者用大劑參芪

歸朮倍加姜附虛極發躁欲坐并暮然變瘡身反張瀆後

以手足溫為度惡寒作渴怔忡睡臥不安陽衰陰盛發躁脉洪大按之微

細或無此陽虛極暮然牙關緊急腰背反張變為瘡瘰陰

細或無此陽虛極暮然牙關緊急腰背反張變為瘡瘰陰

脾經

縮或無汗惡寒或有汗不惡寒九惡也俱宜八味丸將加參芪歸朮大劑煎服陰虛晡熱夜不寐

消渴便汚血難藏原稟瘦快或房慾竭精或瘡出膿多或不著瘡出紫血四物湯托裏益氣湯腎氣丸主之便汚

黑者不治便血瘀滯者犀角地黄湯救之○瘡瘍時或愈後口鼻吐衄牙宜齧露皆因瘡瘍出血脾火動而錯經妄

行當求經審其因而治之肝熱則血妄行四物湯加山梔

牡丹皮黃芩白朮肝虛則不能藏血腎氣丸心火不能主

血四物湯加炒黃連牡丹皮芍藥木脾虛熱不能統血四君

子湯加炒山梔牡丹皮則不鬱結者歸脾湯加五味子脾

肺氣虛者補中益氣湯加五味子氣血俱虛者十全大補

湯陰火動者腎氣丸加五味子大丸失血過多而見煩熱發渴等症勿論其脉急用單人參湯補之經云血生於氣苟非其温參芪歸朮之類以主心脾五善見三容易治七惡見四真惡瘡正傳以善為順惡為逆瘡瘍仍忌倒陷又增為九逆殊為有理又有一般

無名腫

非癰非疽非瘡非癬狀如惡瘡或瘡或劇名曰無名腫毒隨其見症在表在裏在經用藥外以槐枝

煎湯洗淨後以赤小豆黃連白膠香黃連黃柏貝母硫黃

糯米黃丹輕粉為末麻油調搽一切惡瘡人所不識者皆

同癰疽癩疔也同方

潤一寸至二寸為癰一寸至五寸為癰五寸至一尺為疽一尺至二尺為

竟體疽未潰色紫黑堅硬已潰深陷如岩為癰四畔生如

牛唇黑硬為癰無頭面色淡紅為癰是知腫起為癰沈潰

為疽發出於外者為外發隱伏腸胃者為內疽癰比癰疽

更輕癰癩疔多難治○癰多生乳脇脉膝全宜大補氣血

脾胃及蠟燭丸護膜生肌其萬一

○癰癩見後週身部

○腦頸部

腦發五種
大頭腫

頭瘡
鬢疽
風屑
耳瘡
白禿
軟癩

內痔瘡
痰核

疥癩
癩瘡

腦後頸後頂心發六腑陽毒好上蒸

六腑陽毒聚頂惟大陽勝肱主之文積痰

火濕熱上蒸於腦古謂發腦發鬢發眉發頤發背謂之五
發至僂凡眼不見翳皆惡○有生於兩邊髮際穴者如有
核宜取核以去病根○有生於腦心者四邊腫赤連耳項
不急治膿水從頭中而出血逆痰起不治○有生於頤後
者瘡頭向上瘡尾向下形如蜂窠乃反症也掀腫者急宜
托裏散加林府赤芍桔梗防毒攻心如痰發或流入兩肩
者不治○有生腦後對口者名曰天疽其狀大而色紫黑
不急治熱入淵脈前傷任脈內薰肝肺十餘日而死○有
生耳後一寸三分至命之處名曰發頤又曰銳毒凡頭上
癰疽宜服降火化痰消腫托裏之藥不可針灸惟初起隔
蒜灸之則可但艾炷宜小而少勢成者外敷南星膏或陰
陽散歛口古香柳散若熱上蒸連頤而穿口必主穿喉而
死
焮腫納冷真熱症
焮腫作痛煩渴好飲冷水宜解毒湯
加天花粉以除痰火濕熱或黃連消
毒散當歸羌活湯清熱
消毒飲活命飲選用
口乾飲熱腎虛情
腫痛口乾作渴
好飲熱湯為腎
陽虛火熾宜托裏消毒散托裏益氣湯腎氣丸八味丸慢
腫微痛少食者補中益氣湯痰多者托裏清中湯若色黯

不潰不斂為陰精
消渴各腦燥不治
頭瘡風屑**禿軟癩**總是濕熱症稍輕頭

宜內服酒歸飲外用雄黃水銀各等分為末以臘月猪脂
半生半熟和勻洗淨敷之濕爛者用燕窠土黃柏為末乾

疹痂高者用黃蠟瀝清同熬敷之○頭上風屑白屑極痒
宜內服單苦參九下虛者薄荷茶外用藜蘆煎湯避風洗

頭候稍乾分開頭髮仍以藜蘆末糝頭皮上綰帕緊縛兩
日夜頭風亦效○禿瘡初起白團瑛剝如癬上有白皮久

則成痂遂至滿頭生瘡中有膿孔細虫入裏不痛微痒經
反不瘥宜內用通聖散酒拌除大黃另用酒炒共為末再

用酒拌令乾每一錢水煎服外用紅炭一淬長流水洗去瘡
痂再用淡豆豉一合炒令煙起色焦至塵一團飯飲調劑

炭火煨令灰燼等分為末入輕粉少許麻油調搽如有熱
加黃連寒水石有水加枯礬有虫加川椒麝香少許腫厚

加消皮烟洞烟膠香爐蓋上香膠如久不愈有虫者摩風
膏加黃柏黃丹烟膠各一两二方用鹽烏魚頭燒灰麻油

調搽○軟藤用抱鷄卵壳燒存性入輕粉黃連裁半為末
清酒調敷外腎生瘡亦效愈而再作者用野蜂房二箇燒

存性為末以巴豆廿粒去壳煎清油二三沸去豆以清油調敷或枯礬亦好多年不愈者用猪頭上毛猪頭上毛各一握燒存性鼠屎一粒為末清油調敷或加輕粉无妨如暑月生癩用木槿花搗爛敷之最妙

大頭腫痛

又名雷頭風時行毒濕在高巖之上故頭面痛腫疔瘡甚則咽嗑堵塞害人最速冬

濕後多病此症似傷寒寒熱身痛治分表裏三陽屬連兩目鼻面腫者陽

角者少陽也腦後項下腫起者太陽也脈浮表症多者清震湯或敗毒散加荆防脈沈裏症見者宜羌活黃芩俱酒

炒大黃酒蒸為主陽明加葛葛升麻芍藥石羔少陽加瓜萋仁牛蒡子太陽加荆芥防風水煎時時呷之取大便邪

氣去則止甚者加芒硝或防風通聖散加牛蒡子玄參俱用酒炒微微下之咽喉腫痛者用姜蠶一兩大黃二兩蜜

丸如彈井水化服凶荒勞役宜普濟消毒飲以安裏虛者加參歸便秘加大黃或人中黃丸亦妙服後俱仰臥使藥

氣上行故非便秘熱表裏症罷腫不消磁鋒去血通關搗盛忌用降下之藥

表裏俱解腫不消者破去血外用通關散倍羊躑躅及藜蘆少許搗鼻嚏以泄其毒久不愈欲作膿者內服托裏消毒散體倦食少惡寒者補中益氣湯加桔梗潰後腫赤不消膿清色白者六君子湯加桔梗芎歸元氣素弱脈微者用參朮芎歸陳皮柴胡升麻甘草各等分以升舉陽氣用牛蒡子玄參連翹桔梗減半以解熱毒腫赤便屬純陽脈微便屬純陰慎之

鬢疽 肝膽之怒火或因風熱藥同畏 怒火風熱俱宜柴胡清肝湯腫痛甚者注

命腎虛血燥日晡潮 腎水不能生木以致肝膽火盛血燥飲腎虛血燥日晡潮 鬢及頭自腫痛者四物湯加玄參柴

胡桂梗甘草風熱連頭面咽牙痛者 汗多喘渴脾勞過 犀角升麻湯血虛者四物湯加參芪

役腫痛寒熱喘渴自汗者補中益氣湯去升柴加五味麥門冬炮姜

耳瘡 三焦肝風熱 耳瘡發熱掀痛屬三焦厥陰風熱者柴胡清肝湯梔子清肝湯中氣素虛者補

七三五

中益氣湯加酒炒山梔黃芩牛蒡子寒熱
作痛屬肝風熱者小柴胡湯加山梔川芎
痺痛出膿兼養

血內熱痺痛出膿寒熱濕數牽引骨脇
脹痛屬肝火血虛者八味逍遙散
出水貪冷屬腎虛

火動切忌風藥劫耳內痒痛出水喜冷銀簪探入屬腎經
虛火被惹忌用風藥燥筋宜腎氣丸

耳邊侵淫瘡出黃水者用救苦膏頻刺芥棗肉等分燒灰入
臍粉為末麻油調搽○月蝕瘡生耳鼻面間及下部諸竅

隨月盛衰用胡粉炒黃枯礬黃丹黃連輕粉各一錢胭脂
煨灰一錢麝少許為末先用鹽水洗淨糝之或麻油調搽

內痔瘡生於口上腫治以鈎刀并鐵烙敷以雄粉支其牙

最是虛勞元氣薄初發如蓮花根蒂小而下垂乃大治法
以鈎刀決其根燒鐵烙以止其血次以

雄黃輕粉粉霜日晡白藜為末敷之以槐枝作枕支其牙
頰間毋使口合二兩時許瘡癩定合口自便次日出膿以

生肌散敷之上
腫多骨疽見後

疾腮

同 鬚發

風熱犯其胃表分寒熱裏不利

外因風熱腫痛在表寒熱者并

麻胃風湯在裏二便不利者四順清涼飲如表裏俱解腫痛又不消飲作膿也托裏消毒散治同大頭腫積熱

腫痛頗難當

骨柔厚味胃經積熱腮腫作痛或發寒熱者用升麻黃連連翹牛蒡子白芷等分水煎服

連耳上太陽部分腫屬風熱加羌活防風連耳下少陽部

分腫屬怒火加柴胡山梔牡丹皮連耳後少陰部分腫屬

相火加知母黃柏頭面齒牙俱腫內熱口乾者犀角升麻湯齒牙唇口俱腫出血者清胃散加石膏內寒不

潰宜補劑內傷生冷涼藥不能消潰食少體倦者補中益

子傷七情有寒熱者八味逍遙散傷色慾連頤及耳後腫者腎氣丸八味丸十全大補湯不可誤用風藥尅伐之劑

瘰癧馬力屬少陽風熱痰氣結核囊

生頸前項側結核如大豆如銀杏口瘰癧

生脅腋腋下堅硬如石形如馬力者曰馬力多氣少血之病總皆手足少陽相火所主蓋耳前後與缺盆肩膊上臑下

屬足少陽部分延及頰頰頰車與頸屬足陽明部分延及
胃中中府雲門肺經部分者死風癱大而小熱癰癩腫赤
色又各血壅痰癰推動滑軟氣癰實者化痰通經脈清肝
圓而動又有鼠成癰大小不一

養血是上方

無痰不成核諸癰初起實者皆以化痰為主
通用一陳湯加防風桔梗黃芩竹瀝宵緊者

以此探吐尤妙一通經脈必用瑛貓踈滲小便以瀉心火
古方必劫散立應散是也但此二藥甚峻服後宜量體調

治體實風熱盛者繼以宣熱舟服之體虛者托裏益氣湯
或八物湯合二陳湯多服瘡口自斂又有虛甚者宜先服

健脾藥而後服一散輕者只用斑鷄丸便堅胃盛者白蠟
丸或追膿化毒散較硬者九少陽分者柴胡通經湯陽

明分者升麻調經湯少陽陽明二經二湯合服調之誤下
則犯經禁病禁一清肝者膽與肝合病則筋累累如貫珠

寒熱癩痛乃肝氣動而為病也當清肝火為主佐以養血
若寒熱止而瘡不愈者乃肝血燥而為病也當養血為主

佐以清肝清肝益榮湯槐子
清肝湯柴胡清肝湯選用

虛以滋潤肺脾腎瘡如豆粒
附筋肉色

清肝湯柴胡清肝湯選用
虛以滋潤肺脾腎
附筋肉色

不變內熱口乾精神倦怠久不消潰及肝腕弦緊腎脉洪
 數乃腎水不能生木以致肝血火動筋攣忌用風藥燥肝
 經又爛破膿血大泄者脾腎愈虧火炎於肺皆宜腎氣丸
 補中勝毒餅為主兼服逍遙散加桔梗麥門冬玄參以清
 肺火多怒有肝火者清肝解鬱湯有寒熱者單夏枯草散
 肝火旺甚或近骨處生虫作痒者薑薑丸通用 備頭片海
 藻散堅丸外治銀右散蠶繭散 備蠟散 成痿瀉水補且防
 虛弱者單夏枯草骨內服外貼加麻油
 痿即漏也經年成漏者與痔漏之漏相同但在頸則曰瘰
 漏在痔則曰痔漏治法則一初起者宜溫散風冷及行腎
 經濕熱邪水又則大補氣血兼用薰洗平肌塞竅之藥
 方白朮散治瘰癧成漏以其有牽牛能利腎經惡水免云
 淋瀝穿穴但利後當量體調治
 痛節酒色財氣九漏治詳漏條
 女人經閉有潮死經調及
 潮者可治經閉有潮或咳者死古方用正燭散治瘰癧和
 血通經服之自消日進一服七八日見効便不閉者胡
 通經湯并麻調經湯又虛者加味道遙散清肝益榮湯或
 用二陳湯合四物湯加牡蠣柴胡黃芩玄參神麴為末以

柔糖膏搗丸菘豆大每五十丸
丸濕酒下或腎氣丸尤妙
男子潮咳是真傷

癆瘵類有日腹中有塊頸上有核最爲難治
况成潰漏而不清金降火滋腎健脾病人又不清心淡口則潮汗咳瀉

惡症蜂起其可生乎但視其目內赤脈貫瞳人有幾條則知其幾年死面色眊白金尅米脉洪大爲元氣虛敗俱爲不治故曰實者

可治虛者可慮

痰核在頸全不痛乃痰聚不散也不可誤用瘰癧藥治宜

二陳湯加大黃連翹柴胡桔梗體薄者二陳湯加桔梗黃芩玄參麥門冬及防風少許入竹瀝多服自消如耳後與

項間各有二在臂或痛亦不紅臂核或作微痛者以內無塊者含化用

腫皆然宜陳皮半夏茯苓防風酒芩各一錢連翹二錢通皂角刺一錢半川芎蒼朮各五分甘草二分水煎服

身結塊多痰注濕痰下體却宜通凡遍身有塊多是痰注但在上體多兼風熱在

下體多蒸濕熱宜加味小胃丹竹瀝
建痰丸量體虛實服之通用海帶丸

癭瘰有五應五臟

舊分五癭六瘰惟薛立齋止言五瘰蓋
癭瘰本共一種皆痰氣結成惟形有大

小及生頸項遍身之殊耳立齋云肝統筋怒動肝火血燥
筋攣曰筋癭心主血勞役火動陰火沸騰外邪所搏而為
腫曰血癭脾主肉鬱結傷脾肌肉消薄外邪搏而為腫曰
肉癭肺主氣勞動元氣騰理不密外邪搏而為腫曰氣癭
腎主骨勞傷腎水不能榮骨而為腫曰骨癭瘰之名有五
者此也仁齋云筋脉呈露曰筋癭赤脉交絡曰血癭皮色
不變曰肉癭隨憂愁消長曰氣癭堅硬不可移曰石癭走
癭瘰之名有五者此也癭瘰俱內應五臟藥治相同

遍身癭頸項

癭瘰所以兩名者以癭形似櫻桃一連縱大
亦似之槌槌而垂皮寬不急原因憂恚所生

故又曰癭氣今之所謂影囊者是也瘰初起如梅李皮嫩
而光漸如石榴瓜瓠之狀原因七情勞怒復被外邪生痰
聚痰隨氣留住故又曰瘰癧總皆氣血凝滯結成惟憂恚
藉傷心肺故癭多着頸項及肩勞怒邪氣乘經之虛而住

有

故癰腫之處着之。雖無痛痒有虛實散堅行氣不可妄。癭瘤或軟或硬無痛無痒。

體實者海藻散堅丸海帶丸痰火盛者抵掌散神效開結散此皆化痰行氣破堅之劑久虛者不可妄服虛者筋癰

腎氣丸或八物湯加山柅木瓜炒黑龍膽草肝火盛者間以蘆薈丸暫服血璠四物湯加茯苓遠志肉癰歸脾湯補

中益氣湯氣癰補中益氣湯骨癰腎氣丸補中益氣湯○通用初起者十味流氣飲單蜘蛛片稍久者蠟礬丸常

服自然縮小消磨外敷南星膏切不可輕用針刀決破破則膿血崩潰滲漏無已必至殺入但有一種脂癰紅粉色

全，是痰結用利刀破去脂粉則愈或有如茄番下根甚小者用藥點其蒂俟茄落即用生肌斂口藥敷之防其出血

○手部

天蛇頭 甲疽 代指 驚掌風 紅絲瘡

疣屬肝膽小腸經。多患於手背及指間或如黃豆大或如聚粟或如熟棗按之則絲長三四寸許

又曰手背發風熱怒火或亡精。風熱血燥筋縮者八味逍遙散和黃連或清肝益榮湯怒火者

柴胡清肝湯亡精腎枯筋縮者腎氣凡

切忌寒涼繫與灸誤犯出血必傷生

誤用寒涼降火之藥及蟬螂蝨蛛絲纏荒花漿線繫着艾灸等法輕者反劇重者大潰腫痛發熱出血而死慎之

甲疽惡代 雖害事不似**鷲掌風** 難平 足甲疽乃毒氣攻於手指努肉畏上指甲

疼痛出血瘡中有虫或因剔甲傷肌或因甲長侵肌遂成

腫痛俱用綠礬五兩置鉢上以炭火封之吹令火熾其

礬即溶流出赤汁者是真候流汁盡去火待冷取為末色

似黃丹收之先以鹽湯洗拭後用綠礬為君入乳香少許

敷之重者用綠礬五錢蘆薈一錢半麝香一字為末以絹

袋盛藥納所患指於袋中線札定以瘡為度○代指指頭

先腫焮熱掣痛然後於爪中邊結膿甚者爪甲俱脫先用

芒硝煎湯淋洗然後用烏梅核中仁為末米醋調成膏入

指瘻之自愈或用猪脂和蚯蚓搗爛敷之○天蛇頭瘡生

手指上或足瘡傍一塊開口腫痛用鷄母楊根攷醋浸一

宿即消或以雄黃入鷄子內以患指浸其中一宿次早更

以蜈蚣燒烟薰病指一二次即消如痛甚流血不止者用

雄黃蜈蚣全蝎為末搽在瘡上却以少油抹其上扎之
鷲掌風癰用猪前蹄爪破開入菊花蒼耳末以線縛定收
爛食之次日用白薛皮皂角雄黃各五分鉛製水銀三分
為末臨夜用搗脂姜汁調搽次早以沙擦去然後量體服
去風之藥此癰乃楊梅瘡類如多年不愈者先用磁鋒磨
刮次以草麻子一兩枯礬二錢為末桐油調搽火烘極熱
再以棗肉三兩水銀五錢枯礬三錢搗爛如泥每日搽手
十餘下次以肥皂酒糟洗淨十次神效更灸勞宮或內關
一穴斷根又方桐油調密陀僧末搽掌外用水龍骨火
燒烟薰之治手足掌風及絲花癰更以樟葉煎湯洗之

紅絲瘡最害久速或生於手或生足發泡初黃變紫青絲

逆入心毒入腹 紅絲瘡因喜怒不常血氣逆行而生於手
足間有黃疱其中忽紫黑色即有一條紅

絲逆逆血上而生若至心腹則使人昏亂不救或有生兩
三條紅絲者急以針橫截紅絲所到之處刺之令其出血

以膏藥貼或躑躅
草根敷之立愈

○胃腹部

乳癰 胃癰

肺癰痿 腸癰

心癰附 腹癰

乳房 膈胃 乳頭 肝

婦人之乳 男子之腎皆性命根也

病初 嘔渴 增熱 寒

渴

嘔吐者 膈胃風熱也 甚則毒氣上衝 咽膈妨碍 寒熱者 肝邪也 此皆表症 宜不換金 正氣散 加天花粉 能止渴 嘔定寒熱 咽膈有碍者 其桔湯 加生姜 或護心散 如潰後見此 四症為虛 婦人胃厚 多憂鬱 火化

汁濁 塞竅 端結 核有兒 吹熱氣

飲食厚味 恣慾憂鬱 以致胃火上蒸 乳房汁化為濁

膿 肝經氣滯 乳頭竅塞 不通致令結核 不散痛不可忍 初起便宜 隔蒜灸法 切忌針刀 能飲者 瓜蒌散 一醉膏 加芎歸各一分 一服兩服 即効 不能飲者 瓜蒌散 ○結核亦有氣血虛弱 畧被外感 內傷 以致痰瘀凝滯 俱以古芷貝散為主 血虛合四物湯 更加參朮柴胡升麻 氣虛合四君子湯 更加芎歸柴胡升麻 憂思傷脾者 歸脾湯 加瓜蒌根 貝母 白芷 連翹 丹草節 水酒各半煎服 有用火結核 腫痛甚者 清肝解毒湯 ○吹鼻 因乳子 膈有痰滯 口氣燥熱 含乳而睡 風

熱吹入乳房凝住不散作痛初起須忍痛揉令稍軟吸令
汁透自可消散不散宜益元散苓姜湯或井水調一日一
夜服三五次自解重者解毒湯頓服之挾氣者古芒貝
散單青皮湯外用漏蘆為末水調敷又有乳汁不行妳乳
脹痛者核久成癰硬腫漫核久內脹作痛外腫堅硬手不
湧泉散核久成癰硬腫漫可近謂之乳癰未潰者仍服瓜
萸散內托升麻湯或復元通聖散加藜蘆虛者托裏消毒
散將潰兩乳間出黑頭瘡頂下作黑眼者內托升麻湯已
潰寒熱者內托十宣散少食口乾者補中益氣湯補熱內
熱者八物湯加五味子胃虛嘔者六君子湯加香附砂仁
胃寒嘔吐或瀉者六君子湯加乾姜藿香遇勞腫痛
者八物湯倍參芪歸木遇惡腫痛者八物湯加山柰又有
核小全不痛久則潰漏療益難其子大不痛不痒五七筆
灸外腫紫黑內漸潰爛名曰乳癰滴盡氣血方死急用十
六味流氣飲及單青皮湯兼服虛者只用清肝解鬱湯或
十全大補湯更加清心靜養庶可苟延歲月經一年以後必
於乳下潰一穴出膿及中年無夫婦人死尤速故曰夫者

妻之天惟初起不分屬何經絡急用葱白寸許生半夏一
枚搗爛為丸炭實大以懸裹之如患左塞右鼻患右塞左
鼻二寸宿

男兒乳疾何須怪怒怒損傷精血乾

男子乳疾治與婦人微異

者女損肝胃男損肝腎蓋怒火房然過度以致肝虛血燥
腎虛精怯不得上行痰凝滯亦能結核婦人胎產後亦
有肝虛者大槩男子兩乳腫者瓜蒌散十枚米流氣飲左
乳者足三陰虛鬱怒所致八物湯加山柘牡丹皮或清肝
解鬱湯火盛風熱者更加炒黑草龍膽五分腎虛者腎氣
丸食少作嘔胃脇作痛日晡頭疼溺澀者六君子湯加芍
歸柴胡山柘潰爛作痛者十全大補湯腎氣丸因勞怒則
痛并發寒熱者補中益氣湯加炒黑山柘不可輕用清熱
敗毒之劑

肺癰因痰火益炎

經年久咳熱極葉焦而為痰猶草木元
甚則枝葉萎落也火燥甚則腐脹為膿

血成癰病因汗吐下後亡津或腎虛火炎或厚味薰蒸而
成其候惡風咳嗽鼻塞流涕項強不能轉側皮膚不澤

脇脹滿呼吸不
利吐痰血腥穢
癰口乾燥痰涎粘膿成胃痛或開竅調和

金水胃脾兼肺痿脈數而實寒熱往來自汗咳唾口中涎

散火盛者人參平肺散為丸含化虛損者切勞散虛冷不

濕者冬甘草湯加乾姜喘急有寒邪者小青龍湯喘急而

浮鼻塞翳脹者古葶藶散是知肺痿有寒有熱而以清金

降火豁痰為主也○肺癰脈數而虛口燥咽乾胃脇隱痛

二便赤澀咳唾膿血腥臭置之水中則沈桔梗湯主之也

吐膿者消膿飲咽痛者其桔湯便秘者太乙膏為丸白湯

下又有胃脇間開竅口中所咳膿血與竅相應而出者

宜大補氣血血多者梅巨湯冷熱不調者雲母膏為丸其

桔湯下痰多者托裏清中湯咳喘短氣溺少者參芪

補肺湯脾虛少食者參朮補脾湯七情饑飽勞力傷脾肺

者團參飲子咳唾痰壅者腎虛也腎氣丸口乾燥者虛火

也八味丸去附子加五味子有吐膿血如肺癰口臭諸般

藥不效者消風散加髮灰米飲下大槩面赤當補脾腎面

白當補脾肺蓋補脾以生肺金補肺以生腎水也如陰火

發熱咳吐膿血痰如糯米粥脉浮大者死若膿血自止脉浮短瀼者生

心癰胃發名井疽胃乳間生蜂窠癰發各井疽狀如豆天三四日起不早治入於腹十日死外

發可治內傷殂降火清心為要藥心熱盛極急用疎導心火之藥遲則不救小便

澁者清心散或涼膈散去硝黃加白芷天花粉瞿麥木通大便秘者內消清心散或涼膈散去硝加白芷天花生地

脇癰一樣忌補虛初起神效瓜蒌湯或柴胡清肝湯蓋胃脇肝心火盛虛中有熱決不敢投陽藥

潰後方敢清熱托裏兼滋腎水誤投熱藥易傷骨膜慎之脇癰用鷄屎粘搗爛入鹽少許醋和敷之消腫止痛膿

成者敷之即安

胃癰胃熱咳膿血人迎反盛胃脉沈胃脘癰因飲食七情火鬱後被外感寒氣

所隔使熱濁之氣填塞胃脘胃中清氣下陷故胃脉沈細惟寒氣所隔故人迎緊盛有此二脉者胃癰真也寒

熱如瘡皮毛縱先宜疎利次補升外症寒熱如瘡胃濁則肺金失養故身皮錯縱

或咳或嘔或唾膿血俱大射于湯去之胃火盛皆清胃散

痰壅者其桂湯大便不利者太乙膏為丸服小使不利者
三仁湯內痛者失笑散虛而痛者牡丹散膿出食少者補
中益氣湯升提胃氣或佐以前葉調之不可專治其瘡

腸癰小腹痛若淋濕熱痰注內膜甚者腹脹有水聲便

膿臍瘡皆敗惡濕熱鬱積成癰痰火盛者脈數而滑挾痰血多者脈數而芤外症小腹腫強按之則

痛小便若淋似奔豚發熱惡寒脈遲緊者未有膿也
黃湯或五香連翹湯下之不敢下者敗毒散加秦艽連翹

脈孔滴者四物湯加桃仁紅花玄胡索木香脈洪數者已
有膿也三仁湯神效瓜蒌湯小腹疼痛小便不利者膿壅

滯也牡丹散若腹脹大轉側間有水聲或
遠勝生瘡出膿大便屢下膿血者不治問有虛冷皮甲

錯服皮似腫按軟弱中無積聚外無潮脈數還宜用溫藥

脉數外無潮熱內無積聚身皮甲錯腹急如腫按之却軟
 乃內虛陰冷凝痰成癰牡丹散或內托十宣散加茯苓其
 者收毒散以
 小便利為驗又有冷熱相交併消痰和中後補托
 雲母膏為疔牛膠煎酒下利去痰膿則愈其間有痛甚大
 便從小便出者亦宜如下膿過多者梅豆湯合其桔湯和
 之蠟熬丸左妙膿止後內托十宣散或八物湯補中益氣
 湯以固本元愈後却宜靜養若動作躁暴或被驚恐則腸
 斷而死九癰生小腸分尤可大腸
 分近肛門者難治肛門破者即死

腹癰 腹痛關脉數飲食七情火滯着

腹癰生於肚腹皮裏
 膜外左關脉洪數而

腹痛甚若是也膏梁七情火鬱以致脾虛氣滯而成
 小兒多因驚積虧損而成食積疝氣相類不可誤治無膿

腫硬色如常

慢腫堅硬肉色不變未有膿也四君子湯加
 芎歸白芷枳殼或托裏散若按腫痛甚者邪

氣寬也先用活命飲隔蒜灸以
 殺其毒後用托裏散以補其氣膿成腫軟色赭若
 腫起而軟色赭

光

赤者膿成也，托裏消毒散若膿成而不外潰者，氣血虛也，毋針刺之。潰未皆宜壯胃元行經。

活血忌涼藥，不問初起已潰未潰俱宜壯胃元氣而佐以

能潰潰不能斂壯者難治未弱立死若曾經誤下及服降火破氣消痰之藥大劑參芪姜附或十全大補湯救之。

吁嗟九疽認亦難按穴方知審經絡中府屬肺巨闕屬心

中脘屬胃京門屬腎天樞屬大腸丹田屬三焦關元屬小腸每穴內隱隱痛者為疽肉上微起者為癰假如中府隱

痛者肺疽也上肉微起者肺癰也各穴做此十太味流氣飲或托裏散加當歸山柰黃芩杏仁

○背腰部 背發七種 腰發二種

發背五臟毒蘊成七情六慾外邪并背雖膀胱督脈所主然五臟皆係於背或

醇酒厚味或鬱怒房勞以致水結火炎痰凝氣滯或投外邪與毒相搏隨處發生肩下脊上脾家

毒 發在脊下脊上乃因飲食感毒廣一尺深一寸雖潰在

骨不穿膜不死急治脾胃中之毒內服護心散外用敷

藥恐毒奔心太要服藥截截偏右蓮蓬子內生蓮子發生於

住如通脊背腫者不可救右脾中外如

蓮蓬內有子孔恐其毒奔入心太要用托裏散加茶偏左

蓮黃柏荷蓋散之不令攻心漸消可治通背腫者危

初起汗即散 脾發生於左臍間初起可用燈

火點破內服追疔湯汗之即散左搭右搭肺

肝情 右搭肩發骨上生者以動之處可治若串左有難治

左搭肩發骨上生者以動之處可治若串右有難治

二症內服托裏散加升麻桔梗外用去惡香中蜂窠防膜

散或綿絮燒灰為末糝之乾者麻油調搽

透 蜂窠發正當脊心形如蜂窠有孔在上者不宜最為反

未發也對心火毒太相凌 對心發極重因心火盛而熱氣會

故也對心火毒太相凌 生於此其毒壯盛走暴急用疎瀉

心火之散走流注風熱盛 散走流注發毒氣乘風熱而走

藥解之散走流注風熱盛 急宜疎風定熱治之則氣自息

若流注於手脚氣食陰虛龜見形此發頭尾俱尖四邊散

腰若必死無疑致而氣食相開合陰虛而成之氣虛而散者所以開口而瀉急服托裏補藥腎俞濕熱單生發

房怒兼之雙發平腎俞發因受濕并怒氣飲熱酒傷於內

若腎經見有濕熱更房勞發怒過度則兩腎俞穴生發陽發於外者可治陰發痰發傷腎膜及膿稀者死又有發

俞下發脾骨上發肩膊上又生一發亦謂之雙發慢腫難治炊腫易痛色赤作渴

脈滑數有力先服活命飲後用托裏消毒散慢腫不熱微疼色點作渴脈數無力者腎虛也托裏散少食者六君子

湯加姜補熱陰虛者四物湯加參朮或腎氣丸惡寒熱四邊熱大者陽氣虛也單人參湯十全大補湯小便頻數者

八味丸初起食少者邪盛脾虧也急用補中益氣湯救之今俗專用賽命丹下念金施於因怒因飲食毒及肥人則

可若瘦人及因怒火者反燥陰休渴致吐或血凝毒氣不行惟初起或一服之則可九炊腫氣血勝毒易治慢腫服

托藥不應者乃毒勝氣血死在旬日或已發出而不腐潰
若須急用托裏藥兼補脾胃不應死在二旬若已潰而色
不紅活者用托裏散加參芪肉桂及補脾之藥却不
能生肌瘡口黯暈大而不斂乃脾崩也死在月餘

中間法可憑

表症內托發汗裏症內疎通在經和解毒體虛
者未潰托裏消毒已潰托裏溫補詳前總論

○腎腿部

腎癰附腎蛆瘡 便毒 路岐 懸癰附穀
道中瘡 痔 漏 陰瘡 陰囊癰附

小兒陰囊生瘡 婦人陰瘡附交接出血

附骨疽附腿 上寒濕瘡 林瘡

腎癰太陽部位與雖多血氣罕到

腎居小腹之後部位
僻真雖曰多血然氣

既罕到血亦罕來中
年患此誠為可慮 陰虛濕熱是病根內托固裏性無躁

初起未成膿者隔蒜灸再用葱熨法飲作膿者內托若活
湯痛甚若活命飲腫硬痛者托裏消毒散微腫痛者托裏

散脾虛不能消散或食少不作膿者六君子湯加芎歸黃
芪偏古腎腿者左宜腎虛不能消散或作渴瀉淋者腎氣

人言 砒石也

九有脾虛誤服消導藥以致氣陷下腫痛甚者補中益氣湯或十全大補湯潰後尤宜進此一藥以固其裏兼節酒色戒躁暴乃可萬全○醫蛆瘡痛痒者摩風膏只痒甚有虫者用硫黃一兩入言一錢為末用醋調勻慢火熬乾復熬化如灰起將醋洒數次傾地下待冷成餅用麻油磨濃候瘡痒抵破擦上三日即愈

便癰屬足厥陰肝

俗云便毒實血疔也生於腿膝小腹之間乃厥陰肝經及衝任督三脉敗道乃

精氣出入之路也

房慾強精只一端

或入房忍精或思色不遂或當泄不泄敗精凝滯為癰腫

痛在跨腹之間先用五苓散利去敗精使秘加大黃有寒熱者小柴胡湯加山梔澤瀉後用腎氣丸以補精兼逐癰

血濕熱因勞或被冷補瀉方詢便易難

內有濕熱外被寒邪相拒敗痰不得

散治宜清肝火活瘀血滲利腎經邪水體實一便難者丙解湯入止散按鬱怒者流氣飲子或復元通氣散加天花

粉白堊青木香腫痛甚者活命飲濕熱壅滯者龍膽瀉肝湯體薄太便易而小便澀者小柴胡湯加芎歸知柏澤瀉

或神效。瓜薑湯加柴胡、山柃，痛甚者，活命飲去大黃。○濕熱因勞倦氣滯者，補中益氣湯，後俱宜托裏散。八物湯加柴胡，或十全大補湯，又欲成漏者，蠟燭。○單方用紫花地丁，搗酒服，最妙。騎馬兩邊異名兩便毒，左右兩邊俱發，或先有痔瘡而發，或卒然起核疼痛，而發，用藥同前。古方初起，宜國老膏入皂角炭少許，主之外，用厚尾草煎湯洗淨，以明松香為末，日三次乾糝，自愈。愈後仍戒房室行動。**路歧些小跨襠間**腫痛者，內服單蛇蛛方，外用炒葱熨三五次，後以消毒消腫藥加大黃、木鱉子、南星、草烏敷之。破者用生肌散。此症小兒患之，多因食積痰滯。

懸癰足三陰虧損

生穀道前陰囊之間，初發甚痒，狀如松子，漸如蓮子，日久如桃李，加以赤腫，若

破則大小便從此，輕則漏瀝重即殞。輕則瀝盡氣血而中而出，不可救也。輕則漏瀝重即殞。輕則瀝盡氣血而中而出，不可救也。輕則漏瀝重即殞。輕則瀝盡氣血而中而出，不可救也。

起量與溼熱

初起濕熱壅滯，作痛，瀉肝湯。命飲去大黃，或龍膽瀉肝湯。

大補氣血

猶恐耽

不成膿不潰者八物湯膿已成者急封之欲其生肌水斂腎虛者腎氣丸血虛者四物湯加參朮氣

虛者四君子湯加芍歸脾虛者補中益氣湯久成漏者十全大補湯蟬蟬丸此疾首尾常服固老膏雖患亦輕雖潰

亦淺誤用寒涼則不可救○穀道中生瘡用水中荷葉細搗綿裹納下部日三次即愈

五痔原因食色傷

經曰因而飽食筋脈橫解腸痔為痔蓋飽食則脾不能運食積停聚大腸脾土

一虛肺金失養則肝木寡畏風邪乘虛下流輕則腸風下血重則變為痔瘡或醉飽入房精氣脫泄熱毒乘虛下注

或淫極入房過甚傷筋忍精停毒甚則以男交男致傷膀胱與腎肝筋脉蓋膀胱筋脉抵腰絡腎貫腎走肝環前後

二陰故痔乃筋脉病發則面青痛甚肝苦急也○五痔牡痔肛邊如鼠乳此痔肛邊一救生膏陷入腸痔結核腸內

膿肛出血血痔大便清血隨下如射線脉痔腸口頻頻發痛出血且痛且痒五痔散主之又有氣痔肛門腫痛便難

強力則肛出不收加味香蘇散酒痔飲酒則發乾葛湯重痔侵淫濕爛歲積月累餘腸穿次蠟皮丸黑玉丹凡毒深

若大如鷄冠蓮花核桃毒淺者小如松子牛

乳鷄心鼻乳櫻桃雖三種種不同皆二陰虛也

濕熱風燥毒

言身痒非外邪乃臟內濕熱風燥四氣相合

出膿血水者熱勝血也痛極者火熱也痛痒者風熱也

便秘者燥熱也小便澀者肝火濕熱也又瘡頭向上或硬

者熱多向下涼血和氣清濕熱潤燥疎風止痛痒

蓋熱則傷血血滯則氣亦不運而大腸下墜作痛大麥以

芩連山柘清熱黃柏防已澤瀉行濕麻仁大黃潤燥秦艽

荊芥疎風風邪陷下夕者防風升麻提之氣弱者人參黃

芪補之氣不順者木香檳榔和之古方熱痔黃連阿膠凡

清心丸槐角丸槐膠丹濕熱加味連壳丸或四物湯合敗

毒散風濕秦艽湯燥痒四順清涼飲下血者芎歸丸

苦參丸痛者止痛丸痒者黑玉丹腫硬者膠疔丸

割剔終有害 刀割線剔損臟傷命藥點藥敷閉毒變漏初

起只宜蒜灸已成者防風荆芥槐花木鱉朴

水

硝煎湯熏洗滑脫加文蛤蓮蓬洗後用古熊膽膏蜈蚣油塗之內痔宜內生肌丸忌搽藥斷根滋補忌

寒涼體實屬肺與大腸風熱者加味槐角丸加味地黃丸三神丸斷根更易體薄屬肝脾腎三經陰精損者腎

氣丸補中益氣湯十全大補湯以滋化源更節嗜慾謹此居方可斷根又有兼下痔瘡者有莖中出白津者有兼疝

者皆肝腎不足變出勿專服寒涼瀉火○蜈蚣油端午取大蜈蚣一條於笈陰乾臨發前一寸煨存性桐油調塗輕

則不發重則次年對過日又發再剪一寸煨塗斷根又法用生蜈蚣數條浸麻油內候生蠶畧熬化塗痔及諸瘡癬

九漏須知初與久

凡癰疽久則宿膿腐肉傳蓄其間穿孔必深風冷外侵消洎穢膿流出如鉅瓮

之有漏孔九漏肝主狼漏胃主鼠漏大腸主蠅蛆漏脾主蜂漏肺主蚰蟀漏心主螻蝻漏膽主浮蛆漏腎主瘰癧漏

小腸主轉筋漏原因氣血壅滯染觸毒蟲動含毒之毒而名其因治則一也在痔則有穿腸穿腎穿陰者又有無痔肝

門左右別生一竅流出膿血各為單漏竅在皮膚者易愈臟腑損者難治又有原有痔漏肝邊別生一塊依膿就在

痔孔出者乃食積初濕熱久濕寒痔止出血如絲是熱注下也宜連魏散漏流膿血初是濕熱

久是濕寒初起淡紅微腫小核宜涼血清熱燥烈牽牛酒加味槐角丸臘頭丸古杖巴丸連歸丸久則內如藕白外

如黑腐淫虫惡臭宜澁竅殺虫溫補黑玉丹釣腸丸芋歸丸苦參丸蠟燭丸又有初起因風冷者久則虛而挾濕煎

者大補氣血兼艾灸薰洗平肌寒竅端十全大補湯補中益氣湯黃芪六一

湯主之丹溪用參朮黃芪芎歸為君佐以蝟皮蛇退牛角

腮蜂房之類服之外用津唾調附子末作餅如錢厚放瘡

上漏大姓大漏小姓小灸令微熱不可令痛乾則易新餅

再灸如倦暫止次日又灸直至肉平為度外用雲母膏貼

之畏灸者內生肌丸最妙他如熏洗方齒髮散蜂房散

平肌塞竅取膿取虫諸方粗實者酌用清貴者慎之

陰瘡三等屬腎肝濕瘡風濕痒如癬濕陰瘡由腎虛風濕相博邪氣乘之癢痒

成瘡侵淫汁如精瘡因久曠房室思色妬精作白腫痛痒動慾以致敗精流入莖內

出狀如齋藥

初發如粟赤腫潰爛作白痛痒妨悶陰蝕華丸腫相遺陰蝕瘡因婦人子宮

未淨與之交合房室後又未洗浴男子腎虛邪穢滯氣遂令陰莖連華丸腫痛小便如淋甚久潰爛成

下痒經久潰爛侵蝕肌肉血出不止以成下疳瘡寒熱煩

渴宜詳辨非虛便是濕熱侵之身體煩熱壯熱惡寒宜急治

湯加參朮芎歸腫痛發熱者四物湯加柴胡山桅濕熱腫

痛律裂寒熱者小柴胡湯加龍膽草黃連青皮熱勝二便

秘者八正散濕熱甚則腫痛溺澀及莖縮縱痒痛或出白

津者龍膽瀉肝湯如氣虛者補中益氣湯加龍膽草山桅

煩渴不止者竹葉黃芩湯腫潰後氣血虛而有火者八物

湯加柴胡山桅無火大便軟者托裏散內托十宣散太要

此症肝經陰虛為本腫痛寒熱為標莖痒津出多脾軟中

宜常服腎氣丸若專治肝則誤矣金水以致肝經血虛

痔出白津多因脾土軟弱不能滋生火燥宜補中益氣湯與清心蓮子飲間服蓋脾胃為肝腎

之源心實主之。○外治濕陰瘡，柏蛤散，銅綠散，如精瘡，津
謂散，薑腦散，除蝕瘡，鳳衣散，下疳瘡，旱螺散，玉莖破，裂腫，
痛者，鷲管散，爛鼻，成瘻者，截疔散，或用洗藥，腎莖上生瘡，
久不合口者，用經布燒灰，蜜調塗，上即愈。有陰毛間生虫，
作痒者，搗桃仁泥塗之。

陰囊癰屬肝腎經都緣陰虛濕熱并

丹溪云，但以濕熱入肝施治，而佐以補陰。

難清脫，溺澀清肝利濕毒

初起腫赤，脹痛小，使澀滯寒熱，
作渴，當清肝火，分消濕熱，以通

宜黑龍湯吞滋腎丸，如全因入房囊腫大如斗，許小腹脹，
悶溺澀發熱，口乾痰壅，命在反掌，宜腎氣丸料加車前子，
牛膝煎吞滋腎丸，滲利濕熱，後仍腫痛者，宜補陰并裏以
速其膿而針之，若膿掀而便秘者，熱毒壅滯也，宜托裏消
毒散，或不減者，熱毒未解也，宜潰後托裏補陰精，
清肝益榮湯，膿已成者，活命飲。

畢丸懸掛，或內見筋一條，不消，陰囊悉腐，玉莖下面，貼囊，
若亦腐如半邊筆管，只宜托裏散，加故紙，黃芪，五味子，免

絲子或四物湯加參朮吞腎氣丸兼服補中益氣湯倍參
芪歸朮大補氣血脾胃切忌寒涼攻伐及淡滲損陰之藥
外塗白蠟膏囊莖旬日可復雖曾去陰子亦無害又有因
水腫囊腫潰者見內科○陰囊兩傍生瘡濕痒甚者牡蠣
卅或連兩腿上生風濕瘡者硫磺散○小兒陰囊生瘡及
陰股間汗出先痒後痛愈後復發先以火灸瘡拭去痂令
乾以蜜敷之却搜麩作餅灸熱乘
熱灸之冷則再灸再灸以愈為度

婦人陰瘡發火致損傷肝脾濕熱注如蛇如菌如鷄冠生

虫腫痛痒脫墜

陰戶生瘡乃七情鬱火傷損肝脾濕熱下注○陰中挺出一條尺許如蛇痛墜出水

濁溢者朝服補中益氣湯晚服龍膽瀉肝湯外塗藜蘆膏
而收○陰中突出如菌如鷄冠四圍腫痛者乃肝鬱脾虛
下陷先以補中益氣湯加山梔茯苓車前子青皮以清肝
火兼升脾氣漸愈更以歸脾湯加山梔茯苓川芎調理外
塗藜蘆膏○陰戶突因勞力者血虛四物湯加龍骨氣虛
補中益氣湯○陰中生虫蟹如小蛆者乃濕熱甚而心氣

又發氣血凝滯而生宜藿香養胃湯神心湯古稀鯉丸外

用生艾子調雄黃未燒烟薰之更用雄黃散散納陰中

陰中生細虫痒不可忍食入臟腑即死令人發寒熱與癆

症相似先以蛇床子煎湯洗淨拭乾後用梓樹皮焙乾為

末入枯礬四分之一麝香少許敷之立效○陰戶兩旁腫

痛手足不能舒伸者用四季葱入乳香末同搗成餅安陰

中立效○陰腫痛極便秘欲死者枳橘散但腫痛者四物

湯加柴胡山柘牡丹皮龍膽草如時常陰痛者四物湯加

藁本防風○陰戶腫痛不閉者逍遙散十全大補湯腫消

不閉者補中益氣湯腫墜者加山柘牡丹皮○濕痒出水

又痛者憂思過也歸脾湯加柴胡山柘

牡丹芍藥生甘草○潰爛者逍遙散

內症熱倦經不調

食少胃滿尿澀滯 陰戶腫痛不閉寒熱溺澀體倦少食者

補中益氣湯加升麻柴胡至一錢量入

茯苓山柘○陰戶不閉小便淋瀝腹中下物 又有交接血

攻動脹痛者逍遙散加柴胡山柘車前子

節來涼藥房勞當禁忌 交接出血乃房室有傷肝脾虛不

藏血補中益氣湯外用熟艾皂裹

入陰中或用亂髮青皮燒灰敷之若
出血過多見雜症者調補肝脾自愈

附骨疽毒深着骨賊風石緩不可忽賊風得熱痛少寬

因風邪搏於骨髓故其痛亦徹骨過寒則甚外症惡寒有
汗痛處常欲熱熨失治變為癰曲偏枯宜越婢湯主之

緩慢色黯石硬疔緩疽石疽皆寒氣伏於骨髓但緩疽其
熱緩慢色黯黯久則皮肉俱爛石疽腫

與皮肉相似疼痛堅硬如石一若初起
便宜溫熱托裏補虛次乃隨症調治 **附疽肉痛真如錐**

外肉全無赤腫突粗人多因冷露侵濕熱痰火壅家發感

因露卧風冷寒濕襲深者初起痛不能轉寒熱無汗經反

寒齋為熱便秘者漏薑飲子主之有不敢下者須分經內

托汗散在死腎者內托羌活湯腿內近膝股漫腫木硬者

內托羌藥湯腿外者內托酒煎湯左腿外側漫腫長濶行

步逐痛以手按至骨大痛者黃連消毒散通用積蘇散敗

毒散○內傷厚味及勞役與酒後乘涼浴水邪入脾樞環

跳穴左右積痰瘀血搏成宜青草蒼柏湯微汗服此不愈
 恐疽將成者急掘地坑用火燒紅沃以小便令患者赤體
 坐其上以被席圍抱下截使熱氣薰蒸曠理開氣血暢而
 愈○內傷生冷飲食寒涼藥物血凝於內飲食如常活命
 飲食少體倦者六君子湯加當歸藿香如因勞役傷食右
 腿偏腫者補中益氣湯○內傷鬱怒腫痛如雖赤黃散漫
 先用活命飲次用八物湯加柴胡牡丹皮山梔○內傷勞
 役兩腿腫痛寒熱食少此濕痰下注也補中益氣湯加平
 夏茯苓芍藥○內傷房室兩腎腫硬二便不通者腎氣丸
 料加車前子牛膝煎服兼用十全大補湯有寒熱者逍遙
 散○抑考附疽初起宜青皮甘草節二味煎服以行其氣
 或灸灸患處若膿已成即用火針使毒不得內潰帶生用
 亦無妨且不痛又易斂口○附骨疽慢腫光色者用蜂房
 蛇退頭髮灰各等分為末每三錢酒調服或神應膏為丸
 梧子大每三十九溫酒下外仍貼之已潰者用平肌散或
 狗頭骨燒烟薰之魚眼瘡亦妙○腿上一切寒濕瘡用鶴
 子糞煨過為末乾糝如燥痛加黃丹少
 計桐油調敷凡癰疽生伏兔穴者不治

杖瘡 破瘀止其疼

定心補益是後節

杖瘡於法本不當治據古方破瘀去血為先一杖畢即飲童便和酒不可喫茶

免血攻心待神氣定後體盛者用鷄鳴散下之體薄者瘡

攻寒熱惡心少食宜當歸鬚散加柴胡羌活氣鬱加木香

心腹脹痛加薑便心下脹滿氣不通暢加木香檳榔外用

熱豆腐鋪在林處其氣如蒸其腐即紫後以熱豆腐鋪之

以紫肉散盡淡紅為度出膿血潰爛者亦宜甚者內服乳

香定痛散隨以熱酒盡量而飲虛者潰後宜大補氣血脾

胃兼吞紫河車丹最易平復外貼黃蠟膏馬齒膏

凡杖瘡忽乾毒攻腹內恍惚煩悶嘔吐者難治

○足膝部

鶴膝風 人面瘡 腎臟風瘡 腫瘡
脚跟瘡 附脚肚瘡 及袴口瘡 脚發

嵌甲瘡 脚指丫瘡
脚背發

鶴膝風如鶴之膝三陰虧損風邪入

足三陰虧損風邪乘之以致內熱減食肌

瘦肢體癢痛久則膝愈大而腿愈細有如鶴之膝然初起

宜用葱熨法以內消之寒熱者五積交加散加烏藥姜熨

已潰者留活寄生湯大防風湯亦有虛火陰血枯所以痢後多此疾陽虛熱來

復去者無根虛火也十全大補湯大防風湯膈腹疼痛瀉

瀉頭暈吐痰者八味丸發熱大渴面赤脉大血虛甚也古

歸芪湯陰虛形瘦發熱者胃氣丸挾濕熱者蒼龜丸

炒蒼柏散食少面黃者六君子湯津乾中氣不足者補中

益氣湯加五味子腰背肌肉不生者八物湯婦人月經

不調發熱口渴兩膝腫痛者腎氣丸蒼龜丸道邊散加牛

膝梓仲入面相傳積業窈貝母一施淡便出瘡象入面眼

黃柏膝上亦有臂患之者據方書昔云窈業所至須清心悔過

內服十木味流氣散又著大苦參丸腎氣丸外用貝母為

未敷之乃聚眉閉口仍用生肌斂口而愈

腎臟風瘡有如癬初起脛上遍身攻此非膿瘡亦非外腎

燥或思色精不出而內敗初起兩足時熱脚跟作痛多於

內脛或膿上痒極抓破成瘡久則能漸延開失治延及腿

服遍身 外症瘡痒滴膿水內症潮汗痰倦如 內症哺熱盜汗 者有之 汗口燥咽乾

吐痰體瘦腰脚倦怠治以腎氣丸為主佐以四生散若脾 胃虛者補中益氣湯為主佐以腎氣丸四生散又有遍身

生瘡膿水淋漓兩腿尤甚體倦作痒經年不愈乃腎虛一 火也八味丸主之 外治謝傳傷手瘡方白膠香散

臃腫 腫痛濕熱甚 生兩臃上初起焮腫作痛寒熱者屬外 邪濕熱積蘇散敗毒散主之毒盛發寒

熱者活 慢腫寒熱陰分 慢腫作痛或不腫不痛屬三陰 命發 虛也或發寒熱俱宜八物湯十

全大補湯脾虛挾表邪者補中益氣湯加桔梗白芷脾虛 濕熱流膿口乾少食者補中益氣湯加茯苓芍藥神熱加

炒黑黃柏熟地按恣氣加山施川芎有鬱者歸脾湯加山 施柴胡若患慶黑黧肢體惡寒飲食少思者屬肝腎虛敗

宜八味丸內熱口乾者腎氣丸久不愈 外足三陽需外治 者大苦參丸腎臟虛風四生散黃芪丸

內足三陰更難醫 外治外腫瘡因風濕者洗以葱湯次用 龍骨膏貼之風熱者馬齒膏濕熱者蜜

土膏因血氣凝滯者小駐車丸加乳香少許糝之○內腫
瘡初起洗以鹽湯次以蠟礬紙貼之重者桐油膏痒甚時
斷其膏久不愈者內外通用癰疽膏點去瘰肉後非黃
蠟膏然內必量體服藥若誤用攻伐傷胃者亦能殺之

腳跟瘡乃督腎部內因虧損足三陰

腳跟乃督麻發源腎
經過脉內因飲食起

居虧損足三陰所致或初必脚軟并跟痛一味滋補免侵
外被天兔所咬而成

事慢腫食少者補中益氣湯補熱頭昏者逍遙散腎氣丸
咳嗽吐痰者十全大補湯八味丸久不斂口滴蓋氣血

而死○脚肚上生瘡初如粟漸大抓搔不已成片包脚相
交黃水流出生不可忍久成痼疾難愈先用貫衆煎湯洗

洗後用百藥煎為末津唾調逐旋塗敷自外而入○袴口
瘡生於脚脛或因物打撲而成其瘡口狹皮內極潤皮薄

如竹膜極痒痛終日黃水流延蔓而生甚者數十年不愈
又易於染人患者須忌房室則易愈用韭菜地乾地龍屎

為末入輕粉清油或白犬
血調敷內外腫瘡亦治

脚發足心或縫間三陽易治三陰難生足掌或足指縫間

足三陽濕熱下注易治微赤微腫膿清者屬足三陰屬損難治若黑黯不腫痛不潰膿煩熱赤濁小便淋瀝者陰敗

未傳惡症不治湧泉發熱乃其兆灸發滋降可保安注者先用隔蒜灸及法命飲以解蘊毒次服補中益氣湯腎氣丸以補

精氣三陰虛者初起托裏消毒散或托裏散加牛膝檀香杜仲或托裏消毒散續後天防風湯十全大補湯八味丸

陰虛足心熱者四物湯加知母黃柏脾虧者補中益氣湯若事治又有**軟甲**不能行**五指濕爛**如湯發

入四邊腫焮黃水流注浸淫相染五指濕爛漸漸引上脚

跌疽漿四起如湯發火燒日夜倍增不能行動以陳皮濃煎湯浸良久甲肉自相離開輕手剪去肉中甲外用蛇

退一條燒灰雄黃四錢為末乾糝乾者香油調敷與甲疽條悉治○脚指丫瘡濕爛及足指角急為甲所入肉便刺

作瘡濕爛用枯礬三錢黃丹五分為末糝之或鷓鴣掌黃皮

燒灰糝之。又方用細茶嚼爛敷之。因暑手抵兩脚爛瘡亦宜能解熱燥故也。○指縫痒成瘡血出不止用多年糞桶糞燒灰敷之。○脚上及指縫中沙瘡用燕窠泥畧炒黃相二味為末香油調敷痛者加乳香。

脚背發必兼消渴輕者赤痛猶可活重潰色黑名脫疽甚

重筋骨寧斬割 脚背發又多脫疽疔以其能潰脫也亦有患於手背及手指者原因膏深房室損傷

脾腎或先渴而後發或先發而後渴輕者色赤作痛自潰可治先用隔蒜灸內服活命飲或敗毒散加金銀花白芷

大黃痛止乃與托裏散或內托下疳散去桂加天花粉金銀花挾氣者十六味流氣飲下虛者十全大補湯八味丸

大苦參丸。○重者色黯不痛先用隔蒜灸桑枝灸更服補藥固肉則惡肉不致上侵庶可保生又有肉修手足口咬

等傷或外塗生肌藥內服尅代兼犯房室患處不潰不痛色黯上延亦多致殞重者須用利刀解去其筋則筋骨

出而毒得泄又甚在指則斬去其指在肉則割去其肉外

用桐油及無名異煎下沸入花椒下看瘡大小剪藥

藥在內同煎浸一七後
單以此藥貼瘡上即安

○遍身部

五疥

五癩

血風瘡

癩風

楊梅瘡

多骨疽

翻花瘡

流注

瘰

疔瘡

暑熱瘡

疔瘡

寒冷瘡

凍瘡

手足皸

蝟瘡

癩瘡

侵淫瘡

白蛇纏

湯火瘡

肥瘡

疔瘡

漆瘡

竹木刺

折傷

破傷風

五疥

乾濕虫砂膿

五疥由五臟蘊毒而發屬足三陰者尤多

便秘為實利虛風

瘡有遍體難分經絡必憑外症以斷虛實癰腫作痛便秘

硬發熱者為風毒濕熱慢腫痒痛噴熱或時寒熱體倦少

食便順利者

乾疥瘡痒肺燥甚

乾疥瘡痒痒皮枯屑起便秘者為心肝火鬱於肺四順

為血虛風熱

清涼飲古荆黃湯搜風順氣丸

古荆黃湯搜風順氣丸又若天門冬膏便秘者為

相火鬱於肺活血潤燥生津飲或四物湯加黃芩連翹天

門冬丸若腎氣丸久虛古身荆丸如

素

濕毒譽腫脾胃攻疥

有肺風面止多粉刺者槿皮散

覺腫作痛久則水流如黑豆汁便秘者為脾鬱濕熱毒防

風通聖散俱酒蒸或炒大黃另用酒煨炒三次加木鱉子

或升麻葛根湯加天麻蟬退氣滯復元通氣散濕勝者除

濕丹便利者為脾虛熱補中益氣湯量加芩連清熱苦

正燥濕胃火作渴者竹葉黃芪湯脾鬱盜汗不寢者歸脾

湯瀉瀉腹脹者胃苓湯加黃連久者二炒蒼朮丸濕勝單

蒼朮青脾肺風砂細作疼心血滯砂芥如砂子細箇或痛

毒者何首烏散或疥搨之有水撒赤乃

心血凝滯便秘者當歸丸或赤暈散合四物湯久者酒蒸

黃連丸胃煩多痰者牛黃清心丸心煩口乾小便不利者

連翹飲便利者活血

四物湯久者當歸飲玉瘡如癰肝火衝為黃蘗也玉疥痒

不知痛延曼易於傳染便秘者肝風熱甚蘆薈丸或敗毒

散磨羚羊角汁刺之久者古昔每丸便利者肝經火鬱道

遙散磨羚羊角汁刺之久不愈者胡麻

散但諸瘡久則生虫須兼外治敷洗膿窠焮痛脾壅熱

痛慢虛火腎不充

含漿稠膿色厚焮痛便秘者為濕熱五

香連越湯升麻和氣飲或竹葉石羔湯

合四物湯合漿膿清色淡不痛便利者為腎虛火入更分
味逍遙散或八物湯加知母黃柏或四生散散腎氣丸

上下與肥瘦上體多兼風熱下體多兼風濕肥人多風濕瘦人多血熱瘦弱虛損腎枯火炎燥有便秘

發熱作渴等症只宜滋陰降火畧加秦艽蒼耳連翹之類

決不可純用風藥涼血傷胃因皮膚之疾而襲臟腑若有

之通用連歸湯氣虛四君子湯血虛開鬱退熱殺其五毒

合四物湯風合消毒飲烈合平胃散殺其五毒

鬱須辛溫吳萸白芷之類退肌熱須苦寒芩連大黃之類
殺其五須水銀之類此丹溪外治三法也乾芥吳茱萸散或
黃連大黃為末猪膽汁調搽濕疥下上散砂芥草散或
芥硫黃餅膿窠三黃散通用摩風膏洗藥用荆芥黃柏苦
參等分煎湯加蛇床子川椒腫加葱白

五癬濕頑風馬牛總皆血熱肺邪留疥癬皆血粉熱燥以

淺者為疥深流者為癬疥多按熱癬多按濕疥發于足遍
身癬則肌肉應疹或圓或斜或如苔毒走散風癬即乾癬

搔之則有白屑濕癬如虫行搔之則有汁出頑癬全然不
知痛痒牛癬如牛頸皮厚且堅馬癬微痒白無相連又曰
癬清熱殺虫祛風濕又則補腎自然收 諸風濕虫癬與疥
瘡大同初起有豆

下者打膿散去黃連金銀花穿山甲芒硝加赤芍白芍水
酒各半煎臨熟入大黃露一宿五更服有可汗者四物湯
加荆芥蘇黃各五錢淨萍一兩葱豉煎服取汗一切癩癬
皆效經久不敢汗下者只用防風通聖散去硝黃加淨萍

皂刺水煎服久年不愈體盛者兼吞頑癬丸或古龍犀丹
用何首烏白芷蘇木等分入猪油及鹽少許浸酒送下體
虛者不可妄用風藥氣虛者何首烏散消風散血燥者四
聖不老丹或腎氣丸久服自効有虫者俱宜間服

○外治乾癬用狼毒草烏各二錢半瑤龜七枚生為末津
唾調搽○濕癬用枯礬黃連各五錢胡粉黃丹水銀各二
錢為末用猪脂油二兩夾研令水銀星散盡被罐收貯
之○牛癬用舊皮鞋底燒存性入輕粉少許為末麻油調

敷○馬疥癬用馬鞭草不犯鐵器搗自然汁半盞飲盡十
日即愈○通用麻油二兩入巴豆草麻子各十四粒瑤龜

七粒熬煎三味枯黑去查却八白蠟五錢蘆薈末三錢攪
勻磁罐收貯括破塗之或用川槿皮浙剪草木鬣子等分
為末醋調敷○洗藥用蘇
蘇樟腦蒼耳浮萍煎湯

血風血燥風熱鬱初發疥癩或如丹癢痒扒破痛有水毒

投風藥血益慳血風瘡乃三陰經風熱鬱火血燥所致癢
痒不常抓破成瘡膿水淋漓內症瞞熱盜

汗惡寒少食體倦所以不敢妄用風藥大藥肝風血燥寒
熱作痛者當歸飲加柴胡山梔痛痒寒熱者小柴胡湯加

山梔黃連夜熱譫語者小柴胡湯加生地肝脾鬱火食少
寒熱者八味消痰散脾虛瞞熱盜汗不寐者歸脾湯加山

梔熟地腎虛有熱作渴咳痰者腎氣丸通用通身者四物
湯加浮萍黃芩等分甚者紫雲風丸換骨丸三蛇骨兩足

痛痒者當歸拈痛湯如因飲酒後遍身痒如風瘡抓至出
血又痛者用蟬退薄荷等分為末每二錢水酒調服凡身

發痒者通用○外治
麝鼠骨大馬齒膏

麝鼠骨大馬齒膏

癩風審因分上下

癩即內經厲風受天地間肅殺風氣酷烈暴悍最為可畏一因風毒或汗出解

衣入水或酒後當風二因濕毒或坐卧濕地或月雨露三

因傳染然未必皆由外也內傷飲食熱毒過甚太寒太熱

房勞穢汚以致火動血熱更加外感風寒冷濕而發初起

身上虛痒或起白屑紫雲如癩風然或發此紫疱疥瘡流膿

上先見者氣分受病上體必多下先見者血分受病下體

必多上下俱見者氣血俱病從上而下者為順風從下而

上者為逆風但從上從下以漸來者可治頓發者難愈治

失其法以致皮死麻木不仁脉死血潰成膿肉死割切不

痛筋死手足緩縱骨死鼻梁崩塌與夫眉落眼昏唇翻聲

噎甚則蝕傷眼自腐爛玉莖擊拳肢體病至於此天刑難

離總是陽明血熱化熱甚痰癆腐為虫追虫取涎藥必伯

胃與大腸無物不受脾主肌肉肺主皮毛然瘡疥雖見於
皮肉而熱毒必歸於腸胃故法必先治陽明初起宜防風
通聖散在上用麻黃以去外毒在下用硝黃以去內毒上
下俱見者用正料防風通聖散以解表攻裏三五日後即

服解仙散以吐惡涎服後又服防風通聖散去硝黃麻黃
多服久服待胃氣稍定用再造散以下其蟲又有宜先下
虫而後吐涎者吐下後仍以防風通聖散量加
參芪熟地以固氣血或脾胃弱者白朮當倍用
兵已蝕臟

壞五形清肝涼血火瀉瀉外瘡涎蔓內虫攻注蝕肝眉脫
蝕心足底穿蝕脾聲啞蝕肺鼻崩蝕腎斗鳴如雷宜先服

瀉青丸以瀉肝火次隨症救治虛痒者四物湯加酒李調
浮萍末痒甚加荆芥蟬退搔痒皮皴白屑者白芷蛇九眉

落髮者三蛇丹或柏葉煎眉脫鼻崩者換肌散補氣瀉榮
湯蝕眼者薑薈丸肢節廢者蠲痺散通用凌膏花散胡椒

散加味苦參丸大楓丸換骨丸大蘇風丸紫雲風丸活神
丹腎氣丸四聖不老丹八物湯外治麻風膏浴癩方髮落

不生者先用生姜擦三次後用半夏為末麻油調搽更與
四卷末髮頭
髮條參看

楊梅瘡因風濕熱或傷氣分或傷血
楊梅瘡因治癩癩大
同多由肝腎脾內風

濕熱之毒間有天行濕毒傳染但各俗呼各不一有呼楊梅為天疱者有呼楊梅為大麻風者以理推之形如楊梅嫩紅濕爛痒痛屬心多生乳脇形如鼓釘黃豆者屬脾多生滿面謂之大風痘形如絲花屬肺多生毛髮形如茶葡萄按之緊痛者屬肝腎多叢生豚鬚及筋骨之處形如魚泡內多白水按之不緊者謂之天泡瘡此類之輕者如發於鬢額口鼻穀道邊者屬陽明及少陽太陽如發於足脛陰莖脇肋者屬肝腎及太陰太抵上先見者氣分受病上體必多下先見者血分受病下體必多上下俱見者氣血俱病

初宜疎瀉又補虛免成

癰癤與漏缺

初起即服防風通聖散一貼去麻黃用確黃以去內毒待胃氣稍定再一貼去確黃用

麻黃發汗以去外毒

以後用加減通聖散九多服此方內

通臟腑外發經絡為首尾要藥輕者服此一劑更加搽洗

足矣重者十貼後宜服化毒散二日却用改藥三日瘡乾

痂欲脫落丹服化毒散二日後量用防風通聖散加減上

體多者兼服敗毒散加荆防鈞藤下體多者兼服龍濟膏

肝湯從鼻準腫起遍身生瘡面上尤多者梓皮散便燥者

搜風順氣丸以此調理斷根。失治久則風毒深入經絡，挾濕而成頑癩，或氣血虛敗而成漏，或誤服輕粉水銀及不遵禁戒而成風堆腫爛流膿出汁，謂之癰病。至於此亦，有蝕傷眼鼻腐爛玉莖拳拳肢體與癩無異，治宜消毒兼以補虛。○消毒頑癩者，皂根丸、筋骨痛者，皂刺丸、換骨丸、成漏者，象牙丸、腫塊者，仙遺糧丸、通用加味，苦參丸、大楓丸、洗若丸、單苦參酒。○消毒補虛，仙遺糧湯加鈞藤，或補氣瀉營湯、胡麻散。○補虛氣虛者，單人參湯、補中益氣湯、血虛者，四物湯、加山拖鈞藤、金銀花、草節，或腎氣丸、四聖不若丹、氣血俱虛者，八物湯、八味丸、單仙遺糧丸。○外貼大之膏、白蠟膏。

疥瘡全是飲食毒發因灾畜暴疹傷

經曰膏粱之變足生大疥，恣食辛辣厚味

灸燔腥葷及誤食自死禽獸，蘊毒於中而即發者有之，或卒遇大風木霧大暑木寒天地暴疹之氣襲注經絡，觸動其毒而發者，或因感死畜蛇虫毒氣而發者，其死尤速，初發或因衣物觸着而疼痛忽生，或因發疹抓破而成疱，僅

一、小瘡殺入一二日，生於四肢及頭面。疔發無定處，或有間比之癰疽，尤毒。背腰尤緩，在頭面

耳鼻口目舌根唇上及手足骨節間者，最急如生，兩足多有紅絲至臍，生兩手多有紅絲至心，生唇面口內多有紅

絲入喉者，俱難治，須急看以針挑撥，其絲出血以泄其毒氣，方可保生。頂硬根突近寸長，變

黑腫爛透深孔，形色不一，極痛痒。瘡頭黑硬如釘，四畔赤如火盤，根突起寸餘

隨變焦黑，未幾腫大而光，轉為濕爛深孔透肌，如大針穿之狀，其形初起大小不一，或如水泡，如吳黃如豆如石榴

子，其色有五，內經分應五臟，各有所屬部位，局方別二十三種：一、麻子疔狀如黍米稍黑，忌麻仁麻衣；二、石疔如黑

豆甚硬，忌瓦礫磚石；三、雄疔四畔仰痘，發起色黃大如錢孔，四雌疔四面痘，發起心凹，色稍黃如錢孔，俱忌房室五

火疔狀如湯火燒，四畔有煙焰，忌火燒烙；六、爛疔色稍黑膿水流出，忌沸湯熱食爛物；七、二十六疔狀如黑豆，今日

生一明白生二，及滿三十六數，即死，忌噴嚏，入蛇眼疔狀如蛇眼，忌惡眼人及嫉妬人見，九、葷膚疔狀大如匙，面色

赤中有黑粒忌食鹽十水洗疥狀大如錢頭白裏黑汁出
 中硬忌飲漿水水洗渡河十一刀鑷疥狀如薤葉大長一
 寸肉黑如燒烙忌刺及刀鑷切割十二浮漚疥其狀曲圓
 少許不合大如薤葉內黃外黑黑處刺之不痛黃處刺之
 痛十三牛狗疥色赤疱起搯不破已止皆宜依法將護若
 或觸化則脊強瘡痛不可忍惟浮漚牛狗無忌不治自愈
 ①又有一種魚臍疔瘡頭黑深形如魚臍破之黃水滲出
 四畔浮漿其毒尤甚用絲瓜葉連鬚葱韭葉搗爛以酒和
 服其渣貼腋下如病在左手貼左腋下在左足貼左膝下
 右手足同在中貼心臍並用布縛住候肉下紅絲處皆白
 則安有潮熱者亦宜却令人抱住恐其顛倒則難治或
 用乾退燒灰鷄子清調敷①一種水疔瘡用黃荊葉十四
 片獨頭蒜二三箇百草霜
 二錢搗酒服取汗大効或不痛痒只麻木寒熱眼中流火
 光牙關急緊時驚惕甚則嘔吐毒陷腸吐最危治分虛
 實豁心火實者初服賽命丹二十九以葱酒發汗表症多者
 追并湯或敗毒散加蟬退姜蠶金銀花裏症多

者活命飲五聖湯便利溺澀者黃連消毒散此散初起服
 之內消欲作膿者托裏消毒散○虛者初服保生錠子以
 解毒或蟾肝丸有表邪不敢汗者補中益氣湯加防風白
 芷裏症不敢下者蜂蟻散腫痛欲作膿者托裏散內托十
 宣散不能潰者大料參芪歸木補之或補中益氣湯合生
 脈散以防毒陷○豁心氣者疔毒入心則神昏口乾煩悶
 恍惚似醉嘔吐不定危症也實者用萬病解毒丹以黃連
 當歸煎湯化下虛者用古昔歸湯加茯苓茯神遠志蓮肉
 清之毒上攻心嘔者護心散有因服賽命丹吐者亦宜此
 解之恍惚悶亂坐臥不寧煩渴身痛便秘者漏蘆飲子煩
 躁作渴者竹葉黃芪湯○外治輕者單蟾酥為末以百粒
 和黃冊搜作丸如麥米大用針挑破疔頭以一粒納入効
 重者賽命丹危篤者提疔錠子**暴死灸法可回陽**凡暴死者多是疔毒急
 宜急灸之并服賽命丹亦有復醒者如偏僻之處
 藥難道蓮惟灸有回生之功若專疎利表散者危

多骨疽由瘡久潰氣血不能營患處久則腐爛骨脫出只

補脾胃壯元氣

或全大補湯腎氣丸主之外以附子饒灸

瘡自斂若腎氣虧損其骨漸腫在背歲月潰膿出骨亦當用葱熨法若投以芫代則真氣益虛邪氣益甚雖不有誤

有上膈腫硬年餘方潰半載未愈內熱體倦作渴用補中益氣湯腎氣丸元氣漸復出骨一塊仍服前藥而愈有

足背腫落一骨者有下
手背腫落一骨者

翻花瘡因瘡將斂

元氣虛弱肝

翻出一肉突如菌

大小長短不一

或如蛇形長數寸者用雄黃末敷之

內服補養脾胃藥

十全大補湯或八物湯倍參芪歸木出血

乃肝不能藏脾不能約也補中益氣湯加五味子麥門冬或腎氣丸有怒火者八味逍遙散若用風藥速其亡也汗

多必然發瘡危甚哉

外塗藜蘆膏要方

藜蘆一味為末猪油調塗週日一易須候元氣漸復膿毒

瘡盡時塗之則瘡肉自入不然雖入復出若誤用針刀蝕灸其勢益甚或出血如注寒熱嘔吐等症急補脾胃為善

流注腫塊非等閑內傷外感濕痰干跌撲閃挫并產後氣

流血注四肢關流者行也注者住也或結塊或慢腫皆因素有痰火或外感風寒邪氣流行至其痰

注之處而發或內傷鬱怒以致痰火驟發或內傷房室陰

虛陽氣湊襲逆於肉理而成或內傷勞役飲食搏動而發

或跌撲閃挫一時氣逆血凝而成或產後惡露未盡復被

感傷凝注多生四肢或胃腹腰脊關節之處初起宜葱熨

法實者十味流氣飲敗毒散痰痛便秘者古半硝丸服

者二陳四物湯托裏益氣湯不換金正氣散六君子湯加

芍歸補中益氣湯加木香枳殼選用令其自瀉自消若潰

久不斂者縱有表邪只托裏為主十全大補湯人參養榮

湯補中益氣湯托裏抑青湯托裏益氣湯八味丸更佐以

豆豉餅琥珀膏祛散寒邪補接陽氣膿成以火針破之內

有膿管以藥線腐之若過用寒涼者不治

瘰癧大如梅小如粟多生手指及臂足色變不常深入肌串

筋見骨痛至極瘰癧一名蛇瘡烟瘡地面多有之先作點

豆劇者如梅如李發無定處或臂或腎或口齒或吐膈多

見手足指間赤黑青白色變不常根深入肌走臂逆腫毒

血流注貫串筋脉爛肉見骨出血極多令人串痛狂言痛入於心即死突出於外腎者亦死惡風積毒

血熱成煩燥噁悶入心腹原因感受惡風入於脉理或烟瘡地面傷寒瘡後及感觸蛇毒

所致二十已後四十以前者皆積傷之毒入胃壅聚而成

四十已後六十以前乃血閉不行壅熱積血得之治宜宣

毒行血用瓜蒌根酒煎入乳香沒藥五靈脂皂刺等分以

下其毒次用清心行血之劑如係蛇毒赤足蜈蚣最效雄

黃白芷次之或蠟塔丸冷酒入麝香送下外用荆芥白芷

川椒葱白煎湯入鹽俟湯溫自手臂上盪下日三二次瘰癧

毒氣走腫所至處宜緊繫之自手發者毒走至心自足發

者毒走至腎不救各有小紅筋尋其筋之住處灸三炷即

瘰癧云在指則截在肉則割恐毒氣入心入腹令人煩燥

極慮引風凡癰疽開一寸則一寸引風非必風入於其中
風邪襲風則肉爛透骨惡血橫流宜南星半夏白芷稍最
能去風可以頻敷其諸瘡
理推廣癰疽未度行之

痼發手足或掌心或腰或臀毒何深無頭無面愈又發色

帶淡紅防瀉慢 凡瘡氣血相搏有頭有面風邪內作無頭
無面痼無頭面黧裏開瘡低貼肌肉走注

牽連生於手足或掌心或腰腿或臀下伸縮之處初起渾
身壯熱手足不遂增寒頭痛虛渴多汗嘔逆四肢沉重較

之諸發煩渴為甚或腫毒已平數月後復於他處大發但
作肉色微帶淡紅終不能救大要培養內氣以防滑瀉治

與癰疽類推外用神應膏貼
之如瘡出米泔汁者必死

小小諸瘡風毒滯 諸般小瘡皆因心腎不交飲食不節腸
胃停留以致風熱寒濕之毒與氣血相

搏凝滯肌肉之間而發露也
暑癘凍裂手足 夏暑心神鬱燥熱逼汗
漬成瘡遍身或出膿血

皸 夏暑心神鬱燥熱逼汗
漬成瘡遍身或出膿血

赤爛如^火用^{南星}半^夏黃^連黃^柏各^一錢^五倍^子黃^丹各^五分^爲末^乾參^如痒^加枯^礬雄^黃常^服黃^連阿^膠丸^以漬^心○熱^汗浸^漬成^瘡痒^痛不^止用^黃芪^當歸^防風^荆芥^穗
 地^骨皮^木通^各二^錢白^礬一^兩爲^末每^藥一^兩水^二三^碗
 煎^五六^沸漚^去查^飛熟^淋洗^患處^乾避^風少^時立^効輕^者
 者^只用^麟雪^水和^蛤粉^敷之○疔^瘡因^汗出^見濕^而生^者
 輕^者狀^如撒^粟用^青蒿^煎湯^洗之^或棗^葉亦^好重^者熱^汗
 浸^漬即^成瘡^用菘^豆滑^石各^五錢^爲末^醃撲^之摩^破
 成^瘡加^黃柏^棗葉^各五^錢片^腦少^許○冬^月下^虛身^觸寒^冷
 血^溢生^瘡頑^滯不^知痛^痒內^服升^麻和^氣飲^去木^黃外^用
 木^香檳^榔硫^黃吳^萸姜^黃麝^香爲^末麻^油調^搽○凍^瘡
 先^痒後^痛然^後腫^破出^血黃^水不^止用^雄雉^雞腦^一枚^搗
 爛^黃蠟^各等^分清^油裁^半同^於慢^火上^熬成^膏去^查塗^之
 久^不愈^者亦^効又^方用^半附^子爲^末麝^香調^塗之○手^足折^裂
 作^痛用^清油^五錢^慢火^煎沸^入黃^蠟一^塊再^煎溶^入水^粉
 五^倍末^各少^許熬^紫色^爲度^先以^熱水^泡手^足火^上烘^乾
 後^用藥^敷以^紙貼^之其^痛立^止入^水亦^不落^或桐^油膏^塗
 之^亦好○手^足皸^{先用}百^沸湯^泡洗^皮軟^拭乾^然後^用

瀝清二兩黃蠟一兩共熬勻敷之或用五倍子為末牛骨
髓調磁罐收貯埋地中七日取出填鞍中即愈或黃蠟膏

好補塞

蝮瘰侵淫

白蛇纏

蝮瘰生手足間相對如新菜
黃痔痛折裂搔則黃汁淋漓

有孔如蝮久而生虫用杏仁乳香各三錢硫黃輕粉各一
錢半為末用麻油三錢入黃蠟五錢溶化入前未煎攪成

膏去火毒磁器收用又方用燕窠取孢子處土為末乾糝

先用白芷太腹皮煎湯洗淨然後敷藥○走皮癩瘡生滿

頰項發如豆梅拜而多許延蔓兩耳內外濕爛如侵淫瘡

之狀先用桑寄生桑根皮各一握白芷黃連各少許煎湯

以熟蕪洗候惡血出盡拭乾次用皂莢麻竹箬俱燒存性

黃柏黃連樟葉白芷各等分為末麻油調搽神效忌醋○

手癩瘡用皂角粉輕粉黃柏黃連為末敷之○小兒胎

癩頭生紅餅瘡先用生艾白芷太腹皮葱白煎湯洗淨拭

乾次用生藍葉生艾葉入蜜搗膏敷之亦治惡瘡○侵淫

瘡初生甚小先痒後痛汁出侵淫濕爛肌肉延至遍身若

從口發出流膿四肢者輕從四肢發生然後入口者重用
苦練根晒乾燒存性為末猪脂調敷濕則草蓼先用苦參

大腹皮煎湯洗之。○白蛇纏瘡有頭尾儼似蛇形初起宜
隔蒜於七寸上灸之仍用雄黃為末醋調敷之仍以酒調
服之或萬病解毒丹
蠟藥在外塗內服

湯火肥疔漆刺身

湯泡火燒瘡初時
宜強忍痛急向火

灸慎勿以冷物慰之使熱不能出爛入筋骨後用寒水石
七兩黃柏黃連黃芩山柃木黃赤石脂各一兩其若加水
片少許為末酒調或鴨子清調敷或陣止痛丹亦好。○小兒
肥瘡用松香為末以紙捲成條香油浸燃之滴油搽或用
猪爪燒灰麻油調搽。○疔瘡如魚鱗疔十日瘡一様多生
手足又名梅氣瘡宜艾灸初起者則餘者皆落神效。○漆
瘡因見生漆中毒面痒而腫遠眼微赤痒處搗之隨是瘡
癩重者遍身如豆如杏膿嫩作痛用生蠟取黃隨瘡大小
遍敷之或臘茶為末麻油調搽或柳葉冬用皮煎湯洗之
○竹木刺入肉不出單糯米膏貼之或頭垢或蟻蟻虫搗
爛敷之効或象
牙為末搽之

折傷先問出血否

折傷有損身體或墜跌打撲倒壓悶到
氣血鬱逆而皮不破或金刃傷皮出血

外損筋骨者可治內損臟腑未出攻之出則守未出血者

裏膜及破陰乎耳後者不治

瘀黃連降火白木和中三味用童便入酒煎服在上者宜

韭汁和粥喫在下者可下血冷則凝不可飲冷水引血入

心即死消痰鷄鳴散花蓋石鼓順氣木香勻氣散加童便

紅麴或紅酒已出血者急用陣王丹止血先服補托藥而

後消瘀虛甚者亦不攻下血虛者四物湯加穿山甲氣虛

者用蘇木參芪當歸陳皮甘草服半月脉散漸收方取以

煎藥調下自然銷末一味空心服之如骨不碎折者忌用

素虛損甚者紫河車丹去麝香但損傷妙在補氣血或被

寒冷者先服腰膝痛增熱寒折傷專主血論赤如六淫七

宜起寒腹脹痛增熱寒情有在氣在血之分然肝主

血不問何經所傷惡血必漏於肝流於腦鬱於腹而作脹

痛或增寒熱實者下之虛者當歸續命散復元活血湯調之

或十全大補湯加香附最嫌嘔吐血出口凡損傷瘡口忽

陳皮貝母等分水煎服乾毒攻腹內燥

惚煩悶嘔吐及已出血多而又嘔血不止者難治初起嘔

吐者用平胃散為末內服外用姜汁調敷破傷風浮腫者

亦宜初起吐血用藕汁煎湯調古烏附湯或古蚌霜散如
惡血入腸胃下血濁如瘀血者用百草霜為末酒調服如
傷外腎小便出血貼敷定痛脉頰和如命門脉和緩關脉
不通者再發散實者縱傷重不死命
門虛促而脫者雖傷淺難治凡血未出者脉宜洪大已出
血者脉忌洪大此折傷脉要也敷藥單糯米膏小麴散定
痛乳香定痛散來骨法折傷後為接骨何人是效手接骨
四氣所侵手足疼痛者應痛丸須經
絡穴法骨髓明透而又有傳授故古
以危氏為善接骨紫金丹接骨丹

破傷似症中風有四因四因百病皆然不因氣動者二卒暴

行有因氣動者二瘡口不合貼膏留孔風襲或熱鬱遍身
白痴瘡口閉塞氣難通泄傳播經絡燒煉真氣是以寒熱
間作甚則發瘡口噤禁角弓反張須臾欲死用蝎粉餅或
三生飲加天麻為末每十錢用黑豆淋酒調服化痰開關
風盛者下烏丸風痰俱盛者古星風散風痰虛者烏蛇散
血凝心神昏悶有單鷲翎燒灰存性為末酒調服十錢服

佐 佐

後飲酒一二盞以助藥勢如血多痛甚者如聖散手足戰
掉者硃砂指甲散麝香酒如頭自青黑額汗不流眼小目

瞪身汗如油治同傷寒表裏法風熱燥甚佛鬱在表善伸
者四逆不治治同傷寒表裏法數欠筋脉拘急或時惡寒

或筋惕搐搦宜辛熱治風佐以辛寒如傷寒麻桂加黃芩
石羔知母是也若表不已軌傳入裏在肌肉者宜退風熱

開結滯辛寒之藥或佐以辛熱調之猶傷寒半表裏而用
小柴胡也若裏熱已甚而舌強口噤項背反張驚搐惕搦

涎唾稠粘胸腹滿塞便秘結或時汗出宜桂風散結寒
藥下之後復以清熱開結之藥調之又云破傷風同傷寒

壞症治看注何經太陽宜汗少陽和表症古防風湯去耳
而用本經藥祛之草加小芎獨活等分

水煎服或調蜈蚣散或九味羌活湯少用細辛加歸芍等
分水煎服便秘加大黃緩緩通之或用古龍虎丹發汗亦

效半表裏陽明下之工中甲若服表藥過多臟腑和而
症甚麻湯自汗者白朮防風湯大汗

不止搐搦者升麻葛根湯加白朮黃芩如臟腑閉小便赤
自汗者先用小芎黃湯二三服後用大芎黃湯速下之或

自汗者先用小芎黃湯二三服後用大芎黃湯速下之或

自汗者先用小芎黃湯二三服後用大芎黃湯速下之或

自汗者先用小芎黃湯二三服後用大芎黃湯速下之或

自汗者先用小芎黃湯二三服後用大芎黃湯速下之或

自汗者先用小芎黃湯二三服後用大芎黃湯速下之或

自汗者先用小芎黃湯二三服後用大芎黃湯速下之或

自汗者先用小芎黃湯二三服後用大芎黃湯速下之或

紅標九氣弱若

只用靈藥法

本是血疾易入陰

或始而出血過多或瘡口早合瘀血停滯俱是

血分受病血屬陰五臟所主始雖在表隨即入裏故多死

也宜養血當歸地黃湯活神丹托裏散內托十宣散以防

毒陷外用魚膠散或用鼻頭骨為末臘月猪脂調敷亦治

狗咬又有破傷水瀝口緊強直者用牡蠣為末敷之仍

以其草煎湯

調服一二錢病痊又恐氣亦乏任是風邪不可攻只宜大

補令淡治

或病已十分安痊而忽有口緊反張筋搐痿瘓似破傷風症又似瘧症其實乃氣血俱虛也凡

癰疽潰後膿血大泄陽隨陰散變症只宜大補氣血果係

風症亦不宜以風藥治之血虛者四物湯加參朮氣虛者

補中益氣湯去升柴陳皮加酒炒黑黃柏五味子麥門冬

肉桂大劑服之氣血俱虛汗多作渴寒熱者十全大補湯

加桂附麥門冬五味子鉅逆者

托裏溫中湯若劫換風藥者死

編註醫學入門外集卷之五

終

縣痒靜吾湯君

名建中贈刻

