



#1336609111  
v.7

編註醫學入門 三卷上

外感

溫暑

葉五運主病樞要 三一十八劑

傷寒

五 六經正病 土表裏陰陽汙吐下溫解

十六正傷寒

五 類傷寒

七八初症

七八雜症

五六變証

卒瘞症

卒危証

四死証

五六婦女傷寒

名樂志

李叔清

平陽清

平陽大面琴

平陽縣

傷寒序

欲識傷寒之義者先正傷寒之名。百間云冬曰傷寒春曰溫病夏曰熱病通而言之爲傷寒者何哉蓋邪之所湊其氣必虛冬月陽氣不密以致寒邪觸犯其卽發而爲病者名曰傷寒其不卽發至春感溫氣而發者名曰溫病至夏感熱氣而發者名曰熱病溫熱雖發於春夏而其受病之因隔冬寒毒藏於肌骨而自裏發之故通而言之爲傷寒也仲景傷寒立論萬世典也河淵溫暑補方三時用耳至於傳經直中分別陰陽雜症乃丹溪之獨見傷寒太義如

此然西北風高傷寒者多、東南地燠內傷者多。是以東垣  
又作內外傷論以辨之。傷寒之書至此可謂全且備矣。奈  
何今之醫者或讀傷寒一二而不理、會傷寒一二而不理。  
傷雜病一二而不理。會雜病內傷或竊內  
者專一溫補內外莫辨。殺人慣矣。陶節菴曰：「醫者不可一  
日不讀傷寒以活心源。愚謂讀傷寒而不讀三子之書亦  
不足以活心源。噫！三世四家之書缺一不可。」

萬曆丙子初夏

編註醫學入門外集卷之三

△病機○外感

溫暑  
傷寒

河潤劉先生溫暑纂要

諸風掉眩乃肝木

掉搖也、眩昏亂旋轉也、由風木旺甚生火風火屬陽陽主乎動兩動相搏爲之

旋轉、痛痒瘡瘍心火屬人近火氣者微熱則痒熱甚則痛附於火而爲瘡皆火之用也、痒者美疾也、故火旺於夏而萬物蕃美或云痛爲實痒爲虛非謂虛爲寒也正謂熱之微甚也痒得爬而能爬令皮膚辛

辣而屬金化辛能散故也瘡瘍屬熱而出濃水猶肉果熟極則腐潰而爲水反兼水之化也、濕腫滿本

脾土

經地之體也、土濕過極則痞塞腫滿物

濕亦然故長夏屬土則萬物隆盛也

金伏

謂賾滿也、鬱謂奔迫也、痿謂手足廢弱無力以運動也、大抵肺主氣病則其氣賾滿奔迫不能上升至

於手足痿弱，不能運動。由肺金本燥，燥之爲病血衰，不能  
榮養百骸，故指得血而能攝，足得血而能步。秋金旺，則霧  
氣蒙鬱，而草木萎落。病之象也。萎猶痿也。寒之收引腎水鄉，  
收斂引急寒之用故冬寒則拘筋矣。

### ○五運主病樞要目

諸暴強直支痛，裏急筋縮，腰戾。本足肝膽一經厥陰風木，  
之氣不柔而痛也。腰縮也。戾，乖戾也。謂筋縮裏急，乘戾失  
常而病也。然燥金勁切，木病反兼金化。由亢則害，承乃制也。  
况風能勝溫，而爲燥也。風病勢甚，而成筋緩者，燥之甚也。  
故甚者皆

兼於燥也

諸病喘嘔及吐酸，暴注下迫轉筋難，小便渾濁，血溢泄，癰

氣結核癟，疹斑，癰疽，吐下霍亂症，臍齶腫脹，鼻塞乾，覬劙

淋秘身發熱惡寒戰慄驚惑間笑悲譖妄齶汚腹脹跛  
之有聲和少陰君火手二經真心小腸氣之過喘火氣甚  
息粗也嘔胃膈熱甚火炎之象也吐酸木味爲酸如飲食  
熱則易於酸矣暴注卒瀉火性速故也下迫裏急後重也  
火燥能令下焦急迫也轉筋熱燥於筋而自轉也小便渙  
濁寒則水清熱則水濁溢血出於上竅泄血出於下竅瘤  
氣赤癟丹癰熱氣勝也結核熱氣鬱結癆有頭小瘡也疹  
浮小癰疹也癰淺而大疽深而惡吐下霍亂熱甚氣則傳  
化失常或下水穀不及變化臍胷膈憤悶或引背痛也鬱  
熱極則腠理鬱結而氣道不通也腫脹陽熱太甚則腫滿  
脹脹鼻塞寒主收斂故陽氣不通勦鼻出血  
淋熱客膀胱祕太便澁滯熱能耗液故也發熱惡寒邪在  
表也戰慄火熱過極反兼水則傷腎水衰故也驚心  
卒動而不寧惑皆惑而志不一笑火盛喜發悲火盛凌金  
金不受制故發悲譖多言也心熱神亂則言妄出妄狂妄  
也心熱神昏則目有所見齶汚鼻出紫黑血也腹脹鼓熱

甚則氣盛  
脹滿如鼓

痙與強直積飲滯霍亂中滿諸臟痞體重吐下附腫瘦肉  
如泥之按不起太陰濕土二足經脾與從中胃之氣也強  
直謂強項也太陽經中濕令人項強有剛柔之分積飲留  
飲也痞否也謂氣不升降也隔阻滯也腸胃溫甚則傳化  
失常中滿濕則令人中焦滿也吐下霍亂謂腸胃濕飲相  
兼故也體重清陽爲天濁陰爲地濕土爲病體重宜也附  
腫溫勝於下也肉如泥  
按之不走溫勝於身也

諸熱瞀瘓筋惕惕悸動搖擗瘛瘲極暴瘡冒昧躁擾狂罵  
口言驚駭氣上逆附腫疼酸噫嘔瘡喉痺耳鳴聾欲閉嘔漏  
溢食下不能目昧不明瞞瘻翳或禁慄之如喪神暴病暴

死暴注利少陽相火乎二經心胞絡與三焦氣

督神昏而氣濁也

熱令肌肉跳動暴瘡卒瘞也火盛炎也金不能發聲肩昧昏憒也躁擾火盛於外手足不寧也狂謂乖越禮法而失常也或登高棄衣熱極故也罵詈言之惡也心火熱極則發惡言也驚駭君火化同氣逆衝上火氣炎也肺腫熱勝於內也疼酸火盛制金不能平木運鼻中因痒而噴作聲人以紙燃擾鼻而嚏作擾動屬火鼻屬肺金故也喉痺熱客上焦耳鳴熱衝聽戶龍水襄火盛氣道閉塞嘔涌不下熱盛火炎之象目昧熱極則昏瞶肉跳也禁冷也慄戰慄也如喪神守火極而似永化也暴病死火性速也

諸澁枯涸閉乾勁揭皴起陽明之燥金肺與太腸氣

澁遍身澁通

不謂澤也枯不榮生也涸不通流也乾不滋潤也也勁不柔和也皴揭皮膚開裂皆血液病耳

上下水液出清冷癥瘕堅痞病腹滿急痛利白清食

已不饑吐利腥風伸不便與厥逆厥逆禁固太陽經腎與

膀胱爲寒水陰陽標本六氣裏

上下水出清冷寒賾水自澄清癥氣聚之積或聚或散無有常處也痕血結之塊蓋由女子月水沈滯久而成

痕也亦有熱者當以標本明之癩症足厥陰受寒則陰腫也堅痞腹滿急痛如冰寒則冰梗如地下利清白水寒則

清淨明白食已不飢胃寒則不能消穀吐利脾臟水甚不能制火肺金自盛故水腥也屈伸

不使厥逆禁固謂手足踰牽而冷

○一十八劑

輕調緩淡清暑濕解和平火奪寒井補耳

乃補仲景之遺亡也非不遵桂枝麻黃之謂也丁

說清平之世同水化也雖辛熱之藥不生他症擾

擾之世同火化也若用辛熱之藥則發黃出斑變

發汗不如辛溫辛溫又不若辛涼藥也

輕

防風通聖散

合益元散，名雙解散，在表當汗者俱

宜連進數服，必愈。不解者，病已傳變入

清

涼膈散

汗吐下後無異症者用，下早遂成結膿虛痞或合天水、小柴胡

解

小柴胡湯

半表半裏者，或合涼膈散緩大柴胡湯，裏微熱者用。

大柴胡湯

裏大熱者用，表裏太熱合大柴胡

寒

大承氣湯

裏大熱者用，表裏熱甚，表熱漸微者合解毒湯。

調

調胃承氣湯

裏熱無脹，裏熱者用。

火

黃連解毒湯

火

暑

天水益元散

傷寒，餘熱，以此調之。

火

黃連解毒湯

暑

白虎湯

中暑自汗者用，半表半裏者用，或加蒼朮發汗，熟石膏解肺，尚浮者用石膏之，或裏熱內盛陽厥極。

皆因失下而成此症，但進涼膈天水合而爲之。

一調合陰陽，洗滌臟腑，則其他症自不生矣。

淡

五苓散

中暑白虎解後，多服，或合天水。

火

三花神祐丸

劑 三黃丸

六味丸

補劑 防風當歸飲

平劑 四君子湯

七味

劑 荘四物湯

瀉胃風湯

溫劑 理中湯

和胃散

結膏 大小便膏湯丸

發涼膈散

加當歸、芍藥、陳皮、枳壳、桔梗

心煩不眠 桔梗湯

黃芩湯

調五味散

煩渴涼膈散

合去桂枝、五苓散

瘡承氣湯

合解毒、瀉語發

附土方十八小劑、二十四方、四十四味藥品調治。溫暑初一  
症雜症餘症及雜病痰火濕熱曲盡其妙。男婦俱同。

溫暑終

仲景張先生傷寒纂要

詳傷寒論

百問百病歌活人書法

人大全及全陶氏亦書王氏家寶

與名名家惟陸氏

傷寒未覩其書

嘗聞病皆起於傷寒治莫精於仲景一百一十三方如水  
有源不過汙吐下滲和解溫補總方以變化之也三百九十七法如衣有領過  
陰陽表裏虛實而已惜乎全書亡而後益支離記性拙而聊從簡省  
姑以六經言之

太陽則頭疼身熱脊強此太陽正病也以後凡言太陽病卽頭疼身熱脊強也凡言表症者  
亦卽太陽症也六經倣此陽從下起三陽之長曰太陽脉  
尺寸俱浮浮緊傷寒浮緩傷風太陽受病當一二日發以  
其脉上連風府故頭項背腰脊強頭者諸陽之會氣病則  
麻血病則痛身熱者寒客皮毛鬱閉其陽而後發熱陽雖

人身正氣鬱則爲邪爲熱。熱雖甚，不死。蓋傷寒始於寒，而終成於熱也。惟不發熱而但惡寒者，邪發於陰也。或熱多寒少，或不大使而泉清，頻數或熱結膀胱，溺澁或汗多濶難，或汗後不解，或汗漏不止，或過經不解，或蓄血發黃，或喘，或嘔，皆太陽所主。

**陽明則目痛鼻乾不眠**。陽爲明，夾於二陽之中，陽氣盛極，經病長而流數，腑病太陽脉靜，則不傳。如脉數急，吐者，此寒邪變熱，傳於陽明，當二三月發，以其經中客邪故也。日痛，鼻乾，身熱者，陽明主肌肉邪，甚則身前皆熱，不眠者，煩盛津乾，胃氣不和也。太陽未罷者，發熱惡寒，太陽已罷者，不惡寒而反惡熱，煩渴，作嘔，津乾便硬，或卽狂言，謂之正陽明。少陽陽明，腹滿不大便而嘔，或瘀血發黃，或下血證語，或胃瀕懊憹，皆此經所主，然亦有裏寒下利，或寒氣結積而爲癟瘕者，不可不知。

**少陽耳聾，腸痛，寒熱，嘔，而口爲之苦**。少初也，陽氣初嫩，並於陽明，故曰少陽脉。

尺寸俱弦而滑數者陽極發厥弦而和者病欲散少陽受病當三四日發以<sub>其</sub>脉循脇絡於耳故風熱上壅不利則耳聾脇痛寒熱往來不食嘔而口苦乾目眩若不嘔吐而能食者爲三陰不受邪也若身無大熱燥悶者陽去入陰無疑矣似瘧婦人血結皆此經所主

**太陰**腹滿自利尺寸沈而津不到咽陰從天降首曰太陰邪在表則見陽脉邪在裏則見陰脉故尺寸俱沈流實有力當下沈細無力當溫太陰受病當四五日發以<sub>其</sub>脉布胃中絡於咽喉故腹滿或痛而嗌喉下乾燥或大便不通小便如常或自利手足溫而渴者爲傳經腑熱或自利不渴手足冷者爲直中陰症或因內傷飲食冷氣或脾必腹痛胃膈不快然太陰乃三陽之終三陰之始陽經表症未盡宜汗半表裏胃滿多痰宜吐傳經裏熱宜下直中陰經宜溫調脾勝邪正在此關

**少陰**舌乾口燥次於太陰故曰少陰脉尺寸俱沈流實有力當下沈微無力當溫少陰受病當五六

日發以<sub>其</sub>脉起於足心<sub>貫</sub>腎絡於肺繫舌<sub>乾</sub>口燥而渴或自利清水心痛腹脹或大便閉硬不欲食者皆熱入裏之深也若厥逆畏寒欲吐不<sub>止</sub>腹痛自利小便白色或乾嘔亡陽咽痛脉微緩者乃陰毒入<sub>臟</sub>之深也或下利體痛咳嘔者水氣也或飯食入口則吐脈弦遲厥逆心下實者不可下也宜止之或脈沈發熱者汙之蓋有初得病直攻少陰不<sub>中</sub>先自

太陽傳次而入<sub>上</sub>也

**厥陰**煩滿囊拳已盡無復可傳<sub>月</sub>傳<sub>賊</sub>逆于手經矣脉尺寸俱沈沉實有力當下沈遲無力當溫浮緩者病自愈厥陰受病當六七日發以<sub>其</sub>脉循陰器絡於肝故唇青舌卷或煩滿者胷中氣滿急也或囊拳者陰囊繒也<sub>在女子則</sub>陰戶急痛引小腹此傳經厥陰風熱毒深於內也肝木移熱犯脾脾受賊邪五臟六腑皆困榮衛不通耳聾囊縮而厥水漿不入不知人則死速下以物五死一生或下利譖語者內有燥屎也仍宜下之或嘔而發熱者和之或發熱惡寒如瘧囊不縮脉微浮微緩胃之脉脾氣既全不受賊

邪、榮衛將復水升火降寒熱作而大汗解矣或下利腹脹身疼者當先救表而後溫裏若下利清穀大汗出而厥四肢疼小腹拘急或乾嘔吐沫或氣衝心痛發熱消渴吐蛔皆厥陰寒症也宜溫之已上正文六言乃萬病之祖非得之不能六言包括無遺如此凡言六經

所見之症卽此三陽三陰經症也雜病亦然

經絡難拘分日數胃云一日足太陽膀胱之經二日足陽明脾之經五日足少陰腎之經三日足少陽膽之經四日足太陰肺之經六日足厥陰肝之經又云傷寒不加異氣不傳經者七日足太陽病衰手太陽受之頭痛少愈八日足陽明病衰手陽明受之身熱少歇九日足少陽病衰手少陽受之耳聾微聞十日足太陰病衰手大陰受之腹減如故則思飲食十一日足少陰病衰手少陰受之渴止舌乾已而噫十二日足厥陰病衰手厥陰受之囊縱少腹微下大氣乃止病再傳六經有自安者活人云一二日可發表而散三四日宜和解而痊五六日不解便入實方可議下此皆論其常耳解惑論云病人有虛實邪氣有遲速豈可拘於日數日雖多尚有表症而脉浮數猶當

發汗日雖少已有裏症而脉沉細卽當下之但隨症虛實與脉而汗下之陶節菴云但見太陽症卽用麻桂汗太陽見少陰症卽用四逆溫少陰見陽明症卽用承氣下陽明見真寒症直入陰經卽救真寒此最活法有循次傳者天運主氣者初氣厥陰風木二氣少陽相火三氣少陰君火四氣太陰湿土五氣陽明燥金六氣太陽寒水人生順受其氣病順逆其氣而傳變自下而上自外而內空其所以然者陽主動而位外陰主靜而位內人身膀胱氣血之會自頭背至足無所不主故風寒每先犯之其次胃氣流行無息自鼻腹至足皆其所生故太陽行於器而交任必及於陽明也又其次少陽清氣主行榮衛脇肋身側皆其所主於太陰人身五臟脾爲死陰至靜不動其所消食者全賴胃氣升降故自少陽脇肋以下肺腹宣乎先之太陰也其次腎主受米穀之精而至靜惟子時濁氣一動而已故自中腹移至腑腹必及於腎也又其次肝脈主散血藏血而極其凝滯故入裏之深至於小腹而下行已極乃復上行於手經此天然之序不可亂者如此若夫太陽自傳於本

者作渴濁溢因誤滲也太陽併傳陽明者當用麻黃而反用葛根以引之也太陽越經傳少陽者當用麻黃而反用柴胡以引之也太陽傳少陰者當用桂枝而反下以入之也此醫之誤也太陽傳太陰者當用桂枝而反下以入之也此醫之誤而亂其傳之序也又有太陽卽傳厥陰頭項痛甚二經絡相接同督脈而上行也有太陽傷風以致陰血自燥熱蓄膀胱逆傳小腸與心謂之窓熱有風寒自背入者直中太陽少陽自而入者直中陽明有首尾只在太陽經而不傳諸經者有間傳一二經者有不傳而罷者有不罷再傳者有不自陽經直中陰經者此邪無定體不可拘於日數也沛入云六氣之邪乘虛之經得之

**標本湏明後先**標者梢末本者根本以主言之各經絡爲標各腑臟爲本如太陽經爲標膀胱爲本餘微此以客邪言之先受病爲本次受病爲標標本相傳治其急者請諾言之太陽膀胱爲本故頭疼脊強小腸爲標與心爲表裏故發熱冬月麻黃桂枝餘月丸桂根陽明太陽爲標與肺爲表裏故微惡寒發熱爲經病葛根

解肌湯渴而有汗不鮮者白虎湯胃爲本目痛鼻乾潮汗  
閉澁滿滿渴症譖爲腑病調胃承氣湯少陽三焦相火爲本  
遊行一身故微熱膽爲標耳聾腸痛寒熱嘔而口苦綠三  
焦無形膽無當入之路故從中治標本俱小柴胡湯太陰  
肺爲標咽乾身目黃脾爲本腹滿痛謂之腑熱咽乾腹滿  
手足溫者桂枝加太黃湯或大柴胡湯身目黃者茵陳湯  
胷滿者瓜蒂散如自利不渴或嘔吐者屬臟病理中陽九  
少陰心爲本故舌乾口燥或達脇硬痛或心下硬痛或下利  
純清水或譖語便閉小承氣湯腎爲標面寒如刀刮唇  
舌萎附屬厥陰心胞絡爲標故舌卷厥逆冷過肘膝肚  
青不渴吐利胷腹絞痛四肢厥逆指甲黑躁卧身如被杖  
嘔逆不渴小腹絞痛者爲寒三十六參葛根湯四逆湯肝爲本  
主男子囊縮女人陰挺乳縮或手足乍冷乍溫大便實消渴  
煩滿者屬熱大承氣湯似瘧不嘔二使自調者必自愈  
不愈脉遲有汗者小建中湯脉濇無汗者桂麻各半湯其  
囊乳縮症寒症亦有之此萬法之祖也學者於此而一悟焉  
則病機到手矣自非仲景玉函內秘其孰能與於斯乎  
此後汗吐下溫和解諸方不甚詳載正言宜汗宜吐宣下

宣和  
悟之

寒傷榮而風傷衛

太陽爲之首爾

榮行脈中，在血脉，其病深衛行脈外，在皮膚

病淺，荣血陰也，陰主閉藏，故寒喜傷榮而無汗，衛氣陽也，陽主開泄，故風喜傷衛，而有汗，然豈獨太陽爲榮衛之會，而有風寒之別乎？陽明善饑，爲傷風，不食爲傷寒，少陽目聾，口苦，咽乾，目眩爲傷寒，三陰傷風，但四肢煩疼耳。太陽爲之先者，傷寒因腎水弱，損至春木無生意，故發爲溫病，至夏絕生化之原，發爲熱病，所以太陽少陰二經受病，最多最先。

經可解而腑可下，陽明爲之主焉

表多裏少爲在經，宜清肌解表，裏多表少爲在

腑，宜和肌，通裏，蓋陽明標雖主肌，而其本則胃也，然豈獨陽明爲十二經之長，而有經腑之異乎？仲景曰：三陽受病未入于腑，可汗而已，三陰受病已入于腑，可下而已，則三陰亦在經者，仍宜微汗之，蓋榮衛屬太陽，主皮毛，胃腑屬

陽明主皮膚之下肌肉之上及腸胃也。胷胸屬少陽。主血  
榮百節。流行三部。臟屬三陰。主筋骨。并兩足。故太陽爲陽  
症之表。胃爲陽症之裏。若但以臟腑而分表裏。則腑爲表。  
臟爲裏。若合榮衛臟腑而分表裏。則表者榮衛之所行裏  
者。胃府之所生。而臟則又深於裏。但病入胃則亦不更傳。不可不知。

少陽原從乎中治

禁

汗

禁下

少陽居太陽陽明之中半表

半裏禁汗恐犯太陽禁下

犯陽明禁參恐生發之氣陷

入陰中只宜和之以小柴胡

湯犯三禁則變不可勝他如太陽經禁下與參犯之則動

血熱入裏而難解陽明經禁汗與參犯之則竭津血畜下

而如狂益津液者。津瀆葱白湯是也。又下症中治見合病

三陰利用乎變法有中有傳

三陰最不可執

有宜下者有

宜溫者自三陽氣分傳入

三

陰謂之傳經。陰症傳非傳入。脾胃肝也。乃入三陰。血分胃  
與大小腸之府也。故仲景謂已入於府可下者是也。若不  
自陽經傳來。首中三陰之經。初起厥逆腹痛自利。不渴。太  
溼自受寒也。上症加之嘔吐。少陰自受寒也。又加之小便

清利厥陰自受寒也。熟藥溫之猶恐或運陰陽一差生死立判。雖然傳經直中先賢發之盡矣。然豈無傳變者乎。假如傳經之際輕生者或被生冷或犯房慾或粗士猛施汙下真氣衰弱陽症變爲陰症如俗所謂陽症歸陰仍宜直中寒症法治故內經正言傳變而不言直中者蓋言變則包直中全局方言傳陰傳陽則不是當言傳陽變陰疾乎傳經爲裏熱直中與變爲裏寒臨症參脉直中二丁陽傳經三陽病在於表脉浮長弦傳經三陰病在於裏脉沉數實直中二陰病在於經脉沈微緩此表裏虛實大分非專以陽爲熟陰爲寒也。

謂傷足而不傷手則可以寒爲足之所司手之六經主於陽正司冬令觸肩之者則二經受病其次則少陽厥陰繼冬而司春令至春分後方行溫令故風寒亦能傷之足陽明與冬本無與然寄在四季寒熱溫涼之氣皆能傷之究表邪傳裏必歸脾胃而爲燥糞用湯藥下之而胃和矣

謂傳足而不傳手不可蓋熟爲手之所竈

人身之氣每日周行三百六十

五、骨節以應周天三百六十五度，血亦隨氣運行，腠理以爲一身動靜之主。所以一脉愆和，百脉皆病。况風寒中人，先入榮衛，晝夜循環，無所不至。豈間斷于手經哉？七日不愈，而再傳者，乃足經移，熱傳于手經，如冤家之相撲也。雖然，手冤亦推本言耳。上古止分三陰三陽，而不分手足，其意甚深。況手足三陽同手，走頭至足；手足三陰同足，走胃腹與手，豈有經絡同一而受病又不同者哉？卽如喘咳發熱，分明手太陰太陽病也。征言譴語，分明手少陰病也。胃滿乾嘔耳聾，分明手厥陰少陽病也。認真五臟六腑俱有表裏，一症蓋人之情慾，天之淫邪，自然不齊，故病多標本兼見，般冷、脉弦、面青、目痛筋急、善怒、心下滿者，兼肝有風也。脉洪面赤口乾善笑，身熱者，兼心有熱也。脉緩面白黃，身重肢痠者，兼脾有濕也。脉澀面白帶憂，喘嗽下利者，兼肺有燥也。脉微面黑善恐耳閉氣逆而泄者，兼腎有寒也。凡邪出於外，則爲腑，爲表；八於內，則爲臟，爲裏。不拘何臟何腑，表症必同歸於太陽，裏症必同歸於陽明。噫沫無定用，病有定體。知此，則百病機關，一悟可了。又何疑於手經之不受病耶？

右一段論六經正病

表可汗而裏可下。表症屬太陽。凡見頭疼發熱惡寒。清便拘日數。多少便。宜解表。不宜下。滲有汗爲表虛。宜解肌。無汗爲表實。宜發汗。但發汗亦有輕重不同。古謂春夏宜汗者。借天時而喻。陽邪在外也。其實。春月陽氣尚微。秋月陽氣欲歛。俱不可大汗。夏月天氣熱。玄府開。不必大汗。冬月陽氣伏藏。感胃輕者尤不宜汗。惟傷寒重者。時令嚴慄皮毛。堅緻非大汗無由得散。不得已而從權也。至於陰症。但厥無汗者。妄汗動經則死。或有表邪。辛熱微汗以散之可也。○裏症始焉脉浮。而大汗則沈。而數始焉惺而靜。余則躁而動。始焉頭疼發熱惡寒。余則不惡寒。反惡熱。煩躁倍加。○連脇腹滿痛。腋下掌心自汗。識戰以致冒。苞糞躁大便不通。小便赤澀。口渴發往譖語。掀衣揭被。揚手擗足。六脉有力。卽是傳經熱症。又謂陽盛誤汗卽死。或有初病卽見此症者。不拘日數。多少便。宜通利。失下則血氣不通而發厥矣。抑又有說焉。純乎表而裏無一毫病者。當解表。時

不  
昨也

勿攻裏純乎裏而表無下毫病者當攻裏時勿審表如表裏俱見或表多裏少表急裏緩則先治其表而後攻其裏或裏多表少裏急表緩則先攻其裏而後攻其表也又表虛裏實則藥宜辛涼裏虛表實則藥宜辛熱皆以裏為主內氣正而後可以治表雖莫急於內表亦不可緩也表裏虛實而醫之大分明矣

表裏半

者宣吐與和

凡病或渴或不渴或胷中煩不煩或

慄或小便不利或有爲之症少陽所生也邪在表則多寒

邪在裏則多熱邪在半表裏則寒熱往來邪在裏則心腹不痛邪在裏則心腹脹滿邪在半表裏則心腹痛邪在表

則呻吟不安邪在裏則狂言亂語邪在半表裏則欲言不言邪在裏則小便清而易邪在裏則小便濁而難邪在半

表裏或利或不利邪在表則不煩不渴不嘔邪在裏則煩

渴而渴故或煩或嘔者邪在裏也若是見耳聾脇痛

寒熱嘔而口苦胷脇緊痛脉見弦數者即是半表半裏脉大胷痛多痰者或挾宿食可吐百問云氣浮上部填塞心胷頭痛多延此吐症也內經云其高者因而越之脉雖大

無頑痰者不可吐只當和解古謂春宜吐者順陽氣發生於上也秋冬宜下者順陽氣取歛於內也此亦道其常耳有病皆

當從權

陽可寒而陰可熱既言之三陽經病卽陽症手之三陽從

頭走足

故頭疼身熱

云云

三陰經病卽

陰症

足之三陰從

足走腹

故腹痛自利

云云

然陰陽俱有

表裏二症

陽症表裏同歸

於熱而已

陰症表裏似

陽入裏

則有傳經直中之殊大抵陽症之表發熱惡寒清便自調

面光聲亮鼻息往來如常手足溫

陽症之裏唇焦舌燥

心

甲紅活身輕易於轉側煩渴掀衣揭手擲足大便或閉或

鞭小使或亦或滯

脉浮洪數宜

汎吐下和四法以治之

陰

症之表無熱惡寒面慘聲短鼻息往來氣冷手足厥逆陰症之裏唇紫舌卷爪申青黑身重難於轉側不渴引衣卧

多踏足

大便泄利

小便清白脉細滑微

每與陽症相反蓋

陽症自下而上

故初起有頑痰

陰症則無頭疼也

陽症自上而下

故無頭疼也

外傳八故欬而爲熱陰症則無身熱而反厥冷也陽症雖手擲足陰症則肺多踏足陽症內熱而渴陰症則不渴陽

症二便閉、陰症二便清、且利也。惟有腹痛、嘔、陰陽二症俱有，然陰脈沈微，凡言陽症，多得之風寒暑濕邪生於太陽也。凡言陰症，多得之飲食起居喜怒邪生於少陰也。故云傷寒挾內傷者十居八九，此陰陽正病也。

### 陰陽極者從治

非訛

陽邪不深，不能至手厥逆，陰邪不甚，

水謂之反化，亢極則害之義也。陽症潮汗秘赤，滿渴狂譫甚，則痰血喘急，然熱極忽然熱伏於內，故身寒四肢厥逆。

狀若陰症，但身雖冷而不欲近衣，神雖昏而氣色光潤，脉必沉滑而有力，此陽極似陰也。宜大柴胡湯，下之或白虎

湯，竹葉石膏湯，陰症厥冷，吐利不渴，靜躁甚，則咽痛鄭聲然寒極忽然火淫於外，發躁擾亂，狀若陽症，然身雖煩渴

而引衣自蓋，口雖燥渴而飲水不下，脉必沈細無力，此陰極似陽也。宜通脉四逆湯，從流者反攻也。熱藥冷飲，冷藥

熱飲，或熱藥爲君，而佐以涼藥，或冷藥爲君，而佐以熱劑，亦非判然如庸醫之差訛也。借有熱病服熱藥而愈者，必先服寒藥過多，寒病服寒藥而愈者，必先服熱藥過多，故耳。若夫以寒治熱，以熱治寒，此爲逆治，逆治者，正治也。正

治之法人孰知之乎

表裏俱無不可犯上犯下腹中不和或閉或泄裏也若四五日後以至過經十二日既無表症又無裏症身微熱者虛熱耳小柴胡湯和之不可汗吐以犯上焦清氣不可大下以犯下焦胃氣身熱日中不了了晴不和大便鞭者乃可大柴胡小承氣下之設或已下而脉數滑穀毒饑六七日不大便者瘀血症也

表裏俱有察其孰少孰多表裏俱見必分多少治之脉浮散主之頭疼身熱便閉爲裏惡寒頭汗爲表小便清利爲表桂枝湯主之心滿不食便閉爲裏惡寒頭汗爲表小柴胡湯主之太陽病因下早而協熱下利心痞鞕者謂之表裏不解桂枝今參湯太陽病因下早而腹痛有積者謂之太陽太陰又謂之裏傳表桂枝加芍藥湯甚者加大黃太陽病下早利不止脉促喘而汗出表未解也葛根芩連湯脉弦微澀者檜

故湯吐之通治表多裏少者白虎湯或合小柴胡湯裏多表少者五苓散或合小柴胡湯表裏俱急者防風通聖散

大柴胡湯

胡湯

當汗而下則爲瘀血懊憹痞氣結胸之患者宜汗而汗之不解者再與汗之若失其汗則寒邪傳經當着傳過何經變出何病若應汗而反下滲表邪乘虛內陷則熱蓄於裏變爲瘀血懊憹體痞氣結胸等症

當下而汗則爲悸惕亡陽譖語厥竭之病太陽症脉浮緊者宜汗而汗之裏症具而脉浮後熱不退脉未和者猶當量虛實再下若下則無從出又或應下而反汗之則津液內竭變爲動悸等症不可汗諸虛咽瘡漱血壞症動氣與風溫風濕脉遲者脉症全在表也然太早太過則津液竭而變生焉有不可汗者諸虛預咽乾口燥咽痛瘡漱經水適至諸失血吐

沫喉嚨瘍症、腑中上下左右動氣、風溫風濕、蒸溫、脈遲微  
滯弱或厥而脉緊者俱宜和解、不宜汗、若強發之病微者  
難瘥、利者言一、亂目眩而死。

**不可下**諸虛、咽腫、嘔厥、結脣、動氣與脉浮、虛帶表者、脉  
症全在裏也、然太早、太過、則水穀脫而變生焉、有不可下者、諸虛、咽腫、嘔吐、厥逆、結脣不轉、失氣、腑中、左右、上下動氣、脉浮、細、虛微清帶表惡寒等症、  
下之則危、隨宜以溫熱藥投之。

**陰虛挾火而脉數**可灸之者消、及口和、背惡寒、脉微濇厲、  
陽虛者宜灸、陰虛挾火、脉微數者不宜灸、蓋外火能助內  
火、火炎則下體必重痺、骨焦肉消、或因此遺精潮咳、見紅  
皆火氣之所使也、古人云、凡灸後燒針後症、  
與火邪發往者同、小柴胡加龍骨牡蠣治之。

**膈寒肢冷而脉微**可吐之者夭、膈上寒飲乾嘔、少陰病也、

四肢冷、面目癱也、脉微、下虛

也誤吐內煩損傷元氣遂致不救者有之若應吐而反溫之則毒氣鬱結於胃而為發狂等症

### 急下以救水存液之機甚微

傷寒熱氣入臟流於少陰之經咽嗌焦口燥渴渴而水乾也

熱病熱不已目睛不和亦腎水乾也

皆急下以救腎水陽明發熱汗多或已汎不解腹滿痛及狂譫不大使者皆急

下以存胃液傷寒脉弦而遲弦爲寒遲爲臟脈大而緊大

爲陽緊爲寒俱謂之陽中伏陰急下以分陰陽又下利三部脉平心下鞭者內實也下利脉遲而滑或濡大按之反

濡惡食者皆胃有宿食也但宿食忌巴霜只宜太黃蕩滯

生脈沈覆冷膈上寒欲乾嘔或時頭痛皆寒氣上攻也急溫

### 急溫以和陽止嘔之功非尔

三十六參萸湯內寒已極厥逆吐利不渴靜躁陽和之氣欲絕六脉若有若無急溫之四逆湯所言急者病勢已篤將有變革非若他病可以緩也他如太陽汗出不止汗後

惡風汗後煩躁心悸身痛皆宜急用附子加於桂枝芍藥之類三陽脉壅腹痛建中湯當先施

也但一服中病即止傷寒之藥自然力

過經不汗下從輕

傷寒六日傳經一週七日當解再傳至於十三日以上不愈謂之過經汗下失

宜以致邪氣留連不已神昏譁語口渴澀渴隨其表裏症見而調之或從輕再汗再下如脈亂發躁尺寸陷者危如脉緩安睡邪未淨者正未復耳參胡芍藥湯調之有大便下利而脉和者知醫以丸藥下之停蓄餘熱九過經氣虛或加異氣宜下與表裏參看

尺遲

補

何忌

良忌

汗吐下宜先以小建

中湯或黃芪建

中湯亦好

候麻不遲方可施治

發表攻裏溫裏之方扶陽助陰抑陰之義

此陰陽指表裏言病者爲虛不

病者爲實表病裏和則邪出於外而爲陽虛陰盛故發表不遠熱而用辛甘之劑所以扶陽也裏病表和則邪入於內而爲陰虛陽盛故攻裏不遠寒而用酸苦之藥所以扶陰也若陰經自受寒邪則爲藏病投陰陽氣將脫急宜辛

熱回陽抑陰故曰桂枝下咽陽盛則鬱承氣入胃陰盛乃亡實實虛虛損不足而益有餘醫殺之耳此汗下之杼機法以得中爲貴不及愈於太過有不回汗有大汗發表微汗解肌以別輕重下有急下少與微和滲利以分清濁溫有兼補者吐有宣湧探引或只寬利而不敢生者和解則一而已或曰傷寒無補法熱氣得補復盛更復下之是重困也惟虛煩裏寒陰症不在此例得中者五法洞中懸劇太過者粗工益進不及者中工從緩從輕凡傷寒汗下藥一服止病即止不必盡刺與雜病不同傷寒不過汗吐下三症若用之得當有何傳變全在醫者精明審處之耳

題

症有似是而非不知寧可不治傷寒所自未定之時不知相兼似是而非最宜詳辨故不知者寧可不治班固有言日有病不治得中醫倘一藥之誤悔將噬臍古以醫藥救人於死豈不與謀刦者同哉慎之慎之

頃

右一段論表裏陰陽汗吐下溫解五法

傷寒惡寒無汗而手足微冷

霜降後春分前人有舊病道途覆霜踢冰冒犯寒氣即發

爲病名曰傷寒先惡寒頭痛甚鼻無涕其聲前輕後重口中和雖不食亦不惡食手足不熱病深重者必身痛發

熱冬月麻黃湯輕淡者陶氏麻黃湯虛者人參順氣散三時差治仲種湯小柴胡湯通用麻黃杏仁散此專辨無汗

爲傷寒蓋風暑濕皆有汗惟寒泣血無汗至於初症傳變雜症俱詳後段

傷風

惡風自汗而手足微煩食與傷寒同緣寒乃陰邪風

初症惟頭疼口和不惡

乃陽邪所以傷寒鬱而後能發熱傷風卽能發熱傷寒手足微煩傷風手足背皆熱傷寒鼻無涕傷風鼻流涕其聲

如自甕中出傷寒面深身痛傷風面光身重傷寒無汗惡寒不惡風傷風有汗惡風不惡寒甚者自汗出不止洒洒惡風復審審惡寒冬月桂枝湯自汗小便數者芍藥甘草湯自汗小便利脚踰急者桂枝湯加參附輕者柴胡桂枝

湯自汗渴而小便難者邪，慟傳裏五苓散自汗不渴者邪，在表茯苓桂甘湯三時防風冲和湯柴胡桂枝湯或敗毒散去茯苓鼻塞通關散通用柴胡半夏湯古立六經傷風方見後桂枝湯下但三陰藥皆辛熱似非傷寒家法仲景治傷寒傷風表症分有汗無汗裏症同於和解通利更無分別今詳桂附八物恐亦風邪直傷陰分其人素虛或房室後傷風則可若槩作表藥誤入多矣蓋傷風發表半熱不如辛溫辛溫不如辛涼也或疑六淫仲景獨詳於風寒而畧於暑濕且不以燥火何也蓋暑熱同氣燥溫同源風寒傳變六經暑濕性偏著人五臟壯者氣行則已怯者乃着為病故耳前所謂离嗇不足之說也洒酒洒淋也皆惡風之貌

治表裏急治裏表急陰同于陽爲兩感

兩感者半入於陽半入於陰陰陽兩

感臟腑俱病一日太陽與少陰俱病頭疼爲太陽邪盛於表口乾而渴爲少陰邪盛於裏二日陽明與太陰俱病身熱譖語爲陽明邪盛於表不欲食腹滿爲太陰邪盛於裏三日少陽與厥陰俱病耳聾爲少陽邪盛於表囊縮而厥

爲厥陰邪益於裏也。五臟六腑俱病，欲治表而裏急，飲滌  
裏而表急，必死之症。但真氣實而感邪淺者或挾異氣風  
溫風濕之類，猶可救療。所以仲景有治有先後，發表攻裏  
之說法，當審其表裏緩急虛實何如。如表裏俱急者，大羌  
活湯主之。如陽症陽經先受病，身體痛而不下利者，爲表  
急，先以菖根麻黃發表，後以調胃承氣裏。如陰症陰經  
先受病，身體痛而下利不止者，爲裏急，先用四逆救裏，後  
以桂枝救表。陰陽未分者，附子、神和湯探之。古方一日太  
陽少陰五苓散，主之頭痛加桂，治防風口渴加黃柏知母。  
二日陽明太陰大柴胡湯，三日少陽厥陰危甚，大承氣湯。  
先輩皆以爲謬，大抵兩感脉從陽可治，從陰難治。  
**傷風見寒**，**傷寒見風**，脉不合症而相反者，先傷寒而後傷風。  
傷風之脉先，傷寒者，症傷風也，而見傷寒之脉，此乃榮衛俱實，故無汗而煩躁。太青龍湯不煩躁者，桂麻各半湯通用。大羌活湯丸朱慈活湯加人參大棗，或神木散香蘇散。

三陽合病自利而汗下審在經入府

或一陽先病一陽隨

或二陽同病或三

陽同病不傳者謂之合病○自利者下利溏泄三陽合病

寒邪甚而裏氣不和也氣行下則利氣逆上則嘔太陽合

陽明自利惡寒者升麻葛根湯惡熱者白虎湯太陽合

陽自利者黃芩湯嘔者並加半夏生姜陽明合少陽自利

最重小柴胡合升麻葛根湯○有宜下者本太陽病因汗

下滲亡津液胃府燥實轉屬陽明謂之太陽陽明脾約丸

潤之本少陽病因汗滲熱入胃府大便燥者大柴胡微下

之本陽明經病熱盛傳入胃府謂之正陽陽明乃本經自

病也宜調胃承氣湯從中治之蓋太陽少氣少陽少血惟

陽明居二陽之中氣血俱多所以從中治陽明而不敢犯

太陽少陽也又三陽合病面垢腹脹痛身重難轉側諳語

遺溺口燥不仁太便難者白虎加參湯主之不可汗下亦

中治法也○有宜汗者表症頭疼惡寒未陰為太陽尚未

過經尤宜發汗如大陽陽明喘而胃滿者麻黃湯太陽少

陽麻黃湯合小柴胡湯通用九味羌活湯加

石蓋知母枳壳蓋在經則汗過經則下也

太陽少陽也又三陽合病面垢腹脹痛身重難轉側諳語  
遺溺口燥不仁太便難者白虎加參湯主之不可汗下亦  
中治法也○有宜汗者表症頭疼惡寒未陰為太陽尚未  
過經尤宜發汗如大陽陽明喘而胃滿者麻黃湯太陽少  
陽麻黃湯合小柴胡湯通用九味羌活湯加  
石蓋知母枳壳蓋在經則汗過經則下也

三陽併病可汗而攻通必傳胃歸和

併者，催併逼迫之意。始初二陽合病後，一

陽氣盛，二陽氣衰，併歸一經獨重，初症亦不解罷。

陽明併太陽者，太陽症未解，陽明症又至。

太陽併少陽者，太陽症未解，少陽症又至。

如太陽症重，加太陽經藥。

陽明症重，加陽明經藥。

少陽併太陽者，太陽症未解，少陽症又至。

如太陽症重，加太陽經藥。

少陽併少陽者，少陽症未解，少陽症又至。

如少陽症重，加少陽經藥。

胡湯頭痛項強，肢體如筋骨狀者，亦宜通用。

少陽併陽明者，為木克土，難治，小柴胡湯合升麻葛根湯。

柴胡升麻湯救之，是併病在表者皆可汗。

若太陽症罷乃入胃府者，謂之傳經，非併也，宜量體攻下。

舊云三陰無合併二病，然三陰亦有自相合併者，但

非兩感必無陰經與陽經合併之理。

但聞疫癘能傳染

疫疾如鬼癘相似，故曰疫癘，又曰時氣，春應緩而反清，夏應熱而反涼，秋應

涼而反大熱，冬應寒而反大溫，兆其時而有其氣，凡感之

者，卽發頭疼身痛寒熱，一方長幼病皆相似，治與傷寒微

異，首春清責肝，升麻葛根湯，夏熱責心，二香散，謂中湯，秋

濕責肺，白虎加蒼湯，陳五苓散，冬寒責腎，萎蕤湯，芎桔

湯土呼四季隨經取之治與傷寒同者表症散毒散半表裏小柴胡湯裏症大柴胡湯扶內傷者宜補宜散宜降人中黃丸是也紅丹疫氣不拘於診更當於運氣求之凡入疫家用麻油服之或紙搣蘸麻油并雄黃硃砂未探入耳

鼻內最能避穢毒之氣遍

蒲鄉村善用如意丹亦妙

豈知正氣亦多致

春日春氣溫和夏氣暑熱秋氣清涼冬

氣冷冽以傷寒氣者以其最成殺厲

之氣也

其有傷於四氣留在何經而發何病大槩春傷於

風夏必飧泄

夏傷於暑秋必瘧痢秋傷於湿冬必咳嗽

冬

傷於寒春必痰癰

孩者二日一發癰者一日一發秋傷於

濕不

即發者及冬風寒相搏來延生而爲咳嗽

冬傷於寒

不即發者及春溫氣相搏變爲溫病是四時正氣亦生發

不即發

者及春溫氣相搏變爲溫病是四時正氣亦生發

和如

此皆因發動之遲延推致病之源非受傷之時預擬

今日之病故有久而消散不成病者豈可執一論哉但稍

覺氣滯於内心腹不快者不換金平氣散加戒以正胃氣

春變爲溫夏變爲熱溫病者春分後有太陽病發熱咳嗽

身痛口渴不惡寒其脉弦數不緊右

手反盛於左手，蓋體熱在內故也。或散在諸經，各取其經而取之，熱病卽興，溫病同。但發在夏至後，脉洪數，熱渴更甚耳。雖因冬時受寒，伏於肌骨，然人身隨天氣化，春分則寒變爲溫，夏至則寒變爲熱，所以傷寒惡寒，而不渴；溫熱不惡寒而渴。不惡寒，則病非外來，渴則自內達表，熱鬱肢，理不得外泄，乃復還裏。終是裏多表少，間有惡寒者，乃冒非時，暴寒，或溫暑，將發，又受暴寒，非冬症之甚也。法當治裏熱爲主，而解肌次之。亦有專治裏而表自解者，設下猶可誤汗。則變爲嘔嘔狂斑，而死。蓋溫熱在經，而不表，安可例用發寒汗法？惟藜桑，暴寒者，乃可表裏雙解，亦不敢用冬月辛溫之藥。○春溫表症、天溫升麻葛根湯、天寒柴胡桂枝湯、太陽合、少陽敗毒散合小柴胡、太陽合、陽明敗毒散合升麻葛根湯、少陽升麻葛根湯合小柴胡湯、半表裏小柴胡裏症、太柴胡重者，一時表裏俱發，防風通聖散、表裏俱熱，太便自利者，柴芩湯加山梔木通，腹煩竹葉石羔湯變雜症，悉同傷寒。○夏熱表症，太陽九味羌活湯汗後，煩渴，脉洪大者，惡寒者，白虎加參湯益元散，裏症太柴胡重者，一時表裏盛發，雙解散，熱病脉細無力足，全已。

得汗而躁盛者此陰脉之極也必死詳溫暑門

晚發疑爲秋病質諸高明

先輩云清明至夏至前太陽病以感之輕者發之早感之重者發之遲從立秋至霜降有

患太陽病者亦名溫病治法同溫熱但加燥劑於解肌藥中裏症同傷寒但既以三月至夏全爲晚發春分前又

爲正傷寒不知春溫在於何月更考三月至夏至前各爲春溫則晚發當屬於秋矣立秋前後病者因濕熱而發

暑後病者因燥熱而發庶乎四時六氣備而不亂而治之大柴胡湯加生地或導滯通幽湯變雜症者隨宜施治

冬溫總是時行加乎調燮

冬有非時之煖名曰冬溫與春

傷寒相能但脉不浮耳治法大同春溫表症姜桂湯九味羌活湯八裏加大黃重者雙解散輕者加葛調中湯

靜而得之爲中舉動而得之爲中

暑暍皆自汗煩渴脉虛而筋骨倦靜而熱

傷心脾爲中暑與夏熱病相似但熱病脉洪濶中暑脉細數而沉動而熱傷太陽爲中渴脉浮似夏傷風但汗出惡風身熱而不渴者傷風也汗出惡寒身熱而渴者中渴也加之身痛且重者必夏月傷冷或深冷水行皮中所致○中渴心腹疼痛霍亂吐瀉轉筋甚則發歇昏悶香薷散痰逆惡心惡寒者橘皮竹茹湯汗多渴而不惡寒者竹葉石膏湯暑濕相搏身痛頭痛煩渴惡心尿赤者五苓散濕盛胃滿者瓜蒂散吐之若小便已利毛聳口開前版齒爆黑肢厥小勞身卽熱者表裏俱病也白虎加參湯有湿者白虎加蒼湯和之切忌汗下針灸汗則惡寒下則內虛變淋矣則助火發熱○中暑發熱煩躁口渴者小柴胡湯加香薷漏利口渴者香薷散合四苓散元氣素弱脉虛身倦者膚暑益氣湯昏憒不甦者葱薑鬚臍

暴寒寒疫與伏藏已變之寒自是情違  
春分至秋分暴寒

寒北也三月四月或有暴寒陽氣尚弱爲寒所折病熱猶輕五月六月陽氣已盛爲寒所折病熱則重七月八月陽

氣已衰爲寒所折病熱亦微傷之者其病與溫暑相似而治則殊者蓋溫暑伏寒自內而發寒疫自外而入宜調中湯爲主隨時氣候寒熱輕重而以辛涼辛溫之藥加減蓋折者折抑陽氣鬱而爲熱也感之輕而陽氣不爲所折未至發熱者當於

感冒藥中求之

暴溫溫疫與過經不除之溫皆難汗發

春三四月間是熱傷之者亦名溫病

傷寒汗下過經不解者亦名溫病但當隨各經見症治之皆不宜汗下暴溫梅子升麻湯九味羌活湯過經和解散

參胡方

藥湯

風溫喘渴多睡四肢不收若癱太陽病發汗則身涼如發當春溫氣大行又感風邪所致惟風傷衛四肢緩從不收汗身猶灼熱者乃風溫也若癱瘓然惟溫傷氣氣昏而鼻息不利語言蹇澁身熱自汗多眠治在心火肝木二經忌汗下針謁汗則身必灼熱甚則須渴譖黃下則遺溺針則耳聾惟着解肌表爲佳宜

卷之三  
湯、瘀、喘者，金沸草散加杏仁細辛五味子設汗防已黃芩  
湯救之譖語獨語及卓視遺尿者難治

濕溫、冒滿妄言、兩脛逆冷如雪

夏月先傷溫而後傷暑名

日溫溫溫與熱搏兩脛逆冷甚則遍身亦冷、冒滿頭痛壯熱自汗若再發汗令人嘔  
羹身變青色不語名曰重暍必死治在心火脾土疾苓白

术湯溫勝潤溼便利者五苓散除虛湯脈滑者木附湯暑

勝壯熱二便澁者香薷散六和湯便閉渴譖白虎加蒼湯

風濕頭汗身重而大便難先下受風濕相搏風在表而濕

在內大汗則其氣暴而內邪不能出故風去而濕存濕流  
入裏則病重微汗則其氣緩而内外之邪俱去或濕症去而風症未去者不久自解寒熱身痛麻杏薏苡湯體痛發  
熱小便不利麻黃湯加薺木肩背脊腰強痛者恙治勝濕  
湯腫痛微喘杏仁湯汗多漢防己湯虛者身重難以轉側桂枝湯加百合身重昏迷自汗失音下利不禁者白通湯

加白朮甘草身痛小便不利者，甘草附子湯、身重走痛者，小續命湯去麻黃附子熱而重痛煩渴者，敗毒散去柴胡人參加瓜萎根小便自利及下利不止者死。

寒濕頭汗身痛而大便泄。傷寒無汗寒濕相搏而有汗不利也。症頭風濕相似。滲濕湯主之。帶表五積丸。加散裏寒理中湯加附子寒多浮腫附子肉湯妙。

中濕二便垂而黃熏於肌膚。濕卽水也。東南恣下風雨襲經則日晡發熱鼻塞在關節則一身盡痛。在臟腑則清濁混而太便濡泄小便反澀腹或脹滿濕熱搏則遍身黃如熏色輕者面目微黃而已誤下則爲喘嘯誤汗則發瘡而死惟利小便爲佳。五苓散除濕湯主之。小便不利太便反快者甘草附子湯二便利不發黃者。附子湯加葶苈發黃者黃芪建中湯中氣堅滿癃閉者枳朮湯。身痛鼻塞者甘草附子湯。身痛鼻塞者甘草附子湯加葶苈發黃者甘草附子湯。

防已

黃芪湯無汗者

五積交加散主之

然濕氣四時有之

兼風

兼熱，兼寒者隨症加減

濕病古云三種實亦五種

寒濕重感成瘡瘍發時可驚

太陽病純傷風純傷寒則不

發症惟先傷風而後又感寒

或先傷風而後又感寒過汗俱能發瘡重發

太陽汗大發

溫家汗皆能發瘡外症寒熱類傷寒但脉沈遲弦細搘頭

露眼口噤手足搐搦項強背反張如發癟終日不醒爲異風性勁爲剛瘡因重感寒故無汗宜葛根湯加羌獨活防風濕性緩爲柔瘡因先傷風故有汗宜桂枝湯加天

花粉葛根其或痰塞氣盛則南星半夏白芍以消麥枳貫陳皮紫蘇以順氣痰消氣順然後分剛柔治之通用小續命湯有熟去附子自汗去麻黃剛瘡二三日佈面壯熱胷

滿如結胷狀便閉脚踰卧不着席者太極氣湯下之輕者敗毒散小柴胡湯炙桑二三日不瘥汗多厥冷筋脉拘急者附子防風湯時發時止危者附木散又有剛柔不分之

瘡身熱譜語似剛微厥便滑似柔宜小續命湯加生附子有汗下後乍靜乍燥偏左眼左手足牽攏者少陽瘡也小柴胡加防風又血虛之人及瘡後傷風過汗破傷風瘡發

瘡俱不可純作風治。四物湯加防風或八物湯去芍藥。  
黃芪羌活防風救之。凡瘡脉如雨濺散出指外者立死。又  
戴眼反折瘻癰汗出如珠或反張離席一下掌許小  
兒離席二指許者皆死。風熱瘻火犀瘡見雜病。

### 寒氣重感變溫瘡發久則載

傷寒汗吐下後餘熱未淨重感於寒而變瘡或過經舊熱

未解新感六淫之氣而變瘡皆曰溫瘡者俱先熱後寒故也。寒多熱少或單寒者太陽邪變也。桂枝湯去桂皮加桂枝少或單熱骨節煩疼者陽明邪變也。白虎湯加桂寒熱相等或先熱者少陽邪變也。小柴胡湯渴者去半夏加天花粉知母寒熱大作戰慄汗出不敢者太陽陽明合病也。桂枝石燕湯服此後瘡愈甚者三陽合病也。恐傳入陰經急用桂枝黃芩湯。如傳入陰分從卯至午發而嘔吐大便閉者大柴胡湯下之從午至酉發而腹痛便閉者大承氣湯下之。不軌下者桂枝升麻湯傷寒與雜病瘡不同在此間有扶寒與食積嘔吐不食者二陳湯對金匱子尿澁煩渴或因瘡氣不伏水土者五苓散俱加黃芩柴胡此等瘡與雜

病無大異。日以勢發，稍緩則截之。痰飲在上，腹欲吐，不吐者，都爪帝赤小豆雄黃等分爲末，水調五分服之。以吐爲度。或桂附丸亦好。久不愈者，勝金丹若瘧丸以消之。

霧露中於下焦，名曰渢。霧露中於上焦，名曰累。陰脉緊者，中於下焦少陰之分，故曰渢。因表虛裏微，遂使邪中於陰，爲慄。令人足脛逆冷，便溺妄出，或腹痛下利。宜理中湯。四逆湯，熱藥以散其邪。陽脉緊或帶濇者，霧露清邪中於上焦太陽之分，故曰累。令人發熱頭痛，項強，頸攣，腰痛，脰酸。宜九味羌活湯加藁本。或惡寒欲吐者，藿香正氣散。五積散，仍量加藁本。○陰陽脉俱緊者，上下二焦俱中邪也。必吐利，後脈不緊，手足溫，則愈。若吐利，後脈遲不食者，脾胃虛，而內停水飲也。若脉陰陽俱緊，口中氣出，唇口乾燥，踴卧，足冷，鼻涕出，舌上胎滑，勿妄治也。又有陽病，上行極而下，陰病下行極而上，上下必于中焦。於是三焦溷亂，内外氣塞，以致上爲口糜嘔嘔，下爲小便黃，大便血凝如猪肝，熟氣勝，而脾胃不運，榮衛凝滯，則生瘡癰，虛寒甚者，脾

胃獨弱下焦不約清便下重臍築漱痛而死蓋腑爲生氣之源築痛生氣已絕

**水症**多嘔咳而頭汗惟在表也則身熱而心腎怔悸惟在

裏也則身涼而脇腹痛堅

水陰也寒也或因洗浴過度內熱者得之卽自

消癆內寒者得之卽自停蓄傷寒表熱與水氣相合者發

熱怔忡乾嘔喘嗽小腹滿小便不利

小青龍湯半表裏症

但頭汗出身無大熱心下痛揉之汨汨有聲者謂之水結

胷小半夏湯甚者大陷胸丸下之或傷寒厥而心下悸乾

嘔逆者茱萸桂甘湯赤茯苓湯裏寒與水氣相合者四

肢疼痛腹痛嘔泄小便不利

玄武湯甚則成癖腸鞶者十

裹湯表裏俱見渴欲飲水水入卽吐者各曰水逆五苓散

滲之若病在陽宜汗而反以水噀面閉熱肉上粟起欲飲

水而不渴者單用文蛤爲末沸湯調服方寸匕流八皮膚

浮腫者牡蠣澤瀉湯五苓散防已黃芪湯附湯選用

**黃症**俱口渴而頭汗薑熱發者則渴澁而大腹脹脹蓄血

發者則濁清而小腹急結

經日濕熱相交民病癰癰卽黃

單陽而無陰也傷寒發黃雖不

一皆因內熱而誤用溫藥或被火攻太甚或失汗下與滲以致陽明經中血熱而見黃色於肌膚謂之癰熱發黃頭

汗依渴小便不利色黃而明茵陳湯茵陳三物湯陶氏茵

陳湯有濕熱鬱而發黃者身痛發熱色黃而晦茵陳五苓

散有寒濕發黃者太陽病寒濕在裏發汗過則寒去而濕

在麻黃連轺赤小豆湯身痛鼻塞者急用後風帶搖鼻法

內服茵陳五苓散頭痛甚者神木散加茵陳有中濕發黃

者一身盡痛誤汗則眼目俱黃茵陳五苓散梔子柏皮湯

防已黃芪湯身體頑疼者麻黃湯加蒼朮有傷風發黃者

易饑鼻乾腹痛潮熱更熱心小柴胡加茵陳如藏加茯苓甚

者用大柴胡加之往來寒熱者小柴胡加山梔茵陳有內

傷中寒發黃者脾胃素虛或傷冷物停滯不敢食或嘔逆腹

痛或大便自利理中湯加茵陳枳實青皮腹脹食不敢飽

欲作穀疽者五苓散加茵陳有陰症發黃者四肢逆冷腹

沈或陰盛發躁四逆湯加茵陳有結胸發黃者心胸滿悶

拔之痛不可近太陷胃湯加茵陳有痞氣發黃者心下痛

鞭按之不痛半夏瀉心湯加茵陳痞結消則黃自愈太指  
發黃與盈濕相似輕則滲利和解重則大下水利黃自退  
矣非但寸口無脉鼻氣冷爲不治形變煙薰黑色推頸直  
視環口黧黑疎汗發黃脾臟氣絕也凡初發黃先以口含  
水用瓜蒂末丁字搗入鼻中吐出黃水內服茵陳五苓散故  
或酒蒸黃連丸外用生姜同茵陳搗爛遍身擦之諸發  
黃皆小便不利惟瘀血發黃小便自利且瘀血與瘀熱外  
症俱頭汗作渴脈浮數但熱結下焦則熱耗津液而小便  
不利血結下焦則熱阻耗血而不  
耗津液故小便自利治詳後瘀血

右一段論正傷寒名義

曰傷寒曰傷風曰傷風則

併病曰兩感曰中霧露曰中暑暍曰熱病曰晚

發曰瘡瘍五種濕病風濕濕溫寒濕中濕溫瘧  
症黃症乃傷寒之本關健也故并提之共二十

四種濕溫居半可見濕熱爲病最多

虛煩頭身不痛無寒而脉鮮緊

虛煩者、七情六慾以致取腎水虛、而心火煩燥、或雜病。

後蒸熱未溼而煩或勞後氣襄火旺而煩或陰虛相火動而煩有類傷寒初症外亦發熱但頭身不痛脉不緊數爲異雖陰虛亦惡寒而不甚脉亦能數而無力太緊病後虛羸少氣煩燥欲嘔者竹葉石膏湯輕者小柴胡湯藜蘆丸心者膈皮竹茹湯陰症內寒外熱肢節痛口不燥而虛皆妄自陽服東藥後脉愈大而無力熱愈甚而燥渴者單人參湯或人參黃芪煎湯下五苓散勞役氣虛者補中益氣湯陰虛者四物湯加知母黃柏脾胃弱者三白湯驚悸癲癇盛者溫膽湯心神不安者殊妙安神丸婦人新產挾血虛煩者四物湯加入參淡竹葉麥門冬甘草表虛已忘汗裏虛忌下但宜平和之劑調理金云虛煩不可太攻熱去則寒起若用傷寒汗下重劑而治虛煩重則津竭而死輕則內消盜汗變爲癆瘵傷寒有未經汗吐下而煩者胃痛膈實煩熱有已經汗吐下而煩者胃滿煩燥懊憊見各條

卷之三

頭項不痛，寒熱而寸多浮。

炎者津液所化風傷肺熱傷脾凝濁而生外症頭項

皆和，惟寒熱類傷寒耳。初起便胃膈滿悶，氣上衝咽，寸口浮爲異，有熱者參蘇飲、金沸草散、柴胡半夏湯，無熱者二陳湯、溫營湯，通用葛根湯。有痰結胃者鵲真丹，枳梗二陳湯，有痰上攻，非次頭疼者平蒂散些之。

食積心腹病

外症頭疼發熱惡寒，全類傷寒，惟身不痛。

症云頭疼而恶心，身不痛者，食積也。頭疼而身亦痛者，傷寒也。食在上脘，脅痛惡心欲吐，實者，瓜蒂散吐之。食在中脘，痞脹欲嘔，有熱者二陳湯加黃連生姜烏梅或陷氏平胃散，腹痛欲瀉者胃苓湯，寒者治中湯。心腹痛，不大使者，大柴胡湯下之。又有夾食傷寒，謂之太陰積症，表症霍香正氣散，或五積散去當歸麻黃加人參蘇葉，有表復，有裏者桂枝加大黃湯，表症已罷，但裏實滿者小承氣湯。

凡傷寒下後六七日，不大便，煩熱腹滿而痛，胃中有宿食故也。巷中寒夾食，卽見吐利厥逆霍亂等症，急用理中湯加枳實，或四逆湯熱之片，夾食脾胃已傷，不可輕易汗下。

脚氣，膝脛軟柔，脚曰氣者，風寒暑濕四氣蒸於足，循經入臟之深，而發則以渺，若四氣中人雖淺。

而繫也。外症全類傷寒，且有六經傳變。如太陽頭疼，身  
熱云云，直至厥陰，煩痛裏舉，又有合併二病，但初起脚膝  
軟弱，頑痺，轉筋，赤腫爲異耳。如太陽症見，外踝循京骨至  
小指外側，脣痛，著隨四氣偏勝，發散麻黃湯加防風羌活  
細辛葛根白朮茯苓防已，或攻毒散合瀆蘇散，陽明症見  
髀膝外裏下入中指內竊者，隨四氣偏勝，微利大柴胡湯  
加羌活細辛杏仁，或升麻葛根湯，合瀆蘇散，少陽症見諸  
足指節痛者，宜和解小柴胡湯去參加防風葛根細辛白  
朮茯苓麥門冬乾姜小草，二陽合病，拘牽便閉者，合前二  
方，如城而服名，左經湯，或專入足太陰經，症見腹脇內廉  
足大指端肉側痛，或浮腫者，左桂附湯加防己白朮茯苓，  
少陰經症見足小指下，連足心，廉股內痛，衝胃不食面黑  
溺溢，小腹不仁者，難治，八味丸，救之，厥陰經症見足太指  
連內廉，脅腹脹痛，脚攀乾呕者，養真丹，用知足三子陰攀，痳緩  
弱，上支脅，脇痛，肩背下注，脚膝足心熱者，換火丹，先要之風多  
入肝，病筋走注，脉搏無汗，小便不利，渴，加獨活，風毒臘痛，排  
行走，忽倒或腫，除湿湯，痰多者，用此湯，吞青州白丸子，暑

多入心病氣喘悶煩躁所患必熱敗毒散加木黃寒多入  
腎病骨癱急掣痛所患必冷平積散趙婢湯加木瓜通用  
三七六  
千金續命湯流氣散子烏藥順氣散順氣散者專治慄飲之  
便用者三七九散脾經丸毒氣薦心作痛者蘇子降氣湯下  
六八九  
養正丹或吳萸煎湯刺人姜汁拔死在旦夕尋常春夏  
檳榔散加川練子熟腫赤箭散改善散加木瓜本秋冬五  
積散加木瓜檳榔牛膝吳萸最忌蘇湯淋洗草藥擦  
盦其症有因於氣因於飲食及舟石者不可不知

**瘀血**昏忘姪狂曾脇小腹不快斯可益乃人身血脈貴流通而  
液內參或不當汗而汗津液內竭或利小便過多以致血  
熱化爲惡疾又或其人素有跌撲閼刺善思善鬱過食煎  
炒以致血熱瘀滯蓄於上焦則胸盈善忘甚則昏迷良久  
乃甦或曾脇腹皆痛譁語昏憤謂之血結曾症蓄於中  
焦則頭汗作渴發黃蓄於下焦則姪狂便黑小腹急結疼  
之則痛其脉沉芤滿外症寒熱全類傷寒太陽症則姪狂  
陽明症則善忘少陽症則寒熱似瘧大築浴上犀角地黃  
湯治半桃仁承氣湯治下抵當湯一丸然必症重脉數方可

抵當攻之症輕脉微通用犀角地黃湯加青皮芩連太黃或小柴胡湯加桃仁生地兼梔子茵陳一切血症皆此治法不易傷寒有用承氣天下不解反便堅善食者衆血也

凡病日輕夜重便是瘀血所以打撲傷損症亦類傷寒

**瘡毒**飲食如舊掀發腫痛可求無名腫毒初起寒熱全類

傷寒但傷寒不食瘡毒飲食如常且身有紅腫掀痛處可驗不可妄施汗下宜外科法治之俗呼流注傷寒流者

行也注者住也血氣流行遇寒邪則凝滯結如堆核大者如拳小者如李初起寒熱全類傷寒未潰者宜敗毒散合

涼膈散加金銀花已潰者托裏散不可作正傷寒治之俗呼赤脯傷寒脅痛赤腫疼痛寒熱類傷寒非正傷寒也

宜荆防敗毒散合小活骨湯

**湯裏實者**防風通聖散

**痘疹死足當時冷**

凡幼稚及年長之人忽類傷寒症如未患痘疹死足中指皆冷宜從痘症初熱

瘡治上

之

勞發痰火待日週素有痰火者有勞動便發寒熱全類傷寒輕者將息週日自愈重者頸腋膊臂之間遂結核腫硬或消下次遇勞又發  
治宜八物二陳湯加降火和解之藥

外感疎泄勿甚

舊謂傷爲中感冒爲傷寒悉分之正恐人以傷寒重則而治感冒輕病變生異症蓋

感寒雖亦惡寒而慄其頭疼發熱不如傷寒之甚脉多沈遲感風雖亦惡風鼻塞其發熱等症亦不如傷風之甚脉多浮數太槩未發熱者感寒香散感風蘇葛湯右薑荆散已發熱者九味羌活湯之類熱服脈體微潤卽愈尋常體薄多疾之人只於原服藥中加生姜陳皮或寒用二陳湯風用二白湯加咸詳見雜病

內傷補益兼投

外感挾內傷者素冒風寒未發加之飲食

關脉大於右手氣口一二倍此外感重而內傷輕也治以九味羌活湯去蓄水生地用白朮隨六經見症加咸如內傷脾胃外感寒邪者藿香正氣散人參養胃湯如內食外感風寒者平胃散加黃連枳實便開加桃仁大黃如

內傷生冷外感風寒者五積散。○內傷挾外感者先因飲食勞役過度身痛腰腿酸軟而其體已解亦又感冒風寒外症全類傷寒但右手氣口及關脉大於左手人迎一二倍此內傷重而外感輕也治以補中益氣湯或調中益氣湯隨六經見症加減誤作傷寒大發其汗者死。○內傷房室又感風者玉屏風散或加桂枝白芍。內傷房室又感寒者川芎湯風寒兩感者玉屏風散合川芎湯體薄者通用十全大補湯少加防風羌活細辛白芷。肢冷者加姜附陰虛者小物湯加陳皮炒乾姜不可誤用風寒燥藥愈虧腎水內傷虛損四肢無力發熱亦類傷寒但必兼盜汗遺精白濁爲異內傷衛虛惡風榮虛惡寒亦類傷寒但居密室則不惡也內傷陰虛火動惡寒非寒惡熱非熱但體清瘦脉無力爲異內傷大渴體熱脈洪大似陽明中熱白虎症但脉無力耳內傷長夏困倦似外感濕熱或發熱頭疼似溫暑病已上俱宜補中益氣湯或四物湯四君子湯加一錢詳内外傷辨及雜病各條○解体出內經解者肌肉解散体者筋肉束骨其症似寒非寒似熱非熱四肢骨節解散怠情煩渴飲食不美或因傷酒或中濕或感冒風寒或

房事過多或婦人經水不調似砂病而實非砂也治宜通其氣血踐其腠理以內傷兼外感藥調之輕者從俗割砂刺十指及委中血砂症類傷寒見雜病虛瘡

右一段論類傷寒名義舊以藜飲虛煩腳氣食積

大類傷寒新謂感冒勞傷共成十

症要之百病皆類傷寒不可不知

正類傷寒如斯傳變傷寒何謂嘗聞傳陽則潮熱汗便閉

溺澼腹滿口渴發狂譖甚則發斑嘔血喘急能升臂屋

變瘻則厥冷吐利不渴靜躁甚則咽痛鄭聲欲坐井地請以初症言之

頭痛三陽所主而濕痰鼻塞脅煩太陽表症頭痛自巔頭連兩額太陽火者分有

汗無汗治之。若頭痛極破者急用建貢葱白湯始止。之陽明表症、頭痛連鼻目齒葛根葱白湯、葱豉湯、陽明裏症、肺熱汗多頭痛者調胃承氣湯、陽明症汗多煩渴脉洪頭痛者白虎湯加白芷、少陽症頭角痛蓮耳、往來寒熱者小柴胡湯。○濕家鼻塞聲重頭痛者令病人先瀉水一口勿燕次將承蒂散一字入鼻內搐出黃水為度。○葵薤頭痛難當。胃膈煩痛欲吐寒熱者瓜蒂散吐之。

九頭痛連腦痛甚辛足俱寒者不治。

巅痛厥陰所司而脾胃從足至頸脈至頸脣而還惟厥陰上系與督脉會於巔頂下顙頬連目出額必兼乾嘔吐沫却無身熱亦頭陽症不同。○參萸湯主之輕者小建中湯若厥陰得浮脉則陰病見陽易愈若脉沉痛入泥丸手足冷爪甲青者謂之真頭痛有上症而連齒痛者屬少陰厥症俱不治然風溫在少陰濕溫在太陰而反頭痛至陰中毒及太陽少陰兩感亦有頭痛不與陰症無頭疼相反耶然少陰雖有反熱而無頭疼厥陰雖有頭疼而無身熱且頭疼終不如陽經之甚若身熱頭疼兩全者則屬陽症。

**項強連背邪初臨**

項硬而不能左右回顧太陽初症表實無汗

葛根湯表虛有汗桂枝湯加葛根

苦

寒下邪氣乘虛入裏反結胃而項強又不解謂之結胃

項強

大陰會胃陽丸兼理中丸或四逆湯服之所以陰毒初

病亦有項強俱以熱藥治

之正陽散附子湯是也

**項強連脇邪亦猛**

項強連脇下痛者小柴胡湯又

**頭眩有風有虛**

未經汗下而眩皆邪漸入裏表虛故也頭目俱眩者太陽併少陽傷風也時時目眩

口苦者

少陽風邪盛也俱小柴胡湯主之頭敗善食不惡

寒者

陽明風邪也來苓桂湯已經汗下而眩者裏虛也

汗漏不止

心悸身搖惕瞞或發熱者芩桂湯虛煩頭眩心

下痞滿腹痛氣上衝

身戰筋惕成瘓者茯苓桂枝甘草湯已經汗下虛則厥上虛則眩所以婦人經水適來易病真

元精散皆令頭眩間有瘓火上衝者輕則起方昏眩重則

卧亦旋

轉危哉

齋首不仁不省

齋乃氣不舒，首乃神不清，俗謂之昏迷也。

乘虛中人，如物蒙罩

其首恍惚

不省人事，比之暎暎更重

太陽少陽病頭痛眩冒時，如結胷瘡硬者

人參三白湯加川芎

羌活天麻吐下虛煩氣衝，眩冒身搖者

桂枝甘草湯加桂枝

少陰症脉流遲，面白微赤，身微熱，下利清穀者

必齋冒牙齒

理中四逆湯加桂枝乾姜湯選用血虛者

人參養榮湯加天

麻，如利止頭眩，時時自冒者，難治

太陽病下之不愈，因

復發汗，表裏俱虛者

其人必冒汗，自出則表和而愈，又藜飲

藜冒厥逆者

其人必除眩暈者，芎朮除眩湯又有

頭重二症，太陽不能舉者，宜發散易病

不能舉者，宜補真元，婦入新產血虛挾寒，必冒見產後

身惡寒有熱無熱陰陽班班

惡寒非寒熱之寒，身雖為熱，亦

火氣則寒，熱相搏，寒不可遏

經曰：發熱惡寒者，發于太陽

也，乃陽症之表惡寒，無熱惡寒者

發于太陰也，乃陰症之

裏惡寒在陽，則脉浮數宜發汗，在陰則脉沉細宜溫中，或

下症悉具，但有一二客惡寒者，爲表邪未淨，須先解表，俟不

惡寒乃可攻下時時齎齎惡之甚者屬太陽乍止惡之微者屬少陽陽明不惡寒反惡熱惟太陽合病在表則亦惡寒若少陰症惡寒而踴脈沈細無頭疼無頭強厥冷自利煩躁脉不至者死

背惡寒

口和口燥虛實井井

風寒客於表分當下身盡寒

陽脹爲陰又以背爲五臟所系是以背惡寒也寒邪在裏不能消耗津液故口中和此屬少陰宜附子湯熱邪陷內消耗津液故口中乾燥全無滋味此屬陽明井二陽合病俱宜白虎湯中暑及暑月傷冷陰氣乘陽亦有背惡寒者

惡風可解而漏汗濁澁當溫

惡風者或當風或用扇則怯

陰無惡風症悉屬陽經無汗者當發其汗有汗者當解其肌若裏症甚而惡風未罷者尤當先解其表而後攻其裏也桂枝湯加葛根主之汗漏不止及濁澁四肢拘急難以屈伸者宜桂枝附子湯凡汗不止者必惡風煩燥不得卧先服防木牡蠣湯次服小建中湯惡風項強脇痛手足溫而渴者小柴胡湯汗吐下後惡風大渴者白虎加參湯惡

相壯熟者參蘇飲防風沖和湯風濕相搏惡風身疼  
小使不利者井草附子湯身重惡風者防已黃芩湯

發潮可通而氣逆脉虛忌冷

似潮水之有信一日一發謂之潮必日晡而作者陽明旺

於未申故耳宜諸藥氣湯選用或大柴胡湯有不可下者脉浮或弦嘔穀飴逆氣逆上微溏惡寒發熱非日晡所發是謂其熱不潮或潮於寅卯者屬少陽潮於巳午者屬太陽爲邪未入胃俱宜小柴胡丸之又日晡發熱脉虛者亦不可下宜桂枝湯微汗之若結胷潮熱脉浮者屬太陽大陰胷湯陽明傷風腹滿身黃者麻黃連翹赤小豆湯冬陽明潮熱黃芩湯吐下後不解並見鬼狀摺衣摸床微喘直視脉濶者死

似瘧作止有時太陽陽明厥陰

似瘧非瘧作止有時或日再發或二三日不發非久客

潮單潮而無寒亦非若寒熱往來之無定也太陽症二三日似瘧寒多脉浮洪者桂枝湯或桂枝附子湯陽明症似瘧汗出日晡發熱脉浮者桂枝湯脉實者承氣湯熱入血室似瘧小柴胡主之厥陰症似瘧一日一十三發脉浮

緩者爲裏和自許而愈。凡感肩之人忽覺毛寒股栗筋節搜摩百骸鼓搗撼嘔不欲食其寒不可禦未發復轉而發熱者皆似瘡狀不必脉弦隨所見症與上麻而以小柴胡湯和解此卽溫瘡也。

### 少寒少三症弱脉脉遲同等

一丁亥脉弱者亡陽也不可正汗及吐下桂枝二越婢

一湯以微汗之一症脉遲者血少也先以黃芩建中湯養血俟脉不遲乃以小柴胡湯和之一症脉陰陽同等微浮微緩不嘔滯便自調此不待藥汗而自愈也若一面赤身痒脉滻者桂枝各半湯必待微汗而後愈通用柴胡陳湯熱多加川芎前胡寒多加川芎草菴若寒多熱少不煩躁而脉浮緩者乃傷寒見傷風脉也或而色不澤兩手無脉者乃麻黃附子細辛湯症也

### 往來寒熱正是半表半裏之情

經曰陰氣上入陽中則惡寒陽氣下陷陰中則發熱

此陰陽相乘之病也若大下陰微發熱大汗陽微惡寒乃醫之誤也大要陽不足則陰邪出于表而與陽爭則陰反

勝而爲寒，陰不足則陽邪入于裏而與陰爭，則陽反勝而爲熱。若邪入而正氣不與之爭，則但熱而無寒矣。陽不足，則先寒。陰不足，則先熱。表邪多，則寒多；裏邪多，則熱多。半表半裏，寒熱相等，乍往乍來，而間作也。若不嘔清便，昧浮者，猶當解表。口渴尿赤，脉實者，大柴胡湯。心煩喜嘔，胷脇滿而不可欲食者，小柴胡湯。熱多者，加柴胡；寒多者，加桂枝。汗下後，柴胡症不除者，柴胡桂姜湯。寒熱往來，腸滿小便不利，嘔渴頭汗者，最宜如柴胡熱勢益當遲一二日少定方。可箇之所謂其盛者，可以待衰而已。若寒熱勢一定或早移於蔓，或移於早，邪無可容之地，病將解矣。○夫病機言搏者，舊有癥瘕相火之類，偶然新氣犯之，則搏動而發。此理易明。言爭者，乃彼此相搏，相鬪，久而後可和解之謂。不過邪正氣相引結而未還散，非實有所爭，虛也。血氣盛者，雖風寒之邪乘間而入，終不能動其真氣而與之鬪。惟血氣弱者，則邪入必鬪。鬪則便有勝負，須正氣復而後邪可退也。若邪愈勝而正氣負，非藥餌大扶持之，必不可救。此爭與搏之義也。至於頭面上病，皆百邪上攻。胸膈間病，皆百邪上衝。腸胃間病，皆百邪下流而傳入。不然，則血氣失升降。

之常。或陽當升而不升，陰當降而不降，精宜升而不升，氣宜降而不降。血宜順而<sub>古</sub>不順，火宜靜而不<sub>古</sub>靜。識病機，括盡於此矣。

### 表裏寒熱譬<sub>六</sub>如冬至夏至之景

隋氏以皮膚卽骨髓之上、骨髓卽皮膚之下，前人錯

誤，而分表裏，但以冬至陽生<sub>生八卦</sub>則地中熱而外寒漸極。夏至陰生，<sub>庚午</sub>地中冷而外熱漸極。推之則誠有表熱裏寒表寒裏熱之理。且如病人身熱，似火而外欲得衣，微寒下利，脉沈而遲，分曉裏寒表熱所謂熱在皮膚寒在骨髓也。活人先以陽旦湯退寒，次服小柴胡湯，加桂枝，表所以少陰反熱。——症裏寒表熱手足厥而下利者，<sub>利</sub>清穀者，四逆湯主之。如病久身冷似冰而外不欲近衣，口燥舌乾脉沈而滑，分曉表寒裏熱所謂熱在骨髓寒在皮膚也。活人先以陽旦湯全白虎湯除熱，次服桂枝半湯和表，所以少陰傳經熱症惡寒而踴時時自煩，不欲厚衣者，大柴胡湯下之。此仲

東林議當一的從之

翁翁發熱於表則二、蒸蒸發熱於裏則一

表熱若鴻合羽  
所覆有汗發

散無汗解肌二者之分裏熱若火薰蒸自內達表惟下之  
一法而已半表裏熱者表邪雜羅裏赤作實輕于逃在表  
純在裏之熱也宜和解之要之不渴小便清者爲表渴而  
小便黃者爲裏或渴或不渴半表裏也然三陽經又有陰  
陽表裏之分蓋太陽以皮膚爲表以膀胱爲裏熱在皮膚  
頭疼項強爲表麻黃湯桂枝湯九味羌活湯熱在膀胱口  
渴尿赤爲裏五苓散陽明以肌肉之間爲表肌肉之下爲  
近裏以胃府之內爲全入裏熱在表則目痛不眠葛根解  
肌湯熟透於裏則口渴背寒白虎加參湯熟入裏則自汗  
在譜調風氣湯少陽以胸膈之間爲半表半裏表多小  
柴胡湯裏多熱盛者黃芩湯已上發熱太陽惡寒陽明自  
汗少陽多嘔皆三陽症也太陰厥陰不發熱惟少陰反  
熱一症一脉沉發熱表鬱重者麻黃附子細草湯輕者麻  
黃附子甘草湯一脉不出裏寒外熱者白通湯和之脉陰  
陽俱虛熱不退及汗下後復發熱脉躁疾下利不止者死

**煩躁**以躁之類漸而分陰陽

煩乃心中懊憹欲吐之貌

躁則手掉足動起卧不安心熱

則表裏汗吐下治之不煩而便發躁者爲陰症宜溫中或經

吐下而不解煩躁者亦宜溫之太陰中關脉浮大身熱而渴者多太陽陽明病治以寒涼尺寸脉沉微厥而利者多屬少陰病治以溫熱一百間云惟躁有陰陽二症太陽症煩

躁宜汗陽明症煩躁宜下若陰症發躁宜溫之是也故有

曰煩躁與虛煩少異煩躁晝日不得眠夜反安靜身無大熱陽虛也虛煩不得眠而無間斷故爲裏熱宜柏枝湯吐

之丹溪又云煩主氣躁主血肺主皮毛氣熱則煩腎主津液血熱則躁故用桔子以治肺豆豉以潤腎但肺熱非火乘之乎凡煩躁見吐利厥逆無脉及結胸者死

古方黃連鷄子湯甘草乾姜湯芍藥甘草湯選用

**煩熱**以膈之軟滿而辨虛實

心煩依渴欲嘔身熱時卧不

無時休歇非發熱時發時止凡煩熱志經汗吐下邪熱傳

裏而作亦未作膈實心中欲吐不吐鬱悶之狀者爲虛但

當和解或微汗而已。經云：病人煩熱汗出，則解是也。若心下繫滿而煩者，爲實，則有半下之異。賦云：微煩爲陽之相勝。言當分表裏而治之也。又云：煩極而反發，發者乃陰所致。言熱極則反與陰盛發躁一同，必以四逆理中湯治之，宜與動降。

條參看

自汗不特傷風也，併少陰反症而有九。自出必兼惡風寒，日傷風衛虛而汗也。日風溫，風傷衛而溫傷氣也。日濕溫，濕熱蒸而汗自出也。日中暑，熱傷氣也。日霍亂吐利，而陽氣大泄於外也。日柔痓，原因傷風也。日胃不和，言臘無他病，但時發一熱而汗自出，乃風邪在胃，宜微汗以散之。日亡陽，太陽發汗過多也。日陽明，自汗不惡風寒，反惡熱而熱逼汗自出也。汗甚津液內枯，不可下者，蜜導法，椎三陰，本無汗血，少陰有反，有汗三症亦可。日亡陽，其一自汗咽痛，甘桔湯；其二自汗厥冷，四逆湯；其三自汗嘔吐，東草葛姜湯。凡汗不正者，先服防風牡蠣湯，次服小建中湯，如汗出，茹油不流者，死。

**無汗**不特傷寒也併陽明反症而有七

日太陽傷寒日太

厥陰病日冬陽明日剛痓日陰陽易皆寒汗血陰主收欬意也但陽明病當有汗今反無汗其症有三惡寒脉浮而喘者表有邪也宜麻黃湯升麻葛根湯微汗之若無汗小便不利心中懊惱者必欲發黃宜茵陳湯小便利吐而咳手足厥苦頭痛鼻乾者二石五建中湯

**亡陽少血躁極痰癖不得汗湏巧攻**

太陽惡寒當脉躁而

遲爲亡陽不能從汗其身必痒桂麻各半湯凡傷寒當汗與麻黃湯二三劑而汗不得者死熱病脉躁益而不得汗者尤陽之極也不治陽明身熱宜首汗今反無汗身痒如虫行皮中者久虛故也建中湯本附湯寒熱厥症忽兩手或一手無脉是爲重陰如欲雨漚熱必濶然大汗而解其或投藥無汗而脉又不至者死雖然血虛中乾不能作汗瘦飲癥癖又每囁汗而不能出血虛養血瘦癖開關行氣以汗之最爲活法有服藥不得汗者當用蒸汗法通

用開門  
造散加減

寒入少陽冬病陽明睡中汗且盜出

盜汗者邪方入裏尚連於表脾則氣行於

裏而表不痏故汗出醒則氣週於表而汗復止膽有熱也

小柴胡湯

冬陽明昧浮緊者必有潮熱盜汗黃芩湯柴胡

桂枝湯勝深大欲眠日一合則汗者小柴胡湯

陽上蒸而頭額汗表實內枯症最多

諸陽上循於頭裏虛表實勝理痏密則熱

氣不得發或於週身乃上蒸於頭面汗出既多則五內自枯惟裏虛忌下惟肉枯忌汗屬半表裏者小柴胡湯主之汗下後胃滿心煩嘔渴表未解者小柴胡湯去半夏加桂枝瓜蒌仁虛煩者梔豉湯微吐之陽明熱入血室燥糞譖語者俟其過經確以小柴胡湯利之黃症水症瘀血風濕寒濕頭汗見苔條光頭汗小便不利內外關格者爲陽脫及誤下溫家頭汗而喘或小便不利大便自利者亦爲陽脫二者皆不利

氣旁達而手足汗便輒軟利法已畢

津液自胃府旁達於外

於外則手足自汗有熱

聚胃府逼而出者必有譖語燥糞陽明症也大便已輒者大柴胡湯或大承氣湯大便不輒而軟者小柴胡湯凡陽寒欲下而小便少手足心井腋下不發潤者不可攻也有寒聚胃府大便初輒後溏或水穀不分手足濶然汗出者不可下少與理中湯或猪苓湯如寒甚不食小便不利者此欲作癆瘕也宜理中兼散氣之藥治之

下後熱

只陰弱而邪陷於心者則痛

太下傷血傷血陰弱

則脉滯血虛寒極則發熱古方芩桂苦酒湯酸苦湯泄之

則義也凡下後不可更補一身熱心中結痛者施取湯微汗之

或醫以丸藥下之致留餘熱未淨者施辛乾姜湯胃滿未瀉腹痛未止脉尚數者積垢未淨也少承氣湯體薄者黃芩湯小柴胡湯益元散調之仲景云下後熱不退因汗下失宜如入臼已上大發熱者難治經云陽微惡寒陰微

發熱寒多易愈

沉

汗後熱多陽虛而邪入於裏者爲實。悸眩身瞶脉弱或兼惡寒陰陽俱虛者。李武湯主之。發汗後表症未退者宜再汗之。若身涼半日許而見半表裏症者宜和之。若汗後日晡如瘧脉洪實便閉裏症已具者大柴胡湯下之。若但熱而嘔逆心痞自利者大柴胡湯去大黃調之。虛煩者作藥石羔湯。凡大汗後熱不退脉靜者生脉盛躁疾者此名陰陽交必死解惑論云。汗後寒熱交作當看脉尚浮數洪大猶當微表其汗醫者見已經汗後不敢再表邪氣無由發泄誤矣。發汗後止惡寒虛也。發汗後止發熱實也。惡寒用溫藥發熱用涼藥無不愈者。

虛者汗下之後惡寒愈增。汗後亡陽惡寒者表虛也。附子甘草湯下後惡寒者裏虛也。四逆湯其有表邪未盡必兼發熱者柴胡加桂湯又有裏實熱伏於內陽微於外而惡寒便堅者亦必兼熱充宜下之百問云。汗後惡寒入必虛下後發熱人必實是也。汗下後厥陰症太汗出煩躁體疼拘急厥逆者陰陽俱虛也。

宜四逆湯以補陽加人參茯苓以益陰汗下後脉微惡寒者下小柴胡湯去芩加芍藥有頭汗者柴胡加桂湯汗下後尺寸俱微陰陽表裏俱虛者小建中湯意傷寒以真氣爲主陽病宜下真氣弱者下之多脫陰病宜溫真氣弱者寒熱便生非藥無力主本無力也惟寡慾真氣完者易於用藥誤下氣脫皆倦不食不渴者來復丹靈砂舟暫服之

熱者吐下之後消渴可以虛煩而乃客於中焦爲消渴者白虎加參湯心下痞者先解其表發清其裏汗後渴者少與水以和胃則愈傷寒汗吐下後邪氣乘虛而內客或壅窒而未盡皆當量虛實而調治之

咳嗽有寒熱水氣之多端者何也肺爲五臟華蓋內通膀胱外主皮毛而爲氣之主氣逆而不下則吸風寒乘之氣冷則濡熱邪乘之氣燥則營水飲乘之與氣相搏寒熱水氣皆能生痰又痰之所從始也以風寒言之太陽症身熱嘔喘者麻黃杏仁飲咳喘者三拗湯少陽症寒熱胸滿或

加

挾濕者、小柴胡去參棗加五味子乾姜少陰症厥逆腹痛  
下利者、四逆湯加五味子乾姜少陰多而嘔渴心煩不得  
眠下利者、猪苓湯春冬、傷風寒夏秋傷濕冷、鼻塞喉鳴氣  
不得下而咳者、橘皮竹茹湯以熟咳之金沸草散、米胡  
半夏湯鴻白散或咬體血者、小柴胡加黃芩黑豆咬嗽身  
熱膚腹滿痛者、大柴胡湯下之中、蒲而煖者大半夏湯解  
痰氣盛者、太橘皮湯素有痰火者當於芩連二陳湯中消  
利以後胃寒不食者、理中湯六君子湯俱加五味子細辛  
太陽之裏水有痺玄武湯治陰症之裏水有寒凡咬而小  
息又水亥有三症青龍湯治太陽之表水有寒十全大補湯治  
太陽之裏水有痺玄武湯治陰症之裏水有寒凡咬而小  
便利者忌汗久而入臟成  
便利者忌汗久而入臟成  
便利者忌汗久而入臟成

勞嘯之上肓之下者不治

體痛有陰陽血風之感悉風寒入肌血脉凝滯所以身痛  
清宣分有汗無汗治之少陽身痛必脇硬嘔渴小柴胡加瓜  
湯和之汗後身痛不休脉沉遲者桂枝加參湯又有痛無  
常處按之不可得短氣脉濶者宜再汗之太陽病七八日  
脈細惡寒陰陽俱虛者不可發汗吐下宜小柴胡湯誤汗

令久耳鹽素有熟者黃氏建中湯素無熟者芍藥附子湯  
厥陰少陰身痛下利煩滿脉沈緊者先溫以四逆陽玄武  
湯後發以桂枝湯血虛勞倦身痛者補中益氣湯黃氏建  
中湯風邪在陽明不榮於表一身重痛者葛根湯陰毒身  
痛加杖瘀血身痛發黃中濕痛難轉側風濕丁身盡痛見  
各條瘡家誤汗身痛心發癰瘍葛根湯或桂枝湯以救之  
**渴有汗多自利水入即吐名逆症**  
熱在表則不渴熱入裏則熱耗津液而作渴或  
汗出下過多耗奪津液而渴然有渴必有煩者腎主水熱  
深則水竭而渴肝木挾心火以生煩故厥陰六七日飲水  
多而小便少者謂之消渴渴欲飲水為欲愈者傳經已盡  
也、脉浮而渴屬太陽有汗而渴屬陽明自利而渴屬少陰  
至於厥陰則熱之極矣太陽病汗後脉洪者白虎湯無汗  
而渴者小柴加本湯陽明病汗少潤脈者五苓散汗多而  
渴者竹葉石膏湯少陰病下利亥嘔心煩不眠者猪苓湯  
下利飲水有熟者白朮翁湯小便清白虛寒者甘草乾姜  
湯厥陰消渴不食食則吐蛔者烏梅丸汗出下溼枯者白  
虎加參湯陽毒消渴傷常者陷胃丸黑棗丸中暑者酒蒸

木立  
黃連丸。凡飲水安睡者，實熱也。飲水少頃即吐者，火邪假渴耳。凡渴不口舌欲飲須少與之，以潤胃氣，恐變水結一種。水逆症渴欲飲水，水入即吐者，五苓散又發汗動右氣，肺傷亦飲水，卽吐者亦宜。若先嘔後渴者爲欲解當少與之水，先渴後嘔者爲水停赤茯苓。

陽有風溫發黃渴症見各條。

○因經熱裏寒水入不薰多血疾  
經熱則口燥煩而欲水薰陽明症，漱水不薰身熱或微惡寒熱在經而不，在裏必入逼血上行爲衄血，黃芩湯瘀血症，漱水不薰外無寒熱喜忘加狂星角地黃湯少陰症，腋沈鬱冷煩躁或乾嘔無脉好漱水不薰者，四逆湯白通湯主之。蛔厥症煩躁些蛔好水浸舌而不欲漱者，理中湯加烏梅。

右一段論，傷寒初症，未有不自頭疼項強身痛發。

熱惡寒有汗無汗，或咳嗽或渴而始者，故提之。

於此過七日不愈者皆雜症也

驚

怫欬因汗失宜便堅爲實嘑爲虛

面赤陽明所主陰盛者

而光表症汗出未徹以致邪熱怫欬欬結故頭面白紅赤甚則蒸於肌膚汗出未透身痒者桂麻各半湯惡寒熱者葛根湯汗太過發黃者茵陳湯驚惕者火升湯不便觀者葛根湯已實也大柴胡湯下後覺者胃虛也桂枝參苓湯

戴陽浮火所衝陰症

下利熱微陽熱甚

百問云

病人身微熱面赤脉反沈而

逢者陰症也身微熱者裏寒也面戴陽者面雖赤而不紅活乃下虛也醫者不察脉以虛陽上固熱躁誤爲實熱下之又用涼藥則氣消而成大病矣仲景理中四逆陶氏益元湯主之若陽症面赤脉洪大腹滿潮熱大便不通者大

柴承氣

主之

目盲鼻鳴而口齶者熱搏之重

難經曰脫陰目盲言橫血脈而不上榮於目故目盲

不了了，或無所見也。傷寒發煩目盲甚者，必衄。蓋肝血爲  
熱氣所搏，妄行於上，而爲衄。得衄則熱，隨血散而解。與麻  
黃湯或麻黃升麻湯九味羌活湯，蓋傷寒衄爲積熱在表，  
用麻黃羌活者非治衄也，以解太陽經之邪耳。此與太陽  
病其人適失血，及下利，宜桂枝湯。法同，但衄家最忌發汗。  
邪輕者犀角地黃湯又目逆鼻爲內，首屬太陽，近眉尾屬  
少陽，當面屬陽明，赤脉從上而下者，太陽病從下上者，陽明  
病從外走內者，少陽病熱則目赤，風則目眩，寒則目疼，又  
孤憲目不能閉，陰症眼睛痛，陰陽易病，眼中生花。○鼻者，  
呼吸清氣之路上竅於肺，下通膀胱，風寒壅則鼻鳴，而必

乾嘔。太陽病桂枝湯、太陽陽明合病鼻乾肌熱者，葛根湯。

又手冒心而聾耳者，陽脫之証。

難經曰：陽者見鬼無陽，氣而見凶，陰之鬼傷寒汗。

過亡陽，其人必又手自冒心而聾耳者何也？蓋耳屬腎，  
陽氣盛則上通而聰，陽氣虛則下脫而聾。仲景云：少陰受  
病，腫滿而耳聾者是也。宜芍藥附子湯，黃芪建中湯，救之，  
心悸欲得按者，桂枝甘草湯，撮空神呪者，附子升陽散。

火湯若初症手少陽風病厥而聾者耳中燁燁煙燭水柴  
胡湯最忌吐下以致驚狂手太陽熱厥聾者耳中塞諸加  
之熟壅出氣出體則成停耳燄溫厥陰耳聾見前又有風  
邪入胃耳中卒痛外症寒熱不急治則發強如春俗名黃  
耳傷寒不可作正傷寒治之內服小續命湯散毒散外用  
鹿耳草搗汁滴入耳中上症頭汗如珠不流者陽脫卽死  
四肢胃未由熱而溫而冷逆知是傳經之厥傷寒邪在三元  
半表半裏及太陰則邪漸入內則四肢溫傳至少陰厥陰  
則邪入深而陷於內則四肢厥冷然先由熱而後厥者傳經熱厥也輕則四肢散白鹿湯竹葉石羔湯重則大柴  
三百九氣下之若邪乍結智中心煩不食而厥者爪勞散吐之  
百問云熱厥與冷厥不同熱厥者微厥却發熱若冷厥則  
不發熱四肢逆冷脈沈細大小便滑泄惡寒指用青色又  
有失下血不通四肢便厥醫者不識疑是陰厥復進四逆  
湯之類如復掌太抵熱厥脉沈伏而滑頭止有汗手掌  
溫指梢亦溫便宜下

此仲景之妙旨也

一舌心苗由白而黃而燥黑失其本體之紅

舌爲心主津液無病

則舌紅而潤偶見紅星點者將欲發黃如丹田邪熱則心苗枯槁生胎如白胎然是以邪在表則無胎邪初傳裏則胎白而滑胃寒客熱懊憹者槌鼓湯吐之陽明症脇硬不大便而嘔舌胎白者亦不可攻小柴胡和之如惡寒欲嘔痰者小柴胡加乾姜白胎滑而下利者爲脈結不治○熟漸入深則胎白而澁熟深入胃則胎黃或肥光或尖白根黃者表峻裏少也俱白亮加參湯主之○手足腋下汗出譜語便閑胎紫帶黑或生芒刺重辟燥刻者承氣湯下之但舌黑亦有數種有四邊紅而中死黑成路者失下也有黑圈者過經未解也有黑尖者虛煩也有舌見黃而中有黑點者表未解也有根黑尖黃脉滑者可下脉澀者可汗有尖黑而有亂紋脉滑實者急下之脉數無力者外發渴而死凡舌黑不論多少俱係危症惟冷而滑者淡黑然者乃無根虛火可以化痰降火藥治之○陰症胎白腹痛自利者理中湯中濕濕痺舌上如胎非真胎也丹田有熱胃

中  
有  
寒

五  
苓  
散

卷三

四十一

無寒熱而唇焦者多因血瘀不發寒熱脅滿唇焦漱水不便利太便黑者血瘀於下也

無色澤而唇青者必是寒中陰症脅滿面色及唇皆無青有瘡則爲狐惑

口乾口燥口涎

豈無異

口乾者

邪熱聚胃

消耗津液故也

口燥者

白虎加參湯少陽

五苓散加知母黃

芩

氣湯少陽口燥咽乾者

小柴胡湯雙解

少陰口燥舌乾者

承氣湯口燥咽乾默默不欲言者宜

散少陰口燥舌乾者承氣湯口燥咽乾默默不欲言者宜以狐惑治之凡口乾燥忌汗之重亡津液口涎有陽

明熱盛者則延熱

少陰寒症則延熱

氣逆氣短大相同

氣逆者氣自腹中時時上衝也太陽無汗陽明有滿者汗之太陽下

之早表邪乘裏傳裏裏本虛者受邪不逆裏本實者不當受邪則氣逆上衝邪仍在表當復汗之厥陰客熱氣上衝

心此熱在裏而氣上也下之胃滿實皆吐之汗不後氣逆敗軍者疾桂木甘草湯有病後虛羸少氣欲吐氣逆者

有動氣發汗氣逆者○氣喘惟有太陽陽明二症大陽症無汗而喘宜汗陽明症汗多而喘宜下太陽陽明合病胃

痛而喘惡寒者亦只宜汗而不宜下也故曰微喘緣表之未解喘痛不惡寒者當下而痛又有汗後停水喘者有汗

下後喘者有陰症喘息甚急者返陰脉伏者加柴生脉散如脉伏汗出多潤者肺絕不能呼氣短者呼吸不相接續以喘而不摇肩似呻吟而無痛也經曰微虛相搏則爲

短氣短氣不足以息者實少氣不足以息者危有結氣者

有停水悶忡者有風濕相搏者有素弱及下後脉微氣虛甚者太抵心腹脹滿者爲實爲邪在裏心腹濡滿者爲虛

爲邪在表氣喘不遂亦然

## 濕嘔乾嘔宜察腎肝病症

濕嘔有物有聲食已則嘔乾嘔空嘔無物總屬陽明氣血俱病

故嘔比吐爲重也熱嘔口苦煩渴脉數手心身熱寒嘔頭痛  
脢滿厥冷吐沫脉遲吐噦飼飽皆然○濕嘔表邪傳裏  
裏氣上逆故半表裏症多嘔也三陽發熱者俱小柴胡加  
生姜主之胃滿日晡潮甚加芒硝嘔不止便閉者大柴胡  
湯嘔多雖有陽明症胃薄不可下者其桂湯煩渴者先嘔  
後渴爲欲愈猪苓湯先渴後嘔爲停水赤茯苓湯飲水即  
嘔者五苓散虛煩渴者竹葉石膏湯加姜汁或施豉湯上  
熱下寒嘔者黃連湯胃寒下利厥冷不渴者理中湯去芍  
加薑汁或正氣湯加姜汁少陰三症膈上寒飲嘔吐涎沫  
或吐利而渴者四逆湯加生姜脉沉或咳或悸挾冰氣者  
玄武湯去附子加姜汁手足寒心中溫欲吐不吐慣慣無奈何者生姜汁半夏湯廻汗下利者乾姜芩連人參湯  
汗後水藥及穀食不下者危小半夏湯牧之又有溫毒嘔  
者心悶發癥水症嘔者先嘔忙吐嘔體血者腥臊氣過上

嘔  
嘔嘔盡自愈。○乾嘔胃熱與穀氣相併上薰心下痞塞故嘔則無所出食則不能納。蔻連解毒湯有太陽無汗乾嘔者風邪上壅也桂枝湯有太陽陽明合病不下利而但嘔或乾嘔者裏實氣逆上而不下也葛根湯胃寒津枯乾嘔渴者理中湯少陰三症乾嘔下利脉微者白通湯裏寒外熱脉微欲絕者通脉四逆湯利不正煩躁厥逆無脉者白通加猪膽汁湯厥陰頭痛乾嘔吐痰或自利厥逆煩躁者三味參芪湯胃中似喘不喘似嘔不嘔似暎不暎愦愦無奈何者生姜汁半升湯、大小橘皮湯。

吐  
吐酸總因胃府熱寒。吐有物無聲食入卽吐。丹溪以虛躁者爲寒酸臭者爲熱治與嘔暎一同。凡嘔吐脚軟痛者脚氣也。嘔吐脉弱小便自利身微熱而厥者虛極難治。藏餉皆因水寒相搏。藏卽乾嘔聲更重且長耳。爾乃胃間藏餉皆因水寒相搏氣塞不通。胃脉浮脈爲餉滑則爲暎。皆因胃氣本虛汎下太過或復飲冷水寒相搏胃虛氣逆而上理中湯加肉桂丁香以散寒下氣茯苓半夏以消水

嘔不正者，橘皮乾姜湯、橘皮竹茹湯間有熟邪壅鬱，上下之氣不得通者，俱小柴胡加生姜和之，熱甚便難者，小柴胡氣下之便軟者，諸瀉心湯選用，溫病發渴飲冷作嘔者，竹麻葛根湯加茅根，凡嘔嘔必用半夏散結氣也，用竹茹、桔梗、胃解煩也，用生姜、散逆氣也，嘔嘔飴皆因氣逆，故姜爲溫家聖藥，熟者烏梅代之。

**飴逆**亦有陰陽兩端，舊以爲欬嗽之欬，俗又以爲口吃之

上之名，又有以飴逆爲嘔者，嘔出聲然後吸，飴逆入聲逆盡，然後呼，出入呼吸不同，兼嘔嘔者，本於胃，飴逆本於肺，穀入於胃，胃氣上注於肺，故寒氣與新穀氣相忤逆而復於胃，故噫噫有聲，所以丹溪力辨乃相火自膈下直上衝督交於厥陰，水火相搏而作聲也。陽症發熱口苦，胃滿脉弦數，小柴胡湯加竹茹一小使閉，加茯苓或猪苓湯大便閉者，調胃承氣湯少陰症，失下腹滿便閉或純下清水詎逆者，小承氣湯陽明身熱口渴，卻滿煩躁，脈洪數，飴逆者火衝肺也，甘草鴻心湯○陰症便軟，胃寒或因吐下虛極惡寒，脉細者橘皮乾姜湯，內寒厥冷者，差活附子湯。

柿蒂散 調蘇合 香丸 胃寒飲水相搏者 小青龍湯 去麻黃  
加附子 手足厥冷者 小橘皮湯 冒瀉虛煩者 大橘皮湯 凡  
絕逆藥中俱宜陳皮竹茹姜汁 此症有欲作正汗陰陽升  
降而然者卽愈又有食積而致者小便閉澁及痰火上衝  
者腹滿不得小便及脉見沈微散者死已一  
上嘔噦絕逆大同水氣表裏俱有此五症

**衄血** 热迫於鼻動經則爲厥竭不治

經絡中熱盛逼血從鼻出者爲衄多屬太

陽名曰陽血點滴不成流者表猶未解當用辛涼之藥解  
表九味差治湯加赤芍或升麻葛根湯加黃芩或升  
麻湯雙解散渴者五苓散煩者竹葉石膏湯以散經中之  
邪仲景云傷寒脉浮緊不發汗因致衄者麻黃湯主之是  
也如無表症衄血成流及因汗而得衄或下又見血者不  
治自愈不止者犀角地黃湯陶氏生地芩連湯黃芩湯茅  
花湯外用冷水浸紙貼太陽穴紙熱又換或用百草霜胎  
髮燒灰吹入鼻中九竅出血亦効凡衄不宜卽止恐餘血  
入胃着於上焦爲血結留症○直中少陰症熱行於裏先  
熱後厥無汗亦陰症似陽也醫不能識驗發其汗必動其

經外則筋惕肉瞶內則伏熱逼血從耳目而出或從口鼻而出名曰陰血是爲下厥上竭不治但厥爲下厥血出於上爲上竭輕者黃芩湯加生地之類或當歸四逆湯黑錫丹救之動經與真衄微有不同如此

吐血熟積於中併牙乃是腎胃相殘

汗乃心液熱則變紅而逆出上竅陽邪失

汗以致熱毒入臟化爲瘀血從口吐出多屬陽明凡見目紅骨熱神昏狂譖眉脣急滿皆血症也熟殘者畢角地黃

湯加黃芩山梔茅根藕節或小柴胡湯黃連柏皮湯熱深者杏仁承氣湯三黃湯抵當湯丸陽毒者升麻湯作渴者

五苓散恐水八復吐故也或竹葉石膏湯皆加川芎調血

炒山梔降火危哉又有陰症吐血脈逕腹痛厥逆嘔吐紫

黑色者難治姑以理中湯其桔梗湯加生姜汁半夏湯枝之

支牙床屬胃牙齒屬腎如陽明傳入少陰二經相併血出

於牙縫如吐者人多不覺其爲牙血以涼水漱盃則止少

頃又來者是外用綠袍散內服解差湯合犀角地黃湯或

生地芩連湯下之輕者清胃降火而已

者清胃降火而已

漏汗驚狂癱痺總是火邪逆。火邪者或不當汗而用火取汗，或汗不得而用火，數奪以致火氣薰蒸，精神皆墮，肢體不寧，體虛者漏，汗不止，真陽脫亡。凡汗不得者謂之亡陽，汗多不止者亦謂之亡陽。如心痞胸悶，面青脣潤者難治，色黃手足溫者可治。因太陽症者桂枝湯加附子，或汗下後見吐逆者亦宜因少陰症者四逆湯或便清乾嘔者甘草乾姜湯、咽痛者帶膚甘桔湯，少陰訛逆譴語被火小便難者必滋其津液竹葉石羔湯去半夏加生地或時倏然而起惕然而驚起卧不安者狂者桂枝龍骨牡蠣湯體實者雖不至亡陽，然內火外火相併，熱發於外則身必發痺，熱轉於內則小便必難，驚狂譴語煩躁不已，或丁身盡痛甚，則手掉足動，摘衣摸床者死。如小便利者可治，通用柴胡龍骨牡蠣湯、火邪湯或下清血，或因燥唾血者犀角地黃湯發黃痺者茵陳湯，若太陽症宜汗而反用火灸者，其邪無從而出，病當腰下重痺，麻杏薏苡湯散之。

譴語鄭聲

靈寶全憑水道看

事或閉目言之，所未見事或

譴者妄也，或閉目言之，常

獨語或齶中呴嘯或呻吟不已甚則狂言罵詈俱謂之譫語皆因胃熱乘心故脉來洪數二使多閉外見陽症有陽明汗多譫語少陰自利譫語者內有燥屎也調胃承氣湯下之半表裏默默不欲語及已得汗而身和亡陽譫語者柴胡桂枝湯調之已下旬煩身重不可轉側譫語者柴胡龍骨牡蠣湯錯語獨語呻吟者絳山毒湯或白虎湯和之又有汗多譫語者風也俟過經方可下瘥後譫語者邪留心胞也短毋麻黃湯如氣逆下利厥冷而脉又沈細者死身熱脉大聲清氣朗目光面潤者生瘀血亡陽令病濕溫熱入血室火邪譫語見名後○鄭者重也言語重復不已聲音模糊有如鄭衛不正之音皆因汗下後乃風溫發汗過多以致表虛裏竭精氣奪而神昏舌短故脉息沈微二便多利外見陰症白通湯投之或单人參湯亦可故曰譫語實則可下虛不可爲實者胃實有燥屎也虛者眉虛腸自利全憑水道斷之

咽痛有熱無熱腎伏暴寒下必利太陰絡咽少陰絡喉熱利邪乘之乃生咽痛若汗

下過多虛而生熱亦能咽痛有少陰身熱腹痛脉沈咽痛  
或不食嘔吐者黃連龍骨湯少陰客熱咽痛苦參甘草湯  
寒熱相搏及亡陽咽痛者猪膾湯甘桔湯二使難者甘桔  
湯加玄參枳壳順氣黑良之物續以甘草生姜煎湯頻與  
之以解其毒或陶比李連消毒飲陽毒發斑吐血咽喉者  
文參升麻湯陽厥宜下反發汗則口瘡亦爛內服升麻六  
物湯外用蜜清黃柏汁含之咽喉閉塞者烏芻湯聲音不出  
者鵝壳苦酒湯有少陰咽痛無熱下利四肢厥冷者甘  
桔湯取冷吐利脉沈者猪膾湯厥冷下利不止者四逆湯  
丸或通脉四逆湯加桔梗不可汗下有汗者藁本末撲之  
又有胃傷寒丁瘡乃非時暴寒伏於胃經初起頭痛腰痛  
咽痛次卽下利脉微弱者先用半桂湯次用四逆湯主之  
傷寒六七日大下後脉逕不至咽痛吐膿  
血厥冷利不止者延麻黃升麻湯救之

臓結有痞無痞臍痛引陰生必難臓結與結脣相似皆下  
結在胃者爲結胸與陰相結結在臍者爲臓結惟其陰結  
故臓結無陽症不往來寒熱或但寒而不熱其人反靜飲

食如常時時下利舌上白膩脇肋腹引入陰筋俱痛者  
舟由有熱中寒所以難治又病人肺下素有痞氣再  
加傷寒邪氣與宿積相合使真臟之氣閉結而不通亦名  
臟結不問有否無否慎不可下邪未全成熟猶在表止宜  
小柴胡加生姜以和表灸關元

穴以回陽而解陰氣之結危哉

結節

下早而緊痛大小寒熱宜細辨傷寒太陽症下之早

焦少陽之分名曰結節當心緊痛而煩水穀不入但能仰  
而不能俯其表邪又不敢故頭強如柔症狀有大結節者  
不按而痛智連臍腹痛硬手不可近不太便日晡熱潮大  
小如湯丸有小結節者按之方痛只心下硬小陷胸湯有  
寒實結節者身不熱口不渴但心中脹硬而痛枳實理中  
丸五積散甚者三物白散有熱實結節者心下滿硬懊憹  
煩躁而渴大汗者太陰胃湯有水結胃血結胃陰毒  
陽毒結節見各條結節脉浮大者不可下之卽死結節  
症具而煩躁者死結節見陰脈陰症及喘急逆者亦多  
死若未經下而胃滿者乃半表裏症不可誤作結節

痞氣下早而虛滿硬濡噦利更易安

傷寒半表症下早而  
邪入於中焦太陰之

分而成痞氣按之濡而不痛比之結胷更輕有胸滿而硬  
嘔吐下利者裏實有水也大柴胡湯心痞引脇下痛乾嘔  
者大柴胡湯汗出惡寒者附子鴻心湯有胃滿而濡脇脹  
滿者虛邪氣聚耳小柴胡湯加乾姜牡蠣各一錢胃虛氣  
逆者半夏瀉心湯有心痞噦噫者胃不利也汗出脇有水  
聲雷鳴者生姜瀉心湯心痞噦噫不止者旋覆代赭石湯  
有下利者裏虛也穀不化腹鳴者甘草瀉心湯或已數下  
表邪入裏干於腸胃遂成下利而心下痞硬者謂之表裏  
不解桂枝人参湯下利不止者赤石脂禹餘粮湯又結胷  
痞氣關脉皆沉如關浮惡熱心痞者乃肝熱非痞也二黃  
湯心湯心痞而口渴溺澁服瀉心湯不如者乃停水非熱  
痞也五苓散凡痞氣服諸瀉心湯而熱不除者亦須大陷  
胃湯丸下之但結約月與痞雖宜下加脉浮惡寒有表者須  
柴胡桂枝湯或柴陷湯解表發表症參脾關尺沈滑緊實者  
方可下之下後病猶不退者乃下虛氣虛上攻枳實理中丸  
和其胃氣初起未成痞結之際虛者亦宜枳實理中

九實者，枳梗湯。標陽躁氣，然後隨症用藥。胃冷厥逆者，俱宜。神中四逆，利屬待日久邪，不退而後議下。是結胷痞氣始末，用藥俱同。但中間用藥略有輕重之殊耳。不識前輩分陰陽二症，謂何陷比？又以傷風爲陽，傷寒爲陰。王氏又以痞氣乃陰症，有表者皆於理未協，要乏旨傳經陽症。但下後胃寒，而用藥有宜溫者，若邪盛胃實方，可參。察下之成結胷心下痞硬，裏則爲痞氣，初未審分陰陽也。設有陰症誤下，不死而結胷痞氣者，亦當以陰毒結胷法治安取。又用黃連心等劑耶？以此論之，謂陰陽二症俱有結胷，則可謂陽症爲結胷，陰症爲痞氣。則不可。又用寒涼藥治陰症，尤不可。知者裁之。○又心下妨悶，不痛不硬者，謂之支結。表未解者，桂枝湯。桂枝湯微冷，而微結者，小柴胡加乾姜牡蠣各丁錢。表裏俱不解者，桂枝人参湯。客熱、懊悶時發躁下，陽氣內陷，心下固硬者，則爲結胷。氣空虛客熱在膈，短氣煩躁微冷，則爲懊悶。將成結胷者，宜大小柴胡湯。但懊悶煩不得眠，饑不能食，頭汗出而不

結約者施取湯腹脹坐卧不安者施子夏草湯渴者白虎湯陽明症下後懊憹者內有燥糞猶宜承氣湯下之懊憹小便難者必

發黃茵陳湯

內虛動悸必生煩如火入將捕卽恆惟意也有火停心上頭眩身搖厥而悸者參其水而悸厥自定有神氣素虛心中空耗不能自持者有汗下後內虛而悸者比之素虛者尤甚須先定其氣而後治其悸大約先煩後悸者爲寒小建中湯玄武湯脉代者灸甘草湯入酒少許汗後日服桂枝芽草湯先悸後煩者爲熱小柴胡湯喜嘔譫語太便難者小柴胡湯加大黃或加芒硝少許譫語小便不利者柴胡龍骨牡蠣湯小一便赤者五苓散

胷痛多帶表肌症

胷痛者未經下而胷脢氣塞滿悶非心入胷中少陽所屬半表裏症也柴梗湯主之譫語身痛者柴胡龍骨牡蠣湯有癲氣逆上搶心者施攻湯或加甘草

生姜調下肺促桂枝湯去芍藥喘者麻杏甘石湯胃虛者半夏瀉心陽虛硬便閉屬臟者方可議下尋常胷膈不利多挾痰氣食積者柴陳湯桔梗湯謂之

胸滿半居表裏間

胸滿非腹中滿也乃脇肋下脹滿半表

半裏之間多耳聾乾噫寒熱往來默默不欲食少陽所主小柴胡湯和之如太陽未罷項強者小柴胡加乾葛陽明便閉舌胎者柴梗湯挾痰熱者柴梗半

更湯有水症及脈結胸滿者見奇経

腹脹

裏有邪陽閉滯而陰利歟腹脹裏未淨吐下實而汗

後脰

傷寒外邪自表分皮膚肌肉而入於脣脢脰爲半表裏直至傳入胃府乃爲入裏是腹脹雖屬太陰而

裏症尚淺未全入府猶宜和之惟腹滿硬不減咽乾口燥便閉者乃陽邪入裏方可下之若腹滿濡時減吐利厥冷者乃裏寒陰症速宜溫之○又汗後滿者外已解而裏亦不實乃脾胃津液不足氣鬱不通壅而爲滿宜厚朴半夏

甘參湯以溫散之。吐下後滿者，表邪未淨，寒虛入裏以致。上下氣不通和，宜大柴胡湯加厚朴量下之。或用桔子厚朴湯量吐之。合病脹者，身重痛口頑麻白虎湯加葛通用。柴梗湯、柴梗半夏湯，凡脹滿忌用。白朮開氣，如腹脹喘而不

尿脉濁者死。

腹痛熱閉冷利皆邪入裏相搏。

寒熱邪氣入裏與正氣相搏則腹痛陽症不可按擗。

大使閉者爲熱表症誤下表裏俱病者桂枝加芍藥湯甚。

者加大黃半表裏症者小柴胡湯去芩加白芍表裏俱熱上

者大柴胡湯適腑腹痛滿實手不可近而便閉者內有燥屎也。大承氣湯經日痛隨利哉是也。熱便泄瀉者四逆散

上熱下寒者黃連湯。

寒煩者梔豉湯加厚朴枳實。

腹症可按與探痛無休息腸鳴而太便利者爲冷太陰理。

四逆湯大陰連小腹痛甚自利不正者難治又大腹屬太

陰腹滿屬少陰膀胱屬厥者。

上

中湯黃芪建中湯少陰四逆湯玄武湯服之。

正陽散當歸

三七五

陰多有挾食積與瘀火者。

上

小一

腰痛

熱發冷結有物非氣爲

牽

火

歸

與

大腹

痛者

指外邪

疾硬是病溢血結膀胱者小便自利熱結膀胱者小便自溢又有令結膀胱小便亦溢但手足厥而脅不痛爲異宜

外灸關元穴

中灸武陽

內服

奔施三法動積氣奔豚上衝尤甚

其人先有五積在臍中或騰上下左右復因傷

寒邪氣衝動新邪與舊積相搏而痛或醫人不知病者原有痞積奔施汗吐下發動其積氣築築然跳動名曰動氣動右肺氣則咽乾鼻燥渴渴飲即生水動左肝氣則筋惕肉瞤身熱欲謹動上心氣則掌熱作渴氣上衝心動下腎氣則心煩骨痛食則嘔吐或下利清穀大繫脛者通用理中湯去白朮加肉桂頭取楊潤汗多者防一术牡蠣湯小建中湯

中湯腹痛身微熱欲謹者甘草乾姜湯心煩骨痛吐食者太極皮下湯熱者通用茱萸桂枝湯煩渴者竹葉石膏湯或血煩渴者五苓散心痞下利清穀者甘草瀉小湯氣上衝心者李根湯五穀惟膾下奔豚衝心最甚多因汗下心虛

而胃氣乘虛上衝者不可若江豚奔浪然桂枝湯加桂一倍荳蔻湯吐後去荳蔻加白朮蓋白朮閉氣止可  
鬱用桂鴻奔豚苓伐腎邪奔豚妙藥也

### 邪犯三焦成霍亂吐利不發則殂

三焦水穀道路邪在上焦出而不利邪在下焦

利而不吐邪在中焦上吐下利病因飲食不節清濁相干陰陽乖隔輕者止曰吐利重者憚煙擾亂乃曰霍亂外症

必發熱惡寒頭疼身痛本傷寒病也因邪入脾胃故發爲吐利然中焦爲寒熱之半邪偏高居陽分者則多熱而渴

五苓散分利之邪偏下居陰分者則多寒不得渴理中湯分利之風寒濕勝者藿齋正氣散除濕湯五積散穿合暑勝

太渴者二香黃連散益元散柴苓湯選用傷食甚者平胃散治中渴主之轉筋者氣不和也俱加木瓜或單用雞屎

白署炒爲末溫湯化下方以凡霍亂多責於熱故夏秋爲盛或熱伏於內手足如火六脉沉伏食即飭逆此火氣上奔然而不可誤爲陰症必吐利小便亦自利而大汗出下利清穀寒熱四肢拘急厥強脈微欲絕乃爲陰症四逆湯

或加吳萸生姜散之少陰吐利煩躁欲死者二三味參萸湯  
吐利止自汗厥逆不渴脉微欲絕者通脈四逆湯加猪膽  
汁計吐利止身痛不休者桂枝加參湯吐利止發熱者隨症  
微汗之吐利止亡津而渴者竹葉石膏湯白虎加參湯吐  
利不止者桂枝加芍藥丹木香乾姜煎湯下凡霍亂不可遽與米  
飲粥飯等食以助邪氣必所傷物盡然後淡食少少養之  
傷寒心痞發熱吐利者大柴胡症也不可誤爲霍亂○乾  
霍亂者氣痞於中欲吐不得吐欲泄不得泄所傷之物華  
閑正氣關格陰陽煩躁喘脹者必死急以鹽湯一盞入童  
便姜汁類服採吐全透未吐再服外用鹽炒吳萸熨臍卽  
卽以理中湯加陳皮謂之或藿香正氣散加官桂倍枳壳  
茯苓木瓜吞蘇合香丸如發熱頭腹痛者桂枝加大黃湯  
**大使閑**本裏熱而帶表屬陰未可攻下論云陽結能食不  
言陽氣困結於腸胃蓋病邪在表則大使如常邪傳入腸  
胃之裏謂之正陽明病潮溼開溢滿渴狂謠尺麻實者諸  
二十九承氣湯選用如脉浮帶緩舌上白脂者知邪未全公府猶  
屬半裏所謂嘔家雖有陽明症不可攻舌上白脂未可攻

者是也。宜與柴胡湯，和其榮衛，通其滯液，得微汗而自解。然有數日不大便而妨閑甚者，雖尚有些表症，亦當與大柴胡湯。或小承氣湯，微潤之。又陽明症，汗多，小便利，而太便硬，或發汗利，不使多，而太便硬者，皆滯液內竭，宜審摩之。太便硬，小便數者，乃爲脾約，宜麻子仁。且太便堅，小便少者，未可攻。津液未充，候其小便自如，乃可攻也。當問病久一日小便幾行。若如常當知氣已下，行太便不久，自當要知古人審用轉藥。若欲行大承氣湯，當先一日用小承氣湯。候其腹中轉失氣，轉氣者，腹中響而放屁，知其有燥糞真者，有宿食宣攻之。若不轉失氣者，必先硬後溏，勿攻之。金匱云：六七日無所，若不可攻。下之早熟氣乘虛入胃，重者必死。又便閉，屢下不通者，須吐以提之。陰結脉沉遲，正結不食，身重，如石，且公太便硬，而艱難，非燥糞也。乃陰寒固結於胃，血氣凝滯而閉塞也。宜四物湯附子湯，或金液丹。古半硫丸、五種散，如久不大便而麻反微，瀦者，裏虛甚也。急以黃芪建中湯，煎之。又有食滯脾及血燥而不大使者，當於雜病傷食及燥門求之。

小便閉

本下熱而亡津屬陰難以參疏

傷寒邪在表則小

便利入裏下焦直

熱引飲過多小腹脹硬小便閉皆脉浮五苓散脉沈猪苓湯大便乍難乍易而小便不利者內有燥屎大承氣湯若還而自通可也汗下後發熱項腫頭頑心痛無汗小便不利者

三七五

姜棗湯半表症

小柴胡湯去參加茯苓譜語身

重者柴胡龍骨牡蠣湯少陰脉沉小便不利者

大承氣湯或

四逆湯加茯苓少陰腹滿痛便脹並小便不利者

大承氣湯或

又陰盡下利小便不利囊縮小腹痛欲死者急與返食丹

二七五

附子

小便不利以炒蕷蔻附子桂枝湯下陰氣不散彼熱物熨之令氣衝心亦有致死者凡小便閉而厥逆頭汗出者

見前

陽

附子

水難陰虛而陽邪凌襲小便難者出不快也經曰陽入陰而陽熱乘之不可強利必小便黃赤者乃可萬全木通湯利之如太陽汗不正者桂枝湯加附子陽明傷風嘯卧身

二七五

附子

黃耆小柴胡  
湯加茯苓

水利偏前而後便乾枯

傷寒內熱則小便閉，又利尿膀胱主津液而偏滲於前宜乎後便

乾枯

有瘀血症小腹硬滿其人如狂者抵當湯有少陰症

厥逆脉沉者四逆湯或玄武湯去茯苓有陽明症自汗

便利而大便雖硬者不可攻

宜蜜煎法或

猪膽汁灌之有停水心慄者夜半桂苓湯

膀胱移熱

小便頻濁

而不痛裏和則小便清裏熱則小便濁膀胱移熱於小腸則尿血

與赤獨相似道赤散或玄胡索散朴硝二味等分水煎服或加川芎滻利之劑尤妙此亦瘀血中之下症也

腎虛惕熱

小便雖數

而無餘惟虛則小便頻數惟熱則小

陽自汗少便數者雖有表症不可桂枝重亡津液誤服厥者陽不足也甘草乾姜湯心煩脚躁者血不足也芍藥甘草湯有宜下者諭語自汗少便數者調胃承氣湯少與之入汗吐下後小便數大便硬者大柴胡湯陽明汗多小便數

大便硬者胃喎脾約乃約束津液不行宜脾約丸餘瀉遺溺見後危症

協熱自利而渴曰腸垢腸間津分垢膩熱甚純下清泉

協寒自利不渴曰鴨溏鴨屎狀濕毒有如豆汁

陽症自利溏泄身熱

臍下亦熱作渴尿赤後重泄下黃赤故曰腸垢陰症自利太陽手足溫少陰厥陰手足厥冷臍下亦冷不渴利下清白故日鴨溏熱因表邪入裏挾風則所下必暴寒乃直中陰經大法熱宜和解或攻泄或利小便寒宜溫中或固下焦俱不宜發汗令胃氣虛而脹滿作但自利舊分陽症陰症又分協熱協寒而治法相同然陽症自利亦必裏氣虛而表熱乘之乃能自利雖太陽初症下利亦然與表邪傳裏協熱下利無異至於陰即協寒其症尤顯所以云陽症下利語溫則發黃寒出而死此等支離去處每爲合口庶不惑人太槩裏氣協熱下利黃赤者黃芩湯最妙帶表口渴下利者柴苓湯少陰熱症渴而下利者白虎湯少陰熱症渴而嘔渴心煩不得眠而下利者猪苓湯熱甚口燥心

痛下利純清水者太承氣湯潮熱譴語脉滑有宿食者大  
柴胡湯或陷火黃龍湯下利脈和者內實下利脉滑或浮  
大按之反澁不欲食者有宿食並宜下之又太陽初傷風  
下利不惡寒頭痛乾嘔心痞腹痛者桂枝湯加茺花或十  
棗湯胃不利腸鳴下利者生姜鴻心湯小便澁大使利者  
赤石脂丸下利頻而溺逆常者自止橘皮竹茹湯調之合  
病自利及心痞下利見各條○裏氣協寒下利清白太陰  
不渴者理中湯四逆湯寒毒入胃者四逆湯加韭白少陰  
自利虛渴脉微者白通湯厥逆無脉者白通加猪膽汁湯  
通脉四逆湯少陰下利咽痛者甘桔湯厥陰下利先厥而  
後發熱者下利必自止若再厥者必復利也小建中湯當  
歸四逆湯利不止者赤石脂禹餘粮湯又下利身痛者先  
以四逆湯救裏利止但身痛者急服桂枝湯數表凡下利  
譴語直視及厥燥不得眠汗不止無脉及自利不禁身熱  
脉實者皆死○濕毒下利膿血腹滿腸內刮痛如魚腦爛  
死或如黑豆汁者除濕湯猪苓湯地榆散濕挾熟者敗毒  
散黃芩湯白蘞翁湯如無濕但熱毒日晡壯熱腹痛便下  
膿血稠粘者黃連阿膠湯濕挾風者胃風湯加木香濕挾

寒者不換金正氣散加乾姜木香又陽症便膿血者亦名  
協熱腸堵當清其腸津角地黃湯陽明熱入血室下血者  
小柴胡湯加生地枳壳山梔少腹下利膿血者亦謂之協寒鴨溏當固下焦桃仁散赤石脂丸

壯而熱止其利斷下之生也不長少壯以實熱下利不宜  
止溢止之則加熟悶而

死名曰壯

熱斷下

厥而利反能食除中之死也可立

邪在表則能食邪在裏則不能食表裏之間著

欲食而不能食今傷寒厥深下利脉遲當不能食而反能食者名曰除中中之胃氣既除豈可再復

風漏手足繒搐陽虧四肢拘急

四肢諸陽之本腰背太陽之絡因發汗腠理空躁蓋

覆不調將息未久以致風邪復入筋骨之間繒搐有妨行持牛蒡根湯主之如脚繒搐齒者風熱也承氣湯下之拘急者手足不能自屈屈伸不便蹉卧惡風之貌發汗亡陽而有此症汗多小便難者桂枝湯加附子吐一下後厥逆

拘急者，因逆湯心煩足鞶屬血虛者，方藥甘草湯。  
陰陽易病亦有下手足搐搦如風狀者，古瓜竹湯。

太陽腰痛項連尻陽明不回顧少陽如針刺汗無汗傷寒

人參順氣散傷風敗毒散或通氣防風湯粗以刺委中血甚妙大陽合陽明葛根湯少陽柴胡桂枝湯與頭痛參看。

少陰腰痛背及脊太陰遺溺甚腰下如橫木厥張弓風熱

腰下如橫木厥張弓風熱

故腰強急如弓二陰通用五瀆散加杜仲附子或加於

黃芪建中湯當歸四逆湯中尚當於雜病腰痛參看。

陽氣虛而筋惕肉瞤陽氣者精則養神柔則養筋汗下後

津液耗竭陽氣大虛肉筋失養故惕

然而跳躍然而動久則成痿治宜溫經養榮益胃玄武湯是也羸甚去芍藥熟者去附子或陶氏溫經益元湯亦好汗下後頭眩身摇者茯苓桂枝甘草湯心下痞滿者暫與枳梗湯加茯苓汗下後表裏俱虛及素虛之人微發其汗。

膚觸肉戰喘促汗出如油者死人動氣在左發汗有此症者亦危。

風熱極而癥短，癰長。俗云，搐也。瘻則筋脈急而縮短，癰則仲縮不定。狀如風癟，可畏多。因汗下脾土受傷，木旺風熱熾盛，故手足動搖，擣摶必平。木降火以柴胡山梔滌熟，防風羌活祛風，兼佐和血化癆之藥治之，與瘻大同。如聖餅子引風湯、陶氏如聖飲選用。結胷失下，有此症者，大承氣湯、風溫被火癰癧、姜桂湯、火邪湯、經曰：大陽終者，戴眼反折癰癧，汗出不流者死。

邪氣勝則心寒，而慄也。屬陰正氣勝則身振，而戰也。屬陽

戰者，身振而動慄者，心戰而惕。邪氣外與正爭，正氣勝則戰。邪氣內與正爭，邪氣勝則慄。戰則病欲愈，慄則病欲甚。戰屬陽，故一戰搖之間而真陽鼓動，大汗以解不必藥也。慄屬陰，陰無勝陽之理，故恐懼不戰而承乎陽。於是陽反爲陰所制，心寒足踴，顙脰厥冷，便溺妄出，不知人事，純乎陰，而陽敗遂成寒症。宜理中四逆甚，則養正丹、附灸關元穴。若復躁極而不得卧者，不治。若原係傳經熱症，口燥喉嚨，牙齦發冷，有時溫和，脉大而數，表症慄者，羌活沖和湯重。

症標者大柴胡湯

此歌却緣多饑，蟲攻咽及攻胃。  
厥陰又手足厥逆，義也。其人素有食蛔，或因病過饑，虫逆上咽膈而出，妄發其汗，以致胃冷長虫上攻咽膈，胃氣困乏，雖饑不能食，食卽吐蛔者，虫聞食臭氣而出也。外症乍靜，衣煩者，虫或上或止也。又或下利臟寒，則蛔亦上入于膈，然上焦熱而中下焦寒，故雖煩熱消渴便硬，不可遞投涼藥，當先以烏梅丸理中湯安蛔，然後隨症調之。或煩熱不退者，小柴胡湯或熟甚，昏曇腹脹便閉，或蛔不得安，從大便而出者，大柴胡湯。

狐惑蓋緣失汗，虫食臟及食肛。  
此亦虫症也，如狐聽水猶寒，或因傷寒變成其候，四肢流注，飲食惡，聞食氣欲眠，目不能閉，舌白齒晦，面白色變，無常，虫食下部爲狐，下唇有瘡，其咽乾，虫食其喉，爲惑，上唇有瘡，其聲啞，殺人甚急，皆因汗下失宜邪，熱入腹以致飲食少，而腸胃虛，甚則三

重舉而食入五臟食上部者三黃湯心湯主之食下部者  
单苦參煎湯淹洗之食肝門外者用生艾汁調雄黃末燒  
烟薰之通用黃連犀角湯治癩癩杏仁湯金液丹雄黃  
銻散又濕瘡虫症與狐惑症同但專食其臘爲異耳

### 陰陽發斑總是火誰知溫毒時毒

傷寒陽症發斑謂之陽毒春溫發斑謂之溫毒

夏熱發斑謂之熱毒時行與暴溫發斑謂之時毒名雖不同同歸於熱或因當汗不汗及已汗而熱氣不散表虛裏實而發者或因當下不下熱蓄於胃而發者或因下早熱邪乘虛入胃傷血不散而發者或因誤服溫藥胃熱焦爛而發者然皆心火入肺故見紅點於皮毛之間輕如疹子蚊跡只在手足先紅後黃重如錦紋發在脅腹先紅後赤切忌發汗重令開泄甚則皮膚瘡爛陽毒具而紅潤稀疎起發五六日即愈若陰脉見而黑斑稠密成片身涼六七日死先紅後黑如果實者亦死○陽毒舌焦鼻燥發斑者陽毒升麻湯白虎加參湯熱甚者三黃石燕湯三黃湯水煎濃汁服或青黛一物湯熱病發斑與陽毒同○溫毒

因冬煖感溫氣至春風氣相搏發爲癰疹多痒初起升麻葛根湯加玄參或敗毒散加紫草赤芍日夕發渴腹滿便硬者調胃承氣湯加黃連赤芍生地牡丹皮已經汗下而毒不解者黑膏主之○熱病發斑時行發斑身如火色者大青四物湯猪膽鷄子湯○發斑雜症咽痛玄參升麻湯或紫雪丹之飴逆下利者黃連橘皮湯心煩嘔吐者葛根橘皮湯血熱內結者小柴胡湯犀角地黃湯斑盛破爛者芒硝猪膽汁法凡汗下不解足冷耳聾煩悶咳嗽便十是發斑之候宜化斑消斑之藥以防之諸斑藥皆通用惟溫毒挾風稍殊耳○陰症亦有發斑者乃相火乘肺故但出於胷口手足稀少脉沈身無大熱爲異宜理中湯或加附子玄參

血濁如狂有是症爭似發狂

凶狂

有陰盛發躁欲坐井地

妄如狂者然血濁如狂有三症與陽毒如狂相似故舉言之○如狂屬瘀血者脉沈實多漱水不嚥有無表症但血蓄下焦小便自利如狂者有無表裏症脉數善饑不大便如狂者有太陽初症熱結下焦如狂者血自下者卽愈如

外未解者桂枝湯桂枝湯飲外已解但小腹急結者桃仁承氣湯挾血傳心脾者當歸活血湯有太陰身黃瀨澁如狂者狂者本散此皆如狂但暎中忽欲起行錯言妄語猶知諫阻尚可制禦非若發狂熱凶莫能禦也○發狂者熱毒在胃併入於心遂使神皆不定言動急速妄雜妄笑甚則登高而歌棄衣而走踰垣上屋不饑不卧皆因汗下失宜陽氣亢極陰氣暴虛大吐下不止傷寒四五日身熱煩躁不得汗發狂者表裏俱熱黃石黑湯雙解散傷寒六七日壯熱脅滿便閉脉實數發狂者大承氣湯加黃連陽毒暴盛發狂多乾嘔面赤發斑咽痛下利黃赤壯熱而不得汗者草薢苦酒湯咽痛吐膿血者陽毒升麻湯潮熱甚者柏子仁湯潮熱大使閉者升麻葛根湯加大黃或三黃湯發斑不可下者草龍膽一味水煎服狂走者瓜蒂散吐痰時行熱毒發狂者黑奴丸通用水瀆法火劫法王氏玄明粉凡發狂見陽症陽脉者順見陰症陰脉及舌卷囊縮者卽死

多眠陰盛而晝寢不厭傷寒邪傳陰則多眠昏閉目者見陰症陰脉及舌卷囊縮者卽死

也。有太陽症，外已解而神將復者，設若督滿脇痛，鼻乾得汗者，小柴胡湯、脉浮、恙活、冲和湯、冬月、麻黃湯。有陽明熱伏於裏而晝卧者，小柴胡湯、少陰脉流細自利，欲吐而渴，多眠者，四逆湯加人參茯苓以益陰，回陽或熱病得汗後，脉沈細身冷，初覺安靜漸次昏沉，喜卧不肖亦急與四逆湯，令四肢溫不爾，有熟睡而死者，合病目合則汗出風溫常不了了，祇感精神恍惚治見各條，惟汗下後酣睡者，爲正氣已復不必藥也。

### 不眠陽盛而夜卧不遑

或終夜煩擾，或晝夜惺惺不眠，未

根辨肌湯在裏屬心，神不清者，大承氣湯已經汗下，不眠津波乾熱，盛陰虛胃不和也，太陽發汗過多，躁不得眠，欲飲水者，卽愈，若脉浮而渴，小便難者，五苓散，汗吐下後懊憹，不眠者，施灸湯，晝夜不眠者，酸棗仁湯，錯語乾嘔不眠者，龍毒湯，譖語小便淋澁，煩躁少寐者，白虎湯加山梔子，瘀血者，犀角地黃湯，少陰下利而渴，或因汗後不得眠者，猪苓湯，少陰二三日心煩不眠者，黃連鷄子湯下後陽虛，脉沈無表症，夜靜晝煩不得眠者，宜古寒附湯，或四逆湯。

加茯苓汗多者外建中湯傷寒瘥後不眠者陰氣未復也

桔子烏梅湯或溫膽湯

加竹茹

虛者十味溫膽湯

精神恍惚者朱雀丸古法不眠者半熟酸

棗仁

多眠者單生酸棗仁亦好

故亦好

大半生酸棗仁故亦好

亦好

常病常法易知變病變法難詳

右一段論傷寒雜症從面至足及眠逐上詳審以便問症云

陰症微甚分於便閉便通有微甚不同微者寒邪自背前漸入少陰故表鬱亦能發熱但終不如陽症熱甚亦或頭疼但肢厥脉沈爲異古法麻黃附子細辛湯麻黃附子甘草湯附子細辛湯近用辛黃三白湯微而腹痛手足清冷便閉者桂枝加芍藥湯甘草乾姜湯理中丸有表復有裏者人參三白湯或附子細辛湯加大黃甚者不自表分漸入或上從鼻入或下從足入卒中陰經初起無頭疼身熱

脊

便惡寒厥冷或脅腹滿痛嘔利間有熱者虛陽之氣外浮耳太陰腹痛自利附子理中湯痛甚理中合小建中湯瀦溢理中合五苓散少陰口和背惡寒身痛虛渴或發熱脉沈下利者名夾陰傷寒附辛湯少陰下利清穀或咽痛脉微者四逆湯利不止脉欲絕若白通湯無脉者白通加猪膽汁湯厥陰下利小腹痛或消渴吐衄者當帰四逆湯凡生姜頻擦唇口擦後黑轉爲紅乃吉

陰症常變察其有力無力厥冷吐利不渴靜躁此陰症之大抵衣去彼此陰症之變也若認作陽症投涼必死須察脉有力無力如重按無力或全無者便是伏陰急與五積散通解表裏之寒甚加姜附如果有力乃陽症似陰也不可不辨陰症無脉者姜酒半盞服之或吞四順丸又病人有痛處當知痛甚者脉必伏如無痛症用此法脉不來者死如原無正脉須覆手取之乃陰陽錯亂也宜和合陰陽陰厥不熱便厥而下利清熱吐利不渴靜躁等症乃陰

利

邪獨勝而然手足盡冷乃厥陰所主陰陽之氣不相接逆而然非比傳經四逆之漸冷也太陰厥手足指頭微冷者理中湯少陰厥脛寒足冷甚則手至臂足至膝若四逆湯通脉四逆湯厥陰厥一身盡冷者當歸四逆湯厥逆煩躁者不治自開云冷厥初得病四肢逆冷脉沈細卧多擣足或惡寒指甲青色或自引衣覆身或下利清穀或清便自調小便數外症惺惺此冷厥也四逆湯三昧參更湯選用凡病熱多厥少者易愈厥多熱少者難已又有血厥四物湯氣厥四君子湯暑厥白虎湯水厥心下怔忡矣苓桂甘湯厥不厥卽半惡冒犯不正之氣而然木香勾氣散合平胃散或追加湯此厥見前

陽厥微厥便熱而下利黃赤陽厥者未厥前有頭疼有身陽邪深入陷伏於內而後發厥微厥半日間却又發熱熱氣下行則腹痛下利後重稠粘黃赤必見膿血若不便血熱氣上行則必喉痺又熱厥傳經七日不退者其後必便膿血若陰厥腹痛下利清白不渴以辨之尤的詳前熟厥

**暈厥**

**挾痰與伏火**

暈者昏暈傷寒乃熱結胃滿痰盛口禁不省人事先用綿帕裹指牙齦上類類

擦之候牙寬却  
用大承氣下之

**臟厥**

發熱七八日脉微膚冷而躁或吐或渴無時暫安者此乃厥陰真臟氣盡故曰

臟厥仲景無治法四逆湯冷飲救之又少陰厥而吐利發躁者亦不治三昧參萸湯救之

**陰毒**

**冷汗甲青而六脉沈細身痛若鞭**

三陰病深必變爲陰毒有初症蹶然

而成者有誤服寒藥或吐下後變而成者蓋以房勞損腎而生冷傷脾內已伏陰外又感寒致之內外皆陰陽氣暴絕故其外症比常陰症厥冷吐利不渴靜躁甚則咽痛鄭聲加以頭痛頭汗眼睛內痛不欲見光面白唇指甲青黑手背冷汗心下結硬脅腹築痛身如鞭朴外腎冰冷或便膿血診其脉附骨取之則有按之則無宜甘草湯正陽散或玄武湯加人參連用陽氣復而大汗解矣陽氣乍復或生煩躁者返陰舟復陽舟金液丹不可涼藥並加生姜良姜要

葉也外借火氣相不可大近承和詩云陰毒傷寒身體重  
背溫眼痛不甚任小腹痛急口青黑毒氣衝心轉不禁四  
肢厥冷惟思吐下利咽疼脉細沉若能速灸臍輪下六日  
看過見喜深葱熨法見繩臂以手足和爲吉如手足指冷

甲下肉  
黑者死

陽毒無汗眼紅而遍身斑紋胷緊若石

三陽病深必變爲陽毒有初病遽然

而成者有經吐下變而成者多因酒麴金石僭燥腸胃極  
熱所致又或症屬陽明誤投溫藥助熱爲邪內外皆陽陰  
氣暴絕故耳外症比常陽症潮汗閉塞蒲渭狂譖甚則發  
瘈喘急加以吐血咽腫兩眼如火六脉洪大促數宜黑衣  
丸自鹿湯二黃湯生地芩蓮湯陽毒升麻湯咽痛及赤斑  
者青黛一物每用二錢井水調服或活龍散尤妙陰氣復  
而大汗解矣外用冷水蘸紙搭胷熱又易之詩云陽毒健  
亂四肢煩面赤生花生點斑狂言妄語如神鬼下利黃赤  
喉不安汗出遍身應大瘡出口開張命欲翻有藥不華但  
與服能過七日漸能安又陰陽二毒伏連變爲結臂有自

利者有大便閉用藥而不得利者宜結督條炎臍法以利之陽毒內服活龍散陰毒內服破結丹庶幾陰毒得泄則陽氣復陽毒得泄則陰氣復陰陽升降榮衛流行自然大汗而解矣若心下已結延至五日間斷不可活

陽盛拒陰大熱症也脉數而身反盡寒

陰盛拒陽大虛症也身熱而脉不鼓擊此言陰陽隔絕必毒而已病人身寒歟其脉滑數按之鼓擊於指下者非真寒也此名陽盛拒陰宜三黃巨勝湯身熱脉數按之不擊或身冷而欲坐井中欲漱水而不入口者非真熱也此名陰盛拒陽宜霧靈散

取症而不取脉可汗可下脉滑可下以熱入府而不大使流可汗以熱在裏故也故用溫藥微汗使身不發熱其敢汎之乎脉

憑脉而不憑症似陽似陰

常法清高貴客脉症兩懸勞苦粗人多憑外症又有信一二分

症者又有信二三分脉者須要臨時參

酌傷寒陽症似陰陰症似陽全憑脉斷

太陽症裏虛而脉沉補中宜發

太陽症發熱頭疼脉宜浮

宜救裏使正氣內強逼邪自出四逆湯中用姜附補平根

中兼發散也假如裏不寒則脉必浮乃麻黃常症耳

少陰症表鬱而反熱發中宜補

少陰症當脉沈無頭疼無

發熱今反發熱者寒邪在

表鬱閉爲熱耳然終無大熱或下利手足冷爲異耳用麻

黃以發表間之熱熟附以溫少陰之經加細辛爲汗劑之

重者去細辛加甘草爲汗劑之輕者若使寒邪入裏則外

必無熱是四逆症也

憇太陽少陰脉沈發熱同而受病與

藥別也微哉他如少陰心煩不得眠或咽瘡聲不出或咳

而嘔渴或口燥咽乾腹脹不大便數症皆熱也豈可槩以

溫藥治上

之耶

脉伏而必有邪汗當致尚非真氣之脫亡

一手無脉謂之

單伏兩手無脉

謂之雙伏雜病得之則危傷寒表症脉伏因寒邪鬱閉其  
脉冬月麻黃湯三昧羌活仲和湯以汗之不可誤爲陽得  
陰脉如裏症脉伏因熱邪陷結而不流通宜  
和解俟病稍減而脉至乃敢審症輕重下之

脉無而將欲正汗勿攻譬如此旱之甘雨

傷寒病六七日來別無刑羌症

忽皆脉不省脉靜或無此欲作正汗如久旱將雨之吉兆  
喘促無脉者加味生脉散中暑脉無者白虎加參湯陰躁  
無脉者回陽返本湯下利脉不至者白通加猪膽汁湯或  
因汗下太過無脉者亦必有正汗急用四逆湯溫之脉結  
者灸草湯熟厥煩渴無脉者解毒湯合小柴胡調之寒  
厥營閉其脉兩手俱無亦是好汗相逼汗出自愈麻黃附  
子細辛湯或麻黃附子甘草湯加人參五味子以回陽助  
汗諸症服藥仍前無汗脉不至者皆死汗出脈續出則愈  
或先溫而後一汗身輕

厥陰下利腹痛身疼先溫裏以四逆湯後發表以桂枝湯

或先解而後一攻便愈

太陽症如在者表邪未解熱結膀胱精采與人不相當譖語煩

躁先以桂枝湯解其外後以杏仁承之  
氣攻其裏小便不利者五苓散滲之

有表症而反不可汗者焉必其表之將入於裏  
而發渴脉浮表將入裏未可汗也誤汗者玄武湯救之

有裏症而反不可攻者焉必其裏之未全於府  
若惡寒脉不實裏猶帶表未可下也誤下者理中湯救之

利半表而溫半裏半表裏極難識有言身前後者有言身  
解少陽之半表裏也身後爲太陽身前爲陽明少陽居中  
或從前或從後寒熱莫定此以身之前後而言也五苓散  
分利膀胱之半表裏也膀胱寒水近陽明燥金水多則寒  
濕多則熱故亦往來寒熱也此以太陽陽明之間而言也  
理中湯治吐瀉不定上下之半表裏也以身之上中下而言

汗三陰而下三陽

此皆變法也。三陰不當發汗，常也。然太

正

麻各半湯以助其熱耳。少陰反發熱，脉沉。麻黃附子細辛湯汗之。微熱無厥逆，諸裏症者，麻黃附子甘草湯微汗之。是三陰未入於臟者，皆可汗之。太陽忌下常也有。魯汗吐下而小便數大，便閉者，太陽陽明宜大承氣。少陽陽明小承氣。正陽陽明調胃承氣是三陽已入於臟者，皆可下之。胃與大小腸爲三陽，臟乃藏物之臟也。

顛倒六經非真見，不敢

脉絡貫通故也。百症云均上頭痛身熱也。內實不大便者宜下外實

小便清者宜汗盡皆不拘常

法如此，非真見能如是乎？

反覆汗下有神手何妨

以表裏邪未溌也。

右一段論傳陽變陰之極，變病變法推究融會以

盡其妙

戰汗已占病可解。戰者邪正相爭也。有戰而汗解者太陽虛故與邪戰而後解也。有不戰而汗解者陽明也。脉必浮數不乳浮爲表。不乳爲正氣不足故不戰而汗解也有不少戰不汗而解者少陽也。雖有寒熱表邪寸闊尺大小浮沈遲數同等而無偏勝不日陰陽和平而自解矣。又柴胡症誤以藥下而柴胡症仍在不爲逆更與小柴胡服之必蒸蒸汗出而解。日中得病者夜半解。夜半得病者日中解。凡身寒鼓額戰慄急與姜米湯熱飲以助其陽。老人虛弱發戰而汗不行隨卽昏悶者不治。又渴甚飲過者黑怒症也。亦汗出而解。

發痒誰識疾將移。象非風非血燥也。

癰後昏沈非怪魅。癰後半月十日昏沈少神錯語妄言或無寒熱或寒熱似瘧或朝夕潮煩皆由汗出未徹毒流心胞絡間。取麻黃湯主之。無表邪者陶氏藜赤各半湯極妙。大病後喜嘔痰者理中湯。胃熱虛煩。

而嘔者竹葉石羔湯加姜汁從腰以下有水腫者牡蠣澤  
鴻湯手足攀搐者牛蒡根湯遺精者桂枝龍骨牡蠣湯加  
鹿茸一錢或十六味溫膽湯瘧後不食參苓白朮散根术丸  
瘧後狂言益元散加辰砂瘧後失神及乾嘔柴胡百合湯  
瘧後血迷當歸活血湯瘧後腰痛獨活寄生湯瘧後聲沈  
補中益氣湯瘧後體瘦肌熱或咳嗽者用柴胡二錢甘草  
等症俱照常治法輕者損穀節慾慎動自愈

遺毒不散發瘡痍凡傷寒三日後脉數而熱不能者此爲  
耳傍連頰腮有結核硬腫者謂之發頤或汗出不徹項後  
流於大腸或肝門井小腹腫痛謂之臘毒或瘧後項下頸  
邊生風堆數枚不紅不痛如瘰癧之狀或瘧後  
發疹者俱宜清熱涼血瀉毒去風外科法治之

勞復食復飲酒復者熱甚復者其病如初也傷寒新瘧津  
言動思爲太過則成勞復蓋勞則生熟熱氣乘虛還入經  
絡未免再復治宜清熱解勞小柴胡湯麥門冬湯和之熟

氣浮者施政枳實湯。鼠屎豉湯。表症多者柴胡桂枝湯。汗之裏症多者大柴胡湯下之。○傷寒新瘥胃氣尚弱若恣飲食不能消化。濁穢臟腑依前發熱。若用調和脾胃藥。胃熱轉增。大凡傷寒無和胃之理。治須清熱消食。輕者。胸中微滿。謂之遺熱。損穀自愈。重者。胷高喘痛。胃脹必須吐下。施政枳黃湯主之。煩熱甚者。竹葉石膏湯。胃痞者。生姜薑鴨心湯。○飲酒復者。其熱尤甚。蓋酒性至熱。必煩躁乾嘔。舌胎妄語。不寐者。解毒湯或草龍膽一味水煎服。汗出自解。凡復症先病七日出汗而解。今復舉亦必七日而解。先病十四日出汗而解。今復舉亦必十四日而解。雖三四次復舉亦必三四次戰汗而解。但勞復症久不愈。恐成癆瘵。

### 陰陽陽陽陰陽交者命危

男子新瘥婦人與之交而反得病曰陽易。婦人新瘥男子與之

交而反得病曰陰易。言陰陽感動其毒著入如換易也。其病狀身熱。熱衡。頭重不能舉。眼內生花。乃所易之毒上衝也。四肢拘急。小腹腰胯皆痛。陰腫。手足攀卷。陰氣已極。外縮入腹。痛引陰中。吐舌數寸。而脉離絃者。卽死縱不死。

百節解散，經脈緩弱，氣血骨髓空竭，恍惚呼吸氣力轉少。  
不能着床，起居仰人，牽引歲月，仲景有鹿膠散，赤衣散，假  
鼠糞湯可救其失，囊縮，腹引，陰痛，欲絕者，單青竹皮水煎，  
服之，陰火上衝，面赤如烘熱，心煩悶者，八物湯，竹皮逍  
遙散，四肢拘急，不任者，當歸白朮湯減，單乾姜四兩，水煎，  
溫服，汗出手足自伸，挾痰惡寒嘔逆者，橘皮竹茹湯。○有  
不因易而自病復者，名曰女勞復症，治亦相同，但多增寒  
發熱，用假鼠屎，竹皮燒棍之類，虛弱者兼用，人參逍遙散，  
小腹急痛厥冷者，當歸四逆湯加吳茱附子論云，餘勞尚  
可，女勞卽死。○陰陽交者，凡發汗後，脉躁疾，不爲汗衰狂  
言，不能食，謂之陰陽交，言交合陰陽，  
之氣爲邪所傷，不可分別，此死症也。

**一病百合** 經絡將何以識？病後未甚，平復失於調理，餘症  
陰醫反汗之，以攻陽，以此百脉一宗，各不得解，無復經絡  
傳次，似寒又無寒，似熱又無熱，欲食不能食，欲卧不能卧，  
欲行不能行，有時又或強健，但能睡卧，不能行，口作苦來，  
藥入卽吐，有如邪祟治以百合爲主，以其能和百脉也。分

汗吐下後加減及陶氏柴胡百合湯渴者瓜萎牡蠣湯又百合洗法洗後淡食將養勿用益豉頭痛者六十日愈不痛者四十日愈頭一  
駁者二十日愈

### 遍身不仁 针火頑然無知

不仁者頑麻不知痛痒 汗下氣

襲經絡凝滯經日少陰脈不至 胃氣微精血少 寒氣上奔  
血結心下陽氣退下熱歸陰股與陰相動令身不仁 是爲寒  
尸厥 甘草乾姜湯桂枝湯加芍藥乾姜補益氣湯駢

### 四般壞症

#### 犯何逆

傷寒病邪未退或重感風變爲溫瘡或

毒或重感疫氣變爲溫疫又太陽病三日已汗吐下及溫  
針不解者此爲壞病言正氣已虛而邪氣留滯及過經不  
解瘥後虛羸少氣皆名壞症疾候變易不常必視其犯何  
逆以治之表症多者知母麻黃湯半表者小柴胡湯溫膽  
湯餘熱不能者參附芍藥湯大渴者黑奴丸  
虛煩者竹葉石膏湯諸藥不効者鱉甲散

**五臟死候**

**死候**

**巧莫施**

水漿不入、汗如油、形體不仁、喘不休、命

絕也、汗出髮潤肺先絕也、形如煙薰直

視、搖頭心絕也、唇吻反青肝絕也、壞口黧黑柔汗發黃脾絕也、溲便遺失狂言直視腎絕也、陽氣前絕陰氣後竭其人死身色必青陰氣前絕陽一

氣後竭其人死身色必赤

**搘衣摸床**

**泉清知熱在**

傷寒搘衣摸床兩手搘空直視常向壁卧頭不安枕脈澁搘衣

縫者死脉弦者生諸敗症皆然此症發熱譖語大承氣湯下之如發黃渴利者津液赤鴟猶可救療若溺齒者難治

**搖頭直視**

**風痙非絕於心**

陽脉不和則頭爲之搖有心絕者搖頭直視形如烟薰卽死有

瘡病風盛則搖者小續命湯加減有裏痛而搖者言者爲

虛不言者爲實如聖餅子芳木湯芎辛湯二陳湯選用○

臟腑精華皆注於目直視者反自倒竄眼睛上騰死症也惟無表裏瘡目中不了了睛不和者乃肉熟神昏非直視

也又衄血發汗則直視血虛發汗亦直視脉弦者可救若脉澁狂言譖語喘滿直視必死

口張目陷不復肢冷臍硬難禁

腎氣下脫遺尿

小便自遺惡症也陽邪神旨自遺而猶知者清熱可愈合病遺尿白虎湯裏熱承氣

湯瘀血杏仁

三七

承氣湯陰邪氣脫自遺若不知者溫補救其

萬二餘熱氣虛有火者補中

三七三十

益氣湯加知母黃柏五味子

麥門冬下虛者四逆湯加益智仁

三七十五

囊縮者三朱參姜湯加附子大劑急救之狂言直視冷汗遺尿者腎絕卽死風溫

直視遺一

尿亦死

心竅有毒失音

肺主聲被火傷而瘡痍有少陰病咽喉生瘻而不能言者小承氣湯有狐惑症聲嗄不能言者有風溫下利不語者有中暑失音有瘀血迷心失音者各宜分治須謂道二便以通

心竅爲先通用通瀉散吹鼻

智圓行方竊唐進士之正學好生起死慕秦越人之慈心

唐時醫道大衰，孫思邈因醫而興，爲枝流。朱子惜之，故外學引其言曰：智欲圓而行欲方，膽欲大而心欲小。此真醫學之秘訣也。世有善記誦古全醫籍，而治人無効者，非失之方，而不圓通，傳失之心粗，而膽小耳。果哉！遂吾好生之心，以濟眾疾，殘矣！如扁鵲有起死之功，當先理預眞人之學問云。

### 婦人傷寒與男無異，經來經斷名曰熱入血室

仲景傷寒不分男女

但婦人以血爲主，血室卽冲脉血海也。如傷寒發熱，經水適來，晝則明，夜則譖語。如見鬼狀，經行盡，則熱隨血散，不治自愈。如經盡，熱退，身涼，脅滿，如結，或譖語，若乃邪氣結於胷脇，按之痛者，亦謂之血結胷，宜海蛤散、桂枝紅花湯。婦人傷寒，寒熱以瘧經水適，斷者亦名熱入血室。其血必結，而不下行，小柴胡湯、黃龍湯加牡丹皮、杏仁、婦人此症最多，切忌汗下。若見喜忘如狂，腹滿泉清，當以瘀血法治之，又不可拘於不下也。然男女均自此血海在男子血室得熱，則必妄行，多爲下血，譖語頭汗，見陽明症，爲異耳。男子由陽明而傷，婦人隨經而入。

產前產後謂之法無犯胃

產前安胎產後補溫爲主古法

謂攻下也犯上焦者謂發沫也犯中焦者謂取吐也不可

發汗吐下但當和解胎前凡藥必加白术黃芩安胎爲主

尋常外感小柴胡

夫半夏

加白

术合

四物湯

或合

四君子

湯最能保胎除熱如傷寒太陽症見九味羌活湯合四物

湯陽明症見升麻葛根湯少陽症見小柴胡湯太陰症見

平胃散

加白术枳實

熟者

太柴胡湯

加厚朴

當歸

少陰症

見人參三分

白湯加當歸

熟者

太柴胡湯

加厚朴

當歸

少陰症

者六順氣湯已上俱宜合四物湯服之其餘變症照依

古法表症具者芎歸

芍藥

甘草

術湯前胡

七物湯黃龍湯傷

暑者柴胡石黑湯嘔逆不食胎動者麥門冬湯嘔吐不食

心煩者薑根湯發熱煩悶者生菖根一味水煎服發瘧者

梔子大青湯升麻六物湯發在者秦艽散時氣大熱恐胎

墜者用伏龍肝末水調塗脐下乾則再塗病瘥乃止如胎

已死者葱豉湯葱白一物湯○產後傷寒發熱宜四物湯

倍芎歸加軟柴胡炒乾姜人參佐之如惡露去者柴胡

服後湯凡藥必加四物湯烏丸乃養血之源也六經見症

卷三  
一  
西  
一  
東

同胎前用藥外感四氣咳嗽惡阻旋覆花

湯面赤發喘竹葉防風湯更參婦人門

浮沉升降順天時

天地陰陽之氣鼓擊而生春夏秋冬

同二分則氣異陰陽相錯而人病由生此事難知云春不

服白虎爲浮金也秋不服柴胡爲鴻木也以此推之春耳

夏卒秋酸冬苦

苦四季宜鹹

南北東西隨水土

東南山谷地氣濕熱病多自汗西北高燥地氣寒涼病多無汗中原上饑病多

脹飲食居處各不同故麻黃桂枝自西北二方居

人四時服之無不應驗自江淮間惟冬及春可行之

潛心之下真有易道存焉

六經名義有八卦之理此事難知以六十四卦配合日用至於

朝大黃暮附子朝附子暮大黃變易之義也麻黃

桂枝瓜蒂等方甘象辭例也泥象熟方不知易也

反掌之間似乎兵決萬矣

東垣曰用藥如用兵機無輕發此事難知云治法如孫子用兵

若在山谷則塞漏泉在水陸則把渡口在平川廣野當青  
野千里塞漏泉者刺俞穴一把渡口者奪病發時前青野千  
里者如肌瘦羸宜廣服大藥以養正又曰補益者守也汙吐下者攻也調和者廣畧而決勝也

由丹溪而入長沙秋江澄澈

涉河澗而步東垣春山紅紫仲景傷寒專爲霜降至春分  
丹溪分別時令直中東垣力辨卽病者設河澗補溫暑一法  
經肯透徹眞如春山千紅萬紫無所不備惟識生平之則存乎  
人耳議者謂陰症雜病乃後人增入論中又謂溫暑亦無陰症皆道其常而不知其變耳

噫學未究乎張劉朱李且勿議乎叔和無已勉之勉之醫

囊無底

右一段論瘡症危症死症及婦人傷寒



