

卷之三

#1336609111
v.8

編註醫學入門

三卷下

總方

傷寒用藥賦

百全汙四下滲和解溫補總方


棄七內外傷辨

九草內傷辨

內傷

四氣脾胃虛實傳變論

十五內傷饑餉勞倦總方



傷寒用藥賦

太陽無汗寒傷榮臘月麻黃湯爲最

太陽有汗風傷衛臘

月桂枝湯

可先易老冲和湯卽九味治風寒而發於三季

陶氏冲和湯分陰陽以救乎雙傳

此方以兩感必死但陽之中病卽愈如不愈者看表裏陰陽多少用藥是以用九

味桂枝湯去蒼朮加柴胡乾葛石羔黑豆皆三陽經藥也

陽明之本宜解肌審葛根白虎

於寒熱傷風有汗表虛者桂枝湯○傷寒無

汗表實者葛根湯○不惡寒

反惡熱二便不閉者白朮桂湯陽明之標須承氣詳痞滿燥

實於便堅

痞滿燥實俱全者大承氣湯○有痞滿而無燥

實者小承氣湯

有燥實而無痞滿者調胃承氣湯行陽明帶表之秘

小柴胡湯擅少陽和解之

氣大柴胡湯

行陽明帶表之秘小柴胡湯擅少陽和解之

權有痰妨胃滿，_三蒂散

梔豉湯

緩緩飲無頭疼身熱附子

乾姜熟熟煎

_{古姜附湯}乾姜一兩生附一枚水三盞煎至

脉不至加

_{三石加}理中湯

建中湯治太陰中臟寒之不足桂黃桂

苓桂枝太陰

_{傳經}月臍熱之不平

桂枝加大黃湯桂枝三錢芍藥四錢甘草二錢大黃二錢姜

五片棗二枚水煎溫服治太陰傳經熱症腹滿而痛咽乾而渴手足溫脉沉有力本方陶氏加枳壳柴胡臨服入檳榔水三匙如腹滿不惡寒而喘去甘草加太腹皮桂枝加芍藥湯桂枝三錢芍藥四錢甘草一錢姜四片棗一枚水煎溫服治太陰腹滿扁甚或太陽病下之轉少陰熱症屬太陰自利者亦宜

陶氏桂苓飲五錢散

小承氣湯

反之四逆倍甘草拒陽可愈

_{四逆}厥陰熱症

承氣湯

反之四逆用當歸似瘡自痊

_{當歸}四逆湯

此雖六經之

正治實具百病之真鑑表裏陰陽通治

凡言表症分有汗俱於前正方

內隨經選用凡言裏症分傳經直中俱於前正方內選用
凡言陰症俱於前溫中熱藥內選用凡言陽症俱於前通
裏寒藥內選用是教方可以代百方雖曰神景方法猶有
遺失之根據愚見於此推類而通於雜病則方法亦無以
加矣汗吐下溫兼全凡言宜汗卽前正方中或發表或解肌
之劑選用凡言宜吐卽前正方中或採
吐或瀉滯之劑選用凡言宜下卽前正方中潤下湯泄之
劑選用凡言宜溫卽前正方中暖寒亡陽之劑選用是教
法者可以兼百法貴乎用之當耳設用麻黃令人亡陽汗
出不止將病人頭髮水浸外用糯米粉并龍骨牡蠣未搗
之誤用硝黃令人不禁用理中湯加炒糯米烏梅壁土止
之設用姜附令人失血發斑用蘿蔔汁或子搗汁或泥漿
汁再入黃連甘草犀角可解其毒不然身有紅處乃血欲從各竅出也抑又聞風寒總曰汗
病麻桂不可亂嘗不論傷風傷寒皆以得汗則散無汗服

桂枝而嘔吐失血下利者變用傷寒無汗或酒客誤服桂枝湯而嘔吐者必吐膿並爲肺痿症又有其病當汗而適值失血及下利者不可與麻黃湯宜小劑桂枝湯頻頻飲之體潤自然和解三七四有

汗服麻黃而煩躁寒熱似瘧者相當傷風服桂枝湯不雜乃邪客榮衛宜桂枝二麻黃一湯若非此症誤服麻黃者必煩躁衄血衄血與上肺痿二症照依難症以清血涼血之劑畧加和表之藥如犀角地黃湯黃芩湯加柴胡是也傷寒輕者麻黃杏仁飲麻黃桔梗前胡黃芩陳皮半夏各一錢杏仁細辛各八分防風七分甘草四分姜三片水煎溫服治太陽發熱惡寒頭痛無汗脉浮緊而咳嗽如夏月去麻黃加蘇葉自汗去麻黃加桂枝芍藥表熱換藥胡口渴加天花粉智滿加枳壳喘急加

白芷
桑根
傷風輕者柴胡半夏湯柴胡半夏各一錢半黃芩白芷各一錢甘草五分姜三片棗二枚水煎溫服治傷風發熱惡寒頭痛無汗而咳嗽或協熱自利兼治一切癰症狀似傷寒如小便

不利加葛根。冬月無汗加麻黃。三時無汗加蘇葉。冬月有汗加桂枝。三時有汗加防風。咽痛加桔梗。喘嗽去白朮。加杏仁桑白皮。酒熟加黃連。食積加山楂。神曲。痰伏膈下。作金瘡草。前胡。芻。白芥子。痰盛喉中如牽錐。加竹瀝姜汁。麥門冬。加膠加

金瘡草。前胡。芻。

大羌活湯

主治陰陽兩感

防風。白芷。黃芩。連

蒼朮。白朮。甘草。細辛。各三分。知母。川芎。芍藥。黃芩。各一錢。水煎。熟服。未解再服。三日内剗病愈。則止。治發熱惡寒無汗。或自汗。頭痛項強。或傷寒見風脉傷風。見寒脉。兼鮮利。兩感傷寒。此方治陰陽已分。陽症多者。宜服陶氏沖和湯。爲陰陽未分者。設大青龍湯。善解風寒兩傷。麻黃三錢。桂枝二錢。杏仁一錢。姜三片。棗二枚。水煎溫服。方意以寒宜甘。發麻杏石。甘棗之甘。以散榮中之寒。風宜辛。散桂枝生姜之辛。以散衛中之風。辛甘相合。乃能發散。榮衛風寒。則衛實寒傷。則榮實。榮衛俱實。太陽症具。無汗而煩躁者。宜服若脉微。有汗。榮衛俱虛。若誤服。則厥逆。逆筋惕肉瞶而亡。合病嘔。而不利。葛根加以半夏。葛根

加半夏湯葛根三錢麻黃二錢桂枝一錢半夏芍藥各一錢甘草八分姜三片棗一枚水煎服治太陽陽明合病裏氣逆上但呕而不下利者與葛根湯以散其邪加半夏以下逆氣合病利而不呕兼參加

以半姜黄芩半夏生姜湯黃芩二錢芍藥生姜各二錢半夏下錢甘草五分姜五片棗一枚水煎溫服治太陽少陽合病自利而呕或腸堵協熱自利非汗下所宜故用此和解以下胃之逆氣太陽併病陽明

芍麻葛硝黃耆罷未

太陽症未罷無汗者葛根湯有汗者去麻黃大陽症已罷陽明症見者調

氣湯太陽併病少陽者麻桂柴胡要酌量

無汗者小柴胡合麻黃湯有汗

者柴胡桂枝湯三時與輕者小柴胡湯爲主仍以羌活防風代麻桂可也春夏秋冬疫癘并麻

人黃如意

升麻葛根湯方意以四氣不和營毒爲疫故用

毒更妙於敗毒散

人中黃丸太黃黃連黃芩人參桔梗

薯木防風滑石香附人中黃各等分爲末神曲糊丸梧子

补

大每七十丸氣虛四君子湯下血虛四物湯下痰多二陳湯下熱暑加童便如無入中黃用糞鉤岸代之或礞砂雄黃爲衣亦好如意丹川烏八錢橘人參柴胡吳茱萸川棗白姜白茯苓黃連紫苑厚朴肉桂當歸桔梗皂角石菖蒲各五錢巴豆二十錢半擇吉日於不聞鷄犬處靜室誠心修合各取淨末棟蕊爲丸桔子大硃砂爲衣每三丸或五丸七丸專治溫疫及一切鬼祟伏戶傳毒發狂失心山嵐瘴氣蠱湯或白湯下風疫及宿患太風身體頑麻不知痛痒眼淚不下睡卧不安面赤紅日久鬚眉痒脫唇爛齒焦偏頭痛紫癜瘡癬左癱右瘻鶴膝風疼一切風疾荆芥前湯下寒疫及小腸氣痛小茴煎湯或吳萸煎湯下暑疫及五淋燈心前湯下熱甚大黃煎湯下燥疫生地或麻子仁煎湯下或冷水下濕疫及水腫車前子或木通煎湯下十種木氣甘遂大戟煎湯下癰瘍其遂煎湯下膀胱病氣腫疼蘿蔔煎湯下五般痔瘻白藜湯下五癰乳香湯下胃臟積咬齒齶涎腰疼鹽湯下五瘡艾枝煎湯下失心中邪柳枝丸枝湯下陰陽一毒傷風咳嗽薄荷煎湯下五痔八癰腸風臘毒陳米煎湯下諸般咳嗽姜湯下小兒十二驚

風薄荷煎湯下治癰癧瘻瘍癰瘻瘍癰瘻瘍消渴大小腸閉
或泄或利酒毒便紅喉痺重腮誤吞銅錢金石藥毒不服
水土溫湯下治瘻疾紅甚黃連煎湯下婦人血海久冷帶下
亦白難爲生育及諸般血氣艾湯下此方通治山腳素不
服藥之人存乎善用耳

風寒暑濕邪氣藿香正氣預防散厚朴陳皮不換金正氣

藿香半夏蒼朮各一錢甘草五分姜三片棗二枚水煎溫
服治四時感冒傷寒時氣溫疫山嵐瘴氣但竟四肢拘急
心腹滿悶飲食不化或有吐利惡寒等症却未發熱者宜
此先正胃氣以預防之兼治霍亂吐瀉下痢亦白不服水
土等症如感冒更加頭疼發熱胸滿者藿香正氣散取前
症更加身痛者入參敗毒散九味大羌活湯○藿香正氣散

藿香紫蘇白芷太腹皮茯苓各六分厚朴白术陳皮桔梗
半夏麴各四分甘草二分姜蜜煎服治內傷脾胃外感寒
邪寒熱拘急頭痛嘔逆胸中滿悶與夫傷食傷冷傷濕中
暑霍亂山嵐瘴氣不服水土寒熱如瘧並宜增損用之非
正傷寒之藥若病在太陽頭疼發熱骨節痛者此方絕無
相干誤服反虛正氣逆其經絡凡氣虛及夾陰傷寒俱不

可
用春溫通聖雙解

防風通聖散、防風川芎當帰赤芍大黃

芩桔梗各五分、滑石一錢半、甘草一錢半、荆芥白朮山梔各一分半、姜三片、木煎溫服。治春夏溫熱狀如傷寒，表裏俱見者，兼治內科一切風寒燥熱及飲酒中風或便閉或飧泄，或風熱上壅不言等症。雜科耳目口鼻唇舌咽喉風熱風癰等症。外科癰疽瘡癰發疎打撲跌傷等症。小兒驚癇積熱諸風潮搐痘出不快等症。婦人諸疾。令四物湯一料。凡屬風熱之疾無所不治。如有利去硝黃，自汗去麻黃，名通聖散。○雙解散，即防風通聖散合益元散等分，姜葱甘草煎服。欲吐則採吐，欲下則下，欲汗則汗，故名雙解散。治風寒暑濕饑飽勞後内外諸邪所傷，以致氣血怫鬱變成積熱，發爲汗病。往來寒熱癰疽驚悸等症。小兒瘡疹，亦然。始自利去硝黃，自汗去麻黃。○夏熱益元散方 益元散又名六一散，取天一生水，地六成之義也。滑石六兩，甘草一兩，爲末，每三錢入蜜少許，沸湯調服。熱者冷水調服。孕婦慣半產者忌服。如傷寒身熱不解，加蒼朮末三錢，葱豉湯調服，進數服。汗出爲度。又汗吐下後餘熱。

以_丁此解之甚妙。虛煩不卧加辰砂少許。身熱霍亂嘔吐轉筋者先_乙拭地坑傾新水一桶在內攬勺澄清謂之地漿水。另用井水一碗入油一匙浮於水面將此藥撒在油花上其藥自沈碗底去清水用前地漿水調服名油墜散下一切風熱上壅咽喉不利加青黛薄荷少許蜜丸論化一切寒症瀉痢嘔吐反胃如乾姜五錢名溫六丸中寒甚者再加三硫黃少許用生姜汁浸炒餅丸又能伐肝邪一切暑症作渭新汲水下感田禾燒氣作渴用帶泥稻稈煎湯下一切濕熱腸癖泄瀉其滑石用牡丹皮煮過加紅麴五錢名清六丸用陳米飯丸每五十丸白湯下如產後腹痛自利用補脾補血藥下或加五靈脂一兩能行血止痢瀉甚加肉豆蔻少許一切瘀熱吐逆反胃驚癇頭暍熟毒瘻瘍腹痛加黃丹少許姜汁蒸餅爲丸服如溫暑輕者通用丸味茱萸湯加裁入裏如大黃柏子升麻湯合秋令之晚發苦寒各一錢石黑甘寒二錢姜三片水煎溫服治晚發傷寒太陽症具不可大汗宜此清肺解熱兼治溫熱及虛煩不止白芷加桂枝無汗加蘇葉葛根虛煩加

旨

知母麥門冬

加天花粉

咬礪加杏仁

此方潤燥深含思

意以秋爲晚發經日燥淫於內治以苦溫佐以甘辛正此

方之謂也他如張子和六神通解散用蒼朮石羔滑石黃

芩芩黃芩草姜葱煎服雖以三月爲晚發亦不甚宜或疑

冬傷於寒春必病溫晚發乃溫病之遲者夏傷於暑秋必

病癟豈可以秋病爲晚發耶殊不知癟有一日一發或熟

多寒少者其邪淺夏傷於暑而然也有二日一發或寒多

熱少者其邪深結成癟母非隔冬寒邪帶伏後再感暑而

後發動若本夏所感之邪安能遂成癟耶

所以秋病多於四時者此也推之癟道亦然

白芍生地歛

冬月之愆陽

加減調中湯

白芍一錢半

柴苓白朮各八分

生地五分陳皮三分桔梗烏梅

甘草各二分

水煎溫服

治冬溫及春月暴發煩躁眠食不

安或掀脫欲作傷風狀者如體盛

加黃芩有痰加貝母

中暑中暍白虎或加參木

白虎加參湯石羔五錢知母人

參各二錢

芩草五分粳米一升

撮水煎溫服

惡煩不正加麥門冬尤妙

治動中暍傷氣身

熱脉洪或頭煩渴口燥小便已

酒熱毛聳口開前版齒燥

七

經

下

黑兼治發斑故又名化斑湯○白虎加蒼朮石羔四錢知

母三錢蒼朮二錢甘草五分粳米一大撮水煎溫服自汗

不_レ止加桂枝尤妙治靜中暑傷濕惡寒肢冷_レ靜中暑傷濕惡寒肢冷

汗出身熱妄言名濕溫兼治疫癘及秋感熱暴寒暴溫調

中_レ湯或去太黃_レ葛根黃芩芍藥藁本白朮桔梗茯苓甘草各五分水煎溫服治夏秋暴寒疫癘折於

盛熱熱結於四肢則壯熱頭疼及肝腹不和等症如暴溫肌熱煩渴加大黃門冬如暴寒傷胃表裏邪盛或便閉或協

熱下利血水脈數及年久臘毒下血不止者俱加大黃七錢下之移時再服得利壯熱自止○風溫汗渴

萎蕤兼以瓜蒌_レ萎蕤湯萎蕤二錢半石羔三錢葛根二錢

白薇杏仁青木香川芎甘草各一錢

麻黃一錢二分水煎溫服治風溫喘急頭痛身熱多睡語

言蹇澁自汗四肢不收甚者如癇內煩躁擾_レ冬溫春溫亦

宜加知母赤芍汗後身猶熱加黃芩知母赤芍汗多去麻黃加桂枝

防風氣弱加人參直瘻目睛不_レ了者加南星渴甚加天花

粉肝火熱加龍膽草○瓜蒌根湯石羔三錢瓜蒌根葛根各一錢人參防風各一錢甘草五分水煎溫服治風溫渴

甚身熱

濕溫汗多

疾苓和以桂木

茯苓白术湯

各一錢

白术一錢半

桂枝七分

甘草五分

水煎溫服

方意以

濕溫寒熱

頭目疼痛

智齒痛

妄言多汗

兩脰逆冷

者皆因暑

浴冷坐石

眼地爲濕

氣所傷復感暑

搏而爲病

是以藥品盡

皆治濕而非治暑

也所以各家亦有未詳此意而不敢用故以白虎湯加蒼术官桂其意更明然二方亦皆難用輕者但以二香等湯去暑除濕等湯去湯風濕腫痛勝濕表

以麻杏四般

羌活勝濕湯羌活獨活各一錢藁本防風甘草各五分蔓荆子川芎各二分水煎溫服治

脊痛項強腰似折項似拔此足太陽經氣不行肩胛痛不可回顧此手太陽經氣鬱不行如身重腰流流然者乃

經中有濕熱也加附子黃柏蒼朮○麻杏薏苡湯麻杏薏苡仁各一錢杏仁甘草各一錢水煎服取微汗治肢體酸

疼不能轉側額上微汗不欲去衣或身微腫大便難小便利熱至日晡加剉脉浮虛而濇甚者加川烏爲引有汗加

白术輕者只用九味羌活湯諸濕有表者俱宜○杏仁湯桂枝二錢天門冬麻黃各一錢姜五片水煎溫

服治風濕身痛惡風微腫寒濕腫痛湯

表以交加五積散

五積交加散卽五積散

散合入參敗毒散治寒濕身體重痛腰脚酸疼如寒勝者只用生料五積散甚者加附子夏月去乾姜肉桂加黃連如天時暄熱或春分後雖無汗亦去麻黃換紫蘇葉如肚腹脹滿不快或便閉去參加山楂神麩枳實如潮熱或肌熱加柴胡乾葛中濕木附甘附諸濕便溺皆調小便不利輕者除胡乾葛中濕木附甘附諸濕便溺皆調小便不利輕者除

白术三錢附子一丁錢芍草一錢姜三片棗二枚水煎溫服治中濕一身盡痛發熱身黃多煩脈浮而緩○小便不利大便反快輕者五苓散重者芍草附子湯芍草附子白术各二錢桂枝四錢水煎溫服得微汗卽解方意以風濕相搏骨節煩疼掣痛不得屈伸之則痛劇或風勝則衛虛汗出短氣惡風不欲去衣濕勝則小便不利或身微腫是以桂枝芍草之辛甘而散風邪以固衛附子白术之辛甘而解濕氣以利經如汗出身腫加防風動氣利不利加

扶蕁濕痺防巴漢已諸濕汗孔皆塞

防巴黃芪湯防巴黃芪各二錢白术一錢半芍草

草七分姜棗煎服治諸風諸濕暎浮身重自汗及誤汗汗
出不止如胷膈不和加芍藥氣上衝加桂枝有寒加細辛
風多走注加麻黃薏苡烏頭熱多赤腫加黃芩寒多掣痛
加官桂姜附溫多重著加茯苓蒼朮乾姜中氣壅滿瘡閉
加陳皮紫蘇枳壳甚者加葶苈○漢防已湯防已二錢半
黃芪一錢半白米二錢甘草一錢姜煎服卽防已黃芪湯
但汗多者主之
附防附木瘡柔而厥者宜附子防風湯白朮茯
苓桂心柴胡甘草各七分五味子九粒姜三片前服治傷
寒柔瘡閉目合面手足厥逆筋脉拘急汗出不止如汗不
出者去防風姜桂止用三分加麻黃五分主之附木散附子
白朮各一錢獨活五分川芎三分桂心二分棗二枚水煎
溫服治傷寒柔瘡手足逆冷筋脈拘急汗出不止時發時
止不食下利者難治如輕者剛柔通用九味羌活湯加減
桂石桂芩瘡熱而重者速桂枝石羔湯桂枝一錢石羔知母各三錢黃芩二錢水煎溫服入
治太陽陽明合病間日作瘡熱多寒少主之桂枝黃芩湯知
母人參黃芩半夏各八分柴胡一錢石羔二錢桂枝五分

甘草四分、姜煎温服。治太陽陽明少陽，合病瘡疾寒熱極甚。二方以桂枝湯料治太陽，白虎治陽明，柴胡治少陽，意甚明顯。挾痰合二陳湯食積合平胃散，溺澁合五苓散，便閉合大柴胡。汗加乾葛蒼术，有汗加黃芪白朮。夜發加茺蔚仁白芍，一日久加常山檳榔。吐之治瘧之法盡矣。

水乘表而發咳，青龍小劑

小青龍湯

桂枝麻黃芍藥乾姜各二錢，細辛一錢半，夏半錢半，五味子甘草各五分。水煎温服。治傷寒表不解，因心下有水飲與寒相搏，氣逆乾嘔發熱而咳，或喘或噎或渴或大便利，或小便不利，腸痛腹滿等症。蓋寒邪在表宜桂麻甘草，辛甘以散之，水停心下而不行則腎燥，宜姜半細辛之辛行水氣而潤腎，咳逆而喘肺氣逆也。宜芍藥五味之酸以收肺氣，經曰腎苦燥急，食辛以潤之，肺欲辛急食酸以收之。此方發汗，所以散邪，水行散所以固真水，水氣內清，傳變不一，故有或爲之症，宜隨症加減，以解化之，如微利去麻黃，加羌荊花以下水渴者去半夏，加瓜萎仁以生津，嘔者去芩，以行下焦蓄水，喘者去麻黃，加杏仁以下氣，凡服此便渴。

渴者裏氣溫水欲散也宜再服之或疑小青龍與小柴胡
症皆嘔而發熱表裏之病大槩彷彿何二方寒熱不同蓋
傷寒熱未盛而飲水停蓄非青龍姜桂不能解散傷寒邪
熱傳半表裏非小柴柴芩無以清解此二方症治同而用
藥殊也

水入陰而下利玄武神方

文武湯白朮一錢白朮百

芍附子各三錢姜五片水煎溫服治傷寒四五日腹痛小便不利大便自利四肢重
痛或發熱或濁利或嘔或咳兼治汗後仍熱心悸頭眩及
陰症身痛昧沈汗過筋惕肉瞞此由渴後飲水停留中院
所至方意以腎主水腎病則不能制水是以用姜附芍藥
之辛酸以溫督散濕佐苓白朮平以益脾逐水經日
寒溼所勝治以辛熱濕溼所勝佐以酸平是也如小便利
則無伏水去茯苓大便利去芍藥加乾姜以散寒咳加五
味子以散逆氣水寒相搏而咳加細辛乾姜以散之嘔者
去附子恐補氣也倍生姜以散逆氣茵陳太黃調五苓頭汗出而欲
茵陳

陳稿一兩大黃五錢山梔十枚水二盞慢火熬至一盞溫
服以利爲度甚者再服當下如爛魚膿血惡物小便下利

金色皂角等汁。或見熱症，頭汗出，將欲發黃者，用此
劑分作四服，入五苓散三錢，調下治黃之法，無踰於此。
意以陽明裏熱已極，煩渴引飲，以致濕與熱搏，如得遍身
汗出，則濕熱發越於外，而不能發黃也。今但頭出汗，
而還二便不利，渴且不止，則瘀熱鬱內，腹作脹滿，而黃疸
必矣。是以用茵陳山梔之苦寒，以除胃燥，大黃之苦寒以
下胃熱，一切癰癤疽瘻雜病，發黃等症，及傷寒因火逼取
汗，不出反致邪熱怫鬱於內，上攻頭面，紅赤蒸於肌膚，發
黃並宜。○茵陳五苓散，茵陳一兩，五苓散五錢爲末，每二
錢米飯下，或煎服，亦可治同上。○翁氏茵陳湯，太黃茵陳山
梔厚朴根實黃芩甘草姜一片，燈心一撮，水煎熟服，治同
上。如太便利，去大黃厚朴，加大腹皮，以小便清利爲度。

茵陳梔子皆二物，太便利而發黃。茵陳三物湯，茵陳三錢溫服治同上。○梔子柏皮湯，山梔黃柏四錢，黃芩半錢，水煎服治濕家發黃及傷寒發黃，但太便不利者。茵陳湯，二便不利者。茵陳湯調五苓散，太便利小便不利者，茵陳五苓散，茵陳三物湯，梔子柏皮湯，正所謂小熱之氣。

寒以和之，太熱之氣，寒以取之。虛煩，竹葉石羔既濟三白稱奇。

竹葉石羔五

錢人參二錢，麥門冬一錢半，半夏一錢，甘草七分，淡竹葉十四片，粳米一錢，大撮水煎，入姜汁二匙調服。治傷寒解後，餘熱未淨，津液不足，虛羸少氣，氣逆欲吐，及陽明汗多，而渴，而渴欲飲水，水入即吐，井瘡後下，後虛煩汗多等症。

經曰：辛甘發散而除熱，竹葉石膏甘草之甘辛以發散除熱，甘緩脾而益氣，門冬參米之甘以補不足，辛者散也，半夏之辛以散逆氣，如氣弱太渴，倍人參汗多加黃芪，陰虛夜煩加知柏生地芍藥，嘔吐去石羔加陳皮茯苓，痰加貝母，並加白朮澤瀆，又柰方去參石半夏名麥門冬湯，治勞復發熱。

既濟湯卽竹葉石膏湯去石羔加附子二錢，治虛煩上盛，下虛煩躁，自利手足冷，三白湯白芍、白朮、白茯苓各一錢，甘草五分，水煎溫服治虛煩或泄或渴，實調理內傷外感。

內傷外感之奇方也。

脚氣，檳榔越婢續命千金難贖，上檳榔散，橘葉童便酒各半盞煎，數沸去渣，入檳榔末二錢，謂服治脚氣風腫痛。

○戟牌湯石羔三錢，白朮三兩，附子一錢半，麻黃

二錢、甘草一錢、二分、姜棗煎服、治風痺脚弱一方、意以肺為

爲卑臟主行津液是湯所以名脾者以其能發越脾氣通行津液也千金續命湯防風芍藥白朮各一錢川芎防

巴桂枝麻黃羌活各八分、蒼朮一錢半、甘草五分、姜三片、棗二枚、燈心甘莖水煎八錢計二十匙謂之張治腳氣外症全

類傷寒

中

疽暑中三陽所患心熱脉洪數者去桂麻加芩連柴胡黃柏

柏寒中三陰所患必冷脉遲濫者加附子

於濕者則行

走急

足痙或腫膝或枯絨加永瓜檳榔牛膝丸於風者

則脉浮弦無汗加獨活氣虛加入參便閑去麻黃白朮加

大黃道瘀醫瘀陶氏加以芩連參朮梗瓜蔓

陶氏導瘀湯茯苓南星枳實各

八分半夏一錢陳皮蘆荟白朮黃連芩連仁各五分桔梗四分人參三分甘草二分姜二十片棗二枚水煎臨服入竹

瀝姜汁調下年力非盛者先吐去瘀次服此藥治內傷亡

情瘀迷心竅神不守舌苔出舍空則瘀生以致增寒壯熱

頭痛昏迷上氣喘急口出涎沫等症如鬼祟瘀症類傷寒者亦宜

○ 雜項舟白朮一兩心紅五錢或黃丹亦好爲末

每以二匙入磁器內溶化乘熱擦左前眼核大薄荷煎湯化下治結胃脣脹滿痛及癰症發熱或咽喉在肺鋸者

平胃消食陶氏加以薑連枳木姜查麯

陶氏平胃散、蒼朮生茶不

木各七分、甘草乾姜山查神麯各二十分、草果三十分、黃連枳實各四分、姜三片、水煎、臨服入木香磨汁調下治食積類傷寒如腹痛加杏仁、痛甚太便實熱去查神麯、加大黃下之如心中有火欲吐不吐無奈者用滾薑湯調皂莢未

五分、探吐瘀血在上犀角地黃湯加減

犀角牡丹皮各一錢、白芍二錢半、牛膝三錢、一

方有當歸一錢半、水煎溫服治傷寒汗下不解、欬干經絡或爲吐衄不盡餘血停瘀以致脉微發黃便黑煩躁發狂漱水不無等症如表熱加柴胡黃芩鼻衄加山梔內熱甚如黃連腹脹或痛瘀血未下加杏仁紅花大黃小腹急痛加青皮本方陶氏加甘草桔梗陳皮紅花當歸

姜三片煎服入鷄糞、鷄糞三匙調下治同上瘀血在裏桃仁承氣抵當

桃仁承氣湯大黃四錢桃仁二錢桂枝芒硝各二錢甘草一錢水煎服血盡為度

未盡再服方意以太陽經也膀胱府也太陽經熱不解則入府而結於膀胱令人如狂熱逼血自下者愈若熱搏血蓄下焦令人小腹急結便黑溺溢脉沈有力爲三刃瘀血結曾譖語漱水等症宜此湯攻盡黑物則愈若外症未解當先解其外而後攻其裏經曰從外之內而盛於內者先調其外而後調其內此之謂也故用桃仁之甘緩小腹急結桂枝之辛散下焦蓄血硝黃之寒折膀胱之熱本方用氏加芍藥柴胡青皮當歸枳實姜三片煎服熟入蘇木汁三匙調服治同上抵當湯蜜丸水蛭桃仁各十枚大黃三錢病甚人壯者五錢水煎溫服未下再服方意以太陽經病六七日邪當傳裏爲熱結胷症今表症仍在脉沈而熱不結胷反結於下焦令人如狂小腹硬滿小便不利者乃熱蓄津液不通也小便利者乃熱不蓄津液而蓄益也蓋鹹走血苦勝血故用童蛭之鹹苦以下結熱亦治一切瘀血結胞譖語漱水等症○抵當丸水蛭赤仁各七箇蜜丸八箇大茴一兩爲末密調分作四丸每丸用大茴水煎化溫服未下再服治蓄血在下無身熱便黑喜忘如狂等症但小腹滿而

溺利者宜此

丸緩以下之感寒齋蘇五積散

養胃大溫

香蘇散、香附紫

一錢、甘草五分、姜葱煎服。取汗治四時感寒頭疼發熱惡寒如頭痛甚加川芎白芷無汗加麻黃。人參養胃湯、蒼术一錢、陳皮厚朴半夏各六分半、茯苓、藿香各五分、甘草二分、烏梅一箇、人參、葛根各四分、姜三片、棗二枚、煎熱服。

取汗有汗溫服治外感風寒內傷牛乳增寒並熱頭目昏疼肢體拘急不問風寒二症及夾食停痰皆妙。兼治飲食傷脾或外感風寒濕氣發為痰癰及山嵐瘴疫尤妙。如虛寒加附子、平肉桂。

冒風參蘇十神敗毒

更速

半、陳皮桔梗枳壳各五分、姜三片、棗一枚、水煎服治

外感風邪頭疼發熱咳嗽聲重涕唾稠粘、內因七情痰寒壅脣潮熱等症加肺熱去參加白朮黃芩、肺燥去橘半加

爪榔杏仁一本方去木香加川芎柴桑黃芩朱芷蘇散治四時感寒頭疼寒熱。十神湯紫蘇香附陳皮甘草乾菖亦芍升麻白芷川芎麻黃各五分、姜葱煎熱服治風寒兩感及時行溫疫頭疼寒熱無汗等症此方去芍芷麻黃名蘇。

葛湯內乾葛專解陽明瘟疫風邪。若太陽傷寒發熱用之
足引賊入陽明多發乘疹。世槩用誤哉。○人參敗毒散
羌活獨活柴胡前胡枳壳桔梗川芎赤芍人參各二三分甘
草一分半姜三片煎溫服或加薄荷少許治傷寒發熱頭
疼睛痛項強肢體煩疼傷風咳嗽鼻塞聲重反時行溫疫
瘧氣風濕風痰眩暎嘔噦等症如三陽經腳氣赤腫加大
黃芩水皮膚疹痒加蟬退如心經蘊熱口乾舌燥加黃芩
虛加參术火盛加李連麥門冬補中益氣勞傷服加朱補中益氣湯外感
桂枝陽明症加葛根升麻平陽症加黃芩半夏倍柴胡太
陰症加枳實厚朴少陰症加生草桔梗厥陰症加川芎
變症發斑加葛根玄參倍升麻陶氏補中益氣湯人參
黃芪當歸牛地川芎柴胡陳皮甘草細辛蔻活防風白朮
姜三片棗二枚葱二莖水煎溫服治勞力內傷氣血外感
風寒頭疼身熱惡寒微渴自汗身腿酸軟無力布元氣不足者加升麻少許以升之喘嗽加杏仁汗不止去細辛加
芍藥。月中煩熱加山梔竹茹乾呕加姜汁炒半夏胃中飽

闕去牛地牛草牛木加枳壳桂枝梗痰盛去防風細辛加瓜
萎貝母腹痛去芒硝加芍藥乾姜因血鬱內傷有痛處或
太使黑黑去芒硝防芒硝細辛加茺茺仁紅花甚者加大黃下盡
瘀血瘀自愈愈後去大黃調理日夕下症具者亦量加酒製

大黃體厚者厚大柴胡下之下

○丹溪治二十一人舊有下病瘡忽

頭疼發熱惡寒以小柴胡湯加龍膽草胡黃連熱服而安

又一人因忍饑霜中涉水患惡寒吐血吐血以小建中湯去芍藥加陳皮半夏煎服而安二方可為內傷外感者式

葱豉麻葛頭痛甚於搥鑽搥鑽連鬚葱白湯生姜一兩葱十四

末汗頭痛如鑽般或合麻黃湯尤妙尤妙○葱豉湯葱白七莖

豆豉一合麻黃二錢葛根一錢半姜五片煎服如行五里

許許再進二服良久吃葱豉粥取汗治太陽陽明頭疼無汗

如太陽發熱惡寒無汗剛痊加芍藥三錢名麻黃葛根湯

○葛根葱白湯葛根芍藥知母各一錢半川芎生姜各三錢葱三莖煎服治陽明頭目痛鼻乾無汗桂枝柴

葛頭強頭強難於回顧回顧太陽無汗頭強葛根湯葛根半陽小柴胡湯

葛頭眩眩身

振衣苓桂甘桂茶和陽

英苓桂甘湯 苦苓二錢 桂枝二錢
甘草一錢 姜三片 水煎溫服治陽

明症在頭暉不惡寒能食而咳兼治肺氣在半表乘於心
胃壯仲愬陽乾嘔自汗不渴方意以 苦苓甘草之甘益津
而和衛桂枝生姜之辛助陽而解表○ 苦苓桂甘太棗湯
苦苓六錢半 苦草二錢二十分 桂枝四分 太棗五枚 先取水
六七碗置大盆內以杓揚之上有水珠數十顆相逐取用
之名耳 煮水用二盞先煎茯苓減半入諸藥煎至八分溫
服治汗後臍下悸動 故依奔豚者○ 苦苓桂枝甘草湯 苦
苓四錢桂枝三錢白朮一錢甘草一錢水煎溫服治汗出
下後裏虛氣逆上衝心腹痞滿或痛甚則頭眩脉沈緊爲
在裏則不宜汗汗則外動經絡損傷陽虛則不能主
持諸脉身體疾挫筋脉傷觸久則成瘓宜此湯以和經益
陽故陽氣不足者補之以甘朮 苦草之甘以生津液而
益陽也裏病逆者散之以辛桂枝之辛以行陽而散逆氣也
欒胃神昏人參三當三升

醒胃

介參三當湯 人參白朮白朮各一錢甘草柴胡三
錢川芎一錢天麻五分水煎溫服治太陽病誤下誤

汗表裏俱虛以致帶冒冒家得汗自愈若不得汗而不解者宜此主之如下虛脈微弱者合生飲以溫腎固其本也經曰滋苗者必固其根伐下者必枯其上是也背惡寒而三陽屍湯少陰附湯

傷寒六七日身無大熱口燥渴心煩背惡寒者此屬陽明宜白虎加參湯○傷寒二三日口中和背惡寒者此屬少陰宜附子湯附子人參各二錢茯苓芍藥各三錢白朮四錢水煎溫服兼治少陰身痛肢冷骨節煩疼方意以附子之辛以散寒參术茯苓之甘以補陽芍藥之酸以補陰所以然著偏陰偏陽則爲病火欲實水當平之不欲偏勝也

身惡寒而陽經柴桂陰經桂枝

陽經柴胡桂枝湯柴胡一錢桂枝黃芩人參芍藥半

夏各一錢甘草五分姜三片棗二枚水煎服治少陽弱頭額痛項強脇痛脣齶發熱惡寒乍來及自汗亡陽譖語依渴兼治風溫汗後身熱及動氣等症或小柴胡湯桂枝湯麻黃湯選用○陰經直中者黃芩建中湯四逆湯小建中湯

選用

惡風漏汗木附加入桂枝

桂枝附子湯桂枝附子各三錢芍藥二錢甘草

一錢、姜五片、棗二枚、水煎溫服。治太陽病發汗，遂漏汗，不相停，身體煩疼，不能轉側。今不嘔不渴，脈浮虛濶。方意以過汗，則陽虛不固，汗出多，則津液亡而小便難，四肢諸陽之本液脫者，骨鶼屈伸不利。是以用桂枝甘草辛甘以溫經，附子辛熱姜棗辛甘通津液以和表也。如裏寒去芍藥，小便利去桂枝。
桂枝加白朮發潮欲症，麻葛兼以赤豆。麻黃連翹赤小豆湯
連翹即連翹根，麻黃連翹即連翹根，麻黃

各二錢、生梓白皮三錢、赤小豆半合、甘草一錢、杏仁七箇、姜三片、棗二枚、潦水煎溫服。或加山梔茵陳葉相尤妙。治陽明身熱發黃，方意以麻杏甘草姜棗之甘辛微發其汗而散表分之寒濕，連翹梓皮之苦寒以除內熱，赤豆之甘平以散在表之濕熱，煎用潦水者取其味薄而不助濕也。如天氣暄熱，或有汗去麻黃加桑胡，內熱盛加黃芩、黃連，大便實加枳壳大黃口渴加天花粉，似瘡面赤身癬桂二麻上各半。桂枝上桂枝一錢一分，甘草一錢，杏仁八分
姜五片、棗三枚、水煎溫服。治太陽病服桂枝湯後似瘡熱，
渴桂枝芍藥各二錢、麻黃一錢二分、甘草一錢，杏仁八分。

多寒少者乃邪客榮衛也。脉必洪大。用此發汗必解。
桂麻各半湯。麻黃一錢半。桂枝芍藥杏仁各一錢。甘草七分。
姜三片。棗二枚。煎服治傷寒。未七日發熱惡寒。舌不短。囊
不縮。脉浮緩。便清為不傳陰經。欲愈此厥陰似瘡也。如不
愈者。宜此又太陽病日久。似瘡寒熱或熱多寒少。其人不
嘔。大小便調。裏和欲愈。若裏虛。脉微。表虛。惡寒。表裏俱虛。
面色青白。今面反赤色者。表未解也。其身必痒。宜此湯。微發其汗。以除表邪。上
二越一合湊。
桂枝二錢。麻黃芍藥各一錢。石
羔二錢。甘草三分。姜三片。棗二枚。水煎溫服。
治肺弱亡陽。熟多寒少。
柴桂柴姜。往來寒熱極驗。
柴胡加桂湯。柴胡加桂湯。柴胡
二錢。半夏一錢。甘草四分。姜三片。棗二枚。水煎溫服。治平
表裏症。盜汗身熱不欲去衣。及不瀉不硬。但心下妨悶。謂
之支結。
百症云。若有頭疼惡寒者。小柴桑加桂。值千金。
柴胡桂姜湯。柴胡三錢。桂枝半錢。生地各一錢。天花粉。黃芩。各
二錢。乾姜一錢。甘草八分。水煎溫服。方意以傷寒五六日
已經。而下則邪當解。今冒滿微結。心煩寒熱往來。邪在半

表半裏凡小便不利而渴者必嘔今便利渴而不嘔者裏無熱也傷寒汗出則和今但頭汗出而他處無者津液不足而陽虛也是以用柴芩之苦以鮮傳表之邪桂甘之辛以甘以散在裏之邪牡鴉之鹹以消腎腸之滿猶姜之辛以衣陽虛之汗天花粉之苦以生津液陰旦陽旦表裏寒熱堪諒陰自湯黃芩芍藥甘草各二錢桂枝四錢棗二枚水煎溫服治陰症身大熱欲近衣股節痛口不燥而虛煩者此爲內寒外熱也○陽旦湯桂枝芍藥各三錢黃芩二錢甘草一錢姜三片棗二枚水煎溫服治裏熱表寒如夏至後更加知母石羔或升麻不然恐有發黃乘出之變反發熟麻附甘辛有₁題麻黃附子細辛湯葱白四莖生附子一枚乾姜半湯真裏寒白通湯葱附無差葱白四莖生附子一枚乾姜半湯不能制水脉微自利不止方意以葱白之辛通陽氣姜附之辛散陰寒經云腎苦燥急食辛以潤之是也煩躁厥逆自利或無汗而不眠芍黃連鷄子湯攬勺黃連一錢半黃芩一錢

膠芍藥各

下錢水二盞煎至一盞去渣乘熱入阿膠令溶

化少溫

入鷄子半枚攬均溫服脉經日風傷陽寒傷陰少

陰受病得之

二三日已上寒極變熱為陽入陰也脉沈無

太熱心中煩躁不卧

厥逆自利不得汗方意以陽有餘以

苦除之

參連之苦以除熱陰不足以耳補之鷄子阿膠之

耳以補血酸收也渴也芍藥之酸收陰氣而渴邪熱所謂

宜渴必以苦宜補

必以耳此方兼之煩躁厥逆欲吐或洩難而脚蹠芍藥姜

甘芍簡易

甘草乾姜湯甘草四錢乾姜二錢水煎服

○芍藥甘草湯白芍甘草各三錢水煎溫服方意以

傷寒脉浮自汗小便數

而微惡寒者陽氣不足也心煩足

踰者陰氣不足也陰陽俱虛若誤用桂枝發表則便厥咽

乾煩躁吐逆是以先宜

甘草乾姜辛甘發散以復陽氣而

厥愈足溫心煩者更作芍藥甘草酸甘相合以補

陰血其脚脛諸汗不止者防术牡蠣湯外用米粉撰乾

防术牡蠣湯防風白

自袖諸汗不止者防术牡蠣湯外用米粉撰乾

防术牡蠣湯防風白

术牡蠣各等分爲末每一錢米散或酒下日三服汗止服

小建中湯治煩躁惡風不得卧汗出不止及久邪汗多須

躁者尤妙。○撰汗法。白术、藁本、川芎、苦白芷各二錢半爲末，入米粉一兩半和均以絹袋盛貯，週身撲之治汗出多，不得取汗不得者。陶氏再造散外用麸糠鋪地，人參、黃芪、桂枝、甘草、附子、細辛、羌活、防風、川芎、芍藥、生姜、夏月加黃芩、石羔棗二枚煎，耳加炒芍藥一撮煎，三沸溫服治亡陽症，陽虛不能依汗誤用重湯火劫取汗者死。○蒸汗法先須燒地令熟以水洒之，取蠶砂、柏葉、桃葉、糠麩皆鋪燒地上，冷後掌許然後鋪席令病人當卧其上，以被覆之，移時汗出，週身至足心用藁本末撰之上床而睡此法取汗雖易，一日間載范雲用之。後二年卒死。

夜睡盜汗小柴去半滋陰乎。傷寒盜汗責表熱雜病責。

陰虛古法柴胡加桂湯主之王氏以小柴去半夏加當歸生地芍藥麥門冬知母黃柏陳仁亦好。

冬病陽明黃芩等芍蜜導耳盜汗本屬少陽半表裏病冬月陽明宜有汗而天寒無汗夜眠必有盜汗黃芩湯主之黃芩三分，芍藥二錢，川芎五分，棗二枚煎服有嘔者去棗加生姜，

半夏以下逆氣此方本治太陽少陽合病自利兼治三陽也失血經日虛而不實者以苦堅之以酸收之是用本旁之苦酸以卑歛腸胃之氣弱而不足者以甘補之其草大棗之甘以補固腸胃之弱○蜜導法用白蜜半盞於銅杓內微火熬令滴水不散入皂角末二錢攪勻成小棗大長寸兩頭銳蘸香油推入數道中太便卽急而去如不通再易一條外以布掩肛門須忍住蜜待糞至方放開布治陽明自汗利不可攻小柴加瓜湯汗後嘔而渴煩小柴胡湯去半夏人參加瓜蔓根

大柴胡湯下後熱小柴胡湯去半夏去黃汗後嘔而自利去天黃下後熱小柴胡湯去半夏苦酒湯清肌生艾汁一合無生艾蘿蔴五錢苦酒五合煎至三合分三十次服治大下後傷寒血脈繒發熱不休兼治發在煩躁面赤咽痛下後寒

方藥附子補髓方藥附子甘草湯三味各三錢水煎溫服方意以傷寒汗下後則解今反惡寒者下過傷寒也或撮空耳聾者汗過亡陽也是以用芍藥之酸斂津液而益榮附子辛熱固陽氣而補胃甘草調和辛酸

以安風熱喉嚨金沸草散能除

旋覆花四分荆芥八分麻黃前胡各六分甘草赤芍

半夏各二分姜三片棗一枚水煎用細綿濾過免毛射肺咳嗽不已治肺受風寒頭項強急肢體頑疼寒熱往來頭目昏痛咳嗽聲重涕唾稠粘脣膈痞塞悶喘病及時行寒疫壯熱惡風又治一切風熱及風痰壅盛痰涎不利等症如諸風及大腑風熱左脇刺痛加枳壳風熱腑臟煩躁氣壅腹痛大使閑加硝黃薄荷姪婦傷寒頭痛壯熱心煩加參术黃芩石斛熟軟加葶苈子鈴薄荷桑白皮烏梅喉中焦燥加朴硝牙疼熟煎灌漱汗後身痛桂枝加參湯作主桂枝芍藥各三錢人參二錢甘草一錢姜三片棗二枚水煎溫服治汗後及霍亂後身痛流黑欬丸渴比常而倍加黃芩盆底燥呂硝竈柴墨梁上未蜜丸彈子大每二丸新汲水化服須臾發寒汗出而瘥未汗再服須見微利始不大渴不可輕用治陽毒發瘧煩躁大渴倍常猪苓湯渴後嘔而不止佛手汗下胃虛桂枝

參苓

桂枝參苓湯桂枝芍藥各三錢人參茯苓各二錢甘草一錢姜棗煎溫服治汗出下後胃虛而癟憊憊而赤

戴陽陰火躁悶益元附草

陶氏益元湯甘草二錢附子炮乾姜人參各一錢五味子

廿粒麥門冬黃連知母各七分艾三分葱三莖姜一片棗二枚水煎臨熟入童便三匙頓冷服治無頭疼有身熱躁悶面赤飲水不得入口乃氣弱無根虛火泛上名曰戴陽症是以用附子之鹹補腎姜葱之辛潤腎甘草參麥甘以緩之五味酸以收之連知母苦以發之經日火淫於內治以鹹冷佐以苦辛以甘緩之以鹹收之以苦發之降之是也

麻黃升麻

湯

目盲鼻衄收氣

麻黃升麻芍藥黃芩石甘草各等分姜煎熱

服微汗治傷寒太陽不解血濁氣壅鼻衄俗謂紅沫一方加桂枝歸尾天門冬知母姜白朮乾姜治傷寒六古日邪傳厥陰大下後寸脉流遲尺脉不至咽喉不利嘔吐體血半足厥逆泄不止者難治方意以太熱之氣寒以取之甚熱之氣汗以發之是用麻黃升麻之甘以發浮熱當歸桂姜之辛以散寒知母黃芩之苦以涼心去熱扶正當歸

之草以緩解，生津方藥之酸以收逆氣，
萎蕤門冬石黑甘草之草以潤肺除熱升陽散火，入手冒
心是寶。隋氏外陽散火湯，人參當歸柴胡芍藥黃芩甘草
熟金同煎服治攝空症，乃肝熱乘肺元氣虛弱不能主其
以致譖謠神昏不省人事，利者可治不利者死如疟疾
加姜汁半夏便燥譖渴加
大黃泄漏加升麻炒白术柴方枳甘何憂熱厥似陰，四逆
草根實柴胡芍藥各一錢爲末每二盛米飯下方意以邪
熱入深則手足漸冷，是以用枳實之苦佐甘草以瀉裏熱
芍藥之酸以收陰氣柴胡之苦以發表熱經曰熱淫於內
以酸收之以苦發之是也如咬者肺寒氣逆下痢者肺與
大腸爲表裏加五味子以收逆氣乾姜以散肺寒條著氣
虛而不能通行心下築築然營動加桂枝以道陽氣小便
不利加茯苓以淡渗之裏虛腹漏加附子以補虛泄利後
重下焦氣滯也加韭白以泄氣滯凡腎病體有熱者皆可
服青布生姜可洗舌胎裂稿擦舌張凡胎白而渴者用生
姜蘸蜜擦之○胎黃赤燥澀

者用真青布裹指蘸冷水頻擦之熱輒者其胎易脫者擦而難胎必大下津液退而胎退若下後依然唇口燥不減或黑者死口燥

口燥內亡津液挾火滋陰養榮

微陰養榮湯當

歸二盛人參生地各一錢半麥門冬芍藥知母黃柏各一錢五味子十四粒甘草四分水煎溫服治汗下過多內亡津液或病後水虧火炎口燥咽乾氣喘腹有濡滿屬陰化痰生脉汗下後壅者一陳湯加姜汁竹瀝凡喘多痰皆宜○氣虛者加朱生脉散五味子三錢人參麥門冬杏仁陳皮各一錢姜五片棗二枚水煎溫服治手足痠遲脉伏喘促者危殆以此救之○氣虛甚者單人參湯人參五錢甚者一兩水一盞半煎至半盞服之喘定者生不定者死治元氣素虛傷寒汗下後氣短氣喘目反脉微精神困怠如血虛加當歸脉不至如麥門冬五味子半錢厥逆加乾姜冷甚加附子紫鴟加白朮汗後喘微者桂杏麻石要可喚桂枝加朴杏湯治太陽病汗下後微喘者此表未

下

錢以降氣○麻杏石甘湯麻黃三錢杏仁一錢半、芍草一
錢石黑五錢水煎溫服治汗下後汗出而喘身無大熱者
方意以汗出而喘有大熱者裏熱甚也無太熱者表邪甚
也宜此湯以散其邪或疑汗下後風邪者蓋汗下雖不同
而邪在表則一也凡汗吐下後治法各不同

相同經所謂若汗若吐若下都是矣下後喘逆者葛根參

連湯宜選擇

葛根三錢黃芩黃連各二錢芍草一錢姜三片棗二枚水煎溫服治太陽桂枝症誤下自

利不止脈促喘而汗出方意以誤下則腸胃虛而爲熱所乘遂煩熱自利不止脈促者爲陽盛知表未解也若脉微邪在裏也凡病自汗出而喘者乃邪氣外甚所致因喘而汗出者乃裏熱氣逆所致故用葛根芍草之其以散表邪芩連之苦

以除裏熱

汗下虛噦萎芩連參橘皮竹茹最靈

乾姜芩連人參各一錢水煎溫服治傷寒食入即吐謂

之寒格及魯經汗下關壅胃虛冷嘔吐方意以參姜之并

辛以補正氣芩連之苦以通寒邪內格

橘皮竹茹湯人參三錢陳皮五錢甘草一錢竹茹一團姜五斤水煎溫服

參三錢陳皮五錢甘草一錢

參三錢陳皮五錢甘草一錢竹茹一團姜五斤水煎溫服

治四時傷風寒冷濕，鼻塞，疾鳴，上氣不得下而吸噉。陰症，餓逆，恙活，丁香，橘皮，乾姜。

任責

卷活附子湯，恙活一錢，炮附子半枚，茴香丁香，乾姜各十錢半，水煎入盐一撮，熟服治陰症內寒厥而嘔。

逆

橘皮乾姜湯，陳皮二錢，通草乾姜各一錢，人參一錢半，水煎服治傷寒初病，但惡寒不發熱，口中和，脉微細，而

餓逆者，此寒邪客中焦而氣不得伸，也或加半夏生姜，丁香，柿蒂尤妙。太橘小橘，嘔吐煩冷。

分掌

大橘皮湯，陳皮，甘草各二錢，人參五錢，姜七片，水煎服治嘔吐胃滿，腹瀉不安。小橘皮湯，陳皮五錢，生

姜一兩，水煎溫服。

治嘔吐手足厥冷，太半小半，餓逆痰飲不食。太半夏湯，半

各二錢半，

臘臘水煎服治傷寒痰症及惡心嘔暈，加陳皮一錢，草質不和，加陳皮一小半，夏湯半夏五錢，生姜一兩。

水煎溫服治餓逆，氣入口。

開泄及發汗後水藥不下，水不入而搗姜汁，更煎半夏。

以寬脅，生姜汁

半盞，湯半夏五錢，水一盞半，煎至半盞八

分，稍溫緩緩服之。凡嘔吐藥忌類。

服

治胸中熱喘不喘，似嘔不嘔。

十全大業

卷三

八

八

八

八

八

八

嘔

似嘔不嘔，費費無奈何者。

十全大業

卷三

八

八

八

八

八

八

以快

膈赤疾苓湯，赤茯苓五錢，陳皮，人參各二十錢，白朮川

半夏各一錢，水煎入姜汁一匙，調服。

十全大業

卷三

八

八

八

八

八

多水停心下，脢滿頭痛，汗爲水結，智或先渴後嘔。

或微瀉消渴氣上衝，或汎下後身體振，提筋惕肉，衄血。

十全大業

卷三

八

八

八

八

八

八

生地

芩連，或茅花湯而單煎。

十全大業

卷三

八

八

八

八

八

梗甘草

厚角棗一枚，水煎，臨熟入荳根，或藕節，搗汁磨京

墨，調服。

十全大業

卷三

八

八

八

八

墨調

服治鼻衄成流，一切去血過多，譖語失神，撮空閉目。

十全大業

卷三

八

八

八

八

不知人事。

生地芩連湯，生地川芎當歸各七分，赤芍山

楂黃芩，黃連各二分，防風二分，水煎徐徐呷之。

十全大業

卷三

八

八

八

大黃

下之，治婦人血風症，因崩大脫血，或前後去血，及男子去血過多，因而凋燥，其熱未除，循衣摸床，撮空閉目，不省人事。

十全大業

卷三

八

八

八

八

楊手擗足錯語失神，脈浮弦而虛，內有燥熱之極

氣粗，鼻乾，上下通燥危症，凡氣分燥閉者，用大承氣湯。

十全大業

卷三

八

八

八

八

省人事。

茅花湯，單茅花一大把，無花用根洗絃搗碎，水煎濃汁服之。

十全大業

卷三

八

八

八

八

楊手擗足錯語失神，脈浮弦而虛，內有燥熱之極

氣粗，鼻乾，上下通燥危症，凡氣分燥閉者，用大承氣湯。

十全大業

卷三

八

八

八

八

茅花湯，單茅花一大

把，無花用根洗絳搗碎，水煎濃汁服之。

十全大業

卷三

八

八

八

八

城治頭吐血黃連柏皮湯黃連黃柏黃芩各
血不止

二錢水煎臨熟入阿膠一錢半煮洋溫服治熱毒吐血
綠袍散黃柏薄荷芒硝青黛各等分爲末入水片少許搗

上牙床卽止救火逆驚狂身痛柴胡龍驤鉛丹枝蜀漆各
治齒縫出血

救火逆驚狂身痛柴胡龍驤鉛丹枝蜀漆各

救火逆驚狂身痛柴胡龍驤鉛丹枝蜀漆各

三錢甘草二錢牛犧四錢龍骨二錢半姜五片棗三枚水
二盞先煎獨漆十餘沸入諸藥煎至八分服方意以汗出

亡陽則心虛神浮驚狂與桂枝湯以解未盡之表邪芍藥
益陰非亡陽所宜故夫之火邪錯逆加蜀漆之辛以散之

神氣脫亡加龍驤之滋以收神固陽本草云滋可去脫是
也○桂耳龍骨牡犧湯桂枝一錢半甘草牛犧龍骨各一

錢水煎服治一切火逆及誤下裏虛又加溫針致生煩躁
驚狂遺精等症是用桂耳之辛甘以散經中之火邪龍驤

之滋以收浮越之正氣○柴胡龍骨牡犧湯柴胡三錢黃

芩一參龍骨牡犧各一錢半姜五片
棗三枚水二盞煎至一盞入大黃二錢再煎二三沸溫服
方意以傷寒八九日邪氣難復傳陽經誤下虛其裏而熱

不_ノ能以致_シ冒滿煩驚譖語シテ小便不利皆心胃熱而津液不行故也又丁身重痛不可轉側者陽氣內行而不發於表

也宜_{シテ}小柴胡ニシテ以除冒滿加龍獮鉛丹以斂神氣茯苓以行

滌液利便大黃以除胃熱桂枝以行陽氣而解身重_ノ篇難

之正譖語錯亂呻吟梔子芩蓮黃柏黄連解毒湯黃連黃

芩黃柏山梔各二錢

半水煎溫服治傷寒汗後或因飲酒復劇苦悶乾嘔口燥

呻吟錯語煩躁不得眠卧兼治胃熱吐血丁切熱毒臟毒

等因痛猪膚甘桔而半桂可起伏寒猪膚湯猪膚一兩水

蜜一合白粉半合熬香熟和均相得服之治陽經傳入少

陰客熱下利咽痛冒滿及脈陰陽俱緊主無汗而有汗日

亡陽法當咽痛此屬少陰方意以猪水薑共氣入腎是以

猪膚能解少陰客熱加白蜜以潤燥除煩白粉以益氣滋

利○單井草湯井草一兩水一盞半煎至一盞日進三服

治陽邪傳少陰客熱咽痛如寒熱相搏咽痛加桔梗五錢

名井桔湯方意以井草井平以除熱桔梗辛溫以散寒井

桔相合以調寒熱而和少陰之氣也○半桂湯半夏桂枝

甘草各二錢、姜五片、水一盞半煎至七分、徐徐飲之治少陰寒塞下利、脉微弱而咽痛是以用半夏桂枝辛以散寒

芋草之甘

正氣喉塞龍骨烏扇而鷄壳能開音啞

黃蓮龍骨湯

骨一錢七分、黃芩芍藥各二錢、水煎溫服治少陰腹痛

沈細有熱而咽痛

烏扇湯射干猪脂各四兩同煎去渣

取半鷄子黃大錦墨內喉中徐徐薰下凡咽中閉塞不可

下者宜用鷄壳苦酒湯半夏十四枚用鷄子留白去黃

以苦酒同入鷄壳內置刀環中安火上煮一二沸去渣少少

含嚥作三次服治熱傷於絡則經絡乾燥使咽中生瘡不

能言聲不出者是以用半夏之辛以發聲

音鷄子之甘以緩咽痛苦酒之酸以斂咽瘡升麻六物湯

誤汗咽痛及口干參各一錢葱三莖水煎治陽厥應下反

汗出咽痛

口瘡牙腫

玄連消毒散

時行咽腫并頭額

黃芩黃連柴胡

荆芥防風羌活枳壳連翹射干白芷姜三片煎入半夢子

丁根再煎一沸入竹蔗姜汁調服治天行大頭病發熱惡

寒頭項咽喉腫痛，脉洪取作瘀火治。凡服宜涼，未加大黃利去一二次，後去大黃，加入參當歸調理。

結胃熱

而有渴，大小陷曾十棗湯。大陷智湯，太黃三錢半，病重加芒硝二錢，再煎一二沸，去渣入甘遂末一錢和勻溫服。若

腹中不動，再進丁服。治傷寒表裏，解醫反下之膈內拒痛。

手不可近，短氣心煩懊憊，心下鞭太便悶，舌燥而渴，熱實脉沈，而緊，兼治一身無大熱，有水結在胃腸間者。方意以大

黃苦以蕷滌，芒硝鹹以軟堅，甘遂通水，可以直遂其氣而透胃膈之結也。但此藥太峻，不可輕用，如不得已，卽用大

陷智丸。

○大陷智丸，大黃三錢，杏仁、葶苈各二錢，芒硝二

錢半，甘遂一分，人弱者半分爲末，蜜丸，彈子大，每丁丸，用

水一盞煎至六分溫服，至二宿未動，再進丁丸，以利爲度。

治熱實結胸項脰如癟瘡狀，用此下之，則和。方意以硝黃

鹹苦以下，熱葶杏苦甘以瀉，利滿實物也。

○小陷智湯，黃連三錢，半夏一

錢，瓜蔞仁二錢，姜三片，水煎溫服，利黃涎沫，卽安。一方加枳壳桂枝，便東芩，治結胸病，正在心按之則痛，其脉浮濶，方

意以半夏之辛，以散結氣。黃連之苦，以瀉熱實。瓜萎之苦，以寬中潤下。十全大補湯，羌花、芍藥、桔梗、巴豆、大黃、甘草、白芍、桂枝、白术、人参各等分，爲末，用大棗十枚，水一盞，煎至半盞，去棗，調未五分，怯弱者，減半服。服後，大便利，下水以粥補之。治太陽傷風，下利，嘔逆，熱嗽，汗出，發作有時，頭痛，心下痞硬，滿引脇下，疼痛，乾嘔，短氣，不惡寒，及裏水，身涼者，宜服方，意以下利，嘔逆，爲裏受邪，可下汗，不出，不惡寒，發作有時，爲表已解，可攻，頭痛，脇疼，心痞，乾嘔，短氣，邪熱內蓄，而有伏飲，是裏未和也，是以用茺花之辛，以散飲，戰，汗之苦，以瀉水，結胸寒，而不煩。枳實理中三物白，枳實理中丸，人參白朮茯苓各一兩，甘草乾姜各七錢半，枳實六錢，黃芩二錢半，蜜丸，彈子大，每十一丸，沸湯化下。治太陰病，誤下，寒實結胸，及傷寒，諸吐利，後留，疼痛，欲絕，高起而痛，手不可近，如渴，加天花粉。汗利不止，加牡蠣殼。三物白散，貝母，桔梗各三錢，巴豆一錢，爲末，每五分，弱者減半，白湯調服，病在膈上，必吐，膈下，必利，若不吐利，進熱粥半盞，助之。若吐利過，進冷粥半盞，止之。治寒實結胸，無熱症，二黃附子瀉心下，痞軟。

虛瀉

湯

一
盛

浸

之

以

物

蓋

定

候

二
飯

久

稍

多

去

查

頻

溫

服

沸湯

瀆藥者

取其氣薄

而泄虛熱

也治心下痞硬

內實熱

盛而不大使

關脉浮者

可服惡寒

勿眼

附子湯

用

附子半枚水

一盞煎

至半盞去渣

刺入三

黃瀉心

湯

內和勻分

二次溫服

治心下痞硬惡寒

汗出

半甘牛

姜瀉心

下痞軟氣逆

半夏瀉心湯

半夏一分

水煎溫服

治心下痞滿軟

而無痛

甘草

姜三片

生姜二分

水煎溫服

治心下痞滿軟

而無痛

甘草

黃芩二錢

黃連一錢

黃芩一錢

黃連一錢

鴻心湯

半夏瀉心湯

半夏一分

水煎溫服

治心下痞滿軟

而無痛

甘草

黃芩二錢

黃連一錢

黃芩一錢

黃連一錢

黃芩一錢

黃連一錢

黃芩一錢

黃連一錢

黃芩一錢

黃連一錢

寒傷風

醫反

下之

利日數十

行穀不下化

腹中鳴

心下痞

硬乾嘔

心煩若狂

再下之

之痞氣益甚

此虛氣上逆也

○生姜

海心湯

生姜半分

各各二錢

人參乾姜各一錢半

黃芩二錢

黃連一錢

黃芩二錢

黃連一錢

黃芩一錢

和

之痞然痞爲虛熱有惡寒汗出者陽氣外散也加附子以固陽胃爲陽氣之根詳出亡津胃虛氣逆痞而乾噫食臭

不能消穀。或挾水雷鳴下利者。土弱不能勝水也。加生姜。以益胃之陽氣。下利不止。穀不化。乾嘔宿益甚者。胃虛氣上逆也。加甘草。二味以補胃之陰氣。痞而滑利。禹餘糧赤石脂禹餘糧湯各二錢。水煎溫服。治心下痞硬。服鴻心湯利不止。及傷寒下利不止。服理中湯益甚者。半斤此乃下焦不約故水穀不分。是以用石脂之滋以收斂之禹餘糧之重。以鎮固之。李草云。濕可去怯。是也。若服此不止。當利小便兼治汗家重發汗心神恍惚小便已。陰痞而乾噫代諸古。旋覆代諸古湯旋覆花三錢。人參半。夏甘草各二錢。代赭石一錢。姜五片。棗二枚。水煎溫服。治汗吐下後心下痞硬。胃弱虛氣上逆。乾噫或吐。方意以旋覆之鹹而軟。痞硬代赭之重而鎮。虛逆生姜半。夏之辛以散痞氣。參草大棗之甘以補胃弱。柴陷桂參痞結疎表且。

和中。柴陷湯卽小柴胡湯合小陷智湯治結督痞氣初起有表及水篩瘀結熱結等症。○桂枝人參湯人參白朮草姜各一錢。甘草桂枝各二錢。水煎溫服。治太陽症未解。下之遂成傷熱下利而心下痞硬。表裏不解者。方意。

以表邪未解而裏氣又虛故加桂枝於理中湯內也

○ 檳榔枳梗痞結調氣先開

○ 檳榔

○ 檳榔枳壳枳壳各等分黃連少許水煎溫服治結胸痞氣未成宜先服此謂氣○枳梗湯枳壳桔梗甘草各等分水煎

○ 檳榔治結胸痞氣及胃滿不利煩渴欲死不論寒熱通用

如右痰合二陳湯各半枳梗二陳湯表熱或寒熱往來加柴

胡黃芩內熱加黃蓮痰喘加瓜

○ 結胸危甚艾灸填以巴連

灸結胸法用巴豆十粒研爛八萬蓮末一錢又研勻捻作

餅子納脇中艾炷如手指大灸之輕者一下炷重者不過再

灸候腹中微熱取下惡物立効灸畢以溫水拍手洗淨不

然生瘡治結胸症危甚手不可按二便閉滯或連日不通

但口中有微氣或嘔

吐不止諸藥無効痞結奮鬱姜葱裹以綃帛奮結胸法用

鷄子一隻生姜四兩共搗爛炒微溫攤在胸中結實之處

如盤大外以箬葉綃帛縛之候半日許覺腹中熱燥解去

更用熱手揉之不拘早晚當先用○發結胸法用葱白

十莖生姜一兩共搗碎作餅炙熟貼脇中以熨手貯火於

餅上敷之半時許待熱氣入內覺輕卽住復用枳實理中丸

三十九

加附子或五積散之類服之治陰症冷結手足厥逆并發

泄毒以汗出爲度置三五十餅易之○禽瘡氣法蘿蔔子二

合生姜二兩葱白七莖橘葉一搾白麪半合共搗勻炒畧

溫禽瘡滿之處外用苦葉絹帛縛之候半日許胃中煩熱

卽解去拭淨復以熱手揉之不拘寒熱虛實遲早並用

熨瘡氣法用橘葉一太搾麥麸半升同炒熱以皮紙襯絹

包之乘熱熨瘡滿之處冷則再煖至病人覺快方止凡

病氣初起施朴治懊憆煩脹厚朴宜生

便寫用之施子稟朴湯山楂

枳實二錢水煎溫服得吐卽止治傷寒下後心煩腹滿坐

卧不安方意以山楂之苦以吐虛煩枳朴之苦以泄腹滿

無腹滿者施皮湯效桂甘除動導脉代甘草用灸

三十

桂枝四錢桂皮三分甘草二錢桂枝甘草湯桂枝

鐵二分水煎溫服治過汗心悸欲寐甚則身振振欲舞地如脉代急者宜灸甘草湯

八

梔豉甘草生姜施梔豉甘草湯山梔四枚豆豉五錢甘草二

錢水煎溫服治胸滿少氣熱傷氣也故加

茅草於施豉湯中以補氣○施豉生姜湯施字四枚豆豉五錢生姜一兩水煎溫服治脅滿作嘔熱搏而氣逆也故加生姜於施豉湯中以散逆氣

腸滿熱而有痰柴梗青皮杏核

柴梗湯卽小柴胡湯

去人參合枳梗湯治脅腹痞滿或痛○柴梗半夏湯柴胡二錢黃芩半夏枳壳桔梗瓜萎仁各一錢青皮杏仁各八

分茅草四分水煎溫服治發熱咳嗽脅滿兩脇剉痛者此邪熱挾瘀攻注也如口燥渴去半夏痰在脇下加白芥子

或竹茹

亦妙○柴陳湯

卽小柴胡湯

合二東湯治痰氣留脇不利及癰癧等症

腹痛下寒黃連

乾姜性捷黃連湯黃連二錢乾姜桂枝各一錢人參一錢

煎溫服治胃中有熱胃中有邪氣腹痛欲嘔吐者上熱下

寒也方意以陽不得降而胃熱欲嘔陰不得升而下寒腹痛是以用黃連之苦以降陽姜桂半夏

之辛以升陰參草大棗之甘以益胃

腹脹汗後厚朴半

更功殊厚朴半夏人參湯厚朴三分半夏二錢人參一錢甘草五分姜三片水煎溫服治汗後腹脹滿而痛

方意以厚朴之苦瀉腹滿參草之甘益脾胃半夏生姜之辛散滯氣桔梗半夏湯陳皮三味各等分姜煎溫服治

陰陽氣不以和動氣衝心八味李根湯妙當歸芍藥桂枝甘草各二錢桂枝三錢

錢甘草半夏各一錢，甘李根柏皮二兩，水煎溫服。治動氣在上發汗，則氣上衝心，不得息，霍亂多暑。

香黃連散 當霍香厚朴半夏茯苓陳皮枳壳各一錢黃連澤瀉各八分甘草三分水煎入姜汁一茶匙

匙溫服。嘔多者倍久。尤妙治伏暑霍亂暴熱。躁悶或腹疼。冷汗自出。尺脉沈。手足冷。不宜熟藥。大使

燥而丸 麻子シマツナ 半丸又名脾約丸 太黃枳壳 荒草朴防蠶各五錢 杏仁二錢 腐竹三錢 為末蜜丸 葵上

大汗每卅九溫渴下利再服得快方止治外便數太便難名爲脾約宜此通腸潤燥方意以麻子杏仁之甘以緩脾

而潤燥。燥液不足以酸液之。芍藥之酸以斂液，腸燥胃強以苦泄之。枳朴太黃之苦下燥結而泄胃強也。兼治年老少，大使堅及脚氣大使燥，小便澀而剉滑瞿。萬全本通散木通潤石赤。

調

茯車前葉各一兩，瞿麥五錢爲末，每四錢水一盞煎至半盞，溫服。治陰虛爲陽所湊，膀胱中有積熱也。故小便難而黃。
黃白通調冷利無脉煩躁加猪膽 白通加猪膽汁湯附子
莖、水煎去渣，入童便二盞，猪膽汁一枚，調服。治少陰厥冷，
下利，乾嘔，脈不至而煩躁，服此湯，脉暴出者死，微出者生。
方意以腎主水，客寒犯腎，不能制水，故厥逆下利，是用葱
白之辛，以通腎之陽氣，姜附之辛以散陰寒。加童便膽汁，
者，內經所謂調寒熱之逆，令熱並行，不然，熱物冷服，下咽
之後，冷體既得熱性，便發財病，病性不違，而氣亦從，可以去
拒格之。
白頭疎熱利純下清 水索薰龍 白頭翁湯 白頭翁
寒也。
白頭疎熱利純下清 水索薰龍 黃柏 秦皮 黃連 各
一錢，水煎溫服。治協熱下利後重，而渴。方意以腎欲堅急，
食苦以堅之，利導之，利則下焦虛，是以純苦之劑堅之。○閨氏黃
龍湯 大黃二錢，芒硝一錢半，枳實厚朴各一錢，甘草人參
當歸各五分，年老氣血虛者去芒硝，姜三片，棗一枚，桔梗
三分，水煎一沸，熱服。治熱邪傳裏，胃中燥糞結實，心下硬
痛，絕口不食，多是日逐自飲藥水，下利非外寒也。宜急下。

之身有熱者宜用此湯桃花散石脂丸邪入經而膿陳積身無熱者六

順氣湯

桃花散石脂丸

邪入經而膿

膿爲陳積

結塊

全桃花散赤石脂五錢半生半炒乾姜二錢糯米一合水煎去渣入生石脂末丁半調服治少陰下利膿血

腹痛小便不利下利不止脉沈血寒凝滯下必紫黑成塊

或雜膿血方意以石脂瀦腸胃乾姜散寒糯米補氣下焦

裏寒不約者宜

赤石脂丸

赤石脂丸

歸各二兩爲末蜜丸梧子大每丹丸米飯下治小便滯太

便向膠陽地榆散毒入臟而血

血爲新穎流長黃連阿膠湯山

二錢水煎溫服治傷寒熱毒攻胃流久太腸所下必紅赤

城流如腹痛加芍藥血虛加芎歸血不止加地榆夾膜有

食積加山楂神曲地榆散地榆尾角黃連茜根黃芩各

五錢山梔二錢半爲末每五錢入韭白五寸水煎溫服治

瘡寒熱毒不解晚卽出

利膿血手足搘擗通末牛蒡

牛蒡根湯牛

熱腹痛腰疼下利膿血

手足搘擗通末牛蒡

牛蒡根丁兩南

星麻黃牛膝各六錢入酒

下盛同於石器內搗細另找黃

土地坑以炭火燒令通赤去火掃淨投藥於坑內再用炭

火燒令黑色取出爲末每一錢溫酒調服治發汗失宜風邪乘虛選入經絡故手足擊擣筋脉拘急易用以裏服古瓜竹湯冷葵根五錢竹茹二錢半水煎溫糞末丁字謂服治熱上衝旬月煩悶手足擣撓如風狀及瘥後勞復陰陽易病卵種疼痛手足不能動者溫經益元惕瞶自愈陶氏溫經益元湯熟地人參白朮黃芪甘草芍藥當歸生地白芍陳皮肉桂附子姜三片棗一枚糯米一撮水煎服治汎後太虛頭眩振振欲辦地非筋惕肉瞶及發汎太多備虛亡陽汎出不正或下後利不止身疼等症如飽悶去地黃加枳壳瘦人去芍藥有熱去附子泄利去歸地加炒白朮升麻陳壁土嘔加姜外製半夏渴加天花粉汗後惡風寒屬表虛去桂附生地加桂枝飴糖引風如聖瘻癰可瘳引風湯大黃乾姜龍骨各四兩桂枝三兩甘草牡蠣各一兩、疑水石滑舌赤石脂白石脂紫石英石羔各六兩爲粗末以蓆布盛之每取三指撮水煎二沸服治風溫妄以火薰發黃甚則狀如驚癇時發瘻癰如聖餅子防風天麻

半夏各五錢、南星乾姜川烏各一兩、川芎、甘草各二兩、丁
方有細辛二錢爲末、蒸雞丸、艾實大捻作餅子、日乾、每五
餅同荆芥三五穗、細嚼茶酒任下。如傷寒得汗尚餘頭痛
者、姜葱煎湯下、兼治男婦氣厥上盛、下虛痰飲及風寒伏
留、陽經偏正頭疼、痛連腦顱、吐逆惡心、目眩耳聾、常服清
頭目、消風痰、緩胃氣。○陶氏如聖飲、羌活防風川芎、白芷
柴胡芍藥甘草當歸烏藥半夏黃芩、姜二片水煎、臨熟入
竹瀝姜汁調服、兼治瘡症。如癰瘡加白朮桂枝、剛瘻加麻
黃、苦杏仁口噤咬牙、大便實者加太黃利之。安蛔理中去甘草、烏梅丸子頻入口。
安蛔理中湯、人參白朮乾姜茯苓各一錢半、烏梅三箇、水
煎溫服、治蛔厥如太便閉、加太黃入蜜以利之。日渴加瓜
蒌根。○烏梅丸、烏梅十箇、乾姜一錢、黃連一錢半、細辛附
子桂枝人參黃柏各六分、當歸川椒各四分、爲末用醋半
盞浸烏梅蒸爛去核和諸藥、搗丸梧子大每十九米飲下
日三服、病甚者多服取効、爲度已生冷滑物治臟寒蛔厥
得食卽止。嘔乍難止利方意以烏梅之酸而歛肺
氣、人參之甘以緩脾氣、當歸散細桂枝之辛以潤內寒、姜

附之辛熱以勝，內寒連柄之苦以安蛔。凡虫症忌用甘草，蓋虫聞其味則起，聞酸則止，聞苦則定，聞辣則頭伏而下矣。

治蠶桃仁與雀角雄黃銻散納肛頭治蠶桃片湯桃仁梗七枚水一盞煎至半盞濃清溫服治狐惑唇上生瘡聲啞○黃連犀角湯黃連一錢半犀角一錢烏梅三箇木香丁分煎服同上治狐惑咽乾唇焦口燥熱盛雄黃銻散雄黃青葙子苦參黃連各二錢半桃仁一錢爲末牛艾搗汁和如小指尖大蟲糞納下部肝門內治狐惑症虫食上下者並宜

消斑青黛紫雪猪膽鷄子仍欬飴

閩氏消斑青黛飴黃連甘草石羔知母柴胡玄參生地山楂犀角青黛人參大便實者去參加大黃姜下片棗二枚水煎臨熟入苦酒一匙調服治熱毒發斑等症○紫雪升麻六錢黃金十兩寒水石羔各四兩八錢犀角羚半角各一兩玄參一兩六錢沈香木香丁香各五錢甘草八錢水五盞先煮黃金至三盞入諸藥再煎至一盞去渣入芒硝三兩二錢慢火煎以柳木攪不停手候欲凝入磁盆中更下硃砂麝香未各三分急攜令勻

候冷凝結成雪，每一錢細細煎之，治發斑、咽痛及暑中三陽脚氣煩躁。猪膽鷄子湯：猪膽汁二合，鷄子一枚，苦酒三合，和匀，壯人煎三沸，盡服；羸人煎六七沸，緩服。汗出即愈，治傷寒五六日，斑出。**赤斑**：黑膏黃連沸。

葛根橘皮兼止嘔：區黑膏生地一兩六錢半，淡豆豉一兩六錢半，猪脂一兩，和匀，露一宿煎之，分三

分減。一憑去查入雄黃末五分，麝香末一分，攬均，分作三服。白湯化下，毒從皮膚中出，則愈。未効再服。忌蕪荑。治溫

毒發斑嘔逆。黃連橘皮湯：黃連二錢，麻黃葛根各一錢，半橘皮杏仁枳實厚朴各一錢，甘草七分，水煎溫服。治溫

毒發斑皮膚癢疹，及唇口下部生瘡，食逆悶亂，下利嘔吐。清汎始病，勢沈重，晝夜呻吟不安，或咽痛者，去麻黃加玄参升麻。

葛根屬皮湯：葛根橘皮杏仁知母，麻黃黃芩李苡草水煎溫服，治溫毒發斑心煩。**大青**：四物湯

治斑火紅：大青一兩，阿膠二錢，甘草一錢，香豉一合，水煎治斑，熟煩躁太渴，脉洪盛，遍身斑出如火色。芒硝三錢，金玉斑爛臭。芒硝猪膽汁，法芒硝三錢爲末，猪膽汁調塗瘡上，候乾，即痂落無痕。

仍研朱粉之此病鴟竈有血及瘡黑膿不出體者死如狂活血當歸桂苓飲子也相應陶氏當歸活血湯當歸赤芍甘草紅花桂心乾姜枳壳生地黃人參柴胡桃仁姜丁片煎入酒三匙調服服三帖後去桃姜紅花加白朮茯苓治無頭疼無惡寒但身熱發渴潤利便黑口出無倫不可誤爲熱症乃瘀血內傳心脾一下經使入昏迷沈重如見祟症名挾血陶氏桂苓飲猪苓澤瀉桂枝甘草白朮黃柏知母山梔棘葉姜三片煎再加滑石末一錢煎三沸服取微汗爲効治初得病無熱狂言煩躁不安精神來不興人相當講爲發狂下者死殊不知熱結膀胱名日如在症血自下者愈不愈者宜此古方用桂枝湯發狂三黄石羔梔子玄明皆不受三黄石羔湯黃芩黃連黃柏山梔各二錢麻黃溫服得汗卽瘥未効再服治癭寒身熱煩躁不得汗脉洪大四五日便發狂者表裏俱熱也梔子半湯山梔亦行大青知母各一錢升麻黃芩石羔杏仁各二錢柴胡一錢半甘草五分香豉百粒姜三片水煎分一服治發狂煩躁

面赤咽痛潮熱百節疼痛。○王氏玄明粉二錢寒水石黃連各一錢半珍珠辰砂各一錢爲末。鷄子清一枚。

白蜜一匙新汲水調服治發往神効。○水漬法用青布五六尺疊擗以新汲水浸之稍候乾搭於病人身上須臾蒸熱再浸再搭良久狂定方可。○診脈下藥治太熱狂叫奔走不能制伏火劫法用炭火一盆置病人之前將醋一盞急沃火內使烟氣衝入鼻孔內。

須臾自定或用涼水噀面亦可。○柏子烏梅湯瘥後不睡即

安竹葉十四片豆豉一錢半水煎溫服治傷寒瘥後不眠

者此熱氣與陽并酸棗仁湯晝夜不眠甚效各一錢半石

茱二錢半茯苓知母甘草各一錢桂心五分姜三片鹽水煎溫服治汗吐下後晝夜不眠。

三白辛黃以疎表辛黃二白湯人參白朮白芍各一錢白

棗一枚水煎溫服治陰症傷寒在表如脈沈發熱口和加附子五臘見症加藥同麻黃湯服後陰症重者

四順通脉以濟危

四順湯丸

人參白朮乾姜各二錢
甘草三錢水煎或蜜丸服治身無熱脉沈苦

煩默默不欲見光腹痛下利或無脉可診未辨陰陽姑與服之若是陽厥便當見出熱症若是陰厥則無看熱矣

通脉四逆湯附子五錢乾姜二錢半甘草二錢葱白三莖酒赤者七莖水煎溫服治少陰症下利清穀微熱厥逆反

不惡寒面赤脉微欲絕或咽疼乾嘔腹痛自利不止如腹痛去葱加芍藥以利氣嘔加姜汁以散之利止脉不出加

人參以補血咽痛加桔梗以散結○茯苓四逆湯茯苓乾姜甘草各一錢附子人參各三錢水煎溫服治發汗復下後不解脉沈微而細煩躁者陰陽俱虛也方

意以四逆湯以復陽加入參茯苓以益陰○陽毒升麻芩

參狂斑頓愈

陽毒升麻湯升麻射干人參各一錢黃芩二

錢犀角一錢半甘草七分水煎溫服取汗治

陽毒發斑頭項背痛躁悶不安狂走妄罵下利咽喉腫痛口吐膿血○玄參升麻湯甘草三分各三錢水煎溫服治

發斑煩躁譫語咽喉閉塞腫痛陰毒正陽甘草厥痛立移

正陽散附子一錢良姜甘草五

錢皂莢一挺、麝香二分、爲末、每二十錢水煎入蜜熱服治陰
毒額汗頭痛面青舌黑口張出氣煩渴心下硬滿腹硬身
冷多晦○陰毒甘草湯甘草升麻當歸桂枝各一錢雄黃
川椒各一錢半、鱉甲三錢水煎溫服良久再服毒當從汗
出未汗再服治陰毒畏寒身體重痛腹疼背強咽痛嘔逆
恍惚失驚氣短神昏爪甲青黑手足冷汗頭面烘熱等症
破結瀉毒活龍散用蜜調下
豆蔻木香官桂牽牛黑附子
巴豆各五錢、輕粉半分麝香五分、金箔五片、爲末用米醋
半盞入辰砂附子牽牛三味熬成膏次入餘藥和丸皂子
大輕粉爲衣每十九蜜湯下治陰陽伏逆變爲結腫五六
日太便結之不可達之不及以此主之○活龍散活地
龍四條洗淨研爛入姜汁少許蜜一匙薄荷汁少許新汲
水調和徐徐灌盡漸次涼快若熟熾者加一片腦少許未効
再服自然汗出而解治陽毒累經藥下不通返陰止躁復
結胷硬痛或稍通而復再結喘促熱燥狂亂返陰止躁復
陽丹宜酒投之
两乾姜附子桂心各五錢爲末用鐵鉗先

鋪玄精次鋪補石各一丁半中間鋪硫黃末又將硝石玄精
餘末蓋上以小盛合着用炭三片燒令得所勿令煙出急
取瓦盆令着地上四面灰蓋勿令煙出候冷取出入餘藥
同爲末糊丸梧子大每丹丸艾湯頓下汗出爲度治陰毒

心煩頭痛肢冷面青腹脹脉伏乃氣虛陽脫無脉不省人
事復寒陰厥○復陽丹草澄茄木香乾蝎附子硫黃吳萸
各五錢乾姜一錢爲末酒糊丸梧子大每丹丸姜湯下
復以熱酒投之取汗治陽寒面青肢冷心腹脹脉沈細陽

盛拒陰

陶

三黃巨勝湯可去斑加芒硝大黃姜一片棗二枚水煎臨熟入泥漿清水二匙調服治陽毒發斑狂亂妄言大渴叫喊目赤脉數大便燥實上氣喘急舌卷囊縮難治始以此

治

湯刲之陰躁回陽百問霍霍散尤奇陶比回陽返本湯
人參麥門冬五味子臘茶陳皮如面戴陽者加葱白七莖
黃連少許清泥漿二盞煎臨熟入蜜五匙頓冷服之取汗
爲劫治陰盛格陽陰極發躁微渴面赤欲坐井地脈無力
欲絕○百問方硫黃五錢艾湯調服卽時安卧良久睡起

汗出而愈治傷寒身冷脉微手足厥而躁○又方附子五
 錢生姜三錢需米一撮水一升太盞煎至六分溫服取汗如
 不可與冷水飲之如發渴併查服之甚妙治陰毒傷寒煩
 躁渴悶○鱗靈散附子一枚炮過取出用冷灰堵半時切
 半枚入真臘茶一錢水一升煎六分去查入熟蜜半匙調
 匀頓冷服之須臾躁止得睡汗出乃瘥治陰盛格陽身冷
 反躁欲投井中肢體沉重唇青面黑渴欲水瘥後水腫壯
 復此大便自利黑水六脉沈細而疾或無
 牡犧澤瀉湯以利便牡犧澤瀉禹州根蜀漆草蘿蔔海藻
 得利卽止治太病瘥後從腰以下水腫方意以牡犧澤
 濟海藻之鹹以瀉水氣漆草商之辛酸苦以導濕腫
 後神昏○陷道赤各半湯以醒迷冬滑右山施疾神知母人
 爭棗煎加燈心一握煎沸熱服治傷寒後心下不硬腹
 中不滿二便如常身無寒熱漸變神昏不語或瞞中獨語
 目赤唇焦舌乾不飲水稀粥與之則蘇不與則不思形如
 醉人乃熱傳手少陰心也心火上逼肺所以神昏名越經

症易病燒棍赤衣與鼠糞虛弱乎當歸白术

燒棍散取近
陰處棍端一寸

塊方貞四五寸男用女棍女用男棍燒存性溫水調服方寸匕日三服丁方加手足指爪甘片燒灰男女互用米飲下小便即利陰頭微腫則愈○赤衣散取室女月經布透陰處著燒灰白湯調下或入湯藥調服尤妙男女俱宜○

復膚糞湯非白一把雄扇糞十四枚水煎溫服微汗未汗再服治男子陰易小腹連腰跨急痛○當帰白术湯當歸

附子各二錢生姜一錢白术桂枝甘草人參黃芪芍藥各五分水三盞煎至一盞溫服食頃再進一服微汗便瘥治

男婦病未平復因犯房事則小腹急痛連腰胯四肢不能舉任身無熱者復症

梔豉枳黃與鼠

屎逍遙乎人參竹皮

梔豉枳實湯山梔枳實各一錢杏政五錢水煎服微汗治勞復發熱方意

以熟聚於上以苦吐之熟散於表以苦發之紅曰火淫所勝苦以發之是也○梔豉枳黃湯山梔枳壳柴胡各一錢

香豉五錢大黃三錢人壯積堅者五錢水煎溫服治食後發熱如內熱加黃芩腹脹加厚朴傷肉加山楂傷麪加

補綴○鼠屎散湯鼠糞七枚枳壳一枚山楂七箇豆豉卅
粒葱白廿莖水煎溫服治勞復發熱○人參逍遙散人參
當歸各二錢柴胡一錢半白朮白芍白蒺藜各一錢水煎溫
服治女勞復虛弱者如心煩口乾加麥門冬五朱子陰虛
火動精泄加知母黃柏牡蠣心下痞滿加黃連枳實不眠
加竹茹煎服○竹皮逍遙散青竹皮外縮腹痛者倍之人
參知母黃連甘草滑石生地韭白柴胡犀角姜二片棗二
枚煎臨服入燒裯檔末一錢半調服微汗未汗再服得小
便利陰頭腫卽愈○百合分汗吐下陶氏柴胡兼用合知母
湯百合七枚知母一兩先以水洗百合漬一夜宿去白沫另
以水二盞煎至三盞去渣又以知母水二盞煎至三盞去
渣二汗和勻再煎至三盞半分二次溫服○吐後百合鷄
子湯百合七枚製法如前煎汁一盞入鷄子黃一枚攪匀
溫服○下後百合滑赭湯百合七枚製煎法如前另用泉
水二盞煎謂石三兩代赭石一兩至三盞方入百合汁內
再煎至三盞溫服○不經汗吐下者百合地黃湯百合七
枚製煎法如前更用生地二兩搗汁一盞和百合汁再煎

倦

至二十一盞溫服太便當下如滲中病卽止○變成渴者百合洗法百合一升以水廿盞漬一宿通身洗之洗已淡食將息弗與益致○渴而不瘥者瓜萎牡蠣散山葵根甘橘各等分爲末每二盞白湯調服三服○變成發熱不休者百合滑石散百合炙一兩滑石三兩爲末每三錢白湯下○陶氏柴胡百合湯柴胡人參黃芩芽草知母百合生地陳皮姜三片棗一枚入醋炙鱉甲煎溫服治瘡後昏沉發熱渴而錯語失神及百合勞復等症茹渴加天花粉胃煩加山梔頭疼加羌活川芎嘔吐加姜汁製半夏胃中飽悶加枳梗食復加枳實黃蓮大便實加大黃風煩加竹茹竹葉加瘡後乾嘔錯語失神呻吟瞞卧不安加黃連犀角加杏仁百合麻黃驚惕爲血少加當歸茯神遠志虛汗加黃芪脾卷加白朮腹中雷鳴加榧生姜加黃勞復時熱不除加葶苈烏梅生艾油不仁因汙過多駱龍升麻湯獨宜錢木香五分姜五片水煎溫服治傷寒肌肉頑麻不仁壞症表以知母麻黃而參胡芍藥清肌熱知母不痛不痒

陽知母二錢、麻黃、甘草、芍藥、黃芩各一錢、桂枝五分、水煎溫服，微汗即愈。治汗吐下溫針不解，及小柴症，罷而熱尚在者，亦爲壞症。大率以表症多者宜用之。參胡芍藥湯，人參柴胡芍藥黃芩知母來門冬各一錢，生地一錢半，枳壳八分，甘草三分，姜三片，水煎溫服。治傷寒十四日，外餘熱未除，脉息未緩，大便不快，小便黃赤或渴，或煩，不能安睡，不思飲食，此邪氣未淨，正氣未復，當量其虛實，以調之。如胸滿腹脹，便硬去參，加厚朴倍枳壳，小便頻數，加茯苓澤瀉，加竹茹，血弱加當帰，虛煩加竹葉梗米，二使自利，胃腹不飽，形羸脈弱，去枳壳倍入參，不眠加炒酸棗仁、茯神、宿糞未淨，腹滿或疼，便硬不通，量加大黃，壞症久則鱗甲星角而參胡溫膽止。

瘻癰
鱗甲散 鱗甲星角前胡生地黃芩各一錢，枳壳八分，烏梅二箇，水煎溫服。治瘻症諸藥不効。○溫膽湯 半夏枳實各一錢，陳皮一錢，枳壳五分半，甘草四分，竹茹一團，姜七片，棗一枚，水煎，熱服。治傷寒瘻，後一切惡瘻，不眠，氣脈不和，心膽虛怯，及食復勞役，病症，如初如頭眩身搖，加百术，咽痛加桔梗，百般加蕤柏。○參胡溫膽湯 陳皮

半夏茯苓枳實人參各一錢竹茹香附麥門冬柴胡桔梗各八分甘草三分姜三片棗二枚水煎溫服治心膽虛怯懶乏或復自汗四肢浮腫飲食無味煩躁不安婦人熱

入血室桂紅海蛤堪調和

桂枝紅花湯桂枝赤芍甘草各一錢半紅花一錢姜四片棗二

枝水煎溫服汗出而解治傷寒發熱惡寒四肢拘急口燥舌乾經脉凝滯不得往來海蛤散蛤粉滑石甘草各二兩半硝一兩爲末每二錢鷄子清調下治傷寒血結脅痛不可忍服此小腸利而腹中血自散矣

寒犯產

家黃龍增損可通用

黃龍湯柴胡黃芩人參各二錢甘草一錢水煎服治胎前產後及經水適

來適斷傷風傷寒表症半表裏症及汗後瘥後勞復餘熱氣虛令四君子湯血虛合古勞湯表邪器欲傳裏幾至

動胎者加阿
麥倍芥木之產前表以前胡芎蘇入裏柴壳罩胎兒

前胡七物六劑

湯前胡黃芩山楂知母各一錢石羔大青各二錢竹茹一
彈八葱白煎服治孕婦傷寒頭疼壯熱肢節頑疼旁麻

散川芎陳皮芍藥白朮各八分蘇葉六分乾菖五分黃芩
前胡麥門冬各一錢甘草三分姜葱煎服治孕婦傷寒寒
熱頭疼身痛項背強加藏由人姪傷風咳嗽寒熱痰喘不
眠○參蘇飲去參加芩术瓜萎杏仁最妙○柴胡枳壳湯
柴胡一錢半枳壳黃芩山梔知母麥門冬乾菖各一錢六
青生地石羔各二錢升麻八分甘草四分水煎溫服治孕
婦傷寒邪傳於裏口渴煩熱腹滿便閉譖語或發斑晝夜
不安大便閉甚量加二大黃○柴胡石羔湯柴胡二錢石羔
四錢甘草一錢姜煎服治孕婦傷暑惡寒頭痛壯熱躁悶
四肢煩疼背項拘急口乾舌燥氣虛加人參○秦艽散
秦艽柴胡石羔前胡赤芍苓甘草犀角升麻乾葛黃芩各
等分竹茹威半姜煎入姜汁調服治孕婦時氣五六十日不
得汗口渴年言嘔逆○蘆根湯蘆根二錢麥門冬一錢半
入參乾葛知母各一錢竹茹一彈丸葱白煎服治孕婦熱
病頭疼並熱嘔吐食不下心煩○施子大青湯施子大青
黃芩各一錢半升麻一錢杏仁八分葱白煎服治孕婦傷
寒發寒變黑或尿血○蘇木湯蘇木赤芍陳皮黃芩黃連
各一錢甘草四分水煎服取汗治孕婦傷寒或中時行疫

癘漸漸作寒慄而慄。置胎散嫩捲荷葉一兩焙蛤粉五錢爲末。每半錢蜜水調服。治孕婦傷寒太熱悶亂燥渴。或發痘疹。恐傷胎臟。產後表以柴胡防歸。_ノ近裏旋竹破瘀壅。_ノ柴胡防歸湯柴。胡人參各一錢當歸三錢川芎一錢半夏陳皮防風各八分。甘草五分。姜棗煎服。治產後發熱不因難產。傷力及亡血過多。惡露未盡。無子。蒸乳四症。果條外感風寒表症。脉實。挾食積瘀血。量體加減。○旋覆花湯。旋覆花赤芍前胡半夏茯苓麻黃杏仁各一錢。五味子十四粒。甘草五分。姜煎服。治產後傷風寒暑。咳嗽痰盛。坐卧不安。_ノ竹葉防風湯。淡竹葉甘四片。防風人參桂枝桔梗前胡陳皮。茯苓各一錢。姜棗煎服。治產後傷風發熱頭疼面赤氣喘。○柴胡破瘀湯。柴胡黃芩半夏甘草赤芍當帰生地各等分五錢。脂桃仁各錢半。姜煎服。治蓄血症及熱入血室。如大便閉塞。加大黃二片。然非汗下。暫爾從權。_ノ孕婦傷寒雖久。忘疲。並症不可輕用。○蘇葛白疎散。厚朴枳實消導萬不得已。暫用汗下。卽宜古方。大汗加阿膠。人參安之百問。云婦人大病藥有序。產前。

安胎、產後補、然後用藥、療傷寒、病稍退時、藥即去、又云、氣
口緊盛、下爲宜、人迎緊盛、汗乃足、左手關脉若浮緊、當救
血室、和柴、衛、尺宜、發汗不宜下、汗則液通病去矣、但傷寒藥皆不必盡劑、與雜病不同、和補與男相

共

婦人

傷寒傳經直中

及諸類症

雜症與男子相同

但胎

前陰症只宜理中湯

加芍歸脾服不可用烏附犯胎其

餘和解之劑量病

多服以平爲期

抑論辛甘

需棗氣分假之

以發散桂枝

草之類能復陽氣

凡傷寒發散藥多用東

葛根

煎者以其能和藥也

惟中滿嘔吐者不宜

分賴之以湧吐

亦藥苦酒芩青黛苦參之類

能補陰血

斂津益榮故不用姜

山梔無

豉

吐不宣、麻黃無

葱汗不發、太黃非枳實不通附子無姜不

熟竹瀝非姜汁何以行經蜜道非皂角何以通結利藥不

難生尤便於清肌補湯須用熟最宜於養血主乎病者先

煎病在下者早發

詳見二十

呼與其方多而効少莫若方少

而意深疾各有因通於彼者塞於此

卽如傷寒初症其人素有食積痰火及素

虛素實或酒後房室後或憤怒後名各不同如

此豈可執一試効之方而均治彼此之疾乎

藥不可執

宜於古者泥於今

古人治病之方雖存而其變病之因豈能知其悉乎况古今風氣不同人情亦

異卽如男女之慾古人二三十歲而後動今總十四五而

真元已漏矣若謂無古今之異則是三代之禮至今可盡

行矣其不可改者表裏虛實之法寒熱溫涼之性耳

許氏謂讀仲景書須守仲景心不泥仲景方者是也

陶氏所立三十六方似於傷寒加一癰癧然

然古法已湮亦正久此一一番活動故備載之症自我識方

自我立草木鳥獸資於學

固有讀醫書而不知醫者未有不讀醫書而知醫者也神

明變化存乎心

以神明變化故曰不矩易者不可以言醫

△汗吐下滲和解溫補總方

○陽症

○大汗

寒氣入人，肌膚久則侵骨，頭痛如劈，身熱如火，浮熱甚者俱宜午時前發汗，午後陰分不

宜，故日汗不太早，汗不厭早，緊急不拘晨夜，衣被覆首足向火服藥緩緩得汗，令手足識遍爲佳，如難汗，將杏丹服，或汗後不解，又可再汗，若急汗如水淋瀝，則病邪不除而真陽脫亡，丸散亦可發汗，不如湯藥爲驗。

麻黃湯 治太陽症，頭疼發熱，惡寒脊強，身痛無汗，脉浮濶，而喘，又治太陽八九日不解，以發汗，必衄乃解，及不得汗，發衄，又治太陽陽明合病，喘而胃滿腹不痛邪，在表分不可下者，又治陽明脉浮無汗而喘，凡脉但浮無餘症者，皆宜服之。

麻黃三錢桂枝二錢杏仁十粒甘草六分

姜三片葱二莖水煎熟服取汗止發汗藥一服

中病即止不必盡劑如感寒深重服湯不得汗宜再服之半日連進二三劑而汗不出者死方意以寒傷榮則榮盛而衛虛榮脉中寒邪盛則血脈滯而頭項背腰強痛是用桂杏之辛其以散之衛虛則惡寒無汗氣逆而喘宜麻黃甘草之甘以大發之充其衛分之陽或疑無汗用桂枝者蓋榮行脈中并衛氣而犯之經日寒淫於內治以甘熱佐以苦辛又曰辛甘發散爲陽凡寒淫者皆此例也

陶氏麻黃湯

即前方加升麻川芎白芷防風羌活藁本姜

葱豆豉煎熟服治法同上如本經寒熱頭痛

無汗而喘去升麻加葛根本經寒熱身痛去杏仁加荳蔻藥本經寒熱身痒面赤不得小汗者去杏並升麻加柴胡芍藥本經寒熱頭痛胃中飽悶加枳壳桔梗凡症脉浮無汗當以急汗麻黃湯主之肝之表見症者加防風羌活心之表見症者加黃芩石羔肺之表見症者加

加防已白术肺之表見症者加熟附子生姜桂枝

生姜腎之表見症者加熟附子生姜

追魂湯

治卒厥暴死及客忤鬼擊飛尸奄忽氣絕口噤麻黃三錢杏仁廿五粒甘草二錢水煎搥口灌服若

更不下分病人髮左右提鴟肩引之藥下漸甦一丁方有桂枝二錢服後身和汗出則愈若入臟反青身冷卽死

三拗湯

治感冒風邪寒冷鼻塞聲重語音不出咳嗽多痰鼻孔滿短氣喘急麻黃杏仁甘草各一錢姜三片水

煎溫服得汗爲度如鼻塞加枳實

有痰加半夏頭痛加石羔細茶

五拗湯

即前方加荆芥桔梗等分如咽痛甚者臨服芒硝少許一方去荆芥桔梗用枳實半夏

麻黃附子細辛湯

麻黃細辛各二錢熟附半枚寒甚者加姜五片棗米二枚水煎溫服取汗至足

乃愈如嘔吐去細辛倍生姜方意以傷寒無熱而反發熱頭不陰經病也今少陰病始得之當無熱而反發熱頭不痛爲異耳乃邪在表也脉雖沈以始得邪氣未深尤當溫劑發汗以散之是用附子細辛之辛以溫少陰之經

麻黃之甘以散少陰之寒經日寒溼於內治以甘熱佐
以苦辛以平潤之是也凡房慾後傷寒者多患此症
活人大全云少陰症脉沈欲寐始得之發熱肢厥無汗
爲表病裏和當以此湯緩以汗之隨各臟見症加藥同
麻黃湯若少陰外顯前症內見二便閉塞或濁赤水謂
之有表復有裏宜本方去麻黃名附子細辛湯隨各臟
見症加藥同麻黃湯但
更加大黃以微和之

麻黃附子甘草湯 治少陰病得之二三日發熱脉沈細邪
汗以緩散之卽前方去細辛加甘草二錢煎服
○凡方以麻黃爲主者皆自麻黃湯而變之也
○解肌微汗也風傷衛強則榮弱故以補榮不可
大汗傷血須半牢心時密室加衣靜坐宜熟

汗卽止

桂枝湯

治太陽

傷風

衛實

榮虛

自汗

頭痛

鼻鳴

頭強

乾嘔

畜惡寒

渴酒

惡風

翕翕發熱

或熱多寒少

面色光

而下愾煩躁身痛手足不冷脈浮緩寸大尺留者宜如
無汗潤數手足冷不惡寒者已用夏月誤服麻桂必發
黃發斑年閑而死

桂枝錢白芍三甘草一錢姜三片棗二枚水煎熱服微

汗方意以風傷衛則衛盛而榮虛

衛脉外風邪盛則發熱自汗氣逆鼻鳴乾呕宜桂姜之
辛以散之榮虛宜惡寒而又惡風者因自汗腰理踈也
宜方藥之酸以斂之衛盛榮虛則爭爲寒熱故用甘棗
之甘以和之經曰風淫所勝平以辛涼佐以苦甘以辛
散之以酸收之以甘緩之是也或問傷寒論云陽虛陰
盛汗之則愈下之則死又云桂枝下咽陽盛則斃桂枝
包麻黃而言然則桂枝亦發汗藥乎蓋表陽虛而後風
邪得以乘之客於榮衛之中榮衛亦屬皮毛表分也非
發散何由得愈且桂枝雖能止汗亦能和血而今汗自
出也對肉桂而言實爲發汗對麻黃而言則爲止汗要
之麻桂皆表藥也一則大汗一則解肌但有汗不得用
麻黃無汗不得用桂枝實仲景格言也

陶氏桂枝湯

卽前是加芍藥川芎羌活藁本姜棗煎臨熟入鯆糖二匙溫服治跌同前如汗多加白朮

汗不止加黃芪

喘加柴胡杏仁白朮中飽悶加桔梗

人太全云太陽表症外見復有裏症

便濶弱滯腹痛或

漏赤水謂之有表復

有裏桂枝湯主之隨各臟

見症加藥同麻黃湯但更加大黃以微利之

○附六經傷風方

太陽桂枝湯少陽柴胡桂枝湯太陰桂枝加芍藥湯

杏子湯

治足陽明傷風惡食口苦咽乾腹滿微喘發熱惡寒自汗嗜卧身重頭難轉熱而嘔逆唇發數桂枝

芍藥芩草細辛乾姜大黃各六分

杏仁半夏五味子各七分

水煎溫服

九味桂附湯治足少陰傷風腎痛心煩咽痛自汗腰連腰骨酸痛嘔吐泛沫頭痛脉沈而弦桂枝芍藥

甘草乾姜生附子桃仁各五分

水煎溫服如咽痛加桔梗二分半

八物散

治足厥陰傷風惡風而倦自汗小腹急痛寒熱如

胡防風各三分芍藥一錢半甘草茯苓各五分
姜五片棗二丁枝水煎溫服方論見傷風條下

葛根湯治太陽陽明無汗惡風發熱惡寒頭痛項背腰強

問丁切傷寒溫病時行寒疫等症兼治剛柔二莖

葛根三錢麻黃二錢芍藥一錢桂枝一錢甘草八分姜二片棗

取汗本草云輕可去實故加麻葛二味之輕於桂枝陽中以去表實甚有意朱麻黃治太陽葛根治陽明所謂治陽明而不前棄太陽是也

葛根解肌湯卽葛根湯加黃芩二錢治同上

葛根解肌湯兼治春疫發熱而渴不惡寒

陶氏解肌湯卽葛根解肌湯去麻桂加柴胡羌活白芷桔梗石羔升麻姜煎服治陽明病蕭傳少陽等

芩加麻黃夏秋換蘇葉
症如無汗惡寒甚者去

升麻葛根湯

治四時傷寒時行疫癘表症或已汗吐下表益未解熱深毒甚發爲壅疹春溫尤妙兼治

小兒瘡疹欲發未發及解傷酒膈熱口瘡咽痛葛根一

錢半升麻芍藥甘草各一錢水煎溫服以病去身清涼

爲度如表熱加柴胡內熱加黃芩有吐血或斑紫

赤加生地牡丹皮熱甚加肉桂黃連或加連翹天花粉

丸散大便硬加枳壳大黃以利之頭痛加川芎身痛加

羌活鼻脣瘡悶加枳梗咬嗽加杏仁有痰加半夏發癰

加玄參如老人去芍藥加柴胡茯苓參

柴胡升麻湯

治肺行瘟疫壯熱惡風頭痛體痛鼻塞咽乾麥盛咳嗽涕唾稠粘葛根芍藥柴胡前胡荆芥石羔各一錢桑白皮黃芩各六分升麻五分姜三片

豆豉十粒水煎服凡方以桂枝芍藥爲主者皆自桂枝湯而

變之也

九味羌活湯

不問傷風傷寒寒熱頭項脊強痛并四肢強痛并四時感冒疫癘晚發等症雜病亦可通治此

方不犯三陽經
禁解利神方

羌活

一錢半治太陽肢節痛爲君大無不通
小無不入如關節痛甚及無汗者倍之防風半治

少陽一身盡痛隨住使而引之如直汗者倍防風減羌活
一錢三分雄壯止行之

傳太陰如有汗者
汗者換白术川芎

一錢三分治厥陰頭痛在腦

白芷

一錢二分治陽明頭痛在額

細辛

三分治少陰苦頭痛或連齒

黃芩

一錢二分治太陰肺熱在脣

生地

一分治少陰心熱有熟者可

陰心熱有熟者可用無熟者去之甘草

五分能緩裏和中述名藥主治使用指詳之生姜三片大棗二

枚葱白二莖水煎熱眼取汗如無汗用熟粥以助之此

方發春夏秋三時表症代桂枝麻黃青龍各半四方蓋

三時暄熱傷寒則不敢用冬月桂枝而實表故代以防風活蒼木傷風則不敢用冬月桂枝而實表故代以防風

白术芍藥甘草發表以代表桂枝地黃救血以代芍藥加黃芩以順天時也○加減桂枝太陽症加羌活藁本陽明症

加升麻葛根白芷少陽症加柴胡黃芩半夏太陰症加
蒼朮厚朴枳實少陰症加桔梗知母黃柏厥陰症加川
芎柴胡如夏月加石膏知母服此湯後不作汗加蘇葉
惡風自汗加桂枝夏月去桂加芍藥汗後不解加大黃
嘔逆加姜汁有痰去地黃加半夏肌熱加柴胡葛根喘
而惡寒身熱加杏仁生地鹿煩加知母麥門冬竹茹
中飽悶加枳壳桔梗中風行經加附子便閉加大黃中
風兼五痺等症各隨十二經內外上下寒熱溫涼四時
六氣加減補瀉用之煉蜜爲丸尤妙

羌活沖和湯治傷寒無汗脈浮緊羌活蒼朮各一錢半防
風黃芩川芎白芷生地甘草各一錢細辛五分水
分水煎熟服取汗如渴加知母石

羔潔土司夫倍蒼朮又上兩亦加

防風沖和湯治傷風有汗脈浮緩防風白朮半地各一錢
半羌活黃芩白芷甘草各一錢川芎五分水
煎溫服汗出止加黃芪芍藥仍步止用柴胡桂枝湯

川芎湯

治犯房室感寒頭痛發熱惡寒無汗脉浮緊川芎白朮羌活各等分水煎熱服

○吐

凡脅中痰癆熱鬱或寒結，胸中鬱而痛不能食，欲使人按之而反有涎唾，或下利，寸口脉滑，或宿食在上，或客氣脅中脉結，心下煩滿而不能

食者，並宜

吐之。一服出病即止，不可過也。凡吐

時先以布擦腰腹於無風處，空心或半空心時得天氣清朗爲妙。如風痰急病及傷食者，不拘

以吐爲度。如不吐，含砂糖一塊，下藥涎出，不損人。此皆自吐之法，不用手探，但藥但湯皆可吐。

雖雜病，但宜升提其氣，便吐。通角防風山楂川芎桔梗蘆薈茶芽生姜非汗之類，加入二斤

陳湯中

吐之妙也。

瓜蒂散

治寒邪不在表，亦不在裏，而在脅中半表之分，故

症如桂枝，但頭不疼，項不強，寸脉微浮，或大脅中

痞鞕，痰涎壅盛，氣上衝咽

不得息，或懨懨煩躁，不得眠，

不經汗下，謂之實煩，宜用

如諸亡血及諸虛家，不可用。

瓜蒂赤小豆

各五分爲末用豆豉煎湯調服或以益湯

一二碗頓服服後宜卧片時欲吐且忍之

良久用指探之隨吐得快乃止如不吐飲熟湯一碗以助藥力如服藥過多者飲水解之未吐次日又服之

梔豉湯

治太陰病在胃膈脉大多痰及汗吐下後虛煩發

躁不得眠甚則反覆轉倒心中懊惓及身熱不去

心中結痛或按之軟者又治陽明症下後外有熱

手足溫不結節心中懊惓饑不能食但頭汗等症

山梔枝

四豆豉六錢水煎服得吐卽止

經曰酸苦澆泄爲

在上者湧之

痰涎壅盛湧以赤豆之酸

之苦

如梔豉湯更妙

梔豉之苦寒更入酸蘿蔔水少許以吐

中之邪

如梔豉湯表熱加柴胡薄荷加黃連傷食加山楂神曲

便閉加大黃

但病人微溏者不可服裏虛而寒在下也

經云先泄而後生他病者治其本必

且調之後乃治其

他

治瘀火於此而悟焉其神乎

○凡方以梔子爲主者

皆自梔豉湯

而變之也

○下

凡下積聚癭症須五鼓或平旦空心服藥傷寒
晚下不納飲食者已時以後尤好故日下無太
下藥用湯勝丸水滸萬物散也一服中病即止
不必盡劑通三五升次後以稀粥止之

大承氣湯

治陽明病脉實身重汗出不惡寒譖語煩躁五

井腋下濺濺汗出少陰口燥咽乾肺熱胃熱當消穀引
飲今久不能食者內必有燥屎若能食者但便硬耳又如
脈滑而數者有宿食凡病太熱太實太滿者宜

太黃厚朴芒硝枳實

各二錢半水一盞先煎朴減三分

煎一二沸溫服得利即止未利再服其太黃須用酒煨
若生用峻下則必爲邪熱於至高之分是以愈後多患
頭目等疾○治人本全云裏症脉沉急下者太承氣
湯主之肝之裏見症者加柴胡黃芩心之裏見症者加

黃連麥門冬，脾之裏見症者加白芍生地，肺之裏見症者加黃芩石羔腎，之裏見症者加知母黃柏。

小承氣湯

治裏症已見三因，腑腹脹滿而不甚堅硬，或曾

小滿者宜大黃五錢

厚朴枳實各二錢

煎服同前得利

即止。活人太全云

裏症脉浮宜緩下者

小承氣湯主

之肝之裏見症者加柴胡連翹

心之裏見症者加赤芍

木通

脾之裏見症者加葛根炒山梔

肺之裏見症者加

連翹黃芩，腎之裏見

症者加滑石黃柏

謂胃承氣湯

治傷寒二三日不解蒸蒸熱而不滿腹如仰

弄腹中轉矢氣必有燥屎及太陽邪熱入於

陽明裏之裏故不惡寒反惡熱

太便梗小便赤譖語而

嘔日晡潮熱狂躁煩亂脉來洪實者宜大黃

四錢芒硝

三錢甘草一錢煎服同前如發狂走罵者陰不足也宜

加當歸紅芍逆之順者從之是也方意承若順

也本草云通利去滯濁可去壅塞而不利閉而不通可以蕩滌使正氣得以順暢是以承氣名之經日燥溼所

勝以苦下之熱滻所勝治以鹹寒又曰燥滲於內而以苦溫是以三承氣湯宜分三焦受病而用之若三焦傷者痞滿燥實堅俱全是以太承氣湯用大黃枳實之苦泄滿實以微熱厚朴之苦溫消痞上氣亡硝之鹹寒潤燥軟堅上焦傷者有痞滿實而無燥堅是以小承氣湯用枳朴除痞滿大黃泄實熱不用芒硝因不甚燥恐傷下焦血分真陰謂不伐其根也中焦傷者無痞滿而有燥實堅是以調胃承氣湯用甘草種中芒硝潤燥大黃泄實不用枳朴恐傷上焦虛無之氣

三一 承氣湯

治傷寒雜病內外所傷一切風熱風痰濕熱燥熱入裏之深大小便閉或產難死胎不下

小兒斑疹里陷等症卽大承氣湯加甘草五錢生姜三片又能治肝經玉茎中痛故曰肝苦急急食甘以緩之故加甘草以調其中河濶得之於仲景也

陶氏六一順氣湯

治傷寒熱邪傳裏太便結實口燥咽乾怕熱譫語搊衣狂妄掲手擲足璇黃陽

厥潮熱自汗，脅腹滿硬，燒齶夜痛等症，是以代大小調胃三工。承氣大柴胡太陽，卽半夏湯之神方也。太黃枳實厚朴，芒硝柴胡，黃芩芍藥甘草煎法如前，臨熟入鐵秀水三匙，調服立効。取鐵性沈重，最能墜熱，開結故也。凡本宗胡湯脾約丸，生地芩連湯之類皆自此承氣而變之也。

○繆傷寒表症忌參惟熟近裏未可通利聲生地芩連

卷宜一

猪苓湯治陽明病，上焦熱，肺發熱，中焦熱渴，欲飲水，下焦熱小便不利，二子焦俱熱，宜使熟都於小便出，兼治少陰，挾熱下利，咳而嘔，渴心煩不得眠，先嘔後渴，頭痛身痛，胃燥及秋疫發黃等症，惟汗多而渴者不可服。猪苓茯苓阿膠滑石澤瀉各一錢，水煎去渣，入阿膠煎洋，溫服，方意以茯苓之甘，以行小便，澤瀉之鹹，以利水道。水瀉石阿膠之滑，以利水道。

五苓散治太陽病初無熱，但惡寒，不煩躁，不安，精神與人不同，散相當及汗後，胃中乾燥，不得眠，尿赤微煩，依渴惟多。

上焦微煩邪 猪在表惟渴則入裏熱未_夕成實不能消水
停蓄不散或傷寒下早心下痞滿不痛或太陽少陽同病
及中渴霍亂煩躁中濕關節疼
痛渴薄小便不利大便反快等症

猪苓茯苓白术澤瀉各一錢半肉桂五分爲末每二錢白湯
無熱煩躁狂言者服後以指探吐方意以傷寒發熱而
煩六七日不解脉浮者邪在表也或汗後亡津胃乾煩
躁不眠不能食但渴欲飲水者邪在裏也然上焦虛躁
或飲水不散而反吐出爲水逆症或飲水雖多而小便
不利者皆裏熱未實不能化水故耳是以用白术茯苓
猪苓之甘潤虛躁而利津液澤瀉之鹹以瀉伏水肉桂
之辛甘以和肌表經曰甘甚反淡甘緩而淡滲淡味滲
泄爲陽鹹味湧泄爲陰辛甘發散爲陽是也○加減法
陽症去桂熱服令汗出卽愈陰症加附子溫熱病加甘
草朮熟發黃加茵陳頭目痛加川芎葱白咳嗽加三昧
子熱吐加半夏熱瀉合外柴胡湯加黃連狂言亂語加
辰砂小便閉加瞿麥滑石大便難加黃芩勞復加桔梗

水氣加夢蒸發虛熱加參芪麥門冬以分陰陽腹痛加
木香氣塊加三稜莪术鼻衄加茅花尿血加山梔身痛
加蒼朮煩躁去桂加人參心煩不眠加阿膠

陶氏五苓散

卽五苓散

用桂枝加甘草滑石山梔燈心臨

緯鈞加燈心木通○凡道赤八正

散之類皆自此二方而變化之也

○和解和其內熱解其外邪

傷寒方之王道也

小柴胡湯

又名三禁湯禁發汗利大小便者宜此本治少陽半表裏症頭痛項強耳前後腫或聾筋脉拘

急身疼脇痛寒熱往來或嘔或渴或悶或悸脣脹痞滿
煩悶硬痛或汎下前後不解及瘟疫兩感太陽陽明初
症不敢汎吐喫之下過經不解熱入血室等症雜病蒸熱
肌體羸瘦爲用最多但其間有五症尤爲的當傷寒五六
日脣滿心煩喜嘔身熱心中咳逆不欲食或嘔或不
嘔者可服若因渴欲飲水者不可服寒熱往來而心

憐者二可服。脇下痛硬而痛耳。聾鼻瘡小便不利。或渴或不渴者三可服。發潮熱者四可服。瘥後發熱者五可服。要知無熟症者不可服。爲藥性頗寒耳。

柴胡三錢黃芩二錢人參一錢半夏一錢甘草

四分姜三片棗二枚

一枚水煎去渣澄清溫服。則能入膽。此方內有柴胡半夏能利能汗以解半表裏之邪。然本氣分藥也。而血病每用之者以柴芩專能調血故也。况傷寒日久不解者。熱必傷血。故表惡寒發熱而裏未實者。加桂以溫血。表熱而裏又燥渴糞硬者。加大黃以清血。胷中煩而不嘔去半夏人參加瓜萎仁渴者去半夏加入參爪萎根。腹痛去芩加芍藥。脇下痞悶去棗加牡蠣枳實。脇痛加青皮。未經下而心中飽悶。加枳梗。心慄小便不利去芩加茯苓。不渴外有微熱者。參加桂。咳嗽去參棗加五味子。炮乾姜。嘔加竹茹。虛煩加竹葉梗米。鼻衄加生地。茅花痰盛或喘加桑白皮。烏梅熟盛諸語不眠加山楂。黃蓮黃柏少陽陽明合病口燥目夜加芍藥乾葛。擗丸加鱉甲。過經不解。

晡熱已而微利加芒硝自汗惡熱譫語煩渴去半夏合
白虎湯自汗惡風腹痛或寒多熱少脉弱去芩合桂枝
湯血虛發夜熱合四物湯去芍藥加麥門冬活乾口燥去
半夏加天花粉或貝母齒燥血津涸加石羔脉弦虛無
力先因房勞夢遺感寒或病後血氣未固以致咳嗽吐
痰晝輕夜重發熱不止合四物湯去芍藥加麥門冬知母
黃柏脉弦虛無力或浮散發熱煩躁口渴不飲水此爲
虛熱去半夏黃芩合生脈散熱入血室小腹痛晝明夜
昏妄見或寒熱不定似瘧合四物湯加牡丹皮男一
子熟入血室加生地婦人熟入血室加當歸紅花
陶氏小柴胡湯卽小柴胡湯加陳皮芍藥川芎臨熟
入生艾汁三匙調服治法加減亦同
和解散尋常感冒用此等分柴胡二錢黃芩人參半夏甘
草各一錢姜三片棗二枚水煎服如嘔逆倍生姜
加陳皮頭痛加羌活防風寒熱間作加桂枝中暑發熱
頭痛加黃連春溫時行加生地升麻溫瘡加常山檳榔
火邪湯即小柴胡湯加黑豆一

大柴胡湯

專治少陽病，或因發汗利小便，轉屬陽明。此為

柴葉

治裏症內熱，目不了了，睛不知，口渴煩躁，黃斑年

妄譖語

大使堅閉，小便赤澁，繞脣刺痛，脉洪數沈實身

熱不惡寒

反惡熱及老人素虛，或過經不鮮，熱未除，或

下後仍發潮熱

或腹中餘垢，久滯，中脹滿而潮者，最

穩，若身體疼痛

是表未解，不可服之。柴胡三錢，黃芩芍

藥根壳各一錢，半夏一錢半，大黃二錢

壯實者倍之。生

弱者減之。

姜三片，棗二枚，水煎，臨熟入大黃煎一二三沸，

溫服取通快則止。

未利再服，經日熱退，於內以苦發之。

柴本之苦，以發傳經之熱，裏不足者

以甘以緩，中和之氣邪半入裏，則裏氣逆而嘔，半夏之辛

以散之邪，半在表，則榮衛爭爲寒熱，羨棗之辛，甘以和

之，此小柴胡治半表裏症也。經日酸苦澀泄，爲陰，是以

大柴胡湯用枳芍

之，酸大黃之苦，以泄上，利除中熱去

參草之甘者，恐補中也。仍用柴芩半夏，羨棗者邪未全

入於裏也。○加減法，皆亂譖語，加黃連山楂，宿溝加枳

梗，厚朴，舌胎黃赤口燥渴，飲水加瓜萎仁。夏月熱病煩

躁脉洪大加知母麥門冬石甘發班加牛地牡丹皮玄參發黃加茵陳黃柏鼻衄加犀角大便不通加芒硝

白虎湯

白虎西方之神應秋而歸於肺故夏近秋令中暑

煩渴妙藥主治傷寒汗後脉洪大而渴中外俱熱未全入裏宜此和解咸吐下後邪未除熱結在裏心胸煩渴甚欲飲水自汗不惡寒反惡熱太便不閉及二陽合病頭痛面垢譖語遺尿身重難以轉側一切時氣瘟疫雜病胃熱咳嗽噦發斑及小兒瘡瘍癰瘍伏熱等症上

知母

二石

五錢熟

甘草

六錢

粳米

半合

水煎溫服方

謂爲在裏表有熱裏有寒宜知母石甘之苦甘以解內外之邪熱則傷氣宜粳米甘草之甘緩以益氣征日熱瘥所勝佐以苦甘是也或問白虎性寒熱病惡虛誤服多成結胷夏月陰盛體薄忌之百問云太陽病汗後脉洪大者宜此云裏寒者傷寒邪未入府言寒已入府言熱非寒冷之寒與孤蒂散客寒上焦何同如虛煩甚加麥門冬裏熱大渴煩躁表熱微惡寒脉浮並加入參尺寸俱長而疾自汗大出身表如水乃陽明傳少陰宜

加桂枝、惡煩譖語小便
淋溢起卧不寐加山梔

陶氏白虎湯

卽白虎湯加人參麥門冬五味子甘梔姜棗在上

竹葉煎服治法同上如心煩加竹茹太渴心

煩皆惡寒去山梔

加天花粉

○凡黃芩湯解毒湯麥門冬湯一切平和清解之劑皆自此三方而變化之也○

抑論無汗煩躁而脉浮緊者可服青龍無汗喜渴而脉

浮者勿投白虎陽明自汗引熱則五苓散表可輕進

太陽自汗弱數則桂枝湯不可妄與其故何哉蓋人身

以氣液爲主在外則爲正汗以養皮毛而不燥在內則

爲津液以和胃口而不渴在下則爲小便而不溢是以

三者恒宜相固而不相傷也小便數則津下脫矣豈宜

桂枝重發其汗陽明汗多津外泄矣豈宜

五苓復內滲

其小便百虎之名義甚可畏者性甚寒涼無汗脉浮表

未全解猶宜柴胡解肌之藥豈可純以裏寒藥治之耶

無汗而不煩躁者麻黃湯有汗而煩躁者桂枝湯惟無

汗而煩躁者而後可青龍湯以加石膏、生地、丹皮、麻黃而

言故有是善名也噫用之當者朝大黃暮附子不爲憚

也用之不當小柴雖稍平和亦貽害
也用藥者可不ノ知古人立方之意乎

陰症

○溫補 溫其中補其虛素體虛裏寒及汗

吐下後暴虛寒者用之中病即止

理中湯

治太陰腹痛自利不渴脉沈無力

手足或溫或冷及蛔厥霍亂等症

人參白朮乾姜

各二錢

甘草

一錢半

水煎溫服

如作丸以

爲末蜜丸彈子大每一丸白湯化下大便澁者用丸利者用湯方意以乾姜之辛溫胃散寒參朮甘草之甘緩脾氣調中復曰脾欲緩急食甘以緩之又曰寒溼於內平以辛熱是也如寒甚腹痛拘急四肢逆冷加附子膝下動氣欲作奔豚去朮加生姜下多者倍乾姜胃虛則氣壅腹滿去朮加附子嘔吐不正減者倍草加姜汁吐蛔去耳草加烏梅飴逆加丁香柿蒂散

逆加木香霍亂轉筋加石羔寒濕發黃加茵陳肺弱泄
不止溺不利倍參术合五苓散內虛腹痛合小建中湯

陶氏理中湯 即前方加肉桂陳皮茯苓姜棗煎臨服入炒

渴氣上衝心機不發食餉即吐蛔腹痛便祕加大黃蜜少許利之腹滿滯時甚者去甘草嘔吐加半夏姜汁潞臥沈重利不止及利後身體痛加附子

附子自利腹痛加木香磨姜汁

治中湯 治太陰傷寒手足溫自利不渴咽乾腹痛悶時痛脈沈細及食積頭痛發熱惡寒身體不痛等症即理中湯加青皮陳皮等分水煎服

小建中湯 治傷寒陽脉濇陰脉弦法當腹中急痛有汗及上牙吐下尺脉遲者宜先服此又治傷寒三三日心悸而煩及諸汗不止等症

白芍錢肉桂錢甘草錢飴糖半盛姜五片棗四枚水煎

便溏或嘔者去飴糖紅曰建中者建脾也脾欲緩急食
甘以緩之飴棗甘草之甘以緩中辛潤散泄榮衛不足
潤而散之桂枝生姜之辛以行榮衛酸次泄也正氣虛
弱而行之方藥之酸以收正氣憊者氣虛也煩者血
虛也以氣血內虛與

小建中湯先建其裏

玄武湯見賦三白湯辛黃三白湯凡方

中以三百爲主者皆自此方而變化之也

四逆湯治直中陰症初病無頭疼無身熱無渴怕寒振慄

踴卧沈重欲寐脉來沈遲無力或無及太陰腹痛

自利不渴手足厥冷指甲唇青嘔吐涎沫或少陰下利
清穀或咳或悸裏寒外熱脉微欲絕發躁身反不惡寒

面赤腹痛或乾嘔咽痛或嘔吐逆或利止脉不出者
此爲陰甚於內格陽於外不相通也急宜此湯散陰而
陽又傷寒表症誤下自利不止或表症未除而下利不
止急宜此湯救裏凡三陰脉邊身痛並用陰毒要藥也

乾姜五附子生二甘草附相合辛甘大熱之劑散陰復

錢半

甘草一兩水煎溫服方意以甘草姜

陽經日寒淫於內治以甘熱又日寒淫所勝平以辛熱
是也如利止脉不出加入參無脉加猪膽汁面赤加連
鬚葱白腹痛加芍藥陰毒心一

硬股冷加麝香皂莢少許一

陶氏四逆湯

卽四逆湯

加入參白朮茯苓陳皮半夏肉桂

溫和卽止治法同上如嘔吐涎沫或小腹痛

加鹽炒吳

萸呕吐不止加姜汁酒不正加升麻黃芪咽痛加桔梗

當歸四逆湯

治厥陰病氣弱手足厥逆小腹疼痛或嘔噦

或囊縮血虛則脉細欲絕亦陰毒要藥也當

歸芍藥各二錢肉桂一錢半細辛通草甘草各一錢姜
五斤棗二枚水煎溫服經日脉者血之府也諸血皆屬於
心通脉者必先補心益血苦先入心當歸之苦以助
心血心苦緩急食甘以緩之通草甘草之甘以緩陰血
如素有寒氣加吳萸倍生姜
寒甚加附子脉不至加二人參

三味參萸湯

治厥陰病乾嘔吐涎頭痛甚極及少陰吐利

手足逆冷煩躁欲死陽明食穀欲嘔得湯反

剝屬上焦寒等症尤妙。吳萸三錢人參二錢生姜四錢
棗一枚水煎溫服。經曰寒淫於內治以甘熱佐以苦辛。
吳萸生姜之辛以溫胃人參大棗之甘以緩脾如陰逆
厥冷脣青面黑舌卷郊縮加附子細辛○十全大補湯
十六味建中湯一切峻補之劑皆自

理中建中四逆等湯而變化之也。

炙甘草湯

治傷寒麻代

甘草錢人參二錢

生地桂枝麻仁麥門冬各二錢半阿膠錢

姜三片棗一枚酒七分水一盞三分煎至三分服方意
以財代結者血氣虛弱不能相續也心動悸者真氣虛
也是用參草太棗之甘以補不足桂姜之辛以益正氣
本草云補可去弱是也麻仁阿膠生地門冬之甘以潤
經益血復脉通經日津耗散則爲枯五臟痿當榮衛
潤溫劑所以潤之也○單甘草湯滋陰降火湯補陰丸
生脉散補中益氣湯一切滋補之劑皆自此方而變化之也

傷寒終

東垣李先生內傷纂要

△內傷

饑飽勞役
飲食積聚

○內外傷辨

人身以胃氣爲主。凡言陽氣元氣。穀氣榮氣。清氣衛氣。春升之氣。皆胃氣之別名耳。脾胃一傷。中氣不足。穀氣不能上行。以滋養心肺。乃下流而乘肝腎。各 瘦厥氣逆。腎受脾濕。閉塞其下。致腎間陰火上衝。心肺心肺者天之氣。是無形之氣。受病故飲食勞役失節。爲內傷不足之症。肝腎者地之氣。受病故風寒邪侵筋骨。風傷肝筋 寒傷腎骨。爲外之氣。是有形之質。受病故風寒邪侵筋骨。寒傷腎骨 為外

傷有餘之症

經曰天之邪氣感則害人

五臟水穀寒熱感

於人則害人六腑又曰犯賊風虛邪者陽受之飲

食不節起居不時者陰受之陽受之則入五臟兩說似反而實不反也蓋內外之傷臟腑皆嘗受

之但隨其所從所發之處而爲病耳

經曰東風入肝西風

入肺南心北腎西南則舍於脾觀此則天之邪氣固傷五

臟矣然虛邪中人從皮膚而入絡脈而經而輸伏衝之脉

以至於腸胃又曰東北風傷人內舍於大腸西北舍於小

腸東南舍於胃則天之邪氣又豈不傷六腑乎

經曰飲食

自倍腸胃乃傷則水穀寒熟固傷六腑矣又曰形寒飲冷

傷肺飲食勞倦傷脾亦未嘗不傷五臟也

至於地濕亦未必

必專害皮肉筋脉而不能害臟腑邪氣水穀亦未必專害

臟腑而不能害皮肉筋脉也但以邪氣無形臟主藏精氣

故以類相從而多傷臟腑有形腑主傳化物故因其所

由而多傷腑濕氣浸潤其性緩慢故從下而上從淺而深

而多傷於皮肉筋脉耳孰謂濕氣全無及於臟腑之理哉

觀此則知傷寒溫暑內傷雜病陰陽虛實之理

而已矣仲景東垣丹溪河濶又豈有優劣哉有餘者渴

不足者補補渴一差生死立判其所以疑而似者爲百病
皆起於惡寒惡風發熱頭疼等症雜病亦有六經所見之症外科亦然所以世俗
混而無別其最易辨者傷寒惡寒猛火不除內傷惡寒元氣下無所熏受皮膚間無陽以護但見稍就溫煖卽止傷風惡風寒使惡非常常有之無間斷也稍就溫煖卽止傷風惡風不耐一切風寒內傷惡風偏惡些小賊風避居密室則不惡矣外
傷惡熱無有休歇日晡轉劇至丁酉時直待汗下方退內傷發熱亦似傷寒及中暎之症粗煩躁時止時作或自裸亦便清涼凡體弱食少過勞及常齋胃薄之人因勞役得疾皆與陽明中暎相似誤服白虎必死但中暎日晡熱甚或作譖語內傷日晡病減爲陽明氣旺故耳外傷筋骨疼痛不自支持便着床枕

內傷倦怠有似傷寒及中濕之症但四肢不收無力嗜卧而已間有脾爲寒乘則骨消筋緩亦非得病卽顯是症內傷寒熱間作而不得齊或因口吸風寒之氣燭其陰火使咽喉不通其吸入之氣欲入也爲膈上衝脉之火所拒使寒氣不得入其胷中之氣爲外風寒所遏而不得伸令人口開眼瞪極則聲發於內氣不能上下壅塞於咽中而氣欲絕又或因噦因幅因吐而燥熱發必有所因方有此症其表虛惡風寒之症復見矢表虛之弱爲陰火所乘燥發須臾而過其表虛無陽不任風寒復見矣是表虛無陽常常有之其燥熱則間而有之此二者不齊燥作寒已寒作燥已非如外外傷寒熱齊作而不間內傷傷之寒熱齊作無有間斷也

頭痛時止時作外傷頭痛非發散直傳入裏方罷然豈特初症似太陽可辨哉內傷則元氣不足神思昏怠語言倦

懶先重而後輕外傷則邪氣有餘神思猛壯語言強健先輕而後重內傷則手心熱而手背不熱外傷則手背熱而

手心不熱內傷邪在血脉中有餘則不渴間有渴者心火

余千人有渴者心火

者外傷邪氣傳裏則大渴內傷症顯在口雖食亦不知味

多唾涎沫鼻息不調或有清涕外傷症顯在鼻傷寒鼻塞

傷風流涕雖不能食而亦知味內傷氣口脉大外傷人迎

浮緊外感風寒則人迎脉緩或緊而大於氣口二倍或兩

三倍內傷

飲食則氣口

脉大於人迎一倍傷之重者

倍

少陰則兩倍太陰則三倍此內傷飲食之麻若勞役

過甚心脉變見於氣口是心火刑肺其肝木挾心火之勢

亦來薄肺故氣口脉急大而數時一升而澁也澁者肺之

本脉代者元氣不相接脾胃不及之脉洪大而數者心脉

刑肺也急者肝木挾心火而反剋肺金也若不甚勞役惟右關脉數而獨大於五脉數冲頭緩時一代也如飲食不節寒暑失所則先右關胃脈損弱甚則隱而不見惟內頭

脾脈之大數微緩時一代也宿食不消則獨右關脉沈而滑若顯內症多者則是內傷重而外感輕宜以補養爲先

若顯外症多者則是外感重而內傷輕宜以發散爲急此醫之大關德也奈何業者不學妄行凡病莫分內外專以

發散爲先實實虛虛可勝嘆哉

○內傷辨

新纂

內傷勞倦飲食之症固與風寒暑濕之病不同矣然勞倦傷與飲食傷又豈無可辨者哉以勞倦言之經云陰虛生

內熱又云有所勞倦形氣衰少穀氣不盛上焦不行下腕不通胃氣熱薰胷中故內熱此內傷之原也然人身陰陽有以表裏言者有以上下之分言者有以升降呼吸之氣言者此所謂陰虛之陰蓋勞過則氣化爲火水穀之味因蓋指身中之陰氣與水穀之味耳夫勞倦飲食損傷氣分思慮色欲損傷血分又豈無有陰血陽血之異乎以此見血陰氣陽者分陰分陽之義也氣血各自有陰陽者陰陽互爲其根之理也太浮陽氣虛者宜桂附兼參附峻補陰氣虛者參术甘草緩而益之陰分血虛者生地玄參龜板知母黃柏補之陽分血虛者茯苓參歸遠志或以下焦陰之類補之論至於此東垣丹溪之功大矣哉分爲言或以腎水真陰爲言皆非也夫有所勞倦者過動

屬火也形氣衰少者壯火食氣也穀氣不盛者勞傷元氣

則少食而氣衰也上焦不行者清陽不升也下脘不通者濁陰不降也夫胃受永穀惟陽升陰降而後變化出入以滋榮一身今胃不善納而氣衰少則清無升濁無降矣故曰上焦不行下脘不通然非謂絕不行不通也但比之平人則謂之不行不通耳上不行下不通則鬱矣鬱則少火皆成壯火而胃居上焦下脘兩者之間故胃氣熱熱則上炎故薰胃中而爲內熱也內傷始病熱中未傳寒中陰盛之所致遇寒則四肢厥冷心胃絞痛冷汗自出乃腎之脾胃虛也宜辛熱溫藥理中下二焦勞則氣散

氣短喘，且汗出，內外皆越。故氣耗矣。氣耗則火旺。火旺則乘其脾土。脾主四肢，煩熱無力，懶於語言，動作喘乏，表熱或表虛惡寒，心煩不眠。勞役初病少食小便赤黃大便或閉或結或虛坐只見些少自腰時有下氣或泄白或黃如糜苦心下痞塞或加胃脘當心而痛如刀割之狀，有時上支兩脇痛，必脅下相火上行，使陽明經氣逆胃中甚則高喘，但病每互出，不併作，與外感異耳。宜安心靜養，心之意即真勞矣。以甘寒瀉其熱火，以酸味收其散氣，以甘溫補其中。
經言勞者溫之損者益之是也。平人脈大爲勞，脉極虛亦爲勞。夫勞之爲病，其脉浮大，手足煩熱。春夏屬火，秋冬差隕，大者熱邪也，極虛者氣損也。春夏屬君，時助邪也，秋冬差者時勝邪也。以建中補中治之，亦溫之之意也。雖然勞倦亦有二焉：勞力絕乎傷日溫能除，大熱是也。

氣而無汗者補中益氣之旨也

夫脾胃虛者因飲食勞倦心火亢甚而乘其土位其

火肺氣受邪須用黃芪最多人參甘草次之脾胃虛肺氣先絕故用黃芪以益皮毛而閤勝理不令自汗上喘氣短損其元氣人參以補之心火乘脾炎甘草之甘溫以瀉火熱而補脾胃中元氣若脾胃急痛腹中急縮者宜多用之經曰急者緩之白朮苦甘溫除胃中熱利腰膝間血胃中清氣在下升麻柴胡以引之引黃芪甘草甘溫之氣味上升能補衛氣之散解而實其表也又緩帶脉之縮急三味苦平味之薄者陰中之陽引清氣上升也氣亂於胃中爲清濁相干用陳皮以理之又能助陽氣之升以散滯氣助諸甘辛爲用也脾胃氣虛不能升浮爲陰傷其生發之氣榮益大虧營氣不榮陰火熾盛是血中伏火日漸煎熬氣血日減心主血血減則心無所養致使心亂而煩病名曰悅悅者心惑而煩悶不安也故加辛甘微溫之劑生陽氣陽旺則能生陰血更以當歸和之傷之重者一日進進二服得陰陽和而汗自出病可已矣然兆發散之謂也

勞心兼傷乎血而有汗者黃

或建中之義心力俱勞氣血俱傷者雙和散之所由名也

凡諸益氣湯保元湯之類皆自補中建中而推之也凡渴脾湯養心湯及節齋新立二方之類皆自雙和而推之也

又旁勞傷腎症與勞倦相似

均上內傷發熱症也勞倦因陽氣之下陷宜補其氣以升

提之房勞因陽火之上升宜滋其陰以降下之上升一降迥然不同矣詳發熱

七情動氣脉與飲食無二

蓋飲食七情俱能閉塞三焦薰蒸肺胃清道肺爲氣主曲是而失其宣化之常所以氣口獨繫且盛

其症嘔泄痞滿腹痛亦大相似但傷食惡食臨時消息問察食七情雖作飽亦不惡食

俱不可不細辨

之茲述其略尚當於各類融會而貫通之可也以飲食傷

者言之經云因而大飲則氣逆因而飽食筋脈橫解則腸

澼爲痔蓋飲者無形之氣傷之則宜發汗利小便使上下

分消其濕解醒湯五參散之類是也。酒之氣味俱陽若以是無形之氣受傷而反下有形陰血致病真水陽毒太耗愈增陰火衝上元氣消亡七神何依雖不即死而虛損之病成矣所以酒道不許下下之久久成黑疽蓋以此也。

食者有形之物傷之則宜損其穀其次莫若消導丁香爛飯丸枳米丸之類主之稍重

則攻化三棱消積丸木香見曉丸之類主之尤重者則或

吐或下承帝散備急丸之類主之此大法也條分縷析其

間有失餓傷飽而無停滯者或飲食不調之後加之勞力

或勞力過度之後繼以不調皆謂之不足而當補益者也

有自己喜食或與人鬪食而停滯者此爲有餘而當消導

者也。又有傷生冷硬物者。有傷辛竦熱物者。或熱物多而寒物少。或寒物多而熱物少。或先食熱物而後食冷物。以致前食熱物亦不消化。所傷之不同。如此安可以執一乎。况人之氣稟盛衰。每每相反。前物滯氣傷。必補益。消導兼行者。有物暫滯而氣不甚傷。宜消導獨行。不須補益者。有既停滯而復自化。不須消導。但當補益。或亦不須補益者。有

潔古東垣枳朮丸之類。雖曰消導固有補益之意。存乎其間。方以白朮。甘苦溫。甘溫補脾。之元氣。苦味除胃中之濕。熟利腰膝間血。故先補脾胃之弱。過於枳實。尅化之藥。一倍。枳實味苦寒。泄心下之痞悶。消化胃中所傷。此藥下胃。其所傷不能即去。須待兩時。庶則消化。是先補其

靈而後化其所傷則不發利矣荷葉中空象震震者動也人感之生足少陽甲膽者風也生化萬物之根蒂也內經云立端於始序則不愆人之飲食入胃營氣止待卽少陽

甲膽之氣也其手少陽三焦經之司胃氣穀氣元氣甲膽上升之氣一也荷葉空青而象風木食藥感此氣之化胃氣何由不上升乎更以燒飯和藥與白朮協力滋養令胃更耳不至內傷若傷熱用丁香巴豆熟藥傷冷用大黃牛寒藥不但遺留藥毒重濁中元氣又且飲食傷中魚而反瀉上焦清氣暗損人壽不得終其天年但人不自覺耳其他如冰香分氣丸導氣枳

實丸大枳壳丸之類雖無補益然施之於物暫滯氣不甚傷者豈不可哉但不宜視爲通行之藥爾且所滯之物非枳术丸之力所能去者亦安可泥於消導而弗之變乎故備急丸瓜蒂散等之推逐者亦未嘗棄之而弗用也故善

用兵者攻亦當守亦當不善者則宜攻而守宜守而攻其
敗也非兵之罪用兵者之罪耳觀乎此則知消導補益推
逐之理矣吁均一內傷也勞倦不足一而已矣飲食有有
餘不足之分焉誤用補益則甘溫助濕生痰變生嘔瀉脹
痛危症誤用推逐重傷元氣脫下而死利害匪輕如此故
妄綴之爲內傷辨

○脾胃虛實傳變論

經曰胃太腸小腸三焦膀胱五者天氣之所生也其氣衆
天故渴而下藏九竅者五臟之所主然必得胃氣乃能通

利胃氣一虛口目耳鼻俱爲之病其身熱頭痛耳鳴目眩

流重爲熱所傷元氣故也陽氣最惡煩勞順之則固惟脾

胃和則穀氣上升爲春夏令行而人壽脾胃不和則穀氣

下流爲收藏令行而人矣凡十一臟皆取決於膽膽氣升

則餘臟從之膽氣不升則餐泄腸澼天食人以五氣地食

人以五味味藏於胃以養五氣氣或乖錯形何以存故諸

病從脾胃而生明矣姑以勝衰者言之胃中元氣盛則能

食不傷過時不餓脾胃俱旺則能食而肥脾胃俱虛則不

能食而瘦或少食而肥雖肥而四肢不舉蓋脾胃而邪氣

盛也。又有善食而瘦者，胃伏火邪，於氣分則能食，脾虛則肌肉削，故面熱者，胃病也。胃病則脾無所稟受，故亦從而病焉。脾病則下流乘腎水，怒令人骨髓空虛，力不足，不能履地。是陰氣重疊，陰盛陽虛，汙之則愈，下之則死，然非正發汗也。用辛甘之藥滋胃，當升當浮，使生長之氣旺以助陽耳。夫胃病其脈緩，脾病其脈遲，若火乘土位，其脉洪緩更有身热心中不快之症。此陽氣衰弱，當從升降濡沈補瀉法中用藥。詳後用藥法象蓋治病不達，升降濡沈之理，漏泄中用藥雖愈亦幸耳。昔有病脾胃久衰，視聽半失，淫雨陰寒踰月不止，泄利體重肢節痛，大便泄下，小便澀，若用淡滲之劑，病雖即已，降之又降，是益其陰而重竭其陽。

精神愈短故必用升陽藥以養活獨活柴胡升麻各一錢
防風茅草五分水煎稍熱服陽氣升騰而疾去矣又有脾
胃虛損目疾時作身面目睛俱黃小便或黃或白大便不
調食少氣短怠惰醫以鴻府散下數行而前疾愈甚適當
暑雨素有黃症所以增劇也因立清神益氣湯治之茯苓
升麻各二三分澤瀉葛根各三分生姜四分此數藥能
走經除濕熱而不守故不瀉亦臘肺與脾胃本中氣之虛
弱青皮一分生甘草白芍各二分人參五分此數藥能
能守本而不走經不走經者玉滋經絡中之邪守皆能補
臟之元氣黃柏一分麥門冬八分五味子三三分此
藥去時令浮熱濕熱水煎空心
熱服而愈舉此二者以爲症佐如脉緩病怠惰嗜卧四肢
不收或大便泄瀉此濕勝也從平胃散若脉弦氣弱自汗
四肢發熱泄瀉毛枯髮落從黃芪建中湯苟脉緩而用建
設矣脉血弱摘四物湯一二味脉弱氣短摘四君子湯

胃則

誤矣

脉虛血弱摘四物湯一二味脉弱氣短摘四君子湯

一二味或小便赤黃從五苓散去桂摘一二味俱以本症
中加之如妨閼此非腹脹乃散而不收可加芍藥收之中
焦用芍藥則脾中升陽使肝膽之中不敢犯如腹中空狹
及縮急者去之及諸澁酸藥亦不可用腹痛者加甘草白
芍稼穡作甘者已也曲直依酸酸者甲也甲已化土此
仲景之妙也五苓散治渴而小便不利無惡寒者不可用
桂不渴而小便自利妄見妄聞乃瘀血症用炒黃柏知母
心臟熱而竅不利者導赤散或虛坐而大便不得者皆血
虛也血虛則裏急或血氣虛弱而目睛痛者皆加當歸身

調理脾胃於此五藥中加減無不應驗然終不能使人完

復內傷以脾胃虛敗為甚酒色少之尤虛損脾胃盛者易

衛脾胃弱者只可半愈故農樵終歲勞苦而不成傷能

納能化脾

胃盛耳

後或有因而再至者亦由督任衝三脉

火爲邪

陰爲邪

胃氣虛弱之所致也法湏依症加減如熟方療病非素問

之旨也經云至而不至是爲不及所勝妄行所生受病所

不勝乘之也至而不至者謂從後來者爲虛邪心與小腸

乘脾胃也脈見浮大而弦病或四肢煩燥口苦舌乾咽乾

蓋心主火小腸主熱火熱乘土濕熱相合故煩燥渴亂四肢

脾胃之末也火乘之故發熱飲食勞役所傷以致脾胃

虛弱乃血所生病主口中津液不行故口乾咽乾也心之
真氣之別名今七神離形而脉中惟有火矣善治斯疾惟
使心無凝滯人或逢喜事或天氣暄和或食滋味或眼前
見可愛事則慧然無病矣蓋胃中元氣得舒伸故也忌用五
谷散藥亡津宜補其母於

心與小腸中以補脾胃之根蒂甘溫白爲主苦寒黃爲使

酸味藥爲之臣佐以其心苦緩急食酸以收之此治心火
是爲不及火旺則肺金受邪金靈則以酸補之次以甘溫甘寒

芩連知柏之劑於脾胃中瀉心火之尤盛是治其本也火
生地之類垂脾亦爲不及心火者陰火也起於下焦其緣系於心火
不主令相火代之相火下焦包絡之火元氣之賊也火與
元氣不兩立一勝則一負如脉見洪大而煩渴氣喘是火
大旺而氣大衰也陰火說自東垣乃發素問之未發者也

所勝妄行者言心火旺能令母實母者肝木也木旺則挾
火而妄行故脾胃先受之或身體沈重走注脇痛蓋濕熱
相搏風熱鬱不得伸附著于有形也或多怒者風熱下陷
於地中也或目病內障肝主血開竅於目也或妄見妄聞
起妄心夜夢亡人或寒熱往來或四肢滿閉或淋溲便難
轉筋皆肝木火盛而爲邪也或生瘻或生癰或生厥或中
風或生惡瘡或作腎痿或上熱下寒皆風熱不得升長而
木火過於有形中也宜柴胡爲君防風赤芍甘草桂枝爲
臣猶苓澤瀉茯苓蒼朮知母黃柏滑石石菖蒲川芎細辛蔓荆子升麻爲使經云
惟有陽明厥陰不從標本從乎中中乃不定之辭兆中外

之中也。蓋厥陰爲十二經之領袖，主生化陰陽，足陽明爲十二經之海，主經營氣血，諸經皆裏之。言陽明厥陰與何經相併而爲病，酌中以用藥，所以言此者，發明脾胃之病，不可二例而推，欲人知百病皆由脾胃而生也。釐毫之失，病立生。假如時在長夏，於長夏之令，中立法，謂正當主災，病立生。假如時在長夏，於長夏之令，中立法，謂正當主氣，氣衰而客氣旺之時也。後之處方者，當從此法，加時令藥。如長夏則補脾胃，除少升陽湯是也。太抵此法，此藥欲陰陽氣升浮耳。大禁滲泄滋陽之味，亦有從權而用黃柏、知母爲督任，所生受病者由土弱不能生金，反受火木之衝，三脉盛也。所生受病者由土弱不能生金，反受火木之邪，而清肅之氣傷，或留滿少氣，短氣氣上，精神少，而倦惰，慘慘常不樂，皆陽氣不足而陰有餘也。或咳嗽寒熱者，濕熱乘其內也。宜人參爲君，白朮芍藥爲佐，橘皮青皮以破滯氣，白皮甘草水香根擗五味子爲佐，桂枝桔梗爲引用。所不勝乘之者，水乘木之。

妄行而反來侮土故腎入心爲汗入肝爲泣入脾爲涎入

肺爲痰爲嗽爲涕爲嚏爲水出鼻自入則爲溺多爲惡寒

也治宜乾姜爲君白朮附子肉桂爲臣茯苓猪苓澤瀉爲佐使一說下元土盛尅水致

督任衝三脉盛火旺煎熬令水沸騰而乘肺故痰唾出

於口也下行爲陰汗爲外腎冷爲足不任地爲腰脊背胛

脚下隱痛或水附木勢而上爲眼澁爲眵爲冷淚此皆肺

金之虛而寡於畏也夫脾胃不足皆爲血病故九竅不通

諸陽氣根於陰血陰受火邪則陰盛陰盛則上乘陽分而

陽道不行無生發升騰之氣也天陽氣走空竅者也陰氣

附形質者也。如陰氣附於土，陽氣升於天，則各安其分也。
今所立方中，有辛甘溫藥者，非獨用也；復有甘苦大寒之
劑，亦非獨用也。以火酒干製爲之使引，苦甘寒藥至頸而
復入於腎肝之下。此所謂升降浮沉之道，自偶而奇，奇而
至偶者也。激肝膽之用，是令陽氣生上而出於陰分，未用辛
甘溫藥，按其升藥，使不發散於陽分，而令走於九竅也。
升降浮沉說天，以陽生陰長地，以陽殺陰藏。天氣旺於寅，
寅者引也。立春少陽之氣，始於泉下，引陰升而在天。草木
甲坼，立夏少陰火熾，草木盛茂。此謂天以陽生陰長。經言
歲半以前，天氣主之在乎升浮也。地氣旺於申立秋太陰，
之氣始得大伸。自天而下降徹地，則品物咸賓。立冬少陰
之氣，伏於泉下，水冰地坼。此所謂地以陽殺陰藏。經言歲
半以後，地氣主之在乎降沈也。春溫夏暑秋涼冬冷，正氣

之病升已而降降已而升如環無端運化萬物於日覆端於始病則不愆人之呼吸升降殺象天地飲食入胃氣先歸肺脾肺上行春夏之令下行滋養周身乃清氣爲天者也升凡而下輸膀胱下行秋冬之令爲傳化糟粕乃屬陰爲地者也損傷脾胃真氣下溜或下泄而久不能升是有秋冬而無春夏百病皆起又有久升而不降者亦病焉於此未之有則履端之義明矣

經云食入于胃散精于肝滻氣於筋食入于胃

獨氣歸心滯精於脉脈氣流經經氣歸于肺肺朝百脉輸精於皮毛毛脉合精行氣於腑且飲食入胃先行阴道而陽氣升浮也浮者陽氣散滿皮毛升者克塞頭項則九竅通利也若飲食不節損其胃氣不能轉化散於肝歸於心溢於肺食入則胃欲卧得卧則食在下邊氣暫得舒是

知升發之氣不行者此也經云飲入于胃遊溢精氣上輸

於脾脾氣散精上歸於肺病人飲入胃遽覺至膝下便欲

小便由精氣不輸於脾不歸於肺則心火上攻使口燥咽

乾是陰氣太盛其理甚易知也况脾胃病則當腑有動氣

按之牢若痛有是者乃脾胃虛無是則非也亦可作辨明

△內傷饑飽勞倦總方

○補益

補中益氣湯治形神勞役飲食失節虛損身熱而煩脈大

而虛頭痛或惡寒而渴自汗無力氣高而喘

兼治婦人室女經候不調血脫益氣之本法也

黃芪

一錢勞役甚者加五分

人參久嗽肺有火者去之甘草

各一錢三味除

去白术

加黃柏草豆蔻神麌半夏

當歸和血白朮

助脾

陳皮

導氣又

能同諸

甘藥

益元氣獨用

漏脾

柴胡

引少陽

清氣左

升大除勞

升麻

引胃氣右升

而復其本位

同柴胡須用酒

炒三遍

如咳嗽及有汗者

用蜜炒微

欬而

降之五件各

五分靈甚

升柴只用二十分

汗多者全去之

參芪木有用至二兩

一服者草有

用二三分

錢一服者

水煎

已未午初時溫服

傷之重者連進

千服如得微汗

卽愈忌多言勞役靜養

二十時辰夕方進美膳以助之

常服去升柴加黃柏

三分以滋腎

水紅花二分入心

養血多用破血

加味黃芪湯

又名保元湯

治陽虛背寒

卽前方

去升柴陳歸

加肉桂甚者

加附子

升陽順氣湯

治春月口淡無味

夏天月雖熱猶寒

饑飽失常

以致頭脹滿悶短氣

喜怒不節以致憂思氣

結恐懼氣下等症

卽前中益氣湯

去白朮加黃柏草豆蔻神麌半夏

黃芪人參湯

治夏天氣熱精神不足兩脚癆軟煩熱嘔
藏自汗頭痛痰嗽心脇腹痛胃中閉塞小便頻

數大便難而閉結皆熱傷肺之所致也宜常服之
卽補中益氣湯去柴胡加蒼朮神麌五味子黃柏

清暑益氣湯

治長夏濕熱蒸人四肢困倦精神少懶於動作
作胃滿氣促支節痛或氣高而喘身熱而煩

心下膨閉小便黃而數大便溏而頻或痢或渴不思飲食
自汗體重等症

卽補中益氣湯去柴胡用黃芪一錢

止汗除熱人參五分當歸甘草各三分補中益氣蒼朮
一錢白朮澤瀉各五分滻利除濕升麻一錢乾葛二分

善解肌熱又以風勝濕也濕勝則食不消而作痞滿故
炒神麌五分青皮二分陳皮五分以消食快氣腎惡燥

故以黃柏三分借其味濕熟補氣虛者滋其化源以五
味子九粒麥門冬三分救暑傷肺金中鳴忌汗下溫針

升陽補胃湯

治長夏濕熱陽明少陽下血卽補中益氣湯
去陳皮加桂芍羌防乾葛獨活生地牡丹皮

升陽益胃湯

治秋燥令行濕熱少退體重節痛口乾舌乾
飲食無味大便不調小便頻數食不消兼見

肺病酒漸惡寒慘不樂面色惡而不和乃陽氣不伸故也黃芪二錢人參甘草各一錢白朮三分陳皮四分柴胡三分加羌活獨活防風各五分以秋旺故用辛溫海芝白芍澤鴻各三分渴者勿用半夏一錢黃連一分白芍五分姜棗煎服後加小便罷而病加劇去蒺藜澤鴻何故秋旺反用參术芍藥之類補之脾胃虛則肺俱受邪故因時而補易爲力也若毒食不可飽食恐胃再傷忌不可淡食以損藥力宜安靜少役形體使胃與藥得轉運升發胃氣稍強少食東物以助之經云五穀爲養五果爲助者也

神聖復氣湯治氣乘冬足大陽寒氣足少陰腎水子能令督脈閉塞疼痛善噦口中涎目中溢鼻流瀉涕不止或息肉不聞香臭欬嗽痰沫上熱如火下寒如冰頭作陣痛目中流火視物瞞睛耳鳴耳顛頭併口鼻或惡風寒喜日陽夜卧不安常覺痰塞咽喉不通口失味兩脇縮急而痛牙齒動搖不能嚼物陰汗前陰冷行步欹側起居艱難掌中寒麻木小便數而晝多夜頻欠氣短

喘，少氣不足以息，遺失無度。婦人白帶陰戶中痛，牽心而痛，面如赭色。食少太便，不調，煩心霍亂，逆氣裏急，而腹皮色白，後出餘氣復不能努，或腸鳴，膝下筋急，肩胛大痛。此皆寒水木復火土之讐也。乾姜炮三分半，夏六分，柴胡一錢，藁本八分，防風，人參，郁李仁各五分，升麻七分，附子二分，當歸六分，羌活一錢，甘草八分，白芍花五朵去心，水五鐘煎至二鐘，入黃芪草豆蔻各一錢，陳皮五分，月前至二鐘，入黃連，黃柏酒洗枳壳生地各三分。已上四味先一日水浸，又以細辛二分，川芎，蔓荆子各三分，先一日用水半鐘，分作二處浸此三味，并黃柏等煎，正藥作二鐘，不去渣，入此浸藥再煎至一太鍾，去渣空心稍熱服。又治咬頰咬舌，咬唇舌強等症，宜食肉汁，不宜食肉，不助經絡，中火邪也。太抵腎與膀胱，經中有寒，元氣不足者，皆宜服之，神妙。於月生月滿時，隔三五日一服，如急病，不拘時分。

沈香溫胃丸

治下焦氣弱，脾胃受寒，飲食不美，氣不調和，臟腑積冷，心腹疼痛，大便滑泄，腹中雷鳴，霍

亂吐瀉。手足厥冷。大便無變。又治下焦陽虛。脾腎令痛。一切寒中。及療傷寒陰濕形氣沈困。自汗等症。沈香芽草良姜。當歸吳萸人參木香茯苓白术芍藥各五錢。附子巴戟乾姜茴香各一兩。官桂七錢丁香二錢爲末。醋糊丸梧子大每五十丸空心熟米飲下。忌一切生冷物。

○調理

參木調中湯。海熟補氣止嗽定喘和脾胃。進飲食。卽補中益氣湯去當歸升柴用黃芪四分人參甘草各三分陳皮二分白朮加桑白皮各五分瀉肺定喘。五味子廿粒收蕤散之氣以止嗽。地骨皮二分善解胎熱。茯苓三分以降肺火。麥門冬二分。以降肺氣。青皮一分散鬱中滯氣。洽脉弦洪緩而沉。按之中得三滯。其症四肢安忽肥忽瘦。四肢懶倦口失滋味。大小便清利而數。或上飲下便。或大便澁滯不行。一日二日一見。夏月狼泄。

米穀不化或便後見血見白膜，胃膈短氣咽膈不通，安卧嗜睡無力不思飲食卽補中益氣湯去木歸用黃芪

一錢人參甘草各五分升麻柴胡橘皮各三分加蒼朮四分木香一分水煎熱服

節齋補氣方

人遇勞倦辛苦用力過多卽服一二服免生門冬各一錢茯神八分甘草七分五味子廿粒姜棗煎服勞倦甚加熟附子四五分

節齋補血方

人遇勞心思慮傷損精神心虛氣短驚慄煩熱宜服人參一錢二分五味子十五粒當歸

麥門冬白芍茯神酸棗仁牛地各一錢山梔

甘草陳皮各五分川芎四分空心姜棗煎服

雙和散治心力俱勞氣血俱傷或房室之後勞役或勞役熟地各一錢官桂甘草各七分半白芍二錢半姜棗煎服以此調治但陰虛火動者宜善加減又黃芪當歸二味亦名補血湯善治內傷發熱人參養榮湯黃芪建中湯八物湯平胃散五苓散皆調理間用之劑也

硃砂安神丸

治勞神過度，以致心神煩亂，夜不能欲，吐氣亂而熱似懶體狀，或服升補藥後氣浮心

亂以此鎮之

則愈方是木卷

○升散外熱

升陽散火湯

治男婦四肢發熱，肌熱，筋痺熱，骨髓中熱如燒，擗之略平，夫四肢屬脾，脾者土也，熱伏地

中，此病多因血虛而得，或胃虛過食冷物，抑遏陽氣於脾土，火鬱則發之，此藥乃胃膽脾肺膀胱經藥也，升麻

葛根獨活羌活白芍人參各五分，防風二分半，柴胡八分，炙甘草三分，生甘草一分，水煎服。

升陽湯

治手足心發熱，升麻葛根柴胡白芍各一錢半，防風甘草各一錢，葱白煎服。

甘草二錢，黃芪三錢

紅花少許，水煎服。

火鬱湯

治手足心發熱，升麻葛根柴胡白芍各一錢半，防風甘草各一錢，葱白煎服。

鴻陰火升陽湯

治肌熱煩熱而赤少食喘咳痰盛右關脉緩弱或弦或浮數羌活甘草黃芪蒼朮各

一錢升麻八分柴胡錢半人參黃芩各七分黃連酒炒石羔各五分深秋六分水煎服

按此發脾胃火邪之劑

又心膽肝肺膀胱藥也鴻陰火升發陽氣采養氣血者也

○分消內濕

升陽除濕湯

治脾胃虛弱不思飲食腸鳴腹痛泄瀉無度小便黃四肢困弱升麻柴胡防風神曲澤瀉

猪苓各五分蒼朮一錢陳皮甘草麥芽各三分姜棗

煎服如胃寒腸鳴加益智仁半夏非腸鳴不得用

升陽除濕防風湯

治大便閉塞或裏急後重數至周滿不能利或有白膿或血慎勿利之利之則

反帶結而不通以此舉其陽則陰氣自降矣如脾濕下流肝腎而成泄痢者宜此補之升之舉之不可疎下若脈實腹脹閉塞不通從權以苦多甘少之藥泄之蒼朮四兩防風二錢白朮白芍各一錢用冰二錢半先

煎蒼朮至二下鍾入諸藥再煎至一鍾空心熟服

○婦人

升陽燥濕湯

治白帶下陰戶痛控心急痛身黃皮綬身並如山陰中如水防風良姜乾姜郁李仁甘草

各一錢柴胡一錢三分陳皮黃芩各

五分白芍花七朵分作三貼水煎服

升陽調經湯

治飲食勞倦暴崩不止或下水漿怠惰臂肘四股困倦及夏月帶下脫漏等症獨活五分

蔓荆子七分當歸防風甘草升麻藁本各一錢柴胡羌活蒼朮黃芪各錢半空心水煎服以飯壓之

升陽舉經湯

治經水不止如右丸按之空虛是氣血俱脫大寒之症雖輕手其脉數疾舉之弦緊或澀

此是陽脫陰火亦亡或見熱症於口鼻眼或渴此皆陰燥陽欲先去也此方切補命門之下胞也肉桂盛夏勿

用白芍紅花各五分細辛六分人參熟地川芎各一錢獨活黑附子甘草各錢半羌活藁本防風各二錢白朮

當歸黃芪柴胡各三錢桃仁十枚分作四帖空心水煎服

益胃升陽湯

治婦人經候不調或血脫或脈弱食少水泄日二三行卽補中益氣湯加神曲錢半黃芩

五分腹痛加芍藥此方氣血之藥血脫益氣之要法也

升陽和中湯

治閉目則渾身麻木晝夜甚覺而閉目則麻漸退乃陽衰陰旺非有風邪法當補肺瀉火

陰火與濕通行經脈調和陰陽此藥主之生甘草去腎熱用黃柏白芍澤瀉俱除濕導火升麻行陽助經柴胡各一分半橘皮當歸白朮各二三分白芍人參各三分佛耳草炙甘草各四分黃芪五分食遠水煎熟服

○小兒

保元湯

治慢驚風令脚土實而木不敢犯又爲疹痘絳紅必用之藥也黃芪錢半人參一錢甘草五分水煎

服加減
見小兒

○外科

補中益氣湯

乃癰疽托裏排膿扶脾
胃之聖藥也加減由人

內傷耳嚮日黃頰頸腫頸肩腰時臂外後廉痛面赤脉洪大者以羌活一錢防風藁本各七分甘草五分通其經血加黃芩黃連各三分消其腫人參五分黃芪七分益元氣而瀉火邪另依一服與之嗌痛頸腫脉洪大面赤加黃芩○內傷發斑者因胃氣虛甚是火逆行於外亦痰熱所致火則補而降之熱則微涼以散之切不可

下恐生

卷三

右補中益氣一方六經見症詳傷寒百病相兼見雜病春夏秋冬無不可通男女內外無所不治升而滲之羌獨菖防不爲發散降而沉之木香檳榔猪澤知柏不爲躁滲熱之乾姜肉桂甚則附子寒之芩連滑石甚則木黃藥者於此而悟焉則處方用藥非惟善於加減變化而無疑滯亂雜之弊亦且關鍵可觀而有洞中懇處

之妙然後謂之依東垣用藥亦卽謂之効仲景處方蓋能依東垣則仲景在其中矣能効仲景則東垣亦在其中矣二十八方藥俱自湯液而來理意同而品味多寡病不同耳且清暑益氣仲景法也胸與東垣相似尤爲証驗以後雜病方中直言百般加減由人卽此類是也其餘如頭痛加石膏並活棗則不甚錄卽頭痛大陽川芎陽明白芷豈可槩加石膏並哉諸益氣皆自補中而變或以補中益氣爲主而加散邪之藥或以辛涼解散之藥爲君而以參术等藥爲臣皆因時令主客互爲勝衰內外感傷各有輕重而加減消渴之也其實通治飯食勞役或無勞動依懶於言語或飯後反覆或當春口淡或遇夏惡寒或值秋熱令稍退肺病酒淋條慄不樂或痰嗽或飽或便後見些膿血無非脾濕下流以致內熱生諸病初病熱中則可用之若未薄寒中則不可用也蓋耳酸適足以益其病耳如黃芪人參甘草芍藥五味子之類是也以此見諸并益之劑難用尤甚於桂枝麻黃湯也飲食傷成積聚者潤藥推逐尤宜慎重

內傷飲食積滯方

見雜病傷食積聚
益氣湯加咸見雜病藥賦

編註醫學入門外集卷之三

續

序

易吾

君名萬翁

