

產科指南卷上畢

姓娠腹滿大便燥者二宜

右為末糊丸每服一錢白湯送下

蕎麥西一大黃西三

朱明丸

右搗以白蜜二合和服如豆

甘遂西二

者甘遂散下之

療姪子淋大小便並不利氣急服諸冷散不差

外臺甘遂散

生地黃汁和代赭石末服方寸匕

又方

赤小豆為末好酒服方寸匕日二度

又方治姙娠數月經尚來者

十

丹參舶來物ヲ用ユハシ和産疑ハシキ物

治姙娠胎墮下血不止方

丹參四十以好酒五升煮取三分三服

千金方

子按鯉魚能利蓄水故可令服之

療姙娠數傷胎者

中煩三過作効安穩無忌

右如法作腫少著鹽勿著葱豉醋食之甚良一月

鯉魚斤二 粳米升一

外臺秘要方

吐血衄血者二洞當飲一兼用又

右熱湯攪出一用二方黃栢一

川芎 黃芩 黃連各一 大黃分五

龍騰飲

三日此湯以龍騰飲ヲ兼用速二愈

一婦人姪娘微熱血熱肉日逆出ノ不止

所ナ龍騰飲兼用ノ宜

吐血衄血卒胸痛者是盛奴而其氣暴逆之得儿

石水煎服

皮各五分甘草一分芍藥一分

柴胡 黃芩 黃連 茯苓 半夏 生姜 青

洞當飲

此方二宜之

者二宜之 又妊陰門兩邊赤腫者八針之忌

煩燥口渴浮腫有熱而大便秘之或四肢麻痺

生姜一分 右水煎服

麻黃 大棗 蒼木 石膏 甘草 芍藥

龍翔飲

他急証十者宜服

治水腫及脚氣小便不利諸藥無效者心下不滿

仰少 右水煎

葵子葵子 商陸商陸 猪苓猪苓 杜仲杜仲 甘

赤小豆炒 沈香四 木通二 木瓜二 澤瀉

禹水湯

攪化頓服

右先以水二合煎直根入參至一合去滓內熊膽

熊膽五上品 直根入參二

熊參湯 治子癩

右水二合煎一合服

人參一直根黃連五

黃連湯 治子癩

治姪嘔吐不止者

右為丸或水煎服或加附子

乾姜 人參 一直根 兩各 半夏 兩二 生地黃 少

乾姜 人參 半夏 丸

香或加附子

姪嘔惡阻心下滿嘔吐者二宜之或加丁香

伏龍肝煎服

半夏參一 茯苓參四 青皮參一 生姜參一

虎翼飲

按又凡二姪娠氣心腹不和而痛者二宜之

治又

暈嘔吐往來寒熱無問產前後一切氣滯皆

助入腹中結塊發渴刺因之不調或入臍

婦人一切諸氣作痛或上湊心或攻築脇

有效

甘艸少 右水煎熱服又加沈香大腹皮當飯尤

正氣天香湯 香附子各六 烏藥各一 陳皮 紫菀 乾姜各六

正氣天香湯

陳皮為六君子湯用二或八加炮姜附子用二

用二此方治胎二八孕死胎一或八加何膠半夏又加半夏二

火者二宜之又每孕死胎一或八加何膠半夏又加半夏二

脾胃元氣虛弱飲食少思又飲食難化作酸屬虛

右姜棗水煎

人參 白木 扶苓各二 甘艸

四君子湯

于氣之和入八則痛自止

溫補劑服藥反腸二泥者此湯以

痛冷者久小建中湯或桂枝加附子湯等

此方胎腹不和者宜若寒邪腹二入

腹虛冷者加附子

麥芽氣惱加烏藥香附身冷寒汗加桂枝

黃芩嘔吐加砂仁半夏傷食如山查子香附

腹痛如木香附咳嗽加桑白朮穀腹熱加

痛及胎前諸疾此方二依減入

子懸者心胃脹痛兼胎氣不和心腹脹滿疼

大腹皮甘艸右生姜水煎

及承子四 卷之 三

當歸 川芎 白芍 參 紫蘂 陳皮

紫蘂和氣飲

難堪者亦宜之

診脈ノ量儿ノ又頭痛甚者又肩背強リ甚之

見之動之入事之不知呼吸如絶更ニ聲ナキハ

癩甚者角弓反張之左脇ノ鉄棒ノ如キモノ

常日夜暗者等皆宜之又產後不語者二宜之又

兒夜啼不止身冷者或ハ瘦弱者又產後眼目如

不止或ハ身冷者白帶下或ハ大人小兒雀目小

ハ乳房堅痛乳汁不通或ハ月水不順或ハ崩漏

〜每夜夢驚或〜每夜不眠或〜手足指麻痺或

〜或痛三身乍寒乍熱或〜自盜汗或〜欠數

氣鬱〜眩暈頭背強〜心胸動氣〜心下痞

驗〜ル〜コ〜左〜如〜

用〜テ〜効〜リ〜産後〜肥立〜甚ヨ〜口〜之〜其他經

〜方〜十〜リ〜平〜生〜癩〜証〜ル〜者〜臨〜産〜催〜生〜二〜替〜入

此方産前産後氏二リ〜人二隨〜用〜テ〜ヤ〜下

薑各一獨活各四右水煎服

半各一真各三附子各五羌活各五甘少艸少當歸

沈香 益智 川烏頭各二天麻 防風

沈香天麻湯

活入腹冷者八更二加附子

又每孕死胎墮者早本方二加阿膠半夏用

治妊娠氣血不足又產後怔忡氣血虛驚恐者

与藥各等甘草少右水煎服

入參白木當飯茯苓川芎生乾地黃

八珍湯

墮儿者八加阿膠半夏

不止者如神丸兼用有効又每孕胎死

右水煎服產前後大便下利腹冷者二宜之如

扶苓 芍藥 生姜 白朮 各三 附子 各二

真武湯

湯ヲ用ルハ活入ハ活入

盜汗者ヲ治入又每孕ニ死胎ヲ産入者此

ハ如阿膠大 半夏中 産前後氣血虚寒熱自汗

茯苓 桂枝 各五 右煎服 但胎隨入ル症ニ

白朮 黄芪 芍藥 各一 當歸 乾薑 川芎

第一和劑湯

十

櫛椶ハ次ナリ和製ノ炒テ豆粒ノ如キ者ハ効

本草 卷之四 櫛椶 櫛椶ノ皮ハ...

阿膠二數品阿膠玉樣八上品阿膠又玉樣八上品

遙散如山施子阿膠邪解後宜服前方按

腹冷者加附子又外邪身熱或八寒熱汗出者道

阿膠三右水煎服治每孕二三月必墮胎者

當歸生生艾葉艾葉川芎川芎藥藥艾葉艾葉分三

艾四物湯

此方服之

中中腎氣圓應七腎氣圓應七宜

小便不利小便不利腎氣圓應腎氣圓應風邪二

治小便不利腫滿身熱者治小便不利腫滿先

右水煎服 或加車前子

猪苓 茯苓 何膠 澤瀉 滑石 各等分

猪苓湯

治妊娠轉胞腫滿小便不利身冷者

附子 八分 右水煎服

車前子 五分 山藥 五分 牡丹皮 三分 山茱萸 三分

地黃 一斤 茯苓 五分 牛膝 八分 桂枝 一斤 澤瀉 一斤

加味腎氣圓

每孕胎死腹中者胎前養血活

胎動下血或八水下凡小離凡子膜不破者又

血發熱者治入又加縮砂可十或八顯卧

右姜水煎服胎倦或八胎動腹痛或八下

阿膠各等何藥者八膠生芩宜樣半夏不稱

川芎芍藥地榆

白木茯苓黃芪甘艸當歸

安胎湯

腹冷者加何膠附子二宜

凡者二宜又臟弱孕每二死胎二及者

右水煎服產前後寒涼二中リテ腹痛拘急

膠飴升一

西三

生薑

芍藥

桂枝

大棗

甘草

桂枝

小建中湯

或加附子

下此方二宜之腹痛者下之又臨產身冷者宜之

者二宜之腹痛者下之又重者痛夕入難

右水煎服妊娠寒涼中胎悶腹痛入

桂枝附子湯

大棗

生薑

甘草

芍藥

桂枝

桂枝加附子湯

八証二隨之

藥附子湯只氣弱者八四君子湯或八附子加餘

凡臨產元氣常ノ如クニ只身冷ル者ハ桂枝加芍

ル者下リ然レハ產後ニハ破血ノ劑良トスハ

之強テ用ユレハ氣血ヲ動カシ後ニ寒熱汗渴ヲ發

仁大黃芒硝等ノ破血ノ劑ヲ投スル者下リ忌ムハ

臨產ノ者ニ一向催生ノ爲ト思ヒ故テ壯ク牡丹桃

若シ餘証ノ下ル者ハ其証ニ隨テ方ヲ施スハ又

ヲ察シ証ニ隨ヒ方ヲ處スハ時ハ安産ス

吾カ門ニ催生ト定ムタル方ナシ只臨産ハ虚實冷熱

臨産ノ者ニ古來ヨリ催生ト稱スル方下リト雖モ

經驗方

ヲ得タルモノナリ

産論ヲ熟讀スルニ數百遍ニ溼思專精ニ屢試

術熟タル者深ク參考スヘシ予ハ師授ナクシテ只

ハ術ヲ以テ皆逆産ノ狀ニ作テ出テ術ナリ因テ他

雖氏田生ノ術ハ横産ニ頂産門ニ趣カザル者

凡回生ノ術ハ神奥ニ未熟ノ及テ所ニ非ス然ト

テ後ニ初テ其術ヲ傳ルナリ

予モ亦門人ニ先ツ他ノ諸術ヲ教ヘ熟シ得セシメ

及ノ所ニ非入トテ口授ニ傳ハ來リシトアリ故ニ
子玄氏先生回胞ノ術ハ究テ神奧ニノ筆墨ノ

回生鈎胞術

ニ故ニ熟術ノ者ニ口傳又ルノ三

施セハ出產有ハシ尤王書記又ハ氏初心ノ者ニ者得難

ヲ活又ハシ假令母子俱ニ死又ト雖氏此術ヲ以テ

腹中ニ動テ命アハルハ急ニ一生存ノ術ヲ以テ出シ兒

臨產未タ出又ニ母急ニ惡証ヲ發メ忽チ死シ兒

母死活兒術

トアヲシテ恐ハキニ足ラヌ

一 啼聲ノルハ奇ナリ故ニ治方ナシト雖氏止ム

リ 悶ノヲナストノハ氏啼聲ヲキカス然ルニ萬

ノ 按ニ按妊娘虚冷者腹熱者或痘熱疹熱ノ毒ニ中

ルヲ信セ入胎腹中ニ啼聲下リ雖氏自ラ止ム

周西按前文曠園種志ト虞氏正傳ノ二說子ハコ

奇子昔聞先慈言子亦在先慈腹中作聲者數次

拾物使兒復得令入口中即止柴乃用此術身不足為

姪婦登高取物脫出兒口以此作聲令姪向地

而聲止按虞氏正傳云臍帶上疣瘡乃兒口中令者因

於地令人掖婦逐一拾起納奩中逾時拾至三枚

驚恐柴坐定審視良久顧座間有象棋一奩隨手散傾
栢暑栢因囁視往視見婦委頓而腹中作聲不止舉家
月腹中忽忽作聲一時喧傳杭州有柴北溟善醫密
云康熙三十八年栢某分巡江西有胥役吳敬婦懷八
外又後廢帝元徽中車莞徐垣妻懷孕亦然曠園雜志
啼聲宋孝武大明中張暢妾懷孕而干腹中啼聲聞于
醫賸曰玉芝堂談警云雞跖集王曇母孕時腹中聞
文夕左二出又
醫賸二其說下因于始于是夕明夕得夕其
止于子甚其理于疑于然于二醫官多紀懋先生

ル其聲呼吸ノ音子之但發音ノ是亦藥治ナク自
ニ又子力知ル所ノ農家ノ妻姪ヲ十月然ル者ヲ見
恙ナシ其人今年六十四歳子聞テコソ疑フ然ル
聲アリ藥治ナク自止ム同月下旬安産ノ母子俱ニ
隣家ヨリ嫁リ姪ノ母ノ腹内ニ於テ啼
子力本科ノ師木更津山玄明君ノ妻其母ハ子力
兒啼母腹中說

才ヨリ三月忌ムニ崩漏ノ疾ヲ患ル下リ
大ナル戒トス又産後房事ヲ忌ム健婦トイヘ
凡産前多房ノ者ハ産後辱ヲ病ヘ此姪中ノ

忌房事說

△ハシ慎△ハシ
 △カシ危シ譬ハ過テ瘡ヲ敗テ膿ヲ漏ルカ如シ慎
 或ハ鬱冒シ或ハ角弓反張メ諸惡証ヲ發ス十二
 此真ノ敗血ニシテ若シ上衝スハ血暈シ氣急シ
 移入經水獨リ專ラ流シ出ル所ナク氣血ヲ散亂ス
 ハ未タ熟セ又シ強テ傷リ胞ヲ灰ヲ放ツ故ニ母ヨリ
 二達シ努力ヲ入テ臨産ノ本位ナリ然ルニ半産
 巡リ靜ニ兒モ亦下ヘ進ニ安ク故ニ陣疼自ラ下
 リ乳汁トナルヘシ故ニ胞膜離ルトノ血氣ノ

二 天離レ胎ニ移入經水モ亦自然ト止テ變シテ上
 分熟シテ催シテ懼ルハ慎ムハ撥スルニ本産ハ天然天理
 二 危シテ恐ルハ慎ムハ撥スルニ本産ハ天然天理
 三種急ニ傷ルハ半産ハ是ヲ本産ニ比スルニ殊
 墮胎ノ坐藥ヲ用ヒテ半産スルヲ顛外打撲坐藥
 二 胎轉動シ胞膜傷レ半産スルヲ或ハ好テ
 半産スルヲ又身ヲ顛外スルカ或ハ打撲ノ類
 ルヲリ又一ノ病ヲ發テ其毒ニ傷テ死ト胎トナリ
 凡半産スル者ニ必ス故テ死胎ニナリ半産ス

半産説

玄子先生ノ名術ニ及クハ萬代不朽ノ大法ナリ
俱ニ堅固ニシテ臨産ノ時横礙ノ難産ナシ此術ハ胎
常ニ相離レ又様ニ致シ其位ニ安シタル時ハ胞胎
術ヲ盡シ胎ノ督脈ト母ノ任脈トヲ重子相合ヲ
シ整胎ノ術ニ及テハ先腹ノ失ヲ垂レテ居ルハ九
子宮ノ口邊ハ兩足ノ踵ノ失ヲ垂レテ居ルハ九
尾ルト謂ルヲ始テ知ルナリ又逆孕ハ横骨ノ中
ル時ノ様ニ似タリ其女ノ是ヲ探得テ大ニ驚キ倒ニ
ル九ノ指頭ニコリツク其様已ニ生レ出シテ欲入
メ子宮ノ口邊ヲ探ラシムルニ九月後ハ兒ノ頭堅

廿ト久其法姪婦自身ノ指ニ本陰戸ノ中ノ入ニ
疑子居ル子モ亦如何セシト按シ術ヲ替テ其女ニ
西人愚ナル女下リテ數度廿トセテ其得ルナク
俗婦人自身安難ヲ知ル大ナル益ナリ然ルニ一
里ニ姪下レハ此ノ曉又ニ得ル者多シ此後世ノ
メ但他人ノ術ト異ナル三術ノ意味ハ同シ子カ
ニナルナリ其術ト謂ルモハ此書ニ有ル術ニ
兒ノ頭明カニ見入ルナリ而シテ整胎ノ術モ自身
ヲ横骨ノ上ノ際任脈ノ下ヲ深ク推動カシ見レハ
仰臥シ左右ノ手ノ中指ノ頭ヲ小腹ノ下左右ノ嘗

暗ニ符合スル故ニ彼笑タルノ大謬ナリ事ヲ知
 ルトアリ予又按スルニ學ハ入メ疑者ハ俗ナリ先
 此道ヲ學ビ試シ欲セハ初心ノ者ハ九月臨月ニ
 及テ妊婦ヲ帶シ解シ仰臥セシメ両足ヲ屈セシ
 メ小腹ノ下横骨ノ上ノ際^トヲ醫者ノ手ノ指ヲ尊ヲ
 任脈ヲ々々カカリ腹中ヲ深ク推シ擲シ様ニ動カ
 シ見レハ順孕ノ者ハ胎頂丸ク堅ク指ニ應スル
 明カナリ逆孕ハコニ反入只試スシテ疑者大俗
 ノ癡言ナリ又妊婦自身ニ腹中ヲ探リ否ヲ悟シト
 欲スル者ハ九月後ニ及ビ我身ヲ前ニハル様ニ

醫學綱目 卷之六 婦人經水

產科ノ書ニ元ヨリ倒首ニ定ム其言子女子ノ說ト
書ニ又曰後長洲譯官橋林氏所藏ノ證厄利^キ亞國ノ
ノ居ルト謂ル說ヲ妄言ナリト大ニ笑ハリ然^キ氏其
ルニ其言ニ產論ノ胎腹中ニ有テ始ヨリ首ヲ倒ニ
及又^リ發明スル名家ナリ然ルニ解體新書ヲ覽
ニ於ケル實ニ我邦及唐土ノ諸名醫ト雖^キ氏未聞
シト此ハ一糸ハ古今未幾ノ確ニ論^ク賀川氏ノ此科
月ニ至テ此ヲ按テ其體貌ヲ別テ而盡ス^ルヲ得ハ
背面ノ首ヲ倒ニス其頂横骨ノ上際ニ當テ居リ臨
產論曰腹中ノ胎大抵五月ノ後大サ瓜ノ如ク必ス

背面倒首論

之圖ニシテ下ノ卷ニアリ
 出ル者ハ表裏反ラシキハ出ルモ下リ定リナ
 先ニ兒出ル時臍帶ヲ引テ出レハナリ又胞自ラ安
 凡胞膜出ルニ腹ニ於テ裏反リテ出ル者多シ是ハ
 筆者謬ルカ
 謬ルカ又胞衣胎ノ凡ニ有テ表裏ノ謬アリ是ハ
 又産論翼ヲ視ルニ囊胎ノ狀謬アリ先生異物ヲ見
 リト此一條ハ有識ト雖レ胎蓋ヲ母ノ鳩尾ノ下ニ有
 産論ノ說胞衣胎ノ凡上ヲ蓋ヲ母ノ鳩尾ノ下ニ有

著ヲ養ノ血ヲ受ルニ疑ナシ逆孕此ニ及ルルニ
 三ニ及ルルニ及ルルニ及ルルニ及ルルニ
 囊胎ノ様ト合入ル時ハ考ルニ胞衣母ノ腰ノ裏ニ
 ルニ胞肉ノ所ハ胎ノ尻ト頭ト蓋ヲハキ様ナシ
 胞肉ノ近所ニアリ圖ニ下ノ卷ニ見入是ヲ察ス
 比口分整テ見ルニ頂ヲ以テ膜ヲ突破リ出シ穴ハ
 圖ノ如ク身ヲ潜メテ居ル又諸産アノ毎ニ胞膜ヲ
 衣ヲ前腹ニ蓋テ其間ニ臍ヲ束ワタカマテリ有テ
 ナリ予満月ノ囊胎産又七月ノ囊胎産ヲ見ルニ胞
 全ク包マレテ居ル其胞傷レテ入メ其儘出ルヲ去
 囊胎ハ別ニ名アテル事ヲ聞カテ諸産ノ胎皆胞膜ニ

囊胎說

リ或ハナシ然シコレハ予カ未タ知ラ又ナリ
氣ヲ受ルニ遠シ故ニ死血ノ痕僅ニ肩背ニ下
置クトイヘハ熱物ノ通ル邊少ク除テ居故ニ其
或ハ右或ハ左入テ肩背ヲヤハリ中脘ノ邊ニ
ナシ又才モ入テ孕ノ者ハ頂ヲ脇助ノ下邊
入シ然レハ熱物胃中ニ納リテハ外ヘ其氣受ル所
食熱物ノ氣ヲ受ルニ數百度因テ其邊死血トナ
倒ニ居ルハ月後ハ尻腰ヲ鳩尾ノ下ニ置ク故ニ飲
ノ消入如何トナレハ是死血ノ痕ナリ胎ニ下リ

或曰小兒腰脊ノ邊ニ青ク班文アリ漸々三年ニ

小兒腰青痕說

ルク當ルノ三

ハク薄シ或ハ十シ横骨中ニ入ラ又者子宮ニ緩

拒ム十々咬レ又故ニハク文薄シ又逆孕ノ兒

故ニ胎ノ頭上腹ニ位シ頂骨ノ中ニ入ラ又者ハ

ニ下リテ頂骨ノ中ニ入リ拒テ咬シ下トナリ此

凡小兒頂ノ後ニ横樣ニハク文下リ此ハ母ノ腹

小兒頂後有禿說

ナキモハ死ス

卷之四 十一

診ノ二米粒程ノ動氣下ル者ハ必ス活ク動氣絶テ

ノ邊ヲ數遍撫テ勢ヲツケヘシシ力ノ虚里ノ動ク

トナキハ命危シ如此モノハ急ニ頂ト胸ト腹ト或ハ脊

凡難産初生ノ兒坐草ノ上ニ於テ身弱ト啼ク

救初生虚兒說

ルトナシ

掌ハ兒出ルニ去ルカヲ然スレハ陰門傷ル

ハ兒ノ頸ヲ擱テ努力ト共ニ引出スヘシ肝門ニ當ル

ヲ已ニ兒ノ頭門外ヘ出兒ノ兩肩交骨ニ拒礙ル者

留メ片手ヲ以テ母ノ身ヲ抱ヘ肩ヲ以テ前腹ニ當

肛門ヲ突張ルヲ待テ醫片手ノ掌ヲ以テ肛門ヲ推
如ク細クメ危シ此ヲ傷ルハ子婆ノ謬ナリ胎ノ頂
凡臨産已ニ胎ノ頂出ル時陰門ト肛門ノ界肉糸ノ
護ニ産門ノ術

ルハ子宮ノ口邊ヲ探テ見分クハ止事ナク努力ナ
ク入羞シ胎ノ類ニ出キ物ハ以テ推シ下ハ力
東ヲ瘀血ヲ包ム下リ謬テ手ヲ以テ推シ下ハ力
疑テ一槩ニ好成ハ異物ト謬ル可ク是ハ子宮
ノ上邊ニ當テ大挽ノ程ノ狀九キ一塊下ル下リ
宮縮ツリ本位ニ復シ消スルカ如ク愈又一種橫骨

五五
卷之五
五五

下宜之熱証者大黃牡丹皮湯ニテ宜之瘀血下リ子

方腹冷ノ者ハ折衝欬加附子或ハ木槧湯加附子ナ

ノ瘀血モ十倍ニ滿メ下ル様ニ見ユルヲ見ユル其治

如ク中ニ物充滿メ下ル様ニ手ニ應久ル者下リ僅

非入腹中ノ寒熱ニ因テ子宮努テホクノ鼓脹ノ

者下リ胎ノ有様ニ似タリ數人試ルニ瘀血ノ三三

凡産後一兩日ノ中ニ腹ヲ探見ルニ一物大塊下ル

産後腹狀說

忽子半ハ愈ル程ノ功下ル者多シ

又シテ^{立地}ニ愈ユ又重者トシテ服藥セ又前ニ

ハ予ハ必ス勸メテ身ヲ卧シムルハ輕キ者ハ藥セ
凡産後身ヲ起シテ蹠テ居テ血暈ヲ發ル者下レ
モハ其苦ム了産籠ニ同シ皆忌ムハシ
産婦ヲ寄着シテ蹠テシムル了凡十一日夜スル
惡証ヲ發ス此故ニ予力郷ニ用ル産所ニ物ヲ積テ
ラセテ居ラシムルハ倦テ身ヲ動シ氣血ヲ動シ
ヲ卧テ安シスルヲ宜トス産籠ノ類ニ身ヲ蹠
スレハ氣逆ノ血暈ヲ發スル基トナシ故ニ身
トヘ氏西三日身ヲ直ニ立ツ事ナカレ血室ヲ動
宜シキナリ只身ヲ反リテ卧シ忌ムハシ假令健婦

宜シキナリ 卷之十一 十一

子 臥之 屈之 伸之 屈之 伸之 屈之 伸之 屈之 伸之
ハ 入之 枕之 常日 少之 高之 先之 右之 地之 二着
立 之 歩 行 入 之 力 入 之 膝 頭 之 地 二 著 之 力 二 着 之
凡 産 後 坐 草 之 去 之 膝 二 身 之 著 之 身 二 必 入 身 之
産 後 保 養

モ ノ ナ シ 是 ヲ 自 然 ナ リ
ノ 者 寐 之 血 氣 之 安 入 ル 二 ハ 身 卧 セ シ ム ル 二 勝 凡
ヒ 忽 子 健 力 二 本 復 入 ル 者 多 之 按 入 ル 二 凡 之 苦 行
百 人 試 ル 二 害 ナ 之 宜 之 産 婦 之 亦 各 大 二 日 口 口
婦 之 見 ル 毎 二 勸 之 産 後 必 入 身 之 卧 セ シ ム 之 數

ト謂フ知ラズ子ハ子亥子先生ノ説ヲ信シ産
古昔ヨリ世ノ人漸ク習トナリシ事ナレハ害下ル
ハ害ヲ求テ功ナシ其害ノ八条ハ産論ニ委シ然レ
箱ノ如キ物ノ中ニ身ヲ躐クマシ居ラシムル
凡東都ニ産籠京都ニ産椅ト稱メ三方四方間キ
産椅ノ説

求ルモナリ産後モ同シ
スハシ但緊シキヲ忌ムハシ胎ヲ推シ倒シ難産ヲ
テ能カラシム然ラハ取テ捨ヘカヲ入輕ク程ヨク
又其好ム所ノ有様ヲ考ルニ産前後氏ニ氣ヲ輔ク

卷之六
三十一

及ハカヲサレサレ然シ予數百人ノ孕婦ノ意ヲ問ヒ
凡鎮帶ヲ用ユルハ萬物自然ニ然ニツカヌ時ハ此ニ

鎮帶說

ヲナスモノナリ慎ムハシ
者ハ腹中ニ死スルカ又ハ推倒シ横産杯ノ大難産
シ胎ニ悶ヲ成サシム尤モ忌ムキナリ又程ヲ過ル
シ或ハ交接ノ時腹ヲ重ク逆ニ推シ腸胃ト共ニ動
シ成テ或ハ斜ニ成ハ推倒シ又重物ヲ持テ往來
且寐ルニ身ヲ改テ兩足ヲ屈シ胎ニ碍リ動カシ
凡難産ヲナス者ハ第一鎮帶ヲ緊ク束テ胎ニ碍リ

五 最 早 五 日 三 十 五 日 者 八 週 凡 者 八 最 早 五

下 凡 者 八 半 產 目 的 十 然 其 下 凡 者 八 最 早 五

入 或 八 痛 大 血 下 者 下 先 水 下 凡 者 八 最 早 五

漏 下 見 分 凡 者 八 痛 大 血 下 者 下 先 水 下 凡 者 八 最 早 五

凡 月 水 二 三 月 止 卒 下 血 入 者 下 凡 者 八 最 早 五

流 產 崩 漏 分 別 凡 者 八 最 早 五

凡 者 八 最 早 五 日 三 十 五 日 者 八 最 早 五

凡 者 八 最 早 五 日 三 十 五 日 者 八 最 早 五

中 二 脉 動 十 此 母 血 胞 衣 二 凡 者 八 最 早 五

摘 下 試 公 凡 者 八 最 早 五 日 三 十 五 日 者 八 最 早 五

ル者下リ死胎活胎ヲ悟ラシト欲セハ其帶ヲ指ニ
拒ム故ニ臍帶本位ニ復ラヌト下ル故ニ先夕子出
リテ頂ニ戴キリシテ後ニ頂横骨ノ中ノ下リ下リ
母若シ顛卧トシ身ヲ轉動シテ臍帶其本位ヲ解下
者下リ又一種ハ胞胎本位ニ下リテ無事ト入レ
キ水漿ト共ニ下リ出ル者カ又胞ヲ共ニ出レ
又其間ヨリ子宮ノ口邊ノ落着テ下ル故ニ頂ニ戴
ク下ニ落下リ臍帶ヲ伸下リ頂未タ横骨中ニ入
ル毒ニ當リ離テ養ヲ受ケ又故ニ胎死入胞ヲ亦虚
ハ前ニヨリ死胎ニナリ胞ノ母ノ腰ノ裏ニ着所何レ

シ胎ノ頂ニ先々チ出ル者下リ此ニ種下リ一種

發シ胞ノ膜胎ノ頂ノ邊ヲ水幾走リ下リ臍帶若

モ是ヲ後^サ産下モ又^サ跡^サ産^サト^サ然ルニ臨産努力ヲ

胞衣トノ間ニ下リ産ノ時後ニ出ル者ナリ世俗ニ

凡臍帶ハ胞衣ノ裏ニ着テ胎ノ前腹ニ束子蟠リ

臍帶說

後人ノ名論ヲ俟ツノ三

度ノ精氣ノ餘リ謂ツハキヤ解シ難キ事ナリ只

力ヲ入然レハ品胎品胎ヲ生スル者ハ此モ交接一

ノ小弱ナリ者下リ必^サ交接一度ニ好^サ生ト云

著ノ様ヲ又子一胎大ニツノモノ胎ハ六七月ノ様ニ

テ下リ察スルニ元來ニツノモノ胎ハ六七月ノ様ニ

蓋シスモ下ラシカ胞一ツトノ膜ハ必各構

胎限ル子ハ信セス凡一胞ニ子ヲ孕者ハ

生ト子按スルニ此説ハ交接一度ニ變胎品胎

巢氏病源論ニ曰陽施ニ陰化シ精氣餘リ故ニ子

二暗シト謂入キナリ

取リテ謬ルニ當ルヤハリ推察ニ化理ト本位ト

ニ玉ヲ二ツニ度ニ納レテ又此ヲ出入次第ノ理ヲ

出ルヲ比ト名ク子其意ヲ按スルニ假令ハ穴ノ中

又明ノ季空同ノ説ニ好先ニ出ルヲ第ト名ク後ニ
 シ化理ノ次第ヲ考テ前文ニ敏テ名クハシ
 同下ル下リ此故ニ出ル時ノ前後ヲ第テ名クテ難
 卜又雙順雙逆又一逆一順產ノ者出ルニ次第不
 シ故ニ後ニ出ルヲ然レ氏胎ノ身大小強弱子ル
 ハリ産門ニ近シ前腹ハ容孕ノ假坐ニ産門ニ遠
 下リ按ルニ脊ノ邊ハ先胎ノ居ルヘキ本位ニヤ
 ニ着居テ後ニ孕ノ胎ハ前腹ニ有リテ重リ居ル様
 見ルニ凡先ニ孕メ胎腹ニ有リテハ母ノ背ノ邊
 世ノ説先ニ出ルヲ第ト名ク下リ子好孕ノ數産ヲ

凡胎衣兩胎一胞ノ者ハ形必大ニ臍帶兩條胞ニ
 又母無事ナルモ下リ産シ終テ死シタルモ下リ
 子次ニ正兒生ル、ヲ見ル其兒小弱ニ日中ニ死
 ツハ異物孕ノ者凡三度コレ見ル皆先ニ異物出
 大ニ次ニ生ル、兒多ハ小ナリ又ハ正兒一
 凡子カ知ル所ノ孳數ノ中先ニ生ルハ兒多ハ狀
 トヲ亂シ見ル化理ノ本ヲ知ル要ナリ
 ト大小強弱ト兩胎一胞ノ者臍帶ノ根本胞ニ着所
 ハ健ニ大ニ小強弱ト一子ハ弱ナル下リ其初生ノ前後
 又胎ノ身ノ大ニ大サ孳共ニ大小ナク同キ下リ又一子

凡變子胎雙男子下リ又雙女子下リ又一男一女下リ

ハ又

下リトイヘ氏各膜ヲ搆テ下リ圖ニ下ノ卷ニ見

凡變子胎各ニノ胞ニツテ下リ又共ニ一胞ノ者

難キ下リ考フヘシ

ヲ探ルニ手ニ應ヌル各異ナリ又異物孕ノ解ニ

又双順胎下リ又雙逆胎下リ又一順一逆孕下リ是

孕ニモ腹大ナル者下リトイヘ氏其形格別異ナリ

シ一胎ハ母ノ脊ノ邊ニ着ク一胎ハ前腹ニ居ル且平

ハ漸ク前へ突出シ九月臨月ニ及テ其形ヲ窺ノ如

卷之六 胎前之漸

凡變胎ノ腹狀六ヶ月以前ハ見分ケカクシカクシ七月後

變胎ノ說

下ニ載タリ

治セ又ト謂了ナシ第六ノ手術ハ下ノ卷接腹ノ條

ニ謂ル胎轉動治術ト此整胎ノ術トヲ施セハ全ク

今如何様ナリ轉動歪斜變急ノ痛ヲルトハ前

ト云フハ其様ニ隨ヒテ術ヲ前ニ倣テ施スハシ假

子啓ノ良術ナリ若胎ノ射カクムク左ノ右ノタカ

リニ翼ノ第六ノ手術ヲ施シ整和ノ置クハ此ハ

子先生ノ發明セシ萬代不朽ノ名術ナリ而シテ終

聖胎論 卷之六 六

如 輪ノ 胎死ニ 逆分チ 順者ハ 甚シキ 下ルニ 横ニ 様ニ

益 ハ 胎死ニ 或ハ 居ニ 斜ニ 或ハ 背ニ 本位ニ 胎ノ 整

探 ヲ 此ノ 大ニ 兒ノ 後ハ 月七 假令 胎ノ 整

ル ヲ 胎ノ 整ニ 入ル 胎ノ 整ニ 入ル 胎ノ 整ニ 入ル

入 胎ノ 轉動 前ニ 謂ル 欲セ 胎ノ 施ニ 胎ノ 施ニ 胎ノ 施ニ

胎前術

二 八翼ノ 第六ノ 術ヲ 盡ス 入ル 胎ノ 整ニ 入ル

入 胎ノ 諸術ノ 凡ク 胎ノ 輕ニ 胎ノ 奇術ノ 胎ノ 奇術ノ

二 胎ノ 發明ノ 胎ノ 胎ノ 胎ノ 胎ノ 胎ノ 胎ノ 胎ノ 胎ノ

二 胎ノ 胎ノ 胎ノ 胎ノ 胎ノ 胎ノ 胎ノ 胎ノ 胎ノ 胎ノ

胎ヲ探リ其狀ヲ見分ケ整胎ノ術ヲ施ス極
又胎本位ニ轉シ此ヲ試シ三日施メトイフナシ
度施メ愈ル重者ハ二三日施メトイフナシ
ニ止ム此皆本位ニ復ルナリ輕者ハ一日二
推入レ數回入レハ漸ク和合シ全ク愈ニ隨ヒ痛更
入ク緊ク推テヤハリ徐ク力ニ手ヲ引緩ルメ又緊ク
キヲ入ト痛ハシ若クコヲ入カ又ル痛様ヲハラハ
的ニ定メヤハリ其所ヲ指頭ヲキヒシヲ推トキハ
ハ胎轉動ノ本位ニ背キシ所ナリ治術ハ痛所ヲ目
邊稍力ヲ強ク推シ痛ヲルヤ否ヲ問ヘ痛ヲル所

以テ左右ノ章門或ハ脇腹ノ上脇腹ノ邊又横骨ノ左右ノ
 人ヲ仰臥セシメテ醫者左邊ニ坐メ兩ノ手指頭ヲ
 フリ腹ヲ按テ痛ム所ヲ不和ノ所ト知ルニ先婦
 或ハ腰伸ザルカ或ハ寐テ右カ左カ一方寐苦キ者
 覺ハ甘ル者モ下リ然ル者ハ何レ腹部和シ難キカ
 吐逆ノ滯食ノ如ク下リ或ハ胎ノ三轉ノ敢テ痛ク
 夕着所不和ニナル故ニ腹ノ急痛又甚キ者ハ諸食
 以悶ハ本位ヲ背ハ前ニ謂ル胞膜子宮ノ裏ニ全
 凡姙娠ノ者月々中ニ物ノ爲ニ碍ムレ胎轉動

胎前并治術

効ナシ

ヒリ痛ミ下ルハ効アリ痛ナキハ藥氣ナキニ

シ上水ヲ綿ニシメシ瘁所へ着テ宜シ微シクヒリ

戸甚ク瘁者ハ藥氣ノ下ル生ク乳ノ燒滓ヲ水ニ浸

ヒ薰メ宜シ濕熱下ル者ハ加黃柏煎ノ若シ陰

ノ煎汁ニ綿ヲ浸シ上テテ絞リ陰門腫タル所ヲ蓋

ル時拒サ、ハリ急ニ腫レ痛ムテ産後蒼木薄荷

氣下ル虚弱ノ肉ヲ子婆手荒ク探リ或ハ兒ノ頭出

ニ堪ハカクシ龍翔ニ宜シ一種ハ陰門兩邊濕

赤ク腫ル証アリ証アリ此証針忌ム針スレハ血出テ痛

赤ク腫ル証アリ此証針忌ム針スレハ血出テ痛

榔湯二宜之惡証ノ者ハ心下痞之嘔吐或ハ渴甚ク
 二宜之又胸滿痞氣下和之難キ者如木瓜檳榔兵茱萸
 者如附子者之入越婢如蒼朮茯苓二宜之身冷
 力セ二爲之入越婢如蒼朮茯苓二宜之身冷
 膝弛又緩之者ハ脚氣腫ナシ或ハ脚氣腫ナシ
 咳大小便秘澀之或ハ氣急或ハ手足麻痺之或ハ脚
 湯二宜之者轉胞水腫ノ証ヲ腎氣或ハ氣圓或ハ馬
 入胎ノ否ヲ分ク腹ヲ按ニ堅ク鼓脹ノ如ク指入
 部両脚腫満ニ腹ヲ按ニ堅ク鼓脹ノ如ク指入
 予治方ナシ一者此証ニ似テ面部胸部背兩肘瘦腹

分難若眞ノ腹脹滿ノ腹ヲ按ニ脹滿甚ク姪娠ノ四肢
 入死後必死ノ難ハ治ニ難ク產後必死ノ四肢
 宜ニ腹熱下ル者ハ猪苓湯ニ宜シ一者面部四肢
 毛見分々難シ又整胎ノ術モ功ナシ治方腎氣圓二
 ヲ死胎トナシルハ腹ヲ探ルニ充滿ノ胎ノ順逆
 下リ早ク小便ヲ利シ治セカレハ水氣胞膜中へ入
 入ル子宮ノ中へ水氣已ニ流レ入ラシト欲スル者
 腫ナク或瘦セ獨リ腹滿ノ裏水ノ症下リ鼓脹ニ非
 後必死ノ子治方ナシ一者面部四肢常ノ如ク
 肩脊兩時大ニ腫胸以下腫ナキ者多ク治シ難ク産

難身病
 卷之三
 五

便利入腎氣圓二宜之胸一者胸ヨリ上面部

者又同症二陰門西邊大腫ル者下治方同之小

凡妊娠腫滿六種下者轉胞水腫小便不利

妊娠腫滿

二隨入キナリ

ル者八道送散如山梔子半夏阿膠二宜之其餘ハ証

安胎湯 膠艾四物湯如半夏二宜之風邪熱下

入ル者ハ按腹整胎ノ術ヲ盡ス肝要ナリ治方ハ

トノハ胎膜傷ル者ハ治之愈ス胎斜ニ轉

者ハ治術ヲナク半産ス此故ニ水血下ル

三ノ上ノ

水血漏下

ハヒヤハ腰痛甚キハ何カヤ是ヲ以テ明△ハシ

凡死胎産ニ胞衣先ニ出ツルテリ胎後獨リ出トノ

痴ヲ放シタル様ヲ見公クハシ

胎ノ胞衣ハ時ナク俄ニ離ル故ニ不熟ノ瘡シ瘡ノテ

如シ然ハ臨産ノ時俄ニ離ルニ非タ又半産墮

離レシ様下リ譬ハ瘡瘳熟シ結痴ノ故タ々ニ形ノ

痛ニ下ラヌ又胞衣ノ形ヲ見ルニ盖シ臨産ノ前ニ

ニ廿ハハル故ナルハシ獨リ胞衣ノ離ルハ一條ノ

ヲ得テ陳痰腰痛スル様ナ此兒ノ體陷リ腰ノ裏

卷之十一
未才
三

月二至レハ胞衣最早漸之ニ離レ胎毛隨テ下リ時
著ク臭離レトシテ痛ト余カ按ト異リ蓋シ滿
產科費蒙曰臨產ノ時腰痛甚キハ此胞衣腰ノ裏ニ

臨產腰痛說

落ルニ及シテ身ヲ及シテ仰クハシ
此故ニ兒皆伏テ出ル然シ女子ハ產門ヲ出地ニ
倒ニ居ル故ニ產科ニ名ヲ入トノハ氏見公カク
凡胎腹ニ下リテ男ヲ女ニ共ニ面ヲ母ノ脊ノ裏ニ向テ
脈動下リテ死胎ハ絶テ脈動ヲシ

男女說

ツシ胎ノ臍へ往來スル脉動ナリ此故ニ活胎ハ
中ニ脉動ナキ者ハ死胎ニ決ス是ハ母ノ血胞衣ニ
胎ノ二種アリ其出ル臍帶ヲ指ニツクテ試ニ帶
凡臨産ノ頂ニ先ツテ臍帶ノ出ルニ死胎ト活
ヲ安入ヘシ

ト見定メ進三難キ者ハ回生ノ術ヲ施シ母ノ苦痛
スル者ハ産安キ下リ一槩ニスヘカヲス尤死胎
トヘハ氏頂直ニ産門ニ向ヒ母ニ勢ヒ有テ努力發
リ止リ死胎故ニ下ニ進ムトナキ故ナリ然シ死胎
推ナキハ死胎ナリ是ハ胎ノ體横骨ト交骨ニ當

凡産ニ臨テ努力ヲ發スレヒ俄ニ止肛門ノ王敬ヲ
ルハ又臭氣ニ厚薄アリ時ニ臨テ考ヘシ
多ク下ル者初ハ臭氣ナク又臭氣下ルニ水下ニ歇テ後臭氣下
モ色常ナラヌ又産ノ時漿水臭氣下ルニ然然氏水
ハ濁膿汁出シ又唇上ノ灰白ニ色ヲ變ヌ亦舌上
ノ身腐爛スレハ腹中鳴ヘシ然ル者ハ乳汁絞リ出
凡死胎ノ者ハ腰重ク腹ニシヅナシ着久ク胎
者ニ非マラ考フヘシ
下々腹ハ落チ又モ下リ死胎必下々腹ハ落ルト去
體ニ著所離レ又中ハ子ノ身モ其位ニ下リテ未タ

カヲ入又水腫腹滿ノ者若死胎トノハ胞衣母ノ
動ク下ルハ姓婦多クハ淺俗ナリ其辭証ト入
故ニ胎ノ四肢伸ビ或ハ屈シ或ハ母ノ呼吸ニ隨テ
非入母ノ身ノ起居シ或ハ横様ニ寐テ身ヲ轉スル
入何レモ其母ニ問ヒ動クト答ルヤハ活動ニ
テ張り動ク如ク其動ク見テ活胎ト思フカ
推探ル肘ニ膝ニ頭或ハ踵ニ當テ其手ヲ放テハ起
リ胎斜ニ居ル下腹ハ落テ居ル下リ此ク
數遍撫探リ後ニ忽チ瘦テ胎ト腸胃ト界テ似ク
石ノ如ク潤ビナク腹肉モ先ニ張テ見テ

卷之四
婦人科

凡死胎日數多者無損亦無損是胎手二應入ル木

内經曰有故無損亦無損是胎手二應入ル木

其証下者八假令大黃芒硝下入凡恐入

効下者八他証下者八証下隨方施入

功多得夕又外臺秘要方二儼于鯉魚丸兼用

加減多少八證二臨于量入大槩右方用

子半夏正氣天香湯如當歸沈香右三方附子

平和劑沈香天麻湯如何膠紫類和氣飲如何膠附

嘔吐下者虎翼飲伏龍肝汁以煎服効

胎者補劑如何膠半夏真經驗子力用劇方也姓

者瀉心湯兼用如潮熱者宜大柴胡湯臟氣弱及死

證輕者道送散或如山梔子腹熱不止時大便秘

真四君子湯加何膠阮翰六君子湯加何膠熱

膠半夏真武湯加何膠半夏小建中湯加何膠半

湯加何膠八物湯加何膠半夏桂枝芍藥湯加何

安胎湯膠艾四物湯腎氣丸加何膠第一和劑

臟氣弱虛冷入者八治方左如

心前日日出產二趣之者八宜之其証二隨之如

八治之易力入各問之其之七知子死胎二成

八治之易力入各問之其之七知子死胎二成

死胎二趣之者其次ナリ孕毎四月以前胎隨スル者
 臨月二死胎二趣之者ハ趣之ヲ成難シト知ルハ又八九月
 事ヲ知ラサレハ功ヲ成難シト知ルハ又前方ハ復ル
 ハ鬱氣ヲ開ク劑ヲ與ハ氣ヲ快クシ又前方ハ復ル
 劑ハ時ニ泥△下リ此ヲ知リテ間ニ平和ノ劑或
 及ヲ知リ治ヲ施スハ之假令應ル藥トナシテ過不
 驗方ヲ左ニ記ス然レモ方ノ前後ノヤトナリ過不
 療スルニ十人ノ内ハ九人ハ功ヲ得タリ因テ其經
 八月或ハ臨月死胎ヲ産スル下リ嘗テ數十人ヲ
 ナリ証ニ隨ヒ施治スハ又孕毎二三四月或ハ七

二不長十^リ或ハ其人二^日臍氣弱虛冷者胎不長
凡孕每二胎不長者宿病有二^日臍者調養^ヲ失力故

此胞膜^ヲ又故^{ナリ}

經終^テ三百日過^キ十一月^ノ死胎^ヲ産^タル^ヲ
ハ膜^ヲ廿^ク忽^テ産^子二趣^ク下^リ子^力知^ル所^ノ者
ヲ持^力或^走身^ヲ動^カス^レ劇^シキ力^或顛^仆ス
十日百^日二及^ハ氏^産ナ^シ胞胎爛^レシ者^母重^キ物
又死胎久^シク腹^二下^リヲ^モ胞膜^ヲ又^中ハ七八^リ
ク^シ産^子ハ^或忽^テ廿^ク即^時二産^二向^下リ
凡胎腹中二死^スト云^ハ氏胞膜^ヲ又^中ハ常^ノ如

分ツハシハ九月臨月ニ及ハ頂ヲ母ノ胸ノ下或
居ル六月以前ハ胎ノ順逆見分チカクシ七月後見
凡逆孕ノ狀ハ頂ヲ上ニシ尻ヲ下ニシ手足ヲ屈メ

逆孕說

ルカ如ク身ヲ潜テ居ルナリ圖ニ下ノ卷ニ下見
シ居ル其狀物ニ譬ハ地ニ伏テ居ル蛙ヲ倒ニ見
順孕ノ本位トス面ヲ母ノ脊ノ裏ニ向テ手足ヲ屈
上テ腕ノ邊ニ見ハ下ハ頂横骨ノ中ニ入ル此眞ノ
止テ支ヨリ上下四方ハ肥長ス臨月ニ及ハ胎ノ尻
月横骨ヲ離レ臍下ニ近クシ七月中旬臍下ニ上リ

凡孕者古來ヨリ俗ニ川魚ヲ忌ム子數十人試ルニ
ク伸シテ宜シ

此故ニ腹帶ハ輕ク程ヨクシ寐ルニ兩足ヲ常ノ如

ク斜ニシ成ハ横様ニスレハ難産ヲ求ル惡事ナリ

下足ヲ屈シ寐ルハ胎ヲ推タタクシ悶ヲサシ胎

ヨリ吉ト言傳ヘシハ大ナル誤ナリ上腹ヲ束留ノ

凡孕者寐ニ足ヲ屈シ腹帶ヲキビシク束ルヲ古來

穢シハ熱湯ニ綿ヲ浸シ絞リ拭リ清クスレバ身

ハ寒熱自汗盜汗氣息喘咳危キ証ヲ發スレバ儲身

若シ不快ノ者ハ限ナシ然ラザレハ身體腫ルカ又

ハナリ産後ハ假令健婦ト云氏二十日忌ム

尚九月ヨリ更ニ忌ム産後病ヲ發スルヲ恐ル

シ盖沐浴スルハ膝理開テ風ヲ襲ヤケレハナリ

感スルコト少シ特沐浴スルヨリ外邪ヲ得ル多

凡姪娠ノ者沐浴スルニ孕者内實スル邪ニ

姪娠忌法

ハ是自然ナルニ

專ニ上乳汁トナル故ニ凡ニ三二年經水止テ不通ナ

ク養ヲ受ク故ニ胞中ニ下リテ上テ乳汁ヲ産後ハ

經水トナテ儿ヲ按スルニ胎腹ニ有テ經水ヲ以テ專

凡婦人經下胞中表裏夕上乳汁下
乳汁說

乎

是又人二咽下喉下有氣道穀道各異子者如

輸之八以テ血ヲ注キ一ハ以テ氣ヲ及又者也

片倉元周曰凡莖中三孔有テ相通入ハ以テ氣ヲ

血下相和スルヲ環ノ端ナキカ如シ

ヲ周流シ而復ノ動脈ヨリ胞衣ニ皈シ其母ノ

一身ヲ周流スル者大入ト異ナルヲシ其血一身

漸ク是ヲ肝ニオクリ肝ヨリ心ニ傳入心ヨリシテ

血ヲ胞ニ受ク其血浸漬ノ其臍ヲ臍ヨリ受ク先其母ノ
凡胎ノ子宮ニ下ルヤ其養ヲ臍ヨリ受ク先其母ノ

胎受養說

圖ニ下ノ卷ニ下リ

ニ非入狀玉ノ如クノ潤ビ下ル者ハ姪アリ候法

岩ニ當ルカ如クノ手ニ應入ル者ハ血塊ニメ胎孕

ヒ十ク狀或尖リ或ハ長ク或ハ角張リ龜ニメ等カ

凡腹ヲ推テ見ルニ一物ニ指ニ礙ツク物下レ其潤

宿ル所十レハ此ニサハハリ孕ム下レハ孕ム下レ

又中ハ孕事十シ子宮ノ口邊ハヤハリ胎ノ初メ

下ル下リ然ルニ此所ニ若血塊下ル者解下下
 口邊ニ固着シテ下ル者稀ナリ此証ハ半產ノ者ニ
 上小腹ノ邊ニ下ル者多シ横骨ノ中ヨリ子宮ノ
 凡婦人常ニ惡血ノ固著シテ滯ル者大概横骨ヨリ
 否ヲ考ヘシ
 下シ空虛ノ時ハ疑ナシ又瘀血塊横骨中ニ有ルヤ
 考ヘシ是ナリ然シ大小便下ニ催下ルヤ否ヲ考
 門ノ邊ヘ應下ルハ究テ姪ナリ又指ニコリ附
 下邊ヘ内ヨリ突張ルヤ否ト問ヘテ子宮ノ口邊肛
 和ヲケテ三月前ハ横骨ノ中ヘ指頭ヲ以テ推テ肛門

左邊ニ座ノ手ヲ以テ腹ヲ撫和シ兩足ヲ屈シ腹ヲ
凡婦人ヲ先帶ヲ解テ常ノ枕ニ仰臥セシメ醫者

酒ニ酔ノ者ニ然ルテ一ニ緊ニ論入カテ又

頭ニ脈動ヲ發入ルテ下リ按ニ客陽受ル故乎又

ニ非又婦人ノ中ニ夏六月大暑ノ節不妊者モ指

凡妊婦ノ脈三月後指頭ニ發レ妊婦ニ定リテ事

妊婦ノ然否ハ腹ヲ按テ見ルヨリ要テハ子シ

事滯洋トシテ風ヲ捕ヘ影ヲ係クカ如ク知難シ

ヲ診ヌルニ脈狀ヲ以テ名ツクルシ多シ然レ其

者ハ法ヲ以テ腹ヲ按テ見ルヘシ古人妊婦ノ然否

入シ常ニ多シト去者ハ姪姫ナリ又常ニ少シト去
 二入シ假令四五日月水見サル者常ノ多少ヲ問
 ル下リテヤハリ同様下リ是月水ヲ閉ル故ナリ審
 漏入シ然レ血塊脹ノ者ニ姪姫ノ狀ニ似タ
 根ノ回リ紫黒ノ色ヲ發ス又指ヲ以テ摘ハ淡乳汁ヲ
 見シ又面部胸ノ經脉益青ク太ク又乳房ノ肥肉肥乳
 凡孕者三月後ハ漸ニ諸脉ニ力下リテ指頭ノ脉ヲ
 脉力下ルノ三
 故ナリ故ニ餘ノ病ナキ者ハ害ナク脉狀モ宜ク只
 ノ通リ安キ物ヲ好ハ子宮胃ノ口ニ至ル逆經塞ル

又故ナリヤハリ常ノ食物ヲ反吐シ酸物巢實ナ
凡孕者三十日ヲ過テ惡阻ヲ病ハ後ノ月水ニナラ

姙娠候法説

度ニ産スル者ハ二百七十五日ヲ過レハ進ニ産ス

ノ期大畧日數ハ初テ孕者ハ凡三百日ヲ經テ産ス

アリ此ヲ過レハ後ノ月水動イテ孕カク其免時

凡婦人ノ胎ヲ受ル事ハ月水終リテ後十日ノ間ニ

姙娠日數説

又シ又血塊ノ類ハ大槩左邊ニアリ

此所ナレハ空虛ノ時下リ故ニ胎微ク右邊ノ腑位入
 凡婦人ノ左腹ヲ血室トナシ右腹ハ委食ノ腑位入
 右子宮直腸膀胱三ツノ狀ハ圖ノ下ノ卷ニ見ス
 邊ニ通ズル小囊ナリ
 下ニ下リテ上ニ口ナク下細キ管ノ如ク陰門ノ上
 腹右邊ニ下リ小便ハ膀胱ニ出ツ膀胱ハ左小腹ノ
 隔膜ノ中胃大腸ヲ通リ肛門ニ出ツ大腸ハ小
 薄膜ヲ引伸シ胎ヲ絡ヒ全ク囊ノ狀ノ如ク大便ハ
 下裏ト表ノ如ク又胞膜ハ胞衣ノ厚肉ノ四邊ヨリ
 二身ヲ潜テ倒ニ居ル其胞膜ハ子宮ノ裏ニ固著シ

中胎ノリ胎ヲリ胎ノ中ニ又胞膜トイハル囊ヲリ胎ノ中

ニ月水ヲ蓄ヘ胎ヲル時ハツリ常ニハ縮リ細ク中

口ヲク下ハ陰戸ニ續テ口ヲ孕ム囊ヲリテヤハリ上ニ

ノ間ニ子宮トイフ胎ヲ孕ム囊ヲリテヤハリ上ニ

ノ前ニ胎位ノ説

凡婦人ノ腹妊ノ位ノ所ハ膀胱ノ後廣腸ノ前

門人南總 森寄女保佐

男 周達

上總周准郡 大牧周西著

產科指南卷上

目錄畢

回生鈞胞術

兒啼母腹中說

經驗方二十六首

母死活兒術

半產說

忌房事說

囊胎說

背面倒首論

小兒頂後有禿說

小兒腰青痕說

護產門術

救初生虛兒說

產後保養

產後腹狀說

鎮帶說

產椅說

流產崩漏分別

難產說

臍帶說

變胎說

整胎術

驗胎轉動并治術

陰門腫說

姙娠腫滿

水血漏下

臨產腰痛說

男女說

死胎并治方

逆孕說

姙娠次第說

姙娠忌法

乳汁說

胎受養說

姙娠候法說

姙娠日數

姙娠胎位說

產科指南目錄

文政癸未夏四月 上總大牧周西撰

氏ノ忠臣ニ非スヤ此深ク志ス所ナリ

力僕又和シテ以テコレヲ天ト下ニ擴充セハ豈賀川

ノハ衆人ニ是ヲ見サルカ抑見テ用ル能ハサル

ニ就シムハ此事賀川氏叮嚀ニ是ヲ教ヘ示ス

難産ヲ作ス者モ今此法ヲ行ハバ行ハバ難ク轉ク安

モ難産ナシ且此法婦人各自行ヒ安ク假令明日

身整胎ノ法ヲ得テ其身ヲ保護セハ千百人二一人
ト謂フハ貴賤トナク富トナク孕婦タル者自
内ニ轉復セハ母ノ臍傷ラサルヘクヤ妄言
ノ言ニ胎子腹内ニ轉復スルノ說アリ若シ孕胎腹
科ノ業トスル者ハ知ラヌバ有ヘカラス又世俗
トハ是ナリ故ニ万物皆倒スルヲ知ラス此
ノヤ世ノ人則正ヲ捨テ逆ヲ取リ一盲衆皆ヲ牽ク
明ニ向テ足ヲ地ニ着ク是正位ニ下ラス何
陽トシ陰戸ノ内ニ地トシ陰トス然ハ孕胎頭ヲ天
中ニ渾然タル胚暉ヲ孕ム而シ陰戸ノ外ヲ天トシ

形タルヤ横骨ヨリ鳩尾ニ及テ是ヲ天圓ニ比入
 符合ス僕又密ニ胎孕ノ化理ヲ按スルニ夫孕婦ノ
 二諧厄利亞國孕婦ノ説ヲ即賀川氏ノ説ト暗ニ
 ノ如キハ産論翼ニ至テ審テ又解體ノ新書ヲ覽ル
 ノ世ヲ誣ス實ニ此道ノ達識ナルヲ知ル手術
 ノ讀ト數ト遍又孕婦ヲ試ル事數百人愈賀川氏
 ヤ是ニ於テ僕憤然ト志ヲ勵シ更ニ産論ヲ取テ
 大都ノ人スヲ猶且然リ矧ヤ寒郷ノ愚夫ニ於テ
 ヤ數百歳ノ疑城ニ此ヨリ破リ難キハト通邑
 ノ人ニシテ爲ソ倒ニ孕ノ理ヲ下ラシト嗚呼此事

十ルコトヲ覺テ或曰ク夫頭ヲ天ニシ足ヲ地ニ入ル
カヲ入始テ賀川氏ノ所説顯然トシテ指下ニ明白
其腹ヲ按シ其孕ヲ探ラサルハ富トナク貧キトナク
隣里近郷ニ胎孕ノ者ヲレハ論ヲ事實ニ親ク試ルニ
ニ鳴ル僕嘗テ其所著ノ産科ニ委ク其術ヲ以テ都下
ニ賀川氏ナル者ヲ見テ慨然トシ痛憐スルコトアリ昔
ヲ頌ス者ナルヲ見テ慨然トシ痛憐スルコトアリ昔
殺麥ヲ辨セテ入トトメハ氏僻地ノ婦人産難ノ爲ニ命
僕ヤ上總之鄙邑ニ生レ況ヤ不中不才ニ固ヨリ
産科指南自序

蓋庭擬于存穢藥室

文政丙戌臯目吉東都丹波元堅

世書併以及此云

殆其精則庶幾無竿濫之弊矣既序
世之修內科者咸如翁之於產科以

苟且以冀僥倖焉呼世豈道也哉使
用心深志有未易遽窺者故陸
是如用藥施活者其精粗人難辨
其乃香人易辨用心深志有未
尚乎哉抑予有感焉凡子術癯疾者
碼非尋常丈夫可企及世豈可嘉
而今復刊此書以貽世其志之
序保祐社繼繼翁學以其技行于都下

遂指贊村梓乃以其師遺命屢促可
女身子森崎保保深慨師說之就既
捷徑心足以見其志映樹矣翁既沒
賀川氏之所未及稱切詳悉為隨生
持耒示乎披褰禮之其文雖野間叢
曩日嘗錄次所得善科指南二卷
出新意乃不失一蓋殆至其妙者矣
為而翁之術日加以精齊患險證率

賴其金衡四方傳聞乞活者日以益
不下者盡莫尔值子秦地旌是一鄉
胎之恣斜者上冲者橫者送夫已死
既索為廢寢食方有理會乃嘗試之
求師不得因取貧川氏子素潛思
鄉無良醫為以產難斃遂有志救活
上總大牧狗周西世為軍正早歲憐

序

東原先生自書



Faint, ghostly vertical text impressions, likely bleed-through from the reverse side of the page.

官箴 官箴 官箴 官箴 官箴

政尚成初夏

則友入丹波君序中盡之矣

乃略搖其意以識卷端如左詳

謂十室之忠信周西其人矣哉

得之者以成于陋巷之士者所

都下好壯技者定少矣哉而每
術可口受而不可筆記也嗚呼
產科指南唯不載其所為者此
余屬集其經而錄之名曰
醫中之術以此救人亦寡
孕婦易產是難定定之說也雖則

#83306171 v.1

其術曰姬娘三十日而決之

之技備產科之術而其精過之

言也上總大收周西總賀川氏

盤冰冰為之而塞於冰減守此

尚蘭陵曰青取之於藍而青於

產科指南序



五至十冊

第


一



關柳堂藏

養科指圖

上總大牧園西著



廣
科
指
南