

泰西名醫彙講

一



天保丙申年鐫

秦西名醫曹三果譜

樂忘居藏



泰西名醫彙講序

太西醫書。概有業書之類。凡自諸家之醫考病論。以至一病一藥利害得失之說。簡編短小。不足單行成書者。日彙月纂。及其累積成卷。乃鈔而公於世。泰西諸州之俗皆然。善一人之智。不能周於萬物。合天下之所是非。樂而乎人。以為善。則善莫大焉。論莫正焉。故業書中所蒐輯。其說皆簡明核實。性。超軼於一家著作。而其所裨補。亦不鮮矣。其書成於和蘭。茲譯於波。而載入於。吾邦者。以余之所少見。亦不下數十種。獨奈纂譯無人。未有刊行布世者。



余每恨焉。其作序西。余同學之友也。頃者。英太西名醫彙  
講。徵序於余。受而莊誦一過。其所譯收。皆業書中奇佛  
特拔。最切於日用者矣。於是乎。余之喜可知也。昔者。亞而  
希然得。於驗某王冠金之純駁。苦思未得。一日入浴。忽悟  
和水較重之法。狂躍出浴。不及著衣。革。乃獨告于王矣。今  
余喜之甚。不翅亞而希然得也。乃走草書之。以告續斯編  
者。不知天下同余之喜者。亦果有幾人哉。  
天保七年龍集丙申小春之月

宇田川榕識





泰西名醫彙講序

序

泰西氏之學東漸於

吾邦幾乎百又餘年而其書籍蘭

舶所載來歲不下數十百部凡自天文輿地三才窮理之說以至品物器械百工技藝之書莫不備焉而於吾內外醫科其書籍尤具矣若舍密解剖藥物人身窮理諸書姑舍焉其論述日用醫治者約分爲二部而其第一部又分二種甲則籠絡古今諸說折衷以己所躬驗鎔化鍛鍊別出機軸以成其書焉乙則歷驗久試心得手應未必涉理解直以其切近於日用者隨筆叙出言簡而旨遠義約而用博矣此二種之書俱必成於一人之手也其第二部則



奇效特見異證神藥古人所未發明先輩未見聞有大闢  
不傳之旨收濟生之效者雖短文小篇輒筆而存之地方  
學社日蒐月輯積而成編刊而公布猶清人叢書之類也  
余嘗謂第一部譬經書也而第二部譬歷史也蓋經者綱  
常倫理之大本而其第二部亦直從源頭立論設治雖其  
說有古今精粗之異要皆醫家典謨所不可一日廢曠也  
不亦猶經乎史者世代之所以治亂聖賢之所以藉時勢  
而制禮樂皆一一直書可以鑑古而照今而其第二部則  
應病機而制時宜以活眼察病勢之安危不亦猶史乎夫  
經而無史則板滯拘泥不足盡人事之變史而無經則徒



貴變通而無踐履之實，不其踐危機陷深害者幾希，故經

可以講之無事之日，而史可以施之有事之際，然則其第

一部亦必須第二部，而濟其用，可知己。吾邦先達譯第

一部之書者亦多矣，而如我而德兒內科撰要、布廉幾眼科新書、

新斯多爾屈醫方研幾、孔氏勃律古不別名書、昆斯骨夫醫療正始，其尤

彰著者也。但至第二部，則其書雖亦多存於吾東方，未

有翻譯問世者，即翻而傳之，亦止僅々數篇，未足以成卷

帙也。余每以為憾焉。甲午之歲，回祿為祟，八溝之宅蕩然

灰燼，爾來邸居蕭間，日親筆硯，讀書之暇，嘗取第二部之

書繙閱，有會心處，則抽筆譯之，或先輩故人所翻，可以大

泰西... 序... 樂... 經... 緯...



裨益斯術者亦隨得而編修積成數十卷名曰泰西名醫彙講私自謂聊立斯學之體用而小補先輩之所未備焉矣伏冀世之以弘濟自任者讀此書益修余之所未及有大涉獵夫二部之書涵養於無事而設施於有事則經史相發體用兼備至於斯道之集大成而金聲玉振也必矣誠如是則不止余一人之大幸而已抑亦天下蒼生之福也哉天保七年丙申季秋津山侍醫箕作虔儒書東都冶邸樂忘居中





泰西名醫彙講凡例

一泰西氏日用醫治ノ書、分テ二部ト爲其說已自序ニ  
詳ニス而、其第一部ハ姑諸ヲ舎、若夫第二部ノ書、  
其部類モ亦多ト雖、ヒュ扶歇蘭土氏ノ醫事日記ハ  
輓近ニ在尤著者タリ其餘、サン內外醫社合著、ホ山實福而多氏ノ醫學  
外醫社合著、ホ內外醫社翼編、ホ山實福而多氏ノ醫學  
雜著等ノ數種アリテ皆日ヲ積年ヲ累テ諸家ノ  
新得妙効ヲ記スルト著作ヲ編纂メ世ニ印施ス  
余カ此書ノ如ハ以上ノ諸書ニ比スレバ薰葭玉  
樹、固其匹敵ニ非ト雖、モ群書ノ精英ヲ咀嚼メ尤日



用ニ切近ナル者ヲ抽<sub>テ</sub>翻出シ或友人ノ譯成スル所ニメ大<sub>ニ</sub>沉痾篤癘ヲ斷スルノ肯綮ニ中者ヲ撰擇シ集<sub>テ</sub>以此編ヲ成寸ハ書體彼ニ倣ト云可<sub>カ</sub>ラザランヤ此書ヲ讀諸賢西書ヲ讀<sub>テ</sub>翻譯スル所アリト雖<sub>レ</sub>片簡斷楮未<sub>ダ</sub>書ヲ成ニ足然其說ハ則<sub>チ</sub>醫道ニ關係スル<sub>レ</sub>淺々ナラザルヲ覺者アルガ如<sub>キ</sub>ハ幸ニ篋底ニ深秘スル<sub>レ</sub>ナク余ニ寄示<sub>ス</sub>アラバ速<sub>カ</sub>之ヲ蒐輯ノ以<sub>テ</sub>拙著ヲ粧點セシトス

一書中ノ纂輯スル所ハ務<sub>テ</sub>日用醫療ニ的切ナル者ヲ選擇ス其高論精說病理ノ真元ヲ闡明シ藥物



ノ元素ヲ毫分スル者ノ如キハ宜ク急採修ス可所  
タリト雖<sup>FE</sup> 吾邦ノ醫道尚蒙昧ニメ學者僅<sup>ニ</sup>西庠  
ノ門ヲ得<sup>テ</sup>入<sup>ル</sup>ト雖<sup>FE</sup>未<sup>ダ</sup>宗廟百官ノ美富ヲ縱觀スル  
ニ足<sup>ラ</sup>ズ然<sup>ル</sup>ニ時勢ヲ辯セズ遽<sup>ダ</sup>高妙ノ論ヲ説カバ  
陽春白雪里耳ニ入<sup>リ</sup>易<sup>カ</sup>ラスノ鐘簾ヲ用爰居ヲ饗  
スルノ譏ヲ遺<sup>フ</sup>トヲ懼<sup>ル</sup>故<sup>ニ</sup>淚ヲ揮<sup>ヒ</sup>愛ヲ割<sup>テ</sup>之<sup>レ</sup>ヲ録セ  
ズ高明ノ君子幸<sup>ニ</sup>其卑近ヲ嘲<sup>ル</sup>ト勿<sup>レ</sup>

一藥劑ノ名称ハ一々皆先達ノ成譯ニ準据ス其已<sup>ニ</sup>  
世<sup>ニ</sup>膾炙スル者ノ如<sup>キ</sup>ハ音譯字名ヲ掲<sup>テ</sup>傍訓ヲ  
省<sup>キ</sup>製法モ亦略メ載ル<sup>ト</sup>ナシ



一藥物ノ量目ハ榛翁ノ例ニ据ヒ多ノ如キナリ但  
 達刺屈馬ニ至ハ翁仍錢ノ字ヲ用近來冲齋伊東  
 氏ノ醫療正始ニ達刺屈馬ノ符ヲ變メ弓ノ字  
 ヲ製シ音達トス今此書モ亦其例ニ沿若夫此多  
 多乃氏等秤量新古ノ差ハ名物考補遺ニ見故茲  
 之ヲ開スルヲ無シ

一題目ノ下其名ヲ署セサルハ皆余カ自ラ譯スル所  
 ニ係其友人ノ翻スル所ハ一々其姓名ヲ表出ス

紫川道人虔儒識



泰西名醫彙講目錄

卷之一

木柵治衄血小述

蟻針略說

砒礬為癩癩妙方經驗

砒礬製法

一男子癩癩發作嶮逆連八日不醒喉中拽鋸聲諸部瘕搐將死行砒礬續命火將滅治驗  
觀雙角子宮記并圖

卷之二

胎酸素藥治梅瘡經驗



右肘類動脈傷治驗并圖 冊子帶圖

子宮脫血行荅木封經驗四則

卷之三

頭頸歪斜治驗

奇驗三則 頸腫圖 縫頭針遇胃化勾曲糾結圖

治義膜喉焮衝新法略說纂要

吸角治脫血說并經驗



泰西名醫彙講卷之一

津山 箕作虔儒庠西氏纂述

木桶治<sup>ス</sup>衄<sup>ノ</sup>血<sup>ハ</sup>小<sup>シ</sup>述<sup>ス</sup> 斯<sup>ク</sup>多<sup>ク</sup>而<sup>シ</sup>勃<sup>ル</sup>尔<sup>ル</sup> 舐<sup>ル</sup>ノ<sup>ハ</sup>醫<sup>格</sup>而<sup>シ</sup>黜<sup>ム</sup> 著

往年六月ノ際、天氣非時ニ寒キヲ數週ノ後、倏變ノ鬱熱ト爲<sup>ル</sup>此時幾多ノ疾病群生ス、就<sup>テ</sup>裡<sup>ニ</sup>胸<sup>ノ</sup>焮衝尤多又故焮衝ヲ挾<sup>ハ</sup>ル熱病、天氣ノ倏變ニ遇<sup>テ</sup>之<sup>ヲ</sup>合併スル者亦少<sup>ナ</sup>カラズ又平素康健ノ婦人、經期ニ非<sup>ズ</sup>ノ子宮血崩ヲ得<sup>ル</sup>者アリ、余乃<sup>チ</sup>清涼下劑ヲ投<sup>ス</sup>其人膽液積滯



ノ候アルヲ以テ滋、此藥ニ適スルヲ知後幾那煎ニ綠礬  
 精ヲ點メ之ヲ與手帕ヲ冷水ニ蘸腔内ニ納シム血崩  
 全止此法ヲ施ス<sub>テ</sub>數人皆痊可ヲ告又幾等ノ人物大  
 衄血ニ罹殆死ニ瀕ス野外ニ力作スルノ輩ハ其病勢  
 最急劇ナリ其一人ハ余招ニ應メ詣診スルニ鼻衄尚  
 淋漓トメ止ス手帕ヲ醋ニ蘸全頭ヲ掩次醋ト明礬水  
 トヲ燒酒ニ調停シテ水銃ヲ以鼻内ニ灌漑シ或鼻下  
 ニ接メ之ニ吸升セシメ又皓礬水ヲ懸撒絲ニ浸深鼻  
 ニ挿入ス其余微温脚湯吉利詞爹兒ヲ行病人ノ體ヲ  
 後<sub>ニ</sub>仰傾シムル等ノ諸法ヲ施<sub>セ</sub>凡皆效ヲ奏セズ是ニ



於余乍一按ヲ生シ木栴榲桲、落葉松耳ノ類ヲ剪修テ圓長體ト爲収瀆ノ藥液中ニ浸深鼻ニ挿入ス瞬息ノ間其血乍止是ヨリ以來大衄血ニ遇ハ屢栴片ヲ製スルヲ前法ノ如之ヲ醋ニ蘸用ルニ皆即效アラザルヲナシ木栴ノ此驗ヲ奏スル所以ハ栴鼻中ニ在其體自開張シ緊慢ノ差ナク周鼻竅ヲ歷出血ノ創口ヲ塞住ルガ故ニメ撒絲ノ如ハ其效力迥ニ之ニ遜余内外醫書ヲ檢閱スルヲ數十部未此小技テ兩ヲ以衄血ヲ治スルヲ載者見ズ故其或醫家ノ爲ニ小裨益アラシトヲ思テ斯之ヲ開陳ス



鯨針畧說 全上

小兒齒牙難抽出ノ証ハ鯨針ヲ兩耳後若<sup>カ</sup>隻耳後ニ行  
 ヲ良方トス屢試<sup>ハニシキ</sup>テ屢驗アリ一兒生テ纒<sup>カ</sup>ニ一周歲許  
 天資強厚ニメ多血ナリ半歲以還<sup>カ</sup>暴劇ノ瘰癧ニ嬰發  
 作殆<sup>ウマソクキ</sup>虛日ナシ其証發スル毎ニ止<sup>カ</sup>ザル<sup>カ</sup>丁四分時許諸  
 藥ヲ雜投ノ少モ效ナシ鯨針ヲ施ス<sup>カ</sup>二條ニメ大患  
 一掃メ復發セス初其口内ヲ候ニ齶骨ノ邊<sup>カ</sup>異常ニ腫  
 齶肉緊脹腫起シ猶未<sup>カ</sup>一齒ヲ抽出スルヲ見ズ鯨針ヲ  
 行<sup>カ</sup>テ局處ノ多血ヲ洩<sup>シ</sup>其部ノ感惕ヲ節スルニ及<sup>カ</sup>諸藥  
 驗ナキ至頑ノ瘰癧頓ニ全<sup>カ</sup>瘥<sup>カ</sup>可<sup>カ</sup>シ居<sup>ル</sup>丁少<sup>カ</sup>選<sup>カ</sup>ニメ一時



二幾枚ノ齒ヲ擁出シ少モ餘證ヲ挾<sub>ム</sub>ナ<sub>レ</sub>眞胸痛<sub>助</sub>  
膜<sub>焮</sub>ハ先刺絡ヲ行後其局處ノ血ヲ除クガ爲ニ直<sub>チ</sub>ニ  
衝<sub>ハ</sub>肋上ノ痛處ヲ擇<sub>テ</sub>鯨針六條若クハ其餘ヲ帖ス可シ是  
ニ由<sub>テ</sub>瞬息ノ間ニ焮衝乍<sub>チ</sub>治スル者少カラズ痔疾脫肛  
疼痛ノ者鯨針必效アリ幼婦月事時ヲ以<sub>テ</sub>下<sub>ラ</sub>ザル者之  
ヲ陰部ニ施メ其驗他藥ノ右ニ出<sub>ツ</sub>其他千百ノ諸証鯨  
針ニ非<sub>レ</sub>バ決<sub>シ</sub>効ヲ建ル<sub>ル</sub>能ハザル者指ヲ擣<sub>カ</sub>ルニ暇  
アラズ是故ニ濟生ノ志アル者ハ夥ク貯<sub>テ</sub>不時ノ需  
ニ供給スルヲ要ス須<sub>シ</sub>牛<sub>ギ</sub>栗<sub>リ</sub>結<sub>ケ</sub>而<sub>シ</sub>蘭<sub>ト</sub>土ノ平地ニ産ス  
ル鯨ハ善<sub>ク</sub>血ヲ啞<sub>ラ</sub>而<sub>シ</sub>山國ノ者ハ之<sub>レ</sub>ニ反ス故ニ余常ニ



彼土ヨリ輸、以其用ニ供ス此種ノ鯨ハ時ニ闕乏スル  
トアルガ故ニ再三反覆ノ原鯨ヲ用ルノ法ヲ講セザ  
ル可カラズ此法ハ么微ノ一方ト雖世醫ノ未知ザル  
所ニメ大其闕乏ヲ贍ニ足寸ハ未必シモ之ヲ輕蔑ス  
可ザルナリ鯨血ヲ嘔大飽過スル者其血ヲ吐セシメ  
ズ自然ニ任ル寸ハ數水ヲ更新スト雖半歳ノ久ヲ歷  
サレバ盡腹中ノ血ヲ消メ再血ヲ嘔ノ情ヲ發スルト  
ナシ故其嘔ニ飽テ自脱落スルヲ候盆内ニ入海鹽少  
許ヲ其身ニ摻スル寸ハ盡嘔所ノ血ヲ吐ス是ニ於水  
ヲ以洗淨淨水ノ中ニ畜バ太約八日許ヲ過ル後復用



テ針ス可然<sup>レ</sup>、<sup>レ</sup>鹽ヲ摻スル<sup>レ</sup>過多ナル可<sup>ク</sup>ラズ、又、久ク  
鹽中ニ在<sup>ラ</sup>シム可<sup>ク</sup>ズ此<sup>ノ</sup>如<sup>ク</sup>ナレハ、<sup>レ</sup>蟻速ニ死ス、又、蟻脫  
落セバ速ニ之ヲ摻上スルヲ要ス、若<sup>シ</sup>水ニ畜ル<sup>レ</sup>一二  
日ノ後、之ヲ摻スレバ、<sup>レ</sup>蟻必死ス、<sup>レ</sup>詞密結兒氏、<sup>レ</sup>蟻針說ヲ  
著<sup>ス</sup>、考據淵博ナリト雖<sup>レ</sup>、<sup>レ</sup>猶此切須ノ小法ヲ遺故爰ニ之  
ヲ載<sup>ス</sup>。

砒礬為<sup>レ</sup>癩癩妙方經驗、<sup>レ</sup>蒲而謨<sup>ス</sup>、<sup>レ</sup>的<sup>ル</sup>、<sup>レ</sup>達<sup>ス</sup>、<sup>レ</sup>母ノ醫、<sup>レ</sup>鳥華  
一年鏤行、美  
作牧穆中譯

癩癩等ノ神經病ニ砒礬ヲ行<sup>リ</sup>、<sup>レ</sup>近來ノ發明ニ非<sup>ズ</sup>其由、  
來<sup>ル</sup>所已<sup>ニ</sup>久<sup>シ</sup>、<sup>レ</sup>而此藥ノ遍<sup>ク</sup>世ニ流布セザルハ、<sup>レ</sup>効ナキガ故



ニ非藥カノ明確ナラザルニ由リ往昔依卜加得ノ時  
此劑ヲ内服スルニ疑アリ其能未詳ナラズト雖特ニ  
之ヲ外敷スルニ用フルト吾儕ノ熟知スル所ナリ亞  
列塔越烏斯ハ之ヲ以癩癩ヲ吐又、尔陪列氏碯磬ヲ製  
メ炎思搦涅利斯ト名筋神經ノ弛緩ヨリ發スル病ニ  
用テ奇效ヲ奏ス蒲尔花歌モ亦嘗銅ヲ碯沙精ニ溶消  
シ一二滴ヲ取空心ニ蜜水ヲ以送下ス斯微甸蒲尔花  
歌ノ書ヲ註メ曰先生カヲ費銅劑ヲ製メ神效ヲ得タ  
リ此劑ヲ服メ病人惡心セズ但一個異様ノ運動アツ  
テ蟲ノ行四肢ヨリ指頭ニ至カ如ク覺ルノミト近世



二至復碯礬ヲ内服ス此藥ノ治例多就裡話結兒ハ之  
 ヲ用舞蹈病ヲ治シ微尔蘭蒲郎度斯多而兒ノ三醫ハ癩  
 癩心思鬱憂病ニ用良效ヲ収黜越聖偃ハ癩癩家十一  
 人ニ與病人虺ヲ扱アリ否ザルアリ而其九人ハ平癒  
 ヲ告佛郎屈ハ淋瀝ニ用其服量半匁ヨリ一匁マテヲ  
 取服ス日ニ二次淳坎屈尔廉ノ二家碯礬ノ癩癩ヲ治  
 ノ最奇効アルヲ称揚ス之ニ由碯礬ノ名大世ニ興余  
 謂淳坎氏ノ述所已世人ヲメ此藥ヲ信ゼシムルニ足  
 リ况之ニ屈尔廉ノ論ヲ加ラヤ世人ノ之ヲ賞歎ノ實  
 ガルモ亦宜ナラズヤ此藥ノ古説ハ鹵菴ニメ取足ズ



之ヲ試驗セント欲者ハ宜<sup>ク</sup>輓今ノ新論ヲ看<sup>ル</sup>ヲ要ス余  
ガ此說ノ如<sup>キ</sup>モ亦恐<sup>ク</sup>其數ニ充<sup>ル</sup>ニ足<sup>ル</sup>者アラン今淳<sup>シ</sup>坎<sup>シ</sup>氏  
碯礬ヲ用<sup>テ</sup>癩癩ヲ治スル經驗畧說一則ヲ舉<sup>グ</sup>

一少年々紀十二歲許<sup>リ</sup>色澤鮮華體軀瘦削曾癩癩ニ嬰<sup>リ</sup>  
千七百七十六年十一月七日越<sup>ス</sup>鄧勃<sup>ル</sup>尔<sup>ル</sup>舐<sup>ル</sup>ノ病院ニ歸<sup>リ</sup>  
ス其症約スルニ一週ゴトニ發作ス但其時刻ハ定限<sup>ナシ</sup>  
ナシ病發スレバ五神廢シ四肢劇<sup>ク</sup>瘧<sup>シ</sup>搖<sup>ル</sup>ノ口ニ泡沫ヲ  
吐ス此<sup>カ</sup>ノ如ナル<sup>ト</sup>太<sup>ホ</sup>都<sup>ホ</sup>四分時ノ後昏睡ス寤<sup>レ</sup>ハ微<sup>ク</sup>頭  
重<sup>ク</sup>ヲ覺<sup>ル</sup>瘧<sup>シ</sup>搖<sup>ル</sup>等ノ症仍<sup>ラ</sup>止<sup>マ</sup>ス脉百八動大便調適シ舌滋  
潤ス食氣常ノ如<sup>シ</sup>病荏苒トノ四年許<sup>リ</sup>ヲ經<sup>テ</sup>其症少<sup>モ</sup>變



ゼズ但<sup>シ</sup>其發作初<sup>ニ</sup>比スレバ較多<sup>シ</sup>其癩癩ヲ得<sup>ル</sup>別ニ確  
乎タル原由ナシ但其母癩癩ニ罹<sup>リ</sup>久<sup>キ</sup>ヲ經テ愈<sup>ハ</sup>ズ病人  
コレト家室ヲ同<sup>フ</sup>メ其膝下ニ長ゼルノミ故<sup>ニ</sup>余謂<sup>ラ</sup>此  
病人ノ癩ヲ得<sup>ル</sup>ハ且夕母ノ側ニ侍<sup>メ</sup>其病患ヲ悽惻  
シ神經之ニ連累セラレテ竟<sup>ニ</sup>自己ノ病因ヲ成スノミ  
此等ノ事ニ由<sup>テ</sup>病ヲ感受スルハ往々見聞スル所タリ  
病人今ニ至<sup>マ</sup>テ藥ヲ服セズ余此病人ヲ治スルニ二  
等ノ治則ヲ立<sup>ツ</sup>一ハ則<sup>チ</sup>發因ヲ奪除<sup>シ</sup>ニ在<sup>リ</sup>ニハ則<sup>チ</sup>神經ノ  
性ヲ轉換<sup>メ</sup>發因ヲ敢<sup>テ</sup>之ヲ犯<sup>ス</sup>了能ハザラシムルニ  
在<sup>リ</sup>是於<sup>ニ</sup>第二治則ニ遵<sup>テ</sup>礪礪丸ヲ與<sup>ハ</sup>臨臥前ニ服セシム



其服量下然<sub>レ</sub>此劑モ他ノ銅製ノ藥ト同ク其性慄悍  
 ニ見ユ 猛劇ニメ粗暴ニ用ハ動<sub>ス</sub>大害ヲ惹<sub>ク</sub>ガ故<sub>ニ</sub>其服量モ亦初  
 ハ少許ヨリメ漸<sub>ク</sub>ニ其量ヲ増加病人ヲメ之<sub>ニ</sub>慣<sub>レ</sub>テ服  
 スルニ耐シム可<sub>シ</sub>

十一月十六日初服ノ丸子瞑眩微ニメ吐ヲ發スルニ  
 至<sub>ラ</sub>然<sub>レ</sub>凡<sub>レ</sub>之ヲ服メ後病發動スル<sub>レ</sub>初<sub>ニ</sub>比ス<sub>レ</sub>ハ寢  
 劇<sub>ク</sub>

三十日猶丸藥ヲ連服ス<sub>レ</sub>凡<sub>レ</sub>病人徐<sub>ク</sub>ニ瞑眩ヲ知<sub>ラ</sub>ズ發  
 作減少ス<sub>レ</sub>而其發スルハ他日ニアリテ從<sub>テ</sub>前ノ因ト同  
 カラス



十二月十一日、此ヨリ前數日、丸藥ヲ服セザレ、凡今日  
ニ至<sup>レ</sup>マテ病發作セズ體氣安和ニノ往日ハ病、睡中ニ  
數發セシモ今ハ乃止<sup>テ</sup>發セズ、碯礬丸ヲ連服セシム、但  
朝ハ之ヲ服セシメズ、唯夜間寐前ニ之ヲ用、

廿一日、病人藥ノ神效アルヲ信ジ、每夕丸子ヲ服ス、病  
久發作セズ、服量前ニ同、

廿八日、今日ニ至<sup>レ</sup>マテ少<sup>シ</sup>エ、瘕瘕ノ證候ナシ、此日、丸子  
ヲ服メ、吐ヲ發シ、吐後食氣減少ス、是ニ於<sup>テ</sup>丸子ヲ止、朝  
夕幾那散一<sup>ト</sup>ヲ服セシム、

正月四日、病續發動セズ、丸藥ヲ止<sup>テ</sup>以來、食氣復<sup>タ</sup>生ス、



余謂病人未全治セスト雖今ヨリ後ハ復藥ヲ與且之  
ヲ診問スルヲ要セズ然<sub>レ</sub>凡若<sub>シ</sub>其啓發ノ本曰ニ遇復<sub>ス</sub>其  
病ヲ再發スル<sub>レ</sub>ト必セリ夫礪礬ノ峻効ヲ奏スル此ノ  
如<sub>ク</sub>他藥ニ超越スト雖刺戟ノ性極慘毒ニメ初<sub>ク</sub>ニ於<sub>テ</sub>ハ  
毎ニ小量ヲ要スルガ故ニ初<sub>ク</sub>ハ惟一次ニ一丸ヲ與<sub>ル</sub>一  
ノ内礪礬半<sub>ク</sub>朝夕之ヲ服セシム其初<sub>ク</sub>ハ少<sub>ク</sub>瞑眩ヲ覺  
然<sub>レ</sub>吐下ヲ發セズ此<sub>レ</sub>ニ於<sub>テ</sub>夜服ノ量ヲ倍加ス此等ノ峻  
劇ノ藥ハ早朝空心ニ服スルヨリハ夜服ヲ瞑眩少<sub>ト</sub>  
ス此分量ヲ行<sub>テ</sub>發作漸<sub>ク</sub>ニ減ジ未<sub>ダ</sub>幾<sub>ク</sub>ナラズメ全<sub>ク</sub>止<sub>ム</sub>是ニ  
於<sub>テ</sub>余以爲<sub>ル</sub>爾後其服量ヲ減ズ可<sub>シ</sub>ト偶<sub>ニ</sub>病人嘔吐ス此礪



礬ノ餘勢ナリ故盡屏テ之ヲ用ズ強固ノ劑中ヲ擇幾  
那末ヲ與之ヲ連服スル頃之ニメ患者體氣調適シ復  
癩ヲ發スルノ懼ナキヲ以藥ヲ止其後患者全治ヲ告  
是ニ於余ガ喜知可病人病院ヲ辭シ去家ニ返少間ニ  
ノ又母ノ側ヲ離他方ニ遊テ數月少モ癩ノ徵ナシ六  
月中旬家ニ返母ニ給事ス一二週ノ後前病一發ス其  
後二月ヲ歷了發セズ其母ノ癩癩ハ故ニ異スト雖  
其身康平ニメ少害ヲ惹テナシ

附言

礬礬ハ水ニ化若末ト爲橙葉幾那末ヲ調勻シ與初



ハ半匁ヲ服スルノ日ニ二次漸ニ其量ヲ増加病人  
惡心ヲ覺ニ至過服メ吐ヲ發セシム可カラズ或亞  
鉛華麻屈涅失亞過爾拔ニ配シ用實列紐思曰其量  
二十匁ニ至硃礬等ノ銅劑ハ皆暴劇刺戟ノ劑ニメ  
之ヲ服スルハ動困篤ノ吐瀉ヲ發ス故屈爾蕪曰  
此劑ヲ行其効著カラザル寸ハ速後服ヲ停若妄過  
服セハ倏不治ノ惡症ヲ發ス久癩癩ニハ此劑或峻  
效アリ或ハ效ナキヲアリ蒲律屈那的尔立云胃液  
ハ諸銅劑ヲ消化スルノ能ズト卓見ト云可  
虔儒按ニ硃礬蘭ニズワールシールアマモニア



ク、ホウデンデ、コープル又ズワールフルシール、アム  
モニアカーレ、コーフル俱硫黄酸底碯羅ニシル  
ス、キプロアムモニアカーレ沙含蓄銅ノ義又キプロ  
シム、アムモニアキムト

云、**製法**

硫黄酸銅末

量恒

即チ膽礬ナリ其元性、硫黄酸  
銅トヨリ成故此名アリ

硝子罫ニ入、流動諸模ト尺ニ亞アルイイエンデアムモ  
ニバ初ハ罫底ニ緑色ノ渣脚

沙加石量宜ヲ其上ニ澆バ初ハ罫底ニ緑色ノ渣脚

灰精ヲ生ズ倍澆加其渣脚終ニ盡溶化スルヲ度トメ止謹

慎メ此天藍色ノ液ニ亞アル箇兒等分、或、其餘ヲ加黠



藍色ノ苾ヲ収、火ヲ用ルコナクメ乾シメ硝子壘ニ盛固封シ聽用ハ漢堙話多兒云、此藥鮮麗ナル天藍色ノ苾ナリ香臭ナク味苛烈惡可衝動微収瀉ノ礮氣アリ之ヲ過服スレバ大吐後胃痛腹痛ヲ發ス此藥癩癩ヲ治メ最奇効アリ病人年紀尚幼弱ニメ縱弛粘液樣質ヲ稟病ヲ得テ久カラズ筋纖維弛縱神經虛弱感觸過敏ノ者ニ用大效アリ又舞蹈病ヲ治ス此病魷蟲ニ發スル者最用可丸ト爲若ハ水ニ化シ半匁ヨリ一匁マテヲ服ハ此藥羅倨鹽及酸液ト合用可カラス



一男子、癩癩、發作嶮逆連八日、不醒、喉中搜鋸聲、諸部痙搐、將死、行碯礮續命火、將滅、治驗、偈獨諦格那

年録、美作、牧、穆、中、譯、

一男子、齡三十六、身體清癯、十三年以來癩癩、二罹、其發作ノ勢漸暴劇、ヲ做其平時ハ神經ノ感觸極穎悟、事ヲ操作メ殊ニ強健、言語及身體ノ諸官能モ亦絶敏、恰無病ノ人ノ如シ、發作スル毎余輒強神劑ヲ投メ發熱速止、此ノ如ク二年許ニメ發作大遠、殆平日ニ倍シ、病人疾苦ノ寛解ヲ告、千八百十年十一月四日、例ニ浴發熱ノ將來トスルヲ預知ス、此時方協健達護ノ地方ニ



客遊ス乃其旅館ニ休養シ遂家ニ返是ニ於余ヲ請之  
ヲ診スルニ發作頻數暫歇又發ス是ヨリ前ハ余之ニ  
常用スル強神劑中ニ阿芙蓉ヲ加用テ每良効ヲ得夕  
リ今ハ則之ヲ投メ驗ヲ見ス○其夜病狀前ニ同  
五日發熱片時モ間斷ナシ顎筋顛顛等攣急シテ舌ヲ  
咬傷シ其創甚大ナリ其他ノ諸證昨日ノ如阿片效ヲ  
奏セズ纈艸濃泡ニ阿魏葛斯多儂謨ヲ加用亦効ナシ  
六日諸証昨日ニ仍精神虛脫小便自利ス香竄強神劑  
效ナシ大ナル芫菁膏ヲ肩胛間ニ帖ス諸證亦減セズ  
幾那ニ強神劑ヲ加夥之ヲ服セシム



七日、夜間前ニ全發熱劇、脉初起ノ時ノ如、細ニメ殆候、  
可ラス煩渴メ飲ヲ引ハ暫解ト雖又渴シ殆消滅ス可  
ラス咬傷ニ由全舌大腫テ口内ニ充滿ス發作前ニ全  
幾那ニ強神劑ヲ合用、昨日ノ如、或水銃劑トシ用、  
八日、夜間前ニ同精力虚脱、小便自利故ノ如、發作モ亦  
全ク發熱モ初ノ如、其親族一名醫ヲ邀延、其醫、水劑ヲ  
投ジ且病家ニ囑メ曰、明日余ニ會ノ其療法ヲ議セン  
ト言訖去、余明朝卯時ヲ以詣面ス可ヲ告、其醫曰、辰半  
牌ニ非レバ到、了能スト是ニ於余、一方ヲ記シ其考証  
ニ備テ去、○其方



表西名醫傳算言 卷之一 十一 藥性原

亞鉛華 一ツ 白糖 二ツ

右研和メ散ト爲シ十裏ニ分<sup>テ</sup>毎半時ニ一裏ヲ服ス  
其醫辰半牌ヲ以テ診シ余ガ散劑ヲ見曰好方ナリ用  
可且命メ曰此散藥ハ病間歇スル時ヲ候テ之ヲ行ヒ  
其水劑モ亦故ノ如<sup>シ</sup>連服スベシト  
九日、夜間病狀前ノ如<sup>シ</sup>其熱發作スル<sup>ト</sup>多<sup>ク</sup>間歇スル<sup>ト</sup>  
少<sup>ク</sup>余、濃厚ノ肉汁、大麥水等ヲ處シ幾那ヲ連服セシム  
散、水ノ二方ハ止テ行ハス  
十日、發熱及<sup>テ</sup>諸証前ニ同<sup>シ</sup>精力耗竭ス病人子アリ四人  
皆幼稚知<sup>ル</sup>所ナシ其妻枕畔ニ啼泣ス余心ニ謂<sup>フ</sup>某ノ病



昨夜四更大作<sup>リ</sup>其妻將<sup>レ</sup>寡嫠トナラントス彼必<sup>ク</sup>吾術ノ  
長カラズ且見解ノ未<sup>ダ</sup>精カラザルヲ輕厭<sup>フ</sup>ノ意アラシ  
ト是ニ於<sup>テ</sup>苦心焦思メ其大病ヲ治メ以其母子ノ情ヲ  
慰解セント欲<sup>ス</sup>此時日巳<sup>ニ</sup>午ヲ過<sup>ラ</sup>  
十一日初刻<sup>其西俗子正牌ヲ以テ</sup>病家ニ詣<sup>レ</sup>バ門戸既<sup>ニ</sup>放開  
ス余愕然トメ以<sup>テ</sup>爲<sup>ラ</sup>病人巳<sup>ニ</sup>死シ家中雜遝ス故門戸ヲ  
放開メ燈ヲ點シ闇ヲ照<sup>ス</sup>者タリト驚<sup>タ</sup>其室ニ入<sup>リ</sup>テ之ヲ  
視<sup>ル</sup>ニ病者未<sup>ダ</sup>死セズ是ニ於<sup>テ</sup>余カ心初<sup>テ</sup>定<sup>リ</sup>徐<sup>ク</sup>其病狀ヲ診<sup>フ</sup>  
ニ身體強直喉中喘鳴シ搖擲停時ナシ其病勢方<sup>ニ</sup>死ニ  
瀕スルヲ覺<sup>ル</sup>余急ニ後方ヲ處ス



硃礬 二分 白糖 半分

右研和メ散ト為四裏二分

丑半牌、其一裏ヲ與ルニ瞬間ニメ搗搦ヤ、止、四分時

ノ後一裏、辰半牌又一裏、其夕更一裏ヲ與ル

十二日、上方ヲ投ズルルニ裏、病發作ナシル

十三日、今日ニ至ルマテ幾下廿四時ノ間ニ上方七裏ヲ投

ズ硃礬ノ量、通計三分半、少シモ他藥ヲ配スルルナシ大

麥水ニ蒲萄酒ヲ點シ濃厚肉汁ヲ服セシム此二味ハ

強心ノ首藥タリ病人安靜ナレル仍ル人事ヲ省セズ顔

ノ右部腫起ス幾那濃煎ニ纈艸ヲ加ス



十四日、病前夜ノ如、安靜、顔腫増、神識正、但、食氣未復セ  
ズ、渴故ノ如、左臂兩脚殆、強直ノ運動ス可ラス、左臂ヲ  
掉運セントスレバ必、右手ヲ以之ヲ扶、其狀恰偏枯ス  
ル者ノ如

十六日、前日以來、生機活潑シテ、左臂ノ痿弱復シ、兩脚  
復、知覺ヲ生ズ、左顔ノ腫脹、根脚大起、神機體力ノ故ニ  
復スルニ應メ、思慮其正ヲ得、舌創ノ外ハ意ノ好惡ニ  
應メ、言語ノ侍者ニ接スルマタ、平素ノ穎悟ニ異ナラ  
ズ、滋養強壯ノ諸品ヲ用テ、虛衰ノ生力大活潑ス  
十九日、體力大長シ、腫瘍ノ根脚モ亦大消ス、病者起坐



スル丁四分時、身體疼痛シ右膝尤甚

廿一日、顔腫消散シ膝大腫尾骶破胭ヲ生シ痛楚甚膝

ニ琶布ヲ帖ス

廿三日、患者心意快暢ス前夜甚、安静、膝腫減ス但其疼

痛今朝ニ連テ止ス尾骶ノ破胭腫瘍ト爲、其疼痛膝ヨ

リモ劇、幾那散ヲ與

○按ニ上章舉所、單味ノ滋養劑ハ直ニ癩癩ノ發作ヲ

阻絶スルノ藥ニ非、病人始テ硃礬半匁ヲ服セハル前

ハ病繇連トメ發作止ス已之ヲ服スル後、發作頓ニ歇

搗搨治ス故此病ノ痊ハ硃礬ノ良効タルヲ知り是ヲ



以今此經驗ヲ述テ以同好ノ君子ニ告後ノ有志者冀  
更此藥ヲ以之ヲ幾多ノ病人ニ徵ノ其效否ヲ實驗ス  
ルヲ希ノミ

觀雙子宮記

屋刺烏斯亞屈列兒迷山實福而多卷  
ノ三ニ見ユ

一婦人、年紀三十歲、頃日余ガ郷ニ客死ス之ヲ剖觀ス  
ルニ雙子宮アリ事奇異ニ涉ヲ以畧記ヲ作テ國費ノ  
採修ニ備ト云初其婦ニ兒ヲ誕ス皆健在ナリ其長ハ  
男ニメ甫十歲許、季ハ女子ニメ方僅七歲許、季女ヲ産  
スル後、陰部焚ガ如、且熱灼スルヲ覺、尔後、月經漸ニ多  
疼痛漸ニ熾ニ一身太虚羸ス已メ經血滋多、遂真血崩



二變ス是ニ於<sup>テ</sup>病ヲ興<sup>メ</sup>其土ヨリ斯<sup>ス</sup>多<sup>ク</sup>屈<sup>ル</sup>忽<sup>ホ</sup>而<sup>ル</sup>木<sup>ノ</sup>列<sup>ス</sup>亞<sup>屈</sup>  
 住<sup>スル</sup>所<sup>ニ</sup>來<sup>テ</sup>客舍ニ寄寓シ余カ診施ヲ請<sup>フ</sup>ト云<sup>フ</sup>余乃<sup>ハ</sup>  
 ノ地名<sup>ノ</sup>其陰鼎ヲ探<sup>テ</sup>其子宮脫シ其頸ノ宮口ニ接近スル處  
 ノ上部ニ一硬腫アリ大<sup>キ</sup>小ナル雞卵ノ如<sup>ク</sup>而<sup>シテ</sup>子宮ノ體  
 軟傷スル<sup>ト</sup>ナク唯微捺ニ遇<sup>テ</sup>便<sup>チ</sup>翻<sup>チ</sup>脫<sup>シ</sup>テ陰戶外ニ搭  
 掛スルヲ候<sup>ヒ</sup>得<sup>ル</sup>タリ又<sup>シテ</sup>其子宮口ノ下部モ亦腫硬スト  
 雖<sup>モ</sup>其本位ヲ失スルニ至<sup>ラ</sup>ズ此ニ處ノ腫脹ハ其勢本相  
 連<sup>ラ</sup>ズ而<sup>シテ</sup>各<sup>々</sup>自<sup>ラ</sup>許<sup>ス</sup>多ノ血汗ヲ滲<sup>ス</sup>其脫處ノ前部ハ之  
 容納セザレバ常<sup>ニ</sup>陰外ニ脫下スルヲ以<sup>テ</sup>禪<sup>襠</sup>ヲ以<sup>テ</sup>摩  
 傷シ小便ノ慄<sup>キ</sup>悍<sup>キ</sup>ニ觸<sup>レ</sup>大氣ノ蕩<sup>摩</sup>ニ遇<sup>フ</sup>テ遂<sup>ニ</sup>大<sup>ニ</sup>疼<sup>ム</sup>痛<sup>ヲ</sup>



發シ其色殷紅ヲ爲凡其部ニ生ズルノ斑ハ皆稀清酷  
厲ノ血液ヲ汗滲区是ニ於微其脫ヲ復シテ其位置ヲ  
整正スルガ爲ニ病人ヲメ仰卧ノ少其股ヲ高セシム  
又血ノ頻ニ衰頽スルノ部ニ灌溉スル者ヲ他部ニ分  
導其暴劇ノ血崩ヲ減ズルガ爲ニ肘上ニ刺絡ヲ行定  
痛降鎮ノ劑ヲ施且兼テ解凝ノ微強壯スル劑ヲ投ス  
應ヲ議ス此諸藥ヲ行テ其病狀較佳候アルヲ望可此  
ノ如ク靜養スルヲ三週許ニメ其症初テ寢佳境ニ入  
床外ニ起坐ス巳ノ恰好ノ紮住ヲ行テ其脫ヲ防キ處  
々ニ散步ス然レ其輕快久ク續カズ歩行スル後第三



日、倏熾盛熱ヲ得、大虚ノ候アリ、寒壞疽ニ陥丁ヲ懼、其  
 第四日ニ及、病狀滋、困篤ニ進、脉弱ニメ、倫次ナク、腹膨  
 疇ス、第七日ニメ、冷汗手面ニ蒙、是必死ノ候ナリ、死メ  
 後、其屍ヲ解剖ス、諸名士、四方ヨリ來、會メ之ヲ觀、會者、  
 皆以爲、子宮及其側ノ諸部ハ必焮衝ヲ挾丁アラント  
 又、其腹内ニ腐敗ノ兆アリ、剖之ヲ觀ニ及、果、臭膿アリ  
 テ、骨孟内髓骨ハ内、故骨孟ト名、二填满シ、内器在々、其中ニ浮漾  
 而、子宮ノ鞞帶已腐化、潤鞞帶子宮ニ附、鞞帶、下圖ニ詳ナリ、仙鼠翅合  
 非、鳥斯喇ハノ側ニ在、ハ其腐最甚ク、太畧、其本形ヲ失、  
 亦、下ノ圖ニ詳ナリ、  
 二至、鬢中ノ此說ヲ閱スル者、第三四圖ノ漫漶ヲ恠丁



勿鷗而列ハ國豐ノ畫師ナリ見所ニ据其真ヲ圖繪シ  
敢少モ文飾ヲ加ズ又肉瘁尖腔唇等モ亦余ガ知ホル  
間已之ヲ切斷ス故其圖亦之ヲ除真ヲ存スルヲ重ル  
ガ爲ナリ況少ク解剖ニ志アル人ハ此圖ヲ把商量一  
番セバ容易其子宮雙峙ノ狀ヲ了解ス可ニ足片ハ未  
必シモ其無所ヲ附會スルヲ須ガルナリ余嘗遊學ノ  
暫大學師穎仙滿尼氏ニ師事ノ親其訓導ヲ奉ズ千七  
百五十二年師子宮雙峙ノ者ヲ觀乃斯多刺篤勃尔觚  
地名ニ於其圖ヲ銅鏤ノ世ニ刊布ス圖繪精巧比ナシ今  
此症ニ較ルニ其症ハ雙子宮ノ前ニ各腔アリテ其一



腔每各一處女膜ヲ具而其子宮一雙相接ス蓋未懷孕  
 セザルガ故ナリ若夫今剖觀スル所ノ者ハ雙宮一腔  
 ヲ俱ニシ其際互相離隔ス此一再懷孕スルニ由ノミ  
 按ニ上主巳斯人ニ賦スルニ雙宮ヲ以スル寸ハ一宮  
 ノ人ニ比スレハ必雙品ノ懷孕ヲ得丁多カルベシ知  
 ス果然ヤ否究理家ノ講明スルヲ須ト云夏儒按ニ孔  
 病解剖篇ニ載云婦女雙子宮ヲ稟ル者固少カラス而  
 一宮ノ中間ニ膜アリ之ヲ畫斷メニト為ス者アリ名  
 テ區別的两宮ト云其體分テ二ト為各一宮ヲ造者  
 リ皆其一口ヲ共ニシ又一腔ヲ俱ニス之ヲ雙角宮ト  
 名又二宮對峙各一口一腔ヲ具ル者アリ而此種ハ一  
 腔ヲ俱スル者寡其初ノ二種ハ喇ハ卵巢止二箇ア  
 ノミ其後ノ一種ハ喇ハ卵巢モ亦復層区然庄米結兒  
 云ニ宮ニメ四喇ハ四卵巢ヲ具ルハ知ズ果然ヤ否未



雙角宮并脫病圖

第一圖 雙角宮



直腸

左精脉

左子宮

左卵巢

右子宮

右卵巢

右圓韌帶之上部

左圓韌帶

內為腔外覆以腔外膜

本剪線

左合魯皮為斯喇叭

左仙鼠翅及潤韌帶之片

右仙鼠翅及潤韌帶之片

右合魯皮為斯喇叭

右剪線

外膚

肛門

上部硬  
腫脫於

陰外

外皮膚



第二圖 硬腫



第三圖 雙角宮向頸開其口



雙角宮平部圖

第一圖



之ヲ信ス可<sub>レ</sub>ガ<sub>ル</sub>ナ<sub>リ</sub>止<sub>ム</sub>其<sub>ノ</sub>第<sub>ニ</sub>種<sub>ハ</sub>太<sub>約</sub>其<sub>ノ</sub>雙<sub>角</sub>ノ<sub>狀</sub>  
 互<sub>ニ</sub>相<sub>依</sub>付<sub>ス</sub>然<sub>レ</sub>正<sub>或</sub>兩<sub>般</sub>相<sub>離</sub>隔<sub>ノ</sub>形<sub>狹</sub>長<sub>ヲ</sub>爲<sub>ス</sub>喇<sub>叭</sub>ト<sub>又</sub>  
 分<sub>離</sub>シ<sub>難</sub>キ<sub>者</sub>ア<sub>リ</sub>又<sub>子</sub>宮<sub>分</sub>テ<sub>三</sub>ト<sub>爲</sub>者<sub>偶</sub>コ<sub>レ</sub>ア<sub>リ</sub>又<sub>者</sub>  
 上<sub>種</sub>ノ<sub>外</sub>子<sub>宮</sub>歪<sub>斜</sub>ス<sub>ル</sub>ア<sub>リ</sub>屈<sub>曲</sub>ス<sub>ル</sub>ア<sub>リ</sub>尖<sub>形</sub>ノ<sub>者</sub>  
 長<sub>形</sub>ノ<sub>者</sub>至<sub>テ</sub>潤<sub>ノ</sub>左<sub>側</sub>ニ<sub>向</sub>テ<sub>長</sub>ス<sub>ル</sub>ナ<sub>リ</sub>  
 ル<sub>者</sub>頸<sub>長</sub>キ<sub>者</sub>等<sub>ノ</sub>異<sub>種</sub>ア<sub>ル</sub>ナ<sub>リ</sub>

泰西名醫彙講卷之一 畢

泰西名醫彙講

卷之一

畢



一、長... 二、... 三、... 四、... 五、... 六、... 七、... 八、... 九、... 十、... 十一、... 十二、... 十三、... 十四、... 十五、... 十六、... 十七、... 十八、... 十九、... 二十、... 二十一、... 二十二、... 二十三、... 二十四、... 二十五、... 二十六、... 二十七、... 二十八、... 二十九、... 三十、... 三十一、... 三十二、... 三十三、... 三十四、... 三十五、... 三十六、... 三十七、... 三十八、... 三十九、... 四十、... 四十一、... 四十二、... 四十三、... 四十四、... 四十五、... 四十六、... 四十七、... 四十八、... 四十九、... 五十、... 五十一、... 五十二、... 五十三、... 五十四、... 五十五、... 五十六、... 五十七、... 五十八、... 五十九、... 六十、... 六十一、... 六十二、... 六十三、... 六十四、... 六十五、... 六十六、... 六十七、... 六十八、... 六十九、... 七十、... 七十一、... 七十二、... 七十三、... 七十四、... 七十五、... 七十六、... 七十七、... 七十八、... 七十九、... 八十、... 八十一、... 八十二、... 八十三、... 八十四、... 八十五、... 八十六、... 八十七、... 八十八、... 八十九、... 九十、... 九十一、... 九十二、... 九十三、... 九十四、... 九十五、... 九十六、... 九十七、... 九十八、... 九十九、... 一百、...







