


泰西名醫彙講

二



泰西名醫彙講卷之二

津山 箕作虔儒庠西氏 纂述

胎酸素藥治梅毒瘡經驗

佛蘭西ノ醫思勿實亞烏兒著ス所ノ梅毒全書中ヨリ

抄録ス千八百二十年録行

胡斯骨多氏ハ東印度淳木拔乙地ノ人舍密ノ新元行

ニ精通シ肝臟久炊衝ニ汞劑ヲ行テ大驗アルヲ覈明

ス千七百九十三年適發明スル所アリテ謂消石酸ハ

之ヲ内服セバ其效恐ハ汞劑ニ同カラント此酸ハ其

元素ヲ推原スルニ酸素窒素ノ二瓦斯相配ノ成而其
窒素瓦斯ハ酸素瓦斯ト結交スルト太牢固ナラザル
寸ハ其解携スルモ亦難カラザルナリ此時適肝膽病
ヲ得タリ乃躬自其效否ヲ驗セント欲消石酸六十滴
ヲ取水ニ此ヲ以稀開シ一日ニ服シ盡七日ヲ歷テ其
病全瘥是ニ於又此酸ヲ土人ノ梅瘡ヲ病者ニ施試ト
スルニ意アリ乃前ノ服法ノ如之ヲ行ニ及諸汞劑ヲ
用ル者ト其效驗伯仲ノ間ニ在而歐邏巴印度ニ論ナ
ク汞劑ヲ行テ久治效ヲ奏セザル者モ或時ニ此瓦斯
ヲ投ノ痼疾速ニ治シ其偉績夙ニ汞劑ノ上ニ超出ス

ル丁アルニ至且此酸ハ汞劑ノ如惡證ヲ發スル丁ナ
ク長服ノ危篤ヲ爲ノ憂ナシト云印度地方ノ熱國ニ
テハ此新奇ノ藥ヲ行テ梅瘡ヲ療スルニ少モ惡証ヲ
發セズメ太都十五日若クハ廿日ヲ出スノ全愈又胡
氏淳木拔乙ヨリ友人ニ寄ルノ書牘ヲ讀ニ云此藥或
全績ヲ収ル丁能ザル者アリト雖其証ハ汞劑ヲ行丁
已久メ了寸效アルヲ見ザルノ証ノミ其餘ハ幾多ノ
梅家其証ノ異同ヲ論ゼズ少モ他藥ヲ行丁ナク唯此
酸ヲ用テ完痊可シ二年ヲ歷復再發スル丁ナシト右
ノ如胡氏消石酸ヲ梅瘡ニ經驗シ千七百九十七年越

實木勃尔グニ於テ録ノ世ニ刊布ス龍動シ府窩カ尔ル微弗フ
 英吉利都府龍ノ銃局ノ鑿キ呂尔羅ロナル者其書ヲ獲テ
 動ニ在ル地名ノ銃局ノ鑿キ呂尔羅ロナル者其書ヲ獲テ
 之ヲ讀其年歐邏巴ニ於テ此酸ヲ初感ル底梅瘡ニ用テ
 更其功否ヲ試ルニ志アリ屈律キ乙古斯漢鳩氏モ亦同
 上局ノ一名外科ナリ實ニ專ラ此役ヲ尚親自ラ此酸ヲ梅
 瘡ニ施驗ルニ效能神奇ニノ試法的實ナルガ故ニ尔
 來蕩々タル醫流皆此酸ヲ梅瘡ニ用ント擬スルニ至
 斯ス點亞而多ク曰ク此試驗ハ千七百九十七年呂尔羅ガ著
 所ノ謀標ノ銘ヲ加シ書中ニ見ユ其書ハ從來不治ノ病ト看ル做
 弃置シ其新說ヲ記載ス又曰ク思フ勿シ實亞ノ鳥兒ノ氏ノ此經ヲ驗ス明
 引証スル間ノ少ク脱ス候スル所ノ消ス石酸ハ亞ノ悉ス儒ノ母ノ尼ノ多ク立ス屈ス
 二据ニ呂氏ガ用ル所ノ消石酸ハ亞悉儒母尼多立屈

本草綱目卷之二十一 藥部 酸類

母消石全酸ニ非^ソ亞悉^ニ儒母^モ尼多^ク呂須^ム母消石亞酸^ニ消石亞酸^ニタ
 リ而斯^ル勿^ク實^ニ亞^ニ鳥^ノ兒^ノ氏^ノ一^モ之^ニ言^ハ及^ブ按^ニ呂^ノ而^シ羅^ガカ
 書卷一^ノ百^ノ六^ノ十^ノ九^ノ頁^ノ會^ノ文^ニ云^ク余^ガ此^ノ酸^ヲ用^ト雖^モ其^ノ效^ハ十^ノ全^ク
 適^ニ全^ク酸^ノ闕^乏スル^ニ會^ノ文^ニ云^ク余^ガ此^ノ酸^ヲ用^ト雖^モ其^ノ效^ハ十^ノ全^ク
 復^ニ疑^フ容^ズ然^ラ在^リ兩^ノ酸^ハ其^ノ功^能果^シ皆^ク水^ニ銀^ト相^比準^ス
 ル計^ハ較^ス更^ニ精^ク之^ヲ試^ト庭^スト云^ク今^ノ又^ク兩^ノ酸^ハ本^ノ分^ノ質^料
 全^ク酸^ハ須^ム母^ノ消^石亞^酸ハ^ニ空^ニ素^ニ十^ノ分^ヲ配^メ成^ス亞^悉儒^母消^石
 多^ク呂^須母^ノ消^石亞^酸ハ^ニ空^ニ素^ニ十^ノ分^ヲ配^メ成^ス亞^悉儒^母消^石
 リ聚^ル結^スル^ハ寸^ハ斯^ル兩^ノ酸^ハ能^ク差^ヲ茲^ク屈^レ律^乙古^ス漢^ノ
 ニ開^ル陳^セサル^ハ豈^シ復^シ遺^レ憾^ナラ^ズヤ^ハ屈^レ律^乙古^ス漢^ノ
 鳩^ノ氏^ノ諸^ノ酸^ノ性^ノ藥^ノ効^力ノ^ハ差^異ヲ^ハ查^明シ^且梅^瘡ニ^ハ酸^化汞^ノ
 按^ニ升^汞加^カ羅^默ヲ^ハ行^テ效^驗ヲ^成ハ^汞ノ^能ニ^非メ^果酸^ノ
 兎^ノ赤^白降^汞ノ^類ヲ^ハ行^テ效^驗ヲ^成ハ^汞ノ^能ニ^非メ^果酸^ノ
 素^カ瓦^スノ^本功^{タル}ヤ^否ヲ^ハ審^明セ^{ント}欲^ス第^一ニ^ハ消^石
 酸^ヲ試^ス第^二ニ^ハ飽^酸底^鹽酸^ヲ試^ス第^三ニ^ハ枸^橈酸^ヲ試^ス第^四ニ^ハ

四ニ飽酸底鹽酸剥篤亞斯ヲ試乃其試驗ヲ左ニ開列ス

試消石亞酸第一

一病人三四日以來梅瘡ヲ龜頭系ニ得タリ消石亞酸一多ヲ取水二十多ニ和シ一日ニ服シ盡シム居了數日ノ後其量ヲ增加一多半ニ至年千七百九十七年ノ三月十二日病院ニ詣同十九日全治ス
一病人龜頭包皮ニ梅瘡ヲ得了數處八日以來又包莖ヲ生ズ日ニ此酸一多ヲ取水ニ比ニ和シ服セシム三日ヲ過レ凡太異狀ナシ其分量ヲ加テ一多半ニ至三

月十二日、來治ヲ請_ヒ、日瘡愈テ去_ル。

一男子、八日來、包皮ニ大潰瘍ヲ得、尿道モ亦少ク稀膿

ヲ漏_ス、此酸一芍ヲ水ニ化ニ和シ、整日之ヲ服セシム。嗣

其量ヲ增_シ、一芍半ニ至_リ、更_ニ又加_テ三芍ニ至_ル、但_シ三芍ヲ服ス

レハ其人體氣違_ハ和シ且熱ヲ生スルヲ以_テ其量ヲ減_メ

ニ、芍半ヲ與_フ、三月十八日、病院ニ歸シ、四月廿二日全愈

此症ハ傍證アルニ由_テ其治差_ズ遲_シ。

一病人、包皮ニ大瘍ヲ得、タリ日ニ此酸一芍ヲ取水ニ

化ニ和シ服ス、此ニ由_テ疝痛ヲ發ス、阿芙蓉一匁ヲ與_ル

丁ニ夕、其後漸次ニ此酸ノ量ヲ增加_シ、日三芍ニ至_ル、復_タ少_ク

西名醫三傳詩 卷之二 四 一傳忠厚藏
餘患ヲ發セズ三月十五日ヲ以テ病院ニ歸シ四月十八日、痊可ヲ告

試飽酸底鹽酸 第二

一病人、八九日來、許多ノ梅瘡ヲ包皮ニ得タリ此酸五滴ヲ水一多ニ和シ服セシムルヲ日ニ三次、漸ニ其分量ヲ倍加テ十五滴ニ至、水ヲ以テ稀過シ服スルヲ日ニ四次、三月十二日、病院ニ歸シ廿日ニノ愈

一病人、八日以來、龜頭包皮ニ一潰瘍ヲ得、其底頗深、此酸六滴ヲ取、上方ノ如、服セシムルヲ日ニ三次、瘡形依然トメ變ズルヲナシ、漸ニ分量ヲ加、十五滴二十滴ヨ

リ乃、四十滴ニ至、日ニ四次、三月十二日、初病院ニ歸シ
四月初一日、痊可ス

一病人、龜頭包皮ニ梅毒瘡許多ヲ發シ且便毒ヲ患、此酸
八滴ヲ取、日ニ四服ス漸、其量ヲ倍加、三十滴ニ至、日ニ
四服、此分量ヲ服メ渾身ニ焮衝ノ證候ヲ得タリ一二
日ノ後、刺絡ヲ行、一次、瘡勢故ノ如、ニメ少減ゼザル
ヲ以、更其量ヲ増、五十滴ニ至、日ニ四服、三月十八日、病
院ニ來、四月廿二日ニ至、痊

補註 便毒ハ三月廿二日ニ潰破シ潰瘍ニ先、十四
日ニメ口ヲ斂

一病人、龜頭、包皮處々ニ梅瘡ヲ得、兼、包莖、便毒ヲ患、此酸八滴ヲ水一多ニ化シ、日ニ三服シ、漸ニ其分量ヲ倍シ、加テ五十滴ニ至、日ニ四服、此分量ヲ行テ、焮衝ノ諸症ヲ發ス、刺絡ヲ施、速ニ消散ス、四日ノ後、又四十滴ヲ與、日ニ四服、三月十八日、初病院ニ來リ、五月四日ニ愈。

補註 此證、至頑ノ證タリ、陰莖背ノ水脉、疼痛腫脹ス、然、凡久カラズノ消散ス、其便毒モ亦同。

試 枸 櫞 汁 第 三

一病人、梅瘡ヲ龜頭ニ得タリ、枸櫞汁一多ヲ水三多ニ化シ、初ハ之ヲ服スル、日ニ三次、其後ハ四次、三月十

二日、初^テ病院ニ歸シ同月廿日愈

一病人、八日許來梅瘡ヲ龜頭包皮ニ得タリ上ノ酸汁

一多ヲ水ニ多ニ化シ日ニ三服ス其量ヲ增加メ日ニ

四多ヨリ八多ニ至三月十二日、病院ニ來翼月廿二日

瘡口斂ル

補註病人、醫院ニ來後五日、便毒ヲ發ス醋酸銻_{銻糖}

醋^等ヲ冷水ニ化シ患處ヲ罨^{オウ}其後、越^エ列^レ機^キ的^テ尔^ルヲ行テ

其部ヲ震スル^{タカク}一二三日、梅瘡ニ後、一二三日ニメ治

ス

一病人、龜頭ニ大ナル潰瘍ヲ得、其腹股合縫腺モ亦腫

大^ナラ^ス做日ニ枸櫞汁一^ナヲ取分^リ四次若^シ五次ニ服^ス盡其
 腺腫ノ處ハ上證ノ如^ク蒸^シ濕^シ方^ヲ行^フ八日ニノ潰瘍其口
 ヲ斂^ス其便毒ハ潰破スルノ勢アリ軟化^シ芭布^ヲ帖^ススル
 一^ツ日ニ二次此ノ如^クナル一^ツ日ニノ其瘍潰破ス居^ル
 二三日ニノ潰瘍ノ四周ニ羅斯^ノ狀ノ焮衝^ヲ發^シ疼痛
 腫脹ス日ニ二次^ニ繻^ヲ撒^リ絲^ヲ換^フ帖^シ醋酸^ノ鈹^ノ半^ヲ々^ヲ水^ニ
 化^シ其^ノ上^ヲ冷^シ罨^ス枸櫞汁^ヲ行^フ故^ノ如^ク其量^ヲ增加^ス
 日ニ六^々ニ至^ル三月十八日ヨリ病院ニ歸^シ廿六日ニ
 ノ龜頭ノ潰瘍口ヲ完^シ翼月廿四日便毒痊可^ス

試飽酸底鹽酸剥篤亞斯 第四
飽酸底鹽酸剥篤亞斯
 八 輓近ノ谷密家、蘇魯

林加里ト云フ其元性製法等ハ同寮宇田川榕著
氏著ス所ノ舎密開宗ニ詳ナリ故茲其說ヲ畧メ
ナ載ルナシ

一病人十日以來、龜頭包皮ニ許多ノ梅瘡ヲ得タリ其
腹股合縫腺モ亦大腫飽酸底鹽酸剥篤亞斯三氏ヲ取
服スルナリ日ニ三次、此ノ如ナルナリ三日ニメ太效ヲ奏
セズ故ヲ以其量ヲ倍加テ四氏ト爲其後、又増五氏ニ
至日ニ四次、兼越列機的爾ヲ腺腫ノ處ニ行、日ニ一
次、斯點亞而多曰、英吉利龍動府ノ外科、昆而屈氏、初、其
テ越列機ヲ腹股合縫腺病ニ行、ヲ發明スト云、其
梅瘡ハ十三日ニメ口ヲ斂然、疔腹股合縫腺腫、次第ニ
腫大ス越列機ヲ停テ行、酢酸鉍水ノ冷漏ヲ行、日

ニ數次、此鹽ノ分量ヲ增加テ七匁ヲ與、又增、八匁ニ至、
 日ニ四次、便毒潰破シ十二日ノ後、許多ノ膿汁ヲ漏ル、
 ノ全、其口ヲ斂、四月廿七日、初テ病院ニ來、五月十九日、
 瘡愈、廿九日、便毒治ス

補註

病人、飽酸底鹽酸剥篤亞斯ヲ行、後、八日ニシテ其

脈ヲ診スルニ一密扭多ノ間ニ九十動ヲ得、其舌ノ

中心白胎アリ是ニ於テ血少許ヲ瀉ス上ニ焮皮ヲ結

血中蠶清分ノ凝成所、其後、斯鹽ノ服量ヲ加、五匁ヨ

リ八匁ニ至、ト雖病人平全ニシテ復、他証ヲ得ル、トナ

シ凡、上ニ開載スル諸症ハ太都皆此種ノ酸藥ヲ服

又食機盛ニ小便過多ナル者多然ニ此病人ハ毫モ
此證ヲ發スルナシ

一病人、龜頭ニ梅瘡ヲ發スルヲ數處、且包皮莖ヲ兼、此塩
三ハヲ服セシムルヲ日ニ三次、四日ノ後、其量ヲ増加
七ハニ至、日ニ四服ス五月三日、病院ニ歸シ十六日、故
ニ復ス

補註 此塩ヲ服スルヲ十日許ニメ病人口渴シ舌ノ
中心ニ白胎アリ然レ食機増盛セズ小便モ亦多ク
加ズ其肌ハ平肌ト太異ル所アルヲナシ
一病人、龜頭包皮ニ梅瘡ヲ得、其包皮太硬大ヲ爲、其病

院ニ來^ラザル前之^レヲ患^ル丁^テ殆^ト三週、此鹽ヲ投スル^ト初
ハ四^レ氏、日ニ四服ス九日ヲ歷^テ後漸^クニ其量ヲ倍加^テ五
氏、八^レ氏ヨリ九^レ氏ニ至^ル日ニ四次、口微渴、舌上微白胎ヲ
除^ク外、餘證アル^トナシ五月八日、病院ニ來^リ、同月廿九日、
瘥^ルヲ告^ス

一病人、八日以來、包皮ニ梅毒ヲ得^{タリ}此鹽ヲ行^フ丁^テ初
ハ六^レ氏、漸^ク其量ヲ加^テ八^レ氏ニ至^ル日ニ四次、五月二日、病院
ニ歸^シ六月廿五日愈^ス

補註 其證候ハ上證ト異^{ナリ}所ナシ

一病人、包皮處々ニ潰瘍ヲ得^ル丁^テ已^ニ八日許此時^ニ瘍^ヲ癒^ス

更倍加シ皆速^ニ侵蝕^ノ大^クヲ做^ス斯鹽四^ハヲ與^テ後其量ヲ
增^テ八九^ハヨリ十二^ハニ至^リ終^ニ二十四^ハニ升^リ皆日ニ
四服ス五月八日病院ニ歸シ六月十八日全^ク愈^ユ

補註

此病人ハ其天稟^{トモ}瘰癧^{トモ}質タル^ト明^カナリ其病院

ニ來^ル後七日ニ^ノ口渴シ舌上微胎^{アリ}瘡^ノ周圍^ニ羅
斯狀^ノ炊赤^ヲ爲^ス故^ヲ以^テ上^ノ鹽劑ニ兼^テ幾那^一ヲ
與^ル一日ニ四次^{此ノ}如^クナル^ト十六日其潰瘍^ノ疼痛
減^メ殆^ト痊^トシ羅斯狀^ノ炊衝^ハ全^ク治^{スル}ニ似^{タリ}然
^レ三日ヲ歷^テ羅斯狀^ノ炊衝^復發^ス又此鹽四十八^ハニ
兼^テ日ニ幾那五^ヲヲ服セシム此證^ノ瘡可^{スル}此^ノ

如緩慢スル所以ハ其人ノ天賦瘰癧質タルニ坐ス
ルヲ疑ナシ然レ余謂幾那ニ飽酸底鹽酸^{ボツト}剝^ト篤^ア亞斯
ヲ配合スル寸ハ初幾那此鹽ノ本分ヲ解剖シ而此
鹽一解ルニ及ハ却幾那ノ本能ヲ障碍ノ其カヲ伸
ルヲ能ハラシム此其治スルヲ速ナラザルヲ致所
以ナリ後ノ此等ノ劑ヲ配合スル者ハ宜意ヲ銳メ
之ヲ猛省スルアラシク^ガ故ニ爰ニ之ヲ開陳
ス

一病人數週以來包皮ニ潤大ノ潰瘍ヲ發シ腹股合縫
腺處々大ニ腫初ハ此鹽六^ハ氏ヲ與二日ノ後八^ハ氏ヲ與

日ニ四服ス且醋酸鉍ノ冷濁ヲ腺腫ノ處ニ行、_下日ニ
數回六日ニメ潰瘍大佳候アリ但其腺腫ノ處結膿ス
ルガ故ニ此鹽十匁ヲ與、次十二匁ヲ増與、_下日ニ四
次、此分量ヲ行、_下日、病人腹痛泄瀉ヲ得タリ夜中阿
芙蓉一匁ヲ與、此鹽ヲ服スル、_下日、仍、上量ノ如、_下日ニメ
上證治シ潰瘍幾痊、_下トス腹股合縫ノ腫處ハ已ニ化膿ス
ルニ似居、_下日ニメ潰瘍治ス然、_下日、腺腫ノ處、_下日、
膿少許ヲ漏出ス九日ノ後、_下日、完口ノ些子ノ硬結ヲ遺ス
六月十一日、病院ニ來、龜頭ノ潰瘍、_下日、_下日、_下日、
ハ三十日ニ愈、

以上記スル所ノ十七證ハ皆初感染スル者タリ其人
 ヲ査問スルニ皆汞劑若他藥ヲ服スルコトナシ之ヲノ
 皆醋酸鉍註上ニ一瓜ヲ水ニ多ニ化シ日ニ數回瘡處ヲ
 洗滌セシム別ニ攝生食禁ヲ立ズ但包莖ヲ挾病人ハ
 居室ニ籠住シ床中ニ卧ルヲ禁ズルノ一一人ハ唾
 腺少感觸スル所アルニ似タリ然嘗吐涎ヲ發スル者
 ヲ見コトナシ其瘡已愈ル者モ必皆數日藥ヲ服セシム
 其食物二種アリ其一種ハ乳ニ蒸餅及薄麥酒一此ヲ
 服食セシム其一種ハ肉ニ充分ノ蒸餅蔬菜薄麥酒二
 此ヲ與按ニ此等ノ服食ハ皆西人日用ノ食品ニ別
ニ攝生食禁ト云ニ足ズ唯其人ニ應ノ乳ト肉

トノ差分上ノ治驗ニ据ルニ消石亞酸、枸椽酸汁飽酸底
鹽酸〔飽酸底鹽酸瓦斯ヲ水ニ和ス〕ハ皆梅毒初染ノ諸
證候ヲ治メ少モ吐涎ヲ發スルコトナシ飽酸底鹽酸剥
篤亞斯ハ就裡最效アリ呂而羅氏其著書ノ附録ニ開
メ曰、銃局幾名ノ外科ノ試驗スル所ニ据ルニ消石亞酸
ハ初染ノミナラス再染ノ諸證ニ用テ又同効ヲ奏ス
ト以上、四種ノ酸素ヲ胎孕スル藥ヲ行テ發スル所ノ
證候ハ食機增長シ小便大利シ口渴舌胎アリ全身ノ
機運盛大ヲ爲血液凝結メ所謂燉皮ヲ結ニ至但飽酸
底鹽酸ハ效驗頗峻而枸椽酸ハ之ニ減ス消石亞酸ハ

或内藏ヲ病シムルコトアリ

斯黥亞而多

曰此試驗ニ据考ルニ枸椽酸ノ梅瘡ヲ

治スル其餘ノ三種ト異所ナシ但此酸ハ其素相融

合スル物質ト分解スルコト頗難其餘ノ胎酸素藥ハ

之ニ反ス

飽酸底鹽酸剥篤亞斯ハ渴ヲ生シ心動脈ノ運動ヲ盛

大ニスルコト酸精ヨリモ甚シ然レ尿ノ分泌ヲ催食機

ヲ増盛スルコト少シ是ニ由考ルニ諸酸ノ効能ハ要スル

ニ渾身ノ機運ヲ増盛シ兼血ノ蛋清分ヲ凝固セシム

ルニ似リ

右肘類動脈傷治驗并圖

華、島、吉里傑鬼著千七百九十一年刻スル所ノ外

醫會編ヨ
抄録ス

加列兒カ、霰レ浙爾ル、年紀三旬、其右肘カ、紋レニ一腫瘍ヲ得、其根

脚頗大ニノ明白皮色變セズ疼痛ナク之レヲ候、ニ鼓動アリ

リ千七百九十年五月三十一日日、月曜來余ガ治ヲ請、病

人自述曰、一醫アリ四月廿日、肘ニ刺絡ヲ行、血大涌出

スルト恰波濤ノ如シ、其醫或量ノ血ヲ瀉シ了テ常法ノ

如之ヲ紮住スレ、血止マズ、歷帕オシモツノ中ニ大ナル錢貨ヲ

包テ之ヲ帖シ、繻條ヲ以其上トヲ紮緊ス、半時余ヲ過テ

其癖大ニ腫起シ、皮膚色ヲ變ズ、其醫ヲ招診セシム、其

紫ヲ解ハ血又大噴嘔ス醫復紫法ヲ施_テ初ノ如_シ明朝
ニ及其腫倍甚ク辭手皆黑色ヲ爲_ス醫來再_ヒ其紫ヲ解_シ血
復出_ズ碎麥ノ琶布ヲ全辭ニ帖敷スル_ヲ十四日皮色
故ニ復_ス針口潰破スル_ヲ三四日ニノ口ヲ斂_ム已_ニ其
處漸_シニ一腫瘍ヲ生_ズ醫此腫ヲ認_テ膿瘍ト爲_シ一膏ヲ
以_テ之_ヲ蓋_ヒ且曰_ク十分ニ結膿セバ截開ス宜_ト而其腫次
第二長大メ遂_ニ今ノ症ヲ成_シ荏苒トメ愈_ズ其街内ノ二
良外科思_フ帝傑兒_ル漢傑詞兒_ル邀_テ其病ヲ議_ス二氏皆
謂_フ其病療_ス可_カラザルニ非_ズ凡_ト至_テ篤劇ニノ忽_ニ諸_ヲ可_カラ
ハルノ證タリト因_テ命_メ余ガ街中ノ醫校ニ歸_リ醫治

ヲ請_レシムト云、余乃_レ其腫處ヲ度_レニ全狀_ニ繻_ナ形_ニノ其稠
 圍八_ナ拇半、長_ナ四_ナ拇半、濶_ナ三_ナ拇半ナリ第一圖甲符ヲ照_レ其
 崖畧ヲ見_レベシ巳_ニ醫校ニ來_レ後、其腫上ニ層々相重疊ス
 ル_ニ壓帕ヲ施_シ且_レ辟_レ動脈ノ循_レ所ニ_ニ沿_テ長厚ノ壓帕ヲ安
 シ_テ底_ニ電_ノ揆_レ出_レ繻_ノ帶_ニ漢傑詞兒ノ外科書ヲ以_テ辟_レ手指ヲ
 并_テ紮_レ住_ス此帶ヲ_レ移動スル_ノナク_メ良驗ヲ奏_セシ
 ムルガ爲_ニ針ニ_ニ絲シテ_テ繻_ノ帶_ノ相_レ絡_ノ邊_ヲ迭_レ縫_レ紐_ス時
 々_ニ冷_レ醋ヲ_レ用_テ上_{ヨリ}帶_ノ子ヲ_レ蘸_シ其_レ辟_ハ上_{ヨリ}下_ニ至_テ斜
 ニ_ニ漸_レ高_{カラ}シムル_ノ位置ヲ_レ設_テ大_ニ刺_レ絡_メ血_ノ量ヲ_レ減_シ病
 人ヲ_レメ_レ床中ニ_ニ靜_ニ養_ノ動作セ_サカラシ_メ且_レ緊_ニ忌_口セ_シ

卷之二
 醫部全錄
 雜考

卷之二

卷之二

醫部全錄
 雜考

ム

六月初一日、腫處鼓動甚ク、僻疼痛シ、晝夜安カラズ、後
幾日ニノ上證稍減ズ、十三日、十四日、十五日ニ及其證
漸盛ニ、遂繃縛ヲ解去サル可ラサルニ至此日、盆尼、勃
爾滿、扭斯、窩々斯多、而埜乙、奇樂別、漢傑、詞兒、扶浙木、滿
爾天思等ノ諸先生皆來臨デ其療法ヲ商議ス、其繃帶
ヲ解去之ヲ見ニ腫處又長大ノ九拇半ト爲、其皮膚多
剥脫ス、衆咸謂從前施所ノ繃帶、毫モ病ヲ治スルニ益
アルトナク、而其證手術ニ非レハ愈ニ足サルヲ明知
ス、是ニ於唯輕乾紫ヲ施、緩豆而尼結多ヲ以、僻ヲ鎖皮

膚剥脱全愈ルヲ待テ術ヲ施ヲ約ム廿一日、肌膚初テ
完^キヲ告^シ此日術ヲ施ニ先^ツ一^ツ二時、窩^オ々^ハ斯^ス多^ト而^ル埴^デ乙^イ奇^キ氏
生阿芙蓉三^ハヲ取^リ病人ニ與^ハ服^セシム前ニ云^フ所ノ盆
尼^ニ以下ノ諸先生及^ニ内^ニ外科ノ諸醫生皆來^リ會^ス樂^ズ別^レ氏
叔^シ列^レ烏^ワ埴^テ兎^ル氏介^スタリ術ヲ施^ス左ノ如^シ
先^ツ緊^ク豆^ト而^ル后^ニ結^ト多^トヲ螺^コ鎖^シ針^ノ口^ノ上^ニ腫^ル處^ノ正^中ニ
於^テ縱^ニ皮^膚ヲ割^リ開^ス腫^ル處^ノ下^ヲ距^ル一^一拇^ニ始^リ其上
際^ヲ距^ル一^一拇^ニ止^ム次^ニ雙^ニ頭^ノ臂^ノ筋^ノ腱^ノ樣^ノ蔓^延體^ノ膜^ヲ
徐^ク々^クニ披^キ開^ス此蔓^延體^ハ即^チ其腫^ル囊^ヲ成^ス者^ニメ大^キ雞
卵^ノ如^シ之^ヲ割^リ開^メ其中^ノ畜^ル血^ヲ淨^ク清^シ輪^ノ狀^ニ旋^ラ切^テ

本囊ヲ出去其囊ノ外内面ノ狀ハ第二三圖ヲ參觀ス
 ベシ是ニ於テ繇カ輒ノ海繇ヲ水ニ蘸過シ創内ヲ盪滌ス
 ルニ動脈ニ一創アリ大柳葉鉞鋒ト恰モ相符ス第四圖
 乙符併考可溝路消息子ヲ動脈ノ上下ニ入之ニ循刀
 ヲ下凡ハ尿管ヲ線紮スルニ妨アル物ヲバ一々截斷ノ
 後、脈創ヲ勾針ニテ縫紉シ脈創ノ上下ニ蠟線各二條
 ヲ穿テ動脈ノ底面ヲ繞出其最上最下ノ一線ヲ緊紮
 ス按ニ動脈ノ底面ヲ繞テ創處ノ上下ニ各二條ノ蠟
 ノ線各一條ヲ聚結シ餘ノ二線ハ之ヲ結ハル所以已
 ハコレヲ以テ不時ノ急須ニ備ント欲スル為ナリ
 紮了後徐ニ豆トウ而ル巨結多ヲ螺解スルニ血復噴迸セズ

繇撒絲ヲ創内ニ填、ホクシモシ膠瀆膏ヲ攤開シタル濶大ノ繇片
ヲ六頭ニ切テ創口ヲ絆シ病者ヲノ床内ニ靜養セシ
ム術ヲ施、タノシ十密ミ扭ト多ノ後之ヲ診スルニ小尺骨動脈
前ノ已見二時ノ後、脈完現シ其手モ亦天然ノ温煦ヲ
得タリ爾後三日三夜ハ病人體氣和適ニメ太疼痛ナ
シ第三日ノ夜將終トスルニ及大出血シ遂膏ヲ剥メ
檢視セザル可ラザルニ至解之ヲ視ニ及線紮ノ處ハ
固紮ノ故ノ如血動脈傍枝ヨリ噴出ス漢傑ウダク詞兒氏ノ
遏血法ヲ行明朝ニ及復出ズ是ニ於再一切ノ紮住ヲ
解去血管ヲ查點スルニ其血ノ出所ヲ認ルヲ能ズ樂

別氏ノ卓見ニ遵^テ創^ル口ノ上下ヲ割開シ深^ク縫^ヒ紐スル^ト
 二^多鍼^リ且^チ初^ニ線^ヲ紮^シタル部ノ上下ヲ更^ニ緊^ク紮スル^トニ處^ス
 按^ルニ初^ニ動^カ肌^ノ底^ニ穿^テ入^ルテ^ハ出^ル血^乃ヤム又^チ創^内ニ撒^キ絲^ヲ
 未^ダ結^ハザル所ノ二^線ヲ云^フ出血^乃ヤム又^チ創^内ニ撒^キ絲^ヲ
 填^ル初^ノ如^ク冊^子帶^下造^法用^法ヲ龍^腦精^ニ蘸^テ之^ヲ繃^ス
 紮^ス龍^腦精^ヲ行^フ所以^ハ余^ガ他^ニ適^スル^寸豆^而尼^結多^ト
 ヲ螺^鎖スル^ト緊^ニ過^キ其^僻之^ガ為^ニ病^シメ^ラレ^黒血^ヲ
 瘀^畜メ^行ザル^ヲ治^スル^ガ為^ナリ^其僻^初ハ畧^ホ温^ナリ^シ
 者^今ハ乃^チ日^ニ倍^ク冷^カニ^肌動^全絶^ス
 廿^六日^全僻^疼甚^シ廿^七日^痛稍^減シ^手少^ク温^ナリ^廿
 九^日僻^大ニ^腫繃^帶之^ガ為^ニ過^キ緊^ヲ為^ス其^ヲノ^餘裕^{アリ}

ラ使トシテ繃帶ノ兩邊ヲ處々剪截ス此日血又出太
多カラズ三十日、ハツラ腫滋多是ヲ以帶子ヲ換寬繃縛
七月初一日、血水交流太多カラズ其後二日ノ間、其量
稍増已メ歇出ズ五日、創處ニ良膿ヲ結窩々斯多兒_ル堦
乙吉氏_{イキ}幾那煎ニ綠礬油ヲ加方ヲ與此日繃帶ヲ更換
ス紮住ノ二線寬縱ノ撒絲ト膠附ス

初六日、初七日、大便通セズ先緩下劑ヲ行次吉利詞_{デキ}參
兒ヲ處ス初九日、繃帶ヲ更餘ノ二線モ寬縱ス余意ヲ
決線ヲ剪斷シ去

初十日、初ニ線紮シタル部、及動脈創ヲ縫紮シタル兩

際ニ小息肉ヲ生ズ狀腐化シタル臍ノ如第五圖丙丁
 符ニ見此肉ハ創内ニ長息スル餘肉ヨリモ稍萎黄色
 ヲ帶大豌豆ノ如動脈ノ死腐スル處ヲ速ニ化シ介
 シムルガ爲ニ時々^的列並^精ヲ點シ乾^絲撒^絲ヲ填シ
 冊子帶ヲ以^紮住ス廿二日ニ及創處大ニ斂小ス唯頗
 緊ナル輪轉^縮帶ヲ換用


六月廿六日ヨリ八月十一日マテ四十又七日ノ間ハ
 腕中些ノ脉動ヲ得ズ此日ニ及^及脉初テ復見其後脉勢
 漸盛ナリ

廿一日創悉愈許メ家ニ返シム余病者ニ約メ曰其創

第一圖 右肘類動脈傷外形



第二圖




剝別腫囊視其内外面


第三圖



第四圖 剝去本囊後鉞鋒傷動脈之痕初見



第五圖 小息肉生於脈創之上下



丙
丁

新愈ト雖掉運未故ニ復セズ時々就診視シ其全治ヲ
謀可止九月廿五日ニ及其病盡痊一切運用皆故ノ如

是ニ於初會議シタル諸先生ノ家ニ詣謝セシム

附冊子帶

傑詞見第一卷附錄外科器械圖說

造法并圖

此帶子ハ三箇ノ

木絲片ヲ以製ス其縱徑ハ傷處ノ一又半ノ長ニメ

横徑ハ創ノ形ニ應メ大小スベシ其兩中ハ三層ニ


重テ子春春ノ二號ノ如粗之ヲ縫合ス其三層ノ兩端

ヲ切縫際ノ側ニ至每端各三頭ト爲但其切處ハ每

層一直線ヲ爲スメ一上一下一濶一狹相錯戾メ六

箇ノヒトスジ夏秋冬符ヲ爲ヲ要ス此創上ニ傳帖メ其每頭

冊子帶
ブークバンド



册子帶
 ブークバンド
 此は、
 冊子帶の
 構造を示す
 図である。
 中央の縦線は
 春の季節を
 示し、左右の
 横線は秋、冬、
 夏などの季節
 を示している。
 この構造は、
 冊子のページ
 を季節ごとに
 整理し、見出し
 やすくする
 ための工夫
 である。

ノ切際ニ空隙ヲ遺_ス下莫_シムルガ為ナリ又繻片ノ
 横徑ハ外ヨリ内ニ向_テ毎層必短_ク一拵ナルベシ故_ニ
 最外ノ一層ハ最長_ク最内ノ一層ハ最短_ク **着法**先_テ帶子
 ヲ取_リ證ニ應_ズノ單水若_ク水醋若_ク水燒酒ニ蘸透ス畢竟
 患處ニ觀_テ帖スルニ取_ルノミ是ニ於_テ帶子ノ兩中ヲ上
 臂ナラバ後面_ニ下臂及_テ股ナラバ外面_ニ脚ナラハ内面
 ニ帖シ傷處ノ周_ニ各_ニ其兩端ノ頭緒ヲ横_ニ緊帖ス但_シ
 先_テ其最内層ノ中心ノ一頭ヲ帖上_ノ次ヲ逐_テ其餘
 頭ヲ帖スベシ第二三層モ亦之_ニ準ス **主用**外科者
 流_ル太畧_トタ_シ此帶子ヲ復骨傷ニ用_ルルノミ余_ハ
 自_レ傑_ク詠_ル兒_ノ

泰西名醫彙編 卷之三
 外科
 鐵
 鐵
 鐵

ハ乃股脚骨單傷ニモ亦之ヲ施、毎ニ奇效ヲ収ム

子宮血崩行、タム芥木封ホシ經驗四則本六則ヲ節ス、伊白瓦而其四

達多著

第一驗 千七百八十四年、十月十二日、余ヲ邀テイ乙木氏

ノ令内ノ疾ヲ診セシム其人、年ニ紀廿一歳、姪スル下

已六月餘之ヲ望、ニ精神昏沉、人事ヲ省セズ、短床ノ上

ニ僵卧ス、カシヤシ看侍人余ニ向話、曰、婦一時半以還、陣疼ヲ

得余ノ來ニ先ツ、カシヤシ少頃ニノ其疼止、乍チ眩暈、大血崩ヲ發

ス、ト其陰中ヲ候、ニ子宮口、硬大メ開哆シ、血其口ヨリ

注瀉シテ止ズ、脉小弱、氣息蹇澁ス、頻ニ水醋ヲ面ニ潑

又稍知所アリ少頃ニメ血崩復發シ病人又昏沉ス子
 宮口ノ狀ヲ以考ルニ此危篤ノ際ニ臨決胎児ヲ分娩
 セシムルニ由ナキ寸ハ速ニ其大血崩ヲ遏ルノ利
 ルニ如ズ乃繇帕ヲ摺折ノ四層ト爲冷醋ヲ以蘸腹上
 ニ帖ス知覺少ク生ジ崩微ク止又冷醋ヲ以其面ヲ灌
 洗シ新ニ又腹上ノ帕ヲ醋ニ蘸帖ス巳ノ病人腰腹疼
 痛ヲ叫余其子宮口豁開ノ分娩スルヲ望然_レ其宮口
 全故ノ如少_シモ變化スルヲナキ寸ハ分娩スル能ハル
 一必セリ況其血崩止ザル一既四分時余ニメ今又更
 増劇スル寸ハ宜ク荅木封_ト度儒按_ニ荅木封_ハ蘭_ニス
 封_ト度儒按_ニ荅木封_ハ蘭_ニス

スルノ義ナリ蓋シ繇帕若芋麻等ヲ水若醋中ニ蘸透シ
摺折若緊捏ノ子宮腔ニ内或層々相襲テ腔内ニ填满
ラシテ出血ヲ遏絶スルヲ云又他部ノ創傷ニモ之ヲ行
ラ以テ創内ニ填平スルヲアリ往々諸書ニ載ス
ベキノ證ナリ乃身畔ノ手帕ヲ取醋ヲ以蘸透シ緊捏
ノ一塊ト爲累々相襲テ腔内ニ入上ハ宮口ヲ撐兩股
ヲ緊合シ兩脚ヲ椅子上ニ搭シ床上ニ平卧セシム此
治法ニ由神經新ニ一異感動ヲ生ジテ全身戰慄シ精
神完復ス赤蒲桃酒一盞ヲ服ノ後微々睡寐ス四分時
ヲ歷小便窘迫ノ眠覺余此時ニ乘ノ荅木封ヲ出シト
欲少ク之ヲ探バ荅木封血塊ト相連結メ出次血崩又
大發ス余之ヲ扶掖メ床ニ上シメ又初ヨリモ小ナル

荅木封^{ホシ}ヲ造^リ腔内ニ填塞シ幾那粵幾斯化水ニ舎^セ電阿
 芙蓉液、綠礬油ヲ伍メ之^レヲ投ズ一時ノ後病人微々打
 睡シ蒸氣恰好^ク宣發シ脉弱ト雖^レ倫アリ荅木封^{ホシ}自脫落
 シ血復出^ズ前藥ヲ行^フ數日ニメ一二週ノ後精力故^{モト}
 ニ復シ三月ヲ歷テ男兒ヲ誕ス其^ハ隨^テ橢圓ニメ子宮
 ノ右側ニ牢着シテ幾^ハ子宮口ノ外ニ挺出シ臍帶其側
 面ニ植立ス此疝癢ナル位置ハ實ニ其第六月ノ血崩
 ヲ發スル所以ナリ産後惡露恰好^ク下^リ精力頓ニ復ス其
 明年ニ及^テ再懷孕シ少^シノ異證ナクメ月滿テ分娩ス
 第二驗 遏^ハ漢所倫健ハ密多而勃爾^ル觚^名地ノ内科產科

泰西名醫彙編 卷之三 二二 樂心醫錄

ナリ千七百八十五年八月、一婦人ノ許ニ延請セラレ
 其婦、年紀三十許、已ニ見ヲ誕ス今又、妊ノ方ニ五月十
 リ一日晝間少ク血漏ヲ得、夜ニ及、頗甚ク夜半ニ至、滋
 劇ク過氏詣診スルニ及、ハ病人心神已昏冒シ汚血狼
 藉ノ中ニ僵卧ス其脉小弱、氣息短促、瘵様ノ搐掣アリ
 テ其死期已迫リ子宮口洞開メ大思多乙府見按ニ錢貨ノ名
 ノ如、扶所斯人名ノ術ニ据子宮口ヲ開拓セント欲按ニ慶儒
 扶所斯ノ術ハ未ダ其那樣タルヲ詳ニセズ蓋之、然、
 崩滋甚ク諸證蜂起ス且其術ヲ施了マテハ半時若一
 時ノ久ヲ須ルガ故ニ其間ニ病人ノ精力竟耗竭シテ

生機熄滅セシトテ恐^ル是ヲ以^テ其術ヲ止^テ行ハス。荅木^タ封^{ホシ}ヲ施^テ之^レヲ過^シント欲^ス乃^チ手帕ヲ醋中ニ蘸^シ勉^テ深^ク臍^ヲ中ニ納^メ時々舎^ヘ電^デ阿芙蓉液ヲ與^フ服セシム。丑半牌ノ後、手足本然ノ温ニ復^シ病人知覺スル所アリ。寅牌ニ及^テ決^シ睡ス。夜戌牌、荅木^タ封^{ホシ}ヲ出^シ去^リ之^レヲ更^ニ新^セント欲^ス然^レ血崩^ハ早^ク已^ム閉止スルヲ以^テ復^タ之^レヲ用^ヒス。床内ニ静養シ其明日午後安産ス。惡露恰好^ク下^リ三日、第六日病盡^ク瘥^テ家事ヲ操作スル^ル平時ノ如^シ。

第三驗 亞^ア乙^イ過^ア而^ル列^レ別^ベ氏^スハ思^ス的^テ炎^{エン}別^ベ尔^ル健^ケ地^チノ外科産科ナリ。千七百八十五年十一月十八日、炎^{エン}別^ベ氏^スノ婦

ノ産難ニ邀延婦ハ初産タリ子宮口洞開シ微ナル陣
 疼發スル寸ハ一膜子宮口ヨリ突出ス外面ハ至縦緩
 ナリ遏而列別氏ノ未到ザル前ハ努力頗盛ナリ已ノ
 漸減ズ唯其未破漿セザルガ為ニ幸ニ詳ニ其胎児ノ
 恰好ノ位置ヲ候ヲ得タリ其替遲ノ未分娩セザル所
 以ハ胎衣按ニ即胎外ノ薄膜ノ膠固ニ破綻シ難カ
 故ノ之乃意ヲ決メ其膜ヲ切開ニ未ニ密扭多ヲ過ス
 ノ見胎脱隨ト俱ニ生而血崩大作遏而列別氏手ヲ子
 宮内ニ刺候ニ其口放開メ些ノ手ヲ遮ヲ覺ズ指ヲ以テ
 宮内ヲ摩澤ノ其知覺ヲ興以其口ヲ歛シメント欲レ

凡其機運廢絶ノ絶手ヲ箝頓スルヲナシ此時ニ方病人意識全、胃味ノ血液暴注スルヲ波濤ノ如シ生力瞬間ニ熄滅セントスル勢アリ是ニ於自其手ヲ抽去、苧麻少許ヲ取テ醋ニ湿勉深ク子宮内ニ填满シ其後手ヲ以テ其腹ヲ按スルニ子宮未斂束セズ故ヲ以テ更許多ノ苧麻ヲ醋ニ蘸腹上ニ帖シ一二密扭多ノ後、又上種ノ荅木封ヲ換納、頃之ニノ病人知覺初テ復シ腹痛甚キヲ訴、又其腹ヲ按メ明ニ子宮ノ斂束スルヲ候知ス其時血崩減シ二時許ヲ過ル後血ト荅木封ト糾結ノ脱ス強壯劑ヲ行、了三週ニノ始テ產蓐ヲ起

第四驗

伊越氏ノ妻、千七百八十六年初、妊娠ス、臨盆

ノ際、產婆之ヲ療ス、此ヨリ以還、子宮脫ヲ得タリ、明年

七月、余カ診ヲ請、子宮脫ノ腔ノ大唇外ニ在大初生兒

頭ノ如之ヲ納レバ、乃歛ト雖復脫下ス、尋常ノ子宮環

海綿枕

按ニ子宮環ハ腔中ニ納、子宮脫ヲ上ニ撐ル具、海綿枕モ亦其用、子宮環ニ同ク其脫下ヲ遮攔

スルニ

皆之ヲノ本所ニ留シムルヲ能ス、凡孕婦ノ本

病阻病等

ニ兼テ子宮環等ヲ施、效ナキ子宮脫ヲ得ル

者ハ往々目撃スル所ニモ實ニ受胎ノ一候タリ、其後

七八週ニ及、子宮果復脱セズ、羞骨上ニ升ヲ以其懷孕

タルヲ確證ス、千七百八十八年、第一月十七日、産ニ臨

是ニ於余ヲ招、産婦大陣疼ヲ得、子宮漸ニ開哆スル、
二時半餘ニノ薄膜破綻シ、兒頭子宮頸ト俱、小骨孟内
ニ下降ス、努カスル、少選ニノ陰戸口ニ臨、遂、腔ノ大
唇ニ達ス、子宮口ノ開大スル者、其大畧、子宮環ノ如、余
ニ指ヲ以、宮口ト兒頭ノ間ニ挿入シ、陣疼發スル毎ニ
子宮口ヲ拓開シ、且勉テ子宮頸ヲ上ニ捺送ス、四分時
ノ後、兒頭全、子宮外ニ娩出ス、臍帶兒頭ヲ絡、オシオス二匝、指
ヲ以、撮起、兒頭ヲ踰テ之ヲ解脱シ、分娩セシムル、
常法ノ如、已ノ臍帶ヲ紮斷スル間、倏、血崩ヲ得、病人全、昏
沉ス、臍帶ニ循テ指ヲ刺、子宮中ヲ候、ニ娩隨ノ半截、子

宮底ニ膠附シ其底反墊ノ挽隨ト俱其頸側ニ在而其
頸ハ方ニ垂降腔唇ニ臨乃手心ニ挽隨ヲ承之ト俱宮
底ヲ上ニ支起テ子宮ノ全質ヲ勉テ上推送シ其斂束
ヲ促ガ爲ニ手ヲ其内ニ留其挽隨ノ大半ハ已宮底ヲ
離ト雖餘猶脱セザルヲ以テ子宮之ニ妨ラレテ自斂束
スルヲ能ス血崩仍故ノ如ニ止ナキヲ知乃宮内
ニ留タル右手ヲ以其膠附ノ處ヲ剝離シ左手ヲ以臍
帶ヲ持テ挽隨ヲ外ニ掣出仍右手ヲ陰内ニ留其斂藏
ノ狀ヲ觀ト欲然反墊ニ由麻木シタル子宮底再其機
運ヲ憤起スルヲ能ス病人精神昏沉シ血脈管開哆ノ

處ヨリ溢泄スルヲ恰波濤ノ崩ル、ガ如是ニ於荅木
封ヲ行ト欲手帕ヲ取側ノ冷水桶中ニ蘸過シテ子宮
上身ヲ填塞ス精神乍甦其腹ヲ候ニ子宮モ亦動運ヲ
生メ収縮スルヲ覺此術ヲ施ト雖侍者未嘗之ヲ悟ズ
メ其病人ノ呻吟スルハ挽隨ヲ拽出スルガ故トノミ
思ヘリ已ニ術ヲ施了ニ及傍人ニ向其已危篤ヲ免ハヲ
開諭シ而再三其腹ヲ按メ自其子宮既斂束スルヲ證
明ス然レ其實ヲ語寸ハ物議沸騰スルヲ以荅木封ヲ
内ハヲ知シメス寬陰部ヲ繃縛シテ其頭ヲ鍼紉シ荅
木封ヲ脱セザルヤウニ看護ノ病床ニ上シメ時々發

作スル眩暈ヲハ急ニ忽弗滿鎮痛液、舎電阿芙蓉液ヲ
與余ガ居病家ヲ距一遠カラズ故急ニ之ヲ辨スル一
ヲ得タリ病人輕々ニ睡ヲ催一時許ヲ歷病人以爲大
血塊ヲ下ト而其實ハ荅木封ノ脫下スルタルヲ知ラズ
病人此ニ由眠覺此時精神已頗快爽ス其後心識漸ニ
復シ調攝スル一三週ニノ病床ヲ徹ス其床中ニ靜養
スル間ハ子宮脫セズ起家事ヲ操作スルニ及復腔内
ニ脫下スル一一拇半許之ヲメ更大脫セガラシメ且
其已脫スル者モ亦勉テ上ニ支起ガ爲ニ海綿枕ヲ腔
中ニ行然レ病人之ヲ帶ル一ナシ其年九月又妊スニ

水桶ヲ擔^テ窖^ヲ級^ヲ升^リ子宮復^タ大^ニ脱^スル^ノ初^ニ孕^スノ時^ノ如^シ
第^ニ四^ニ月^ニ及^テ子^ヲ宮^ノ本^ニ位^ニ復^シ其^ノ脱^ヲ治^ス千^七百^八十^九
年^ノ四^月十^三日^ニ安^ニ産^ス臨^盆ノ際^ニ子^ノ宮^ノ頸^ノ少^ク腔^中ニ^ニ脱^ス
在^ス然^レ厄^ニ惡^ニ証^{アル}ル^ノナ^シ是^ニ由^テ前^ノ惡^ニ證^ハ子^ノ宮^ノ脱^ノ
發^スル^所ニ^ニ非^ズノ臍^ノ帶^ノ短^促ニ^ニ由^テ生^スル^ノヲ^知ル

泰西名醫彙講卷之二 畢

... 蘇西... 卷之... 三十三

