


泰西名醫彙講

三







泰西名醫彙講卷之三

津山 箕作虔儒庠西氏 纂述

頭頸歪斜治驗

亞、淋別兒著、外醫會編、見一千七百九十一年刻、

千七百七十四年九月四日、一少年來テ診ヲ請、名ハ舍

夫立屈、年甫十六歲、胸骨乳筋按ニ胸上ノ筋ノ臆短促ノ右

頭歪斜シ頭傾側テ肩上一頓ス其初生ハ已此證アリ

而未甚カラズ既ノ漸ニ今ノ證ヲ成、父母憂懼ノ名醫

輩ノ診施ヲ請ト雖了寸効ナシト云、其項推ヲ檢查ス



ルニ殘廢ノ狀アルトナシ是ヲ以テ伊漢迷結廉ガ著ク  
 ル亞謨斯<sup>アムス</sup>的<sup>テ</sup>而達謨<sup>ダム</sup>和蘭ノ外科弗魯利亞<sup>フロリア</sup>紐斯<sup>ニウス</sup>ノ術ヲ  
 舉行<sup>ケ</sup>ントスルニ意アリ但彼<sup>タ</sup>ハ鉸子<sup>ハシ</sup>ヲ以テ剪斷スト雖<sup>モ</sup>  
 今ハ則代<sup>チ</sup>ニ刀ヲ以テセント欲<sup>ス</sup>此術ハ余和蘭學社合著  
 ニ載<sup>レ</sup>天華弗氏<sup>ヘンハフ</sup>ガ奇術驗說ヲ讀<sup>ク</sup>久己<sup>ニ</sup>其鴻益アルヲ信  
 スルトアリ病見及其父母皆其術ヲ施<sup>ス</sup>ヲ懇請ス大學  
 師盆尼<sup>ホニ</sup>余ノ先師樂別<sup>レイバト</sup>二先生ニ見<sup>テ</sup>診ヲ請<sup>ヒ</sup>且其術ノ  
 可否ヲ議セシム二先生皆異見ナシ是ニ於<sup>テ</sup>本月九日  
 ヲ期<sup>シ</sup>ノ其手術ヲ行<sup>ヒ</sup>此日二先生及<sup>ヒ</sup>内外科ノ諸名匠皆  
 貴臨ス術ヲ施<sup>ス</sup>ト左ノ如<sup>シ</sup>病人ヲメ椅子ニ坐了セシメ



余彼ニ面メ立<sup>ツ</sup>樂<sup>ラ</sup>別<sup>ガ</sup>先生ヲ請<sup>ヒ</sup>兩手其頭ヲ持<sup>シ</sup>勉<sup>メ</sup>テ之<sup>ヲ</sup>  
ヲ掣<sup>リ</sup>引<sup>キ</sup>セシム費<sup>ハ</sup>而<sup>シテ</sup>列<sup>レ</sup>檢<sup>ス</sup>氏<sup>ノ</sup>ヲノ短縮シタル腱上ノ皮<sup>ヲ</sup>  
ヲ撮<sup>リ</sup>上<sup>セ</sup>セシメ余自<sup>カラ</sup>左手ノ示指ヲ以<sup>テ</sup>其皮ノ左側ヲ掣<sup>キ</sup>  
創<sup>ル</sup>愈<sup>ル</sup>後其癥痕ヲノ歪斜セシメガルヤウニ少<sup>シ</sup>ク斜<sup>ニ</sup>  
ニ刀ヲ向<sup>テ</sup>テ皮膚ヲ割開スル<sup>ト</sup>約スルニ長<sup>キ</sup>三指横徑<sup>ニ</sup>  
是<sup>ニ</sup>於<sup>テ</sup>指大ナル胸骨乳筋ノ腱下ニ溝路消息子ヲ入<sup>レ</sup>  
刀ヲ用<sup>テ</sup>此腱ヲ切斷ス已<sup>ニ</sup>之<sup>ヲ</sup>切斷スル寸樂<sup>ラ</sup>別<sup>ガ</sup>先生力<sup>ヲ</sup>  
ヲ加<sup>テ</sup>其頭ヲ掣<sup>ッ</sup>ト雖<sup>モ</sup>尚<sup>モ</sup>牢固ノ處アリテ腱ノ斷處ヲ  
メ半拇モ相離開セシムル<sup>ト</sup>能<sup>ズ</sup>余愕然トメ心驚<sup>キ</sup>手<sup>ヲ</sup>  
術ノ毫モ其病ヲ治スルニ益ナキヲ覺<sup>ル</sup>時ニ乍<sup>チ</sup>天<sup>ハ</sup>華<sup>ハ</sup>弗<sup>フ</sup>



ノ經驗ニ此腓ノ外又必靱帶狀ノ體ヲ切斷ス須ヲ載  
ヲ想起乃指ヲ以テ創底ヲ探試ルニ果所謂靱帶狀體  
ルヲ認得タリ是ヲ以テ又溝路消息子ヲ其下ニ挿テ導  
子ト為テ斷截ス斷截僅ニ了レバ其頭早已樂別先生ニ  
掣正セラレ腓端離開一三拇許已術ヲ施全績ヲ收ル  
ヲ以テ創ヲ療スル一單創ノ如其頭ヲ直ニメ稍左側ニ  
傾敬スル狀ノ繃縛ヲ施四週ニメ創口完然<sub>トモ</sub>氏仍少ク  
右側ニ側<sub>ハ</sub>アルヲ免ズ次病人ヲメ其頭ニ緊<sub>シ</sub>颯<sub>シ</sub>ヲ  
穿<sub>タ</sub>シム其製右側ハ濶<sub>ク</sub>左側ハ狹<sub>ク</sub>此ヲ行テ頭形次第  
ニ正<sub>シ</sub>但<sub>ダ</sub>頤側匾平ノ部仍斜ニ曲<sub>テ</sub>胸前ニ向<sub>フ</sub>ノ<sub>ク</sub>若此狀



ナクンバ人復之ニ接スト雖少モ殘廢ヲ覺ルナカ  
ラン

四 奇驗三則

山北實怒而多卷一ニ見本ト六  
條アリ今其三條ヲ節ス

第一驗 亞屈列兒氏頸腫ノ一證ヲ録ス其證琶布腫  
ノ一種タリ外科那多兒之ヲ療シ亞氏等ノ數醫之ヲ  
相其腫ヲ截斷ノ幸ニ完治ス亞氏其證ヲ療スル間下  
款ノ考按ヲ記ス

○一其腫巨大ニシテ雪際亞國ノ二十比ヨリ重

○二其内ニ停滯スル物渾濁ナラズノ瑩白ナルヲ略

鷄子白ノ如其稠肉ノ如故此腫ハ琶布腫豕肉腫



蜜腫

按ニ此三病ハ皆包腫ノ屬ニ腫内ノ種類ニ含蓄スル物ノ形狀ニ即之ヲ名

ニ算入ス可カラズノ實ニ此等ノ病ノ本因ヲ成者タリ

○三此腫ノ外形ヲ診ノ内ニ停蓄スル物ノ凝流堅軟

ヲ懸斷スルヲ能ズ若夫本病ノ辨論ハ外科ノ切

須タリト雖今ニ於未詳解ヲ下者ナシ宜潛心覃

思ノ忽略スルヲ勿可

○四此腫物ハ齧筋ニ牢著スルヲナク但外被ヲ以テ一


囊ヲ化成シテ此腫ヲ造故本腫ノ膜ニ大血管ヲ

帶絡



○五、外行頸動脈ノ内行ノ支別、及其第四支外行齶動脈ハ其長延長シ且其濶モ亦展張ス蓋其脈常處ヨリ來下齶ニ到テ腫處ノ後面ニ循上ヨリ下ニ降、遂腫底ニ抵却腫處ノ前面ト内面ヲ經、腫頭ニ循顏ニ升故此動脈ハ術ヲ施間其二處按ニ下齶腫瘍ノ後面ニ入部ト腫頭ヨリ顏ニ上ニ處ヲ云テ切斷ス是ヲ以其長ノ六分ノ四ヲ斷去其動脈ノ截口ハ大鷲筆管ノ如

圖解 甲圖



養百名醫集傳 卷之三 日 一



乙圖

腫瘍ノ右側左手ヲ以テ扛起ス

上中中下

皆甲圖ニ全シ

此腫ヲ病人ハ斯没蘭土ノ一貧夫タリ之ヲ患ルヲ幾  
十六年ナリ此術ヲ施五週ヲ歷大患一掃ス

度儒按ニ此腫ハ漢人ノ所謂瘤ノ類ニシテ此邦ノ人  
之ヲ患者多シ其大者大兒頭大ニ至而其皮色大略  
常ノ如ク太疼痛ナシ動靜脈支其上ニ循或間赤色疼  
痛ノ潰破スル者アリ上ニ掲ル驗說ハ細ニ其手術  
ヲ論列セズ故今質篤滿氏外科必讀包腫門ニ載手  
術ヲ爰略載ス其文ニ云其腫太巨大ナラズ囊中ノ



滯物頗流動スル者ハ壓法ニ宜又術ヲ行テ滯物ヲ  
洩ス後、囊ノ内面ヲ愈合スル為ニ之ヲ行テ妙トス  
其腫物小軟ナラバ切開シ滯物ヲ擽去シ輕腐藥ヲ  
帖メ囊ヲ焮衝セシメ亦壓法ヲ行テ愈合セシムベ  
シ或皮囊ヲ連テ截開シ滯物ヲ洩去リ其囊ノ殘片  
ヲハ化膿セシメテ消滅ス此二術ハ少異同アリト  
雖囊上ニ腐藥ヲ行テ焮衝ヲ發セシムルハ乃同又  
線ニ衝動膏ヲ搽腫瘍ヲ串ノ結膿セシムルモ亦得  
タリ其手術ノ通法ハ一舉ニ腫囊ヲ切斷スル是ナ  
リ其法先横ニ腫上ノ皮ヲ切十分ニ創口ヲ開可然



氏長ノ直ナルモ可ナリ楕圓ナルモ亦可ナリ已割  
 開メ創ヲ造ハ其鋒銳利ナラザルニ個ノ鈎子ヲ以  
 皮ヲ鈎メ兩邊ニ掣開シ別ニ鈎子若鑷子ヲ以腫囊  
 ヲ撮シ至謹慎メ囊ヲ傷メナク徐々四辺ノ蜂房體ト  
 相離シム此間毎必大出血ヲ發ス囊ヲ剥離スルニ  
 ハ少囊片ヲ遺テアル可カラズ然レバ性惡潰瘍  
 或再初ノ腫瘍ヲ生シ易術已了バ速ニ絆創膏ヲ帖  
 シ或縫紉メ之ヲ合ス可若腫囊ヲ生ズルノ處切要  
 ニメ一頓ニ切斷ス可ラザル者ハ其太牢著セザル  
 處或危ニ涉ザル部分ノミ割斷シ其餘ハ化膿セシ



メテ除去<sup>キ</sup>宜<sup>シ</sup>又一法之ヲ線紮スル者アリ腫頸細小  
ナル者ニ施<sup>シ</sup>最宜<sup>モ</sup>其線ハ漸<sup>ク</sup>緊ナラシメ腫瘍自<sup>ラ</sup>脱落  
スルニ至<sup>ラ</sup>シム

第二驗 一女孩生<sup>レ</sup>テ未<sup>ダ</sup>一周歲ニ滿<sup>ズ</sup>一日其父母朝  
ニ方<sup>リ</sup>テ衣ヲ更<sup>ル</sup>間右臂ノ肘紋尋常刺絡ヲ行<sup>フ</sup>部位ノ  
下一指許ノ處ニ一針アリテ横ニ臂上ニ徑<sup>リ</sup>テ深<sup>ク</sup>脂肪  
中ニ刺<sup>シ</sup>入<sup>リ</sup>其針頭獨<sup>リ</sup>臂側ニ見<sup>ル</sup>ルヲ視<sup>シ</sup>試<sup>シ</sup>ニ其上ヲ捺<sup>セ</sup>  
ハ其鋒推<sup>シ</sup>テ皮ヲ冒<sup>ル</sup>起<sup>ル</sup>ノ白點ヲ為<sup>ス</sup>然<sup>レ</sup>ニ疼痛疾苦十ク  
腫脹創傷ナシ勃<sup>ホ</sup>而<sup>シ</sup>天<sup>カ</sup>白<sup>ク</sup>健<sup>ク</sup>氏<sup>ノ</sup>ヲ請<sup>フ</sup>勃<sup>ホ</sup>氏<sup>ノ</sup>之<sup>ヲ</sup>割<sup>リ</sup>開<sup>ス</sup>ル  
一ヲ欲<sup>セ</sup>ズ指ヲ以<sup>テ</sup>臂ノ内側ニ於<sup>テ</sup>針頭ヲ牢<sup>ク</sup>爪撮<sup>リ</sup>ス針鋒



皮ヲ穿<sub>テ</sub>臂ノ外側ニ脫露ス乃<sub>チ</sub>小鑷子ヲ用<sub>テ</sub>拔<sub>キ</sub>去<sub>ル</sub>其長<sub>チ</sub>一指許、纖小ノ繭絲<sub>シ</sub>半ハ之<sub>ニ</sub>牢附纏絡シ其處鏽<sub>サ</sub>ヲ生ズ其餘ハ光滑ニ<sub>在</sub>々微鏽スルノミ拔<sub>キ</sub>去<sub>ル</sub>後血一涓滴ヲ洩<sub>ス</sub>十<sub>ク</sub>又之<sub>ヲ</sub>拔<sub>テ</sub>前後兒斷啼泣セズ又疼痛ナシ但<sub>シ</sub>針刺ノ痕、赤斑アルノ<sub>ニ</sub>此症針ノ刺入スルハ本<sub>レ</sub>那樣ヲ以<sub>テ</sub>スルヲ悟<sub>ル</sub>可<sub>ク</sub>ガル寸ハ誠<sub>ニ</sub>常有<sub>ラ</sub>サル一奇證ト為<sub>ベ</sub>シ何ヲ以<sub>テ</sub>之<sub>ヲ</sub>言<sub>フ</sub>ヤ其針ハ皮上ヨリ刺入スルト悞<sub>テ</sub>嚙<sub>ス</sub>下<sub>ト</sub>ニ論ナク其兒必<sub>ズ</sub>些子ノ疼痛ヲ覺<sub>キ</sub>可<sub>シ</sub>然<sub>ル</sub>ニ少<sub>モ</sub>之<sub>ヲ</sub>覺<sub>ル</sub>ル<sub>ト</sub>ナシ若<sub>シ</sub>其コレヲ嚙<sub>ミ</sub>下<sub>ス</sub>者タラバ乳糜管ヨリ喻<sub>升</sub>ノ血中ニ運輸シ終<sub>ニ</sub>此處ニ搬出スル<sub>ト</sub>知<sub>ル</sub>



可果<sup>ラ</sup>然<sup>ラ</sup>バ其些痛ヲ發セザルノ理殊<sup>ニ</sup>解ス可<sup>カ</sup>ラザルナ

リ然<sup>レ</sup>氏假使之ヲ悞<sup>リ</sup>吞<sup>ム</sup>ト雖<sup>レ</sup>決<sup>ル</sup>乳麋管ヨリ噲<sup>レ</sup>升<sup>ル</sup>ノ血中

ニ運輸スル<sup>レ</sup>ナキ<sup>ク</sup>左證<sup>ハ</sup>下證<sup>ノ</sup>縫頭針三十二條ヲ

悞<sup>リ</sup>嚥<sup>ム</sup>ト雖<sup>レ</sup>此道路ニ噲<sup>レ</sup>入<sup>ル</sup>スル<sup>レ</sup>ナキヲ以<sup>テ</sup>微知ス可<sup>キ</sup>ノ

按<sup>ニ</sup>孔<sup>子</sup>氏原病解剖篇ニ云<sup>フ</sup>蜂房體中ニハ骨軟骨石

毛髮諸蟲其餘ノ異體ヲ容<sup>ス</sup>ル<sup>レ</sup>アリ此等ノ異體

ヲ其質中ニ寓<sup>ス</sup>レハ蜂房體其動運ヲ増發<sup>ス</sup>ノ他處ニ

搬運シ内ヨリ外ニ行<sup>ク</sup>或<sup>ハ</sup>外ヨリ内ニ轉<sup>ズ</sup>一人アリ三

十年前悞<sup>リ</sup>鍼<sup>ヲ</sup>嚥<sup>下</sup>ス其後臂上ニ膿腫ヲ得<sup>テ</sup>鍼<sup>ヲ</sup>瘡<sup>口</sup>ヨ

リ抜<sup>ケ</sup>出<sup>ツ</sup>又<sup>ハ</sup>一人前臂ノ一處結<sup>膿</sup>ノ一鍼<sup>ヲ</sup>出<sup>ス</sup>之<sup>ヲ</sup>査<sup>ス</sup>

證<sup>ハ</sup>詩<sup>執</sup>而<sup>多</sup>律<sup>的</sup>兒<sup>華</sup>而<sup>列</sup>兒<sup>等</sup>ノ著<sup>書</sup>ニ多<sup>ク</sup>之<sup>ヲ</sup>載<sup>ス</sup>

第三驗 一處女年紀十八歳一日戲ニ口内ニ縫頭鍼

數條ヲ銜<sup>テ</sup>過<sup>シ</sup>傍人不意ニ其背ヲ拍<sup>ッ</sup>一<sup>拍</sup>女子一驚ヲ




喫了ノ悞遂<sup>テ</sup>其鍼ヲ嚙下然<sup>レ</sup>凡<sup>レ</sup>別ニ病ヲ惹<sup>カ</sup>ズ八週ノ後  
惡心不食シ至<sup>テ</sup>稀薄ノ食料ニ非<sup>レ</sup>ハ吞下<sup>ス</sup>一能<sup>ズ</sup>其口  
ヲ動寸之ヲ候<sup>テ</sup>ニ齒牙綠色ヲ為<sup>ス</sup>舌ヲ捺<sup>ノ</sup>候<sup>テ</sup>ニ一二鍼  
喉上ニ見<sup>レ</sup>一外科器械ヲ以<sup>テ</sup>之ヲ拔去<sup>レ</sup>其後鍼上<sup>リ</sup>テ胃ヨ  
リ喉頭ニ出<sup>ル</sup>每ニ惡心ヲ發ス此ノ如ナル<sup>ル</sup>十四日許  
ニノ尚差ズ吐劑ヲ行<sup>テ</sup>吐シ除<sup>ク</sup>大凡鍼ヲ吐スル三十  
二條ニノ諸證全<sup>ク</sup>愈<sup>ル</sup>初<sup>メ</sup>之ヲ嚙寸ハ其針新<sup>ク</sup>ニシテ鋒穎  
利ナリ然<sup>レ</sup>凡<sup>レ</sup>吐出<sup>ス</sup>ニ及<sup>テ</sup>其形勾曲ノ鋒穎頑鈍ヲ為<sup>シ</sup>或<sup>ハ</sup>二  
三條相糾結ノ恰<sup>ニ</sup>鉗<sup>ヲ</sup>以<sup>テ</sup>紕<sup>ニ</sup>成スル者ノ如其色黒<sup>ク</sup>ノ火  
燉スルガ如<sup>キ</sup>者アリ亦奇ナラズヤ今其崖略ヲ摸シテ



頸腫 甲圖



乙圖





博雅ノ君子ノ考證ニ備ト云

治義膜喉焮衝新法略說纂要

和蘭紐英浮乙思著  
千八百十年録備中

緒方公裁譯、〇慶儒曰、咽喉焮衝、肺癰、義膜、喉焮衝、格

密而樂兒、胸窄病、窒息、聖、於、俯、堅、白、異、同、シ、聚、談、未、格

祿鳥布等ノ病名アリテ其說堅白異同シ聚談未格

喉風、鍼灸、聚英ノ走馬喉等ト其證略相類似ス而

馬脾風ノ如キ亦其類ナリ畢竟皆急劇ノ病ニメ

之カ為ニ命ヲ喪者、少カラス余カ目撃スル所ヲ

以テスルニ吾邦ニ在義膜焮衝ニ充ベキノ病ハ凡

大人小兒ヲ問ズ一ニ日、微寒熱咳嗽、喉痛シ氣息

寒澁窒塞ノ倏然トノ斃ル者、コレニ近其類證ハ

之ヲ治メ問、效アレトモ其眞證若病困篤ノ者ノ如キ

ハ手ヲ束子死ヲ俟外、別ニ技倆アルナシ、況ヤ小兒

ハ之ニ罹リ尤モ多ク、口ニ其病ヲ述ラシ能ザルカ

故ニ父母保傳モ其微恙アルヲ知ラス、醫ヲ延ニ及

己ニ救藥ス可カラザル者少カラス、豈弘濟君子ノ深

慮遠謀メ尅治ノ方法ヲ講究ス可キノ尤モナル者ニ



非<sup>ズ</sup>ヤ又<sup>レ</sup>按<sup>ニ</sup>此<sup>レ</sup>氏<sup>ノ</sup>原<sup>ノ</sup>病<sup>ノ</sup>解<sup>ノ</sup>剖<sup>ノ</sup>篇<sup>ニ</sup>云<sup>ク</sup>滑<sup>ノ</sup>液<sup>ノ</sup>膜<sup>ノ</sup>炊<sup>ノ</sup>衝<sup>ノ</sup>ス  
レ<sup>バ</sup>多<sup>ク</sup>少<sup>ク</sup>糞<sup>ノ</sup>性<sup>ノ</sup>物<sup>ヲ</sup>分<sup>ル</sup>泌<sup>ス</sup>此<sup>ノ</sup>物<sup>ノ</sup>管<sup>ノ</sup>狀<sup>ノ</sup>器<sup>中</sup>ニ  
格<sup>ノ</sup>祿<sup>ノ</sup>烏<sup>ノ</sup>布<sup>ノ</sup>即<sup>チ</sup>糞<sup>ノ</sup>液<sup>ノ</sup>膜<sup>ノ</sup>的<sup>ノ</sup>咽<sup>ノ</sup>喉<sup>ノ</sup>炊<sup>ノ</sup>衝<sup>ノ</sup>如<sup>ク</sup>

這<sup>ノ</sup>新<sup>ノ</sup>法<sup>ハ</sup>華<sup>ノ</sup>母<sup>ノ</sup>勃<sup>ノ</sup>尔<sup>ノ</sup>觚<sup>ノ</sup>名<sup>ノ</sup>地<sup>ノ</sup>醫<sup>ノ</sup>微<sup>ノ</sup>漢<sup>ノ</sup>獨<sup>ノ</sup>ノ發<sup>ノ</sup>明<sup>ノ</sup>スル<sup>ノ</sup>所

ニ<sup>シテ</sup>余<sup>ノ</sup>之<sup>ヲ</sup>試<sup>ミ</sup>テ效<sup>ヲ</sup>收<sup>ル</sup>ル<sup>ノ</sup>多<sup>ク</sup>學<sup>ノ</sup>者<sup>能</sup>是<sup>ニ</sup>由<sup>テ</sup>此<sup>ノ</sup>病

ヲ<sup>シテ</sup>治<sup>ス</sup>ル<sup>ノ</sup>余<sup>ガ</sup>如<sup>キ</sup>者<sup>ア</sup>ラ<sup>バ</sup>余<sup>ガ</sup>歡<sup>喜</sup>何<sup>カ</sup>之<sup>ニ</sup>若<sup>シ</sup>

今<sup>先</sup>微<sup>氏</sup>ノ說<sup>ヲ</sup>譯<sup>抄</sup>シ<sup>テ</sup>次<sup>ニ</sup>余<sup>ガ</sup>經<sup>驗</sup>ヲ<sup>附</sup>ス

微<sup>氏</sup>曰<sup>ク</sup>今<sup>余</sup>ノ發<sup>明</sup>スル<sup>ノ</sup>所<sup>ノ</sup>新<sup>ノ</sup>療<sup>ノ</sup>法<sup>ヲ</sup>說<sup>テ</sup>遍<sup>ニ</sup>同<sup>ノ</sup>好<sup>ニ</sup>

頒<sup>ニ</sup>ハ<sup>シ</sup>先<sup>ニ</sup>其<sup>ノ</sup>一<sup>ヲ</sup>難<sup>ク</sup>證<sup>ス</sup>ヲ<sup>舉</sup>テ<sup>其</sup>說<sup>ノ</sup>來<sup>ノ</sup>歷<sup>ヲ</sup>述<sup>サル</sup>ヲ<sup>得</sup>

ズ<sup>ニ</sup>一<sup>ノ</sup>小<sup>ノ</sup>兒<sup>六</sup>歲<sup>天</sup>資<sup>素</sup>強<sup>固</sup>義<sup>膜</sup>喉<sup>炊</sup>衝<sup>ニ</sup>罹<sup>余</sup>其<sup>ノ</sup>炊<sup>衝</sup>

性<sup>ニ</sup>毫<sup>モ</sup>痙<sup>攣</sup>ヲ<sup>挾</sup>サル<sup>ヲ</sup>知<sup>リ</sup>亞<sup>烏</sup>天<sup>利</sup>多<sup>氏</sup>ノ<sup>法</sup>ニ



據一日夜ニ加羅默兒七十氏ヲ投ズ寸效ナシ他醫ヲ  
 延亦驗ナシ四日ニノ竟死ス是ニ於余愕然トノ大駭  
 戸ヲ閉客ヲ謝スルヲ數月遍古今ノ醫書名家ノ驗說  
 ヲ以己ノ經驗スル所ト參互考證スト雖其效求劑ニ  
 優者ナク其說亞烏天利多氏ヨリ精キハナシ然此  
 藥此說已六證ニ施用テ其二人ヲ起ス一能ズ更沈潛  
 スル際前ノ小兒屬續際ノ一景況自注其死セントスル前麝香一二氏ヲ  
 服セシム諸證暫シ静ニ呼吸易ク想起幸ニ一按ヲ得謂  
 氣管ノ粘液差稀釋スルニ似テ想起幸ニ一按ヲ得謂  
 古來義膜喉焮衝ノ單證ニ麝香等ノ衝動劑ヲ行ヲ見  
 スト雖之ヲ用粘液ノ分泌ヲ促氣管枝ノ攣急ヲ解頑



痰ヲノ略キ易カラ使スバ如何且麝香ヲ汞ニ配セハ汞倍  
 竄透メ速患處ニ達スルヲアランカ適扶キ欵ヘ蘭ラ土ド醫事  
 日記千八百九年六月ノ條下ニ載ニ證ヲ讀且宛獨多  
 實列紐思ダ二氏レ義膜喉焮衝ノ喘息ヲ兼ル證ニ汞麝香  
 ヲ投メ效アル治驗ヲ聽得タリ不日ニ又二病兒ヲ得  
 タリ其一人ハ四歳ノ男孩ニメ其一人ハ十二歳ノ女  
 子ナリ此劑ヲ施ニ俱大效ヲ收自注其女子ノ喉頭極テ疼痛ハ運行  
 面色褐赤盈脹シ脉大實ニノ刺絡ノ諸證悉備然ハ唯  
 加羅默兒麝香ヲ服セシノ頸胸ニ水銀軟膏ヲ搽上ス  
 ルノ服スルヲ三劑ニ及テ泡沫釋開ノ膠痰ヲ涌出シ  
 次濃狀ノ粘膠體ヲ吐咯シ八分時許ニノ窒息止ニ時  
 許ノ後困篤此ヨリ以還此病ニ嬰小兒十六人ヲ治ス  
 ノ諸證盡解



ルニ此法ヲ以テス未嘗一人ヲ悞ス此土ノ諸友モ亦此  
 說ヲ奉メ施試皆即效ヲ收此劑ハ兒ノ體質ニ隨加羅  
 默兒二三瓜若四五瓜ニ麝香半瓜自注多キモ一ヲ加調  
 勻シ半時毎ニ之ヲ與初ハ喉中喘鳴シ次口中痰沫ヲ  
 涌出シ終大粘痰ヲ吐咯スルニ至止此吐ハ散藥一劑  
 ヲ與ル後發スル一アリ然氏多ハ三劑ヲ服盡發ス其  
 粘痰ハ稠凝ニシテ白少シク乳汁膜狀ノ綠黃色ヲ帶其形  
 恰モ頓嗽ノ病末ニ吐スル物ト酷肖類シ且義膜喉炊衝  
 ノ死屍ノ氣管ニ膠塞スル頑痰ト異ナラズ此痰ヲ吐  
 スル一早者ハ治スル一愈速ニシテ散藥ヲ與一時若一



時半ニシテ效ナキ者少吐後、海蔥醋蜜、遠志、舍利別、精製  
硝沙、安質、沒扭酒、四味ノ舍利別ヲ取、每半時ニ茶匕、  
或五茶匕ヲ與、其吐略ヲ促、外部ニハ每半時ニ水銀軟  
膏ヲ頸、上胸、或腋下ニ摩擦シ、或ハリクカカカ度止按  
乘製劑未ダ詳ナラズヲ口内、舌下ニ搽、菲阿斯沙蜜、加蜜列ノ淹方  
ヲ以テ温浴ス、蟻針ハ十六症中一モ施ス、芫菁膏ハ之ヲ  
帖スルニ次ノ右件、證治ノ大略ニシテ其詳説ノ如キハ  
他日公布ス、應然ト雖心誠此説ヲ講究スル人アラバ  
治療ノ際ニ於テ未必小補ナクンバアラス、仰願今世ノ  
濟生家、斯新奇ノ方法ヲ舉用ノ天下ノ父母タル者ヲ



ノ夭殤ヲ哀<sub>レ</sub>テ免<sub>レ</sub>シメヨ

按<sub>レ</sub> 夏儒曰 義膜喉焮衝ハ我邦古來希有ノ病ニ

ノ經驗至<sub>テ</sub>少<sub>ク</sub>或<sub>ハ</sub>偶<sub>ニ</sub>患<sub>ル</sub>ル<sub>レ</sub>アルモ時日ヲ歴<sub>テ</sub>已<sub>ニ</sub>久<sub>ク</sub>ノ

危急ニ迫<sub>リ</sub>窒息<sub>シ</sub>聖<sub>ニ</sub>京<sub>ニ</sub>掘<sub>リ</sub>喘息等ト辨別<sub>シ</sub>難<sub>ク</sub>醫藥功ヲ

建<sub>ル</sub>能<sub>ハ</sub>ス此兒ノ父母其病ノ危峻タルヲ知<sub>ラ</sub>ズ唯輕

易<sub>ク</sub>感冒<sub>シ</sub>中<sub>ニ</sub>為<sub>テ</sub>其治ヲ加<sub>フ</sub>不<sub>レ</sub>醫<sub>テ</sub>又招<sub>ク</sub>常<sub>ニ</sub>晚<sub>キ</sub>ニ坐<sub>ス</sub>

膏<sub>ル</sub>眼<sub>ヲ</sub>明<sub>ク</sub>大<sub>ニ</sub>抑<sub>リ</sub>我邦古來此病ヲ以<sub>テ</sub>希有トスル所以

ハ醫輩果<sub>シ</sub>皆<sub>ク</sub>之<sub>ヲ</sub>悞<sub>リ</sub>認<sub>ル</sub>ル故<sub>ニ</sub>由<sub>ル</sub>カ然<sub>レ</sub>氏<sub>ニ</sub>三<sub>ノ</sub>醫<sub>人</sub>

時<sub>ニ</sub>或<sub>ハ</sub>見<sub>テ</sub>識<sub>得</sub>ザル<sub>ル</sub>ハ之<sub>ノ</sub>有<sub>ン</sub>古今ヲ通<sub>テ</sub>醫<sub>人</sub>ノ

數<sub>ニ</sub>億<sub>ノ</sub>ミナラズ而<sub>シ</sub>一人<sub>ノ</sub>此病<sub>ニ</sub>言<sub>及</sub>テ十<sub>キ</sub>寸



ハ此病他邦ニ比スレバ稀ナルヲ固疑ヲ容ズ然レ氏  
古人皆悞認テ知ラザリシカ將古今名ヲ異スルカ若  
古無クノ今初生ゼシカ未之ヲ明ルヲ能スレ雖氏  
微氏カ略説ヲ得ニ及初之ヲ見テ多ク又經驗ヲ奏ス  
ルヲ少カラザルハ亦一奇ナラズヤ其病性證候原  
由等ハ未一々詳舉スルヲ能ハレ氏妄自經驗スル  
所ヲ舉敢微氏ノ本説ニ附録ス詹々タル小言畢竟  
微氏ノ範圍ヲ出ズノ別ニ奇トス可無ト雖我邦モ  
亦此病少カラザルヲ證スルニ於或小補ナシトセ  
ズ若夫古昔此病ヲ悞認他病ニ混ゼシカ本實ニ之



無シカハ後賢ノ考定ヲ俟ノミ  
第一驗 某君ノ一女兒生テ四歲天資強健多血精神極活潑從來病所ナシ一二日來咳嗽ヲ得タリ然  
氏他證ナク食氣常ノ如家人皆意トセズ感冒ト為  
然咳嗽日ニ増痰沫ヲ吐セズ喉内疼痛ス但飲食故  
ノ如仍他症ナシ千八百十年三月廿一日ニ至咳滋  
甚ク胸中微悶ス然氏猶父ニ隨郊外ニ逍遙ス傍晚  
家ニ還後心意樂マズ食氣ナク大渴壯熱咳嗽離雞  
聲ニノ嘶啞シ胸悶倍加其夜諸證更劇二十二日味  
爽余力診ヲ請其煩悶甚ク兩頰極赤呼吸短促シ乾



咳聲啞ノ離雞聲ヲ為精神亂ス瞻視銳敏眼目不  
喉内痛<sub>凡</sub>嚙下妨十ク頭顱後ニ傾<sub>ナ</sub>脉數大ニノ強十  
ラズ發泡膏ヲ頸ニ帖シ遠志煎ニ安<sub>ナ</sub>質没<sub>ナ</sub>扭酒<sub>ナ</sub>亞刺  
比亞蘊摩漿海蔥醋蜜ヲ加<sub>テ</sub>之ヲ與<sub>午</sub>時ニ至<sub>テ</sub>諸證  
毫<sub>モ</sub>減ゼス呼吸不利短促シ肩胛腹肚為ニ動揺シ唇  
赤黒兩頰赤顔盈脹ノ汗淋漓ス急ニ刺絡ノ血七<sub>ク</sub>  
ヲ瀉シ每半時ニ加羅默兒ヲ與<sub>煎</sub>方ハ前ノ如<sub>別</sub>ニ  
乳汁ヲ水ニ調<sub>レ</sub>ノ飲料ト為<sub>西</sub>脾諸證倍進<sub>脉</sub>倍數<sub>再</sub>  
刺絡ノ血六<sub>ク</sub>ヲ瀉シ加羅默兒ノ分量ヲ増<sub>每</sub>半時  
ニ二<sub>瓜</sub>ヲ與<sub>煎</sub>方ヲ服セシム發泡膏ヲ帖スル



部腫起ス夜半大衰弱シ咳劇粘液氣管ニ壅塞シ氣  
息甚困悶喘鳴シ唇頰赤黒眼目凹陷メ滿面汗ヲ流  
脉太數ニメ數可ラズ然レニ猶能湯液ヲ服ス翼朝卯  
牌大渴引飲少間ニメ没ス

此證ハ病家余ヲ招テ甚晚故其初起ノ狀ヲ明ニス  
ル能ズト雖病家ノ言所ト余ガ自診スル所トヲ以テ  
參考スルニ義膜喉焮衝ノ諸證明備余蟻針ヲ喉ニ  
施ント欲遽ニ之ヲ得テ能ガルヲ以テ唯恨未水銀  
麝香ヲ用ルヲ知ガルヲ

第二驗 同年五月五日某氏急ニ來余ヲ邀曰小生



ノ男年紀四歲、平素薄弱、腺腫ヲ患ル<sub>レ</sub>已<sub>ニ</sub>久<sub>シ</sub>頃<sub>ニ</sub>劇<sub>ク</sub>感冒<sub>シ</sub>一<sub>ニ</sub>異<sub>ナ</sub>乾<sub>カ</sub>咳<sub>キ</sub>アリ喉内疼痛ス然<sub>レ</sub>モ嘔<sub>下</sub>ヲ妨<sub>ス</sub>遊嬉猶常ノ如<sub>シ</sub>昨日以還、心思樂マ<sub>ス</sub>氣息微短促<sub>シ</sub>今朝<sub>ニ</sub>至<sub>テ</sub>滋<sub>甚</sub>小<sub>ニ</sub>往<sub>テ</sub>診スル<sub>ニ</sub>其兒、薄中<sub>ニ</sub>卧<sub>テ</sub>脉疾數、呼吸甚短促、咳嗽劇<sub>ク</sub>ノ吼<sub>ガ</sub>如<sub>シ</sub>顔赤盈<sub>メ</sub>汗淋漓<sub>ス</sub>喉疼ハ此時微<sub>減</sub>ズ遠志煎<sub>ニ</sub>亞刺比亞<sub>ニ</sub>蘆<sub>ニ</sub>摩<sub>ニ</sub>漿<sub>ニ</sub>安<sub>ニ</sub>質<sub>ニ</sub>没<sub>ニ</sub>扭酒<sub>ヲ</sub>加<sub>ヘ</sub>與<sub>テ</sub>次日、諸證倍進、呼吸短促<sub>メ</sub>肩胛腹肚為<sub>シ</sub>一動揺<sub>シ</sub>大氣ヲ吸<sub>テ</sub>ニ力ヲ勞スル<sub>レ</sub>甚<sub>ク</sub>脉百六十動大渴、咳嗽離雜聲ヲ為<sub>シ</sub>病人指<sub>テ</sub>喉<sub>ニ</sub>刺<sub>テ</sub>頑痰ヲ擦<sub>取</sub>スル狀ヲ為<sub>シ</sub>語言微ナリト雖<sub>モ</sub>尚明了、發泡膏ヲ喉外



二帖シ前ノ煎汁ニ兼テ每半時ニ麝香一匁ヲ與テ七日  
 諸症倍峻惡氣息倍短促不利シ渾身為ニ動搖ス咳  
 劇ノ嘶啞シ唇赤黒面赤ノ青ヲ帶滿面ノ汗濺カ如  
 頭戰振ス乃テ微氏ノ經驗ニ據テ加羅默兒二匁麝香一  
 匁ヲ調メ散劑ト為テ每半時ニ之ヲ與テ遠志煎ハ行テ  
 故ノ如温布ヲ以其足ヲ包裹ス八日大輕快シ呼吸  
 猶不利スト雖頗易咳尚劇ト雖大滋潤ス面赤唇赤  
 黒共差減ス仍テ加羅默兒一匁麝香半匁ヲ調メ每半  
 時ニ與テ煎方前ニハ發泡ノ疵ヲ愈足ヲ裹温布ヲ止  
 九日益佳適呼吸微不利スト雖短促セズ咳嗽易シ



時々粘痰ヲ吐シ食氣差復ス昨日ヨリ今日ニ至ルマ  
 テ哺スル一二次此日尚散劑ヲ與一四次遠志煎ニ  
 幾那ヲ加十日咳大減ノ痰沫ヲ吐シ氣息安食機常  
 ニ復ス散藥ヲ停獨煎方ヲ與數日ニノ漸強壯ヲ為  
 十七日全愈

此證咳嗽叫ガ如ナラズノ吼ガ如ト雖是義膜喉焮

衝ノ眞證ニシテ密而樂兒胸窄病ニ非一明ナリ度儒

指氏云密而樂兒胸窄病ト義膜喉焮衝トノ別ハ一

ハ其病ノ經歷ヲ以テ之ヲ知密而樂兒胸窄病ハ其證

明ニ發歎アリ其歎一或一二日ノ久キニ至義膜喉焮

衝ハ歎一アルモ少減ズルノミニ彼カ如ク久カラ  
 スノ諸證却増糸連休息ナシ二ハ呼吸咳嗽ノ聲自  
 異ナリ密而樂兒病ハ咳ナク義膜喉焮衝ハ咳聲高



激ナリ其餘、義膜喉嗽衝ハ喉頭鈍痛ス胸窄病ハ之  
 無<sup>三</sup>ハ義膜喉嗽衝ハ流行シ密而樂兒病ハ此ニ反  
 ス<sup>四</sup>屍ヲ解<sup>ニ</sup>義膜喉嗽衝ハ氣管中ニ義膜<sup>多</sup>何者一  
 狀ノ體ヲ生ズ密而樂兒病ハ此狀ナシ云々  
 二ハ煩悶間斷ナク二ニハ咳スル毎ニ雞聲ヲ爲  
 テ氣管ニ物アルヲ徵<sup>三</sup>ニハ其發スル<sup>一</sup>胸窄病ノ  
 如ク急卒ナラズ其餘、微氏ノ方、大效アル寸ハ別ニ  
 憑照ヲ舉<sup>ル</sup>ヲ須<sup>ヒ</sup>ス

第三驗 上症ヲ療スル間、其父母余ニ向<sup>テ</sup>云、此兒ノ  
 妹、甫<sup>二</sup>歳、強健<sup>ニ</sup>ノ肥胖ス一二日來、感冒咳嗽スル  
 一上兒ノ如<sup>ク</sup>ト余徑診<sup>セント</sup>欲<sup>ス</sup>咸曰、今方ニ睡<sup>ニ</sup>就<sup>ル</sup>  
 繼來<sup>バ</sup>診ヲ請<sup>ニ</sup>ト因<sup>テ</sup>其證ヲ問<sup>ニ</sup>別ニ惡候アルヲ



説出<sup>キ</sup>ズ海蔥醋蜜ニ亞刺比亞蘧摩漿亞爾託舍利別  
ヲ加用<sup>フ</sup>可<sup>キ</sup>ヲ囑<sup>メ</sup>還<sup>ル</sup>其夜諸證大<sup>ニ</sup>峻篤<sup>ニ</sup>進<sup>ミ</sup>氣息短促  
吸氣尤<sup>モ</sup>難<sup>シ</sup>父母謂<sup>フ</sup>長子ノ證余危峻ト言<sup>ハ</sup>然<sup>レ</sup>在<sup>リ</sup>速<sup>ニ</sup>治  
スル寸ハ此兒モ亦甚<sup>ク</sup>意トス可<sup>キ</sup>者ナカラント坦然<sup>ニ</sup>  
余ガ到<sup>ル</sup>ヲ俟<sup>ツ</sup>往<sup>リ</sup>診スルニ呼吸短促既<sup>ニ</sup>甚<sup>ク</sup>面黃流汗面  
ニ蒙<sup>ル</sup>唇黯赭脉大數數可<sup>カ</sup>ラズ急ニ加羅默兒一瓜麝  
香半瓜ヲ調<sup>メ</sup>每半時ニ與<sup>フ</sup>遠志煎ニ安質没扭ヲ加  
服セ使<sup>シ</sup>可<sup>キ</sup>ヲ諭<sup>シ</sup>發泡膏ヲ胸ニ帖ス翼朝往<sup>リ</sup>診スレバ  
兒已<sup>ニ</sup>死ス驚<sup>テ</sup>故ヲ詢<sup>フ</sup>ニ父母病ノ重<sup>キ</sup>ヲ知<sup>ラ</sup>ス昨日ノ散  
藥一帖ヲ與<sup>ル</sup>ノミ其効ヲ奏スルナキハ宜<sup>シ</sup>哉



此證ハ果眞義膜喉焮衝ナルカ密而樂兒病カ窒息  
 聖京<sup>シキョウ</sup>倭<sup>グ</sup>度<sup>シ</sup>儒<sup>ニ</sup>按<sup>ニ</sup>名<sup>ク</sup>又<sup>ク</sup>カ肺傷冷毒カヲ詳<sup>カ</sup>ニセズト雖<sup>レ</sup>  
 父母ノ述<sup>ル</sup>所ト余ガ視<sup>ル</sup>所ヲ以<sup>テ</sup>考<sup>ル</sup>ニ第三驗ノ兒ト異  
 ナラズ故<sup>ニ</sup>其嶮逆ニ至<sup>ル</sup>ト急卒ト雖<sup>レ</sup>胸窄病ニ非<sup>ズ</sup>ト眞  
 義膜喉焮衝タル知<sup>ル</sup>ベシ凡<sup>ク</sup>此驗ヲ讀<sup>ム</sup>者小兒ノ病ハ  
 少<sup>シ</sup>ト救治ヲ怠<sup>ル</sup>可<sup>カ</sup>サルヲ知<sup>ル</sup>ヲ要ス若<sup>シ</sup>此症其治ヲ盡<sup>サ</sup>  
 バ或<sup>レ</sup>續命スル<sup>ル</sup>トアラシ  
 第四驗 余ガ女兒四歳強健多血性聰慧ニシテ顔色  
 鮮華ナリ初生ノ後時々咳嗽ヲ得<sup>ル</sup>然<sup>レ</sup>モ氣息短促セ  
 ス亦胸病無<sup>ク</sup>頃年咳減シ近日全<sup>ク</sup>止<sup>ル</sup>今年八月十六日



又咳嗽ヲ得、太劇カラズ、認<sup>テ</sup>感冒<sup>ト</sup>爲<sup>ス</sup>、カセヒキ十七日、余  
ト共、終日、外ニ逍遙シ、晚ニ家ニ返<sup>ル</sup>、夜中熟寐ス、咳寢  
加<sup>レ</sup>十八日、飲食常ノ如<sup>シ</sup>、咳嗽頻作<sup>ル</sup>ト、雖<sup>レ</sup>竟<sup>ニ</sup>日猶善遊嬉  
ス、申<sup>テ</sup>後<sup>ニ</sup>心思困重、眠ト欲<sup>ス</sup>、寒セズ、振慄ス、脉疾數、喉  
痛、咳間斷ナシ、終夜睡安カラズ、時々眠覺、十九日、熱  
留連ノ止ズ、咳聲嘶、嘔メ、喉痛大加<sup>レ</sup>然<sup>レ</sup>、ヒ嚥下妨<sup>テ</sup>十ク  
食氣喪<sup>レ</sup>、ヒ舌胎無<sup>シ</sup>、病時ニ少<sup>シ</sup>間減ス<sup>レ</sup>、ヒ善話ス、聲  
音明亮、十<sup>リ</sup>午後倍、煩惱シ、脉疾數、咳メ痛アリ、其響  
嘔、呼吸短促ス、昨來、苗香水ニ葛<sup>カ</sup>爾<sup>ル</sup>、ハ儒<sup>ノ</sup>別<sup>ニ</sup>、チ涅<sup>ノ</sup>實<sup>ク</sup>、ダ屈<sup>テ</sup>地<sup>ニ</sup>、ダ粵  
幾斯、亞刺比亞、蘧摩漿ヲ加<sup>レ</sup>、與<sup>テ</sup>今其方ヲ更<sup>テ</sup>、遠志煎ニ



亞刺比亞蘆摩漿、安質沒扭酒、亞爾託舍利別ヲ合シ  
與、咳更加甚、煩悶ヲ兼、咳聲嘎テ叫カ如、義膜喉焮衝  
ノ諸症悉備、是以每一時ニ加羅默兒一匁ヲ投ズ諸  
證倍危、咳聲ノ嘎者、今ハ則喉内ニ物ヲ挿狀ヲ見、氣  
息滋短促、肩胛腹肚皆之ガ為ニ動、顔赤盈滿、面汗出、  
脉百六十動、是ニ於テ加羅默兒ニ麝香半匁ヲ加、與居  
一頃ニメ未效ヲ見ズ、因テ其分量ヲ倍メ、與發泡膏ヲ  
喉ニ帖ス、翌朝卯半牌呼吸差易、咳甘テ喘鳴ト為、已  
メ漸輕、已時許ニ至、稀薄黃色膿樣ノ痰沫ヲ吐ス、吐  
後大安、咳ノ嘶嘎ト叫聲ト皆退、每一時ニ散劑一服



ヲ與、病輕易スルニ隨、分量ヲ減シ終、加羅默兒一、  
麝香半、瓜ヲ與、此日<sub>廿</sub>呼吸略自在ニ、咳嗽少、然、  
熱尚稽留ノ退カズ、不食、微渴、舌上ノ黃胎厚、昨夜ノ  
芫菁膏大泡起シ、喉痛太、減ズ、廿一日、諸證昨日ヨリ  
毛輕、咳少、雖尚止ズ、嘶、嘔ノ粘痰、氣管中ニ在、ヲ覺、  
不食、微渴ス、脉百三十、動時々遊嬉ス、此日ヨリ、廿五  
日ニ至、テ幾、那煎ニ遠志ヲ加、與、諸證太異ナラズ、  
咳又漸、乾枯シ、整夜不寐、發汗シ、脉仍、疾數、食機完喪、  
余謂、毒猶隱匿スト、此日<sub>廿五</sub>病狀又惡、喉中又痛、支  
體疼痛シ、咳多、熱熾、ナリ、傍晚、面俄ニ赤小疹ヲ發シ、



皮上ニ隆起スルガ如ナレ<sub>レ</sub>手<sub>ヲ</sub>摸スレバ<sub>テ</sub>否<sub>ク</sub>次<sub>ニ</sub>手足

鼻中ニ遍<sub>ル</sub>夜中不寐<sub>シ</sub>咳嗽<sub>シ</sub>大渴<sub>シ</sub>壯熱<sub>シ</sub>翼朝<sub>ニ</sub>及<sub>テ</sub>全身

ニ發ス此<sub>レ</sub>麻疹タル<sub>ニ</sub>疑<sub>ハ</sub>シ醫<sub>ニ</sub>侶<sub>ヲ</sub>歇<sub>セ</sub>舍<sub>リ</sub>林<sub>ニ</sub>偃<sub>テ</sub>延<sub>テ</sub>

ヲ議ス其<sub>レ</sub>按<sub>モ</sub>亦<sub>モ</sub>同<sub>シ</sub>煎<sub>方</sub>ニ民<sub>ニ</sub>埒<sub>ヲ</sub>列<sub>シ</sub>利<sub>シ</sub>精<sub>ヲ</sub>加<sub>シ</sub>與<sub>テ</sub>病<sub>日</sub>ニ

輕<sub>ク</sub>咳嗽<sub>シ</sub>脉<sub>ノ</sub>動<sub>ハ</sub>俱<sub>ニ</sub>減<sub>リ</sub>シ食<sub>機</sub>精<sub>力</sub>共<sub>ニ</sub>漸<sub>ク</sub>復<sub>シ</sub>八月三十日

全<sub>ク</sub>治<sub>ス</sub>

此<sub>レ</sub>證<sub>ノ</sub>初<sub>メ</sub>ヨリ尾<sub>ニ</sub>至<sub>マ</sub>テ躬<sub>自</sub>之<sub>ヲ</sub>驗<sub>シ</sub>眞<sub>ニ</sub>義<sub>ニ</sub>膜<sub>ノ</sub>喉<sub>ノ</sub>炊

衝<sub>タル</sub>ヲ決定<sub>ス</sub>然<sub>レ</sub>ニ諸<sub>ノ</sub>證<sub>ヲ</sub>減<sub>シ</sub>後<sub>ニ</sub>荏<sub>ニ</sub>苒<sub>ニ</sub>痊<sub>ザル</sub>所以<sub>ニ</sub>

ハ未<sub>ダ</sub>曉<sub>ラ</sub>ズ<sub>レ</sub>當<sub>トキ</sub>時<sub>ヲ</sub>謂<sub>フ</sub>熱<sub>ヲ</sub>解<sub>ス</sub>整<sub>ニ</sub>夜<sub>ニ</sub>汗<sub>ヲ</sub>出<sub>テ</sub>咳<sub>ハ</sub>嘔<sub>ハ</sub>病<sub>ノ</sub>毒

尚<sub>モ</sub>喉<sub>中</sub>ニ遺<sub>カ</sub>故<sub>ナリ</sub>ト而<sub>シテ</sub>繼<sub>テ</sub>發<sub>スル</sub>所<sub>ノ</sub>意<sub>ヲ</sub>外<sub>ニ</sub>出<sub>シ</sub>麻<sub>疹</sub>



ノ此病ニ於果原由タルカ續證タルカ未確知スル  
一能ズ

以上四證分テ之ヲ見バ固此病ヲ徵スルニ足ズ然レ  
微氏ノ說ヲ合觀セバ大見ニ足者アリ但從來此土

希有ノ病少間三月ヨリ八月ニ至ニノ四人ヲ得ハ豈奇ナラ

ズヤ意今春天氣久乾燥シ東風止無ハ實ニ其發因

ヲ為カ後ノ有志者詳質驗ノ明議定スルヲ冀ノミ

況此必死ノ病ニ加乘麁ヲ試テアラバ國家弘濟ノ

仁ヲ補ニ於其偉績ソレ如何ゾヤ

吸角治失血試驗

佛蘭悉斯貨墨陽漢勃禮達合著  
百病試驗說并治驗卷ノ二ニ出千



八百八十年刊  
ス、湊長昇譯、

古人吸角ヲ諸病ニ行、多ク未、其本効ヲ知ラズ、輒近ニ  
 至、テ尚其弊ヲ傳、テ間、頭痛胸痛ニ之、ヲ施、ト雖、當今  
 ニ至、學術開明シ、其切害歷々分明ニ、昔日ノ冗雜ナ  
 ルガ如、ニ非、就、裡失血諸病ニ殊効アルヲ稱、依、ト加、得  
 氏曰、月經過多ノ者ハ吸角ヲ乳房ニ施、大効アリ、ト余  
 其意義ノ深遠ナルヲ信、ノ遂、之、ヲ經驗スル、ト左ノ如  
 第一試、  
 薩樂華、勃辣古、ノ婦、人、年紀四十二歳、一年以還、  
 子宮脫血及白帶下ニ嬰、其證互、起伏往來ス、千七百七  
 十四年十二月三日、來治ヲ請、鵠栗、技、扭、謨、乳香ノ丸子、



越栗失爾赫篤立沃利玫瑰丁幾冷水ニ醋少許ヲ和ス  
ル灌宮方拔爾撒摩骨澤博撒爾末兒扶斯阿芙蓉諸劑  
石灰水等ヲ用テ寸效ナシ正月五日ノ夜又脫血スル  
二日六日午時許ニ兩乳房ニ吸角ヲ行テ各一箇其奇  
効比類ナク脫血夜ニ至便止其後三日ヲ歷テ復失血  
ヲ發セズ是ヨリ後又石灰水幾乃麴摩ヲ用テ併冷水浴  
ヲ行本月卅日二月七日復血少許ヲ漏然ニ遂ニ全治  
十四日醫院ヲ辭ノ家ニ返ル  
第二試 末爾瓦列多荅乙列兒十八歲三週來子宮失  
血ニ嬰腹背疼痛ス千七百七十六年正月三日玫瑰丁



幾阿芙蓉諸劑ヲ用テ効ナシ幾那ヲ與血止下二日夜十  
五日ニ至復發ス其日晡後兩乳房ニ角法ヲ行其夜便  
止後二日ノ間ハ之ヲ行一日ニ二次脱血治スレ腹痛  
痛依然トメ止時ナク時々少發熱ス廿八日勞動ノ復  
脱血ヲ生ズ吸角ヲ兩乳房ニ行半時ヲ經便止幾乃護  
摩ヲ與十日日二次三十一日全愈テ病院ヲ去  
第三試 麻立穩亜當孫三十六歲初熱病ヲ得醫院ニ  
歸ス其病已解月經ヲ得ル後第十四日正月廿日ニ方  
子宮脱血ニ罹玫瑰丁幾阿芙蓉諸劑消石等皆寸効ナ  
シ腹上ノ冷罨僅少効アルノミ第十五日兩乳房ニ角



法ヲ行<sub>レ</sub>失血便減ズ翼日又之ヲ行<sub>レ</sub>午後全<sub>ク</sub>止再發セズ  
但<sub>タ</sub>腹痛ハ尚治セザル<sub>一</sub>數日

此<sub>ニ</sub>由<sub>テ</sub>之<sub>レ</sub>ヲ觀<sub>バ</sub>子宮失血ニ吸角ヲ乳房ニ行<sub>テ</sub>速効ア  
ル有カ<sub>レ</sub>止血藥ニ減セザル<sub>一</sub>知<sub>ル</sub>可<sub>レ</sub>凡<sub>ク</sub>脫血ハ産婦ノ  
常患ニ<sub>シ</sub>死ニ至<sub>ル</sub>者太多<sub>ク</sub>故<sub>ニ</sub>此證ニ遇<sub>ハ</sub>速<sub>ニ</sub>此法ヲ行<sub>レ</sub>ヲ  
要ス決<sub>シテ</sub>忽<sub>ニ</sub>ス可<sub>ク</sub>ズ然<sub>ル</sub>所以<sub>ノ</sub>者ハ此法ハ雷<sub>ニ</sub>其病ヲ治  
メ大驗アル<sub>ノ</sub>ミナラス其即効踵<sub>ヲ</sub>企<sub>テ</sub>候<sub>ベ</sub>キヲ以<sub>テ</sub>  
ナリ以上ノ諸證ニ角法ヲ行<sub>ハ</sub>大約八分時ニ<sub>シ</sub>止<sub>ム</sub>ヲ  
要ス方今醫家之<sub>レ</sub>ヲ帖スト雖<sub>モ</sub>其時刻ヲ久<sub>ク</sub>フセザルハ  
別<sub>ニ</sub>道理アル<sub>ニ</sub>非<sub>ズ</sub>唯便宜ニ從<sub>ラ</sub>ノ<sub>レ</sub>夫子宮ト乳房ト



新西醫醫學講義  
卷之三  
三十一  
經絡感應論

ハ著キ連累アツテ互相感應スルノ其經驗極多復疑  
可者ナシ然レ其然所以ハ或小腹動脈ト乳房トノ脉  
管相聯絡スルニ在トスル者アリ或神經相累感スル  
ニ由ト為者アリ或天道ノ生物ヲ保育スル洪徳ニ歸  
スル者アレレ其得失未知可ラズ之ヲ要スルニ迂濶ノ  
空論ニメ日用ニ參驗スルノ親切ナルニ如<sup>方</sup>ズ又此法  
他人ノ失血ニ施<sup>タ</sup>亦<sup>タ</sup>効ヲ奏ス  
第四試 耶<sup>ヤ</sup>涅<sup>ネ</sup>多<sup>ト</sup>勃<sup>ボ</sup>倫<sup>リン</sup>二十一歳多病ニメ吐血ニ嬰<sup>レ</sup>諸  
藥效ヲ奏セズ三月十六日余ガ治ヲ請<sup>リ</sup>日ニ二次吸角  
一箇ヲ胃部ニ貼スルノ半時許ニ三日ニメ吐血止<sup>ル</sup>其



後再吐スレ<sub>レ</sub>凡其量至<sub>テ</sub>少<sub>シ</sub>  
余又胃化乖戾ニ原尋常ノ嘔吐病モ亦吸角ヲ行<sub>テ</sub>屢<sub>ニ</sub>  
効ヲ收<sub>ム</sub>之<sub>レ</sub>ヲ要スルニ此法ハ大功カアツテ大尋常思<sub>ハ</sub>  
議ノ外ニ出<sub>ル</sub>者タリ

泰西名醫彙講卷之三



夫西... 醫... 詩...  
 精人... 二... 道... 德...  
 醫... 藥... 性... 寒... 熱...  
 性... 寒... 熱... 燥... 濕...  
 對... 如... 水... 火... 其... 量... 虛... 火...



三都

八戸日本橋通二丁目

須原屋茂兵衛

同 日本橋通二丁目

山城屋佐兵衛

同 芝神明前

岡田屋嘉七

同

和泉屋吉兵衛

同 淺草茅町二丁目

須原屋伊八

同 横山町三丁目

和泉屋金右衛門

京都寺町通松原下町

勝村治右衛門

尾州名古屋本町七丁目

小樂屋東四郎

大坂心齋橋通安富寺町

秋田屋太右衛門

書物

問屋



