


卷三

吉慶堂





癸卯

金蓮吉園父詩

卷一

癸卯年

壬辰

金蓮吉園父詩

卷二

壬辰年

壬辰年  
金蓮吉園父詩

名子不月

BGA2056

V.2

濟陰綱目卷之二

吳興

金德生閻鳳父輯著

金斗

張孫振公武父訂正

濟陰綱目卷之二

吳興 金德生聞風父輯著 金平 張孫振公武父訂正

西陵 江 洪澹漪子笑禪 一都 查 望于周父叅閱

○經閉

瀉心火養脾血。是從本文之義。愚謂當原隱曲推解。

益人有隱情

其衷者則氣

鬱而不暢則

心氣不開。脾

氣不化水穀

見氣血以入

二陽之血海

所以不月也

傳爲風消者

陽明主肌肉

○論經閉由二陽之病治宜瀉心火養脾血

潔古曰。女子月事不來者。先瀉心火血自下也。內經曰。二陽之病

發。心脾有不得隱曲。故女子不月。其傳爲風消。王啓玄註曰。大腸

胃熱也。心脾受之。心主血。心病則血不流。脾主味。脾病則味不化

見氣血以入。味不化。則經不足。故其病。則不能隱曲。脾土已虧。則風邪勝而氣

矣。血海無餘。愈消也。又經曰。月事不來者。胞脉閉也。胞脉屬於心絡於胞中。今

所以不月也。

氣上迫肺。心氣不得下通。故月事不來。先服降心火之劑。後服局

血不足則肌  
肉不榮其不

消瘦平風之

名火之化也

故當根不得  
隱曲上看乃

有本宜方固有法

然不必太沉  
因人易輒可

方中五補丸後以衛生湯治脾養血也。

○論經閉不行有三治宜補血瀉火。

東垣曰。經閉不行有三。婦人脾胃久虛。形體羸弱。氣血俱衰。而致經水斷絕不行。或病中消胃熟善食。漸瘦。津液不生。夫經者。血脉津液所化。津液既絕。爲熱所燥。肌肉漸瘦。時見渴燥。血海枯竭。病名曰血枯。經絕宜瀉胃之燥熱。補益氣血。經自行矣。此病或經適據此論。當有四證。如胃熱。包絡熱。心熱。任脈熱結也。或心包絡脉洪數。躁作時見。大便秘澀。小便雖清不利。而經水閉絕不行。此乃血海乾枯。宜調血脉。除包絡中火邪。而經自行矣。此下焦胞脈熱結也。或因勞言脾胃久虛。血是矣。而所致經水斷絕。今氣上迫肺。心氣不得下通。故月事不來。宜安心補血瀉火。經自一症。又當以。

致絕水陽也。今氣上逆肺心氣不得下通故月事不來宜安心補血瀉火經自

補脾胃爲主  
一症又當以

行矣。肺熱結也。

此上焦心

論耶。益水入於經其血乃生穀入於胃

脈道乃行水去榮散穀消衛亡況脾統諸經之血而以久虛之脾

胃以致氣血俱衰者可不

爲之補益乎

卽此以分虛

實明是四證

善乃遺補虛

一證何歟

此病机也宜

知

駱氏曰右東垣潔古治血枯之法皆主於補血瀉火也補血者四

物之類瀉火者東垣分上中下故火在中則善食消渴治以調胃

承氣之類火在下則大小便秘滯治以玉燭之類玉燭者四物與

調胃承氣等分也火在上則得於勞心治以芩連及三和之類三

和者四物涼膈等分也潔古先服降心火之劑者蓋亦芩連三和

玉燭之類後服五補衛生者亦補氣之劑也

○論經閉因肝勞血傷

駱氏曰經云有病胸脇肢漏妨於食病至則先聞腥臊臭出清液先唾血四肢清目眩時時前後血病名曰血枯此年少時因大脫血或醉而入房虧損腎肝蓋肝藏血受天一之氣以爲榮其經

胸脇滿證入  
皆伐肝豈知  
血枯之故宣  
養肝血也當  
願識此

上貫膈布脇肋。若脫血失精。肝氣已傷。肝血枯酒不榮。而胸脇滿妨於食。則肝病傳脾。而聞腥臊臭出清液。若以肝病而肺乘之。則嘔血。四肢清。目眩。時前後血出。皆肝血傷之症也。

○論經閉因勞當大補脾胃。

既分肝脾當  
分兩治

良方云。婦人月水不通。或因醉飽入房。或因勞役過度。或因吐血失血。傷損肝脾。但滋其化源。其經自通。若小便不利。若頭眩痛。腰皆作痛。足寒時痛。久而血結於內。變爲癥瘕。若血水相併。脾胃虛弱。壅滯不通。變爲水腫。若脾氣衰弱。不能制水。漸漬肌肉。變爲腫癧。當益其津液。大補脾胃。方可保生。王節齋曰。婦人女子經脈不行。多有脾胃損傷而致者。不可便認作經閉。丸血輕用。通經破血之藥。遇有此證。便須審其脾胃。如何。若因飲食勞倦。損傷脾胃。少

是但有肝氣  
鬱滯以致脾  
土失運不能  
化血。首又須  
和肝氣爲要。  
醫者知之。

食惡食泄瀉疼痛或因誤服汗下攻剋藥傷其中氣以致血少而  
不行者只宜補養脾胃用白朮爲君茯苓芍藥爲臣佐以黃芪甘  
草陳皮麥芽川芎當歸柴胡等分脾胃藥能生血而經自行矣。又  
有飲食積滯致損脾胃者亦宜消積補脾若脾胃無病果有血塊

### 凝結方宜行血通經

○論室女經閉成勞因思慮傷心

寇宗奭曰夫人之生以氣血爲本。人之病未有不先傷其血氣者。  
若室女童男積想在心思慮過度多致勞損。男子則神色消散女  
子則月水先閉。蓋憂愁思慮則傷心而血逆竭神色先散。月水先  
閉且心病則不能養脾故不嗜食。脾虛則金虧故發喉腎水絕則  
木氣不榮而四肢乾瘦故多怒鬚髮雀筋骨瘦若五臟傳遍則死。

此用青蒿者  
亦不妨以其  
清氣中熱也  
暗室一炬

自能改易心志。用藥扶持庶可保生。切不可用青蒿、更蟲等涼血  
行血。宜用柏子仁丸。澤蘭湯益陰血制虛火。

亦須兼脾益  
胃陽脾陰主  
治有異也

薛氏曰。經云。五穀入於胃。其糟粕津液宗氣分爲三隧。故宗氣積  
於胸中。出於喉嚨。以貫心肺而行呼吸。榮氣者。泌其津液。注之於  
脈。化以爲血。以榮四肢。內養五臟六腑。若服苦寒之劑。復傷胃氣。  
必致不起。

一室女年十七。病久不愈。天癸未通。發熱咳嗽。飲食少思。欲用通  
經丸。余曰。此蓋因稟氣不足。陰血未克。故耳。但養氣血。益津液。其  
經自行。彼或於速効。仍用之。余曰。非其治也。此乃剽悍之劑。大助  
陽火。陰血得之。則妄行脾胃。得之。則愈虛。後果經血妄行。飲食愈  
少。遂致不救。

脉經云。有一婦。胎一女子。年十五時來。語言女子年十四時經水  
自下。今經反斷。其母言。恐怖。師曰。若是夫。人年十四

既存避年之名不必强求

脉經云有一婦將一女子年十五時來診言女子年十四時經水自下今經反斷其母言恐怖師曰若是夫人親女必夫人年十四時亦以經水下所以斷此爲避年勿怪後當自下此真氣猶怯稟賦素弱而然也宜固天元真氣使水升火降則五臟自和而經脉通矣

○論經閉因積冷結氣

要略曰婦人之病因虛積冷結氣爲證經水斷絕至有歷年血寒積結胞門寒傷經絡凝堅在上嘔吐涎唾仄成肺癆形體損分在中盤結縛脣寒疝或兩脇疼痛與臟相連或結熱中病在關元脉數無滯肌若魚鱗時着男子非止女身在下未多經候不匀令陰掣痛小腹惡寒或引腰脊下根氣衝急痛膝脣疼痛奄忽眩

暉

據此吐法能

李子知者則

可在他人則

不可用吐固  
是方法。然而  
体虛者不宜。

暉狀是厥顛。或者憂慘。悲傷多嗔。此皆帶下。非有鬼神。久則羸瘦。  
脉虛多寒。三十六病于變萬端。審脈陰陽虛實繁弦。行其鍼藥。治  
危得安。其雖同病。脉各異源。子當辯訖。勿謂不然。

○論經閉因痰飲所隔

張子和云。凡婦人月事不來。用芩調散吐之。次用玉燭散。芎歸湯。  
三和湯。桂苓白朮散之類。降心火。益腎水。開胃進食。分陰陽。利水  
道之藥也。

一婦人月事不行。寒熱往來。口乾煩赤。飲食少。且暮間欬二二聲。  
諸醫皆用草蟲水蛭。乾漆。硇砂。芫青。紅娘子。沒藥。血竭之類。惟戴  
人不然。曰。古方雖有此法。奈病人服之。必脅腹發痛。飲食不進。乃  
命止藥。飲食少進。內經曰。一陽之病發心脾。心受之。則血不流。故

惟有瘀者可  
用亦須形病

俱實

女子不月既心受積熱宜抑火升水流濕潤燥開胃誘食乃涌出  
痰二二升下泄水五六行濕水上上下皆去血氣自然滑流月事不

爲水濕所隔自依期而至矣亦不用苦蟲水蛭之類有毒之藥如  
用之則月經總來小溲反閉他證生矣凡精血不足宜補之以食  
大忌有毒之藥偏勝而致天闕多矣

一婦人年二十四歲經水不行寒熱往來面色瘡黃唇焦煩赤時  
咳三三聲間其所服之藥黑神散烏金丸四物湯燒肝散驚用散

形盛氣虛病  
真藥當然非  
輕試之法慎  
之

建中湯寧肺散鐵艾千百轉劇家人意倦不欲求治戴人憫之先  
涌痰五六升午前涌畢午後進食餘證悉除後二日復輕涌之又  
去痰一二升食益進不數日又下通經散渴訖二二升數日去瘀  
皮數重小者如麪片大者如葦膜不月餘經水自行神氣大康矣

○論下利經斷利止經來

脉經曰。婦人下利而經水反斷者何也。師曰。但當止利。經當自下。勿恆所以利不止而經斷者。但下利亡津液故經斷。利止津液復經當自下。若婦人血下咽乾而不渴。其經必斷。此榮不足本自有微寒。故不引飲渴而引飲者。津液得通。榮衛自和。其經必復下。

○論經閉總因血滯血枯

李氏曰。婦人以血爲主。天眞氣降。壬癸水合腎氣全盛。血脈流行。當以三旬一見。以象月盈則虛。故曰月經。經行與產後一般。若其時餘血一點未淨。或外被風寒及濕冷暑熱邪氣。或內傷生冷。七情鬱結。爲瘀。爲癥。凝積於中。曰血滯。或經止後用力太過。入房太甚。及服食燥熱以致火動。邪氣盛而津液衰。曰血枯。

嘔

驚則氣亂  
錯經妄行  
怒則氣逆上  
冲甚則嘔血

總結

良方云。經後被驚。則血氣錯亂妄行。逆於上。則從口鼻而出。逆於身。則血水相搏。變爲水腫。恚怒。則氣血逆於腰腿心腹背腸。手足之間。重症。經行則發。過期則止。怒極傷肝。則有眩暉。嘔血。瘍瘍。血風瘡瘍等病。加之經血滲漏於其間。遂成瘀血。生瘡。淋瀝不斷。濕熱相搏。遂爲崩帶。血結於內。變爲癰瘕。凡此變證百出。不過而滯與枯而已。但血滯亦有虛熱。血枯亦有虛熱。故重則經閉不通。以滯枯分言。輕則經水不調。止言虛與熱而已。○血滯經閉宜破者。原因飲食毒熱。或暴怒凝瘀積痰。直須大黃乾漆之類。推陳致新。俾舊血消而新血生也。若氣旺血枯。起於勞役憂思。却宜溫和滋補。或兼有痰火濕熱。尤宜清涼之藥。每以肉桂爲佐者。熱則血行也。但不可純用峻藥。以虧陰道。至於耗氣益血之說。雖女相要法。

以用藏血肺  
主氣也

但血爲氣配。氣熱則熱。氣寒則寒。氣升則升。氣降則降。氣行則行。氣滯則滯。如果鬱火氣盛於血者。方可單用香附丸散。抑氣散當加木香、檳榔、枳殼。以開鬱行氣。若氣亂則調。氣冷則溫。氣虛則補。男女一般。陽生則陰自長。氣衰則血亦涸。豈可專耗其氣耶。論者多泥。叔和血旺氣衰。不知叔和論肝肺二脉。則宜肝旺於肺。其實氣血平和有孕。故繼曰。兩臟通和。但婦人見偏性。鄙婢妾志不得伸。鬱怒無時不起。故香附爲女人仙藥。經曰。邪氣勝則實。正氣奪則虛。可不悟。諸大槩只虛熱痰氣四證而已。不調亦大相同。隨證調治。飲食調和。自然血氣流通。更有凝滯。然後可用紅花當歸散。紫葳散。通經丸。導經丸之類。虛者只用當歸散。以通之。通後又須養血益陰。使津液流通。苟不務氣血克和。而惟以毒藥攻逼。是求

于金於乞丐必死而後已

○論經閉大法

生血在補脾  
胃調飲食適  
寒溫所謂脾  
旺則能生血  
也至於心氣  
結者宜調心  
又爲心主血  
也

丹溪云。經不通。或因墮胎及多產傷血。或因久發盜汗耗血。或因脾胃不和。飲食少進。而不生血。或因癆疾失血。治宜生血補血。除熱調和之劑隨證用之。或因七情傷心。心氣停結。故血閉而不行。宜調心氣通心經。使血生而經自行矣。

○脉法

脉經曰。腎脈微濁爲不月。經閉脉法備前  
調經閉當參看

○治血枯經閉

玉燭散。治胃熱消渴。減食漸瘦。津液爲熱燥竭。以致血海乾枯。

此卽四物湯與調  
胃承氣湯合方也。

惟心病氣實  
胃鬱者方可

當歸 川芎 白芍藥 地黃 大黃 芒硝 甘草各等分

右剉每服八錢水煎食前服

此治勞心之  
實熱者也如  
心虛而熱收

於內與夫心

虛而上衰者

散合  
方也

當歸 川芎 白芍藥 地黃 大黃 朴硝 黃芩  
梔子 連翹 薄荷 甘草各等分

右剉每服八錢水煎服

二黃散 治婦人室女經脈不通服之如神

大黃燒存性二錢 生地黃三錢

右爲末作一服空心好酒調下

二氣丸 治月水不調斷絕不產面黃肌瘦憔悴不思食有燥熱

以柴胡四兩另爲末醋子當歸

白芍藥各二兩

在爲末作一服，心好酒調下。

治月水不調，絕不產，面黑肌瘦，不思食，有胎熱。

以醋熬大黃

作膏引之人

肝以行血也

四方俱用大

黃而配合不

離四物自有

輕重緩急不

同宜加詳之

心胞是多血

之經此胞脈

當指心胞而

言。

熟地以補天

一之水入參

以生天之一

无所谓水生

於氣也，然氣

不降則水不

以柴胡引子相參服之。

大黃四兩另爲末，醋一升慢火熬爲膏子

當归 白芍藥各二兩

右爲末，以膏子和丸，如桐子大。每服二十九，淡醋湯下。食前服，日進三服。

五補丸 補諸虛，安五臟，堅骨髓，養精神。凡胞脈閉，先服降心火之劑，後服此丸，及衛生湯，以治肝養血也。

熟地黃 人參 牛膝酒浸去盧焙乾白茯苓 地骨皮各等分

右爲細末，煉蜜丸，如桐子大。每服三五十丸，空心溫酒下。

衛生湯

當歸 白芍藥各二兩 黃芪 三兩 甘草 一兩

右爲末，每服半兩，水二盞煎至一盞，空心溫服。○如虛者，加入

生故用白朮  
芩以降天氣

地膚皮以清  
氣中之火牛

膝引之下行

此立方之大  
意也

五補丸補水  
之源衛生湯  
行已生之血

益地黃秋葵

人參俱補裏  
氣之不足而  
黃芪甘草又  
益表氣之不

足當歸芍藥  
行肝血之不

足言先後天  
之意焉

天血生於心

## 參一兩

潔古先服降心火之劑者。蓋亦冬連、三和、玉燭之類。後服五補衛生者，亦補氣之劑也。

柏子仁丸。治血虛有火。月經耗損漸至不適。日漸羸瘦。而生潮熱。並治室女思慮成勞。經閉。慎勿以毒藥通之。宜此兼服澤蘭湯。

柏子仁炒另研牛膝酒洗卷柏各半 澤蘭葉 繢斷各二兩

熟地黃三兩石研內隔成膏酒浸半日

右爲細末。煉密丸如桐子大。空心水飲下三十丸。

澤蘭湯。治證同前。妙在澤蘭爲君。

澤蘭葉三兩 當歸酒洗芍藥炒各一兩甘草五錢

足言先後天

陽

雙子七指利尿不一二兩當歸酒洗荷葉炒各甘草五錢

心火旺則津枯  
而血不化故用

柏子仁以潤心  
而生津火位之

下水氣承之故  
用熟地黃以滋

水其四種皆通  
血脉而續絕者

也若胃寒而色  
不華者去生

地花粉有虛  
火者宜如

右爲粗末每服五錢水二盞煎一盞溫服  
加味補中益氣湯 治飲食勞倦損傷脾胃氣弱体倦發熱作渴  
飲食減少而不生血者

黃芪 人參 甘草炙白朮 當歸 陳皮各一錢 升麻  
柴胡各一 生地黃 天花粉各八分

右剉作一服水煎服

十全大補湯 治墮胎及多產育傷血或誤服汗下尅伐之藥以致血衰氣乏而經不行者

人参 白朮 白茯苓 甘草炙 當歸 川芎 白芍藥

熟地黃 黃芪 內桂各二錢

右作一服水煎服

此方溫補氣血爲主所謂  
勞者溫之損者溫之是也

已上十一方  
重在血枯一

凡通經消塊  
字

但用破氣劑  
堅大熱大毒

之瘤而此方  
但以行氣調

氣血用散結  
氣緩下元之

藥等分而取  
以山梔涼藥

聞能治三年  
塊中之火未

但

也在善用之  
此溫行之劑  
之塊而通經

養置湯 治婦人經閉不通。臍下有塊。已經三載。百藥無效。服此數劑經行。又投數劑而塊消矣。

當歸酒洗 川芎 白芍藥酒炒 熟地黃薑炒 白茯苓 陳皮  
梔子炒 山茱萸去核 益母草 小茴香酒香附子 藿浸炒  
右剉每服一兩水煎服。五六劑後經通作丸。  
○治血凝經閉  
溫經湯。治經道不行。繞臍寒疝痛徹。其脈沉緊。此由寒氣客於血室。血凝不行。爲氣所衝。新血與故血相搏。所以作痛。宜此湯與桂枝桃仁湯。

牛膝各一錢  
當歸 川芎 苓藥 官桂 牡丹皮 蓬木各一錢  
甘草 炙五分

耳八參得官桂

桂枝桃仁湯 治證同前

右以火加水一盞煎至一盞。不拘時服

也。在善用之。

牛膝

一

甘草

五分

桂枝

一

牡丹皮

一

蓬木

一

川芎

一

地黃恐凝滯  
也。以四物去。

耳、八參得官

桂則能溫行

故加之。然諸

痛忌參术亦

有不必用者。

在人取之有

法焉。

此皆破血之

藥。然不用川

芎以行血海

之血而用白

芷以行陽明

之經者。以血

海隸乎陽明

也。

此與前方不  
相遠。而青皮

右咬咀水一鍾煎至一鍾。不拘時服。  
**桂枝桃仁湯**。治證同前。

方見調經門。疼痛條。

**紅花當歸散**。治婦人經候不行。或積瘀血。腰腹疼痛。及室女月經不通。

**紅花**、**當歸尾**、**紫葳**、**牛膝**、**蘇木**細剉各二兩。  
**赤芍藥**、九**劉寄奴**、五**桂心**、**白芷**各一兩半。

右爲細末。空心熱酒調下三錢。食前臨臥再服。○若久血不行。

灑煎紅花酒下。孕婦勿服。一名凌霄花。卽紫葳。

**行經紅花湯**。治婦人室女經候不行。時作脹痛。

**當歸尾**、**赤芍藥**、**紫葳**、**劉寄奴**、**牛膝**、**玄胡索**

等。卷之二治血枯經閉方

十

桃仁乃厥陰  
肝經藥要分

別此義

總是破血行  
經藥而發熱

二字曾署之  
卽丹皮涼血

而官桂白芷

非溫熱之味

益重在不行  
而不重在熱也

觀酒洗酒浸酒前

之法然乎否  
乎

姜黃義木又

郎在氣在肝

之理

紅花

蘇木

桃仁

炒各一錢

青皮

香附各八分

桂心五分

右作一服水煎空心服。

凌花散 治婦人月水不行發熱腹痛。

當歸

赤芍藥

凌霄花

劉寄奴

牡丹皮

酒洗各一錢

玄胡索

酒洗各一錢

桂心五分

官桂

白芷

紅花

酒浸各等分

右咬咀每服四錢水一盞酒半盞煎服。

瑞金散 治婦人血氣撮痛月經不行。

片薑黃

四兩

當歸

赤芍藥

川芎

牡丹皮

蓬莪术

延胡索

官桂

紅花

各二兩

右咬咀每服八錢水一盞酒三分煎八分食前服。

土牛膝散 治婦人室女血閉不通五心煩熱。

土牛膝

當歸尾

桃仁酒

炒紅花

兩

水

每服一錢空心溫酒下

目標氣在肝  
之理

土牛膝散

右陰陽各一錢水酒分服

專主血閉

借此以治婦

人血塊作痛

有効

右爲細末。每服二錢。空心溫酒下。

土牛膝

當歸尾各一錢

桃仁去皮。紅花各半兩。炒熟炒

當歸散。治血脈不通。

當歸

穿山甲

炒各半兩

辰砂另研

麝香少許

右爲細末。研勻。每服二錢。食前熱酒調下。

琥珀散

治心膈迷悶。腹臟撮痛。氣急氣悶。月信不通等疾。

天台烏藥

二兩當歸

蓬木一兩。煨切各

右爲細末。每服二錢。溫酒調下。後以食壓之。忌生冷油膩。產後諸疾。炒薑酒調下。

桃奴飲子

治婦人室女月經不通。漸成脹滿。及治男子墜馬跌

撲損傷。以致瘀血停積。欲成血癆病者。悉皆治之。

沈眼滿根血

癰癧

頓濁陰之物  
以破海積之  
血佐溫熱之  
味以行停滿  
血氣益爲氣  
血流也

不用黃芩水  
蛙斑貓之類  
是重劑中之  
輕者最穩

桃奴 桃樹上嫩桃乾枯不假鼠糞卽雄鼠糞也落者冬月及正月收假鼠糞兩頭尖者是玄胡索五靈脂 肉桂 香附子 砂仁 桃仁 去皮尖另研各等分右爲細末每服三錢空心溫酒調下

萬病丸

治經事不來繞臍寒疝痛

乾漆

杵研炒烟盡須牛膝去苗酒浸一宿青自此如此一時牛膝焙乾各一兩

妙在以生地  
汁熬破血藥  
大有見解

右爲末以生地黃汁一升入二藥末銀器內慢火熬可丸卽丸如桐子大每服二丸空心米飲或酒下

已上諸方俱輕劑隨寒熱選用

通經丸 治經閉不通及血塊疼痛

歸尾 桃仁去皮大黃燶牡丹皮乾漆炒煙內桂

牛膝 茯苓各一三棱醋炒麝香分

五錢

分

是事屬中之  
輕者最穩

右爲末。皂角五錢。芫花二錢。水煎糊爲丸。如桐子大。每服五十

丸。米湯下。

產寶方。治月經不通。腹中痛。

水蛭須炒土  
分熟。蕎生則

害人也。

牛膝六分。大黃

桃仁去皮

各五分。川芎

當歸各四

分。尖炒細辛

各五分。米炒黃

水蛭

三分。米炒黃

右爲細末。煉蜜丸桐子大。每服二十九丸。空心溫酒下。

于金桃仁煎。

治血積癥瘕。月水不行。

大黃

溫紙裹煨

桃仁去皮

朴硝各二

分。尖炒朴硝兩

分。瓦蟲

一兩去足

翅炒黑

右爲細末。醋二升半。銀石器中慢火熬膏。却入大黃。瓦蟲。桃仁  
末。不住攬。度可丸却。八朴硝。再攬。良久出之。凡如桐子大。五更  
初溫酒下五丸。至日午取下。如赤豆汁。鷄肝。墨衣様。候鮮紅。

卷二  
住。仍以調氣藥補之。

按方廣云月

候不通有血

瀆者而枯者

此方用之於

血滯則可用

之於血上枯

是求于金於

乞正矣審之

鉅瘞皆便血

故用之以破

血若非血塊

不宜用。

血和通經丸。治婦人經水凝滯不行。腰背脣腹疼痛漸成血塊。

芍藥兩當歸

木香 肉桂 乾漆

炒盡

五靈脂 大黃

廣茂

煨谷半兩

水蛭錢半隻蟲頭足翅膀桃仁三十個去皮尖

二十七個湯浸去皮尖

右爲末。醋糊丸如桐子大。食前醋湯或酒下二十丸。

班猫通經丸。治經候閉塞亦治乾血氣。

班猫

二十個糯米炒

桃仁四十九個炒

大黃

錦紋者五錢

右爲細末。酒糊爲丸如桐子大。空心酒下五丸。甚者十九丸。○如血枯經閉者用四物湯送下。○一方加蛩蟲半錢水蛭一錢。

大黃膏一名將軍治婦人乾血氣。

川大黃四兩爲末。用釀醋熬成膏子丸如鷄頭大。每服一丸。

乾血氣者熱也。故用大黃。

一脉角熱通

川大黃四兩爲末。用鹽炒過研末。

治婦人乾血氣者。每服一錢。水煎服。

其加當歸頭。附子一錢。桂心一錢。

頭昏附者。

榮血一周氣

也。在人鼻擇

酒化開臨臥溫服。大便利二三行。紅脈自下。是調經之仙藥也。○一方加當歸頭。○一方加香附二兩。童便浸炒爲末。入膏丸桐子大。熱酒下四十九。

聖惠方

治婦人月水澁滯不快。結成瘕塊。脹大欲死。

單行益脈最  
穩固

馬條草根苗五觔剉細。水五斗煎至一斗去渣。別以淨器盛

熬成膏。食前溫酒調下半匙。

通經丸。治婦人室女月候不通。或成血瘕。

當歸 桂心 青皮 乾薑 炒川椒 炒出 川烏 炮蓬莪术

乾漆 炒烟 大黃 炮桃仁 去皮尖炒

此方類聚大  
熟之藥。非因  
寒凝氣滯血  
結成瘕者不  
可服。

右爲末。先將四分用米醋熬成膏。和餘六分成劑。白中杵丸如桐子大。暗乾每服二十九。用淡醋湯下。加至三十九。溫酒亦得。

空心食前服。○濟生方去川烏加紅花。

本草人參子清同丸  
畏漆入腸胃生瘡也。

○已上諸方俱重劑隨寒熱醫酌用。

○治痰結經閉。

丹溪方治積痰傷經不行夜則妄語。

瓜蔓子

一兩黃連半兩吳茱萸十粒桃仁五十枚紅曲二錢縮砂三兩

山楂末

一兩

據言屢驗大抵因胃氣實也

右爲末生薑汁研煑餅爲丸每服百丸空心淡白水下一方治月水不逕屢試有驗

形實氣盛  
皆宜之

厚朴不拘多少薑汁炙香細切濃則去渣空心服不過三四

此治胃實疾  
盛之藥非爲  
降心火也其

劑瘥。

通經止取四  
右加生薑固水煎服

加味導痰湯治軀脂經閉。

物湯中一味  
之最富者恩

氣上迫肺是

言心火上炎

迫金不降

而生水宣降

心火爲主或

壯水之主以

掌中金丸。治婦人乾血。

經云。氣上迫肺。則心氣不得下逆。故月事不來。今用蓮朴之類。  
導瘀降火。使不上迫於肺。故心氣下通。而月事來也。

穿山甲炮

甘草

苦丁香

川椒

苦葶苈

白附子

猪牙皂角

草烏頭各一錢

巴豆

二錢全用研

無傷孕

四豆大蟲丸

右爲細末。以生葱綫性。和丸彈子大。每用一丸。新綿包之。納陰

中。一曰卽白。二曰卽赤。三曰卽血神效。

磬石丸。治婦人經水閉不利。臟堅癖不止。中有乾血下白物。

磬石燒

杏仁一分

即審遺意

右二味未之煉蜜丸。棗核大內陰中。剝首再納之。

一粒仙丹。治婦人乾血勞並赤白帶下。種子如神。

巴豆

一百二十個去殼用新磚一個將豆紙包放磚上搗去油令淨如麵。白方好用。班猫去翅足六十個。

穿山甲

五錢油前過兩胡去

大黃

各一  
苦蘿蔔兩

皂角

粗皮火炮一兩

法固巧然必  
果有乾血者  
子宮者可用

右各爲末合一處。以棗煮去皮核。丸如彈子大。用綿繭張開。裹藥在內。穿入三寸竹筒上頭。後仍留二三寸餘。挽一轉。不令藥氣在外。用時先以溫水洗陰內。令潔淨拭乾。却以葱汁浸濕藥頭。送入子宮極深處。整一日一夜取出藥不用。少閒耳冷氣下。發寒發熱。如傷寒狀。不怕飲食。任意食用無妨。半日即通。或鮮血。或死血。一切惡物悉下。忌生冷發物。自此子宮和緩。而交媾。

則有孕矣。

通經下取方。曾試驗神効。

海蛤粉五錢

牙皂各二錢半

巴豆油畧去

天花粉五錢

苦丁香、紅娘子各一錢半

麝香少許

右爲細末。每用一錢。葱汁同搗爲丸。薄綿裹。以五寸竹管納陰戶中。候熟時。先通黃水。次則經行。

血崩

○論崩中由傷損衝任

良方論曰。婦人崩中。由臟腑傷損衝任。血氣俱虛故也。衝任爲經脈之海。血氣之行。外循徑絡。內榮臟腑。皆無傷損。則陰陽和平。而補氣者爲熱。所乘者則宜涼血。不當混。

氣血調適。若勞動過多。致臟腑俱虛。而衝任之氣亦虛。不能約制。

言調脾胃爲主觀東垣法便得其然

其經血故忽然暴下或由陰陽相搏爲熱所乘攻傷衝任血得熱則流散甚者至於昏悶其脈數疾小爲順洪大爲逆大法當調補

脾胃爲主

○論血崩因虛熱

陰虛陽搏是陰中有火也故以尺脉爲彤此言脾氣下陷爲熱宜用升補瀉火東垣以自帶細爲診固是說而後人卒以爲溫熱須可一服而愈或先貴而後賤或先富而後貧病名脫營者心氣不

心下急起又有足其火大勝在於血脈之中又無陽氣相輔助其證顯

說而後人率以爲偏執須

或四肢困熱心煩則不得眠臥心下急宜大補脾胃而升降氣血

可服而愈以先胃而後心也取先富而後貧之義

名

說此

不

此雖指出脾  
胃症而煩心  
心下急又有  
虛火矣心主以  
營故曰心病

陽氣肉動便  
火是胞絡中有

足其火大熾旺於血脉之中又致脾胃飲食失節火乘其中形質  
矣而經水不時而下或適來適斷暴下不止治當先說惡死之言  
勸諭令懼死而心不動以大補氣血之藥補養脾胃微加鎮墜心  
火之藥治其心補陰瀉陽經自止矣。養論云悲哀太甚則胞絡絕  
胞絡絕則陽氣內動發則心下崩數溲血也故本病曰大經空虛  
發則肌痺傳爲脈痿此之謂也

薛氏曰經云陰虛陽搏謂之崩又云陽絡傷血外溢陰絡傷血內  
溢又云脾統血肝藏血其爲患因脾胃虛損不能攝血歸源或因  
肝經有熱血得熱而下行或因肝經有風血得風而妄行或因怒  
動肝火血熱而沸騰或因脾經鬱熱血傷而不歸經或因悲哀太  
有風

薛氏所論凡七  
條而脾胃二條

肝經三係胞絡

一條

合此

胡及橘芳牡丹皮

者以厥陰手足

一經爲多血減

血之所血爲熱

追則不能從陽

亟起故以引起

所氣而橘芳等

收陰抑陽也如

東垣升陽舉經

之意看得其妙

所在脾胃方藥

必是久病之類

出脾胃諸藥言

甚言如此自

謂四君爲血證

收功須用則正

補治之法可知

在此、生得力

過胞絡傷而下崩治療之法。脾胃虛弱者。六君子湯加當歸川芎柴胡。脾胃虛陷者。補中益氣湯加酒炒芍藥山梔。肝經血熱者。四物湯加柴胡。山梔苦木。肝經風熱者。加味逍遙散或小柴胡湯加山梔芍藥牡丹皮。若怒動肝火亦用前藥。脾經鬱火者。歸脾湯加山梔柴胡牡丹皮。哀傷胞絡者。四君子湯加柴胡升麻。山梔。故東垣丹溪諸先生云。凡下血證。須用四君子以收功。斯言厥有旨哉。若大去血後。每以脈診。當急用獨參湯救之。其發熱。潮熱。咳嗽。脉數。乃是元氣虛弱。假熱之脉也。尤當用人參之類。此等證候。無不由脾胃先損而患。故脉洪大。察其中有胃氣受補。則可救。設用寒涼之藥。復傷脾胃。生氣反不能攝血歸源。是速其危也。

方氏曰。血屬陰也。靜則循經榮內。動則錯經妄行。蓋人之七情過

遇

愚謂止滯之中須寓情涼而清涼之中又須破瘀解結。至於補血還舊又須調脾其間兼證或有不同。又當得其所以而治焉似難盡一也。

不可

此大寒之劑  
非前藥之慎  
恭實熱症可

極則動五志之火。五志之火亢甚則經血暴下失期而來久而不遇。謂之崩中如風動木搖火燃水沸類也。治崩次第初用止血以塞其流中用清熱涼血以澄其源。末用補血以還其舊若止塞其流而不澄其源則滔天之势不能遇。若止澄其源而不復其舊則孤子之陽無以立故本末勿遺前後不紊方可言治也。

張子和云孟官人母五十餘血崩一載僉用澤蘭丸黑神散保安丸白薇散補之不効戴人見之曰天癸已盡本不當下血蓋血得熱而流散非寒也。夫女子血崩多因大悲哭悲甚則肺葉布心系爲之急血不禁而下崩內經曰陰虛陽搏謂之崩陰脈不足陽脉有餘數則內崩血乃下流舉世以虛損治之莫有知其非者可服大劑大劑者黃連解毒湯是也次以香附二兩炒白芍藥二兩焙。

卽陰虛陽搏

西園公治一婦人。年六十二歲。益崩不止。投黃連解毒湯四貼。後之治。

當歸二兩焙。三味同爲細末。水調下。又服欖榔丸。不旬日而安。  
葉舉。而上焦不通。熱氣在中。血走而崩。故效。

所見証俱屬

胃

脾

肝

脾

肝

薛氏曰。一婦人年將七十。素有肝脾之證。每作。則飲食不進。或胸

肝脾宜審之

脾

肝

脾

肝

膈不利。或中脘作痛。或大便作瀉。或小便不利。余用逍遙散。加山

以脾症而用

胃

脾

脾

肝

茱萸。而愈。後憂玄媚居。不時吐紫血。其病每作。先倦

也。豈所謂補

胃

脾

脾

肝

而後發熱。經曰。積憂傷肺。積思傷脾。肺布葉舉。是令子母俱病。

此佐金丸生。

胃

脾

脾

肝

不能攝血歸經。而致崩漏。遂以前藥加炒黑黃連三分。吳茱萸二

分。顛倒復因怒吐。亦血甚多。躁渴垂死。此血脫也。法當補氣。乃用

脾

脾

脾

肝

人參一兩。芩木當歸各三錢。陳皮炮黑乾薑各二錢。炙草。木香各

胃

脾

脾

肝

則陳皮亦不可少。此佐金丸生。

一錢一劑頓止

一婦人年六十四。久鬱怒。頭痛寒熱。春間乳內作痛。服流氣飲之。類益甚。不時有血如經行。又大驚恐。飲食不進。夜寐不寧。乳腫反。方症合宜。而以四劑全消。恐無是遠。

用歸脾加炒黑梔貝母。諸證悉愈。

一婦人因怒崩血久不已。面青黃而或赤。此肝木制脾土而血虛也。用小柴胡合四物。以清肝火。生肝血。又用歸脾補中二湯。以益脾氣。生肝血。而瘥。此證若因肝經有風熱。而血不寧者。用防風。一風而下陷者。宜用防風。一條芩是大腸經藥。用柴胡。則治厥陰。

若柴梔膽是  
厥陰藥木梔  
是平肝藥  
脾病兼肝故  
用法如此  
若血分有熱  
當加丹皮山梔

一婦人性急。每怒非太陽耳。項喉齒胸乳作痛。則脇滿吞酸。吐瀉少食。經行不止。此皆肝火之證。肝自病。則外證見。土受尅。則內證作。若自病見。用四物加白朮。茯苓。柴胡。炒梔。炒龍膽。若內證作用。四君子加柴胡。芍藥。神曲。吳茱萸。炒過黃連。諸證漸愈。惟月經不止。是血分有熱。脾氣尚虛。以逍遙散倍用白朮。茯苓。陳皮。又以補中益氣。加酒炒芍藥。蒸服而調。

○論氣陷血脫法當升舉

東垣云。一婦人經候黑血凝結成塊。左廂有血痕。水渴不止。穀食有時化。有時不化。至今歲四月。血塊暴下。併水注俱作。是前後二陰。有形之血脫竭於下。旣久經候尤不調。水瀉曰見三兩行。食餽心煩不快。飲食減小。甚至瘦弱。東垣先生曰。夫聖人治病。必本四

陽盛是言陽  
邪盛於內故  
可下陰盛是  
言寒邪盛於  
外故可汗

時升降沉浮之理。權變之宜。若不本四時以順爲逆。非其治也。且無失正。絕人長命。故聖人云。陽盛陰虛。下之則愈。汗之則死。陰盛陽虛。汗之則愈。下之則死。大抵聖人立法。各自有義。且如升陽以發散之劑。是助春夏之陽氣。令其上升。乃瀉。秋冬收藏。殞殺寒涼之氣。此病是也。當用此法治之。乃升降浮沉之至理也。夫天地之氣。以升降浮沉。乃從四時。如治病逆之。則殺人矣。故經云。順天者昌。逆天者亡。可不畏哉。夫人之身。亦有天地四時之氣。不可止認在处。人體亦同天地也。今經漏不止。是前陰之氣血已下脫矣。水瀉又數年不愈。是後陰之氣血又下陷矣。後陰者。主有形之物也。前陰者。精氣之門也。俱下竭。是病人周身之氣。常行秋冬之令。陰

主殺此等收藏之病是也。陽生陰長春夏是也。在人身之中令氣升浮者。穀氣上行是也。既病則周身血氣皆不生長。穀氣又不升其肌肉消少。是兩儀之氣俱將絕矣。既下元二陰真脫。血氣消竭。假令當日元是熱證。今下焦久脫已化爲寒矣。此病久沉久降。寒濕太勝。當急救之。瀉寒以熱降。濕以燥。大升大舉。以助生長。補養氣血。不致偏枯。聖人立治之法云。濕氣大勝。以所勝助之。助甲風。舉下陷之氣。風勝濕。是以所勝平之也。當調和胃氣。次用木上升是也。故經云。風勝濕。是以所勝平之也。當調和胃氣。次用白术之類。以燥其濕。而滋元氣。如其不止。後用風藥以勝濕。此之謂也。此便是大舉大升。以助春夏二濕久陷下之至治也。又一小田膽也。

風勝濕。正是  
舉下陷之氣。  
今人以爲風  
來則乾之意。  
非也。

云。此病次用四物。隨濕證加減。

○論血瘀腹痛法當收止。

震靈丹能止  
能行非先禮  
不能道不能  
明

於此特見

總論

非久崩氣脫  
者不可用

戴氏曰。血大至曰崩中。或清或濁。或純下瘀血成癥。勢不可止證。  
狀非一所感亦異。甚則頭目昏暈。四肢厥冷。竝宜膠艾湯。噦震靈  
丹。佐以三灰散。或以童子小便煎理中湯。或以沉香降氣湯。加入  
百草霜。米飲調下。而崩甚而腹痛。人多疑惡血未盡。又見血色瘀  
黑。愈信惡血之說。不敢止截。大凡血之爲患。欲出未出之際。停在  
腹中。卽成瘀色。難盡以瘀爲惡。又焉知瘀之不爲虛冷乎。若必待  
見瘀血之後。截之恐併與人無之矣。此腹痛更有說。瘀而腹痛。血  
通而痛止。崩而腹痛。血住則痛止。宜芎歸湯加乾薑。熟附一錢。止  
以下皆止溢。之法。而蟹殼。黃麻。又有破毛蟹殼燒存性。米飲下。亦有以早黃麻根燒灰爲末。米飲下。  
血之能。

○論過服寒涼法當溫補

薛氏曰。表弟方健甫。內五十歲。辛丑患血崩。諸藥罔效。王寅八月。  
身熱。體痛。頭暈。涕出。吐痰少食。寒作火治。展轉發熱。絕粒數日。余  
診之。曰。脾胃久虛。過服寒藥。中病未已。寒病復起。遂用八味丸料  
一服。翌早遂索粥數匙。再服食佳。熱減痛止。乃服八味丸而愈矣。  
卯秋。因勞役憂怒。用辰夏病復作。胸飽發熱。脊痛腰疼。神氣憊鬱。  
或作中暑。崩血便血。煩渴引飲。粒米不進。昏憊時作。脉洪大。按之  
微弱。此無根之火。內虛寒而外假熱也。以十全大補加附子一劑。  
遂食粥三四匙。崩血漸減。日服八味丸。始得全愈。

大尹王天成之內。久患崩。自服四物涼血之劑。或作或輟。因怒發  
熱。其血不止。服前藥不應。乃主降火。更加腹脇大痛。手足俱冷。余  
溫補脾胃。此治法自有種種得窺。如此治法。自有知者。

因怒發熱不

溫補脾胃。此得治本之道。

主十日而車  
其血不正而病  
溫補胸胃

此脾胃虛寒所致。先用附子理中湯。體熱痛止。又用齊生歸脾

然以前日寒  
之症方藥迥

別。又孰是耶。

均一寒涼過

劑而方藥應

用不同。然皆

不拾妻附是

必有道爻兩

服之而愈。一

不聽而殆可

不知所集之

意哉。

○論補中益氣二湯崩血頓愈。若泥痛無補法則誤矣。  
錦衣楊永興之內患前證。過服寒涼之劑。其證益甚。更加肚腹痞  
悶。飲食不入。發熱煩躁。脈洪大而虛。余曰。此脾經氣血虛而發躁  
也。當急用八珍湯加炮薑以溫補之。緩則不救。不信乃服止血降  
火之劑。虛證雖起。始信余言。緩不及泊矣。

○論補中去積。

審証細審。自  
是老手。

東垣云。丁未年冬。郭大方來說。其妻經水暴崩不止。先曾殞身失  
血。自後一次經數月而來。今次不止。其人心窄性急。多驚以予料  
之。他日必因心氣不足。飲食失節得之。大方曰。容到彼診。得掌中  
寒脉沉細而緩。間有沉數。九竅微不利。四肢無力。上喘氣短促。口  
鼻氣皆不調。果有心氣不足。飲食失節。脾胃虛弱之證。胃院當心

前是虛此是實

此節尤妙尤難

而痛在脇下急縮有積。當脇有動氣。腹中鳴下氣大便難。諸虛證極多。不能盡錄。擬先治其本。餘證可以皆去。與安心定志。鎮墜其驚。調和脾胃。大益元氣。補其血脈。養其心神。以大熱之劑去其冬寒。凝在皮膚。少加生地黃去命門相火。不令四肢瘦弱。製黃芪當

歸人參湯。

○論開痰行氣

又得一種見  
解人嘗謂丹  
溪先生善治

痰然哉。

丹溪云。涎鬱胸中。清氣不升。故經脈壅遏而降下。非開涎不足以行氣。非氣升則血不能歸隧道。此論血泄之義甚明。蓋開胸膈濁涎則清氣升。清氣升則血歸隧道。不崩矣。故其症或腹滿如孕。或脅腹疼痛。或血結成癰。或血出則快。止則悶。或脅上動。其治法宜開結痰。行滯氣。消汚血。

既云心脾虛

虛自當益補

乃不爲治本

卽用烏賊失

笑以治標何

耶

○論殺血心痛

良方云婦人血崩而心痛甚名曰殺血心痛由心脾血虛也若小產去血過多而心痛甚者亦然用烏鱖魚骨炒爲末醋湯調下失

笑散亦効

論解得當至薛氏曰前證若陰血耗散用烏賊丸收斂之若瘀血不散用失笑

云心血虛正用芎歸似未

散行散之若心血虛弱用芎歸湯補養之若鬱結傷血用歸脾湯

盡善觀後案

便得要旨

調補之

一婦人血崩兼心痛三年矣諸藥不應每痛甚虛證采真面色瘦黃余曰心主血蓋由去血過多心無所養以致作痛宜用十全大補湯參术倍之三十餘劑稍愈百餘劑全愈

○論崩漏雜治法

丹溪云崩漏有虛有熱則下陷熱則通流

氣虛血虛者皆以四物湯加參芪

因勞者用參芪加升補藥

因寒者用乾薑

因熱者用黃芩

漏下乃熱而虛四物湯加黃連

崩過多者先用五靈脂末一服當分寒熱益五靈脂能行能止

紫色成塊者血熱四物湯加黃連柴胡之類

急則治其標用白芷湯調百草霜末甚者棕櫚灰後用四物湯加

炒黑薑調理

經驗簡要治崩中等證治者脉緊細手足寒紅去淡黑或五色

經驗綱要。公私崩中等證。○冷者脉緊細。手足寒。紅去。淡黑或五色。

當歸建中。加白龍骨。血竭。附子。下紫石英丸。震靈丹。炙火。○熱者  
脈洪。四肢溫。心煩口苦。燥熱血沸而成。用黃芩湯。荆芥散。或清心  
蓮子飲。加竹瀝。生地黃汁。甚者。生地黃汁。磨京墨。百草霜。冷服。○  
虛者。膠艾湯。加麥門冬。鹿茸。龍骨。酸棗仁。或養榮湯。加龍骨。血竭。  
送震靈丹。○實者。腹中痛。煮附丸。四物湯。加香附。心虛者。恍惚。  
多夢。健忘。舌強。小便多。面紅盜汗。柏子仁湯。酸棗仁湯。加龍骨。京  
墨。百草霜。吞靈砂丹。又靈砂。當歸。蓮肉。龍骨。栗肉丸。參湯。送下。崩  
中。麝香。當歸。崩者。心氣已散。急服靈砂龍骨等。○有田婦。崩中。斷  
下者。用大蕪根酒煎。清早服。生麥。中如蓬蒿花。  
或云。卽薊根也。

赤者血熱。  
白者氣虛。

○ 脉法

減節小也

脉經曰。問血崩何等。煩師曰。白崩者形如涕。赤崩者形如絳津。黃崩者形如爛瓜。青崩者形如藍色。黑崩者形如衃血也。○寸口弦而大弦則爲減。大則爲芤。減則爲寒。芤則爲虛。寒虛相搏。脈則爲革。婦人則半產漏下。○尺脉急而弦大。風邪入少陰之經。女子漏白下赤。○漏血下赤白不止。脉小虛滑者生大緊實數者死。○漏下赤白。日下血數升。脉急疾者死。遲者生。

藏肝肝氣

不升則熱迫

于下故血不  
能藏而崩也

况厥陰之經  
蹉蹉而震

之荆芥升肝

氣附理肝

○治血熱崩漏

荆芥四物湯。治崩漏初起。不問虛實。服之立止。

當歸

川芎

白芍藥

炒各

生地黃

荆芥穗

條茶炒

香附子

炒各一錢

右荆水煎服。○如不止加防風。升麻。白朮。薄荷。一方加地榆。

氣條芩除內  
熱四物生地

芍藥養血涼

血故皆取効

奇効四物湯 治肝經虛熱 血沸脣而久不止

當歸 酒洗

川芎

白芍藥 炒

熟地黃

阿膠炒成珠

艾葉

黃芩 炒各一錢

右剉水煎服

河潤生地黃散

治經漏下 脉虛洪 經水紫黑

生地黃

熟地黃

白芍藥

黃芪

枸杞子

天門冬 去心

地骨皮

柴胡

右咬咀水煎服

便血者加地榆

此方用熟地  
以補肝之母  
以阿膠黃芩  
益肝之氣及  
養溫下元以  
助真氣之升  
所謂陰從陽  
起也

洪虛者氣不足  
紫黑者血之熱  
黃芪所  
以補氣然氣  
盛則生火又  
加天冬地骨  
以清氣中之

火熟地所以

生血而生

不涼尤虛妄

行故以生地

黃連以涼心

芍藥甘草緩

肝益脾胡

黃芩清肝升

麻根祀熟地

又肝腎同歸

者也經曰陰

者從陽而極

起也血屬陰

陰不自升故

諸經之血必

隨諸經之氣

而後升若氣

有所照則熱

迫血而內崩

矣故用黃柏

生地黃當歸尾各

五分

黃連黃檗知母

藁本川芎

生地黃當歸尾各

五分

升麻各二分

柴胡

防風羌活黃芩細辛

荆芥

蔓荆子

甘草各一分

紅花少許

右㕮咀作一服水煎空心稍熱服

小薊湯

治崩漏不止色明如水得溫則煩悶者此陽傷於陰令

人下血當補其陰脉數疾小者順大者逆

小薊莖葉

搗取汁

生地黃各一盞

搗取汁半兩

右三件入水一盞煎減一半去渣溫服

芎藭酒

治崩中晝夜不止醫不能治者

芎藭一兩

生地黃汁一盞

右用酒五盞煮芎藭一盞去渣下地黃汁再煎二三沸分爲三

安故用黃柏

以清下焦胞絡之火心者

火之主也故又以生地黃

連以治火之原知母黃芩

滋水之母歸尾破瘀紅花

生血所謂去故生新地黃

芎行血海之餘憂鬱涼諸經之血而風藥皆所以升諸經之氣也諸經氣升則陰血不得

不隨之而起矣故曰從陽而起也有是

服

治崩中去血不止。

大小薊根五兩

白茅根三兩

右二味細切用酒五觔者取四觔去渣分四服。

一方治婦人血崩。

槐花半兩炒

黃芩二兩去皮

右二味共爲細末每服五錢好酒一碗用銅稱錘一枚桑柴火燒紅浸入酒內調服不拘時忌生冷油膩之物

金華散治血室有熱崩下不止服溫藥不効者。

玄胡索當歸瞿麥穗牡丹皮乾薑各一

石膏二兩桂心另研藏靈仙各七蒲黃牛兩

而起也有是

醫案開

民三血崩門

三五

瘡瘍去之

右爲細末。每服三錢。水煎空心溫服。日二次。

此方以酒煎  
菖蒲配生地  
汁自有妙用

甚奇甚奇

用酒之意使  
是升法

黃芩一味。研爲細末。每服三錢。麝酒調下。

卽燒秤  
錘酒

陽乘陰。所謂天暑地熱。經水沸溢者。

海也而乾薑

○治勞傷崩漏

桂心爲之從  
治歲久仙丹  
腸中宿膿惡  
水惟敗血不  
清。熟結血瘀

膠艾四物湯。治勞傷血氣。月水過多。或崩漏不止。及妊娠胎氣  
不安。或因損動漏血傷胎者亦宜。

者可用  
清

當歸

五

川芎

白芍藥

熟地黃

與奇效四物  
少異。彼用黃

阿膠

炒成珠

艾葉各一錢

甘草炙五分

茶此用甘草

右剉水酒各半煎空心服。

彼以水前此  
又牛酒其溫

阿膠珠

女蘋酒

甘草分

少異彼用黃  
與舒攻四物

當歸芍藥湯。治婦人經脈漏下不止。其色鮮紅。先因勞役脾胃  
虛弱。氣短氣逆。自汗不止。身熱悶亂。惡見飲食。四肢倦怠。大便  
涼不同如此。

時泄。

黃耆一錢

白水

蒼朮(泔浸)

當歸身

用補中益氣  
為王。今此方  
不用人參。升  
氣燥火。其

色鮮紅。又何  
用之。況與地  
黃同用。豈不  
爲時人所笑。

甘草炙各三  
分

柴胡三分

熟地黃各五  
分

生地黃

據見證悉屬  
肝胃氣虛。當  
用補中益氣  
為王。今此方  
不用人參。升  
氣燥火。其

色鮮紅。又何  
用之。況與地  
黃同用。豈不  
爲時人所笑。

右作一服。水煎空心熱服。東垣爲一婦人製此方。一服之後。諸  
證恐去。予族一婦。因勞役下血。角來

兩旬不愈。醫者拘血熱之說。用四物加芩連。治不愈。一日血  
大下。昏迷不醒。急以問予。予用此藥一劑。少頃頓醒。過兩時血

遂止。後常用此藥。其病遂不復作。蓋血虛須兼補氣。嘗譬之。血  
猶水也。氣猶堤也。堤堅則水不橫流。氣固則血不妄行。自然之

理也。此藥有黃芪最多。白朮次之。所以神劫俗醫不達此理。專  
用涼藥。不知涼藥傷胃。服久則正氣愈弱。血安得固。故特爲表  
求至理所在。而不必拘方。因證立法。但求至理所在。而以試病也。

之、出

此爲氣猶夫也。血猶妻也。血隨氣升。夫唱婦隨之道。

耳夫營出中

焦脾胃氣虛

則氣下陷

是言血失其

夫矣。此方益

營助脾而以

氣藥爲君者

正此意

心脾氣虛氣

結者宜之

此濟生方也

而玄齋加柴

枳以清厥陰

之火以升肝

脾之氣

龜鵝刀陰中

### 歸脾湯

治婦人思慮傷脾不能攝血以致妄行或健忘怔忡驚悸不寐或心脾傷痛忘情嗜臥不思飲食。

人參

黃芪炒

白朮

白茯苓

當歸

龍眼肉

遠志去心

酸棗仁炒各

木香

甘草炙各

五分

右剉

加生薑三片棗一枚水煎服○加柴胡山梔名加味歸脾

湯

### 柏子仁湯

治婦人憂思過度勞傷心經不能藏血遂致崩中下血不止。

柏子仁

炒香附子

炒芎藶

鹿茸

擦去毛蒸焙

扶神去水

當歸各一錢

川續斷二錢

阿膠炒

遠志去心各一錢

甘草炙五分

右作一服生薑五片水煎空心服。

脾之氣升而

當歸錢半分  
生薑五分水煎空心服

這

一錢

至陽陰休而  
陽用也非血

嘔氣衰者不

以大怒而用

是故曰平肝

香附青皮柴

川芎甘草

胡麻子

川芎緩肝趾

升提肝氣

當歸生地養

血藥用然所

重在大怒故

立方如此

養血平肝散 治大怒經血暴下

當歸 酒浸

白芍藥 炒

香附 炒黑各二錢

青皮 酢炒五分

柴胡 川芎

生地黃 各八分

甘草 五分

○治崩漏氣陷  
右剉水煎食前服

益胃升陽湯 血脫益氣古人之法也先補胃氣以助生長故曰  
陽生陰長諸甘藥爲之先務舉世皆以爲補氣殊不知甘能止  
血此陽生陰長之理也故先理胃氣人之一身內穀爲寶

黃耆一錢

人參有喙去之

神麃炒各一錢半

白朮 三錢

當歸酒浸

陳皮

甘草炙各一錢

升麻

柴胡 各五分

生黃芩 二錢

湯瀉盛暑之伏熱  
刑金肺逆秋涼不用

以食增減爲

藥增減可見  
古人用藥有

法

要知鮮血不

用清涼用升

舉當在不思

飲食上而摩

以症屬太陽

者多生面方

藥多散少升

陽明太陰厥陰

加當歸紅花

引入血分以

升陽氣乃爲

之大舉大升

此從陰用陽

之義也

前日鮮

此用

忠

志

有

別

而

右爲粗末每服三錢或五錢如食添再加之如食減已定三錢內更減之不可多服每服二錢水煎去滓熱服如腹痛每服加白芍藥三分中桂少許如渴口乾加乾葛一分如嗽去人參○如服此不止却服後方柴胡調經湯大舉大升之也柴胡調經湯治經水不止鮮血項崩急脇痛脊骨強痛不思飲食

羌活

藁本

升麻

各五分

蒼朮

柴胡七分葛根

當歸身

甘草

炙各三分

紅花

少許

石咬咀作一服水煎去渣稱熱室心服微汗立止

調經升陽除濕湯治女子漏下惡血月事不調或暴崩不止多下水漿之物皆由飲食不節或勞傷形體或素有心氣不足因

力無氣以動氣短上氣逆急上衝其脉緩而弦急按之洪大皆

當細思之

此曰

下水漿之物皆出飲食不節或勞倦形體或恚怒心火氣不足因

前日解此曰

酒力無氣以動氣短上氣逆急上衝其脉緩而弦急按之洪大皆

中

怠惰嗜臥小  
薦則熱故氣  
逆上衝故爲

溫之微弦爲

木之象薦而  
不伸則此

心火乘脾之  
竟也其脉按

之洪大者久  
在下也見用  
之者土之位也胞絡爲

相火寄于命

門戶多血之

經病從火治

心火以藏德  
爲神相火競

命于心三焦

飲酒勞倦致令心火乘脾其人必怠惰嗜臥四肢不時困倦乏  
力無氣以動氣短上氣逆急上衝其脉緩而弦急按之洪大皆  
中之下得之脾土受邪也脾主滋榮周身者也心主血血主脈  
二者受邪病皆在脉脉者血之府也脉者人之神也心不主令  
胞絡代之故曰心之脉主屬心系心系者胞絡命門之脉也主  
月事皆出脾胃虛而心胞乘之故漏下血水不調也況脾胃爲  
之洪大者久之洪大者久之洪大者久之洪大者久之洪大者久  
在下也見用之者土之位也胞絡爲  
之洪大者久之洪大者久之洪大者久之洪大者久之洪大者久  
血氣陰陽之根蒂當除濕去熱蓋風氣上伸以勝其濕又云火  
鬱則發之

黃芪

蒼朮

羌活

各一錢半

防風

藁本

升麻

柴胡

各一錢半

甘草

炙各一錢

當歸

酒湯

獨活

各五分

蔓荆子

七分

主氣胞絡生

血故血分之

火專主胞絡

氣分之火專

主三焦管則

火不得遂矣

上之性迫于

血分故陰經

傷絕此方以

蒼朮升麻發

太陰陽明之

退柴胡防風

達厥陰少陽

之本元活烹

本以升舉少

陰太陽下部

之鬱所謂下

者舉之也是

皆升散之物

過則氣耗而

右咬咀水五大盞煎至一大盞去滓稍熱服空心服藥畢待少時以早膳壓之可一服而已如炙足太陰脾經中血海穴二七壯或三七壯立已

此藥乃從權衡之法用風勝濕爲胃氣下陷而氣迫於下以救其血之暴崩也若病愈經血惡物已盡主病雖除後必須以黃耆甘草人參當歸之類數服以補之於補氣升陽湯中加和血藥是也若經血惡物下之不絕尤宜救其根源治其本經只益脾胃退心火之亢乃治其根蒂也若遇夏月白帶下脫漏不止宜用此湯一服立止

○治崩漏血瘀皆暉暉○疼痛

五靈脂散 治血崩不止及昏不省

皆升散之性  
固則氣耗而

五靈脂散

治血虛明不止及昏不省

傷金故又以  
黃芪以保肺

當歸引血使

各有所歸

甘草和氣

荳蔻涼血

此四種

者又制丸膏

之法也其曰

可一服已何

其神哉讀者

當得此意

以升舉主治

者以標爲本

也以追心火

爲治者以水

爲主也以益

肺胃爲培者

標平不捨也

東垣專主脾

胃之意蓋如

## 五靈脂

不拘多少炒  
令烟盡研末

右爲末每服一錢溫酒調下。一方治血崩不止。五靈脂一錢炒熟加當歸酒同煎。或水酒童便各半盞同煎服。一方五靈脂半生半熟爲末。酒調服。一方水煎五靈脂半乾去渣澄清再煎成膏。入神麪末爲丸。如桐子大空心溫酒下二三十丸。便止。一方每服三錢水酒童便各半盞。煎至八分通口服。名抽刀散。治產後有病。服三服散惡血。或心腹脇肋腳痛不可忍者。或止用童子小便尤佳。或中風卽入草烏頭半錢同煎亦治。腸風下血。如不飲酒者。煎烏梅柏葉湯調下。如心煩口乾渴者。加蒲黃炒減半。一方同蒲黃各炒等分。名失笑散。治失血及產後半產。惡血攻心。昏迷不省及心腹絞痛欲死者。其効如。

此白帶主濕  
故一服立止  
夏月二字亦宜玩

五靈脂行污  
濁之血如神  
童便降火亦  
行血分而同  
煎尤妙

神龜生丹原  
用醋研丹淳

先生嘗言之

產後瘀血心  
崩不論久近  
服之如神

四法俱良

氣寒則凝而  
癥瘕腹痛皆

氣凝之故香

神真救急之良方也。人家不可不備。此藥兼能解毒及蛇蝎  
蜈蚣咬塗傷處立愈。

香附子散。治血崩不止。或成五色。亦治產後腹痛。及小產血不  
止。大是婦人仙藥。常服益血調氣。

香附子不拘多少。春去毛中斷之畧炒。

右爲細末。每服二錢。清米飲調下。能止血。好酒調下。能破積。  
冷氣薑湯下。○帶下。艾湯入醋少許下。

煮附丸。治崩漏帶下。積聚癰瘕。臍腹疼痛。方見調經門。疼條。

傅金散。治婦人血崩不止。

香附子炒四兩。

當歸尾一兩。

五靈脂炒兩。

右爲細末。每服五錢。醋湯調下。空心服。立效。

附体重氣溫  
吐苦辛苦以

八血分辛以

散結氣氣行

血流故痛自

止

崩而內有瘀

者宜之

數方皆用破

血之劑

良薑妙

如神散。治血崩不止。赤白帶下。

香附子炒

赤芍藥炒各等分

右爲末。大鹽一捻。水煎食前溫服。

一方用香附  
白芷爲丸。

立效散。治婦人血崩臍腹痛。

香附炒三兩

當歸一兩

赤芍藥

良薑

五靈脂

各半兩

右爲細末。每服三錢。酒一盞。童便少許同煎服。

一方。治血崩臍腹痛。

當歸

赤芍藥

熟地黃

香附子

牡丹皮

木賊去節各二兩

沒藥

丁香

桂去皮各三錢

右爲細末。酒調三錢溫服。

繃砂散。治血崩。

縮砂不拘多少。於新死上炒香爲細末。米飲調下三錢。  
加減四物湯。治室女二七天癸至。亦有當時未至而後至者。亦  
有卒然暴下。淋瀝不止。有若崩漏者。失血過多。變生諸證。悉宜  
服之。

四物湯 四錢

香附子 炒去毛 一錢半

去熟地黃可  
不思之

右加生薑五片。水煎食前服。○如血色鮮而不止者。去熟地黃  
加生地黃。

○治崩漏虛寒

丁香膠艾湯。治崩漏不止。蓋心氣不足。勞役及飲食不節。所罹  
經隔小時。其脉兩尺俱弦緊而洪。按之無力。其證自覺臍下如  
水。求厚衣被以禦其寒。白帶白滑之物雖多。間下如屋漏水。下

東垣所論。脉  
證此析宜宗  
之

以寒多故用  
藥必溫

時有鮮血不多。右尺脈時微洪。屋漏水多暴下者。是急弦脈爲  
寒多而洪。脈時見乃熱少合而言之。急弦者。北方寒水多也。洪  
脈時出者。命門包絡之火也。黑物多赤物少。合成屋漏水之狀  
也。

當歸一錢

白芍藥

熟地黃各二

川芎

丁香各四

阿膠

炒六分另後八生艾葉一錢

服藥有法有  
時

右爲細末。作一服水二盞煎至五沸去滓。入膠又再上火煎至  
一大盞空心宿食消盡。帶熱服三服效。

芎藶湯。治帶下漏血不止。及風寒冷熱勞損衝任。月水不調。崩  
中暴下。腰重裏急。淋瀝不斷。及產後失血過多。虛羸腹痛。或妊娠胎動不安。下血連日。小便頻數。肢體煩倦。頭暈目暗。不欲飲

好加減

重在氣虛二

字此卽膠艾四

物之變局也

彼有芍藥此

有人參烏鵲

乾薑大柴崩

在肝氣下斂

者宜芍藥之

酸寒以收之

氣脫而不溫

者宜參差烏

鰥之類溫補

而溫之阿膠

者益金木以

成收藏之用

也陽則寒陰

加味四物湯治崩漏

食

芎藶

黃耆

芍藥

乾地黃

吳茱萸

甘草

炙各二兩

當歸

乾薑各一兩

石以咀

以水一斗煮取三升分三服

○若月經後因有赤曰不

止者除地黃

茱萸加杜仲人參各二兩

斷下湯

治衝任氣虛崩中漏下經脈不調每遇月候時來臍腹

腰脚先痛漸減飲食四肢乏力

及帶下三十六疾悉能療之

人參去蘆

熟地黃

艾葉

醋炒各一兩

烏鵲骨燒灰

當歸酒洗各

二兩

阿膠蛤粉炒成珠

川芎各七錢

乾薑炮半

右咬咀水煎食前服

烏鵲骨卽海螵蛸

此生之而腹

古判卒每服半兩

食前服五六服寒熱腹痛皆退崩漏

人參一錢

大棗五枚

水煎服

此生之而腹

附錄卷之三

加味四物湯

宮崩漏

虛則熟故以  
此主之前腹

痛一症人皆  
以爲瘀血者

多而此以爲

漏不止者服

熟附丸正元

熟附丸

禮所謂崩而  
腹痛者崩止  
而痛除也

川芎

熟附子

木賊去節

龍骨

赤石脂

煅名半兩

當歸

各一兩

此溫濬之劑  
也入崩漏胎  
者宜之丹溪以若此  
爲熱而此言  
焦氣寒血凝  
而黑各有病

鹿茸

燒去毛

赤石脂

裹各一兩

法然安子氣

四物湯

人參

二錢

吳茱萸

一錢

右剉碎每服半兩。薑棗煎食前服。五六服寒熱腹痛皆退。崩漏

未止續服後熟附丸。

海在上、血海  
在下、故下雋

溫而後氣升

血行如鹿茸

者以血成形

由氣而長血

隨氣上而成

角故人血分

以生焉又以

附子艾葉佐

而溫之以石

脂餘糧鎖而

緩之柏葉情

補而續之成

歸地續斷

全方也、不加

人參、益無意

焉、而次關元

之意、誠可思

## 當歸

附子 炮

熟地黃

續斷谷二兩

艾葉一方

柏葉各半兩

右爲細末酒糊丸如桐子大每服三十九空心溫酒下○煉蜜

丸亦可

## ○治崩漏虛脫

大全方 治崩中下血不止小腹痛

芍藥二兩炒黃

柏葉六兩微炒丹溪云柏性多燥

右用水一升煎至六合入酒五合煎取七合空心分爲二服一方爲細末酒調二錢一方有鹿角膠等酒調治白帶臍腹痛

下元虛寒之方

全方也、不加

人參、益無意

焉、而次關元

之意、誠可思

黃芩一兩二錢半

側柏葉

蒲黃各兩

以柏葉爲君

苟藥爲主臣

清涼之物可

治肝熱而脫

不治氣虛血脫

卽小腹痛及

是血虛妙在

用柏此亦殺

邪有生机也

右㕮咀水二升煎取八合分爲二服

又方 治患崩中不止結作血片如雞肝色碎爛  
菖蒲十二分 生地黃 伏龍肝各十分 阿膠 青竹茹各八分  
當歸六分 繢斷 地榆 小蘆根各一分

右用水九盞煮取三盞去滓分三服

伏龍肝散 治氣血勞傷衝任脉虛經云非時忽然崩下或如豆汁或成血片或五色相雜或赤白相兼腰腹癰痛經久未止令人黃瘦口乾飲食減少四肢無力虛煩驚悸

澤此芩翁所

以爲君也

伏龍肝

赤石脂各一兩

菖蒲三兩

熟地黃

艾葉微炒各二兩 薺門冬去心

當歸

乾薑各一錢生

肉桂

甘草

各半兩

右爲龜末。每服四錢。棗一枚水同煎。  
地榆散。治婦人崩中漏下不止。

地榆

蒲黃

白芍藥

白茯苓

柏葉

微炒

蟹爪

微炒

熟地黃

鹿角膠

碎炒令黃

漏蘆

各一兩

芎藭

當歸

各七錢半

伏龍肝

一兩

乾姜

炮

桂心

甘草

各赤半兩

右剉碎。每服三錢。水一中盞。入竹茹一分煎至七分去滓。浮食前溫服。

此方有溫有涼。其破瘀止痛。莫如蟹爪。而補血上行。莫如角膠。餘可三反矣。漏蘆入陽明最妙。旋覆半夏之涼朋與治痰。寫之滻等若果因瘀而崩漏。尤血藥之不灵也。不知用此則此布溫治燥。

按伏龍肝爲止血之聖藥。蓋燥可去濕也。先賢治崩用旋覆花半夏。治膈間濕痰。而崩止者。亦此意。

止血破血  
之劫弱也、  
又可治白帶

前方溫下元  
以止血此方

調血氣以燥  
滯、是不同、

此又無千年  
二字而用油

炒仍慮燥熱  
也、露靈之名、

乃燒種錘投  
酒中之毒亦

或取其靈應  
之速耳、

蟹甲是下部  
陰藥而通督

脈之陽、自脊  
齊筋節而下、

以至子陰內、

蒲黃散 治崩中不能止

蒲黃 炒 破故紙炒 千年古石灰 炒過各等分

右爲細末、每服三錢、淡酒或醋湯調下。

露靈散 治經脈妄行

香附子三兩

川芎

石灰油炒各一兩

右爲細末、燒秤錘淬酒調服二錢。

鹿茸散 治崩中漏下不止、虛損羸瘦。

鹿茸一兩去毛塗酥炙微黃

白龍骨

鱉甲塗酥炙令黃去裙

熟地黃

白芍藥

白石脂

烏鵲魚骨炙黃

續斷各一兩

肉蓯蓉一兩半酒浸去皮炙乾

右爲細末、每服二錢、食前粥飲調下。

蒼朮是下部  
陽藥有益坎

中之陽而補

真火故曰黑

司命石其餘

可類而推矣

若愚脂從容

又爲其藥之

助玉爾

補宮丸。治婦人諸虛不足。久不妊娠。骨熱形羸。崩漏帶下。

白薇

牡蠣

白芍藥

鹿角霜

山藥

白朮

白茯苓

烏鵲魚骨

白芷各等分

牡蠣丸

治月水不止。衆藥不愈者。

右爲細末。麵糊和丸。如桐子大。每服五十丸。空心米飲送下。  
却用醋調艾末。熬成膏和丸。如桐子大。每服五十丸。醋艾葉

下。

一方。治婦人血崩。

蠶砂

炒一

伏龍肝 半兩

阿膠一兩

桑葉柔而葉  
砂有清香涼

燥之能單服

之亦驗以頭  
二桑者佳爲

右爲末。空心溫酒調服二三錢。全名無比。

股無則膠丁。

之亦能單服  
以頭  
也、有生生之妙

○血見黑則止

黑金散。治婦人血氣虛損，經候不調，崩中漏下。

鯉魚皮

棕櫚皮

黃牛角臘

破故紙

亂髮各

烏鵲魚骨

乾薑

木賊

當歸

熟地黃

各半兩

右剉碎抖勻，入磁罐內，鹽泥固濟，候乾，以炭火五斤，服令通赤，烟盡，取放土內，埋令冷，取出研細，每服三錢，入麝香少許，空心米飲調下。

五灰散。治下血不止成血崩。

蓬萊殼

黃絹

血餘

百草霜

五灰十灰散

取其黑如首

草霜黑墨芝

意如前方中

所未備而此

中出之以成

方若令人知

有所取也

連房及節藕

通血脉而散

其飴與房

皆歛虛涼實

而味清房成

於升氣而清

類不之象有

收陽歸陰之

理故用之以

渭血

黃綃錦片皆

絲所成蚕

棕皮以上共  
燒灰

山梔炒黑  
蒲黃炒

黑墨

血竭

右爲細末調服或煉蜜丸桐子大清米飲下五十九

十灰散 治下血不止

錦片

木賊

櫻櫚

柏葉

艾葉

乾漆

鯉魚鱗

鯉魚鱗

血餘

當歸已上逐味火燒存

性名等分研末

麝香少許研

右研勻每服一錢空心溫酒調服

十灰丸 治崩中下血不止

錦灰編一云

黃絹灰

馬尾灰

艾葉灰

藕節灰

蓮房灰

油髮灰

赤松皮灰

食葉而吐絲  
鈎織所成

鈎筋

蓮房

油髮灰

赤松皮灰

食葉而吐絲  
扶桑之木受

青陽之氣稟  
少陽升生之性  
能和肝胆之陽以養厥

陰之血故神仙一切服食

藥不得桑藥

煎不食以其火不文不武

而具溫性之氣暴砂治崩止血豈漫言

百草霜乃

百草之烟墨亦松烟所造

草体乙木之陰狀多青松有清涼之操味

多濁取之以

櫻櫛灰

蒲黃灰

各等分

右研勻用醋煮糯米糊和丸如桐子大每服七十丸加至一百丸空心米飲下

如聖散 治血止崩

櫻櫛

烏梅肉

乾薑一兩五錢  
並燒存性

右爲細末每服二錢烏梅酒調下空心食前服久患不週三服愈方去乾姜用甘草二寸牛生半熟共爲末二三錢淡醋

湯調服

當歸散 治婦人血崩不止

理氣血而又瀉血者也

當歸

龍骨燒赤

香附子一錢  
炒各

棕毛灰五錢

烟則上升取之以黑則制火松皮灰亦此意諸魚屬

火而生居水

中是水中之

火惟鯽魚生

干四季故得

土之多其臭

腥腥先入肝

以助肝氣之

升鱗甲者金

之用也不中

有火水中有

金主救濁

併之意馬尾

火土生金木

陽氣下而

陰血潤下而

陽氣者血之

右爲末每服四錢米飲調空心服忌油膩豬魚鷄等物一方治血崩屢效

當歸

白芍藥

乾薑

櫻櫚各等分

右各煅存性研爲細末醋調以有節朱筋左攬四十九轉食前服

琥珀散一名烏絲帽散治暴崩不止

赤芍藥

當歸

香附子

乾荷葉

收頭男子髮皂莢水洗櫻櫚

烏紗帽是漆紗頭巾取

陽氣上衝故也

右各等分並於新瓦上煅成黑灰存性三分爲細末每服五錢空心童便調下如人行十里久再進一服卽止○若產後血去多加米醋少許墨麝香少許

生尾尾生于  
陽體之盡處

空心童便散丁如人行十里以再進一服卽止  
多加米醋少許

生尾者乾之  
是陽中之陰

也以陰虛之

餘生手純陽

之休又有陰

中得陽之義

凡血脫于下

乃陰無陽以

升此借陽中

之陰以鼓陽

灰以爲止過

之用皆良法

也此方以血藥

入乾姜有從

治之妙而左必効散 治婦人月經不調及崩漏不止

棕皮 燒

木賊 去節燒存性各二兩

麝香 另研一錢

寓少陽生數

攬四十九轉

香附

三兩一半炒

櫻皮

一兩存性

一法先以五積散加醋煎投一二服次服五靈脂散立應散 治婦人血海崩敗又治腸風下血

右爲細末每服五錢酒與童便各半盞煎七分溫服無時如腸

風不用童便

立効散 治婦人血崩不止

當歸

蓮花心

白綿子

紅花

茅花

各二兩

右剉如豆大白紙包裹泥固火煅存性爲末每服三錢溫酒調

服

之義亦呪由

右爲末酒服一錢空心服

荷葉清茶可烏金散治血崩不止

以升肝胆之

氣而清血烏

紗染五倍故

能止血又有  
生添可以破  
瘀取當用者

陽升之意

腸風不用童

便似有前後

之分

蓮花心性清

而君可以通

心氣之和而

滌血

涼而能止

櫻櫛毛燒存性一兩

龍骨煅過二錢

右爲細末研匀每三錢空心好酒調服二服立止

香礮散治血崩

香附子醋浸一宿炒焦存性爲末一兩

白礮末二錢

右研勻米飲調空心服神効一方用荷葉調尤妙

一方治婦人血崩下止

槐花一兩 紫毛灰五錢

右爲末水二盞鹽少許煎至七分去滓溫服○一方用陳槐花一兩百草霜半兩杵錘燒紅淬酒下一二錢○一方槐花蔓燒

涼而能止。

右傷寒水火一盞臨小紙煎至七分去津溫服。一月用陳根才

百草霜半兩。每晚在紅淬酒下一錢。

○

一方槐花散。

正元

年

九

月

廿五

日

廿六

年

廿七

月

廿八

日

荆芥入肝清  
而升舉乃血  
中要藥。

### 止崩雜方。

一方荆芥蓮房各等分燒灰存性爲細末。空心米飲調下一錢。

一方荆芥穗燈火燒焦爲末。每服三錢。用童便調下。

葫蘆未解。

一方葫蘆去子穰實荆芥穗燒存性米飲調服。

一方香附子去毛炒焦黑存性爲末。熟酒調服二錢。不過兩服立止。

一方砂仁新瓦炒黑爲末。米飲調服。

一方益智仁炒黑爲末。鹽米飲調下。

一方檳榔燒灰存性碾末。溫酒調下甚妙。

一方亂髮皂角水洗淨爲末。空心酒調下二錢。

一方、櫻櫚白簪煅爲末。酒調二錢。

一方、櫻櫚燒灰存性。淡酒調下三錢。

一方、烏梅燒灰存性爲末。烏梅湯調下。

一方、桂心燒存性爲末。米飲或酒調下一二錢。

一方、桃仁燒灰存性研細。食前溫酒調下一錢。

一方、五靈脂炒令烟盡爲末。溫酒調下一錢。

一方、黃牛角腮用尖燒爲黑灰微存性研末調服。

一方、鹿角燒灰細研。食則溫酒調下二錢。

一方、烏鵲魚骨燒存性爲細末。每二錢煎水服。酒調服。

一方、以鹽白梅燒灰存性爲末。空心米飲調下。

一方、用夏枯草燒存性爲末。米飲調下。

夏枯草是厥  
陰經養陰之

用猶膽升其  
自然亦陽中

一方、草果一錢。狗脊一錢。川柏半錢。二服。當歸酒調服。

一方、川芎一錢。白芷一錢。同燒露蜂房爲末。二指撮酒調服。

一方以鹽白梅燒所存性爲末。米飲調下。

一方用夏枯草燒存生爲末。米飲調下。

用狗膽汁甚。

奇然亦陽中。

陰藥也同百

草霜必妙必

妙

柿子煖下元而止血。

一方百草霜二錢。狗膽汁拌定分作二服。當歸酒調下。  
一方京墨爲末二錢。同燒露蜂房爲末三指撮。酒調服。  
一方新綿一口燒研末。空心酒調下立止。各一  
笑散

一方蓮蓬燒灰存性爲細末。酒調下二錢。

一方棉子花銅器炒烟盡爲末。空心溫酒調下二錢。

一方用大薊。俗呼爲馬茨菴。連根去土勿洗。以磁石器搗爛。仍入  
冷水半盞。取汁服之立止。

一方金方。治婦人無故尿血。

無故二字當詳。

龍骨二兩爲末。以酒調服方寸匕。

孫真人方。治九竅出血。

荆葉搗取汁。酒和服之。

九竅一竅絕是理。

濟陰綱目卷之三終由血下上

指骨二兩酒末炒鹽頭照之

生金丸

白散人驗效良血

金水半盞取柏脂立止

一六田大補酒也酒黑茶葉去土味以酒浸器

水半盞取柏脂去心黑酒浸止

繫丸李中風頭末酒浸止

草薢酒浸末

海藻酒同百草根水浸末

用白朮水浸末

濟陰綱目卷之三

關中 武之望叔卿父輯著 武林 汪灝洋子父訂正  
西陵 汪淇瞻漪子箋釋 天都 查望二周父叅閱

○赤白帶下

○論帶下由勞傷衝任

凡巢氏所論不可稽者什九即此言亦無徵治之法何可憑也

倍字作滯字  
看  
三句透徹

嚴氏曰。巢氏病源論。婦人有三十六疾者。七癥八瘕。九痛十二帶下也。而帶下不顯其證。今人唯知赤白二帶耳。此由勞傷衝任風冷。據於胞絡。婦人平居血欲常多。氣欲常少。百疾不生。或氣倍於血。氣倍生寒。血不化赤。遂成白帶。若氣平血少。血少生熱。血不化紅。遂成赤帶。寒熱交并。則赤白俱下。其脈右手尺浮。浮爲陽。陽絕者無子。若足冷帶下。輕則漏下。甚則崩中。皆心不榮血。肝不藏血。

所致其脉寸口弦而大弦則爲減大則爲芤減爲寒芤爲虛寒虛相搏其脉爲革主半產漏下又尺寸脉虛者漏血漏血脉浮者不可治

雖分三十六

種總是冷熱

微甚所致故

後人只以赤白二症總之

產寶云帶下三十六疾者是十二癥九痛七害五傷三固謂之三十六疾也十二癥者是所下之物一者如膏二者如青血三者如白二症總之紫汁四如赤皮五如膿痂六如豆汁七如葵羹八如凝血九如清血似水十如米泔十一如月浣十二如經度不應期也九痛者一陰中痛二陰中淋痛三小便痛四寒冷痛五月來時腹痛六氣滿來時足痛七汗出陰中如蟲齧痛八肠下皮痛九腰痛七害者一害食二害氣三害冷四害勞五害房六害妊娠七害睡五傷者一竅孔痛二寒冷痛三小腹痛四瞞不仁五子門不正引背痛三固者由子臟冷熱勞損而來下起於陰內也

胞門子口卽  
子宮俗所謂

兄陽也其傳

無症豈二而

藏有微傳脉

月水閉塞不通。其餘二者文缺不載。而仲景所說三十六種疾皆由子臟冷熱勞損而來。下起於陰內也。

○論帶下五色因風邪入於胞門

良方云。婦人帶下其各有五。因經行產後風邪入胞門。傳於臟腑而致之。若傷足厥陰肝經。色如青泥。傷手少陰心經。色如紅津。傷肺音束諸絛。故緩結之症。心包絡與胞門不同。其曰。黑如衃血。人有帶脉橫於腰間。如束帶之狀。病生於此故名爲帶。李氏曰。平時陰陽過多。及產後亡血不虛。風邪乘虛入於胞絡。宜煖宮丸。加薑附。吳茱萸。或黃耆建中湯。去桂加當歸。水煎吞苦練。卽非包絡。豈胞門與包絡。丸。○白帶兼痛風者。一陳湯加蒼柏。南星。牛膝川芎。兼頭風鼻涕同也。白帶痛風以下兩方。皆丹溪所定。者。着柏辛芎散。

然專主于濕  
痰並無風冷

入胞之涼

前人之言非

也亦補未備

耳

此指任帶二

脉而言其曰

熱入大小腸

之論無據當

從邪入包門

致傳臟腑結

爲正

子帶脈之說

發冤結之義

以明濕熱之

端

○論帶下屬濕熱冤結不散

保命集云赤者熱入小腸白者熱入大腸原其本皆濕熱結于任故津液涌溢是謂赤白帶下本不病結緣五經脈虛結熱滯于帶故女子臍下痛陰中綿綿而下也經曰任脈爲病男子內結七

瘕女子帶下瘕聚王註云任脈自胞上過帶脈貫于臍上故男子內結七瘕女子帶下帶脈起於季脇章門似束帶狀今濕熱冤結不散故爲病也經曰脾傳之腎名曰瘕瘕小腸冤結而痛出自一

名曰蠱所以爲帶下冤結也冤屈者屈滯而病熱不散先以十乘湯下後服苦練丸大延胡散調下之熱去濕除病自愈矣

潔古云治帶下冤結而痛者先以十乘湯下之次服苦練丸大延

胡索散調之是先攻後補之法也湯是雜病痰飲大延胡散方見產後腹痛條

子和云婦人病帶下連綿不絕曰物或來已三載矣命乎脈之

脉証俱屬實  
然而曰寒疾

### ○論帶下癰實宜吐下

子和云一婦人病帶下連綿不絕白物或來已三載矣。命予脈之者益爲敗濁。之液既聚成痰則與本氣不相和故痰積之久自成冷物曰寒痰。因病人自竅其冷而言狀亦有熱者不可不明如醉水酸水也。豈屬寒耶。督主秘藏。乘之則堅。近而黃食減已三年矣。諸醫皆云積冷。陽起石硫黃薑附之藥。重燥補汚水轉多。戴人斷之曰此帶濁水本熱乘太陽經其寒水之性失矣。故不能秘藏而帶下絕其上源之法也。乃涌痰二三升次日下污水半升行三遍汗出周身至明日病人云汚已不下源之法妙甚。

積痰恐不能  
滲入膀胱若  
言溫熱則可

矣。次用寒涼之劑。服及半載庶一男。

丹溪云。帶與漏俱是胃中痰積流下。滲入膀胱無人知此。只宜升提。是者上必用吐以提其氣。下用二陳湯加白术。蒼朮。仍用丸子。

方中並元升  
提法。惟川芎  
一味爲血分  
升氣之藥。

肥人有帶多是濕痰。用海石半夏南星炒薑黃芩蒼朮川芎青黛。瘦

人帶病少如  
有參是熱。用  
炒薑黃芩蒼朮  
川芎青黛桂皮。

羅先生法。或十枣湯。或神佑丸。或玉燭散。皆可用之。虛者不可峻

白濁同。且第  
女之濕病。一  
也。

攻實者可行。

潔古云。治結痰白帶。以小茴丹半錢半飽津液下數丸。候鬱積行  
却服補藥。

○論帶下虛寒宜溫補

虛寒然亦有  
淋漓不已屬

李氏曰。帶下有虛寒帶腥臭者。因小水淋瀝不已。或崩中暴下。或

氣聚帶于下。佳。經積而成。白滑如涕。下流腥臭者。甚則益氏建巾湯去

淋漓不已。然亦有  
李氏曰。世下有虛寒帶腥臭者。因小水淋。經脈凝注。衛氣下陷。精

產後去血過多。以致陰虧陽竭。榮氣不升。經脈凝注。衛氣下陷。精

氣累滯于下焦。蘊積而成。白滑如涕。下流腥臭者。黃芪建中湯去桂加當歸水煎。吞苦練丸。不止臍腹引陰冷痛者。東垣固元丸。虛中有火者。補經固真湯。大烏鵲丸常用。氣虛四君子湯。血虛四物湯。有火加黃柏。有寒加桂附。○寒始因亡血。復亡其陽。氣虛極帶下腥臭。多悲不樂。桂附湯。腹痛陰冷者。四物湯加桂附。常用酒煮當歸丸。小烏鵲丸。琥珀調經丸。

### 飛霞醫案

韓氏曰。山妻年三十餘。十八胎九殞八夭。曾先君松潘難作。賤兄弟皆西布。妻驚憂過甚。遂昏昏不省人事。口唇舌皆瘡。或至封喉。下部虛脫。白帶如注。如此四十餘日。或時少醒。至欲自縊。自悲不能堪。醫或投涼劑解其上。則下部疾愈甚。或投熱劑及以湯藥薦。

用熟造熟此  
從治也非其  
確見有不能  
用惜不言耳

有產後下瀉

上則白舌喉  
瘡以理中

丸用紫雪爲  
衣服之兩病

皆愈亦真對  
真假對假之

元氣是先天  
後天穀氣

塊物者宿痰

也、

李金丹能令  
老婦娠妊方

蒸其下則熟暈欲絕四弟還脈之始知爲亡陽證也大哭曰宗嗣  
未立幾誤殺吾嫂急以鹽煮大附子丸錢爲君制以薄荷防風佐  
以薑桂芎歸之屬水煎入井水冷與之未盡剝肝鼻熟睡通宵覺  
即能識人時止一嗣子二女相抱痛哭疎戚皆悲執友趙忌長驚  
曰君何術也弟曰方書有之假對假對真爾上乃假熟故以俱  
冷之藥從之下乃真冷故以真熟之藥反之斯上下和而病解矣  
繼後主以女金丹錯綜以二三方不但去其疾且調治元氣庚午  
生子今應襲也壬申生一子去年又患瘧疾十三月亦主以養  
元氣調生氣待飲食大進然後劫以毒藥吐下塊物甚多投以附  
子湯三錢而愈不責劫旦暮間其用女金丹卽勝金丸也得之異  
人倍加香附而視氣血之偏者又加葛黃條芩倍川芎之屬取劫

也。金丹能令老婦生壯

人倍加香附而視氣血之偏者又加葛黃條芩倍川芎之屬取效

古菴載而賦

甚多。予念無子者往往有之。翻思予得子之難。其苦何如。乃次第錄其方。供女金丹以濟人云。女金丹卽勝金九方見求于

血生王氣故  
有奇兼四君者

○論帶火枯涸宜潤補

集繩云。帶下火而枯涸者濡之。凡大補氣血皆所以濡之。如以四物湯爲赤。煉蜜丸。梧子大空心米飲下三四十丸。以療年高婦人白帶良驗。皆潤劑也。

○治帶下當以壯脾胃升陽氣爲主

薛氏曰。徐用誠先生云。帶下白屬氣而赤屬血。東垣先生云。血崩久則亡陽。故白滑之物下流。未必全拘于帶脈。亦有濕痰流注下焦。或腎肝陰淫之濕勝。或因驚恐而木乘土位。濁液下流。或思慕爲筋痿。戴人以六脉滑大有力。用宣導之法。此瀉其實也。東垣以

三說各主二  
症。當須辨  
見几診治此

前論五色分屬五臟而無治法此以五臟之中分治法分虛實尤見的據

下數方爲此翁家法

肥燃瘦火之說爲丹溪先生認病總訣

脉微細沉斂或洪大而虛用補陽調經乃兼責其虛也丹溪用海石南星椿根皮之類乃治其濕痰也竊謂前証皆當壯脾胃升陽氣爲主佐以各經見証之藥色青者屬肝用小柴胡加山梔防風瀉熱壅滯小便赤澑用龍胆瀉肝湯肝血不足或燥熱風熱用六味丸色赤者屬心用小柴胡加黃連山梔當歸思慮過傷用妙香散等藥色白者屬脾用補中益氣加山梔色黃者屬肺用六君子何嘗教人泥定一方也雖不可輕治而火湯二字終莫能逃若以此穩當之言不可輕則潔古之十裏子和之汗吐下而以燥濕瀉火之藥輕治之也

一孀婦腹脹脇痛內熱晡熱月經不調肢體痠痺不時吐痰或用

古之十載則瘳  
和之汗吐下

而以炒酒酒火水藥車水也

月經不調。收融癰瘍。不時吐瀉。或用

大無之神佑  
玉燭與小胃

丹之類可輕  
用之與予不  
敢爲丹僕俟

爲欲止今之  
倭日耳

立斋得力處  
在認症確未  
到處在不言

脉惟以二十  
餘年之瘀症  
故可用六君子  
以補脾治濕。  
用六味以治

水汎爲痰。皆  
治木而納氣。  
朝夕反用。又  
其獨見也。

清氣化痰。喉間不利。帶下青黃。腹脇膨脹。又用行氣之劑。胸膈不利。肢體如麻。此乃鬱怒傷損肝脾。朝用歸脾湯。以解脾鬱。生脾氣。夕用加味逍遙散。以生肝血。清肝火。百餘劑而愈。

一婦人久瘧。兼帶發熱。口乾體倦。用七味白朮散。加麥門五味大劑。煎與恣飲。再發稍可。乃用補中益氣。加茯苓半夏。十餘劑而愈。一婦人頭暈吐痰。胸滿氣喘。得食稍緩。苦于白帶三十餘年矣。諸藥不應。此氣虛而痰飲也。痰飲愈。而帶自愈。遂朝用六君子湯。夕用六味地黃丸。不月而愈。

一婦人耳鳴胸痞。內熱口乾。喉中若有一核。吞吐不利。月經不調。兼之帶下。予以爲肝脾鬱結。用歸脾湯。加半夏。山梔。升麻。柴胡。間以四七湯。下白丸子。而愈。

以上七案內

五症皆治濕

痰而兼升神

者以正齋名  
盛當時非久  
病必不延之  
故每以升補  
爲效學立器  
者須得此解  
不然徒讀父  
書矣

一婦人吞酸飽滿。食少便泄。月經不調。服清氣化痰丸。兩膝漸腫。  
寒熱往來。帶下黃白。面瘦體倦。此脾胃俱虛濕痰下注。用補中益  
氣。倍用參术。加茯苓。半夏。炮薑而愈。

一婦人帶下。四肢無力。予曰。四肢者。主也。此脾胃虛弱。濕痰下注。  
以補中益氣。濟生歸脾二藥治之而愈。

一婦人帶下黃白。怒則胸膈不利。飲食少思。或用消導利氣之藥。  
痰喘胸滿。大便下血。予曰。此因脾氣虧損。不能攝血歸源。用補中  
益氣。加茯苓。半夏。炮薑。四劑頓減。又用八珍加柴胡。山梔而痊。

○論帶久不止當補衛厚脾

李氏曰。凡崩中下帶。或用升提如升陽調經湯。或用收滯如伏龍  
肝散。白芷散。然暫吐而終不止者。蓋衛司開闔。而爲榮血之主。脾

經理之言。

者能非古方  
之便

方有用桂枝湯加附子以固衛氣者。四君子湯加草果。丁香木香。

田同知此酒水  
君子湯加草果。丁香木香。

治理之言

肝散白芷散然暫吐而終不止者。益衛司開陽而用收溫如伊龍

不善用古方者。每非古方。

苟能解之便

自能用

收濁劫奪皆

是奇兵用其

合宜便是正

法此益重在

正治有可者

不可偏廢也

水鬱不伸便

能生濕

關門既不能

別清濁則滑

濁之物未必皆

爲滲入膀胱

也如絞腸病

而從溺道出

豈由膀胱來

胃爲血海水液之會。衛氣與胃氣俱虛。則血液無所約制。是以古方有用桂枝湯加附子以固衛氣者。四君子湯加草果丁香木香

煎下。或補中益氣湯平胃散。皆補衛厚脾。使氣血自循故轍。而不

專于收濁。以劫奪之也。

○論帶下濕熱藥用正治從治之異

方氏曰。婦人赤白帶下。多是怒氣傷肝。夫肝屬木。脾屬土。肝邪乘脾。木氣剋土。則脾受傷而有濕。濕而生熱。熱則流通。所以滑濁之物。滲入膀胱。從小便而出也。丹溪作濕熱。而用苦寒之藥治之者。是矣。雖然。古人曾有用辛溫治之而愈者。不知苦寒之藥。正治之法也。辛溫之藥。從治之法也。蓋濕熱怫鬱于內。肚腹疼痛。亦白帶

耶。讀此論乃見今古治法不悖。則丹溪之言亦補先賢。

未備之旨。元禮爲丹溪弟子而相背如此。自是一種翻案。

下非辛溫從治而能開散之乎。然濕熱未曾怫鬱。但止赤白帶下。不若用苦寒正治之爲當也。

○論帶下雜治法

戴氏曰。赤曰帶下。皆因七情內傷。或下元虛冷。感非一端。大率下白帶多。固有下赤者。並宜順氣散。吞震靈丹。仍佐艾附丸。或米飲調沙參末。帶下不止。成冠羸者。四物湯加煨牡蠣粉半錢。吞固腸丸。多服取效。有帶疾愈後。一二月或再發。半年一發。先血而後下漏。帶來不再遏。停蓄未幾。又復傾瀉。此名漏帶。最爲難治。○下截之血。小腹主之。有因血虛而虛熱陷入小腸。致小便澀痛。色如白泔。或成沙粒。皆不可作淋治。用冷劑。宜以四物湯。五苓飲。各半貼。和元禮獨創。不讀此便不知。

漏帶之名始此。亦或升補。燥溫合前此。元禮獨創。不讀此便不知。

煎。

元禮獨創不或成沙粒皆不可作淤泥用徐靜宜以四物湯五苓散各半服和

讀此便不知前

陰中扶者陽初動也所

○論室女帶下

言三說誠有之  
陰中扶者陽初動也所

產寶五未出女子有三病何也答曰女子一病者經水初下陰中

熱或當風臥或扇風二病者太衝脈盛氣盛則內熱以冷水洗之

此方白芷茶根排膿散血

白芍生肌

方用神仙

碧燒湯和以

密蠶此生肌

聚寶丹

方用神仙

托裏之治也

○排膿

脉經曰婦人

腸中排膿爲

○排膿

準繩云帶下並腸有敗膿淋漏不已腥穢殊甚遂至躄腹更增冷

痛此蓋敗膿血所致卒無已期須以此排膿用白芷一兩單葉紅

蜀葵根二兩白芍藥白礬燒枯各半兩爲末同以蠟丸如桐子大

異宜參考之

空腹或飯前米飲下十九或十五丸候膿盡仍別以補藥佐之

間下血而以

○消瘀血

生產瘀血在

齊會洞口

卷三 論帶下

八

腹又白屬帶下。然非仲景不能答。又非仲景之言不能信。如暮熱小腹急滿。爲瘀血在內。則可以掌熱煩躁口乾而用溫經藥。則入皆難之。況此涉有肉桂牛夏吳茱萸。誰肯信服。據此宜屬寒。今皆主熱。此素問語以症白淫之所自筋蒸者。崇筋也。惟入爲

仲景云。問婦人年五十所病。下利數十日不止。暮卽發熱。小腹裏急。腹滿。手掌煩熱。唇口乾燥。何也。師曰。此病屬帶下。何以故。曾經半產。瘀血在小腹不去。何以知之。其證唇口乾燥。故知之。當以溫經湯主之。方見調經門。

○論白濁白淫

大全云。婦人小便白濁白淫者。皆由心腎不交。養水火不升降。或因勞傷于腎。腎氣虛冷故也。腎主水。而開竅在陰。陰爲洩便之道。胞冷腎損。故有白濁白淫。

李氏曰。白淫益緣思想無窮。所願不得。意淫于外。入房太甚。發爲筋癆。久爲白淫。謂白物滌如白精之狀。不可誤作白帶過服熱藥。又有日夜流津如清米泔。或如黏膠者。謂之白崩。與白淫大同多

症白滯之所  
筋病火爲白滯

謂白物滯如白精之狀不可調作白帶過期無藥  
筋火性火熱久則有日夜流津如清米泔或如粘膠者謂之白崩與白滑大同多

若婦人則無淫縱若有之宗筋豈其發道一也究其所以不相似亦不懷此數方

不交者金鎖正元丹小兒綠子丸威靈丸

憂思過度所致誠難治療用平補鎮心丸因思傷脾胃者四七湯  
與治久濁同薛氏曰前證若元氣下陷用補中益氣湯脾胃虛損六君子加升  
法怒火有肝實實者瀉之用龍胆、苦參、柴胡、葛根、黃芩、山梔、肝經、怒火、龍膽瀉肝湯虛以  
龍胆、虛者補之用之故用逍遙以逍遙石歸若論積癥當用木瀉達之

一婦人善怒或小腹痞悶或寒熱往來或小便頻數時下白滯藥  
久不愈面青口苦予以爲積憤而不能發散所致用龍膽瀉肝湯  
而愈用加味逍遙散八珍湯而安

之法

○脈法

脈經云婦人帶下六極之病脉浮則爲腸鳴腹滿緊則爲腹中痛

帶下不治症。數則爲陰中痙痛。則生瘡弦。則陰中掣痛。○婦人帶下脉浮惡寒者不治。

此丹溪法然

配四物以與  
瘦人有火者

清白散 治白帶。

當歸

川芎

白芍藥炒 生地黃

黃柏炒  
鹽水

樗根皮

酒各一錢

乾薑

炒黑

甘草各五分

右剉加生薑三片水煎。○肥白人多濕痰。加白朮半夏。

加酒炒條芩荆芥。○久下加熟地黃牡蠣。○氣虛加入參黃芪。

和中若見刃  
者必有所兼  
症也。非升膀胱之  
濕。蓋氣陷之

之濕。加升麻柴胡蒼白朮。

解帶散 治血氣不調。濕熱白帶。四肢倦怠。五心煩熱。痰欬。嘔吐。

湯也。

舊本水

白茯苓

陳皮去肚丹皮各一錢

川芎

甘草

溫益氣陷之  
陽也

解帶而散

治血氣不調，濕熱白疕用。

四肢倦怠，五心煩熱，卷舌。

當歸身酒洗香附子錢五分白芍藥酒炒白朮錢三分

姑

藜米

白茯苓

陳皮

去白牡丹皮錢一

川芎

玄胡索

各八分

甘草

炙四分

以下四方皆

丹溪獨造均

以清濕熱爲

主故用椿皮

黃柏然芍藥

救肝火良姜

爲從治而燒

灰之法獨超

于諸方奇哉

樗皮丸

治赤白帶有濕熱者

右剝一劑

加生薑水煎空心服

芍藥五錢

良薑三錢

燒灰黃藥二錢

俱椿根皮一兩

燒成灰

椿根皮五錢

勝濕丸

治赤白帶因濕熱勝而下者

右爲末

糊丸桐子大

每服四五十丸

空心米飲下

蒼水鹽炒

白芍藥五錢

滑石一兩

炒各椿根皮一兩

乾薑兩

燶二

地榆五錢

枳殼炒

甘草各三錢

右爲末

粥左桐子大空心米飲下一百丸

乾薑一方用

二兩似誤

榆以溫下部

枳殼氣于

上滑石利濕

蒼麵鴨皮丸

治帶下。

椿根皮

二兩  
芍藥一兩  
半

蒼朮

神麴炒

麥皮麵炒

黃蘖

炒各一兩

滑石

枳殼各半

右爲末。粥左桐子大。每五十丸。空心米飲下。

側柏鴨皮丸

治白帶因七情所傷而脈數者。

椿根皮

炒二兩  
香附子

醋白芍藥

白朮炒各一兩

側柏葉酒蒸

黃連

炒炒各半兩

白芷

燒存性三錢

右粥左桐子大。米飲下七十九丸。

按椿根皮性涼而燥。濕熱盛者宜之。後一方有黃連、香附、木香。故可治七情所傷。

苦練丸。治赤白帶下甚妙。

苦練丸。治赤白帶下甚妙。

下部痛藥  
苦練丸

苦練丸治赤白帶下甚妙

苦練  
碎酒浸懷香大茴香當歸各等分

右爲末酒和丸如桐子大每服三五十丸空心溫酒下○療血  
加桃仁○血海藥加桂○如腰腿疼四物湯四錢加羌活防風  
各一錢煎湯送下

四神丸治帶下

此方溫燥非  
有熱所宜

香附四製蒼朮甘浸生椿根皮蜜水砂仁炒各二兩

右爲末黃米煮飯丸桐子大每服五六十丸空心酒下

已上諸方俱輕劑

萬安散治女人赤白帶下或出自物如脂或有臭濁污水並神

効

此利氣溫行  
之齊與寒虛

小茴香炒木香各二錢半黑牽牛一兩另取頭末

相宜

二方皆燥熱  
下氣導水之  
藥惟真寒虛  
者宜之

右爲細末。以生薑自然汁調一錢。臨臥服。取盡惡物爲効。未盡  
圓目二服二錢。後以白粥補之。忌熟毒物。

大聖萬安散。治女人癥瘕。癥氣腹脹。胸滿。赤白帶下。久患血氣  
虛弱。瘦弱無力。並休息亦曰痢疾。並皆治之。其効不可具述。孕  
婦不可服。天陰晦不可服。

白术

木香

胡椒各二

錢半陳皮去白  
黃芪

桑白皮

大通錢

各五  
白牽牛

炒取頭  
末二兩

右爲末。每服二錢。用生薑五片。水一鍾半煎至一鍾。去薑調藥  
臨臥服。須臾又用薑湯或溫白湯飲三五口。催之平明可行三  
五次。取下惡物。及臭污水爲度。後以白粥補之。服藥不可食晚  
飯及童酒等物。

五次取下藥物，及與水爲度後，以白湯補之。服藥不可食晚飯及葷酒等物。

清熱滲溫導

滯夢在氣血

兩分

宣明導水丸。治濕熱鬱于下焦之分。赤白帶下不止。燥熱煩渴。

大黃

黃芩

各二兩

甘草

各一兩

滑石

各四兩

右爲末。水丸如桐子大。每服四五十丸。滾水下隨證加減。

已上諸方俱重劑。

○治濕熱帶下

則可。自入膀胱則不可。

總治中州之

濕。蓋中焦病

則無湿下流

故帶自止。豈

有滲入之理。

滲濕消瘀飲。

治濕熱痰積滲入膀胱。白帶不止。

白朮

蒼朮

半夏

姜湯泡

橘紅

白茯苓

白芷

香附

各一錢

甘草

分次五

右剉水煎服。有熱加黃芩。○血虛加葛根。○氣虛加參芪。○久不愈加升麻柴胡。升提之。

蒼柏樗皮丸。

治肥人白帶是濕痰。

此古中集之

濕清下部之

藥方

也

暑導水之猛  
劑古人能用  
之今則不能  
也

蒼术 黃柏 檬根皮 南星 半夏 海石  
川芎 香附 乾薑 炮各 等分 ○暑月去乾薑加滑石

右爲末。醋和丸如桐子大。每服五六十丸。白湯下。

小胃丹 上可取胸膈之痰。下可利腸胃之痰。及濕痰熱痰。並治婦人結痰白帶。惟胃虛少食者忌用。

甘遂 濕麵裹煨熟一方。麵裹煨熟。經宿瓦器  
長流水煮。兩次研。羌活 好嘴搣。經宿瓦器  
內燒黑。不可焦也。

大戟 長流水煮一時。再用  
水洗淨晒乾。各半兩。

黃檗 炒一兩。

大黃 濕紙裹煨勿令焦。切焙乾。再以酒潤炒熟。焙乾。再

右爲末。以白朮膏丸如蘿蔔子大。臨臥津液嚥下五七丸。或自湯送下。取膈上濕痰熱積。以紙後息之。欲利空心服。一方加  
乃今人所想。有獨創之妙。可法。

木香 檳榔 各半兩。

白朮膏爲丸。

乃今人所想。

有獨創之妙。

可法。

可法

陽達下取膈上濕痰熱積以利之欲利空心服

木香、檳榔各半兩

一月加

此亦丹溪方。乃扶脾胃養

肝陰濡慾而

葵花之用取

其傾心向日

之意蓋花生

陰而用陽一

入氣分二入

血分皆便其

從陽而升帶

白止也

補藥方

治痰結白帶先以小腹丹半餓半飽津液嚥下數丸候

斷開却服此藥補之

白朮二兩

黃芩五錢

紅白葵花二錢

白芍藥七錢

五分

右爲末

蒸餅丸如桐子大

伊服三十九煎四物湯下一方

有葵花、舞草

入土甘草根散可食白

○治風邪帶下

冒風湯。治風邪入于胞門或中經脉流傳臟腑帶下五色。

人參

白朮

茯苓

當歸

川芎

芍藥

肉桂各等

右剉每服八錢。八粟米一撮水煎服。腹痛加木香。五精散去麻黃亦可用。  
濕散勿用也。然無風藥而云治風邪入。胎寒名冒風。

何也

小柴胡少陽

治風邪帶下五色

藥其白治風  
邪豈肝胆熱

而生風耶

小柴胡湯

治風邪帶下五色

柴胡二錢黃芩半夏人參甘草各一錢

右剉加生薑三片棗二核水煎服○色青屬肝加山梔防風色赤屬心加黃連山梔當歸○色白屬肺用補中益氣湯加山梔

○色黃屬脾用六君子加山梔柴胡不應用歸脾湯○色黑屬腎用六味地黃丸

蒼柏參芩散治婦人上有頭風鼻涕下有白帶

辛夷川芎蒼朮黃柏南星酒炒

半夏滑石杜鵑黃芩酒炒

右水煎食後服

地榆散治漏下五色二十二服兼治嘔吐下血地榆三兩剉碎

黃令人可法

治帶平正無

星半滑丸而

頭風以蒼朮

英川芎而治

生方也以芩

此又丹溪先

治帶平正無  
令人可法

地榆散

治漏下五色

一十二番  
兼治衄吐下血  
地榆三兩割碎

此下部清劑  
然以三兩醋  
煎自得單方  
用法果能治  
十二症亦一家病也

以醋水各半升煮十餘沸去滓食前稍熱服一合○本草注云  
地榆主帶下十二病。一曰多赤。二曰多白。三曰月水不通。四曰  
陰蝕。五曰子臟堅。六曰子門微。七曰合陰陽患痛。八曰小腹寒  
痛。九曰子門閉。十曰子宮冷。十一曰夢與鬼交。十二曰五臟五  
定。

○治虛損帶下

以下皆以正

氣爲本此亦

建中法

以腹痛故兼

苦練丸

衛生湯 治帶下不止。脉微弱腹痛。

黃芪 三兩 當歸

白芍藥 炒各 二兩

甘草 炙一  
兩

右爲粗末。每服半兩。水煎空心服。○一方下苦練丸三十粒。虛  
者加入參一兩。

補中益氣湯 治勞役過度。飲食不節。損傷脾胃。以致陽氣下陷。

讀東垣先生書方知立方

之旨讀立齋

先生書更知

善用東垣之

方

補中湯有升

柴以升下陷

之氣此方有

扶苓半夏以

燥中宮之痰

本方補心血

以榮脾補其

母也調肝氣

以和下去其

賊也母補賊

去則脾氣健

矣故曰歸脾

昔真入云補

白帶下久不止。

黃芪

人參

白朮

甘草炙各一錢

當歸

陳皮各七分

升麻

柴胡各三分

右作一服水煎服。

六君子湯 治胃虛有痰飲食減少。由氣不和時時帶下。

人參

白朮

白茯苓

甘草炙

陳皮各半夏

湯炮七次各一錢

右剉一服加生薑三片水煎服。

歸脾湯○治思慮過傷心脾以致健忘怔忡驚悸不寐忘情嗜卧。

不思飲食時常白帶不止 方見血崩門勞傷

加味八珍湯 治婦人氣血兩虛赤白帶下。

當歸

川芎

白芍藥酒炒

生地黃

人參

白朮

去財腎氣健  
矣故曰歸脾

當歸八珍湯

肝胃 息婦人氣血兩虛赤白帶下

白芍藥酒生地黃  
人參 白朮

脾不愈當先  
補心此方其

爲總司者也

其山藥杜仲

烏梅又補帶  
脈之不足而  
加減法亦皆  
得理宜法之

右加烏梅一箇生薑三片衆一枚水煎食前溫服。肥人加半  
夏○瘦人加黃柏○飽悶去人參加砂仁○腹痛去人參加小  
茴香立胡○冬月加煨乾薑○日久元氣下陷加升麻柴胡升

提之。

當歸澤蘭丸治婦人經脈不調赤白帶下久無子者。

可爲調經聖

藥宗之

補氣調血強

腰益督溫燥

五臟與氣虛

自帶相宜乃  
爾寒中正法

香附子用極大子杵去毛一斤分四分童便浸四兩酒浸  
四兩醋浸四兩米泔浸四兩各浸一宿取出晒乾

當歸

酒浸

白芍藥

川芎

熟地黃

酒洗

生地黃

各二兩

澤蘭葉 艾葉

白朮

各一兩半

黃芩

二兩

右爲末醋糊爲丸如赤小豆大每服六十丸空心白湯或酒下。

加汪亦正

止帶丸

當歸酒洗

川芎

白术

人参

山藥

杜仲

薑汁酒炒去絲

香附

破故紙

酒炒

牡蠣煅

椿根皮

酒炒

續斷

各等分

青黛

減半

右爲細末

煩渴

如桐子大

每服五十丸

空心米湯下

○腹痛

加立胡索

小茴香

○肥人加

薑製半夏

○瘦人加

酒炒黃柏

冬月加炮乾薑

少許

○夏月加黃柏

旋覆完絲丸

治嚴氏當歸煎

○治赤白帶下

腹內疼痛

不欲飲食日漸羸瘦

當歸

酒

赤芍

炒

白芍藥

炒熟地黃

酒蒸

阿膠

炒

續斷

酒浸

牡蠣

生各半兩

地榆

半兩

右爲赤

醋糊丸

如桐子大

每五十丸

空心米飲下

○治赤白帶下

此藥不熱不寒得其和平助陰生子

旋覆完絲丸

治赤白帶下

此藥不熱不寒

得其和平助陰生子

以除癰腫乃

黃芩清內熱

用氣以勝濕

以除癰腫乃

黃芩清內熱

以除癰腫乃

用氣以勝濕  
黃芩酒內熱  
以陰陽歸正  
從葛空經丸  
治赤白帶下此藥不熟不寒得其和平助陰生子

川芎調血脈  
以滋榮惟下

虛者宜之要

知古人之友

自有獨解不

然何以男子

藥而補婦人

耶此方以鹿霜

自芍補血以

山藥水萃補

氣以芷薇而

治崩中淋露

以牡蠣而燥

濕治帶此又

別是一種意

見然不用芎

歸地黃者慮

丹溪方治白帶屬真陰虛者

血藥溫潤也

麥局如此可

肉蓯蓉酒

浸鬼絲子酒

蒸

覆盆子

蛇床子各一兩

二錢

當歸酒洗白芍藥炒

川芎各一兩

牡蠣火

烏鵲骨各八錢

三錢

五味子防風錢

黃芩五錢

艾葉三錢

右爲末。煉蜜丸桐子大。每服三四十丸。鹽湯下。早晚各進一服。

補宮丸治婦人諸虛不足。久不妊娠。骨熱形瘦。崩中帶下。並宜

治之。

鹿角霜白芍藥百米

白蒺藜

山藥

香白芷白薇

牡蠣火

烏鵲魚骨

各等分

右爲末。麵糊丸如桐子大。每服五十丸。空心米飲湯下。

丹溪方治白帶屬真陰虛者

龜板炙枳子各二兩

黃檗炒

二兩

香附子

山茱萸

不因事制宜

苦參

樗皮

貝母各半

白芍藥七錢

乾薑半

炒二錢半

乾薑四

丹溪治帶主于熟生濕其

意以腎主閉

藏而下焦者

肝腎主之然

溫從中焦生

故其方如此

宜若本草而

熟思之應變

無窮可爲執

方者一洗塵

補真固經湯

一婦白帶漏久服諸藥不効診得心胞尺脈極微其

白帶流而不止脉訣云崩中日久爲白帶漏下多時骨水枯言

崩中者始病血崩不已久下則血少復亡其陽故白滑之物下

流不止是本經血海將枯津液俱亡枯乾不能滋養筋骨以本

經行經藥爲引用爲使以大辛甘潤膩之藥潤其枯燥而滋益

必原脈原經

肺而救其上熱傷氣以人參補之以微苦溫之藥佐而益元氣能服此隱首不

井有髓者  
龍服以應神

經行經藥爲引用爲使以大辛甘油膩之藥潤其枯燥而滋益

凡東垣立方必原脈原証原藥然后沉思審處且又引前言爲証故治病多効

津液以大辛熱之氣味補其陽道生其血脉以苦寒之藥泄其肺而救其上熱傷氣以人參補之以微苦溫之藥佐而益元氣名曰補真固經湯

人參

乾薑各一錢

生黃芩另剉

郁李仁去皮尖研

柴胡

甘草炙各四錢不去白

橘皮一錢

白芍花十六朵去萼

怪乎病之不瘧也此方以用參薑益陽

李仁葵花潤燥柴胡升清

右除黃芩外以水三大盞煎至一盞七分再入黃芩同煎至二盞去滓空心熱服候少時以豆膳壓之

氣于下陳皮和胃氣于中

生芩后煎炒

其清涼不滯也非深思者不能主此方

名曰補真益

甘草

各一錢

白芍花七朵

柴胡一錢良薑二錢防風

郁李仁乾薑

陰中如水一名升陽

燥濕湯

以真氣爲主

耳

服法亦妙

此治重在陰

中如水痛控

干心故用良

薑爲君乾薑

爲佐不用姜

本首痛無補

也藥防足以

勝溫升陽發

李可以潤枯

溫燥甘噉和

中生芩涼氣

分之熟能與

前方參之日

有見解

前方中多以

氣分藥內加

虛燥之味此

右剉散只作一服水二盞煎至一盞食前熟服。

右二方用葵花郁李仁之滑以潤燥益佑潤帶着者宜之

○治虛寒帶下

元戎四物湯 治婦人赤白帶下。脈沉微腹痛或陰中痛。

四物湯

兩桂

附子炮各

五分

右剉水煎食前服。○一方四物加蔴香桂。

玉仙散 治赤白帶下。

乾薑

煅

白芍藥炒香附

炒焦各

甘草生用

五錢

右爲細末每服三錢月小白酒調下。○一方只用白芍藥酒炒

二兩乾薑炮半兩爲細末水飲調下二錢。

延胡苦練湯 治脅下冷撮痛陰冷大寒白帶下。

氣分栗內加  
溫燥之味此

延胡苦練湯。治臍下冷，微痛，哈冷，大寒，白帶下。

又以血藥中  
加桂附要知  
不同之故在

延胡索

苦練子各二錢

黃柏一分附子一錢

肉桂各三分

甘草

炙五錢

熟地黃一錢

右作一服水煎食前溫服。

桂附湯治白帶腥臭多悲不樂大寒。

肉桂一錢

附子三錢

黃柏

知母各五錢

乾薑用一兩  
是人劑大法  
後方止用四  
分之一又相  
逕庭穴均宜  
法之

右作一服水煎食遠熱服。如少食常飽。有時似腹脹。加白芍藥半錢。如不思飲食。加五味子二十個。如煩惱。茴上麻木如蟲行。乃胃中元氣極虛。加黃芪一錢。人參七分。甘草二分。升麻五分。此補陽氣極虛。用黃柏等爲引用。又升降陰陽藥也。

延胡苦練以  
始痛內桂附  
子以溫寒熟  
地治脅下之

當歸附子湯治脅下冷痛亦白帶下。

當歸錢

良薑

乾薑

附子各二錢

柴胡七錢

分

性之所喜

多悲不樂者

陰晦之象也

故宜桂附以

助陽陽和則

不悲而有樂

矣少以知樂

爲從治者

桂附上也亦

用熱

遠熱之意

食似腹脹何

以加自芍不

思食荷以加

五味思之

良薑薑薑太

治脾下冷痛

鹽柄引之就

下蝎稍直主

宿所升柴引

## 升麻

蝎稍各五分

甘草炙六分

炒黃芩三分

黃柏少許

有爲粗末。每服五錢水煎溫服。爲丸亦得。○東垣回陽丹註云。必用炒黃芩無則不効。蓋寒疝之要藥也。

酒煮當歸丸

治癩疝白帶下注脚氣腰以下如在冰雪中居火

坑以厚衣重蓋猶冷。小便不止。與白帶長流而不禁固。肌肉消

瘦面白目青目恍恍無所見。身重如山行步欹側。腿膝枯細大

便閉結心下痞悶。懊憹飲食不下。面垢背寒。小便遺而不知。此

上中下三陽真氣俱竭。故嘔嘔不止。胃寒之極也。其脉沉緊而

澀按之空虛。若脉洪大而澀。按之無力。猶爲中寒之証。况按之

空虛者乎。按之不鼓。是爲陰寒之極也。其空虛乃氣血俱虛之

極也。

右四味剉如麻豆大。以好酒一升半同煎。煮至酒盡爲度。出火

巨闊稍直上  
升益樞引諸

痛所升柴引  
極也。

左右滿氣上  
升益樞引諸

濁陰下降  
帶脉爲病男

子七疝女子  
瘕聚此以癩

疝在女子豈  
與男子同歟

嘗聞女子病

形如茄突出

陰是亦病  
也故云臥

諸症皆寒獨

便閉心下病

懊惱似狂

浮沉均以爲

寒按之不鼓

無問大小皆

以爲虛形者

當歸一

穠香牛

黑附子

炮去皮臍良薑各七

右四味剉如麻豆大以好酒一升半同煎煮至酒盡爲度炭火  
焙乾同爲細末入後藥

炒黃耆

丁香各半

全竭錢三

柴胡錢二

升麻根

木香各一  
苦練子

甘草炙各五分

玄胡索錢四

右同爲細末酒煮麵糊丸如桐子大每服二十九空心宿食消  
盡淡鹽湯下忌油膩冷物酒麵

暖宮妙應丸治婦人赤白帶下及子宮虛冷無子者

當歸 川芎 白芍藥 熟地黃 艾葉

牡丹皮 茶芩 龍骨 牡蠣 赤石脂

各等 分

右爲末麵糊丸如桐子大每服五十丸空心艾醋湯下

常須識此

既曰血氣俱

虛而本方中

會無一味氣

藥而血藥不

止一味當歸

當真陽已竭  
卽甘溫之味  
亦未易爲力  
也勿地能滯

陽氣故亦不  
用  
妙在前四件  
用酒煮又以  
酒糊丸者峻  
補其下使真  
陽之氣生平  
九淵上千九  
天也其後九  
機或引之于

### 鶴頂丸

治帶下之證有三。未嫁之女月經初下。止而即得。或浴

之以冷水。或熱而扇。或當風。此室女病帶下之由。有嫁之婦。陰  
陽過多。卽傷胞絡。風邪乘虛而入。胞經觸冷。遂成癰瘕。與血水  
相連而下。產後帶下。由亡血失氣。傷動胞絡。門開而外風襲。肌  
體虛而冷風入。冷風與熱氣相連。故成液而下。冷則多白。熱則  
多赤。冷熱相交。赤白俱下。

### 當歸

七錢半 酒浸

附子

炮去皮 半兩

龍骨

盜泥

吳茱萸

湯泡 去漬

### 赤石脂

火煅 醋淬

乾薑

兩半

牡蠣

一兩二錢 盡泥包煖

艾葉

一兩以醋半盞浸乾

右爲細末。研匀。醋糊和丸。如桐子大。以赤石脂爲衣。每服五十  
丸。空心用艾葉食鹽烏梅煎湯下。

### 白蘞丸

治室女衝任虛寒。帶下純白。

天也其後九

白蘞丸

治室女衛任虛寒帶下絕白

降或佐之子升有開結透

閉之妙非精識病源究心

藥石者不能

到也然其力

量博大非善

神仙聚寶丹一名琥珀珠砂丸

治婦人血海虛寒。外乘風冷。搏結不散。

用者不敢此方以四物

合成劑以艾

葉暖其下肢

丹附其瘀宜

乎子宮溫而懷姪矣

此三十六疾

之類此大熟之劑

非真寒者不

可服

右爲細末。茲煎醋汁打糊丸如桐子大。每服五十丸。空心溫酒送下。

鹿茸

酒蒸煑

白蘞

狗脊

燎去毛櫟各一兩

積聚成塊。或成堅癥。及血氣攻注。腹脇疼痛。小便急脈。或虛鳴嘔吐涎沫。頭旋眼花。腿膝重痛。面色痿黃。肢體浮腫。月候欲行先若重病。或多或少。帶下赤白。崩漏不止。驚怖健忘。小便頻數。或白。時見虛熱。盜汗羸瘦。此藥不問胎前產後。室女並皆治之。常服安心去邪。逐敗血。養新血。令有子。

當歸

木香

琥珀

沒藥

各一錢

一滴乳香

半

麝香

辰砂

各半

女子二七而天癸至。正當氣旺之年。豈可輕用溫熱之劑。獨以純白二字推之。自云字推之。便得虛寒之真。故可用鹿茸耳。

右各另研爲細末。合一處研勻。水丸如龍眼核大。每用一丸。溫酒磨下。不拘時。○胎息不順。腹內疼痛。一切產難。酒童便磨下。○產後血暈。敗血奔心。口噤舌強。或惡露未盡。發渴面浮。煎鳶梅湯和童便磨下。○室女月候不調。溫酒磨下半丸。○產後血氣不調。童便磨下。

茱萸浴湯。治下焦虛冷。臍腹疼痛。帶下五色。月水崩漏淋瀝。不斷。

吳茱萸湯泡杜仲炒去蛇床子五味子 丁皮各一兩

木香 丁香各半兩

經曰。氣有是動。血爲所生。病據此所言。病症先由血海虛寒。故氣不能溫。又爲風冷外乘。故致血結不能散。非溫行不可。故此方乃於血中行氣。

右剉如麻豆大。每用半兩。以生絹袋盛。水三大碗煎。數沸乘熱重下。部通手淋浴。早晚二次薰洗。

可故此方乃於血中行氣

謂氣行血所

自無病也

夫醫者意也

凡風寒由外

而襲內以至

下焦生寒証

者以此方熏

而散之所謂

之發之也

摩之浴之開

由茱萸湯至

下四方皆外

治法于上熱

下寒難服溫

補之藥者宜

之益以人功

挽回造化今

罕知此亦有

病者不能言

回陽丹

# 坐藥龍鹽膏 治帶下

玄胡索錢

厚朴錢

當歸

茴香

炒黃鹽

酒防已

肉桂

紅豆

龍骨錢

川烏頭炮

丁香

木香各一錢

良薑

水通錢

金蝎枚枯礬五分

右爲末。煉蜜丸彈子大。綿裹留絲在外。納陰戶內。

勝陰丹爲上藥力小。再加三錢。內加行性藥。

羌活

柴胡各二錢

大蒜一錢

破故紙與蒜同焙一錢

三奈子

川烏頭

大椒各一分

甘松三分

升麻

枯白礬各分

全蝎三個少許

有爲細末。同前法製用。

醫者無以應  
徒自待翫而已  
此東垣先生所製

全蝎

升麻

甘松各二分

草烏頭

羌活各三分

大椒

三奈子

草撥

枯礬各五分

大蒜

破故紙各二錢

水蛭三條炒焦二錢

川烏頭

柴胡各七分

茱蠅三個

翅膀炒黃鹽一錢必用之藥去之則不効

右爲極細末。依前製如指尖大。用綿裹納陰戶中。覺膚下煥爲効。

如聖丹。治婦人經脈不調。赤白帶下。

枯礬四兩

蛇床子二兩

至閉藏者腎若滑脫者腎氣不固也。牡蠣咸寒而益腎。蛇床辛溫而壯氣。其清而燥滯者則枯礬地榆烏賀其濕而補其燥也。

右爲末。醋爲丸。如彈子大。用臍脂爲衣。綿裹放陰戶中。定坐半日。熟極再換。大抵月水不通。赤白帶下。多因子宮不潔。服藥難效。此取易痊。且速效而不傷臟氣也。一方用枯礬川烏各等分。

標其燃而補

勸此取易痊且速效而不傷臟氣也。一方用枯蠶川烏各等

氣者則黃芪  
楚若白芷

行陽明于血

海殼散

氣以消瘀

螺旋蟲氣胎

髮血白芷

白陽明之氣

而散以助

升之用火

土之性而生

燥燥則足以

治上梁上塵

得上氣之飛

揚而土升升

則土氣不暗

而濕不生标

欄為止濕之

用腦射少入

取其能散然

分煉蜜丸如彈子大。綿裹納陰中。治帶下絕產。  
○治帶下滑脫。

側柏地榆湯

治赤白帶下以致不能成孕。

黃芪

側柏葉

地榆

烏賊魚骨

白蘞蠶

牡蠣

用鹽泥固濟火燶透去泥研各一錢

內蔻蓉酒浸白芷

蛇床子

各一錢二分

右剉加生薑三片水煎半餓時服

白芷散 治赤白帶下

白芷

雨

海螺蛸

二個

胎髮

一團

細末

心溫酒調下一錢

伏龍肝散

治赤白帶下久患不瘥。延年方。六脉微濡。

櫻櫛

不拘多少燒炭急以盆蓋蔭冷存性

伏龍肝於性直下取赤土炒令烟盡

屋梁上懸壁炒合烟盡去火毒

於久病燒悴  
之人恐非補  
劑不可

馬蹄得乾金

有下之健体

馬蹄丸 治白帶不絕

下患十年者、半月可安。

而入肝腎益  
得燥金之剛

氣而制木餘

白馬蹄 禹餘糧各四兩 龍骨三兩 乌鱗魚骨 白僵蠶

赤石脂二兩

船赤脂以固  
血之脫龍骨

烏賊以固氣

之脫蓋肝主  
疎泄而藏血

疎泄者氣脫

氣脫則血不

藏以金平之

而健其志以

血滿之而固

其氣宜其爲

治漏之要藥

固真丸 治白帶大下不止。臍腹疼痛。其寒搘之如冰。陰中亦然。  
目中溜火上壅。視物恍惚無所見。齒皆惡熱飲痛。須得黃連末  
擦之。其痛乃止。惟喜乾食。大惡湯飲。此病皆寒濕乘其胞內。故  
喜乾而惡濕。肝經陰火上溢。走於標。改上壅。而目中溜火。腎小

甲伏火也。當大瀉寒溫。以丸藥治之。故曰寒在下焦。治主宜緩

喜乾而惡濕。肝經陰火上炎。走於經。改上壅而目中溜火。臤腎水。

浸肝而上溢。故目中眊眊無所見。齒短熱飲者是少陽陽明經  
中伏火也。當大瀉寒溫。以丸藥治之。故曰寒在下焦治主宜緩。  
大忌湯散。以酒製白石脂。白龍骨以祐其燭。以炮乾薑大辛熟  
瀉寒水。以黃檗之大寒爲因用。又爲鄉導。故云古者雖有重罪  
不絕人之後。又爲之伏其所主。先其所因之意。又瀉齒中惡熱  
飲也。以柴胡爲本經之使。以芍藥半錢導之。恐辛熱之藥太甚。  
損其肝經。故微瀉之。以當歸身之辛溫。大和其血脉。用藥之法  
備矣。

白石脂

燒赤水飛研細焙乾柴胡錢

白龍骨

二錢酒煮日乾水飛爲末

當歸

酒洗三錢乾薑四錢

黃檗

酒洗各五錢分

右爲細末。水煮稀糊爲丸。如鷄頭大。每服三十九。空心宿食消

服藥有法亦  
有期讀此文

得一種經緯

卷三

二二二

盡煎白佛湯放溫送下無令胃中停住待少時以早膳壓之是  
不令熱藥犯胃忌生冷硬物與酒溫麵

大溫下元之  
寒湿惟入痛

虛寒者宜之  
若爲丸服更  
佳恐其滑上

一方治赤白帶下不問遠年近日並皆治之

龍骨半兩 舶上硫黃三錢

此方自益  
崩衄當入血  
崩證

右爲細末每服半錢空心無灰酒下

也

茅花散 治婦人血崩不止赤白帶下  
茅花搗 檀櫟皮嫩荷葉甘草飴仁

右爲細末空心酒調半匙服

雙白丸 治白帶如神

石灰一兩 白茯苓二兩

右爲末水丸桐子大每服三十丸空心白水下

燥濕除溫

散兼服丸

右爲末。水丸桐子大每服二十九丸。空心白水下。

白附丸。有婦經年崩。不止。諸藥不効。脉濡微。此與前伏龍肝

妙在狗骨頭

灰益有溫滌

之能耳。

此方治四氣

七情故以爲

名然以半夏

爲君則知內外

二因皆能合

氣衝而生濕

生痰也。參附

內貼蘇附

外其餘又兼

成功然不有

琥珀爲之通

寐燥溫則亦

不能爲効也。

### 散兼服愈。

白附子

四兩

附子

二兩

黃狗骨頭

四兩燒灰

右爲細末。

粥丸桐子大。每服三十九。

地榆膏。

治赤白帶下。骨立者。

此瀝血涼劑。濕熱勝而滑勝者宜之。

地榆一觔。

用水上升煎至一半去渣再煎。

如稠餳。絞淨空心。

服三合。日二服。

○治白淫白濁。

加味四七湯。治婦女小便不順。甚者陰戶疼痛。

半夏

湯洗七

厚朴

薑汁製

赤茯苓

香附子

炒各五錢

紫蘇

甘草

各二錢

夫坎者水也。  
腎主之而坎  
中之一陽乃

腎中之真氣  
氣固則水旺

水旺則氣溫  
氣溫則下元

虛若白濁八  
而如泔如脂  
或小便無度  
皆氣脫也氣

脫則下焦無  
火而水不溫  
矣安得水升  
而火降此方

能回脫溫氣  
飲藏真火誠  
惟虛寒要藥

右咬咀分四貼。每服水二鍾。生薑三片。煎八分去滓。加琥珀末一錢。調服。

鎗精丸。治小便白濁。或白帶淋瀝。

破故紙炒青鹽。白茯苓。五味子。

爲末。酒糊丸桐子大。空心溫湯。或酒下三十九。

固精丸。治下虛胞寒。小便白濁。或如泔。或如凝脂。或小便無度。腰重等證。

牡蠣煅粉桑螵蛸酒炙龍骨。白石脂。白茯苓。

五味子。菟絲子。燒蒸。

菟子。炒谷等分。

右爲末。酒糊丸桐子大。每服七十丸。空心鹽湯下。

內金鹿茸丸。治婦人勞傷血脉。胞絡受寒。小便白濁。日夜澀痛。

附錄卷之二

內金鹿茸丸

治婦人勞傷血脈胞絡受寒小便白濁日夜無度

雖男子亦宜  
用按鹿茸

蓉黃芪附子

有益精益氣

溫腎之功肉

螺旋龍骨有

通經禁便之

用五味遠志

生津液而入

腎以補正氣

其爲補下無

疑男女俱可

服

內蕤蒙男得

之而助陽女

得之而孕育

巴戟補髓添

精葫蘆巴治

虛令補骨脂

鹽湯任下

鹿茸

黃耆

雞內金

內蕤蒙

五味子

遠志肉

牡蠣

桑螵蛸

龍骨

附子分

各等

右爲細末。煑蜜和丸如桐子大。每服五十丸。食前溫酒或米飲

任下。

金鎖正元丹。治真氣不足。吸吸短氣。四肢倦怠。脚膝瘦軟。目暗

耳鳴。遺精益汗。及婦人白濁白澀等證。

肉蕤蓉

洗培

紫巴戟去萌蘆巴

炒各一斤

補骨脂

酒浸炒

五倍子

八兩。淡芩去皮砂砂

二兩。六兩。研另研

龍骨二兩

右爲末。入藥研令勻。酒和丸如桐子大。每服二十丸。空心溫酒

起陽衰五倍  
子燥陰濕存

苓陽中之陰  
硃砂鎮心之

主寓降火升

水之妙龍骨  
固脫故爲下

元真氣不足

者所服也

味之淡者莫

過於蠟而淡

之滲者莫過

於茯苓益淡

者天之陰天

氣降則水生

水生則火有

制而又以猪

苓者茯苓者

欲其滲之速

以蜡爲丸者

### 威喜丸

治丈夫元陽虛微。精氣不固。餘瀆常流。小便濁。夢寐顛。

泄及婦人血海久冷。白帶。白濁。白淫。下部常溫。小便如米泔。或

無子息。

黃蠟四兩

白茯苓去皮四兩作塊用。猪苓二錢半同於磁器內煮二十餘沸出日乾。不用猪苓。

右以茯苓爲末。熔黃蠟杵爲丸。如豌子大。空心細嚼。滿口生津。徐徐嚥服。以小便清爲度。忌米醋。只契糠醋。尤忌使性氣。泥固濟。炭火內煅存性。去泥研魚爲末。每用一錢。以陳酒調同

百草霜

炒紫金皮

米泔浸粉草

炙各等分

右爲末。每服二錢。艾湯或醋湯空心調下。○心嘈。猪血入鹽酒下。○白帶用鯉魚一尾。去腸不去鱗。將油髮一團。入魚肚內。黃泥固濟。炭火內煅存性。去泥研魚爲末。每用一錢。以陳酒調同

欲其降之速  
以蜡爲丸者

泥固濟灰火內煅存性去泥研魚爲末每用一錢以陳酒調同

欲其降之速  
也亦忌使庄

之句戒動肝

氣也

紫金皮通血

中之氣而散

血百草霜止

葵汁之水而

除黃氣通血

行塊痛自止

妙在甘草等

分不然何以

能清身熱口

燥也

此方簡切久  
服彌佳

### 前藥服

一方 治婦人久積虛寒。小便白濁。滑數不禁。

鹿茸屑炒黃爲細末。每服二錢。空心溫酒調服。



